

CAROLI A LINNÉ,

EQUITIS,

SYSTEMA VEGETABILIIUM

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,

GENERA, SPECIES;

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS

ET

SYNONYMIIS.

EDITIO NOVA, SPECIEBUS INDE AB EDITIONE XV. DETECTIS
AUCTA ET LOCUPLETATA.

VOLUMINIS SEPTIMI PARS PRIMA.

CURANTIBUS

JOS. AUGUSTO SCHULTES, M. D. ET PROF.

ET

JUL. HERM. SCHULTES, M. ET CH. D.

STUTTGARDIÆ

SUMTIBUS J. G. COTTAR.

1829.

Linnean
QK91
C613
1829
v.7
pt.1

SERENISSIMO. PRINCIPI.
COMITUMQUE. SENIORI.

D. D.

JOSEPHO.

AD. SALM-REIFFERSCHEID-DYCK.

PRINCIPI. IN. HRAUTHEIM. COMITI. AD. DYCK. DOMINO. IN. ALFTEH.
HACHENBROICH. RAMERSDORF. BAINDT. BALLEMBERG. GERLACH-
HEIM. GRUNSFELD. REITZ. IDOWITZ. ET. BLANSHOW. S. C. M.
AUSTRIACAE. A. CUBICULIS. EXERCITUS. R. BORUSS. EXCUBIARUM.
SUPERIORI. PRAEFECTO. ORD. EQUIT. MELIT. ET. LEGION.

HONOR. ETC. ETC.

Plures atque gravissimi, quibus fortuna adversa domum nostram a pluribus annis obruit et vix non oppressit, casus obfuere quo minus in edendo Syst. Veg. solitâ promptitudine uteremur. Diligentia interea non abfuit. Die enim noctuque ordinandis expoliendisque, quas a prima quasi juventute per XL annos ad exquisitiorem systematis Vegetabilium editionem collegerat pater, adnotationibus incubuit ita, ut congesto thesauro nonnisi novissima quaeque a tot tantisque viris clarissimis ubique in orbe terrarum recens lecta filio addenda sint.

Suppellectili nostrâ atque benignate liberalitateque clarissimorum et illustrissimorum virorum *Agardh, Balbis, Bertero, Bertoloni, Besser, Blume, de Chamisso, Colla, Decandolle, Dietrich, Dufour, Eschweiler, Joh. Bapt. Fischer, a Froriep, Haworth, Hayne, exc. Com. a Hoffmannsegg, Hoppe, Jan, Koch, Lagasca, Laharpe, Lang, Lehmann, Lindley, a Martius, E. Mayer, Nestler, Panzer, Aub. de Petit-Thouars, Presl, Reichenbach, Rochel, Max.*

Roemer, Roth, Sadler, Ser. Princ. ad Salm-Reifferscheid-Dyck, de Schlechtendal patris et filii, Schrader, Schwaegrichen, Smith, Exc. Com. a Sternberg, Steudel, Thunberg, Trattinick, van Hall, Wallich, Weinmann, Bar. a Welden, Wenderoth, Wikström, Zuccarini (quibus pro sua in nos benevolentia publicas agere gratias tum officii tum voluptatis est) adjuti, neque operae neque sumtui pepercimus, quo magis editionem nostram *Syst. Veg. omni*, quo per nos licuit, numero absolutam reddamus, brevique, si incepto Botanici favent operi, ad finem perducamus.

Landishuti Bojorum 10. Octobr. 1828.

J. A. SCHULTES, M. D.

J. H. SCHULTES fil., M. et Ch. D.

Classis VI.

H E X A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

Genera.

A. Absque spathis.

a. Flores completi.

a. Calyx inferus:

a. 6-3 phyllus.

1275. **NANDINA.** *Cal.* polyphyllus, imbricatus; squamis 6 in singula serie, caducis. *Pet.* 6, intus eglandulosa. *Anth.* oblongae, sessiles. *Styl.* trigonus, brevis. *Stigma* trigonum. *Bacca* pisiformis, exsucca, stylo coronata, 2-sperma. *Sem.* 2, hemisphaerica. *Thunb. Lam. Illustr.* t. 261.

Familia BERBERIDEARUM *Decand.*; incertae sedis apud *Jussieu.*

1276. **BERBERIS.** *Cal.* 6-phyllus, extus 3-bracteatus, caducus. *Pet.* 6, ad unguis biglandulosa vel eglandulosa. *Stam.* petalis opposita, edentula vel apice utrinque dentata. *Styl.* subnullus. *Stigm.* orbiculatum. *Bacca* ovata, rarius subsphaerica, 1-locularis, 2-3-4-9-sperma. *Sem.* erecta, oblonga. *Lam. Illustr.* t. 253. f. 1.

Familia BERBERIDUM *Juss.*, BERBERIDEARUM *St. Hil.* MAHONIA *Nutt.*, ODOSTEMON *Rafin.*

Obs. MAHONIA *Nutt.*, quae *cal.* 6-phyllis, *pet.* 6 eglandulosis, *stam.* ad apicem filamenti utrinque dentatis, *baccâ* 3-9-sperma nunc a BERBERIDE genere distingui solet, vix genus rite definitum constituit, quamvis quoad habitum satis naturale: nam, monente *R. Brown* aliisque, petala basi in omnibus glandulosa, sed glandulae magnitudine valde variae. Dentes filamentorum praeter desunt in 2 MAHONIAE speciebus, nempe in *M. glumacea* et *nepalensi*.

1277. **LEONTICE.** *Cal.* 6-phyllus, deciduus, nudus. *Pet.* 6. *Nectarium* 6-phyllum, unguibus corollae insidens, limbo

patens. *Stam.* petalis opposita. *Anth.* erectae. *Styl.* brevis. *Stigm.* simplex. *Caps.* vesicaria, subbaccata, 1-locularis, 2-4-sperma. *Sem.* globosa. (*Pericarp.* immaturum dehiscens; *semen* magnum, drupaceum, nudum, in funiculo elevatum. *Torrey Fl. N. et M. U. St.* p. 336.) *Lam. Illustr.* t. 254.

Familia BERBERIDUM *Juss.*, BERBERIDEARUM *St. Hil.*

Obs. HUC LEONTOPETALUM *Dec.*: capsulâ demum valde inflatâ, nunquam ruptâ: seminibus inclusis; CAULOPHYLLUM *Mich.*, in quo capsula parum inflata per maturitatem rupta: semina exserta, et ACHLYS *Decand.*. Character CAULOPHYLLI apud *Poiret Enc. Illustr. gen. T. III. t. 936*: „*Cal.* 6-phyllus; *pet.* 6 calyci opposita; *stam.* 6.; *antherae* 2-loculares; *germ.* superum; *stylus* 1; *drupa* 1-sperma.“ Character ACHLYS, generis dubii a *clo Decandolle* ad *Podophyllaceas* positi: *cal.*?; *pet.* numerosa; staminum filamenta apice dilatata; antherae loculi subglobosi, distantes, transverse rimâ dehiscences. Genus non satis notum: an JEFFERSONIAE, an ACTAEAE potius affine?, quaerit *Decandolle*.

1278. GUAPIRA. *Cal.* 4-5-phyllus; foliolis brevibus, acutis. *Cor.* tubulosa, 5-6 dentata. *Fil.* 3 breviora, 3 longiora, sub germine inserta. *Anth.* biloculares. *Styl.* canaliculatus. *Stigm.* 5-6-partitum. *Bacca* ovata, 5-6 striata, monosperma. *Aubl. Gujan.* p. 308. t. 119.

Cls. *Jussieu* genus hoc vix ab AVICENNIA diversum credit. Familia VITICUM *Juss.*, VERBENACEARUM. *St. Hil.*

1279. CLEOME. *Cal.* 4-phyllus s. 4-partitus, patens, subaequalis. *Pet.* 4, irregularia vel regularia, saepius adscendentia, basi saepe nectarifera, vel glandulae nectariferae 3, ad calycis sinus, excepto infimo, singulae. *Stam.* ut plurimum 6, raro 4, subinde 8-40 et ultra, libera vel basi circa torum monadelphæ. *Stigma* crassiusculum. *Siliqua* vel *Capsula* siliquaeformis stipitata vel sessilis, 1-locularis, bivalvis, polysperma. *Lam. Illustr.* t. 567. f. 1. (CLEOME pentaphylla) f. 2. 3. (CLEOME violacea.)

Familia CAPPARIDUM *Juss.*, CAPPARIDEARUM *St. Hil.*

Obs. Genus valde ambiguum quoad staminum numerum, formam situmque, quoad petalorum regularitatem vel irregularitatem etc., variis classibus insertum varioque successu hodie in genera plurima divisum. Secuti sumus clum *R. Brown*, qui pleraque horum generum tantum subgenerum instar recepit. *Decandolle* in *Prodromo* II. p. 237 sequentia exhibuit genera: 1. CLEOMELLAN; 2. PERITOMA (de quibus infra); 3. GYNANDROPSIN, cui: „*Cal.* 4-sepalus, patens; *Pet.* 4; *Torus* elongatus; *Stam.* 6 circa torum monadelphæ ad ejus apicem libera; *Siliqua* in calyce ad apicem tori stipitata.“ (Haec apud *Com. a Hoffmanns. Verzeichn.* p. 186. PODOGYNE, cui: „*Cal.* 4-phyllus; *Pet.* 4, unguiculata, adscendentia; *Glandulae* nectariferae intus ad calycis foliolorum basin; *Stipes* centralis, medio stamina verticillata, apice germen gerens; *Stam.* 4?—6; *filam.* filiformia; *antherae* erectae; *Germ.* superum; *Siliqua*.“ *Clo R. Brown* in *Append. to Denham et Clappert. GYNANDROPSIS* *Dec.* subgenus GYMNOGONIA est praesertim aestivatione apertâ diversum.) 4. CLEOMEN, cui: „*Cal.* 4-sepalus, patens, subaequalis; *Pet.* 4; *Torus* subhemisphaericus; *Stam.* 6, rarius 4; *Siliqua* dehiscens, in calyce stipitata aut sessilis.“ (Huc maximâ ex parte SINAPISTRUM *Tournef.*, Mönch, SILIQUARIA *Forsk.* (subgenus *Siliquaria* apud *R. Brown*), RORIDULA *Forsk.* (RORIDA *S. Veg. ed. nost. III.*) pleraeque CLEOMAE *Linn.*). 5. POLANISIAM, cui: *Cal.* 4-sepalus, patens; *Pet.* 4; *Stam.* 8-32; *Torus* parvus; *Siliqua* in calyce sessilis aut vix stipitata, stylo distincto terminata. (Jam *Rafinesque* genus POLANISIAE sequente caractere exposuit: „*Cal.* 4-phyllus, coloratus, inaequalis; foliolo superiore unguiculato, spathulato; *Pet.* inaequalia, 2 superiora majora, inaequalia; *Nectar.* magnum: glandula superior truncata; *Stam.* 9-14, inaequalia, erecta, hypogyna; *Germ.* pedicellatum; *Styl.* filiformis; *Stigma* truncatum; *Caps.* oblonga, inflata, 1-locularis, 2-valvis, polysperma; *Sem.* marginibus valvularum inserta, subheliciformia.“) 6. SCHEFFERIAN, quam

in OCTANDRIA exhibebimus, et cui: „*Cal.* 4-sepalus, patens; *Petala* 4; *Torus* elongatus; *Stam.* 8 circa torum monadelpa apice libera; *Nectarium* concavum ad basin tori; *Siliqua* carnosâ in calyce stipitata.“ In fasc. III. *plant. rar. hort. Genev.* cl. *Decandolle* 2 genera a cl. *Schrader* eidem in litteris communicata, ab ipso auctore vero nondum descripta, instar subgenerum exhibuit. Horum alterum, (CORYNANDRA, illi mera subdivisio POLANISIAE, filamentis apice dilatatis tantum diversa, est; nobis vero subgenus proprium, uti ipsa POLANISIA. Character generic. CORYNANDRAE apud *Reichenbach Hort. bot. Oent.* II. t. 147: „*Mos* regularis. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* plurima, filamentis apice clavatis. *Stylus* 1. *Stigma* simplex. *Caps.* 1-locularis, siliquosa, polysperma: semina placentis binis suturalibus demum secedentibus alternatim affia.“ Alterum, DACTYLAENA *Schrader*, cl. *Decandolle* subdivisio est (CLEOMES, nobis vero, licet stamina plura abortu etiam in CLEOME (POLANISIA) *dianthera* deficiant, glandula lateralis ad germen etiam in *Cl. uniglandulosa*, majore tamen jure proprium genus constituere videtur, quam genera botanicorum recentiorum plura alia. Subjungimus hic characterem DACTYLAENAE ad MONANDRIAM spectantis a cl. *Schrader* in *litt.* communicatum: „*Cal.* 4-phyllus, inaequalis, connivens. *Petala* 4, inaequalia, unguibus conniventibus. *Parapetalum* 4-partitum, ovarium includens. *Stam.* 1, parapetalo oppositum. *Caps.* siliquaeformis, 1-locularis, 2-valvis, polysperma. *Sem.* sporophoro centrali affixa. Genus CLEOMAE proximum habitu et fructu; diversum calyce, corollâ, praesentiâ parapetali, pauciori staminum numero et glandularum nectariferarum defectu.“ DACTYLAENA *micrantha* *Schrader Cat. sem. hort. Gott.* 1823. Planta suffruticosa, (in *Dec.* ☉). Folia petiolata, ternata: foliolo intermedio ovali v. ovato: lateralibus minoribus oblique ovatis. Racemi terminales, pauciflori. Flores parvi. *Cal.* foliola lanceolata. *Petala* angusta. *Parapetali* lacinae lineari-subulatae. Tota planta pilis exiguis guttuleris tecta, odore ingrato.“ Icones et descriptiones uberiores plantae hujus valde singularis invenies in *Schrader hort. Gott. ined.* et in *Decand. pl. rar. d. jard. d. Gen. fasc.* 3. p. 53. n. 15., ubi stamina et parapetalum sic describuntur: *Stam.* 6, licet primo intuitu 5 tantum adesse videantur; 4 superiora antheris destituta, filamentis liberis linearibus acutis subulatis brevibus; 5-tum ad latus inferius floris, praecedentibus majus, filamento subcylindrico purpureo, calycis foliolo inferiori appressum ejusque longitudine; anthera crassa, didyma: lobis 2 oblongis bilocularibus, ita ut stamen hoc certe e staminibus 3 coadunatis consistat. Glandula ad basin superiorem germinis viridis, satis crassa, fere ut in *Cl. uniglandulosa*.

1280. CLEOMELLIA. *Cal.* 4-phyllus, patens. *Pet.* 4. *Torus* ovato-globosus. *Stam.* 6. *Silicula* in calyce stipitata latitudine brevior. *Decand.*

Familia CAPPARIDEARUM *Decand. Prodr.* I. p. 257.

1281. PHYSOSTEMON. *Cal.* 4-phyllus, deciduus. *Petala* 4, adscendentia, unguiculata. *Stam.* 6, rarius 8, inaequalia, 2 vel 4 minoribus infra antheram inflatis. *Styl.* simplex, stigmatate simplici. *Germ.* sessile. *Caps.* siliquosa, 1-locularis, 2-valvis; receptaculo marginali persistente. *Sem.* plurima, reniformia, echinata. *Martius.*

Familia CAPPARIDEARUM *Juss. Mart. et Zuccar. nov. gen. et spec.* T. I. p. 72.

Obs. Hexandra potius, quam octandra; nihilominus cl. *Spreng.* in *S. V.* eam ad OCTANDRIAM amandavit.

1282. HERMUPOA. *Cal.* duplex: exterior tubulatus, interior 4-phyllus minimus. *Pet.* 4, linearia. *Stam.* 6 longissima. *Styl.* staminibus brevior. *Stigma* capitatum. *Bacca* oblongo-cylindracea, magna, polysperma. *Löffl. Itin.* 507.

Familia CAPPARIDEARUM. Affinis BREYNIAE. *Löffl.* An calyx interior potius nectarium, uti in *Löffling?*

1283. DIPHYLLEJA. *Cal.* 3-phyllus, deciduus. *Pet.* 6, calyci opposita, decidua, intus nuda. *Antherae* loculis membranâ a basi ad apicem junctis, eâdemque solutâ dehiscenti.

bus. *Stylus* brevissimus, stigmatē transverso, labiato. *Bacca* 1-locularis, subglobosa, seminibus 2-3 ovato-subrotundis. *Mich. Poir. ill. gen. III. p. 594. t. 957.*

Familia BERBERIDEARUM *Dec.*. CAULOPHYLLO *Mich.* (LEONTICAE) proxima.

1284. FLOERHEA. *Cal.* 3-phyllus v. 3-partitus, persistens. *Pet.* 3, calyce breviora, et cum eodem alternantia. *Stam.* 6, basi glandulis 3. *Anth.* erectae. *Stylus* bifidus. *Utriculi* 2-3, monospermi. *Sem.* rotundata. *Mühlenb. Willd.*

Familia JUNCINEARUM *St. Hil.*?, PORTULACEARUM *Nuttall*, qui eam nullo modo NECTRI affinem dicit. Omnino esse a NECTRI *Schreb. s. CABOMBA Aubl.* distinctam, si *Elliott* recte pistillum 1 cum seminibus 2 vidit, cum pistilla 2 capsulaeque 2 polyspermae in NECTRI. *Rafinesque in Sillim. Americ. Journ. 1. p. 375. Conf. NECTRIN.*

b. *monophyllus.*

1285. PEPLIS. *Cal.* campanulatus, 12- (rarius 8-) dentatus: dentibus alternis reflexis angustioribus. *Pet.* 6, calyci inserta, aut 0. *Stam.* 6, rarius 4, calyci inserta. *Styl.* filiformis. *Stigma* subcapitatum. *Caps.* calyce tecta, 2-locularis, polysperma; dissepimentis seminiferis. *Lam. Illustr. t. 262 f. 1.*

Familia SALICAREARUM *Juss.*

Obs. *Cls. Decandolle* plures PEPLIDIS species ad AMMANNIAM posuit, quam praesertim capsulâ 4-loculari styloque a PEPLIDE differre dicit. *Peplis indica* illi est genus proprium, AMELITIA, sequente caractere: *cal.* tubuloso-campanulatus, 8-dentatus; dentibus 4 ovatis, erectis, magnis, 4 minimis in majorum sinibus; *pet.* 0; *stam.* 4 angulo loborum calycis inserta et inde cum iisdem alternantia; *germ.* ovatum; *styl.* filiformis; *stigm.* capitatum; *caps.* ovata, junior bilocularis, matura 1-locularis. *Conf. Decandolle Revue de la famille des Lythraires.*

1286. TUSSACIA. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* infundibuliformis, 8-partita. *Stam.* fauci tubi inserta. *Stigma* 4-fidum. *Reliqu. Willd. Ms.*

Genus dubium, quod *cls. de Schlechtendal*, pater, cum divo *Römer* communicavit; filius nil adnotavit.

1287. ADENIA. *Cal.* cylindricus, longissimus, 6-fidus: laciniis reflexis, obtusis. *Pet.* 6, lanceolato-linearibus, inter calycis lacinias iisque breviora. *Filam.* 6, ad basin calycis tubi inserta. *Squamae* 6, lineares, erectae, truncatae, in axillis filamentorum insertionis. *Styl.* conicus, brevissimus. *Stigm.* emarginatum, crassiusculum. *Germen* calycis tubo adnatum. *Fruct.?* *Forsk. Aeg. p. 77.*

Incertae sedis apud *Jussieu*. Genus tantum a *Lamarck* et *Gmelin* receptum.

1288. BOLDUS. *Cal.* 5-6-lobus. *Cor.* 6-petala, calyce brevior: petala subrotunda. *Filamenta* subulata. *Antherae* laterales. *Germen* conicum. *Stigma* sessile. *Drupa* ooidea, 1-sperma.

Familia RHAMNACEARUM. PEUNUS *Boldus Molin.*

1289. PRINOS. *Cal.* 6-dentatus, minimus, persistens. *Cor.* rotata, plerumque 6-fida, rarius 4-5-8-fida. *Stam.* 4-6-8. *Styl.* brevis. *Bacca* subglobosa, 6-sperma, rarius 4-8-sperma. *Sem.* nuciformia. Flores saepius abortu dioici polygamique. *Lam. Illust. t.* 255. *f.* 1.

Familia RHAMNORUM *Juss.*, CELASTRINEARUM *Dec.*, SAPOTEARUM *Alior.* ILICI affinis. AGERIA *Adans.* WINTERLIA *Mönch.*

Obs. *Mönch* distinxit WINTERLIAM: *cal.* minimo, plano, 4-dentato; *cor.* 4-petala: petalis patentibus linearibus integris obtusis; *stam.* 4 aequalibus, petalis alternantibus, reflexis, brevioribus; *stylo* nullo; *stigmatibus* crasso subbifido; *ovar.* oblongo glabro; *antro* immaturo 4-loculari, 4-spermo, a PRINO in quo: *cal.* minimus, 6 fidus; *cor.* rotata limbo 7-8-partito; *stam.* 6-7-8; *germ.* 6-locul.; *styl.* 1; *stigm.* obtusum; *drupa* ovalis ossiculis 6.

1290. PREPUSA. *Cal.* magnus, campanulatus, 6-alatus, 6-fidus, coloratus. *Cor.* campanulata, 6-fida, tubo brevi cylindrico, fauce nudâ. *Stam.* e fauce, corollae duplicaturâ connata; antheris immutatis. *Stigm.* bilamellatum. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis; valvulis introflexis, placentiferis, polysperma. *Mart.*

Familia GENTIANEARUM *Juss.* *Martius nov. gen. et spec. T. II.* p. 120.

1291. ANOPTERUS. *Cal.* 6-fidus, persistens. *Cor.* 1-petala; tubo brevissimo; limbo 6-7-lobo aequali. *Styl.* brevis. *Stigm.* bifidum. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, calyce cincta. *Sem.* plurima, alata, valvularum marginibus affixa, pendula. *Labill. nov. Holl. t.* 112. *Poiret Ill. gen. T. III. t.* 939.

Familia GENTIANEARUM *Labill.*, ERICEARUM? *Poiret.*

1292. DUPRATZIA. *Cal.* tubulosus, striatus, 6-dentatus, persistens. *Cor.* infundibuliformis; tubus calycis longitudine; limbus 6-fidus; laciniis ovatis. *Stam.* 6? *Stylus* 1? *Caps.*? *Rafinesque Fl. Ludov.*

Genus imperfecte cognitum, an forte ERICEIS associandum? *Rafin.*

1293. FRANKENIA. *Cal.* 5-fidus, cylindrico-infundibuliformis, angulosus, persistens. *Pet.* 5 (raro 4), unguiculata. *Stam.* 4-5-6. *Stigm.* 5, oblonga, obtusa, (raro stylus bifidus, stigmatibus globulosis). *Caps.* 1-locularis, 3-4-valvis, polysperma, (raro 2-valvis, oligosperma). *Sem.* ovata, minima. *Lam. ill. t.* 262. *f.* 1. 3.

Familiae CARYOPHYLLEARUM affinis *Juss.*; fam. FRANKENIACEARUM.

St. Hil. NOTHRIA *Berg.*, BEATSONIA *Roxb.*

Obs. FRANKENIA *Beatsonia*, stylo bifido; stigmatibus globulosis; capsulâ bivalvi oligospermâ clo *Roxburgh fl. et Decand. i. p.* 350. genus proprium: BEATSONIA.

1294. THELYRA. *Cal.* basi campanulatus, pedunculo fistuloso calyci continuo. *Cor.* 5-petala, circulus continuus, promens uno latere stamina 6 declinata, dentes 4 loco staminum deficientium. *Filam.* tenuia. *Anth.* dorso affixae, latere dehiscentes. *Germ.* 2-spermum, basi staminum insertum. *Styl.* lateralis. *Bacca?* rugosa, intus villosa. *Sem.* 1 crassum, perispermo o. *Aub. d. Pet. Thouars. gen. Madag. n.* 72.

Familia POLYPETALARUM *Pet. Thouars*, ROSACEARUM *Dec.* Genus distinctissimum ab *HIRTELLA* ex icone *Gaertn. jun. t. 185.*

1295. *COSSIGNIA*. *Cal.* 5-partitus, persistens; (laciniis inaequalibus). *Pet.* 4, rarius 5, brevissime unguiculata. (*Stamina* ad basin germinis annulo inserta. *Antherae* suberectae, biloculares.) *Stylus* brevis (in floribus sterilibus, in fertilibus sat longus, filiformis, basi stellato-pubescent, ante anthesin tortus.) *Stigma* indivisum. *Caps.* ovato-trigona, 3-locularis, apice dehiscens; loculis 2-3-spermis. *Sem.* subrotunda, receptaculo centrali affixa. *Commers.. Lam. Ill. t. 256.*

Familia SAPINDEARUM *Juss.* Flores fertiles in eadem panicula floribus, e pistillo imperfecto, sterilibus mixti.

1296. *PERITOMA*. *Cal.* 4-dentatus, basi circumscissâ deciduus. *Pet.* 4, aequalia, subsessilia. *Gland.* nullae. *Torus* parvus. *Stam* 6, basi submonadelpha: *antheris* revolutis. *Siliqua* oblonga, in calyce stipitata, 1-locularis, 2-valvis; stylo parvo, persistente. *Decand.*

Familia CAPPARIDEARUM *Decand.* *CLEOME* apud *Pursh*; *ATLANTA* *Nutt. Gen. II. p. 73.*

1297. *GLEDITSCHIA*. *Polygama*. *Stam.* 6, (rarius 3-8). *Hermaphr.* *Cal.* 3-6- (saepe 4-) fidus v. partitus. *Cor.* 3-6 (saepe 4) petala. *Stylus* simplex, brevis. *Legumen* falcatum, seminibus compressis in pulpa nidulantibus. *Masculi:* *Cal.* 3-phyllus (rarius 4-8-partitus). *Cor.* 3-petala (rarius 0.) *Feminei:* *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Pist.* 1. *Legumen.* *Lam. illustr. t. 857. f. 1-2.*

Familia LEGUMINOSARUM *Juss.* Conf. *Decand. Mém. Legum t. 1.*

1298. *AMURA*. *Polygama*. *Cal.* 3-4-partitus. *Pet.* 3, conniventia. *Nectarium* globulare. *Antherae* in nectario sessiles. In ♂ germinis loco glandula clavata; in ♀ germen triquetrum; *styl.* 0; *stigm.* latum, 3-lobum. *Caps.* subrotunda, subcarnosa, trilocularis, 3-valvis. *Sem.* solitaria, arillata. *AMOORA Roxb. Corom. t. 258.*

Familia MELIACEARUM *Juss.*

1299. *FLOSCOPA*. *Cal.* infundibuliformis, 3-fidus, coloratus, pilosus, persistens. *Pet.* 3, ovata. *Filam.* exserta, *Stylus* inflexus. *Caps.* subovata, biloba, 2-locularis, 1-sperma. *Sem.* compresso-ovata, radiato-sulcata. *Lour. Fl. Coch. I. p. 238.*

Familia SMILACEARUM *St. Hilaire.*

1300. *AIUVEA*. *Cal.* campanulatus, 3-dentatus. *Pet.* 3, parva, cum calycis laciniis alternantia. *Filam.* 6, disco calycem interne obvestiente inserta, ad insertionem glandulâ pilosâ. *Antherae* ovatae, apice bilobae. *Stigm.* 6-fidum. *Bacca* ovata ad medium usque calyce inclusa, 1-sperma: nuce fragili. *Aubl. Gujan. 310. t. 120.*

Familia LAURINEARUM *Juss.*. *Swartz* genus hocce nomine LAURI *hexandrae* junxit cum LAURO, a quo praecipue differt staminibus 6, et stigmate 6-fido. DOUGLIASSIA *Schreb. gen. n. 1761.* COLOMANDRA *Neck.*, EHRHARDIA. An forsan huic generi accensenda LICARIA *Aubl. Gujan. p. 515. t. 121. Gmel. S. N. 1. p. 574.?*

1301. TRIPHASIA. *Cal.* 5-fidus (rarius 4-dentatus), persistens. *Pet.* 5. *Stam.* 6, rarius 5-8: filamentis subulatis complanatis, liberis; antheris oblongis, basi emarginatis. *Germen* subpedicellatum, 3-rarius 2-4-loculare, loculis 1-spermis. *Styl.* crassus v. nullus; stigmate depresso, obtuso. *Bacca* intus mucilaginosâ, 1-3-locularis: loculis 1-spermis. *Cotyled.* lobatae.

Familia AURANTIORUM *Juss.*, AURANTIACEARUM *Dec.*, HESPERIDEARUM *St. Hil.*. LIMONIAE spec. *Linn. Willd. etc.*

Obs. Character emendatus ex *Blume Bydr. Flor. Nederl. Ind. 1. p. 131.* Char. gen. apud *Decand. Prodr. 1. p. 55:* „Flores proportionem partium ternariâ. *Stam.* 6, libera, rarius 5 et tunc quintum oppositum petalo majori. *Anth.* subsagittatae. *Fruct.* 3-locul., 3-spermus. *Embryones* in semine plures.“ Deleatur apud nos in *S. V. T. V. p. 269.* et huc reponatur.

1302. COLOPHONIA. *Cal.* urceolatus, obtuse 3-lobus. *Petala* 3, sub disco inserta, subretundo-ovata, per aestivationem imbricata: *Stam.* 6, petalis dimidio breviora, calyci aequalia. *Discus* 6-sinuatus. *Fruct.?* *Decand.*

Familia TEREBINTHACEARUM *Juss.*. COLOPHONIA *Commers. incl. Decand. Prodr. 2. p. 79.* *Kunth gen. tereb. p. 20.* BURSERAS spec. *Lam.*

Obs. *Char. gen.* apud *Kunth:* „*Cal.* urceolatus, 3-lobus: lobis obtusis subaequalibus. *Praefloratio* valvata. *Pet.* 3, sub disco inserta, subretundo-ovata, basi lata, subconcaeva, inaequalia, patula, calyce triplo longiora. *Praefloratio* imbricativa. *Stam.* 6, sub disco inserta, corollâ dimidio breviora. *Filam.* crassa, libera, basi dilatata. *Anth.* ovato-cordatae, biloculares, dorso versus basin affixae et cum filamentis haud articulatae, interne secundum longitudinem dehiscentes. *Discus* in fundo calycis depressus, 6-sinuatus. *Pistillum* rudimentum nullum. *Flores* feminei? — Arbor resinosa. *Fol.* alterna, impari-pinnata: foliola petiolata, opposita, coriacea, integerrima, epunctata. *Paniculae* terminales, bracteatae. *Flores* purpurei.“ *Ann. d. Scienc. natur. T. II. p. 362.* Genus apud *Kunth* dioicum, apud *Lamarck* abortu polygamum.

1303. CANARIUM. *Flores* abortu dioici vel polygami. *Cal.* urceolatus, 5-dentatus. *Pet.* 3, conniventia. *Stam.* 6, rarius 7-8, inferne connata in discum germen cingentem. *Germ.* 3-loculare: loculis 2-ovulatis. *Styl.* brevis, crassus. *Stigm.* subgloboso-trigonum. *Drupa* baccata, nuce 3-gonâ. 3-loculari; loculis 1-spermis, quorum 2 saepe abortivi. *Lam. Illustr. t. 812. f. 1. Gaertn. Fruct. 2. t. 102.*

Familia TEREBINTHACEARUM *Juss.*. PIMELA *Lour.* Character emendatus ex *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 1161.*

Obs. Genus a *Linnaeo* et *Willdenow* ad Dioeciam, a *Loureiro* ad MONADELPHIAM positum. *Char. gener.* CANARIUM apud *Kunth Terebinth p. 20.* *Flores* dioici. *Cal.* urceolatus, 2-3-lobus: lobis inaequalibus. *Pet.* 3, sub disco inserta, calycem duplo superantia, oblonga, concava, aequalia. *Praefloratio* imbricativa. *Stam.* 5 (vel 6?) sub disco inserta, petalis breviora, inaequalia, libera. *Antherae* oblongae, biloculares, cum filamentis haud articulatae, inaequales, latere secundum longitudinem dehiscentes. *Discus* urceolatus, ovarii basin cingens. *Ovar.* sessile, obovatum, 3-loculare; ovula gemina, axi affixa, collateralia, medio suspensa. *Stigmata* 3, sessilia, punctiformia. *Drupa* parce carnosa: putamen trigonum, triloculare, osseum vel lapideum: loculis monospermis, duobus fere oblitteratis. *Sem.* exalbuminosum. *Integu-*

mentum membranaceum. *Embryo* semini conformis. *Cotydelones* profunde trifidae, lobis varie plicatis vel contortis. *Radicula* supera. (Char. fruct. ex *Gaertn.*) " *Ann. d. Scienc. natur.* T. II. p. 352. *Charact. PIMELAE* apud *Loureiro Cochin.* II. p. 494.: *Cal.* tubulosus, 3-fidus, inf.; laciniis obtusis brevibus, erectis. *Pet.* 3, ovato-oblonga, erecta, conniventia, crassa, calyce longiora. *Nect.* lentiforme, carnosum, 6-crenatum. *Filam.* 6, subulata basi in tubum coalita, corollâ breviora. *Anth.* oblongae, 2-loc., stantes. *Germ.* subrotundum nectario immersum. *Styl.* o. *Stigm.* acutum, bifidum. *Drup.* ovato-oblonga, carnosae. *Nux* oblonga, utrinque acuta, sub 6-gona, angulis alternis obtusioribus, 2-locularis.

1304. *STERIPHOMA.* *Cal.* bilobus, tubuloso-campanulatus. *Pet.* 4, erecta. *Torus* parvus. *Stam.* declinata; 2 inferiora longiora. *Styl.* o. *Stigma* capitatum. *Germen* stipitatum, oblongum, stamina aequans. *Spreng. Cur. post.*

Familia *CAPPARIDEARUM* *Juss.*. *CAPPARIS* spec. *Jacq.*, *STEPHANIA* *Willd. et Decand.*. Nomen mutandum erat cum sit antiquior *STEPHANIA* *Lour.*

1305. *PSEUDALBIA.* *Cal.* minimus, urceolaris, subinteger. *Pet.* 3, in tubum conniventia. *Filam.* 6, 3 petalis arcte applicatis, unde videntur epipetala. *Capillamenta* apice bifurca ex utroque latere petalorum. *Germ.* conicum. *Styl.* longitudine corollae. *Stigm.* 3-lobum. *Drupa* sphaerica, monosperma. *Embr.* carnosus, absque perispermo. *Cotyl.* carnosae, indiscretae, oleosae. *Aub. d. Pet. Thouars. gen. madag.* n. 51.

Familia *GUTTIFERARUM* *Pet. Thouars*, *OLACINEARUM* *Dec.*. Affinis *FISSILIAE* *Commers. Juss.* (*OLACI*)? *Pet. Th.*. Ex flore media *OLACEM* inter et *HEISTERIAM*; sed semen omnino differt. *Dec. Prodr.* 1. p. 533.

1306. *PSEUDALEIODES.* *Cal.* minimus, urceolaris, integer. *Pet.* 4, inaequalia, basi lata, conniventia. *Stam.* 6; filamenta petalis dispariter applicita, ut ibi appareant inserta, lata. *Antherae* apice insertae. *Germ.* 1-spermum. *Styl.* longitudine corollae. *Stigm.* 3, globosa. *Fructus?* *Aub. d. Pet. Thouars. Gen. madag.* n. 52.

Familia *GUTTIFERARUM* *Pet. Thouars*, *OLACINEARUM* *Dec.*. Affinis *PSEUDALEIAE*, a qua tantum numero partium differt. *OLAX* *Willd. Herbar.*

1307. *CHISOCHETON.* *Cal.* urceolatus, subintegerrimus. *Pet.* 4, linearia. *Antherae* 6 (rarius 7 v. 8), tubo conico 6-fido intus ad faucem insertae. *Germ.* annulo brevissimo cinctum, 3-loculare; loculis 1-sporis. *Styl.* clavatus. *Stigm.* obtusum. *Caps.* 2-3-locularis. (ex abortu 1-locul.), 2-3-valvis; valvis medio septiferis. *Sem.* arillata, arillo incompleto, carnosum. *Embr.* exalbuminosus. *Cotyled.* maximae, peltatae. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind.* p. 168.

Familia *MELIACEARUM.* *SCHIZOCHITON* *Spreng. Cur. post* p. 246., qui ad *Monadelphiam Hexandriam.*

1308. *FEREIRIA.* *Perianth.* o.? *Cor.* monopetala, infera: tubus cylindricus, ad faucem ventricosus. *Limbus* tubo bre-

vior, 5-fidus: laciniis lateralibus revolutis, patulis, acutis. *Faux* angustata. *Filamenta* 6 minima. *Antherae* 6 oblongae intra faucem ventricosam corollae. *Stylus* longitudine corollae. *Stigma* capitatum, emarginatum. *Sem.* papposa. *Velozo* in *Vandelli*.

Obs. ASCLEPIADEIS vel FAGRAEAE affinis: *Juss.*; ergo non conjungenda cum *HILLIA*, ut in *Willdenow* aliisque.

β. *Calyx superus.*

1309. *HILLIA*. *Cal.* duplex: inferus (vel bracteae) 6-phyllus; superus 2-4-phyllus. *Cor.* longissime-tubulosa, contorta; limbo 4-5-fido, patente. *Anth.* 3-4 intra faucem subsessiles. *Stigm.* bifidum. *Caps.* siliquæformis, 2-ocularis, polysperma. *Sem.* comosa. *Jacq.*, *Lam. Illustr. t.* 257.

Familia RUBIACEARUM *Juss.*

Obs. *Juss.* in *Mem. d. Mus.* III. année p. 338. characterem *HILLIAE* sic emendavit: „*Cal.* oblongus, 2-4-fidus; laciniis erectis. *Cor.* tubulosa, longissima, fauce parum ampliata; limbo patente, 6-partito; laciniis lanceolatis. *Anth.* 6 intra faucem subsessiles, non exsertae. *Stigm.* bifidum. *Caps.* coronata, oblonga, angulata, 2-locul., 2-valv., polysperma seminibus numerosis, papposis, receptaculo lineari undique affixis. An genere separanda: *H. tetrandra* *Swartz*, cujus corolla intra tubum 4-andra, limbo 4-partito? *FERRERIA* *Vand.*, in *Willd.* hinc adjecta, certe affinior APUCYNACEIS et FAGRAEAE, quae germen superum.“

1310. *CANARINA*. *Cal.* 6-fidus vel 6-phyllus persistens. *Cor.* campanulata 6-fida. *Filamenta* fornicata, basi dilatata in nectarii valvulas germen tegentes. *Stigma* clavatum, 6-partitum. *Caps.* 6-ocularis, polysperma. *Sem.* parva. *Lam. Illustr. t.* 259.

Familia CAMPANULACEARUM *Juss.*. Olim *CAMPANULAE* species.

1311. *RICHARDIA*. *Cal.* 5-8-fidus v. partitus, persistens; laciniis aequalibus. *Cor.* subcylindrica, infundibuliformis; limbo 6-8-fido, aequali, tubo medio ampliato. *Stam.* 5-8, exserta. *Stigmata* 3, oblongo-capitata. *Caps.* limbo calycis coronata, tricocca, coccis monospermis, evalvibus. *Sem.* truncata. *Lam. Illustr. t.* 254. f. 1.

Familia RUBIACEARUM *Juss.*. Conf. quoque *Juss. Mem. d. Mus.* VI. p. 372. *RICHARDIA* *Banks Reliq. Houst.* t. 9. *RICHARDSONIA* *Hunth*, nomine sine ratione mutato, cum sit antiquissimum Linnaeanum. A SPERMATOCOE numero praesertim partium diversa.

1312. *AMAIOUA*. *Cal.* subcampanulatus, 6-dentatus. *Cor.* tubulosa, limbo patente, 6-fido. *Antherae* 6, subsessiles, intra tubum inclusae, lineares. *Stigma* clavatum. *Bacca* oblonga, corticata, umbilicata, 2-ocularis, polysperma, seminibus intra loculos receptaculo prominulo semipartitos serie duplici dispositis. *Aublet. Juss. Mem. d. Mus.* VI. p. 391.

Familia RUBIACEARUM. *Juss.*. *HAMELIAE* spec. *Lam. Willd.*, *HEXACTINA* *Willd. Herb.*

Obs. „Fructus in *Aublet Suppl.* 13. t. 375. 1-ocularis, seminibus in plures series dispositis, forsitan quia in maturiore evanuerant dissepimenta. Sex admittit loculos *Dec. Ann. d. Mus.* 9. p. 218., quorum semina unicâ serie disposita ab invicem discernuntur septis totidem transversis (ut in *POLYTHALLOSIS*) aucte? An a nostris pluries observatis diversa species? An *Aubletianus* fruc-

tus plus quam bilocularis? Juss. Cal. teres, persistens, superus, pubescens: dentibus 6 rectis acutis. Cor. tubulosa, setosa; limbus 6-fidus: lobis ovato-lanceolatis, patentibus. Stam. 6, inclusa, infra medium tubi inserta lobis corollae alterna. Filam. brevia. Antherae lineares, biloculares. Germ. inferum, oblongum. Stylus 1, non exsertus. Stigma clavatum. Bacca oblonga, corticata, umbilicata, in spec. peruv. bilocularis. Sem. plura, subrotunda, duplici serie placentæ centrali in singulo loculo inserta et supra sese invicem apposita. In desc. et ic. Aubl. bacca 1-locularis; sem. 7 seriebus disposita: an vere? Desf. Mem. d. Mus. VI. p. 12. Cal. campanulatus, 6-dentatus, deciduus? Cor. sibilindibuliformis, tubo ventricosus, limbo 6-partito patente. Stam. 6 inclusa. Stigma incrassatum. Bacca 1-locularis. Sem. plurima, 7 seriebus sibi incumbentibus receptaculo columnali et centrali affixa. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 418. In speciebus a clo de Martius e Brasilia allatis, cal. deciduus, nec persistens, esse videtur; fructus omnino ut in Jussieu, minime ut in Decand., Aublet et Kunth. Eiusdem omnino generis, monente cl. Martius in nov. gen. et spec. T. II. p. 73. fide speciminis a clo Sprengel missi: EHRENBURGIA, cui: „Cal. inferus, truncatus, 5-6-dentatus. Cor. tubulosa, limbo 6-fido. Antherae 6, intra tubum subsessiles. Drupa? Spreng. n. Entd. II. p. 129. S. V. II. p. 12. 133. calycem fort. e floribus junioribus inferum dixit. AMAJOUA apud nos S. F. T. V. p. 267. elenda, et, floribus nunc cognitis, huc reponenda.

1515. PSATHYEA. Cal. 6-dentatus, minimus. Cor. rotato-campanulata, 6-fida, intus barbata: tubo subnullo. Filamenta brevissima fauci inserta. Stigm. 5-4-lamellatum s. 3-lobum. Drupa seca, striata, 6-locularis, loculis 1-spermis. Sem. hinc concava, inde convexa. Commers. Lam. Illustr. t. 260.

Familia RUBIACEARUM Juss. Juss. Mem. d. Mus. VI. p. 396.

Obs. Roxburgh in Fl. ind. ed. Car. et Wallich II. p. 153. in Pentandria sequentem posuit generis characterem: „Cal. 4-6-dentatus. Cor. tubus brevis; limbus 4-6-partitus. Germ. 5-loculare; loculis 1 spermis. Drup. 4-6-locularis; nuces solitariae, monospermae. Embryo erectus, perispermio copioso.“

1514. ISERTIA. Cal. turbinatus, 5-dentatus, (4-6-dentatus et subinteger, brevis.) Cor. tubulosa, limbo 6-partito, (intus barbato). Antherae 6, inclusae, subsessiles, oblongae. Stigma 6-sulcatum. Bacca (Drupa exsucca) pisiformis, coronata, 5-6-locularis, testâ fragili loculos vestiente polyspermos; seminibus minutis. Vahl. Juss. Mem. Mus. VI. p. 399. Lam. Ill. t. 259.

Familia RUBIACEARUM Juss., GUETTARDAE spec. Aubl.

Obs. Drupa subglobosa hexapyrena: pyrenis osseis unilocularibus, polyspermis. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 415. — „Cal. superus, 4-dentatus. Cor. infundibuliformis, limbo 6-fido. Stigma capitatum, 6-sulcum. Bacca pyrenis 6, polysperma.“ Meyer, qui div. Willd. male calycem 6-dentatum dixisse et cum GUETTARDA junxisse, quod etiam clo Poiret placuit. Fructus longe alienus.

1515. MYRRHINIUM. Cal. 4-fidus. Cor. 4-petala. Filam. subulata, in aestivatione versus petalum duplicata. Antherae oblongae. Bacca calyce coronata, 3-4-locularis; loculis polyspermis. Schott.

Familia MYRTEORUM Schott; clo Sprengel diversa videtur.

1516. STEVENSIA. Cal. bifidus, deciduus, bractea 4-fida. Cor. tubulosa; limbo plano 6-7-fido. Anth. 6-7 in fauce coronae. Stigm. bilamellatum. Caps. 2-locularis, polysperma, apice quadrifariam dehiscens. Poiteau Ann. d. Mus. IV. p. 235. t. 60.

Familia RUBIACEARUM Juss.

Obs. Character emendatus apud *Jussieu* in *Mém. d. Mus.* VI. p. 389: „*Cal.* subglobosus, acute bifidus, bractea inaequaliter 4-partita infra cinctus. *Cor.* tubulosa, limbo obtuse 6-7-partito, patente. *Anth.* 6-7 sessiles, fauci insertae. *Stigm.* 2-lamellatum. *Caps.* globosa, dioeca, calyce tecta incrassato, mox solubili una cum coccis bivalvibus, polyspermis, ab invicem discedentibus et ab apice bipartitis. *Sem.* numerosa, minuta, receptaculo centrali intimos valvarum margines connectenti affixa. *Embr.* in perispermo subcorneo centralis; radícula infera.“

1317. **LORANTHUS.** *Cal.* margo obsolete dentatus vel integer, acetabuliformis, germen coronans, basi plerumque bracteatus. *Cor.* petalis 4-5-6-8, plerumque 6, superne reflexis, saepius in tubum irregulariter fissum connatis. *Stam.* plerumque 6, saepius 4-5-8, aequalia vel alterna breviora. *Filamenta* inferne petalis adnata, apice libera. *Anth.* dorso affixae, 3 saepius steriles. *Stylus* filiformis, erectus. *Stigma* obtusum vel capitatum. *Bacca* glutine repleta, umbilicata, monosperma. Flores subinde etiam dioici. *Lam. ill. t.* 258.

Familia CAPRIFOLIORUM *Juss.*; LORANTHEARUM *Juss.*. LONICERARUM *spec. Linn.*, FROELICHAIE *Spreng.*, VISCI *Spreng.*.

Obs. Genus numero formaque partium valde varians, fructu tamen fere semper constans et haud dividendum. De LORANTHIS confer *Juss.* in *Ann. d. Mus.* T. XIII. p. 286. De germinatione LORANTHI conf. *Mirbel* in *Ann. d. Mus. Bernhardi* olim in *Schrader N. Journ.* 1 B. 2 St. p. 153, characterem LORANTHI ad *L. europaeum* sic emendavit: „♂. *Cal.* marginatus. *Cor.* pet. 6 acuta, viridia, reflexa. *Filam.* brevissima ad basin petalorum inflexa; antherae didymae, loculo altero exteriori superiori, altero interiori inferiori serius dehiscente. *Pist.* spurium. *Germ.* sterile, inferum, quasi pedunculum formans. *Styl.* tenuis. *Stigm.* o. ♀ *Cal.* ♂; *Cor.* ♂; at petala triplo minora. *Stam.* hinc inde filamentorum rudimenta ad basin petalorum. *Antherae* o. *Germ.* infer. subturbinatum. *Styl.* crassiusculus. *Stigm.* simplex.“ Characteres hocce tamen perpaucae species gaudent. Habitus subinde VISCONUM.

1318. **SPIROSTYLIS.** *Cal.* margo suburceolatus, subinteger, germen coronans. *Cor.* petala 6, basi erecta, medio reflexa. *Stam.* 6, medio petalorum affixa. *Antherae* subhastatae. *Stylus* spiraliter contortus, anfractibus numerosis. *Stigma* subcapitatum. *Bacca* glutine repleta, umbilicata, ovato-oblonga, monosperma. *Presl.*

Familia CAPRIFOLIORUM *Juss.*, LORANTHEARUM *Juss.*. Habitus et omnia fere omnino ut in LORANTHO; sed stylo mire spirali abunde diversa.

1319. **SCHRADERA.** *Involucrum* universale multiflorum, 5-fidum vel integerrimum. *Cal.* semisuperus urceolatus, integerrimus crenulatusve. *Cor.* 5-6-fida, tubuloso-campanulata, fauce hirsuta, laciniis medio denticulo munitis. *Stam.* 5-6. *Styl.* erectus; stigmatibus 2-, rarius 4-partito. *Germ.* margine supero cinctum. *Bacca* polysperma. *Vahl. Eclog.*

Familia CAPRIFOLIORUM; LORANTHEARUM? RUBIACEARUM *Juss.*. URCEOLARIA *Coth.*, FUCHSIAE *spec. Swartz.*

Obs. *Jussieu* in *Mém. d. Mus.* VI. p. 403. sequentia adnotavit: „*SCHRADERA* (*Urceolaria Coth.*). *Cal.* limbus coarctatus, integer. *Cor.* subinfundibuliformis, fauce pilosa; limbo 5-6-partito, patente; laciniis intus incrassatis et medio 1-denticulatis. *Stam.* 5-6; antheris linearibus, subsessilibus, vix exsertis. *Styl.* 1. *Stigm.* 2. (ex *Sw.*). *Bacca* 1-locul. (4 local. *Sw.*) polysperma. Flores aggregati supra receptaculum carnosum, involucri communi monophyllo lobato cinctum. Char. gen. ex *Ryan* et *Vahl Eclog.*, qui genus LORANTHO appropinquat, licet polyspermum, et congenerem dicat FUCHSIAM involucretam *Sw.* 4-stigmatosam, ac ideo 4-locularem, et subinde a *Vahliano* caractere, discedentem. Loculi polyspermi genus ex LORANTHIS eliminant *Rubiaceisque* ap-

proximant polyspermis et capituliferis confirmante *Rich.*, non obstante stipularum defectu."

1520. *CASSUPA*. *Cal.* brevissimus, integer. *Cor.* tubulosa; limbo 6-partito, brevi, patente; fauce barbata. *Stam.* faucibus inserta, exserta. *Stigm.* 2-fidum. *Bacca* sphaerica, calyce persistente coronata, 2-ocularis; loculis polyspermis. *Humb. et Bonpl. pl. aequin.* I. p. 45. t. 12. *Poiret Illustr. gen.* t. 938.

Familia RUBIACEARUM. Confer *Jussieu Mém. d. Mus.* VI. p. 309.

A N O M A L I A E.

ACHRAS, *CADAPHOBA*, *COUTAREA* *Aubl.* (*PORTULANDIA hexandra* apud nos), *DUBOIA* (de hisce 3 generibus conf. *Juss.* in *Mem. d. Mus.* T. VI. p. 388.), *GARDENIAE* plures, *GEMIPAE* plures, *GULTARDIAE* plures, *TECYONA grandis*, *PISONIAE* plures, *TRIENTALIS europaea*, *AMYHIS zeylanica*, *HURSERAE* species, *CAPURA purpurata*, *CHLORA imperfoliata*, *DODONAEA viscosa*, *GAURA tripetala*, *MIMUSOPS hexandra*, *POLYGONA* plura, *LAURE* plures, *CASSIA glandulosa*, *BOCCONIA frutescens*, *LYTHRA* plura, *PORTULACA*, *TETRADENARIAE* aliquae, *FUMARIA cucullaria*.

b. *Flores incompleti.*

a. *Calyx absque corolla.* (AROIDEAE. IUNCEAE.)

a. *superus.*

1521. *VANHALIA*. *Cal.* campanulato-trifidus, intus coloratus, deciduus. *Cor.* o. *Stam.* 6, inclusa, ad basin styli coalita; *antherae* extrorsum adnatae. *Styl.* sub-4-fidus, stigmatibus obtusis. *Fruct.* siliquiformis, tetragonus, 4-ocularis, polyspermus, indehiscens. *Sem.* triquetra, rugosa. *CERAMIUM* *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind.* p. 1134.

Familia ONAGRACEARUM. (Nomen mutandum erat ob *CERAMIUM Roth* et *Agardh*, generi *FUCORUM* dicatum. Diximus in honorem clar. auctoris *Synopsis graminum Belgii septentrionalis* et *Florae Belgii septentrionalis*, *Med. Dr. van Hall*, Professoris groeningensis, illustris *Blume* concivis Batavi.)

1522. *TACCA*. *Cal.* 6-partitus, regularis, persistens. *Filamenta* (petala *Forst.*) basi laciniarum corollae inserta, dilatata, supra cucullata. *Antherae* filamentis intus sub cucullo adnatae. *Germ.* 1-loculare, placentis 5 parietalibus polyspermis. *Styl.* 3-sulcus. *Stigm.* 3 dilatata. *Bacca* striata, polysperma. *Sem.* striata, albuminosa. *Rumph. Forst. gen. Lam. Illustr.* t. 250.

Familia NARCISSORUM *Juss.*, AMARYLLIDEARUM *St. Hil.*, ARISTOLOCHIARUM sec. *Spreng.*, genus medium AROIDEAS inter et ARISTOLOCHIAS sec. *R. Brown Prodr.* p. 340, ex quo character generis. *Blume Enum. pl. Jav.* I. p. 85. *LEONTICE* *Linn.*

Obs. Character generis apud *Blume* l. c.: „*Perianthium* superum, campanulatum, petaloideum, persistens: limbo 6-partito: laciniis alternis angustioribus. *Stam.* 6. *Filamenta* basi laciniarum perianthii inserta, dilatata, superne cucullata et emarginata. *Antherarum* loculi discreti, intus infra apicem adnati. *Germen* 1-loculare, placentis 3 parietalibus, polyspermis. *Stylus* brevis, triangularis. *Stigma* maximum, orbiculatum, emarginato-trilobum. *Bacca* polysperma. *Semina* striata. — Typus familiae novae: AROIDEIS habitu, praecipue foliacione, accedens, valde diversa vero structura, fructificationis. *Perianthio* supero affinis ARISTOLOCHIAE, a qua staminibus liberis antherisque extus dehiscentibus differt. Ad *Monocotyledones* spectare videtur ob embryonem plane indivisum, punctiformem.“ *Cls. Presl* in *Fasc. III. Reliqu. Haenk.* p. 749. familiam novam: *TACEAS* condidit et *TACCAM integrifoliam* nomine *ATACCIAE integrifoliae* genere distinxit a reliquis *TACCARUM* speciebus. Character *ATACCIAE*: „*Cal.* 6-partitus, inaequalis; laciniis reflexis, exterioribus oblongis, interioribus ovalibus majoribus. *Petala* 6, basi calycis inserta, subulata, apice

concaua. *Antherae* coneauitati petalorum insertae, erectae. *Styl.* brevis, crassus, trisulcus. *Stigm.* capitatum, trilobum, lobis emarginatis. *Bacca* oblonga, semitrilocularis, polysperma. *Sem.* lunata. *Embryo* extra albumen positus." Character *TACCAE* a *Presl* reformatus: „*Cal.* 6-partitus, aequalis; laciniis conniventibus, oblongis. *Petala* 6, basi calycis inserta, apice galeatofornicata, labio galeae emarginato-bilobo. *Antherae* fornici intus adnatae, apice soluto deorsum spectantes, loculis discretis. *Styl.* brevis, crassus, trisulcus. *Stigm.* orbiculatum, stellato-6radiatum. *Bacca* subglobosa, 1-locularis, polysperma. *Sem.* parietalia, subovata, angulata. *Embryo* minutus in regione umbilici."

b. *inferus.*

1325. *KERNERA*. *Polygama*. *Cal.* spatha? duplex, 2-valvis. *Cor.* o. *Antherae* 6, filamentis 5 petaloideis latere exteriori adnatae, polline filamentoso. *Hermaphr.*: *Nectar.* 3-phyllum, aristatum ad basin germinis. *Germ.* oblongum. *Styl.* brevis. *Stigm.* planum, sessile, villosum. *Bacca* 1-sperma s. *Nux* ovata, pulposa. *Masc.*: *Nect.* o. *Pistilli* rudimentum.

Familia AROIDEARUM *Juss.*. *ZOSTERA* *Linn.*, *POSIDONIA* *König*, *CAULINIA* *Decand.*. Conf. *Caulini* *Dissert.* de *ZOSTERA*.

Obs. Flores quoad situm hermaphroditos, ratione fructificationis processus monoicos aut dioicos monet *König*. *POLYGAMIAE* *Hexandriae* inseruit *Willdenow*; *TRIANDRIAE* *Sprengel* *S. V.* I. p. 181. ad descriptionem *R. Brown* *prodr. N. Holl.* p. 339., cui flores hermaphroditi. *Perianthium* o. *Stamina* 3. *Filamenta* dilatata, calycina, persistentia, basi extus antherifera. *Antherae* adnatae lobis basi solutis. *Germen* 1-spermm. *Stigma* sessile. *Pericarpium* baccatum. *Semen* alteri parieti adnatum, exalbuminosum. Affinitate haud procul a *ZOSTERA* et forsam a *RUPPIA*.

1324. *ANANTHOPUS*. *Spatha* gelatinosa, pedunculum abortivum floresque involvens. *Cor.* (*Cal.*!) 6-partita: laciniis 3 exterioribus scariosis, 2 interioribus majoribus, inferiore labelliformi, convexâ. *Stam.* 6, inaequalia. *Antherae* diversae, una lanceolata, stylo adnata. *Germ.* ovale, superum (?) *Stylus* reflexus. *Stigma* minimum. *Fructus?* *Poiret* *Illust. gen.* T. III. p. 594. *GYNANDRIAE* *Sprengel*.

Genus nondum satis cognitum; an affine *MUSACEIS*? *Rafinesque*.

1325. *ORONTIUM*. *Spadix* multiflorus, cylindraceus. *Cal.* (*Cor.* *Linn.*) 6-phyllus, carnosus, connivens. *Filam.* brevissima, plana, 4-6. *Antherae* loculis 2, discretis. *Styl.* o. *Stigma* obtusum. *Utriculus* 1-spermus. *Semen* fungosum. *Lam. Illustr.* t. 251. f. 2.

Familia AROIDEARUM *Juss.*. *POTHI* spec. *Walter*.

1326. *ROHDEA*. *Spadix* cylindricus, multiflorus; bracteis ad basin 2 (spathâ?) *Cal.* (*Cor.* *Roth*) ore sexfidus, subgloboso-hexagonus, truncatus, subcoriaceus. *Filam.* tota calyci adnata. *Anth.* fauci cal. inhaerentes. *Styl.* crassus, brevis. *Stigm.* trifidum. *Bacca* 1-sperma, stylo et stigmatate coronata, cum calyce spadici immersa. *Sem.* ecorticatum. *Roth* *nov. pl. spec.* p. 196.

Familia AROIDEARUM *Juss.*. *ORONTII* species *Thunb.* *Lam. Illustr.* t. 251. f. 1., *TUPISTRA* *Gawl.*

Obs. Monente clo *Schrader*, et ipso *Gawler*. (qui ad *TUPISTRAN* squalidam suam: „anne congener *ORONTII japonici*, male cum aquatico generis sui prototypo associati?“ quaerit) ejusdem generis cum *ROHDEA* est *TUPISTRA* *Gawl.*, cui: „spad. multifl. *Cor.* inf., 6-fida, imbricato-connivens, paten-

tissima, aequalis, rigida. *Stamina* dimidio breviora. *Filamenta* praeter punctum antheriferum corollae adnata. *Antherae* introversae, ovatae. *Pistillum* staminibus duplo longius. *Stylustrisuleus*. *Stigmatrilobum*. *Bacca?* (Clo *Her Bot. Mag.* 1655 et in *Bot. Reg.* 704; *Cor.* inf., adscendens, carnosula, cupulato-campanulata, 6-fida, limbo subirregulari, subinaequali, patente. *Antherae* parvae, basi laciniarum ab axi parvâ mediâ peltato-adnatae, introrsae. *Pist.* urceolato-columnare, inclusum, antheras superans. *Stylus* cum germine isoperimetro continuus et aliquoties longior, crassus, rotundato-triqueter, erectus, 3-suleus, cuniculatus: stigmata 3 crassiuscula, brevia, rotundata, patentia, intus a toto ambitu plicato-corrugata cum canaliculo medio longitudinali discedens. *Germen* viride, oblato-subrotundum, exsulcum, estriatum, repleto-3-loculare: loculis collateralibus dispermis. *Bacca?*)

1527. *ACORUS*. *Spadix* subcylindricus, nudus, tectus flosculis sessilibus. *Cal.* (*Cor. Linn.*) 6-phyllus: phyllis aequalibus, obtusis, concavis, laxis, superne incrassatis. *Filamenta* erecta, crassiuscula, longitudine petalorum, iisdem alternantia. *Antherae* bilobae. *Styl.* o. *Stigma* hemisphaericum, obsolete 3-lobum. *Caps.* 3-angularis, membranacea, 3-locularis, non dehiscens. *Sem.* plura, (loculi monospermi *Poiret et Gay*), ovato-oblonga. *Lam. Illustr.* t. 252.

Familia AROIDEARUM *Juss.*, qui eum *Juncis* affiniorem dicit.

1528. *JUNCUS*. *Cal.* 6-phyllus (v. 6-partitus), glumaceus, persistens, bibracteatus. *Stam.* 6 v. 3, basi calycis foliolorum inserta. *Anth.* erectae, 2-loculares. *Styl.* brevis. *Stigm.* 3, villosa. *Caps.* semitrilocularis, rarius 1 vel 3-locularis, loculicido-3-valvis: loculis polyspermis: dissepimentis seminiferis. *Lam. Enc.* t. 250.

Familia JUNCORUM *Juss.*. *ROSTROVIA*, *MARSIPPOSPERMUM*, *CEPHALOXIS* *Desv.*, *LUZULAE* et *SCHOENI* spec. *Auctor.*, *SCHUCHZERIAE* spec. *Commers.*. Conf. *Desv.* in *Journ. d. Bot.*, *Bicheno* in *Linn. Trans.* XII. p. 297., *E. Meyer Dissert. et Synops. Junc.* 8. *Gotting.*, *La Harpe Monogr. d. vraies Joncées* in *Mém. d. l. Soc. d'hist. nat.* III. p. 89.

Obs. *Cls. Meyer* l. c. characterem generis *Junci* sequentibus posuit: „*Perianth.* 6-partitum, glumaceum, (plerumque) bibracteatum. *Stam.* 6. rarius 3, laciniis perianthii exterioribus opposita. *Styl.* brevis. *Stigm.* 3, plumosa. *Caps.* 3, (raro subuni-) locularis, polysperma, dehiscentiâ loculicidâ. *Sem.* testâ membranaceâ diaphanâ. *Embryo* albumine inclusus, erectus, endorhizus.“ *Character ex La Harpe*: „*Perigonium* glumaceum, duplici serie 6-phyllum. *Stam.* vel 6 perigonii foliolis opposita, vel 3, foliolis interioribus opposita interiorumque basi inserta. *Ovarium* polyspermum, subtriloculare. *Styl.* 1. *Stigmata* 3, undique villosa. *Caps.* 3-valvis, polysperma, 1-vel semi 3-locularis, raro 3-locularis; dissepimenta placentifera; placentae 3, basi coalitae. *Sem.* numerosa, ooidea. *Embryo* basilaris, ooideus; radícula adversa.“ *Character ROSTROVIAE* apud *Desvaux*: *Cal.* corollaque laciniis subaequalibus. *Stam.* 6. *Caps.* globosa, unilocularis, non dehiscens; trophospermum suturale. *Char. naturalis*: *Cal.* corollaque laciniis subaequalibus, persistentibus, atris, albo-marginatis. *Stam.* 6, filiformia, inclusa, persistentia; filamenta brevissima; antherae lineares, calyce breviores. *Germ.* globosum. *Stylus* filiformis longitudine corollae; stigmata 3, corollâ duplo breviora, capillacea. *Caps.* solitaria, globosa, atra, 1-locularis, non dehiscens; trophospermum suturale. *Sem.* numerosa. *Rad.* cespitosa. *Char. gen. MARSIPPOSPERMUM* apud *Desv.*: *Cal.* triphyllus, corollâ subduplo longior. *Stam.* 6. *Stigmata* magna. *Caps.* apice dehiscens, trifida, unilocularis. *Perispermum* dilatatum, paleaceum. *Char. nat.*: *Cal.* 3-phyllus: laciniis scariosis, linearibus, acutis, longissimis, corollâ subduplo longioribus. *Cor.* tripetala: petalis subanceolatis, scariosis, margine membranaceis, undulatis, longitudine pistilli. *Stam.* 6, marcescentia, longitudine capsulae; filamenta brevissima: anthera praelonga medium corollae attingens. *Germen* ovato-oblongum, mucronatum. *Stylus* longus, filiformis, dimidiâ germinis longitudine. *Stigmata* magna, 3, acuta, subdivaricata, basi dilatata. *Caps.* subprismatica, oblonga, acutissima, unilocularis, triplici fissurâ loculicidâ dehiscens. *Sem.* numerosa, adscendentia; perispermio dilatato, lineari-paleaceo, utrinque acuminato. inclusa, oblonga; trophospermum suturale.

1329. *LUZULA*. *Cal.* 6-phyllus (v. 6-partitus), glumaceus, persistens, bibracteatus. *Stam.* 6, basi calycis foliolorum inserta. *Anth.* erectae, 2-loculares. *Styl.* brevis. *Stigm.* 3, plumosa. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis, 3-sperma. *Decand.* *Lam. Illustr.* t. 250. f. 2. (sub *JUNCO*.)

Familia *JUNCORUM* *Juss.*. *JUNCUS* *Linn.* et *Auctor.* Conf. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 129. *E. Meyer Synops. Luzularum.* 8. *Gotting.* 1823, *Laharpe l. s. c.*

Obs. Character *LUZULAE* apud *Meyer l. c.*: „*Perianth.* 6-partitum, glumaceum, (plerumque 2-bracteatum). *Stam.* 6. (an unquam 3? cfr. *Luz. angustifoliam* *Poir.*). *Styl.* brevis. *Stigm.* 3, plumosa. *Caps.* 3-valvis, 1-locularis, 3-sperma (subinde 2-sperma ex *Brotero*; cfr. *Luz. vernalem*). *Sem.* erecta, testâ membranaceâ, diaphanâ, saepius relaxatâ. *Embryo* albumine inclusus, erectus, endorrhizus.“ Character ex *Desvaur*: „*Cal.* 3-partitus, persistens; laciniis subscariosis. *Cor.* 3-petala uti *Calyx*. *Stam.* 6, subinclusa. *Germ.* ovato-oblongum, trigonum. *Styl.* filiformis, brevis. *Stigm.* 3, filiformia, intus pubescentia, recurva. *Caps.* subinclusa, trigona, 3-valvis, 1-locularis, dehiscentiâ loculicidâ, valvulis septo destitutis. *Podospermium* coriaceum, tuberculatum, arcuatum. *Sem.* 3 adscendentia elliptica. *Embryo* endospermicus, axilis, intrarius, orthotropus.“ Character ex *Laharpe*: „*Perig.* glumaceum, duplici serie 6-phyllum. *Stam.* 6 perigonii foliolis opposita interiorumque basi inserta. *Germ.* 3-spermum, 1-loculare. *Styl.* 1. *Stigm.* 3, villosa. *Caps.* 3-valv., 3-sperm., 1-locularis; placentae minutae, fundo capsulae affixae. *Sem.* 3, oidea, plerumque appendiculata. *Embr.* basilaris, oideus: radiceula adversa.“

1330. *NARTHECIUM*. *Cal.* 6-phyllus; foliolis lineari-lanceolatis, patentibus, persistentibus demumque capsulam involventibus. *Filamenta* 6, calycis foliolis opposita, iisdem breviora interiorumque basi inserta, lanata, apice geniculata. *Antherae* oblongae, demum tortae. *Germ.* oblongum, triangulare. *Styl.* conicus. *Stigm.* capitatum, obsolete trilobum. *Caps.* oblonga, obtuse 3-quetra, 3-sulca, 3-valvis, sub 3-locularis. *Sem.* numerosa, scobiformia, arillo utrinque elongato, longitudine capsulae. *Huds.*

Familia *JUNCORUM* *Juss.*, *JUNCEARUM* sec. *Laharpe*, *ASPHODELEARUM* *St. Hil.*, *COLCHICACEARUM* sec. *Decandolle*. *ANTHERICI* species *Linné*. *ABAMA* *Adans.*, *PHALANGII* spec. *Mühlenb.*

Obs. Character ex *Laharpe*: *Perigon.* vix petaloideum, duplici serie hexaphyllum. *Stam.* 6, perigonii foliolis opposita interiorumque basi inserta; filamentis lanatis, apice geniculatis. *Germen* polyspermum, triloculare. *Stylus* 1. *Stigma* 1, capitatum, obsolete trilobum. *Caps.* 3-valv., polysperma, sub 3-locularis; placentae basilares. *Sem.* numerosa, longe scobiformia. *Embryo* basilaris oideus.

1331. *DASYPOGON*. *Cal.* duplex: exterior tubulosus, trifidus; interior triphyllus, foliolis semipetaloides, cochleariformibus. *Stam.* imo perianthio inserta. *Filamenta* apice incrassata. *Antherae* versatiles. *Germen* 1-loculare, 3-spermum; ovulis erectis. *Stylus* subulatus, stigmatate simplici. *Utriculus* 1-spermus, tubo indurato perianthii exterioris inclusus. *R. Brown.*

Familia *JUNCEARUM* sec. *Brown*, *BROMELIACEARUM* sec. *Laharpe*.

1332. *KINGIA*. *Perianthium* 6-partitum, regulare, glumaceum, persistens. *Stamina* 6, fere hypogyna; antheris basi affixis. *Germen* triloculare, loculis monospermis; ovulis adscendentibus. *Stylus* 1. *Stigma* tridentatum. *Pericarpium* exsuccum, indehiscens, monospermum, perianthio scarioso

cinctum. *R. Brown in Linn. Transact. et in Philos. Magaz. et Journ.* 1826. May p. 353.

Familia JUNCEARUM.

1553. CALECTASIA. *Cal.* inferus, tubulosus, hypocrateriformis, limbo petaloideo, sexpartito. *Stam.* fauci inserta. *Antherae* conniventes, lineares, basi insertae. *Germen* 1-loculare, 3-spermum; ovulis erectis. *Stylus* filiformis, stigmate simplici. *Utriculus* 1-spermus, tubo indurato perianthii inclusus. *R. Brown. Poir. Ill. gen. T. III. p. 598. t. 939.*

Familia JUNCEARUM sec. *R. Brown*, BROMELIACEARUM sec. *Laharpe*.

1554. MIERSIA. *Bracteae* patentés, basi imbricatae: sex exterioribus petaloideis; interioribus tot bifidis coloratis, depauperatis. *Perianth.* regulare, monophyllum, urceolatum, carnosum, ore constricto, 6-dentato. *Stam.* 6 minima, fauci perianthii inserta. *Germen* superum, triloculare. *Stylus* filiformis. *Stigma* capitatum. *Caps.* triquetra, truncata, trilocularis, vertice tantum 3-valvis, polysperma. *Sem?* *Lindl. in Miers trav. 2. p. 529. et Bot. Reg. ad 992.*

Familia GILLIESIARUM *Lindl.*; media ASPHODELEAS inter et CYPERACEAS atque RESTIACEAS. Convenit structurâ perianthii cum MUSCABI aut PUSCHRINIA.

β. *Calyx corollinus.* (HAEMODOREAE.)

1555. LOPHIOLA. *Cal.* (*Cor. Gawl.*) 6-fidus v. 6-partitus, coloratus, regularis, refractus, persistens, disco barbatus. *Stam.* hypogyna. *Pistillum* inclusum. *Germen* ovato-pyramidatum; loculis biseriato-polyspermis. *Stylus* 3-partibilis, stigmate simplicissimo. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis, dissepimentis e centro valvularum, polysperma. *Gawl.*

Familia HAEMODOREARUM. CONOSTYLIS species *Pursh*, HELONIAE *Mühlenb.*, ARGOLASIA *Pursh*.

1556. ANIGOZANTHOS. *Cal.* superus, 6-fidus, coloratus, germi adhaerens, demum deciduus, tubulosus, lanatus pilis ramulosis; laciniis subaequalibus, supra secundis. *Stam.* fauci inserta, adscendentia. *Antherae* erectae. *Germ.* 3-loculare, loculis polyspermis. *Styl.* filiformis, deciduus. *Stigma* simplex. *Caps.* 3-locularis, apice dehiscens. *Sem.* numerosa. *Labill.*

Familia HAEMODOREARUM *R. Brown*, NARCISSORUM *Juss.*. SCHWAEGRICHENIA *Sprengel*, ANIGOSIA *Salisb.*

1557. BARBACENIA. *Cal.* corollinus, 6-fidus, tubuloso-infundibuliformis, germi adnatus, extus saepe pilis glanduliferis. *Filamenta* basi laciniarum limbi inserta, erecta, plana, bifida, antheras dorso affixas lineares in divisione gerentia. *Styl.* erectus, triqueter, tripartibilis. *Stigm.* capitato-trigonum. *Caps.* cylindrico-subtrigona, perianthio crasso adnato

cincta, 3-ocularis, vertice dehiscens; placentâ centrali convexo-triquetrâ. *Sem.* numerosa, angulosa. *De Martius.*

Familia HAEMODOREARUM *R. Br.* *Martius et Zucc. nov. gen. et spec. T. 1. p. 17.* Alius videtur character BARBACENIAE apud *Vandelli*, quem vide sub *B. brasiliensi*.

1338. XEROPHYTA. *Cal.* corollinus, 6-phyllus, campanulatus; foliis 6 e totidem germinis dentibus. *Filamenta* 6, basi petalorum inserta. *Antherae* basi affixae, lineares, longae. *Styl.* rectus. *Stigma* peltato-vel capitato-trilobum. *Caps.* ovata, globosa, vel clavata, subtrigona, 3-ocularis, 3-valvis vel vertice valvulis horizontalibus seu impressis, vel plane non dehiscens. *Sem.* numerosa, saepe abortiva, quadrata vel angulosa. *Juss. Lam. ill. t. 225.*

Familia BROMELIARUM *Juss.*, HAEMODOREARUM *R. Brown*, SARMENTACEARUM *Spreng.* (Cfr. *de Martius et Zuccarini nov. gen. et spec. T. I. p. 13. sub VELLOZIA*).

Obs. *Jussieu* ad siccum et immaturum specimen *Commersonii* sequentem dedit XEROPHYTAE characterem: „*Cal.* tubulosus, limbo 6-partito regulari persistente; laciniis exterioribus angustioribus acuminatis. *Stam.* imis laciniis inserta; antherae longae, subsessiles, limbo aequales. *Stylus* 1. *Stigm.* oblongum, tumidum, (simplex?). *Caps.* scabra, coronata, 3-ocularis, polysperma. Suffrutex madagascariensis, aridus, alterne ramosus; rami aridis foliorum praecedentium vaginis alternatim imbricatis omnino scabri; caetera folia ut in *Pinq.* linearia, rigida, pungentia, in ramulis axillaribus terminalia, conferta: flores in ramulis subsolitarii terminalia.“ *Cls. de Martius* XEROPHYTAM conjungit cum VELLOZIA, quae XEROPHYTAE simillima et staminum numero tantum diversa. Character generis XEROPHYTAE apud *Smith* in *Rees Cyclop.*: *Cor.* 1-petala, supera: limbus profunde 6-partitus: segmentis ovato-oblongis, acutis persistentibus; exterioribus angustioribus, spinoso-acutis, fortioribus, extus glandulosis. *Filamenta* basi laciniarum inserta, filiformia, brevia, aequalia; antherae corollâ $\frac{1}{4}$ breviores, erectae, lineares. *Germe*n turbinatum. *Stylus* brevis. *Stigma* tumidum, oblongum, indivisum. *Caps.* ovata, scabra, corollâ marcescente coronata, trilocularis, polysperma.

1339. CONOSTYLIS. *Cal.* profunde et regulariter 6-fidus, superus, coloratus, campanulatus, lanatus pilis ramulosis, persistens. *Antherae* erectae. *Germe*n 3-loculare, polyspermum. *Stylus* conico-dilatatus, cavus. *Stigma* breve. *Caps.* apice dehiscens, stylo cavo tripartibili coronata. *Placenta* centralis, triquetra. *Semina* numerosa. *R. Brown.*

Familia HAEMODOREARUM. *Brown*, IRIDEARUM *Juss.* Calyce styloque ab ANIGOZANTHO, fructus structurâ a LANARIA diversa.

1340. LANARIA. *Cal.* (cor. *Ait.*) 6-partitus, superus, extus plumoso-lanatus, tubulosus; laciniis aequalibus, patulis. *Filamenta* laciniarum basi inserta. *Antherae* versatiles, basi emarginatae. *Stylus* simplex, gracilis. *Stigma* bifidum. *Caps.* calyce coronata, lanata, 3-ocularis, loculis 2-3-spermis. *Thunb.*

Familia IRIDUM *Juss.*, HAEMODOREARUM *R. Brown.* ARGOLASIA *Juss. et Lam. ill. t. 54.*, HYACINTHI species *Linn.*, AUGEA *Retz.*

1341. PHELEBOCARIA. *Cal.* corollinus, superus, 6-partitus, imberbis, persistens. *Stam.* basi laciniarum inserta. *Antherae* tetragonae, subsessiles. *Germe*n uniloculare, trisper-

mum. *Stylus* filiformis. *Stigma* simplex. *Nux* corticata, coronata, monosperma. *R. Brown*.

Familia HAEMODOREARUM *R. Brown Prodr. nov. Holl. p. 301.*

γ. *Corolla* absque calyce. (ASPARAGINEAE, LILIACEAE, ASPHODELEAE etc.)

α. *infera.*

β. *baccifera.*

1342. CONVALLARIA. *Cor.* campanulata v. tubuloso-campanulata; limbo 6-fido. *Stam.* corollâ breviora, mediae vel superiori (rarius inferiori) tubi parti inserta, erecta; filamenta tubo adnata; antherae lineares, erectae. *Styl.* erectus. *Bacca* sphaerica, 3-locularis: loculis 2-spermis; seminibus saepius abortivis. *Lam. Ill. t. 248.*

Familia ASPARAGORUM *Juss.*, SMILACEARUM *St. Hil.*, SARMENTACEARUM *Spreng.*. LILIUM CONVALLIUM *Mönch*, POLYGONATUM *Desf.*, AXILLARIA *Rafin.*.

Obs. Cl. *Desfontaines Ann. d. Mus. IX.* distinguit genus CONVALLARIAE, cui: *cal.* 0; *cor.* campanulata, 6-fida; *stam.* 6, corollâ breviora hujusque basi inserta; ovarium superum; *bacca* sphaerica, 3-locularis, seminibus 1-2; ab illo POLYGONATI, cui: *cal.* 0; *cor.* cylindrica; limbi laciniis 6, obtusis, parum profundis; *stam.* 6, corollâ breviora, mediae vel superiori tubi parti inserta; ovarium superum; *stylus* 1; *bacca* sphaerica, 3-locularis: loculis 2-spermis; semine uno vel altero saepe abortiente.

1343. SMILACINA. *Cor.* 6-partita v. 6-petala, (rarius 4-partita), stellata s. rotata, regularis; laciniis oblongis. *Filamenta* basi laciniarum affixa, divergentia, 6, rarius 4. *Antherae* ovatae vel subglobosae. *Stylus* 1, erectus, rarius 2. *Bacca* sphaerica, 3-locularis, oligosperma. *Desf.*

Familia ASPARAGORUM *Juss.*, SARMENTACEARUM *Spreng.*. CONVALLARIAE spec. *Linn.*, CLINTONIA *Rafin.*, POLYGONASTRUM *Mönch.*, DRACAENAE spec. *Hort. Kew.*, MAJANTHEMUM *Mönch, Roth* etc., STYRANDBA *Rafin.*, SCIOPHILA *Heller*, BIFOLIUM *Fl. Wett.*. UNIFOLIUM *Hall.*, EVALLARIA *Neck.*

Obs. Cls. *Desfontaines Ann. d. Mus. IX.* distinguit MAJANTHEMUM cui: *cal.* 0; *cor.* profunde 4-partita, stellata; *stam.* 4; *styli* 2; ovarium superum; *bacca* sphaerica, bilocularis, a SMILACINA, cui: *cal.* 0; *cor.* profunde 6-partita, stellata; *stam.* 6, divergentia, laciniarum basi inserta; *styl.* 1; *germ.* superum; *bacca* sphaerica, 3-locularis.

1344. FLÜGGEA. *Cor.* 6-partita, s. 6-petala, basi germi adnata, regularis; laciniis oblongis, obtusis, erectis, sub anthesi patentibus. *Filam.* brevissima, fauci inserta. *Antherae* ad germen subsessiles, mucronatae, basi sagittatae. *Styl.* e 3 connatis. *Stigmata* 5, minuta, bilobulata (?). *Bacca* sphaerica, 3-locularis, abortu 1-sperma. *Richard.*

Familia ASPARAGORUM *Juss.*, SARMENTACEARUM *Spreng.*. CONVALLARIAE spec. *Linn.*, OPHIOPOGON *H. Kew.*, SLATERIA *Desv.*, POLYGONASTRUM *Mönch*, LIRIOPE *Lour.*

Obs. Char. OPHIOPOGONIS sec. *Ker.*: *Cor.* semisuperum, limbo 6-partito, rotato, aequali, persistente. *Stam.* inclusa, aequalia, conniventia; filamentis brevibus imo corollae limbo insertis; antherae introrsae, erectae, sagittato-lineares, extus prope basin exsertae. *Germ.* semiinferum, 2-loculare: loculis 2-6-spermis, ovulis adscendentibus. *Stylus* robustus, triquetro-subulatus. *Stigma* apex trigonus continuus. Sec. *Don Prodr. Fl. nep. p. 47.*: „*Perianth.* 6-fidum, tubo brevissimo, semisuperum. *Stam.* fauci clausae inserta. *Filamenta*

inferne dilatata. *Anth.* lineari-subulatae, basi sagittatae, apice mucronatae. *Germ.* 3-loculare: loculis ovulis 2 erectis, fundo adnatis. *Styl.* triqueter. *Stigm.* simplicissimum. *Bacca* sphaerica, 1-sperma.

1345. **STREPTOPUS.** *Cor.* campanulata, profunde 6-partita, v. 6-phylla; laciniis basi nudis. *Filamenta* brevissima; antherae erectae, acuminatae v. obtusae. *Styl.* triqueter; stigmata 3, brevissima, reflexa. *Bacca* subglobosa, laevis, 3-locularis, chartacea. *Sem.* plura, abortu pauca, ovato-oblonga; hilo nudo. *Mich.*

Familia LILIACEARUM *Juss.*, TULIFACEARUM *Dec.*; SARMENTACEARUM *Spreng.*. UVULARIAE spec. *Linn. et Auct.*. *Lam. ill.* t. 247. f. 1., HEXORIMA *Rafin.*

Obs. *Char. gen.* quidquam ablutens in *Don Prodr. Fl. nep.* p. 48., qui genus hoc forte adhuc dividendum statuit: „*Perianth.* infer., 6-phyll., campanulatum, deciduum. *Stam.* 6, aequalia: *filam.* brevissima, obovata (in *S. lanuginoso*), longa basiue fere simplicia: *anth.* oblongae, erectae, basi sagittatae, apice mucronatae (in *S. lanuginoso*), obtusae. *Styl.* triqueter. *Stigm.* 3, brevia, recurvata, apice truncata. *Bacca* subrotunda, 3-loc., sulcis 3 exarata, laevis: loculis polyspermis. *Sem.* septis utrinque affixa, pendula, ovali-oblonga, curvula, sulcata, testâ rugosâ, coriacea.“

1346. **DRAPIEZIA.** *Perianthium* campanulatum, 6-petaloidium, petalis basi calcarato-saccatis. *Stamina* 6, petalorum basi accreta, simulque decidua. *Antherae* extrorsae. *Germen* triloculare, loculis dispermis. *Stylus* 1. *Stigmata* 3 recurva. *Bacca* 1-3 locularis, loculis 1-spermis. *Embryo* in albumine cartilagineo umbilico oppositus. *Blume* in *Enum. pl. Jav.* 1. p. 8.

Famil. COLCHICACEARUM *Decand.*, MELANTHACEARUM *R. Brown.* Genus intermedium UVULARIAM inter et STREPTOPODA, (affine etiam DISPOBO, a quo differt fructu omnino baccato, 1-3-spermo), dictum in honorem cli *Drapiez*, fautoris horticulturae in Belgio meridionali praestantissimi. *Blume.* LETHEA *Noronha*, UVULARIAE spec. *Reinw.*

1347. **DRYMOPHILA.** *Cor.* (*Cal.*?) 6-petala, patens, aequalis, decidua. *Stamina* hypogyna. *Germen* triloculare, loculis polyspermis. *Stylus* tripartitus. *Stigmata* revoluta. *Bacca* subglobosa, 3-locularis, polysperma. *R. Brown.*

Familia SMILACEARUM *R. Br.*, ASPARAGORUM *Juss.*. STREPTOPODI et CONVALLARIAE affinis.

1348. **RIPOGONUM.** *Cor.*? (potiusne *Calyx*?) 6-partita, aequalis, patens, bibracteata, decidua. *Filamenta* subulata, glabra. *Antherae* longiores, emarginaturae baseos insertae. *Germen* 3-loculare, loculis monospermis. *Stylus* brevissimus. *Stigma* 3-lobum, obtusum. *Bacca* 1-2-sperma. *Semen* subglobosum. *Albumen* cartilagineum. *Embryo* excentricus. *Forst. R. Brown.*

Familia SMILACEARUM *St. Hil.*, ASPARAGORUM *Juss.*. Genus SMILACI proximum. SMILACIS spec. *Forst.*, *Willd.*

1349. **ONCUS.** *Cor.* subcampanulata, pilosa, basi 2-bracteata (apud *Lour.*: *cal.* 2-phyllus. inferus); tubo hexagono; limbo 6-fido, reflexo. *Filam.* brevissima, basi laciniarum in-

serta; antherae subrotundae, minimae. *Germ.* 6 - sulcatum, mediâ parte tubo adnatum. *Styl.* brevis. *Stigmata* 3, reflexa, apice bifida. *Bacca* oblonga, 6-gona, 3-locularis, polysperma. *Sem.* subrotunda. *Lour.*

Familia SMILACEARUM *St. Hil.*, (ASPARAGORUM *Juss.*), SARMENTACEARUM *Spreng.*. DIOSCOREAE affinis.

1550. LAPAGERIA *). *Cor.* 6-petala, basi obtuse trigona; petalis conniventibus, subaequalibus: 3 interioribus latioribus subunguiculatis. *Filamenta* basi petalorum inserta, alterna paulo longiora. *Antherae* erectae. *Stigma* clavatum. *Bacca* oblongo-ovata, 1-locularis. *Sem.* numerosa, receptaculo triplici. *Ruiz et Pav.*

Familia SARMENTACEARUM *Spreng.*

1551. PHILEZIA. *Cor.* (*Cal.*?) campanulata, 6-partita, regularis; laciniis 3 exterioribus acuminatis, 3 interioribus duplo longioribus, obtusis. *Filamenta* basi connata. *Antherae* longae, versatiles. *Stigm.* 5-lobum. *Bacca* subtrigona, (3-locularis?), polysperma. *Commers. Lam. ill. t. 248.*

Familia ASPARAGORUM *Juss.*, SMILACEARUM *St. Hil.*, SARMENTACEARUM *Spreng.*

1552. CALLIXENE. *Cor.* profunde 6-partita, aequalis; laciniis alternis basi subbiglandulosis. *Filamenta* basi dilatata. *Antherae* oblongae, versatiles. *Stigm.* trigonum. *Bacca* parva, 3-locularis; loculis intus pulposis, saepe 3-spermis. *Commers. Lam. Ill. t. 248.*

Familia ASPARAGORUM *Juss.*, SMILACEARUM *St. Hil.*, SARMENTACEARUM *Spreng.*. ENARGEA *Gaertn. et Willd.*. CUM LUZURIAGA jungenda videtur clo *Jussieu* apud *Poiret Suppl. V. p. 590.*

1553. LUZURIAGA. *Cor.* 6-petala; petalis distinctis, aequalibus: 3 exterioribus angustioribus. *Filamenta* 6, receptaculo inserta. *Antherae* erectae, sagittatae. *Styl.* triqueter. *Stigm.* triangulare. *Bacca* 3-angularis, dissepimento membranaceo. *Sem.* 2 in singulo loculo, saepe abortiva. *Ruiz et Pav.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Br.*, ASPARAGORUM *Alior.*. LUZURIAGA *Pers.*

Obs. *Cls. R. Brown*, qui in *Prod. Fl. Nov. Holl. p. 281.* species LUZURIAGAE e Nova Hollandia forte genero differre monet a peruviana, sequentem characterem genericum posuit: „*Perianthium* 6-partitum, patens, aequale, imberbe, deciduum. *Stam.* 6, basi laciniarum inserta; *filam.* filiformia, glabra, apice curvata; *anth.* conniventes, sagittatae, filamentis longiores. *Ovar.* loculis oligospermis. *Styl.* filiformis, 3--sulcus. *Stigm.* simplex. *Bacca* oligosperma. *Sem.* subglobosa.“ *Poiret* non tantum species peruvianas et ex Nova Hollandia, sed etiam EUSTREPHUM sub *Luzuriaga* conjungit, Nomen in honorem *M. D. Luzuriaga*, hispani.

1554. EUSTREPHUS. *Cor.* 6-partita, patens: laciniis interioribus fimbriatis, decidua. *Stam.* hypogyna. *Filamenta*

*) In honorem *Josephae Lapagerie*, Imperatricis Gallorum, cui hortae *Malmaison* debuimus.

brevissima, plana, nunc coalita. *Antherae* erectae. *Germen* loculis polyspermis. *Stylus* filiformis. *Stigma* trigonum. *Caps.* baccata, 3-locularis, 3-valvis, valvis medio septiferis. *Semina* plura, umbilico strophiolato. *Embryo* excentricus. *R. Brown.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Brown.* LUZURIAGAE spec. *Poiret.*

1355. RHUACOPHILA. *Cor.*, (*Perianthium* inferum, petaloideum *Bl.*), duplici serie profunde 6-partita, decidua: petala subaequalia, apice pubescentia. *Stamina* 6. hypogyna. *Filamenta* utrinque angustiora, corollà breviora. *Antherae* basi emarginatae, erectae. *Germen* 4-loculare, 4-sulcum. *Stylus* 4-sulcus. *Stigma* obtusum. *Bacca* carnosae, subglobosa, 3-4-sulca, 3-4-locularis, polysperma. *Semina* parva, umbilico strophiolato. *Embryo* umbilico approximatus. *Blume.*

Familia ASPARAGINEARUM. Proxima EUSTREPHO, a quo structurâ germinis, fructu omnino non dehiscente situque embryonis differt. *Blume En. pl. jav. p. 13.*

1356. ASPARAGUS. *Cor.* 6-partita, erecto-patens, basi connivens, (rarius subglobosa v. subrotata), aequalis, decidua. *Stam.* basi laciniarum inserta; *filamenta* subulata, glabra; *antherae* peltatae, erectae, basi emarginatae. *Germ.* sessile, loculis 2-spermis. *Styl.* brevis, 3-sulcus. *Stigm.* 3-lobum v. trifidum. *Bacca* globosa, 1-5-locularis, oligosperma. *Sem.* subglobosa. *Embryo* excentricus. Flores saepius dioïci. *Lam. ill. t. 249.*

Familia ASPARAGORUM *Juss.*, SMILACEARUM *St. Hil.*, ASPHODELEARUM *R. Brown.*

1357. DRACAENA. *Cor.* urceolato-tubulosa vel profunde 6-partita, decidua: limbo patente vel reflexo. *Filamenta* medio incrassata, summo ungui aut ori tubi inserta. *Antherae* incumbentes, lineares. *Germen* pedicellatum. *Stigma* depresso-obtusum v. trilobum. *Bacca* subglobosa, 3-locularis; loculis 1-spermis, saepius abortivis. *Lam. ill. t. 249. f. 1.*

Familia ASPARAGORUM *Juss.*, SMILACEARUM *St. Hil.*, ASPHODELEARUM *R. Brown.* ASPARAGI, ALETRIDIS, CONVALLARIAE spec. *Linn.*, YUCCAE *Hoyer.* STOEBRIA *Crantz.* OEDERA *Crantz.* ALOËS et SANSEVIERIAE spec. *Jacquin.*

Obs. Character reformatus apud *Blume Enum. pl. jav. I. p. 10.* „*Perianthium* inferum, 6-partitum, deciduum; petalis erectiusculis, basi connatis. *Stamina* 6, petalis inserta. *Filamenta* medio subincrassata. *Antherae* lineares, incumbentes. *Stylus* 1. *Stigma* 3-fidum aut tridentatum. *Bacca* 2-3-sperma, loculis 1-2-spermis.“

1358. CORDYLINAE. *Cor.* campanulata, 6-fida, aequalis, decidua. *Filamenta* fauci inserta, subulata, glabra. *Antherae* versatiles, basi bifidae. *Germen* loculis polyspermis. *Stylus* 1, stigmatate parvo, 3-lobo. *Bacca* globosa, 3-locularis. *Sem.* plura v. abortu solitaria umbilico strophiolato. *Commers. R. Brown.*

Familia ASPARAGORUM *Juss.*, SMILACEARUM *St. Hil.*, ASPHODELEA-

RUM *R. Brown.* DRACAENAE spec. *Thunb.* etc., SANSEVIERIAE *Spreng.*, DIANELLAE *Lam.*. An satis diversa a DRACAENA?

Obs. In *Persoon Syn.* I. p. 372. character genericus ex *Aubert du Petit Thouars*: *Cor.* externe pubescens. *Filam.* simplicia, basi corollae inserta. *Stigm.* subincrassatum. *Bacca* turbinata, 1-locularis.

1359. DIANELLA. *Cor.* 6-partita, aequalis, patens, decidua. *Filamenta* curvata, apice incrassato stuposa (aut imberbia). *Antherae* lineares, strictae, basi insertae. *Germen* loculis polyspermis. *Stylus* filiformis, stigmatate simplici. *Bacca* subglobosa, polysperma. *Sem.* ovalia, (angulata), umbilico nudo. *Lam. ill. t.* 250.

Familia ASPARAGORUM *Juss.*, SMILACEARUM *St. Hil.*, ASPHODELEARUM *R. Br.*. DRACAENAE species *Linn.* etc., EXCREMIS *Willd. Herb.*

1360. SANSEVIERIA. *Cor.* tubulosa, decidua, hexagona; limbo 6-partito: laciniis lanceolatis revolutis. *Filamenta* fauci inserta, basi libera, filiformia. *Antherae* lineares. *Germen* loculis 1-spermis. *Stylus* filiformis; stigmatate obtuso, indiviso vel obsolete lobato. *Bacca* 1-3-locularis; loculis 1-spermis, saepius abortivis. *Sem.* subglobosa, superne umbilicata. *Thunb. Lam. ill. t.* 237.

Familia ASPHODELEARUM. ALETRIDIS et ALOËS spec. *Linn.*, *Jacq.* etc., SALMIA *Cav.*, ACYNTHA *Medic.*. Cfr. *Gleditsch Mem. d. l'Ac. d. Berl.* 1769. p. 65.

1361. LOMATOPHYLLUM. *Cor.* hexapetalo-partita, basi sicca et tubuloso-connivens; laciniis imbricatis. *Stam.* immediate hypogyna, erecta, inclusa, filiformia, aequalia; antherae erectae, ovatae. *Styl.* setaceus. *Stigm.* simplex. *Bacca* coriaceo-carnosa, subtrisolcata, 3-locularis: loculis polyspermis; placentâ centrali, valvis discretis. *Sem.* oblonga, angulosa, nigra. *Willd.*

Familia ASPHODELORUM *Juss.*. ALOËS spec. *Lam.*, DRACAENAE *Ait.*, PHALLOMA *Gawl.*. Differt ab ALOË staminibus non inclinatis fructuque non capsulari; a DRACAENA filamentis medio haud incrassatis, baccaeque loculis haud monospermis. *Gawl.*

1362. PELIOSANTHES. *Cor.* semi-infera, ni rectius infera, marcescens, profunde 6-partita, rotata, disco bullâ cavâ, glandulosâ, circulari, perviâ, filamenta brevissima fovente. *Antherae* didymae circa os bullae. *Germen* 3-loculare, loculis dispermis. *Stylus* brevissimus, crassus, trigonus, umbone stamineo. *Stigma* triradiatum. *Bacca* supera, triplex vel gemina: singula monosperma. *Gawl.*, (semina 1-3 nuda, ob pericarpium mox rumpens et ad seminum basin persistens. *R. Br.*) *Andr.*

Familia MELANTHACEARUM?, SARMENTACEARUM *Spreng.*. TETA *Roxb.*

1363. BULBOSPERMUM. *Perianthium* inferum, serie duplici 6-partitum, aequale. *Stamina* 6: filamenta in urceolum

denticulatum connata; antherae introrsum adnatae. *Germina* 5, monostyla, subcoalita, 1-locularia, ovulis 4 basi adfixis. *Stigmata* simplicia. *Baccæ* plures, monospermae, perianthio cinctae. *Blume Enum. pl. jav. 1. p. 15.*

Familia ASPARAGORUM *Juss.*

2. *capsularis.*

1564. LINDERA. *Cor.* 6-petala, infera. *Pet.* ovata, obtusa. *Filamenta* germini inserta, corollâ multo breviora. *Antherae* minutae. *Germ.* ovatum, glabrum. *Styl.* erectus, corollâ paulo brevior. *Stigmata* 2, reflexa. *Caps.* 2-locularis. *Thunb. Diss. Lam. ill. t. 265.*

Familia?

1565. HERRERIA. *Cor.* rotata, 6-partita. *Stam.* basi corollae inserta. *Anth.* rotundatae. *Germen* trigonum. *Stylus* erectus. *Stigma* trigonum. *Caps.* triquetro-alata, 3-locularis, 3-valvis: valvulae septiferae: loculis 2-4-spermis. *Sem.* lenticularia, margine membranacea. *Ruiz et Pav.*

Familia SMILACEARUM *St. Hil.*, ASPHODELEARUM *sec. Sprengel.*

1566. SCHELHAMMERA. *Cor.* 6-petala, petaloidea, campanulata, aequalis, decidua: petala unguiculata, aestivatione involuta, stamina segregantia. *Stam.* basi petalorum inserta. *Antherae* posticae. *Germen* 3-loculare, loculis polyspermis. *Stylus* 1. *Stigmata* 3 recurva. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis, valvis medio septiferis. *Semina* nonnulla, ventricosa. *R. Br.*

Familia MELANTHACEARUM *R. Brown.*

1567. BURCHARDIA. *Cor.* (?) 6-petala, stellato-patens, aequalis, unguibus foveolâ nectariferâ, decidua. *Stamina* basi petalorum? inserta. *Antherae* peltatae, posticae. *Germen* trigonum: loculis duplici serie polyspermis. *Stylus* tripartitus, stigmatibus acutis. *Caps.* tripartibilis, segmentis navicularibus, intus dehiscentibus, polyspermis. *R. Brown.*

Familia MELANTHACEARUM *R. Brown.*

1568. LEDEBOURIA. *Cor.* 6-petala: petalis basi stamini-feris, persistentibus. *Germen* 3-partitum, pedicellatum, subrotundum. *Stylus* capillaris, simplicissimus: *stigmatibus* acuminato. *Utriculi* 3, basi connexi, monospermi; 2 saepe abortivi, et tunc 1 obovatus subcurvatus. *Roth.*

Familia MELANTHACEARUM. MELANTHII *spec. Heyne*, ERYTHRONII *Rottler*, ANTHERICI *Willd.*

** *Liliaceae et Hemerocallideae.*

1569. GLORIOSA. *Cor.* 6-petala; petalis undulatis, caudatis, reflexis. *Stam.* stylo breviora, subhorizontalia. *Stylus* declinatus, obliquus; *stigmatibus* trilobo. *Caps.* oblonga, coriacea, 3-locularis. *Sem.* biseriata, globosa. *Lam. ill. t. 247.*

Familia LILIORUM *Juss.*, LILIACEARUM *Adans.* METHONICA *Juss.*

1370. UVULARIA. *Cor.* 6-petala vel profunde 6-partita, campanulata; petalis erectis, apice patentibus, basi non saccatis; foveis nectariferis ad basin corollae. *Filamenta* brevia, glabra. *Antherae* acuminatae. *Stylus* subtrigonus. *Stigmata* 3 revoluta. *Caps.* ovata, trigona, 3-valvis; valvis septiferis; loculis polyspermis. *Sem.* subglobosa, strophiolata. *Lam. ill. t. 247. f. 2.*

Familia LILIORUM V. LILIACEARUM *Juss.*, TULIPACEARUM *Dec.*, SARMENTACEARUM *Spreng.*

1371. DISPORUM. *Cor.* campanulata, 6-phylla, basi tubulosâ, angulatâ: foliolis lanceolatis, serrulatis, basi saccatis. *Stam.* 6 erecta, corollae foliolis exterioribus opposita, iisdem paulo breviora. *Filam.* brevia, dilatata, glabra. *Anther.* extrorsae, oblongae, obtusae. *Styl.* teres, rectus, stamina longiora aequans. *Stigm.* 3, teretia, obtusa, recurvato-patentia, puberula. *Caps.* turbinato-trigona, 3-locularis; loculis dispermis. *Salisb. Don Prodr. Fl. nepal. p. 50.*

Familia LILIACEARUM *Juss.*, TULIPACEARUM *Decand.*. UVULARIAE spec. *Auctor.*, STREPTOPODIS spec. *Smith*, FRITILLARIAE *Lour.*.
An satis distinctum ab UVULARIA?

1372. COMPSOA. *Perianth.* campanulatum, 6-phyllum, basi tubulosum: foliolis oblongis, apice incrassatis, exterioribus 3 basi gibboso-saccatis. *Stam.* 6, aequalia: filam. subulata, compressa, glabra, basi dilatata ac subconnata; *antherae* ovali-oblongae, peltatae, extrorsae, duplici rimâ longitudinali hiantes. *Styl.* brevis. *Stigm.* 3, subtrigona, apice dichotoma. *Caps.* immatura triquetra, 3-locularis: loculis polyspermis. *Sem.* angulata, simplici serie secus axin digesta. *Don Prodr. Fl. nep. p. 50.*

Familia LILIACEARUM *Juss.*, TULIPACEARUM *Dec.*. COMPSANTHUS *Sprengel.*

1373. ERYTHRONIUM. *Cor.* 6-petala, turbinatim campanulata, cernua; petalis a medio reflexis: alternis basi tuberculis 2. *Stam.* imae corollae inserta, pistillo breviora. *Stylus* sulcato-trigonus. *Stigma* nunc triangulare, nunc lamellis 3 canaliculatis, patentibus. *Caps.* turbinato-globosa, erecta, valvis 3 placentiferis. *Sem.* plura, ovata. *Lam. ill. t. 244. f. 2.*

Familia LILIORUM V. LILIACEARUM *Juss.*, TULIPACEARUM *Dec.*

1374. TULIPA. *Cor.* 6-petala, campanulata, basi nuda; petalis erectis vel semipatentibus. *Filamenta* ad commissuram germinis et corollae inserta. *Antherae* lineari-oblongae. *Styl.* o. *Stigma* subcristatum, germine triangulari prismatico insidens. *Caps.* oblonga, obtuse trigona, 3-locularis. *Sem.* plura, plana. *Lam. ill. t. 244.*

Familia LILIORUM V. LILIACEARUM *Juss.*, TULIPACEARUM *Dec.*

1375. FRITILLARIA. *Cor.* 6-petala, imbricato-campanu-

lata, nutans: laciniis rectiusculis, intus supra ungues foveâ notatis, staminiferis. *Antherae* oblongae, adpressae. *Stylus* subclavatus, obtuse triqueter. *Stigmata* 3, (rarius 1) introrsum canaliculata. *Caps.* coriacea, oblonga vel rotundata, sexsulcato-trigona s. profunde hexagona, angulis acutis, 3-locularis, 3-valvis. *Sem.* numerosa, horizontalia, plana, margine compressa, umbilicum versus angustata. *Lam. ill. t. 245. f. 1.*

Familia LILIORUM v. LILIACEARUM *Juss.*, TULIPACEARUM *Decand.*, MELANTHACEARUM sec. *Martius* ob petalorum situm. PETILIMUM *Linn.*, *St. Hil.*, IMPERIALIS *Mönch* habitu magis quam characteribus differt.

1576. LILIUM. *Cor.* 6-petala, (aliis profunde 6-partita), regularis, infundibuliformi-campanulata; petalis v. laciniis erecto-patentibus, saepius reflexis, sulco longitudinali nectarifero. *Stam.* erecta; filamenta fere subulata; antherae lineari-oblongae. *Stylus* subclavatus, obsolete angulosus. *Stigma* crassum, tricolle. *Caps.* oblonga, obtusa, 6-sulca, 3-locularis, valvis pilo cancellato connexis. *Sem.* numerosa, biserialia in quovis loculo, compressa. *Lam. ill. t. 246.*

Familia LILIORUM v. LILIACEARUM *Juss.*, ANBLIRION *Rafinesque*, FRITILLARIAE spec. *Pursh*, *Sprengel*, HEMEROCALLIDIS spec. *Thunb.*, SAUSSUREA *Salisb.*

1577. FUNHIA. *Cor.* 6-partita, tubulosa, campanulata; limbo subringente, connivente vel parum patente. *Stam.* fasciculata, basi limbi inserta, declinata. *Stylus* filiformis, situ staminum. *Stigma* subtrigonum, laeve. *Caps.* oblonga, subprismatica, 6-sulca, trilocularis, trivalvis. *Sem.* numerosa, depressa, membranaceo-alata: embryonibus pluribus. *Spreng.*

Familia LILIACEARUM, NARCISSORUM *Juss.*, AMARYLLIDEARUM *St. Hil.*, HEMEROCALLIDEARUM *R. Br.*, HEMEROCALLIDIS spec. *Linn.*, ALTRIDIS spec. *Thunb.*, *Houtt.*, HOSTA *Trattin.*, NIOBE *Salisb.*, BRYOCLES *Salisb.*

Obs. *Obs. Trattinick* in *Obs. bot.* p. 56. distinguit *HOSTAM*: corollâ tubulosâ, subbilabiata; limbo 6-fido, connivente; staminibus limbi basi adnatis, confertis; stigmatibus laevissimis, nudis, a *HEMEROCALLIDE*: cor. infundibuliformi, 6-partita; tubo brevi; limbo aequali, reflexo; staminibus declinatis, patulis; stigmatibus scabriusculo.

1578. HEMEROCALLIS. *Cor.* infundibuliformis, 6-partita; tubo brevi; limbo aequali, reflexo-patente. *Stam.* fasciculata, fundo corollae adnata, declinata, dein assurgentia, superne patula. *Stylus* filiformis, subtrigonus. *Stigma* trigonum, apice depressum, puberulum. *Caps.* oblonga, trigona, 6-sulca, trilocularis, trivalvis. *Sem.* ovato-oblonga v. globulosa. *Lam. ill. t. 254.*

Familia LILIACEARUM, NARCISSORUM *Juss.*, AMARYLLIDEARUM *St. Hil.*, HEMEROCALLIDEARUM *R. Br.*

1579. CZACRIA. *Cor.* 6-petala, infundibuliformi-campanulata, apice subreflexa. *Stam.* declinata, apice adscendentia, inferiora longiora. *Stylus* declinatus, triqueter. *Stigma* sub-

capitatum, trilobum. *Capsula* ovata, hexagona, 3-locularis, 3-valvis, valvulis medio septiferis. *Sem.* angulata, pyramidata, apice basique bi-, medio 5-serialia; embryo obliquo, centripeto. *Andrzejowski.*

Familia LILIACEARUM, HEMEROCALLIDEARUM *R. Brown.* ASPHODELEARUM sec. *Sprengel.* ANTHEMIDI spec. *L.*, HEMEROCALLIDIS *Hall., Willd.* etc., PHALANGII *Dec.*, ORNITHOGALI *Lam.*, ALLOBROGIA *Trattin.*

1380. BLANDEFORDIA. *Cor.* tubulosa, ore 6-lobo, marcescens. *Stam.* tubo imposita. *Anth.* basi extensoriiformi affixae. *Germen* pedicellatum. *Styl.* subulatus. *Stigma* simplex. *Caps.* prismatica, tripartibilis: partialibus angulo interno dehiscentibus. *Sem.* biseriata, marginibus suturae inserta, testâ laxâ pubescente. *Smith. R. Brown.*

Familia HEMEROCALLIDEARUM *R. Brown,* NARCISSORUM *Juss.* ALTRIDIS spec. *Labill.*

*** *Asphodeleae.*

1381. XANTHORRHOEA. *Cor.* 6-partita s. 6-petala, subaequalis; persistens: foliola interiora concava, basi conniventia. *Filamenta* plana, linearia; imo calyci inserta, nuda, exserta. *Antherae* versatiles. *Germen* loculis polyspermis. *Stylus* cylindricus, trisulcus. *Stigma* simplex. *Caps.* ovato-triquetra, lignea, 5-locularis, 3-valvis: valvis medio septiferis. *Semina* 1-2, compressa; umbilico basilari, nudo. *R. Brown.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Brown.*

1382. BORYA. *Cor.* tubulosa, infundibuliformis; limbo 6-partito, aequali; marcescens, bibracteata. *Stam.* 6 fauci coarctatae inserta, limbi laciniis opposita. *Stylus* filiformis. *Stigma* capitatum, obtusum. *Caps.* bracteis persistentibus inclusa, 5-locularis, 5-valvis; valvis medio septiferis. *Sem.* (abortu) pauca. *Labill. R. Brown. Poir. ill. gen. III. p. 593. t. 936.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Br.* DAVIESIA *Lam.* BAUMGARTENIA *Spreng. S. F. **). Genus nullo cognito affine nisi JOHNSONIAE et forte XANTHORRHOEAE. Habitu quibusdam Juncis simile. *R. Brown.*

1383. LAXMANNIA. *Cor.* 6-partita, basi connivens, persistens. *Filamenta* subulata, glabra, laciniis inserta. *Antherae* peltatae, subrotundae. *Germen* loculis oligospermis. *Stylus* simplex. *Stigma* obtusum. *Caps.* calyce persistente inclusa, 5-locularis, 5-valvis: valvis medio septiferis. *Semina* subbina, peltata, umbilico nudo. *Embryo* dorsalis. *R. Brown.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Brown.*

Obs. LAXMANNIA *Förster* species BIDENTIS est.

*) Nomen LABILIARDIERIANUM, antiquius *Willdenowiano*, retinendum.

1384. APHYLLANTHES. *Cor.* (aliis *Cal.* coloratus), 6-partita, lobis patentibus basi in tubum conniventibus, squamis imbricatis, glumaceis suffulta. *Stam.* inaequalia, tubo inserta. *Styl.* filiformis, triqueter. *Stigm.* lobulis 3 lateralibus subpatulis, 1 centrali. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis, ab apice dehiscens, 3-sperma. *Lam. Illustr.* t. 252.

Familia JUNCORUM *Juss.*, ASPHODELEARUM secus *Laharpe.*

Obs. Char. gen. ex Decandolle, in Redout. Lil. t. 483: „Perigon. petaloideum, 6-partitum; lobis oblongis basi in tubum conniventibus, superne patulis, apice brevissime emarginatis. Stam. 6 perigonio breviora. Ovar. liberum, trigonum. Styl. filiformis. Stigm. tetracephalum: lobulis 3 lateralibus subpatulis, medio terminali trigono-prismatico. Caps. membranacea, 3-valv.: valvulis intus nervo medio longitudinali, ab apice dehiscens et 3 styli secum auferentibus. Sem. 3 ovata, ad basin nervi medii valvularum inserta. Embr. cylindricus, erectus intra albumen carnosum.“ Gawler characterem gen. sequentibus posuit: „Fasciculus 1-3-florus; squamis 2-3 glumosis convoluto-conduplicatis. Cal. scarioso-membranaceus tubulosus; limbo 5-partito, conniventi-erecto, tubo pluries longiore. Cor. 6-petalo-partita, subhy pocrateriformis, aequalis, laciniarum unguibus cylindraceo-coarctatis, limbo patentissimo. Filam. filiformia, unguibus adnata. Styl. 3-queter, subclavatus. Stigmata 3, recurvata.“

1385. CONANTHERA. *Cor.* 6-petala, (in *campanulata* 1-petala, *campanulata*); petalis aequalibus, retroflexis. *Filamenta* receptaculo inserta, brevia, basi dilatata. *Antherae* subsagittatae, in conum acutum coalitae, apicibus liberis. *Stylus* filiformis. *Stigma* capitatum, trigonum. *Caps.* oblongo-globosa, 3-locularis, 3-valvis. *Sem.* pauca, subrotunda. *Ruiz et Pav.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Br.* ECHEANDIA *Orteg.*, ANTHERICI spec. *Cav.* etc., PHALANGII *Poir.*

1386. STYPANDRA. *Cor.* 6-partita, aequalis, patens, decidua. *Filam.* infra attenuata, curvata, glabra, supra stuposo-barbata. *Anth.* basi emarginatae insertae. *Germen* loculis polyspermis. *Stylus* filiformis. *Stigma* simplex. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis. *Sem.* pauca, ovalia, laevia, umbilico nudo. *R. Brown.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Brown.* ARTHROPODIA apud *Sprengel*; ANTHERICI spec. *Ruiz et Pav.*, PHALANGII *Poir.*, CAESIAE *Spreng.*. Genus posthac forsan dividendum, hinc DIABELLAE, inde ANTHERICO affine. *R. Brown Prodr.* p. 279.

1387. THYSANOTUS. *Cor.* 6-partita, patens, persistens: laciniis interioribus latioribus, limbo utrinque colorato, marginibus fimbriatis: ciliis articulatis. *Stam.* rarius 3, imo perianthio inserta v. hypogyna, declinata. *Filamenta* glabra, brevia. *Antherae* lineares, emarginaturae baseos insertae, 3 interiores saepius elongatae, reclinatae. *Germen* loculis dispermis. *Stylus* filiformis, declinatus. *Stigma* parvum. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis, valvis medio septiferis. *Semina* 2 strophiolata: altero erecto, altero pendulo. *R. Brown.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Brown.* CHLAMISPORUM *Salisb.*, ORNITHOGALI spec. *Labill.*

1388. ARTHROPODIUM. *Cor.* 6-partita, patens, decidua: *Syst. Vegetabil.* Vol. VII.

laciniis interioribus margine undulatis v. fimbriatis. *Filamenta* barbata. *Antherae* basi emarginatae insertae. *Germen* loculis polyspermis. *Stylus* filiformis. *Stigma* hispidulum. *Caps.* subglobosa, 3-locularis, 3-valvis; valvis medio septiferis. *Sem.* pauca, subangulata, umbilico nudo. *R. Brown.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Brown.* ANTHERICI et PHALANGII spec. apud Auct.

1389. BULBINE. *Cor.* 6-partita, patens, aequalis, decidua. *Filamenta* omnia v. interiora barbata, nunc inaequaliter, nunc obsolete. *Antherae* versatiles. *Germen* loculis polyspermis. *Stylus* filiformis. *Stigma* subpapulosum. *Caps.* subglobosa, 3-locularis, 3-valvis, valvis medio septiferis. *Sem.* pauca, angulata, umbilico nudo. *Willd. Lam. ill. t. 240. f. 1.*

Familia ASPHODELEARUM. ANTHERICUM *Linn., Juss., R. Brown.*

1390. TRICORINE. *Cor.* 6-partita, patens, aequalis, decidua. *Filamenta* penicillatim barbata. *Antherae* basi emarginatae insertae. *Germen* 5-partitum, lobis dispermis, basi stylo filiformi connexis. *Stigma* simplex. *Pericarpia* 3, clavata, evalvia, monosperma. *R. Brown.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Brown.*

1391. CHLOOPSIS. *Cor.* duplici serie 6-partita, aequalis, marcescens. *Stam.* 6, basi laciniarum inserta; *filamenta* breviter imberbia; *antherae* lineares, erectae. *Germen* 3-gonum, 3-sulcum, 3-loculare: loculis 2-ovulatis. *Stylus* 1. *Stigma* tricuspdatum. *Bacca* (*Caps.?* carnosae) alte 6-loba, abortu 2-3 loba; lobis subglobosis, indehiscentibus, carnosis, 1-spermis. *Sem.* subglobosa. *Embryo* basilaris. *Blume Enum. pl. jav.*

Familia ASPARAGEARUM *Juss., ASPHODELEARUM R. Brown.* Affinitate proxima CHLOROPHYTO et TRICORYNI.

1392. CHLOROPHYTUM. *Cor.* profunde 6-partita, subaequalis, regularis, patens, persistens: laciniis deorsum breviter tubulose conniventibus. *Filam.* filiformia, glabra. *Stylus* setaceo-elongatus. *Stigma* simplex. *Caps.* scarioso-pergamea, acute lobato-triquetra; lobis compressis, venosis; valvulis septigeris. *Semina* biseriata, 2-5 in singulo loculo, reniformi-rotunda, compressa, hinc depressa cum papilla centrali; umbilico nudo. *Ker. R. Brown.*

Familia ASPHODELEARUM. PITCAIRNIAM inter et TILLANDSIAM posuit *Gawler*, quo minime pertinet, nam optime *R. Brown* monet: PHALANGIO proximum, sed perianthio persistente; capsulâ alte trilobâ, lobis compressis venosis diversum. ANTHERICI spec. *Ait., PHALANGII Poir.*

1393. CAESIA. *Cor.* 6-partita, patens, aequalis, decidua. *Filamenta* imberbia, utrinque angustata. *Antherae* basi emarginatae insertae. *Germen* 3-loculare, loculis dispermis. *Sty-*

lus filiformis. *Caps.* vix valvata, apice toroso-lobata v. clavata. *Semina* ventricosa, umbilico strophiolato. *R. Brown.*

Familia ASPHODELEARUM. Genus PHALANGIO proximum, sed germinis seminumque structurâ abunde diversum. *R. Brown.*

1394. ANTHERICUM. *Cor.* profunde 6-partita, aliis 6-petala, subrotata, subaequalis, decidua v. persistens. *Filam.* corollae disco imposita, erecto-divergentia, inclusa, nuda. *Antherae* oblongae, fere incumbentes. *Styl.* filiformis, triqueter, assurgens. *Stigm.* trigonum, subclavatum, obtusum, pruinosum. *Caps.* pergamenea, globosa s. ovata, obtuse trisulco-trigona, 3-locularis, 3-valvis, medio septigera. *Sem.* abortu pauca, margini interiori dissepimenti utrinque affixa, obverse attenuata, angulata. *Albumen* carnosum, durum.

Familia ASPHODELORUM v. ASPHODELEARUM *Juss.* PHALANGIUM *Juss.*, etc., BULBOCODII spec. *Linn.*, ORNITHOGALI spec. *Lam.*, *Willd.*, *Thunb.*, *Ell.*, ARTHROPODII, BULBINES, CAESIAE spec. *Sprengel*, ALBUCAE *Ker*, SCILLAE *Dec. et Ker*, GAGFAE *Ker*, LLOYDIA *Salisb.*; nomen PHALANGII admitti nequit ob antiquissimum PHALANGII genus in Entomologia.

1395. EREMURUS. *Cor.* 6-petala, sub anthesi patens, post eandem involuta. *Stam.* impubera intra corollam conduplicata, effeta longissime exserta. *Stylus* elongatus, fecundatus reflexus, demum iterum assurgens. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis, corrugata, medio septigera. *Sem.* trigona, laevia. *M. a Bieberstein.*

Familia ASPHODELEARUM. ASPHODELI spec. *Pall.* etc.

1396. ASPHODELUS. *Cor.* profunde 6-partita vel 6-petala, patula, plerumque quidquam inaequalis. *Filam.* subulata, arcuata vel declinata, 3 plerumque breviora, basi fornicata vel valvulis 6 germen subtegentibus conniventibus inserta. *Antherae* oblongae, incumbentes. *Stylus* subulatus, subarcuatus. *Stigma* obtusum, rarius trifidum. *Caps.* subglobosa vel prismatice angulosa, subcarnosa, trilocularis, 3-valvis, saepe corrugata, medio septigera. *Sem.* triquetra. *Lam. Ill. t. 241.*

Familia ASPHODELORUM v. ASPHODELEARUM *Juss.*, ANTHERICI spec. *Steven*, ASPHODELOIDES *Mönch.*

1397. CYANELLA. *Cor.* 6-petala v. 6-partita, subirregulari-rotata, bilabiata v. inflexa: petalis 3 inferioribus propendentibus. *Filamenta* basi laciniarum affixa, ternatim opposita, infimum dilatatum, longius, (v. 3 inferiora), cum *stylo* declinatum. *Antherae* sagittatae, infima difformis. *Stigma* punctum obsolete trifidum. *Caps.* subrotundo-trigona, membranacea, farcta, nodulosa, 3-locularis, 3-valvis: valvis medio septigeris. *Sem.* biserialia, plura, subrotunda. *Lam. ill. t. 259. n. 1.*

Familia ASPHODELORUM *Juss.*, LILIACEARUM *alior.*

1398. ALBUCA. *Cor.* 6-petala vel profunde 6-partita;

lacinae exteriores patentes, interiores conniventes apice crassiusculo fornicato. *Stam.* omnia vel 3 tantum antherifera, incrassata; filamenta planiuscula, basi latiora; antherae oblongae. *Stylus* inverse pyramidatus, triqueter. *Stigma* papilloso-hirtellum, mucrone triplici cinctum vel trigonum, rarius simplex. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis. *Sem.* plana, alata. *Lam. ill. t. 141.*

Familia ASPHODELORUM v. ASPHODELEARUM, SPATHACEARUM *Spreng.*

ORNITHOGALI spec. *Linn.*, ASPHODELI spec. *Lam.*

Obs. ALBUCA differt ab ORNITHOGALO: laciniis corollae alternis apice fornicato-incurvis atque incrassatis; stylo quasi ex tribus connato; stigmate glanduloso-pubescente; ab ANTHERICO radice solido-bulbosâ. *Ker.* De ALBUCA confer etiam *Gleditsch Mém. d. l'Acad. d. Berl. 1769. p. 60 etc.*

1399. ERIOSPERMUM. *Cor.* 6-petala vel profunde 6-partita, persistens, oblongo-campanulata, subregularis vel irregularis; laciniis biserialibus laxè imbricatis. *Stam.* basi corollae affixa, dilatata, aequalia v. subaequalia, inclusa. *Antherae* sagittato-didymae. *Stylus* triquetro-filiformis. *Stigma* obsolete trifidum, subcapitellatum. *Caps.* membranacea, ovata, trilobo-trigona, 3-locularis, 3-valvis: valvis medio septigeris, demum stellato-replicatis. *Sem.* assurgentia, pauca, pedicellata, pappo nucleo plurimum longiore. *Jacq.*

Familia ASPHODELEARUM *R. Br.*, LILIACEARUM *Spreng.* ORNITHOGALI spec. *Linn.* etc.

Obs. *Ker* in *Bot. Reg.* 578. characterem generis sic emendavit: „*Cor.* infera, erecta, 6-divisa, regularis, subaequalis, emarcido-persistens: laciniarum series duplex, imbricans, interdum bifor-mi-patens. *Filam.* corollae disco inserta, subaequalia, inclusa, conniventia, planiuscula, a basi lata acuminata; antherae sagittato-didymae, infra divaricatae, a medio dorso affixae, erectae, introrsae. *Styl.* 3-quetro-filiformis, strictus; stigmate simplici v. subtrilobo, puberulo. *Germ.* loculis inferne biseriato-polyspermis, superne vacuis. *Caps.* oblongo-vel subrotundo-trigona, 3-locularis, 3-valvis: valvis septigeris stellatim replicandis. *Sem.* (ex *Jacq.*) septi margini internae utrinque funiculatim annexa (modo in imo angulo cujusque loculi unum) pappo simpliciter piloso.“

1400. ORNITHOGALUM. *Cor.* 6-petala vel profunde 6-partita, mox supra basin patens, (rarissime connivens), persistens. *Filamenta* receptaculo inserta, basi, saltem alterna, dilatata, (subinde bidentata). *Antherae* medio affixae. *Stylus* filiformis stigmate inconspicuo, aut brevis v. subnullus, eodem capitato trilobo. *Caps.* obtuse trigona vel trilobato-triloba, trilocularis: loculis polyspermis. *Sem.* subglobosa, rarissime compressa, nuda. *Embryo* axilis. *Lam. Ill. t. 242. f. 1. 2.*

Familia ASPHODELORUM *Juss.*, SPATHACEARUM *Spreng.*, STELLARIS *Mönch*, SCILLAE spec. *Linn.*, SAVI, ANTHERICI spec. *Waldst. et Kit.*, DRIMIAE spec. *Ker.*

Obs. Differt a SCILLA potissimum floribus nunquam caerulescentibus aut purascentibus, et seminibus numerosioribus.

1401. GAGEA. *Cor.* 6-petala, regularis, patens (subinde subrecurva), persistens. *Filamenta* receptaculo inserta, compresso-subulata, erecto-divergentia. *Antherae* verticales. *Stylus* filiformis vel trigonus, apice quidquam incrassatus.

Caps. trigona, trilocularis: loculis polyspermis. *Sem.* subglobosa. *Salisb.*

Familia ASPHODELEARUM. ORNITHOGALI spec. *Linné* etc., STELLARIS *Mönch.* Anne rectius categoriae SPATHACEARUM inserenda?

Obs. Genus valde naturale; floribus luteis, inflorescentiâ, totoque habitu proprio facilius distinguendum quam characteribus. *Her GAGEAM* ab ORNITHOGALO differre dicit: caule polyphylo loco scapi nudi, corollâ subherbaceâ tenaciore prorsus in petala discretâ: stylo ratione germinis longiore subclavato vertice hiulco, nec capitellatim protuberante aut trilobo.

1402. PUSCHINIA. *Cor.* 6-fida v. 6-partita, basi subcampanulata; limbo patente: laciniis aequalibus. *Nectarium* faucem coronans, cylindricum, dimidio corollae brevius, dentibus 6 erectiusculis. *Stam.* nectario inserta, filamentis brevissimis. *Antherae* oblongae, subsessiles. *Stylus* filiformis, stigmate simplici. *Germen* nectarii basin replens, ovatum, lineis 6 notatum, 3-loculare: loculis polyspermis. *M. a Bieb.*

Familia ASPHODELEARUM, LILIACEARUM *Spreng.*, ADAMSIA *Willd.*

1403. BARNARDIA. *Cor.* hexapetalo-partita, patens, aequalis, persistens. *Stam.* 6, filamentis basi dilatatis. *Germ.* 3-loculare, 3-spermum: ovulis solitariis, erectis. *Stylus* subulatus, continuus. *Stigma* simplex. *Fructus?* *Lindl.* (*Caps.* ovata, triquetra, 6-striata ex *Thunb.*)

Familia ASPHODELEARUM *Lindl. Bot. Reg.* 1029. Nomen in honorem *Edw. Barnard*, Esq. F. L. S. et H. S. Vice-Secretary of the Horticult-Society. ORNITHOGALI spec. *Thunb.* Genus vix satis distinctum ab ORNITHOGALO SCILLAQUE.

1404. SCILLA. *Cor.* profunde 6-partita, rotata v. campanulata, v. 6-fida subcampanulata, decidua. *Stam.* aequalia; filamentis filiformibus v. compressis, corollae plus minus adnatis. *Stylus* filiformis, erectus, stigmate simplici. *Caps.* subrotunda, trilocularis, trivalvis; valvulis medio septiferis; loculis oligo-4-spermis. *Sem.* subglobosa, atra. *Lam. ill.* t. 238.

Familia ASPHODELEARUM *Juss.*, LILIACEARUM *Spreng.* et alior, ORNITHOGALI spec. *Lam.*, *Bret.* etc., ANTHERICI spec. *Scop.*, STELLARIS *Mönch*, HYACINTHI spec. *Linn.*, *Thunb.* etc., MASSONIAE *Gawl.*, HYACINTHOIDES, USTERIA *Medic.*

Obs. Genus melius adhuc ab ORNITHOGALO distinguendum, cui proximum. Species floribus campanulatis, quae olim sub HYACINTHO latitabant, clo *Link* genus vel subgenus proprium, LIMONANTHE, sistere videntur; ad has pertinet etiam USTERIA et HYACINTHOIDES *Medic.*, quarum characteres vide infra in specierum enumeratione. Cfr. ORNITHOGALUM et HYACINTHUM.

1405. HYACINTHUS. *Cor.* tubulosa, 6-fida, regularis; laciniis patentibus. *Stam.* tubo inclusa; filamentis fere totis adnatis, vel basi dilatatis et submonadelphis; antheris oblongis vel sagittato-oblongis. *Stylus* subulatus, stigmate depresso. *Pori* 3 melliferi ad germen. *Caps.* ovato- v. rotundato-trigona, trilocularis; loculis oligospermis. *Sem.* subrotunda. *Lam. ill.* t. 238. f. 1. et 2.

Familia ASPHODELEARUM *Juss.*, LILIACEARUM alior. SCILLAE spec.

Gawler, Sieber, PUSCHKINIA Sieber, BELLEVALIA Lapeyr., MUSCARI spec. Besser. (Conf. *Medicus über Linné's Hyacinthen-Gattung in Bot. Annal. Fasc. 2. p. 5. et Willdenow ibid. Fasc. 4. p. 24.* Characterem BELLEVALIAE *Lapeyr.* vide sub *HYAC. romano.*)

1406. MUSCARI. *Cor.* globosa, ovata v. cylindrica, 6-dentata, fauce contracta, limbo brevissimo. *Stam.* inclusa, filamentis brevissimis, corollae adnatis. *Stylus* subulatus, stigmate simplici, anguloso. *Caps.* trilobo-trigona, trilocularis; loculis subdispermis. *Sem.* subglobosa, atra. *Tournef. Desf.*

Familia ASPHODELEARUM *St. Hil.*, LILIACEARUM *alior.*, HYACINTHI *spec. Linn. etc.*

Obs. „Genus MUSCARI infert vim naturae et delendum mihi videtur.“ *Bertoloni in litt.* Etiam nobis species nonnullae transitum ad HYACINTHOS sistere videntur.

1407. DRIMIA. *Cor.* profunde 6-partita, tubuloso-campanulata; laciniis aequalibus, infra medium reflexis. *Stam.* laciniarum basi inserta. (*Stigma* obscurius muricato-trigonum.) *Caps.* triloba, trilocularis: loculis ad axem connatis, dorso longitudinaliter dehiscentibus, semibivalvibus. *Sem.* pauca, (1-2) angulo centrali loculamentorum affixa. *Jacq. Schrader.*

Familia ASPHODELEARUM *St. Hil.*, LILIACEARUM *alior.*, HYACINTHI *spec. Poir.*, LACHENALIAE *spec. auctor. plur.*

1408. LACHENALIA. *Cor.* 6-petala v. 6-partita, campanulato-cylindrica et campanulata; petalis 3 interioribus longioribus, extimis subcalycinis magis acutis. *Stam.* erecta, basi petalorum inserta. *Antherae* incumbentes. *Stylus* subulatus, stigmate simplici vel obsolete trifido. *Caps.* 3-alata v. ovato-triquetra, 3-locularis. *Sem.* plura, globosa, biseriata. *Jacq. Lam. Ill. t. 237.*

Familia ASPHODELEARUM *St. Hil.*, LILIACEARUM *alior.*, PHORMII *spec. Linn., Thunb.*, HYACINTHI *spec. Linn.*

Obs. „Quibus LACHENALIARUM fructum maturum inspicere contingit; in ejus dehiscendi modum, simulque in placentationem attente inquirent, ut omnia dubia LACHENALIAM inter et DRIMIAM solvantur.“ *Schrader.*

1409. UROPETALUM. *Cor.* 6-partita, cylindrico-campanulata; laciniis exterioribus longioribus calycinis subcaudatis, interioribus subconniventibus. *Stam.* erecta, basi laciniarum inserta. *Antherae* oblongae. *Stylus* erectus, triqueter; stigmate trilobo v. simplici. *Caps.* ovata, obtuse trigona, trilocularis, trivalvis. *Sem.* numerosa, plana. *Gawl. Lam. Ill. t. 238. f. 1.*

Familia ASPHODELEARUM *Juss.*, LILIACEARUM *alior.* HYACINTHUS *L.*, ZUCCAGNIA *Thunb.*, PHORMIUM *Thunb.*, DIPCADI *Ust.*, LACHENALIA *Willd.*, SCILLA *Gawl.*, POLEMANNIA *Bergius.*

Obs. Character ZUCCAGNIAE apud *Thunberg*: „*Cor.* cylindrica, 6-fida: laciniis 3 exterioribus duplo longioribus, lanceolato-setaceis, saepe reflexis. *Antherae* ovatae. *Caps.* supera, ovata, 3-locularis.“

1410. PHORMIUM. *Cor.* profunde 6-partita, v. 6-petala; petalis

basi in tubum approximatis, interioribus longioribus apice patentibus. *Stam.* adscendentia, erecta, 3 breviora, receptaculo corollae inserta. *Stylus* trigonus, stigmatе trigono. *Caps.* oblongo-elongata, trigona, torta, trilocularis. *Sem.* numerosa, plana, margine membranacea. *Forst. gen. t. 24. Lam. Ill. t. 237. f. 2.*

Familia ASPHODELEARUM *Juss.*, LILIACEARUM alior., CHLAMYDIA *Gärtn.*, LACHENALIAE *spec. Lam.*

1411. EUCOMIS. *Cor.* 6-partita, persistens, rotato-patens. *Filamenta* inclusa, basi membranâ iisdem multoties breviorе corollae disco adnatâ connexa. *Antherae* ovato-oblongae. *Stylus* setaceus, incurvus. *Caps.* coriacea; turbinata, lobato-trigona, subalata, 3-locularis, 3-valvis. *Semina* oblongo-ovata, nigra, septi angustissimi margini interno utrinque adnexa. *Inflorescentia* comâ sterili terminali. *L'Herit. Lam. Ill. t. 289. f. 1.*

Familia ASPHODELEARUM *Juss.*, LILIACEARUM alior.. FRITILLARIAE *spec. Linn.*, ORNITHOGALI *spec. Thunb.*, BASILAEA *Juss.*, MELANTHII *spec. Andr.*

1412. MILLA. *Cor.* infundibuliformis; tubo recto; limbo 6-partito, plano; laciniis alternis angustioribus. *Antherae* subsessiles, fauci insertae, oblongae. *Germen* pedicellatum. *Stylus* filiformis, exsertus; stigmatibus 3 globulosis, villosis. *Caps.* oblongo-triangularis, trilocularis. *Sem.* ovata, acuta. *Cavan.*

Familia ASPHODELEARUM?, AMARYLLIDEARUM *St. Hil.*, LILIACEARUM *Spreng.*

1413. POLIANTHES. *Cor.* monopetala, infundibuliformis; tubo longo, incurvo; limbi laciniis patentibus, aequalibus. *Filamenta* brevissima, crassa, erecta, in apice tubi. *Antherae* filamentis longiores. *Styl.* filiformis, corollâ paulo brevior. *Stigm.* 3-fidum, crassiusculum. *Caps.* subrotunda, angulis 3 obtusis, 5-valvis. *Sem.* numerosa, plana, ordine duplici. *Lam. Ill. t. 243. f. 1.*

Familia NARCISSORUM *Juss.*, AMARYLLIDEARUM *St. Hil.*, LILIACEARUM *Spreng.*

1414. ALETRIS. *Cor.* subsemiinfera, tubuloso-infundibuliformis, ore 6-fido, patulo, obsolete hexagona, extus rugoso-scabra: lacinulis acuminatis, concavis. *Stam.* laciniarum basi inserta. *Filamenta* complanata. *Antherae* subsagittatae. *Germen* trilobo-pyramidatum. *Stylus* e setis 3 connatis: stigmatе simplici. *Caps.* vestita, tricocco-pyramidata, apice trifariam soluta, cocculis introrsum dehiscentibus. *Semina* numerosa, minutissima, arcuata, striata. *Bracteolae* singulae v. plures. *Lam. Ill. t. 257.*

Familia ASPHODELEARUM *Juss.*, LILIACEARUM alior.. WURMBEA *Willd.*

1415. VELTHEIMIA. *Cor.* monopetala, cylindraneo-tubulosa: limbo brevissimo, erecto-patulo, 6-dentato, regulari, laciniis subaequalibus. *Filamenta* medio tubi adnata, inde libera, inclusa. *Stylus* subulato-filiformis, declinatus, *stigmatē* cuspidato. *Caps.* diaphano-membranacea, trialata, subovata: loculis 3 submonospermis. *Semina* obovata. *Gleditsch.*

Familia ASPHODELEARUM *Juss.*, LILIACEARUM alior.. ALETRIDIS spec. *Linn.* etc. Conf. *Gleditsch Mém. de l'Acad. d. Berl. 1769. p. 66.*

1416. TRITOMANTHE. *Cor.* monopetala, campanulato-cylindrica, explicata: limbo brevi, 6-dentato, regulari. *Stamina* receptaculo germinis insita, rectissima, libera, exserta, alterna plurimum longiora. *Stigma* punctum obscurius penicillatum, acutum. *Caps.* cartilagineo-rigescens, ovata, obtuse trigona. *Semina* biserialia, plurima, triquetra vel varie angulata, sibi invicem adpressa. *Link.*

Familia ASPHODELEARUM *Juss.*, LILIACEARUM alior.. ALOËS spec. *Linn.*, ALETRIDIS spec. *Linn.*, VELTHEIMIA *Willd.* etc., TRITOMA *Gawl.*, KNIPHOFIA *Mönch.*

Obs. TRITOMA *Gawl.* (quod nomen antiquissimum insecti) in TRITOMANTHE mutavit *Link.* Differt TRITOMANTHE ab ALOË: corollis non ex laciniis levissime cohaerentibus, staminibus longius exsertis, alternis maxime inaequalibus; capsulâ cartilagineo-durâ et foliorum naturâ; a VELTHEIMIA: capsulâ non pendulâ nec membranaceo-inflatâ, nec maximâ cum loculis alato-compressis atque submonospermis; filamentis haud corollae accretis; habitu non bulboso; ab ALETRIDE: *cor.* non tuberculatim rugosâ, staminibus haud corollae affixis, stylo haud in 3 solubili, habituque. *Gawl.*

1417. ALOË. *Cor.* tubuloso-6-fida vel hexapetalo-partita, in tubum connivens, limbo regulari patulo, vel recurve bilabiato, carnosula, basi nectarifera: laciniis ligulatis, exterioribus interiores aequales vel longiores imbricatim obtegentibus. *Stamina* hypogyna, assurgentia, tubo aequalia, vel exserta. *Stylus* exsertus, v. subnullus, trisulcus. *Stigma* simplex, v. 3 minuta, replicata. *Caps.* membranacea, scariosa, rotunde vel acute trigona, 3-locularis, 3-valvis, valvis medio septigeris. *Semina* numerosa, biserialia, subrotundo-complanata, vel trigona, alata angulosave. *Gawl. Lam. Ill. t. 256.*

Familia ASPHODELEARUM *Juss.*, LILIACEARUM alior..

Obs. Genus a recentioribus Botanicis in plura alia divisum:

1. PACHIDENDRON. *Perigonii* cylindrici lacinae genitaliaque alte porrecta, assurgenter falcatim incurvantes. Caetera fere ut in ALOË. *Haw. Revis. pl. succ. p. 35.* (Arbusculae propaginibus nullis; caudice semper simplici, lignoso, erecto, grosso, senecto 20-ped. et ultra, foliis siccatis eorumque cicatricibus subinfractim incompte onusto. Folia capitatim terminalia, ambienter multifaria, erecto-expansa, recurva retrofractaque, saepe pedalia, ensiformia v. sublanceolata, amplexicaulia, basi arctissime vaginantia, crassa, succulenta, epidermide durâ laevi, tuberculatim spinosa vel semper ciliato-spinosa. Flores in spica terminali densa longa superba lutei vel luteo-coccinei. *Cor.* pendulae e pedunculis suberectis, tubulosae, apicem versus falcatim assurgentes.)
2. ALOË. *Cal.* petaloideus, erectus, basi staminifer. *Caps.* parum costata. Frutices caulescentes floribus pendulis. *Duval pl. succul. p. 5. Haw. Syn. p. 76. Revis. p. 39.*, cui in *Philos. Mag. et Journ. 1824. Octob. p. 298: Perig. pendulum, cylindraeeum, rectum. Genitalia* recta, inclusa. *Caps.* parum costata. (Frutices s. herbae succulentae; sed plerumque caulescentes, floribus alte pedunculatis, coccineis flavisque: saepius africani,

pauci americani arabice, unus sinensis. Caules floriferi varie spathaceo-bracteati.)

3. *BOWIA*. *Perig.* hexapetaloidem, cylindricum, erectum s. patens; laciniis subringenter-bilabiatis. *Stam.* inaequalia, exserta inclusave, cum stylo flexuoso-declinato-adscendentia. *Haw.* in *Philos. Mag. New Ser.* 1827. Febr. p. 122. (Character reformatus et alienus ab illo in *Philos. Mag. et Journ.* 1824. Octob. p. 299). (Herbae succulentae africanae *ALOARUM* genuinarum foliis scapis bracteisque, floribus diversis Nomen in honorem detectoris D. *Bowie*, itineratoris africanae.)
4. *RHIPIDODENDRON*. *Perianth.* monophyllum, corollaceum, coloratum, tripartitum; laciniis oblongis, obtusis, fundo nectariferum. *Cor.* 3-petala: petalis oblongis, obtusis, longitudine calycis. *Filam.* 6, filiformia, subulata, receptaculo inserta, longitudine corollae vel longiora. *Antherae* oblongae, incumbentes, erectae. *Germen* subrotundo-ellipticum, trisulcum, superum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum. *Stigma* acutum. *Caps.* 3-locul., 3-valvis, polysperma. *Sem.* angulata. *Willd. Mag. naturf. Fr.* 5. p. 164. *KUMARA Medic.*
5. *GASTERIA*. *Cal.* petaloideus, curvus, obclavatus, basi staminifer. *Caps.* parum costata. *Duval* in *Cat. Pl. Succul. H. Alenç.* 1809, p. 6. *Haw. Syn.* p. 85. *Revis.* p. 46. *Philos. Mag. et Journ.* 1825. Octob. p. 282. (Fruticuli vix caulescentes, foliis *ALOARUM*, floribus pendulis. *Duv.* Scapi semper remote spathaceo-bracteolati; foliis linguiformibus ensiformibusque. *Haw.*)
6. *HAWORTHIA*. *Cal.* petaloideus, rectus, superne revolutus in 2 labia, basi staminifer. *Caps.* in costas valde prominens. *Duval pl. succ.* p. 7. *Haw. Syn.* p. 90. *Suppl.* p. 70. *Revis.* p. 48. *Philos. Mag. et Journ.* 1824. Octob. p. 300. — *APICRA Willd.* — (Fruticuli vix caulescentes, foliis *ALOARUM*, floribus erectis. *Duval. Char. ess. APICRAE* apud *Willd. l. c.* p. 167: „*Cal.* o. *Cor.* tubo ventricoso, mellifero: limbo bilabiato: laciniis 3 inferioribus et superioribus concavis revolutis. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis: valvulis medio septiferis. *Sem.* angulata, marginata. *Char. natur.:* *Cal.* o. *Cor.* 1-petala; tubo basi ventricoso, cylindraceo, fundo mellifero; limbo 6-partito, bilabiato: laciniis 3 superioribus totidemque inferioribus, concavis, revolutis. *Filam.* 6, subulata, receptaculo inserta, corollâ breviora. *Antherae* oblongae, erectae, incumbentes. *Germ.* oblongum, superum. *Stylus* subulatus, staminibus brevior. *Stigma* simplex, obtusum. *Caps.* oblonga vel subrotunda, transversim rugosa, 3-locul., 3-valv., polysperma: valv. medio septiferis. *Sem.* angulata, marginata, subtriquetra. Habitu, florum structurâ, sapore acidulo nec amaro ab *ALOË* abunde diversa.“)
7. *APICRA*. *Perigon.* petaloideum, erectum, regulare, cylindricum, brevissime pedunculatum; laciniis 6 brevibus, uniformibus, apice rotundatis, patulis. *Haw. Suppl.* p. 61. *Philos. Mag. et Journ.* 1824. Octob. p. 301. (Suffrutices parvi, succulenti, africanae, omnium rigidissimi, foliolis tecti ut in *HAWORTHIA*, at induratissimis, acutioribus, confertioribus et fere semper spiraliter tortis, apice ipso aculeato-pungente.)

1418. *YUCCA*. *Cor.* hexapetalo-partita, campanulata, demum marcescens; laciniis aequalibus, parum patentibus, ungue connatis. *Stam.* valida, brevia; filamentis basi corollae insertis, superne tumidulis. *Antherae* parvae, suboblongae v. subglobosae. *Germ.* oblongum, teretiusculum, 6-sulcum, stamina excedens. *Stigmata* 3 sessilia, obesa, deorsum confluentia, apice parum recurvata. *Caps.* carnosae, oblongae, obtuse 3-6-gona, apice perforata et demum dehiscens, 3-6 locularis, dissepimentis 3 crassioribus. *Sem.* numerosissima, uniserialia, plana. *Lam. Ill.* t. 245.

Familia *LILIACEARUM* *Juss.*, qui de familia dubitat; *SPATHACEARUM* *Spreng.*

b. *supera.*

1419. *AGAVE*. *Cor.* infundibuliformis, basi tubulosa; limbo erecto, 6-partito, aequali. *Stam.* exserta, summo tubo inserta; filamentis longis, subulatis, compressis, suberectis.

Antherae magnae, lineares, versatiles. *Stylus* filiformis, subtrigonus, staminibus brevior. *Stigma* capitato-trigonum. *Caps.* oblonga v. obovata, subtrigona, trilocularis, polysperma. *Sem.* numerosissima, biserialia, plana. *Lam. Ill.* t. 255. f. 1. 2.

Familia BROMELIARUM *Juss.*, LILIACEARUM alior.. LITTAEA *Tagl.*, YUCCAE *Desf.*, DRACAENAE spec. *Auct.*, BONAPARTEAE spec. *Willd.*

1420. FOURCROYA. *Cor.* 6-petala, campanulato-patula, absque tubo; petalis aequalibus. *Stam.* basi vel medio crassiora, apice subulata, glandulae triforatae nectariferae germen obtegenti inserta, corollà breviora. *Antherae* oblongae, versatiles. *Stylus* triqueter, basi incrassatus. *Stigma* obtusum, membranula multifido-vel trifido-lacera. *Caps.* oblonga, trisulca, trilocularis, trivalvis, polysperma. *Venten. Bull. S. Philom.* 1793. *Octob.*

Familia BROMELIACEARUM *St. Hil.*, LILIACEARUM alior.. AGAVES spec. *Linn.* et alior..

Obs. *Cls. Decandolle* notat in *Cat. Hort. monsp.* p. 75. genus hocce, in *plant. succ.* t. 126. a se admissum, rejiciendum nunc esse, cum in eadem *A. vivipara* stamina nunc longiora, nunc breviora vidisset. „Propter corollam vere hexapetalam mereretur *A. foetida* et *cubensis* ab AGAVIS sejungi novumque constituere genus.“ *Jacq.*

1421. DORYANTHES. *Cor.* 6-partita, infundibuliformis, decidua: laciniis 3 interioribus basi latioribus. *Filam.* subulata, basi laciniarum adnata earundem fere longitudine. *Antherae* basi cavae extensoriiformi affixae, erectae, tetragonae. *Stylus* e tribus connatus, 3-sulcus. *Stigma* trigonum. *Caps.* turbinato-ovata, subtrigona, vestigiis corollae coronata, 3-locularis, 3-valvis, intus lignosa, extus corticosa, striata, per axem dissepimentorum et per suturas valvularum dehiscens. *Sem.* biseriata, plana, reniformia, rugosa; nucleo subtriquestro, unilaterali. *Correa Linn. Trans.* VI. t. 23, 24.

Familia AMARYLLIDEARUM *R. Br.*, LILIACEARUM alior..

1422. ALSTRÖMERIA. *Cor.* 6-petala (aliis 6-partita?), cyatho-v. cucullato-campanulata, regularis v. subbilabiata: petalis inaequalibus, 2-3 inferioribus basi tubulosis. *Stam.* fundo corollae inserta, inclusa, erecta v. declinata, alterna subbreviora. *Antherae* erectae, ovaes. *Styl.* filiformis. *Stigmata* 3, replicata. *Caps.* subrotundo-ovalis v. turbinata, costato-hexagona v. trisulco-trigona, dehiscens v. non dehiscens, 3-locularis, 3-valvis: valvis medio septigeris, rarius subbaccata. *Sem.* plura, globosa. *Lam. Ill.* t. 251. f. 1.

Familia NARCISSORUM *Juss.* cum? , AMARYLLIDEARUM *St. Hil.*, HEMEROCALLIDEARUM et LILIACEARUM alior.. BOMAREA *Mirbel.*

1423. IXIOLIRION. *Cor.* ad basin 6-partita v. 6-petala, subcampanulato-patens, regularis; lacinae exteriores angustiores, mucronulatae. *Stam.* basi laciniarum inserta; filamenta inclusa, recta, alterna breviora; antherae oblongae, effetae

revolutae. *Styl.* filiformis. *Stigmata* 3 patenti-recurva. *Caps.* oblonga, basi angustata, multistriata, 3-locularis, 3-valvis. *Sem.* plura, ovali-oblonga. *Herbert App. Bot. Reg. et Bot. Mag.* p. 37.

Familia AMARYLLIDEARUM?, AMARYLLIDIS species *Labill et Pall.*, ALSTROEMERIAE spec. *Ker.* Genus a *Herbert* conditum, primum AMARYLLIDEAS inter exhibitum, serius vero ab iisdem ob caulem foliosum ramosum remotum. Transitum sistit ad SPATHACEAS; spathae in IXIOLIRIO ab auctoribus descriptae involucrium tamen potius, ut in ALSTROEMERIIS, quam veram spatham simulant.

Obs. Character IXIOLIRII apud *Herbert* l. c. sequens: „*Bulbus* ovatus, subuncialis. *Folia* linearia; radicalia longiora, breviora in caule quasi bracteae. *Pedunculi* axillares et terminales, 1-2-flori. *Germ.* oblongum, tenue, pedunculo continuatum. *Cor.* ad basin divisa; lacinae exteriores angustiores, minus coloratae. *Filam.* alterna aequalia. *Stigma* (ut videtur) simplex. *Caps.* oblonga, striata, trilocularis, 3-valvis.“

Classis VI.

H E X A N D R I A.

ORDO I.

M O N O G Y N I A.

Species.

1275. **N A N D I N A.**

1. *N. domestica* Thunb. *Fl. Jap.* p. 147. *Diss. nov.*
pl. gen. 1. p. 15. *Willd. Spec.* II. p. 230. *Decand. S. V.*
II. p. 22. *Nandskokf v. Nandia* Kaempf. *Amoen.* 776.
Banksic. Kaempf. t. 13. 14. *Sims Bot. Mag.* 1109.

In spontanea: caulis fruticosus, erectus, latus, superne ramosus, orgyalis, crassitie digiti vel pollicis; rami vaginis foliorum vestiti, flexuosi, apice foliosi. Folia supradecomposita, ternata; foliola subsessilia, ovata, setaceo-acuminata, integerrima, margine reflexo, glabra. Petioli sulcati, glabri. Panicula terminalis, supradecomposita. Pedunculi pedicellique angulati. *Thunb.* In culta: caules instar *Polygonearum* vaginis e foliis. Petioli alterni, angulis fere rectis divisi, articulis globosis, roseis. Folia triplicato-pinnata: pinnis primis secundisque oppositis longissime, ultimis breviter petiolatis. Foliola ovato-elliptica, acuminata, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata. Paniculae pyramidales, ramosissimae, divaricatae. Cal. ovatus. Cor. $\frac{1}{3}$ poll. in diametro, alba. Petala subreflexa, oblonga, obtusa, basi lateribus inciso-crenata. Antherae sessiles, approximatae, flavae. Baccae rubrae, magnitudine pisi. Semina meniscoidea, hinc convexa. *Sims.* In *Japonia* spontanea et culta; in *China* culta. *h.*

1276. **B E R B E R I S.**

a. *Foliis simplicibus.*

a. *pedunculis multifloris, racemosis.*

1. **B. vulgaris*; spinis tripartitis, foliis brevioribus; racemis simplicibus pendulis; petalis obtusis, integerrimis; foliis obovatis, ciliato-serratis. *Willd. Enum.* p. 395. *Spec.* II. p. 227. *W. Baum.* p. 52. *Linn. Spec.* p. 471. *Lam. Enc.* VIII. p. 616. *Decand. Syst.* II. p. 5. *Allion. Ped.* II. p. 66.

Murr. Com. gott. 1784. *Hall. Helv.* n. 828. *α. rubra*; aculeis triplicibus; baccis rubris. *Smith Engl. Fl.* II. p. 184. *Engl. Bot.* t. 49. *Kölr. nov. act. petrop.* VI. *Knorr del.* 2. t. B. *Mill. Ic.* t. 65. *Fl. Dan.* t. 904. *Schkuhr Handb.* t. 99. *Hayne Getr. Darst. Off. Gew.* t. 41. *Hayne et Guimp.* 50. t. 39. *Svensk Bot.* t. 24. *Dict. sc. nat.* 6. Cah. *St. Hilaire XXVII.* t. 2. *Poit. et Turp. arb.* t. 51. *Duham. ed. Mich.* IV. p. 12. t. 4. *B. irritabilis.* *Salisb. prodr.* 213. *β. lutea*; fruct. luteis *l'Herit.* *γ. violacea*; aculeis multiplicibus; baccis violaceis. *Willd. Baumz.* l. c. *Poit. et Turp. arb. fr.* 59. *δ. purpurea*; fruct. purpureis; fol. angustis, vix ciliatis. *B. innominata*; floribus racemosis; fructibus ovatis, purpureis, 1-spermis; fol. angustis, obovato-lanceolatis, integris, mucronatis, infimis interdum serrato-ciliatis; ramis deflexis; aculeis simplicibus trifidisque. *Kielm. Dec. rar. pl. tüb.* p. 18. *B. sibirica* *H. Carlsruh.* *ε. nigra*; fruct. nigris; fol. oblongis, serrulatis, paucis, ciliato-serratis. *B. vulgaris δ orientalis procerior*; fructu nigro suavissimo. *Duham. l. c.* p. 12. *Tournef. Cor.* p. 42. *ζ. alba*; fruct. candidis. *Mill. Dict.* n. 1. *B. vulgaris γ Dumetorum.* *Duh. η. asperma*; aculeis multiplicibus; baccis aspermis. *Bauh. Pin.* 454. *Clus. Hist.* 1. p. 121. *θ. aspera*; fructibus asperis. *ι. fol. variegatis.* *κ. flor. albis.* *λ. ilicifolia Hortor.* *μ. fructu dulci.* *Host. Fl. a.* p. 454.

„Folia prima obovata, serrato-ciliata, inarticulata; stipulae utrinque dente capillari terminatae; caulina alterna: horum infimum subpinnatifidum, dentibus spinosis; reliqua mutata in spinas tripartitas. Folia secundaria bina, oblonga, serrata, inter folia infima, et spinas intra se occultant minora folia. Ergo foliis, anni praesentis, mutatis in spinas insequentis anticipantia prodibunt. An simile in ulla alia.“ *Linn.* Frutex interdum arborescens, radice lignoque flavicante. Flores flavi, odore gravi, sperma redolentes. Baccae rubrae. Raro folia elliptica aut subintegra et spinae simplices. In ♂ folia obovato-lanceolata, angusta, integra, infima modo serrato-ciliata; fructus purpureus, ovatus, monospermus, nec ovato-cylindricus, dispermus, ut plerumque in *B. vulgari.* *Ad margines sylvarum, sepes totius Europae, Tauriae, Asiae mediae, Americae; η in Syria et altera spinis simplicibus.* *Rauwolf Fl.* 23. *μ* in Austria circa *Gutenstein*, prope *Schneeberg.* *h.*

Obs. AN BERBERIS vulgaris *Thunb. Fl. jap.* 1. p. 146 re verâ nostra?

2. *B. iberica* *Stev. et Fisch.*; racemis erectiusculis; foliis oblongis, subintegris. *Decand. prodr.* p. 105. *S. V.* II. p. 6. (sub *B. vulgari* *ν?* *iberica*). *B. spinis simplicibus tripartitisque; foliis obovato-oblongis, mucronatis, integerrimis; racemis pendulis, multifloris.* *Spreng. Cur. post.* p. 138.

In Caucaso. *h.*

3. *B. aetnensis* *Presl*; spinis tripartitis foliis aequilongis longioribusve; foliis obovatis, ciliato-serratis; racemis mul-

tifloris, erectiusculis. *Presl. Fl. sicul.* 1. p. 28. *B. sicula Jan Elench.*

Fruticulus 1-2-ped., densus, ramosissimus, fere globosus; spinis horizontalibus, validis, flavidis. Rami striati, flexuosi. Folia 6-10 lin.. Racemi erecti, pendulive, 5-10 flori. Flores non vidi. Baccae rubrae, acidissimae, valde adstringentes. Differt a *B. vulgari* spinis, (in hac foliis multo brevioribus) et racemis erectiusculis. *Presl. B. canadensi* affinis. *Jan in litt.* In regione sterili subalpina montis *Aetnae*, altit. 6000-7500 ped. h.

4. *B. emarginata Willd.*; spinis tripartitis; racemis simplicibus, (sub-) pendulis; petalis emarginatis; foliis lanceolato-obovatis, ciliato-serratis. *Willd. Enum. H. Berol.* p. 395. *W. Baumz.* p. 53. *Link Enum.* p. 345. *Guimp. Abbild. fremd. Holz.* p. 78. t. 63.

Similis *B. vulgari*; sed omnibus partibus duplo minor; similior tamen adhuc *B. sibiricae*. Frutex 2-4 ped. (ramis magis cinereis, quam in *B. vulgari*). Spinae 3-rarius 5-partitae, subulatae, (reflexae, subtus sulcatae, foliis breviores, lobis divergentibus). Folia fasciculata, quoad magnitudinem media *B. vulgarem* inter et *sibiricam*, lanceolata, apice rotundata, basi cuneato-angustata, dentibus setaceis, (subtus glaucescentia, 3-8 lin., 2-5 lin. lata). Racemi breves, densi, (foliis breviores, erectiusculi, 4-6 flori). Flores magnitudine coloreque fere ut in *B. vulgari*. Fructus intense rubri, minores et plerumque abortivi. *Willd. Besser* notavit varietatem *B. vulgari* racemis brevioribus, obtusioribus in Volhynia, et quaerit: an haec forte *B. emarginata*? In *Sibiria*. h.

5. *B. canadensis Mill.*; spinis tripartitis; foliis obovato-oblongis, remote serratis, summis integris; racemis multifloris, nutantibus. *Decand. Syst.* II. p. 7. *Mich. Fl. b. amer.* I. p. 205. *Pursh. Fl. sept. Am.* I. p. 219. *Elliott Sketch* I. p. 412. *Nutt. gen.* I. p. 211. *Guimpel Abb. fr. Holz.* p. 79. t. 64. *B. vulgari* δ . *Willd. Spec.* II. p. 228. *Torrey Fl. N. M. U. St.* p. 336. γ . *Ait. H. Kew.* ed. 2. II. p. 313. ζ *Lam. Enc. VIII.* p. 616. *Duham. Tr. Arb. et Arb. ed. nov.* T. IV. p. 12.

Species adhuc dum dubia, sub qua fors plures distinctae latitant. Specimen a *Bigelow* clo *Decandolle* missum foliis multo magis serrato-ciliatis gaudet, et ad *B. vulgarem* magis, quam reliquae borealis Americae, accedit. *Pursh* in sua petit: ramos confertim punctatos; racemos breves subcorymbosos, pendulos; drupas vix carnosas, rubras. *Elliott* racemos 6-8-floros, primum erectos, dein nutantes: calycis phyllis ovatis, acutis; petalis ovatis, basi glandulis purpureis 2; baccas ovatas describit. *Nuttall* ramos fortiores, verrucoso-punctatos; racemos horizontales vel recurvos, nec pendulos; pedicellos inferiores saepe fere pollicares; flores plerumque bibracteatos, odore grato; calycis foliola corollam pallidiora, flava, inaequalia: exteriora ovata interioribus duplo breviora; interiora cuneato-obovata, corollam superantia; petala cuneato-obovata, bifide emarginata, saturate lutea; baccas subglobosas, rarius oblongas, miniatas, 2-rarius 3 spermas. *Hayne Dendr. Flor.* p. 42. distinguit hanc speciem potissimum pedunculis gracilioribus, pedicellis longioribus; *Link* vero race-

mis brevibus. In spec. nostris cult. spinae robustiores, subtus evidentius sulcatae; rami juniores purpurascens nec cinerei; folia minora, obsolete nervosa, subintegerrima; racemi patentes, vix penduli, breviores; pedicelli longiores gracilioresque; flores majores. *B. canadensis* hortorum plur. vero nil nisi *B. vulgaris*. In collibus fertilibus et inter rupes Americae borealis; in montibus Alleghanis; in Tennessee, ubi plerumque sempervirens. Nutt. h.

6. *B. chinensis* Desf.; spinis subtripartitis, raro subnullis; foliis oblongis, subobtusis, integris vel infimis subdentatis; racemis multifloris, nutantibus. Desfont. arb. II. p. 27. Duham. arb. ed. Mich. IV. p. 13. Decand. Syst. II. p. 8. *B. foliis lanceolato-obverse ovatis, submucronatis, parce dentatis; racemis axillaribus, suberectis.* Poir. dict. VIII. p. 617.

Frutex 3-4-ped.. Rami adulti sulcato-angulati, fusco-purpurei. Spinae basi complanatae, trinerves, lobis lateralibus subobsoletis, (in specimine nostro plerumque simplices, $\frac{2}{3}$ foliorum aequantes). Folia in spinarum axillis conferta, (3-4), basi in petiolum fere angustata, saepius mucronata, (1-) 2 poll., 4-5 lin. lata, in spontaneis adhuc angustiora, longiora, flavicanti-viridia. Racemi e foliorum fasciculis, his longiores, 15-20-flori, serius nutantes. Pedicelli longitudine fructus, longiores et graciliores, quam in *B. vulgaris*. Bracteolae ad basin pedicellorum (subinde etiam in pedicello) parvae, subulatae. Cal. basi bracteolis 2-3 parvis, caducis. Flores magnitudine *B. vulgaris*, sed intensius lutei, et petala basi glandulis 2 oblongis, tumidulis. Bacca ovalis, flavescenti-rubra, sicca atro-violacea, minor quam in *vulgaris*, 1-2-sperma. In China circa Pekin et Iehol: Lemonnier in Europa primus coluit. h.

7. *B. laurina* Thunb.; spinis ternis; foliis obovatis, mucronatis, integris; racemis simplicibus, multifloris, pendulis. Billberg Pl. bras. Dec. I. praes. Thunb. p. 8. Decand. Prodr. I. p. 107. Pao de Spintio. Lusit.

Frutex ramis ramulisque alternis, teretibus, flexuosis, glabris, erectis. Spinae ad basin ramulorum ramorumque inter folia ternae; intermedia longior, unguicularis. Folia e gemma singula terna, brevissime petiolata, obovata, (oblongaque), margine subrevoluto, coriacea, obsolete nervosa, glabra, subtus pallidiora, patulo-erecta, inaequalia, poll. ($1\frac{1}{2}$ poll., 3-6 lin. lata). Racemorum pedunculi ex axillis spinarum, inferne patentissimi, apice cernui, filiformes, glabri, digitales (24-27 lin.). Pedicelli capillares, unguiculares (3-4 lin.). Corollae flavicantes. Facies omnino *B. vulgaris*; at folia, ut in *B. cretica*, integerrima. Differt a *B. chinensi*: ramis flexuosis albis, foliis crassioribus, margine revolutis. Billb. Prope Villam Riccam Brasiliae. h.

8. *B. glaucescens* St. Hil.; spinis tripartitis; foliis obovato-oblongis, obtusis, mucronulatis, basi cuneatis, in petiolum attenuatis, integerrimis, glaucescentibus; racemis multifloris, pendulis; calycibus 8-phyllis; stylo ovario angustiore. St. Hil. Fl. Bras. merid. T. I. p. 46. t. 10.

Rami subflexuosi, basi subteretes, apice subangulosi, nitidi, subcinerei. Spinae 3-8 lin., patulae, nitidae, ex luteo fuscae; divisuris acutis, subtus canaliculatis, supra teretibus, intermediâ lon-

giore. Ramuli valde abbreviati; basi squamulis imbricatis, late ovatis, acutis, carinatis. Folia fasciculata, subsessilia, 9-18 lin., 4-7 lin. lata, a medio ad basin gradatim attenuata, glaberrima, nervo pallidiorè cincta; nervo medio utrinque prominulo: lateralibus paucis, parallelis. Stipulae membranaceae, subulatae. Racemi solitarii, simplices, cum pedunculo $1\frac{1}{2}$ -2 poll., glaberrimi; pedunculus curvatus, subangulosus; axis angulosa, striata; pedicelli 5 lin., bractea lineari, acuta, canaliculata, lin.. Flores magnitudine *B. vulgaris*, glaberrimi. Cal. valde inaequalis, submembranaceus, glaberrimus, luteus: foliolis subtriplici ordine: exterioribus 2 minoribus, oblongis, angustis, acutis, concavis, 1-3-nerviis; intermediis 4 oblongis, obtusis, 3-nerviis; 2-subsuperioribus majoribus ovato-oblongis vel orbiculari-ovatis, obtusissimis, 3-nerviis. Petala obovata, obtusissima, 3-nervia, lutea: glandulis 2 basi petalo adnatis, oblongo-linearibus, nervis lateralibus continuis. Stamina petalis basi subcoalita; filamenta brevissima; antherae subcordato-orbiculatae, apice truncatae. Stylus brevis, subcurvatus. Stigma late peltatum umbilicatum. Germen ovato-oblongum, 2-3-spermum; ovula oblonga, obtusa. *St. Hil.* A *B. laurina* diversa. In sylvulis provinciae Cisplinae, a finibus antiquis Lusitanicis usque ad urbem Maldonado. h.

9. *B. Chitria* Hamilt.; foliis lanceolatis obovato-oblongisve, mucronulatis, viridibus, membranaceis, setaceo-dentatis integerrimisve, basi attenuatis; racemis multifloris, nutantibus, folio longioribus; pedicellis (plerumque) trifidis, trifloris; bacis oblongis. *Don Prodr. Fl. nepal.* p. 204. *Bot. Reg.* 729. *B. angustifolia* Roxb. *hort. beng.* p. 87. (fid. *Don*). *B. aristata*; spinis simplicibus, basi vix bidentatis; fol. oblongis, dentibus 4-5, spinulosis, utrinque serratis; racem. patulis, multifloris. *Dec. Syst.* II. p. 8. *Hook. Exot. Fl.* 98. (excl. syn. *chinensis*). *Bot. Mag.* t. 2549.

Frutex (2ped.) spinis simplicibus tripartitisve. *Don.* Affinis *B. chinensi*. Rami teretes, sulcati, pallide grisei uti spinæ conicae. Folia fasciculata, (4-5), utrinque attenuata, vix petiolata, apice spinâ mucronata, integerrima vel utrinque dentibus 2-5, utrinque viridia, 15-16 lin., 5-6 lin. lata. Racemi foliis paulo longiores, 2-4 poll., patuli, racemis *B. vulgaris* satis similes. Pedunculi et pedicelli subtrigoni, hi subinde etiam uniflori. Bracteolæ minimæ, (rubrae) acutissimæ, subulatae. Flores duplo fere majores quam in *B. vulgaris*. Petala obtusa, flava. Stylus brevissimus, stigmatè orbiculari. *Decand.* et ad specim. spont. In *Nepal.* h.

10. **B. cretica*; spinis 3-5-partitis; foliis ovali-oblongis, integris subserratisve; racemis 2-8-floris, foliis fere brevioribus. *Decand. S. V.* II. p. 8. *B.* pedunculis subbifloris; foliis lanceolato-obovatis, integerrimis, submucronatis. *Willd. Spec.* II. p. 229. *Linn. Spec.* p. 472. *Desf. Arbr.* II. p. 27. *Duham Arb. et arb.* ed. n. T. IV. p. 14. *Murr. Com. gott.* 1784. *Sibth. Fl. graec.* t. 342. *Alpin Exot.* 21. t. 20. *B. pauciflora* *Salisb. Prodr.* p. 215. — β *serratifolia*; fol. ovatis, obtusis, dentato-ciliatis. *Poir. Enc.* VIII. p. 618. *Duham.* l. c.

Frutex fere 6-pedal., (ramosissimus). Rami subteretes, (o fusco

cinerascentes; ramuli geniculato-flexuosi). Spinae basi latae, (horizontaliter patentibus), lobis conicis, divergentibus, medio 5 lin., lateralibus 4. Folia in axillis 3-4, basi attenuata, obtusa, tenuia, (subtus obsolete nervosa), 6-8 lin., (in spec. nostris plerumque spinis breviora, 2-3 lin. lata), subtus subglaucescentia. Pedunculi patuli aut reclinati, subumbellati; (pedicelli teretes, glabri, filiformes, 2-4 lin., basi bracteolâ lanceolato-subulatâ, $\frac{1}{2}$ lin.). Flores vix minores quam in *B. vulgari*. Petala ovata, obtusa, concava, flavescentia, magis patentia quam in *B. vulgari*). Baccae ovatae, nigrae, 2-spermae, acerbae potius quam acidae, demum amarae. Stigma brevissime pedicellatum, rotundatum. *Dec. et ad specim. spont.* In specim. cultis rami erectiores, minus flexuosi, purpurei; spinae breviores, subreflexae; folia 5-7 in axillis, majora fere pollicis; racemi erectiusculi, foliis longiores, 6-10-flori; pedicelli longiores 5 fere lin.. Reliqua ut in spontaneis. *In montibus sphakioticis Cretae et passim in Archipelago. h.*

11. *B. crataegina Decand.*; spinis simplicibus; fol. oblongis, nervuloso-reticulatis, hinc inde vix subserratis; racemis multifloris, confertis, patulis, vix folio longioribus. *Decand. S. V. II. p. 9.*

Creticae et chinensi affinis. Rami teretes, fusco-purpurei, glabri. Spinae in ramo florente saltem simplices, patentibus, conico-subulatae, rigidae, 5-6 lin.. Folia in axillis, 4-7, fasciculata, mucronata, in petiolum angustata, pollicaria, 2-3 lin. lata. Racemi floribus 12-18 confertis, flavis, *vulgari* similibus. *Decand. In Asia minore. Cas. Rostan. h.*

12. *B. Thunbergiana Dec.*; spinis infimis tripartitis, superioribus simplicibus; fol. ovalibus, basi attenuatis, integerimis; racemis paucifloris, eorymbosis, folio brevioribus. *Dec. S. V. II. p. 9. B. cretica Thunb. Fl. jap. p. 146.*

Rami glabri, fusci, (purpurei) longitudinaliter striati, inferiores angulati. Spinae inferiores deflexae, superiores (horizontales) rigidae, basi saepe spinulis 2 stipuliformibus, brevissimis. Folia fasciculata, submucronulata, (patentia, unguicularia, glabra), obtusa. Pedunculi foliis breviores, pedicellis 3-4, filiformibus. Bracteae sub pedicellis acutissimae, minimae. Baccae stigmatate late orbiculato, sessili. *Dec. et Thunb. In Japonia. h.*

13. *B. glauca Humb. et Bonpl.*; spinis trifidis; foliis fasciculatis, obovato- aut oblongo-ellipticis, denticulato-spinosis, membranaceis, subtus glaucis; paniculis solitariis; floribus hexandris. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth. V. p. 71. t. 433. Dec. S. V. II. p. 10.*

Rami teretes, laeves, glabri, albidi. Fasciculi s. rami brevissimi, undique foliosi, sparsi, remoti, basi externe squamis s. petiolis foliorum abortivorum ovato-oblongis, fuscis, glabris, involutis. Folia apice rotundata, spinulâ terminata, basi cuneata, reticulato-venosa, glabra, supra laete viridia et nitida, 32-40 lin., 15-20 lin. lata. Petioli 8-9 lin., canaliculati, glabri, apice cum folio articulati. Paniculae e medio fasciculi prodeuntes, solitariae, pedunculatae, ramosae, erectae, adjecto pedunculo 5-6 poll. longae, bracteatae; ramis alternis, patulis, glabris; pedicellis soli-

tariis geminisve, 4-5 lin., pedunculoque 2-2½ poll. glabris; bracteâ ad ramorum pedicellorumque basim ovato-lanceolatâ, apice subulatâ, glabrâ. Flores cum pedicello articulati, vix duplo majores *BERB. vulgaris*. Cal. 8-9-phyllus: foliolis ellipticis aut orbiculato-ellipticis, obtusis, concavis, integerrimis, trinerviis, membranaceis, glabris, coloratis, corollâ vix longioribus; 2-3 exterioribus multo minoribus, ovatis aut ovato-oblongis, acutis. Cor. 6-petala, glabra, flava(?); petalis subrotundo-obovatis, obtusis, basi subunguiculatis, concavis, trinerviis, integerrimis, aequalibus, glandulis oblongis subdivergentibus. Stamina petalis duplo breviora. Filamenta antheris vix longiora, cum connexivo continua, nec articulata. Antherae ut in *conferta*. *Kunth. l. c.* *Prope S. Fe de Bogota, alt. 1370 hexap. h.*

14. *B. monosperma Ruiz et Pav.*; spinis tripartitis; foliis ovalibus obovatisve, mucronatis: inferioribus dentato-spinosis; racemis multifloris nutantibus. *Decand. S. V. II. p. 10. Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 52. Poir. Enc. VIII. p. 621.*

Frutex orgyalis, glaberrimus; caulis erectus, ramosus, teres; rami teneri, striati, purpurei. Aculei basi dilatata tricuspidati, cuspidibus spinosis: teneris erectis, senioribus curvatis. Folia 5-6 fasciculata, inaequalia, cartilaginea; superiora seniora tridentata, dentibus 3 spinosis; juniora mucronata, integerrima. Stipulae oppositae, subulatae. Racemi e centro foliorum. Flores alterni, lutei; bracteolâ lanceolatâ. Bacca nigra, monosperma. Semen orbiculatum. *Ruiz et Pav. In praeruptis Tarmae Peruviae. h.*

15. *B. latifolia Ruiz et Pav.*; spinis brevibus, tripartitis simplicibusve; foliis obovatis, integerrimis, mucronatis, subtus pallidis; pedunculis 3-6-floris, folio brevioribus. *Decand. S. V. II. p. 10. B. pedunculis 3-6-nis; floribus hexandris; fol. oblongo-obovatis, mucrone minimo; aculeis parvis, tricuspidatis. Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 52. t. 282. f. a. Poir. Enc. VIII. p. 621.*

Frutex 3-ulin., glaberrimus; truncus erectus, teres, ramosissimus, cinereo-fuscus; rami leviter flexuosi, cinerei. Aculei solitarii, 2-lin., basi trinerves, tribus cuspidibus spinosis, apice atris. Folia 3-6, fasciculata, inaequalia, coriacea, venoso-reticulata, supra nitidissima, 1½ poll., ½ poll. lata. Petioli 2-3 lin., supra plani, subtus convexi. Pedunculi 3-6, inaequales, 1-flori, foliis breviores. Bacca ovalis, stigmatate pedicellato rostrata, 3-4-sperma, atra. Semina obovata. *Ruiz et Pav. Folia obtusa vel mucronata. Pedunculi 3-6-flori; pedicelli 1-flori. Decand. In nemoribus altis frigidis Andium circa Pillao. h.*

16. *B. coriacea St. Hil.*; spinis parvulis, tripartitis, quandoque nullis; foliis breviter petiolatis, oblongis, angustis, obtusis, mucronulatis, gradatim attenuatis, coriaceis; racemis curvato-pendulis. *Aug. St. Hil. Fl. Bras. merid. T. I. p. 46.* Rami vix flexuosi, subangulosi, substriati, pallide cinerei. Spinae 2-3 lin., patulae vel erectae; divisuris semiteretibus, acutis, nitidis, infra planiusculis, supra convexis: quandoque nullae. Ramuli 3-5 lin., crassi, squamis triangulari-ovatis, acutis arcte imbricati. Folia 6-12 in fasciculo, 1½-2½ poll., integerrima,

margine vix revoluta, quandoque subrugosa, glaberrima; nervo medio confluentibusque lateralibus subtus prominentibus, supra saepe impressis. Petiolus 2-3 lin., subtus convexus, supra canaliculatus. Stipulae subtriangulares. Racemi (absque floribus fructibusque observati) pedunculati, curvato-penduli, simplices, bracteati, glabri. Pedunculus angulatus, striatus. Bractee lineari-subulatae, acutae, canaliculatae, glabrae, persistentes. Baccae, ut ajunt, parvulae, nigrescentes, acidulae, edules. Affinis videtur *B. rigidifoliae* Humb. et Bonpl. St. Hil. A clo Spreng. in Cur. post. p. 138 cum? synonymon dicitur *B. latifoliae*. Prope urbem Curitiba provinciae S. Pauli Brasiliae. h.

17. *B. flexuosa* Ruiz et Pav.; spinis tripartitis; foliis obovatis, glaucis, integerrimis, apice mucronulatis; racemis aggregatis, inaequalibus, paucifloris. *Decand. Syst. V. II. p. 11.* *B. racemis* etc.; fol. obov. inermibus; aculeis ternis coalitis longis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 52. t. 281. f. a.* *B. tortuosa* Dombey Herb. (fid. *Decand.*) β . *B. trispina* Domb. Herb. (fid. *Decand.*).

Frutex (1-2) orgyalis, glaber. Caulis erectus, ramosissimus, teres, cinereo-fuscus; rami flexuosi, striati, articulationibus incrassati, purpurascens, seniores cinerei. Aculei 3, basi corticosâ amplâ coaliti, subpoll., rigidi, subulati, horizontales, intermedio longiori. Folia plerumque 8, fasciculata, breviter petiolata, inaequalia, venosa; ad basin fasciculorum squamis plurimis imbricatis, ovatis, concavis, membranaceis, fulvescentibus. Racemi 2-6 e singulo fasciculo, inaequales, 2-14 flori, laxi, graciles, foliis longioribus breviores. Pedicelli sparsi, tenues, fere 3 lin., uniflori, bractea minimâ subulatâ. Flores dilute lutei. Calycis foliola obovata, concava, inaequalia. Petala obovata, concava. Bacca oblonga, stigmatate pedicellato terminata, nigra. Semina 4-5, obovata. *Ruiz et Pav.* Spinae magnae, 3-rarissime 5-partitae, lobis patentibus, subaequalibus. Folia spinis fere breviora, poll., 7-8 lin. lata, coriacea, petiolo 3 lin.. Pedicelli 2-3. Flores paulo majores quam in *B. vulgari*. β differt: fol. majoribus, magis glaucis, spinas duplo superantibus, obtusioribus vix mucronatis; racemis longioribus, multo laxioribus, erectis nec subcernuis; pedicellis longioribus. *Decand.* In rupibus calidis et aridis Andium circa Tarma, Pillao etc.; β circa Cheuchin. h.

18. *B. ruscifolia* Lam.; spinis tripartitis; foliis oblongis, basi attenuatis, mucronatis, integerrimis, aut (apice) hinc inde grosse dentato-spinosis; pedunculis brevibus, apice 4-5-floris. *Decand. Syst. II. p. 11.* *Lam. ill. t. 253. f. 2.* *Poiret Dict. VIII. p. 619.*

Rami teretes, cinerei, rigidi, flexuosi, subnodosi. Spinae basi dilatatae, lobis conico-subulatis, divaricatis, 3 lin. longis. Folia e nodulo axillari, coriacea, in petiolum brevem attenuata, pollicaria, 3-5 lin. lata, (nitentia, 3-4 in fasciculo). Pedunculi foliis breviores, patuli, subnutantes, apice pedicellis 4-5, unifloris, subcorymbosis. Flores paulo minores, quam in *B. vulgari*; (petala flava, calyce parum longiora). *Dec.* In America australi circa Buenos Ayres. *Commers. h.*

19. *B. spinulosa* *St. Hil.*; ramulis subcomplanatis, laevibus; spinis 3-partitis; foliis parce fasciculatis, breviter petiolatis, oblongis, inferne cuneato-attenuatis, remote dentato-spinulosis, basi integerrimis. *Aug. St. Hil. Flora Brasil. merid. T. I. p. 45.*

Frutex ramis flexuosis, apice praecipue subcomplanatis, glabris, nitidis, cinereo-lutescentibus. Spinae hinc et inde basi mucronatae (rudimenta stipularum); divisuris subaequalibus, 6-12 lin., patulis, acutis, teretibus, subtus canaliculatis, nitidis. Ramuli ex axillis spinarum saepius haud manifesti, fasciculum foliorum 3-6 gerentes, squamulis ovatis, acutis, medio dorso costatis obtecti. Folia 2-3 poll., 5-10 lin. lata, obtusa vel acuta, glabra; spinulis circiter 1-2 lin. longis, inaequalibus, distantibus, acutissimis, tenuibus, nervo medio utrinque prominente; lateralibus tenuibus, infra marginem confluentibus. Petiolus circiter 2-3 lin., subtus convexus, supra canaliculatus. Stipulae membranaceae, subtriangulares, vix manifestae. Flores? Fructus? Folia similia *B. orientali proceriori fructu nigro suavissimo. Tournef. St. Hil. A clo. Spreng. in Cur. post. cum?* ducitur ad *B. ruscifoliam Lam. In sylvis prope urbem Curitiba provinciae S. Pauli Brasiliae. h.*

20. *B. paniculata* *Juss.*; spinis brevibus, trifidis; foliis lanceolatis, mucronatis, integerrimis, aut hinc inde spinuloso-dentatis; pedunculis angulatis, erectis, racemoso-paniculatis. *Decand. S. V. II. p. 12. Juss. ined.*

Rami teretes, glabri. Petioli nunc producti in spinam tripartitam, brevem, lobis subaequalibus, nunc reducti ad basin dilatatam, trinervem, ovatam, duram. Folia axillaria conferta, aut in ramulis subsparsa, dura, rigida, glabra, nervulis minimis anastomosantibus, 1-poll., 5-9 lin. lata. Ramuli floriferi, apice racemoso-paniculati. Bractae lineari-subulatae, pedicellis dimidio breviores. Cal. basi tribracteatus. *Dec. In Peruvia. h.*

21. *B. ilicifolia*; spinis tripartitis; foliis ovalibus, basi attenuatis, hinc inde grosse dentato-spinosis; pedunculis brevibus 4-floris; pedicellis elongatis, subcorymbosis; baccis ovatis, lagenaeformibus. *Decand. S. V. II. p. 12. B. racemis simplicibus, corymbosis; foliis obovatis, coriaceis, spinoso-dentatis; pedunculis elongatis, cymosis; spinis palmatis. Linn. Suppl. 210. Forst. Com. Goett. IX. p. 28. Willd. Spec. II. p. 228. Molina Saggio d. Chili p. 285. B. lagenaria. Poir. Enc. VIII. p. 619.*

Folia ut in *Ilice rigida*, obovata, brevissime petiolata, basi integerrima, versus medium serraturis utrinque 2 s. 3, spinis terminatis, uti apex folii, glaberrima, subtus glauciora. Stipulae palmatae. Racemi terminales, brevissimi; at pedicelli valde elongati. Lignum elasticum incolis ad arcus. *Linn. fil. Rami angulati, sulcati. Spinae lobis conicis, subaequalibus, interdum nullae. Folia in axillis spinarum conferta, 3-4, glaberrima, subtus vix pallidiora, nitida, utrinque spinis 1-3, 1-2 poll., 8-9 lin. lata. Pedunculi axillares brevissimi, vix 3 lin. Bractae ovali-oblongae. Flores ut in B. buxifolia, pallide flavescentes: quidam a Comerson lecti 8-andri, 8-petali. Dec. In rupibus Terrae del Fuego, et in Bay de Bougainville. h.*

Obs. Planta a *Forster* lecta et descripta quidquam abluere, et cum *Comersoni* magis planta convenire videtur. Frutex $\frac{1}{2}$ -1 org., ramis patenti-flor.

xuosis, teretibus, cinereis, cicatricibus numerosis confertis. Spinae extraaxillares, extrorsum infra basin quorundam ramulorum aut etiam foliorum, plerumque trifurcatae, horizontales, divaricatae, glabrae, luteae, furcis lateralibus extus interdum spinulam exserentibus, 3-lin. - $\frac{1}{2}$ poll. Folia alterna, remota, in ramis junioribus sparsa, conferta, obovata, acuta, dentibus 3-4 utrinque apiceque spinuloso-mucronatis, rigidiuscula, supra venosa, glabra, subtus sordide viridi-alba, patentia, poll. - $1\frac{1}{2}$ poll. ($\frac{1}{2}$ -poll. lata). Cymae axillares et rameae, e foliorum cicatricibus corymbosae, subnutantes. Pedunculus comm. brevis; partiales filiformes, laeves, laxiores, 1-flori. Bractee ovato-lanceolatae, acutae, minutae. Flores aurantii, quidquam majores quam in *B. vulgaris*. Calycis foliola ovata, concava, aurantia, alterna minora ovato-oblonga. Petala orbiculata, concava, calyce paulo majora, erecta. Glandulae 2 ovatae, depressae. Filamenta linearicompressa, flava, corollâ paulo breviora. Antherae 2 semi-ellipticae singulo filamento utrinque adnatae. Germen ovatum apice cylindricum, basi angustatum, longitudine staminum. Stylus 0. Stigma orbiculatum, supra planum, puncto perforatum, germine latius. Bacca ovato-oblonga, basi coarctata, apice attenuata, seu lagenaeformis. Sem. 6 nidulantia. *Forst.*

22. *B. asiatica Roxb.*; spinis trifidis simplicibusve; foliis ovalibus, mucronatis, integerrimis aut spinoso-dentatis; racemis brevibus, multifloris; pedicellis elongatis; baccis subglobosis. *Decand. S. V. II. p. 15. Roxb. ined.* *B. fol. cuneatis ellipticisve, glaucis, dentato-spinosis, coriaceis, utrinque valde reticulatis, sublacunosis; racemis corymbosis, folio brevioribus; pedicellis 1-floris; baccis ovalibus. Don Prodr. Fl. Nepal. p. 204.* *B. ilicifolia Roxb. asiat. Research. VI. p. 357. Deless. icon. select. II. t. 1.*

Formâ foliorum accedit ad *B. ilicifoliam*; sed certo ab hac diversa. Rami teretes, pallidi. Spinae rarius nullae; si tripartitae, lobis conicis, pallidis, 5 lin.. Folia coriacea, glabra, superne reticulatim nervosa, subtus albido-glauca, 1-3 poll., 6-12 lin. lata, dentibus utrinque 1-4, magnis. Racemi longitudine folii, aut eodem breviores, nunc racemosi, nunc ex basi subcorymbosi. Pedicelli filiformes, 6-7 lin., ex ipsa racemi basi. Flores magnitudine circiter *B. vulgaris*. Stylus crassus, brevissimus. Baccae maturae nigrae. Semina 1-2 ovalia, subcompressa. *Dec.* Lignum intense flavum. *In Ind. orient. Roxb., in Nepal. Wall. h.*

23. *B. rigidifolia Humb. et Bonpl.*; spinis trifidis; foliis fasciculatis, oblongis, integerrimis aut apice (1-2) dentato-spinosis, coriaceis; racemis solitariis (paucifloris); floribus subpentandris. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth V. p. 70. t. 431. Decand. S. V. II. p. 15.* *B. discolor; racemis pendulis; fol. ellipticis, coriaceis, mucronatis vel obsolete dentatis supra nitidis, subtus discoloribus. Reliqu. Willd. Ms.?*

Rami sparsi, teretes, rimosi, glabri, nitidi, nigrofusci; ramuli fusco-purpurascens, subverrucosi. Spinae sub fasculis iisque multo breviores, glabrae, laciniis subulatis divergentibus, (2-3 lin.). Folia 10-15 in fasciculis sparsis et approximatis, apice acuto-spinosa, basi cuneata, reticulato-venosa, glabra, supra laete viridia et nitida, subtus pallidiora et subglauescentia, 11-13 lin., 4-5 lin. lata. Petioli 1-2 lin., canaliculati, glabri. Squamae creberrimae, basin fasciculorum cingentes, arcte imbricatae, ovato-triangularis, purpureo-ferrugineae, glabrae, petiolo breviores. Racemi in medio fasciculorum solitarii, (3-7-flori), pedunculati, erecti (?) 1- $1\frac{1}{2}$ poll. Flores sparsi, magnitudine *BERB. vulgaris*; pedicelli 3 lin., basi bractea instructi rhaehique glabri; bracteis lanceolato-subulatis, glabris, pedicello 3-4-plo brevioribus. Cal.

sub-7-phyllus, coloratus, glaber, foliolis elliptico-orbiculatis, concavis, membranaceis; uno duobusve exterioribus (bracteis) multo minoribus, ovatis, acuminatis. Cor. flava, glabra; petala 5 (semper?) calyce breviora, suborbiculata, breviter unguiculata. Stam. corollâ breviora, ut in *conferta*, nisi minora. *B. ilicifoliae* similis. *Kunth l. c.* (Affinem *luteae* dicit *Decand.*). Cum *conferta*. †.

24. *B. quinduensis Humb. et Bonpl.*; ramis inermibus; foliis approximato-confertis, oblongis, superne remote ciliato-(3-7) spinosis, coriaceis; racemis solitariis (erectis, pubescentibus, multifloris); floribus hexandris (?). *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth. V. p. 70. t. 432. Decand. S. V. II. p. 13. B. nitida*; racemis terminalibus, erectis; fol. obovatis, coriaceis, nitidis, mucronato-denticulatis. *Reliq. Willd. Ms.*

Rami subteretes, laeves, glabri, albidi; ramuli abbreviati, basibus foliorum undique arctissime obtecti, terminati fasciculo foliorum. Folia sparsa, petiolata, apice rotundata aut acute pungentia, basi cuneata, reticulato-venosa, glabra, supra nitida et laete viridia, subtus pallidiora, 2 poll. et parum ultra, 9-11 lin. lata. Petioli 3-4 lin., canaliculati, supra medium articulati, parte inferiore membranaceo-dilatata (stipulae 2 petiolo longitudinaliter adnatae). Racemi in ramulis terminales, solitarii, pedunculati, erecti, adjecto pedunculo 4 fere poll. Flores sparsi, triplo majores quam in *BERB. vulgari*. Pedicelli 4-5 lin., teretes, basi bracteati, rhachisque dense fuligineo-hirta; bractea lanceolato-subulata, concava, glabriuscula, pedicello duplo triplove brevior. Cal. glabriusculus, coloratus; foliolis (6?) suborbiculatis, concavis. Cor. flava, glabra; petalis obovatis, trinerviis; glandulis angustis, adnatis. Antherae cum filamento continuae. Stylus brevissimus, crassus. *Illicifoliae* affinis. *Kunth. In monte Quindiu regn. nov. Granat.* †.

25. *B. africana Hebenstr. et Ludw.*; ramis inermibus; racemis axillaribus, basi bracteatis; foliis obovato-spathulatis, carnosis, incanis. *Reichenbach in litt.*

Truncus spinosus. Rami inermes, ceterum similes *B. vulgari*. Folia pollicaria, in petiolum attenuata, apice fere praemorsa, 3 lin. lata. Racemi foliis fere duplo longiores, subpaniculati, pedicellis aliis simplicibus, aliis bifloris. Flores duplo minores quam in *vulgari*, ceterum iisdem similes; sed petala alba, cochleata. Germen incanum, stigmatate purpureo. *Reichenb. ex Herb. Hebenstr. et Ludw.*, (qui in *Decand. S. V.* non occurrere eandem.) *In Africa.* †.

26. *B. tinctoria Lechen.*; racemis simplicibus, pendulis; foliis subspathulatis, spinoso-dentatis, subtus glaucis. *Lechenault Mém. d. Mus. IX. p. 306.*

Frutex 6-20 ped., trunco 3-4 poll. in diametro; cortex subsuberosus, cinereo-lutescens, rimosus; lignum luteum, amarum. *Lechen. In montibus Nellygery peninsulae Indiae.* †.

β. *Pedicellis unifloris:*

27. *B. Wallichiana Dec.*; spinis tripartitis; foliis oblongis, utrinque acuminatis, glaberrimis, rigidis, ciliato-serratis; pedicellis 1-floris, 10-15 aggregatis. *Decand. Prod. I. P. 107. B. fol. elliptico-oblongis, mucronatis, coriaceis, spi-*

nuloso-serrulatis, utrinque planis, nitidis, viridibus; pedunculis clavatis, unifloris, aggregatis; baccis ovalibus. *Don Prodr. Fl. nepal.* p. 204.

In Nepal. Wallich. t.

28. *B. sibirica* *Pall.*; spinis 3-7-partitis; foliis lanceolato-obovatis, ciliato-dentatis; pedunculis unifloris, solitariis, folio brevioribus. *Decand. S. Veg.* II. p. 17. *Pall. iter.* II. *App.* n. 108. t. P. f. 2. *Fl. ross.* II. p. 41. t. 67. *Murray Comm. Gott.* 1784. t. 6. *Willd. Spec.* II. p. 229. *Enum. h. Berol.* p. 395. *Wild. Baumz.* ed. 2. p. 55. *Desf. Arbr.* II. p. 28. *Duham. Arb. et Arb. ed. n.* T. IV. p. 14. *Bot. Reg.* 487. *Guimp. Ab- bild. fr. Holzart.* p. 80. t. 65. *B. altaica* *Pall. ross.* II. p. 41. t. 67. (in icone).

Fruticulus spitham. vel pedalis, raro major, nunquam 1½ ped. altior, crassitie vix digiti minoris, rigidus, alterne ramosus, erectus, ligno citrino, cortice extus griseo-striato, intus flavissimo; sub singulò ramulo vel gemma spina palmato-ramosa, 5-fida, 3-4-fida, in ramos divaricatos, striatos, setaceos, rigidos divisa. Folia e gemmis vel spinarum alis fasciculata, oblonga, dentibus setaceis distantibus ciliata; in plantis e semine educatis folia longe petiolata, suborbiculata, ciliata. Pedunculus inter folia nudus, cernuus. Flores subglobosi, majores quam in *B. vulgari*. Calyx exterior virescenti-flavus, interior corollà major et latior, coloratus. Cor. intensius flava. Baccæ cernuae, majores et magis ovatae quam in *B. vulgari*, stigmatate fungiformi umbilicatae, ruberrimae, grate acidae. Semina 5, oblonga, hinc compressa, grisea, acerba. *Pall.* Culta spithamaea bipedalisve, diffusa, glabra; rami cinerei, teretiusculi, nodosi. Spinae basi latissimà, plerumque 3-5-subinde 7-9-fidae. Folia 4-6 lin., 2-3 lin. lata, ovalia vel obovato-cuneata, utrinque dentibus 3-7. Pedunculi 1-2, patuli, 2-5 lin. Flores similes *B. vulgari*, sed majores, calycibus petalisque magis patentibus. Baccæ obovatae. *In saxosis rupestribus Sibiriae altaicae et Davuriae.* t.

Obs. *Cels. Agardh* in litt. ad div. *Römer* monuit in *Herb. Retzii* specimina *B. altaicae* *Laxmann.* prostare, quae *B. sibiricae* simillima quidem, sed tamen diversa videntur; distinguit ergo *B. sibiricam* *Pall.* pedunculis unifloris solitariis; foliis lineari-cuneatis, parce ciliatis, secundariis integerrimis, a *B. altaica* *Laxm.*; pedunc. unifloris, foliis obovatis, dentibus ciliatis: ciliis divaricatis, in qua folia praeterea majora, latiora, magis regulariter ciliata. Specimen tamen nostrum *B. altaicae* *Laxm.*, a clo. *Agardh* benigne communicatum, adeo paucis a speciminibus *B. sibiricae* tam spontaneis quam cultis ablutit, ut vix differentiam specificam invenire possimus. Etiam *B. altaicae* *hort. plur.* nobis vix a *B. sibirica* differre videtur.

29. *B. actinacantha* *Martius*; spinis palmato-5-fidis, margine revolutis; foliis ovatis ellipticisve, brevissime petiolatis, basi vix attenuatis, rigidis, spinoso-dentatis mucronatis; junioribus integerrimis; pedunculis 4-5, subumbellatis, foliis brevioribus, subcernuis; germinibus ovatis, apice vix attenuatis.

Proxima *B. ilicifoliae*; sed spinis, inflorescentiâ germinibusque diversa. Frutex ramis numerosis, patentibus, subflexuosis, nodosis, teretibus vel obtuse angulatis; cortice in vetustioribus cinereo rimoso, in junioribus purpurascenti-fusco, glabro. Spinae semper fere 5-fidae, palmatae, rarissime 3-fidae, recurvae, patententes, conicae, marginibus revolutis, pallide fusciscentes, sub-

tus nervo medio percursae; mediae 5-8 lin., extimae minores. Folia in ramulis brevissimis, e spinarum axillis orientibus, conferta, erecto-patentia vel reflexa, subinde fere obovata, spinose acuta et obtusiuscula, utroque margine dentibus 2-4 inaequalibus, spinosis, fuscescentibus, undique patentibus; juniora plerumque integerrima, rigida, coriacea, glabra, reticulato-nervosa, praesertim subtus, 6-12 lin. longa, $\frac{1}{2}$ poll. lata, juniora multo minora, subtus pallidiora. Petioli breves, $\frac{1}{2}$ -1 lin., supra obsolete canaliculati, basi incrassati et dilatati. Pedunculi 4, rarius 3-5, ex apicibus ramulorum, basi erecti, apice cernui, vel omnino cernui, teretes, glabri, uniflori, 3-5 lin. longi. Flores intense lutei, paulo majores quam in *B. vulgari*. Cal. foliola ovata, obtusa, concava, intensius colorata, petalis breviora, alterna paulo angustiora. Petala subrotundo-ovata, basi quidquam angustata, apice obtuso, concava, $1\frac{1}{2}$ lin.; nervis 3 in siccis intensioribus. Glandulae rotundato-ovatae. Filamenta linearia, corollâ breviora. Antherae apice appendicibus 2 ovato-ellipticis, obtusis, flavis. Stylus 0. Stigma sessile, orbiculatum, planum, latitudine fere geminis. Germen ovatum, apice basique vix angustatum, longitudine staminum, glabrum. *Ad specimen in Herb. cli de Martius in Chili ad Baths of Collina lectum.* †.

30. *B. buxifolia* Lam.; spinis tripartitis; foliis ovatis et ovato-lanceolatis, glabris, integerrimis; pedicellis folio longioribus aut solitariis, unifloris aut ternis e pedunculo brevissimo. *Decand. S. V. II. p. 15.* *B. pedicellis 1-floris, fol. ovatis etc. Lam. ill. t. 253. f. 3.* *Poir. Enc. VIII. p. 619.* *B. minor Forst. in Herb. Mus. Paris.* β . *B. microphylla* Forst.; pedunculis trifloris; fol. obovatis, integerrimis, submucronatis. *Forst. Comm. Gott. IX. p. 29.* *Willd. Spec. II. p. 228.* *Poir. Enc. l. c. p. 622.* *Molina Sagg. d. Chili. p. 285.*

Specimina *Forsteriana* non differre a *Commersonianis*, licet pedicelli florum numero diversi, ut itaque haec species transitum efficiat inter BERBERIDES pedunculis multifloris et unifloris: *Decand. l. c.*, qui hanc speciem describit fruticem parvum, tortum; spinas horizontales, flavidas, 2 lateralibus ad angulum rectum ab intermedia divaricatis; folia secundaria in axillis conferta, subsessilia, obtusiuscula aut saepe ad apicem mucronata, rarissime apice tridentata, plana, viridia, subtus pallidiora, formâ et magnitudine Buxi. Pedunculus in β brevissimus, pedicellis 3 unifloris, gracilibus, folio longioribus; in α nullus, pedicello solitario, unifloro. Flores majores, quam in *B. vulgari*, minores quam in *inermi*, cui affinis. Baccæ ovato-globosae, e purpureo-caerulescentes, 4-spermae, stigmatate sessili. β frutex parvus, tortus, spinis ad basin ramorum foliorumque horizontalibus, trifurcatis, glaberrimis, luteis, 2 lateralibus ad angulum rectum ab intermedia patentibus. Folia subsessilia, obovata, basi angustata, integerrima, rarius apice spinulâ mucronata, fasciculata in apicibus ramulorum vel e spinarum axillis, laevia, viridia, subtus pallidiora, tenuia, vix $\frac{1}{2}$ unc.; axillae spinarum semper foliolis 3 onustae, quorum intermedium minus. Pedunculus brevissimus in apice ramulorum; partiales 3, 1-flori, longitudine fere foliorum. Flores aurantii, triplo minores quam in *B. ilicifolia*. Calycis foliola subrotunda, concava, colorata, 3 exteriora minora. Petala orbiculata, calycis foliolis interioribus minora. Glandulae 2 oblongae.

Filamenta 6 brevia. Germen lagenaeforme longitudine staminum. Bacca 4-5-sperma. *Forst.* In Terra del Fuego, ad fretum magellanicum, in fundo sinus Boucaut. *h.*

31. *B. empetrifolia* Lam.; spinis tripartitis; foliis linearibus, integerrimis, margine revolutis; pedicellis 1-2, unifloris. *Decand. S. V. II. p. 16.* Lam. *ill. t. 253. f. 4.* Poir. *Enc. VIII. p. 621.* Molina *Sagg. d. Chili. p. 285.* *B. revoluta* Smith *Herb.* (fid. *Dec.*)

Rami graciles, virgati, teretes, epidermide griseâ, glabrâ. Spinae basi brevissimâ, dilatâtâ subamplexicaules, breves, lobis divergentibus, conico-subulatis, acutissimis, subtus canaliculatis, (multo brevioribus). Ramuli brevissimi. Folia plurima, fasciculata, glaberrima, mucronata, 3-6 lin., 1-1½ lin. lata. Pedicelli 4-5 lin., graciles, saepe deflexi. Flores 4-5 lin. in diametro. Petala calyce breviora, (longiora *Poir.*), obovata, (albida vel flavicantia) obtusa. *Decand.* In sylvis subalpinis Freti Magellanici. *h.*

32. *B. cuneata* Banks; spinis tripartitis folio fere longioribus; foliis obovato-cuneatis, spinoso-trifidis, glabris; pedicellis solitariis, unifloris, folio subaequalibus. *Decand. S. V. II. p. 16.*

Affinis *heterophyllae*, nec fors satis diversa. (*Clo. Sprengel S. V. II. p. 120.* eadem cum *heterophylla*). Rami adulti teretes, subgrisei, juniores angulati, subflexuosi, glaberrimi. Spinae basi vix dilatatae, lobis divaricatis rectis, rigidis, 6-8 lin., subtus canaliculatis. Folia congesta, 3-5, sessilia, apice acuminata, mucrone spinoso, utrinque lobulo divaricato, spinescente, coriacea, 5-6 lin.. Flos magnitudine *B. vulgaris*. Bacca obovata, subglobosa, caeruleo-purpurea, pruinâ caesia, stigmatate sessili. *Decand.* In America australi, in Puerto deseado. *Herb. Banks. h.*

33. *B. heterophylla* Juss.; spinis tripartitis; foliis ovato-lanceolatis, glabris: aliis integris, aliis tridentato-pungentibus; pedicellis solitariis, 1-floris, folio vix longioribus. *Decand. S. V. II. p. 17.* Poir. *Enc. VIII. p. 622.* Hooker *Fl. exot. t. 14.* *B. tricuspidata* Smith *Herb.* (fid. *Dec.*) *B. ilicifolia* Hortul.

Affinis *B. ruscifoliae*. Caules (3 ped.) subangulosi, glabri, lucidi. Spinae lobis rectis, subaequalibus, flavidis. Folia fasciculata, subsessilia, dura, coriacea, 5-4 lin., margine callosa, apice spinulâ aut dentibus 2-3. Pedicelli folio vix longiores. Baccae rotundatae, purpureae, subcaerulescentes, magnitudine pisi, 4-spermae, stigmatate sessili. *Decand. l. c.* Bractae ad basin calycis nullae. Flores aurantii, magnitudine pisi. Filamenta dente utrinque sub anthera. Stylus vix ullus. *Hook.* Ad fretum Magellanicum. *Commers. h.*

34. *B. virgata* R. et Pav.; spinis minimis nullisve; foliis obovatis, integris aut apice spinoso-dentatis, glabris; pedicellis solitariis, 1-floris, foliorum longitudine. *Decand. S. V. II. p. 17.* *B. floribus subternis, pentandris; fol. parvis, obovato-cuneiformibus, mucronatis; aculeis tricuspидatis, parvis.* Ruiz. et Pav. *Fl. peruv. III. p. 51. t. 281. f. b.*

Frutex biorgyalis, glaberrimus. Caules plures, erecti, teretes, fus-

co-cinerei, ramosissimi, ligno albido. Rami sparsi, virgati, longissimi, subangulati, graciles, lenti, purpureo-castanei. Aculeus unicus sub singulo puncto gemmaceo, tricuspidatus, brevis, basi lineari, planâ, coriaceâ. Folia 4-14 in fasciculo, squamis plurimis imbricatis, ovatis, concavis, rubescentibus cincta, inaequalia, plerumque 3 lin., 1½ lin. lata, subsessilia, integerrima, plana, coriacea, utrinque valde venosa, mucronata; rarius dentibus 3-5-7. Pedunculi plerumque 3, aliquando 2-4, breves, uniflori, graciles, inferne attenuati. Flores cernui, lutei. Calycis foliola 5 subrotundo-obovata, concava, subaequalia, lutea. Petala 5 obovata, concava, calyce duplo longiora, ad basin prominentiis 2 longis. Antherae luteae. Bacca ovali-oblonga, parva, stigmatate coronata, 2-sperma. Semina obovata, fusca. *Ruiz et Pav.* Spinae, si adsunt, simplices et trifidae; lobis lateralibus brevibus, terminali 2 lin.. Folia 3-6 lin., 1-2 lin. lata. Pedicelli patuli, nudi. Germen ovatum. Stigma crassum. *Decand.* In sylvis Andium Peruviae ad Huassahuassi, Pillao et Huariaca; circa Talma. Domb. h.

35. *B. tomentosa* *Ruiz et Pav.*; spinis nullis; foliis ovalibus, subtus dense breviterque tomentosis, integerrimis aut dentibus paucis spinosis; pedicellis 1-3, unifloris, gracilibus. *Decand. S. V. II. p. 14.* *B. pedunculis ternis, unifloris, inaequalibus; fol. ovalibus, dentato-spinosis mucronatisque.* *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 52. t. 282. f. b.* *Molina Sagg. d. Chili. p. 285.*

Frutex 2-org.; caulis erectus, teres, valde ramosus; rami virgati, angulati, rubescentes, glabri, nitidi. Folia alterna, plerumque fasciculata, terna, inaequalia, supra nitida, subtus tomentosa, albedo-helvola, integerrima; majora tricuspidata dentato-spinosaque, plerumque poll. et ultra, fere poll. lata. Petioli 2 lin., subtus trinerves, inferne sensim latiores. Gemmae squamis plurimis imbricatis, ovatis, mucronatis. Pedunculi terni e singulis gemmis, inaequales, nutantes, teretes, superne crassiores, tertio longiori pollicari et ultra. Flores hexandri, lutei, ante expansionem magnitudine Pisi. Calycis foliola ovata, concava, petalis dimidio breviora. Petala ovali-oblonga, concava. Baccae ovaes, stigmatate pedicellato rostratae, 2-3-spermae. *Ruiz et Pav.* Folia primordialis non abortientia, in axillis 2-3 secundaria foventia, coriacea, ½-1 poll., 3-7 lin. lata. Petioli medio articulati, superne subteretes. Flores magnitudine circiter *B. vulgaris.* *Dec.* In Peruvia circa Conception et Coliumo. h.

36. *B. lutea* *Ruiz et Pav.*; pedunculis pluribus, aggregatis, unifloris; foliis obovatis, mucronatis subtricuspidatisque. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 51. t. 280.* *Poir. Enc. VIII. p. 620.* *B. spinis nullis; fol. etc.; ramulis subpubescentibus; pedicellis pluribus 1 floris, folio subbrevioribus.* *Decand. S. V. II. p. 14.* (qui sequentem hujus β dixit, serius vero in *Prodr. I. p. 107.* distinctam esse jussit speciem. *Spreng. S. V. II. p. 120.* utramque sine dubio junxit.)

Frutex sub 3-orgyalis, glaberrimus. Caulis solitarius, erectus, subintortus, teres, inermis, brachii et ultra crassitie; cortice cinereo-lutescente, rimoso; ligno luteo, amaro. Rami conferti, diva-

ricati, subdependentes, similes; teneriores angulati, dilute purpurei, aliquando glauci, tenerrimi, aut gemmae explicatae squamis imbricatis, ovatis, concavis, membranaceis, rubescentibus basi cinctae. Spinae nullae. Folia 5-12 in fasciculo, patentia, inaequalia, saepe oblonga, supra nitidissima, coriacea, aliquando 2-4-5-mucronata, venosa. Petioli breves basi trinervi latâ membranaceâ. Pedunculi 5-12 e centro foliorum, aggregati, uniflori, purpurei, foliorum vix longitudine, compressiusculi, utrinque sulcati. Flores cernui, 6-andri; plures pentapetalos pentandros offendimus. Calycis foliola obovata, concava, extima incarnato-lutea, interiora lutea. Petala lutea calyce duplo majora. Nectarium: prominentiae 2 oblongae, luteae, interius ultra basin singuli petali adnatae. Bacca purpureo-nigra, subglaucâ, ovata. Semina oblongo-obovata, atra, plerumque 2, rarius 3-4; in germine rudimenta seminum 6. *Ruiz et Pav.* In frigidis rupestribus *Andium Peruviae.* h.

37. *B. conferta* *Humb. et Bonpl.*; ramis inermibus; foliis fasciculatis, obovato-oblongis, dentato-spinosis, coriaceis; pedunculis unifloris, solitariis geminisve; floribus pentandris. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth V. p. 69. t. 430.* *B. rigida*; pedunculis unifloris; fol. obovatis, rigidis, nitidis, mucronato-dentatis. *Reliqu. Willd. MS.* *B. lutea* β . *Decand. S. V. II. p. 14.*

Frutex ramosissimus, ramis sparsis, confertis, teretibus, laevibus, cinerascentibus, glabris; ramulis hirtellis. Folia 5-6 in fasciculis sparsis, approximatis, basi cuneata et integerrima, obsolete reticulato-venosa, glabra, nitida, concoloria, adjecto petiolo 7-8 lin., 3-3½ lin. lata. Petioli 1-1½ lin., semiteretes, tenuissime hirtelli. Squamulae fasciculos florum cingentes, crebrae, imbricatae, abbreviato-ovatae, subtriangulares, subacuminatae, integerrimae, purpureo-ferrugineae, glabrae, petiolo parum breviores. Flores in medio fasciculi foliorum cum pedunculo articulati, paulo majores quam in *BERB. vulgari*, foetidi; pedunculi 2-3 lin., teretes, tenuissime hirtelli. Cal. foliolis 5-8, subrotundo-ellipticis, obtusis, integerrimis, concavis, glabris, membranaceis, flavescentibus, rubro-nervosis, margine diaphanis, inaequalibus, deciduis; 2 exterioribus (bracteis?) minoribus. Cor. flava, calycem subaequans, decidua; petala foliolis calycinis opposita, obovato-orbiculata, basi subunguiculata, integerrima, concava, venosa, glabra, aequalia; glandulis oblongis carnosis. Stamina petalis dimidio breviora, pistillum aequantia. Antherae biloculares, loculi connexivo intus adnati, operculo tenuissimo membranaceo. *Kunth l. c.* In frigidis *Caxamarcam inter et pagum Magdalenae.* h.

38. *B. inermis* *Pers.*; spinis nullis; foliis ellipticis, integerrimis, vix mucronulatis, glabris; pedicellis solitariis, unifloris, folio longioribus. *Decand. S. V. II. p. 15.* *Pers. Enchir. I. p. 387.* *Pairet. Enc. VIII. p. 622.* *Molina Sagg. d. Chili. p. 285.*

Rami teretes, glabri, rigidi, petiolis foliorum primordialium abortivis, squamiformibus, obtusis. Folia secundaria in axillis 3-6 conferta, stipulis gemmaceis fusco-rufis, ovatis, brevibus, subtus subpallidiora, 6-9 lin., 4 lin. lata. Pedicelli patentes, pollicares. Flo-

Flores flavi 7-8 lin. in diametro. Calycis foliola ampla. Petala ovalia, oblonga. Germen ovatum, stigmatē coronatum. *Decand. In alpihus Commersonianis ad sin. Bougainville in freto Magell. h.*

b. *Foliis pinnatis; staminibus plerumque dentatis.*

MAHONIAE Dec.

39. *B. fascicularis*; foliis 4-5 jugis cum impari; jugo inferiore ad basin petioli approximato; foliolis ovato-lanceolatis, repando-dentatis: dentibus utrinque 4-6; racemis erectis, confertissimis. *Decand. S. V. II. p. 19.* (sub MAHONIA, et hoc teste): *BERBERIS pinnata Lag. Elench. H. Madr. 1805. p. 6. 1816. p. 14. Bot. Reg. t. 702. B. fasciculata Bot. Mag. t. 2396. Deless. ic. select. 2. t. 5. Lindl. Trans. Hort. Soc. T. VI. p. 66.*

Frutex circiter orgyalis, ramosissimus, glaber: rami teretes. Petioli teretes, 4 poll., basi dilatati, membranacei, semiamplexicaules, utrinque unidentati. Foliola duo inferiora a petioli basi vix distantia, a sequentibus intervallo longiusculo separata, sessilia, basi quasi truncata, sinubus obtusis, dentibus utrinque 4-6 spinosis, apice acuminata, spinosa, nervis anastomosantibus subtus prominulis, viridi-glaucā, coriacea, 1½ poll., 6-8 lin. lata. Racemi ex apice ramorum corymbosi, basi squamulis gemmae floralis. Bractee membranaceae, parvae, latiusculae, apice acutae ad basin pedicellorum; bracteolae 2-3 secus pedicellum. Calycis foliola 3 exteriora subrotunda, interiora 3 obovato-oblonga, longiora, superantia petala emarginata. Filamenta utrinque dento recurvato paulo infra antheram. Bacca ovata, fere subglobosa, stigmatē orbiculato, vix pedicellato, magnitudine *RIBESII nigri*, atro-violacea, 3-sperma, grata. *In Americae boreal. orā occidentali, circa Monterey et Nutka. h.*

Obs. Cls *Decandolle*, qui l. c. etiam locum natalem: *Moran Mexic.*, suae *fasciculari* addit, in *Prodr.* p. 108 laudat sequentem *moranensem* s. *pinnatam* H. et H., et adjicit in observatione: „iconem *Fl. mexicanae* a planta in hort. hispanicis culta differre racemis paucioribus (2-3) pendulis, nec erectis; foliolis paulo magis approximatis, et baccis lagenae more apice attenuatis. An propria species?“ Sic videtur, saltem ex descriptione sequentis. In specim. nostris ex horto matritensi petioli non teretes, sed superne plani et basin versus fere triquetri, 3-5-poll., ad foliorum insertiones articulati et incrassati. Foliola basi plerumque inaequalia, nervo medio subtus valde prominente, 1-1½ poll. Racemi numerosissimi in apicibus ramorum, rariores vel solitarii saepius e foliorum axillis, 2-3-poll., multiflori. Pedunculi communes compressi; pedicelli teretes, erecti vel curvati, 2-5 lin. Petala flava, venis tribus intensioribus, late ovata, 2 lin., 1-1½ lin. lata, calycis foliolis interioribus, pallidioribus ¼ breviora.

40. *B. moranensis*; ramis inermibus; foliis impari-pinnatis: foliolis 4- aut 5-jugis, ovato-oblongis, dentato-spinosis, sessilibus; racemis axillaribus geminis; floribus hexandris. *BERBERIS pinnata Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth. V. p. 71. t. 434. B. fol. pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis, mucronato-serratis, coriaceis. Reliqu. Willd. MS.*

Rami teretes, subrimosi, glabri, fusciscentes. Folia alterna, solitaria, breviter petiolata, 6-8 poll.; foliola opposita, sessilia, subacuminato-pungentia, basi subrotunda, grosse dentato-spinosa,

reticulato-venosa, coriacea, glabra, supra laete viridia et nitida, subtus pallidiora, $2\frac{1}{2}$ poll. longa, pollicem lata. Rhachis glabra, inferne subcanaliculata. Petiolus 4-5 lin., margine membranaceo-dilatatus ob stipulas adnatas. Racemi gemini (pluresve?) e foliorum axillis breviter pedunculati, erecti, adjecto pedunculo 3-4 poll.: pedunculus glaber, basi involutus bracteis compluribus, abbreviato-ovatis, fuscis, glabris. Flores sparsi, superne approximati, inferne remoti, pedicellati, magnitudine *BERB. vulgaris*. Pedicelli 6-8 lin. capillacei, basi bracteati, rhachisque glabri: bractea parva, ovata, acuminato-subulata, concava, glabra. Cal. 6-phyllus, tribracteatus, coloratus, glaber, deciduus, corollam vix superans; foliola elliptica, obtusa, concava, membranacea, nervosa, subaequalia; bractee orbiculatae, acutae, concavae, calyce triplo breviores, deciduae. Petala 6 foliolis calycinis opposita, flava, glabra, obovata, obtusa, concava, trinervia, subunguiculata, integerrima, aequalia. Stam. praecedentium, „(in quibus vero diversa!)“ *Kunth l. c. Decandolle eandem conjungit cum fasciculari, uti etiam Don, et Bot. Mag.; hoc tamen cum? Prope Moran Mexicanorum. h.*

41. *B. Aquifolium Pursh.*; foliis 2-3-jugis cum impari, jugo inferiore a petioli basi distante; foliolis ovato-lanceolatis, repando-dentatis, dentibus utrinque 6-9; racemis erectiusculis, saepius confertis. *Decand. S. V. II. p. 20.* (sub *MAHONIA* uti *Nutt. gen. am. I. p. 212*). *BERBERIS Aquifolium Pursh Fl. sept. Amer. 219. t. 4.* β *Nutkana. BERB. pinnata Herb. Banks et Hortul. ODOSTEMON Rafinesque M. M. 1817.*

Frutex 6-12 poll., ramis laxis, sarmentosis, procumbentibus, inermibus. Folia alterna, sempervirentia, lucida, obscure virentia; foliola opposita, sessilia, margine cartilaginea, coriacea, 2 poll.. Racemi multiflori, suberecti. Flores aurei, odori. Pedicelli bracteati. Cal. extus bracteolis 3, phyllis 3 interioribus exteriora triplo superantibus (cuneato-ovatis, obtusis, venosis, nec nervosis). Petala conniventia, flava, breviora phyllis calycinis internis, oblongo-lanceolata, apice bifida, basi nectarifera. Filamenta plana, utrinque e basi antherae dente filiformi. Germe ovatum, excentricum, 9- et polyspermum. Bacca atropurpurea, 3-sperma, 5-locularis, interdum 1-locularis, stigmatibus trilobo. In β rami cinerascens. Petioli basi semiamplexicaules, utrinque 4-dentati, dente brevi spinoso subdivaricato, 4-5 poll. longi. Foliola 2 inferiora intervallo ultra pollicari a petioli basi, utrinque dentibus 9. An forte diversa species? *Decand. In Americae borealis ora occidentali ad rivum Columbiae, β circa Nutka. h.*

42. *B. nervosa Pursh*; foliis 5-6-jugis cum impari: jugo inferiore a petioli basi distante; foliolis oblongo-lanceolatis, repando-dentatis, sub 5-nervibus: dentibus utrinque 10-14; racemis congestis, brevibus. *Decand. S. V. II. p. 20.* (sub *MAHONIA*, uti *Nutt. gen. I. p. 212*). *BERBERIS nervosa Pursh Fl. amer. sept. I. p. 219. t. 5. ODOSTEMON?*

Valde affinis *B. fasciculari* et etiam *Aquifolio*; sed ab utraque certe distincta. Foliola 11-13 basi non truncata, sed ex ovata basi oblongo-lanceolata, repando-serrata, basi fere 5-nervia, serraturis

spinosis. Racemi ex apice ramorum, vix pollicares. Bracteae ovatae, breves: bracteolae ovato-subcordatae. Petala integra, nec emarginata aut bifida. *Dec.* In Americae borealis parte occidentali, secus Columbo-River. †.

43. *B. glumacea*; foliis 6-8-jugis cum impari: jugo inferiore a petioli basi longe distante; foliolis oblongo-lanceolatis, repando-dentatis: dentibus utrinque 7-9; racemis 1-2 elongatis, gracilibus. *Decand. S. V. II. p. 21.* (sub MAHONIA). BERBERIS *pinnata* *Herb. Banks.*

Frutex glaber. Rami teretes. Petioli basi semiamplexicaules, subdilatati, utrinque dente spinoso recto, brevi, pedales et ultra, teretes, ad juga articulati. Foliola sessilia, basi obtusa, apice acuminata, mucronato-spinosa, serraturis spinescentibus, reticulato-venosa, 1½ poll., ½ poll. lata. Squamae s. bracteae pluri-
mae, foliaceo-scariosae, persistentes, oblongo-lanceolatae, acuminatae, convolutae ex axillis. Racemi e gemma simplices, 3-4-poll. Bracteolae 2-3 ovatae, obtusae, concavae. Pedicelli e bracteolarum axillis, 2 lin., bracteolas superantes. Flores magnitudine *B. vulgaris*. Calycis foliola obtusa. Germen apice attenuatum. Stigma capitato-orbiculatum. *Dec.* In Americae borealis ora occidentali in N. Georgia. †.

44. *B. Miccia* *Hamilt.*; filamentis simplicibus; foliolis 7-9, ovato-oblongis, coriaceis, nitidis, 5-nervibus, dentato-spinosis sinuatisque, basi rotundatis subcordatisve, apice tricuspidatis; racemis terminalibus, aggregatis; bracteolis ovali-oblongis, obtusis. *Don Prodr. Fl. nepal. p. 205.* MAHONIA *nepalensis*; fol. 6- (5-9)jugis cum impari: jugo inferiore minore, basi approximato; foliol. ovato-lanceol., basi 5-nerv., repando-dentatis; dentibus utrinque 5-10; racem. paucis, elongatis, gracilibus. *Decand. Syst. II. p. 21.* *Blume Byd. Fl. Nederl. Ind. p. 47.* *Deless. ic. sel. 2. t. 4.* *B. pinnata* *Buchan. ind.* — *B. nepalensis* *Spreng. Cur. post. p. 138.* β *Roxburghii*. BERB. *pinnata* *Roxb. ined. Dec. l. c.*

Frutex glaber. Rami teretes. Folia prope flores conferta. Petioli 7 poll., ad foliorum juga articulati, imò basi subdilatati; jugo inferiori valde approximato, foliolis multo minoribus, magis orbicularibus, quasi stipulari: reliqua 2 poll., vix poll. lata, impari paulo majore. Racemi plurimi, 4-5 (in defin. pauci), 6-7 poll. Bracteae ovato-oblongae, parvae; bracteolae ovato-lanceolatae, acutae, 2-lin., pedicellis longiores. Flores magnitudine *B. vulgaris*. In β foliola denticulis paucioribus, majoribus; pedicelli bracteis paulo longiores; racemi ex eadem gemma 12-14, simplices et ramosi. *Dec.* *Don l. c.* observat varietates a *Dec.* adductas nil nisi ramos ex eadem arbore esse. In Nepal, ad Narainhetty, *Wall.*; in Tjanjor, ad ortum fluminis Tjitarum, in monte Patuha. *Blume.* †.

Obs. Generi MAHONIAE tanquam speciem non satis notam cl. *Decandolle* l. c. p. 22 (monente *Brown Cong. p. 22* in adnot.) addidit *ILICEM japonicam* *Thunb.* (quam apud nos vide sub *ILICE*), nomine MAHONIAE japonicae. Cls *Don l. c.* *ILICEM japonicam* *Thunb.* vero sine dubio jungit cum BERB. *Miccia*.

c. *Species non satis notae, foliis abrupte pinnatis et petiolo apice spinescente.*

45. *B. tragacanthoides* Dec.; spinis tripartitis, patulis; foliis in axilla congestis, 1-2-jugis; petiolo apice spinescente. *Decand. S. V. II. p. 18.*

Frustula flore fructuque destituta in *Herb. Tourn. et Vaill.* Affinis *B. creticae* et *sibiricae*. Rami virgati. Folia primordalia abortiva, reducta ad spinulas parvas, lobo medio vix lateralibus majore; secundaria obiter aspecta simplicia videntur, sed re vera composita, brevissime petiolata, foliolis 2-4 oblongo-linearibus, basi angustioribus, integris, apice spinulâ, 5-6 lin., lineam latis, coriaceis, glabris. *Dec. Ad flumen Cur prope Tiflis. h.*

46. *B. caraganaefolia* H. Banks; foliis primordialibus basi spinis stipularibus 2, bijugis; petiolo apice in spinam producto. *Decand. S. V. II. p. 18.*

Frutex glaber. Rami teretes, virgati. Folia petiolo basi subdilatato, rigido, 6 lin., trispinoso, stipulis nempe 2 e petioli basi divaricatis, conico-subulatis, 2 lin.. Foliola sub apice petioli spinescente inserta, approximata, obovata aut oblonga, basi cuneata, subsessilia, nervo in aristam spinulosam excurrente, integerrima, 8-12 lin., 4-5 lin. lata. *Dec. In Chinae provincia Shantung. Staunton. h.*

Quid BERBERIS *americana* } *Loddig. Catal. 1813. et Don H. Cantab.?*
 davurica }

1277. LEONTICE.

a. *Leontopetala.*

1. **L. Chrysogonum*; foliis pinnatis: segmentis sessilibus, ovali-oblongis, apice 3-5 fidis; bracteis parvis, scariosis. *Decand. S. V. II. p. 24.* *L. fol. pinnatis, petiolo communi simplici. Linn. Hort. Cliff. 122. Spec. 447. Willd. Spec. II. 148. Lam. Enc. III. p. 465. Smith in Sibth. prodr. I. p. 234; in Rees Cycl. n. 1. Journal de Pharmacie. Mai. 1823. Rauw. iter. 119 c. icon. Moris. Hist. II. p. 285. S. III. t. 15. f. 7. Barrel. ic. 1113.*

Rad. tuberosa, subrotunda, intus rubra. Folia radicalia plurima, 8-9 poll., longe petiolata, glabra; pinnis oppositis, 5-8, apice grosse 3-5 dentatis; dentibus acutis vel obtusis cum mucronulo, atrovirentia. Petioli mediâ parte nudi. Scapus erectus, gracilis, pedalis, foliis longior, superne subpaniculatus. Pedicelli 1-2 poll., uniflori. Flores pallide lutei. Petala reticulata, ovato-lanceolata, obtusiuscula. Stamina longitudine fere petalorum. *Inter segetes Graeciae et Syriae. 4.*

2. **L. Leontopetalum*; foliis biternatis: segmentis 3-5 subpetiolatis, obovatis; bracteis foliaceis pedicello multoties brevioribus; (fructu ovato). *Decand. S. V. II. p. 25.* *L. fol. decompositis, petiolo communi trifido. Linn. H. Cliff. 122. Spec. p. 448. Willd. Spec. II. p. 148. Lam. Enc. III. p. 465. Smith in Sibth. prodr. I. p. 234, in Rees Cycl. n. 2. Journ. de Pharm. Mai. 1823. Lobel obs. 391. f. 1. icon. t. 685. f. 2.*

Besl. Hort. eystett. aest. ord. IV. t. 2. f. 1. Moris. Hist. II. p. 285. s. III. t. 17. f. 6. Weinm. Phyt. III. t. 639. Gesn. op. ed. Schmiedel p. 125. t. 9. f. 75. Barrel. ic. t. 1050. β. Leontopetalum ramosum polyanthes. Barrel. ic. t. 1029.

Rad. tuberosa, nigricans, subdepressa, facie *Cyclaminis*, (magnitudine fere pugni), amara. Caulis erectus, teres, pedalis, nunc simplex, nunc ramosus, uti in β. Folia radicalia, petiolata (pedalia, glauca); caulina nonnulla alterna, subsessilia, petiolo brevi amplexicauli; laciniis obtusis, apice mucronatis. Racemi saepius plurimi. Pedicelli elongati (poll.), graciles, subangulati. Bracteae ovatae, acutae. Flores flavescens, striati; stamina petalo breviora. Fructus *Rumicis Vesicariae* (sed major): capsula obliqua, membranacea, pallida, venis intensioribus, apice mucrone acuminata. Semina 3-4 globosa. *Dec. In arvis et inter segetes Italiae, Graeciae, Syriae. 4.*

3. *L. vesicaria Pall.*; foliis biternatis: segmentis oblongo-subcuneatis, obtusis, submucronatis; bracteis foliaceis, pedicello vix dimidio brevioribus; (fructu obovato, inflato). *Decand. S. V. II. p. 25. Pall. Act. petropol. 1779. 2. t. 9. f. 4. Willd. Spec. II. p. 149. Poir. Enc. Suppl. III. p. 331. L. incerta Pall. it. app. n. 84. T. V. f. 2.*

Media *L. Leontopetalum* inter, cui structurâ fructus, et *altaicam*, cui foliis proxima. Rad. tuberosa. Herba mollis, succulenta. Caulis solitarius, teres, erectus. Folia caulina 2, alterna, petiolata, petiolo trifido, segmentis tripartitis, lobis lateralibus saepe bi-interdum irregulariter 3-4-lobis, lobis obtusis, vix mucronulatis. Racemus terminalis, simplex, pauciflorus. Bracteae reniformes, amplexicaules ad basin pedicellorum, iisdem vix dimidio, nec sextuplo, ut in *Leontopetalo*, breviores. Flores? Fructus vesicarii, maximi, calycis *Physalidis* more inflati, apice obtusissimi, membranacei, pallidi, demum rubescentes, reticulati. Semina globosa, 4, fusca, in fundo vesicae. Semen videtur ob cotyledones distantes ad *Menispermeas*, ob sacculum embryonem includentem ad *Nymphaeaceas* accedere. *Pall. et Dec. Clo Smith in Rees Cycl. varietas forte L. Leontopetali. In praeruptis limosis ad lacum salsum Inderiensem deserti Kirghisorum. 4.*

4. *L. triphylla Smith*; foliis radicalibus, ternatis, obtuse-dentatis; caule radicali, simplici; floribus spicatis. *Smith in Rees Cycl. Achlys triphylla Decand. S. V. II. p. 36.*

Rad. perennis, quidquam repens. Folia solitaria in petiolo gracili, simplici, erecto, glabro, 10-12 poll., basi squamis pluribus imbricatis, ellipticis, concavis, nervosis obsito. Foliola 3, sessilia, 2 poll., glabra, pallide viridia, eleganter reticulata, basi cuneata, lateralia ad latus dilatata. Pedunculi solitarii ex eadem gemma cum petiolis, paulo breviores, graciles, nudi. Spica terminalis, poll.. Flores numerosi, sessiles, albi. Cal. Corollaeque ne quidem vestigia invenienda. Stamina omnino, ut in *L. Leontopetalo*: filamenta basi gracillima. Germen ovatum. Stigma crassum, fere sessile, obliquum. *Smith. In littore occidentali Amer. bar. Menzies. 4.*

Obs. Character gen. Achlys apud Decandolle l. c. „Cal. ? Petala indefinita, minima, linearia, fere subulata. Stam. filamentis planiusculis, basi

atenuatis, apice dilatatis. *Antherae* loculis subglobosis, valde discretis; rimâ transversali dehiscentibus. *Germen* ovato-oblongum. A LEONTICE, immo a BERBERIDEIS, differt antheris non valvulâ dehiscentibus. AN JEFFERSONIAE, AD ACTAEAE affinis?

b. *Caulophylla*.

5. *L. altaica* *Pall.*; folio caulino solitario; petioli a basi tripartiti ramulis segmenta 5 oblonga, integra, palmatim disposita gerentibus. *Decand. S. V. II. p. 26.* L. fol. caulinis ternis, quinatis; radicalibus ternato-quinatis; racemo laxo, sessili. *Pall. Act. petrop. 1779. p. 255. t. 9. f. 1, 2, 5.* *Willd. Spec. II. p. 149.* *Poir. Enc. Suppl. III. p. 331.* β . *L. Odessana* *Fisch. in litt. ad Decand.*

Rad. tuberosa, (globoso-subdepressa, extus grisea, intus alba), magnitudine Avellanae. Herba glabra. Caulis 1-2 e quovis tubere, erectus, teres, 6-9 poll.. Folia radicalia decomposita; caulinum unicum, sub racemo, petiolo basi stipulis 2 auriculaciformibus, obtusis; segmentis folium verticillatum mentientibus, obtusis, submucronulatis: medio $1\frac{1}{2}$ pollicem longo, $\frac{1}{2}$ poll. lato; lateralibus dimidio minoribus, (pallide viridibus). Racemus simplex, erectus, 7-9-florus. Bractee ovatae, foliaceae, obtusae, (striatae), 3 lin. Pedicelli 1-flori, graciles, primum erecto-patentes, demum subnutantes, bracteam triplo circiter longiores. Flores flavi. Calycis foliola colorata, petaloidea, ovali-oblonga, 4 lin. Petala calyce duplo breviora, squamiformia (longitudine fere filamentorum *Pall.*). *Germen* apice vesicarium. Stylus lateralis, filiformis (longitudine filamentorum). Capsula circa semina adinstar calycis persistens, rupta. Semina 2 globosa (plerumque 4, ovata, apice sessilia *Pall.*). β differt pedicellis paulo longioribus; staminibus petala (fere) duplo superantibus; segmentis foliorum paulo magis petiolulatis. Anne potius species distincta, ut videtur plerisque? *Decand.* *In apricis montium Altaicorum Sibiriae; β in collibus calcareis circa Odessam. 4.*

Obs. In specimine nostro varietatis odessanae, quod clo *Besser* debemus, et quod vix cum *L. altaica* jungendum, caulis 9 poll.; folia caulina 2, vel petiolus ad basin usque bifidus; alterum quinatum, alterum biternatum; foliis subsessilibus, (intermediis breviter petiolatis paulo majoribus), basi plerumque inaequalibus, oblongis, obtusis vel acutiusculis, glaucis, $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ poll., 3 lin. - $\frac{1}{2}$ poll. latis. Racemus suberectus, 17-20 florus. Bractee subrotundo-ovatae cum acumine brevi, glaucae, striatae, 3 lin. longae lataeque. Pedicelli graciles, primum erecti, bracteam paulum breviores, dein cernui, fere poll. Calycis foliola ovalia, obtusa, diaphana, flava, nervis plerumque 6, 2 lin. fere lata. Petala triplo fere breviora angustioraque, intensius colorata. Stamina petalis $\frac{1}{3}$ longiora. Reliqua conveniunt.

6. * *L. thalictroides*; folio caulino solitario; petioli a basi tripartiti segmentis ovatis, apice grosse incisis, acuminatis. *Decand. S. V. II. p. 27.* L. folio caulino triternato (27), florali biternato (9) *Linn. Spec. p. 448.* *Willd. Spec. II. p. 149.* *Lam. Enc. III. p. 465.* *Smith in Rees Cyclop. n. 4.* *Brown Trans. Linn. Soc. XII. p. 145. t. 7.* CAULOPHYLLUM *thalictroides* *Mich. Fl. bor. Amer. I. p. 205. t. 21.* *Willd. Enum. I. p. 372.* *Parsh Fl. s. A. I. p. 218.* *Torr. Fl. p. 356.* *Poir. Enc. Suppl. II. p. 140.* *Elliott Sk. I. p. 411.* *Nutt. gen. n. 305.* „Modus crescendi *Epimedii*. Caulis nudus, terminatus foliis 3, patentibus, petiolatis. Petiolus singulus trifidus, adnatis 9 foliolis, quorum lateralia 2 sessilia, biloba; intermedium petiolatum, tri-

lobum; infra divisuram primam caulis exserit e latere petiolos 3 simplices triphyllus, infra quos racemus simplex cum duobus lateralibus. „*Linn.* Herba pedalis, glabra. Caulis simplex, teres. Folium inferius interdum nullum. Segmenta folii caulini subtus glauca, superne intense viridia, $1\frac{1}{2}$ -3 poll., $1\frac{1}{2}$ -2 lata. Racemus 12-15 florus, bracteis parvis, submembranaceis ad originem ramorum et pedicellorum. Flores flavo-virentes. Cal. bracteiformis, foliolis 3-6, parvus. Petala ovato-lanceolata, unguiculata, margine reflexa, 3-5-nervia. Squamae ad eorum unguis angustae, reniformes, margine glutinosae. Germen ovato-ventricosum, mox lateraliter ruptum. Semina 2, aut 1, exserta, substipitata, baccata, globosa, caerulea. *Dec.* Caulis bifolius. Ultima foliorum segmenta triloba. Racemus parvus, paniculatus. Calycis foliola 3-6, inaequalia, 2-3 saepius deficientia. Squamae $\frac{1}{3}$ petalorum aequantes, unguiculatae, margine carnea. Stylus excentricus, brevis. Stigma lineare, incurvum, pubescens. Caps. drupacea, cartilaginea, monosperma. *Nutt.* In umbrosis montosis frigidis Americae borealis a Virginia ad N. Angliam. 4.

Obs. Alia adhuc species huc pertinentis *LEONTICEA* asservatur in *Herb. Banks.* Drupa stipitata in *Mich.* est semen nudum, quod pericarpium rupit, cuius rudimenta plerumque adhuc ad basin seminis maturi conspicua. Nux cornea crassissima *Mich.* est albumen, semen est embryo. *R. Brown. Trans. Linn. Soc. XII. p. 146.*

1278. GUAPIRA.

1. *G. guianensis.* *Aubl. Guian. p. 308. t. 119. Lam. Enc. meth. 3. p. 52.*

Arbor mediocris, trunco 10-12 ped., 7-8 poll. in diametro; cortice laevi, viridi; ligno albo, fragili. Rami in apice trunci recti, sparsi, teretes, foliosi, nodosi; gemmae ramos terminantes squamis villosis, rufis tectae. Folia opposita, petiolata, ovalia, acuta, integerrima, laevia, viridia, 4-6 poll. Racemus ramosus, mediocris, longe pedunculatus, e dichotomia ramulorum. Flores parvi, albi. Calycis foliola ovata. Filamenta plana, striata, sub germine inserta. Antherae virides, loculis 2 basi divergentibus. Germen superum (?), ovoideum, stylo coronatum. Stigma radiis 5-6 linearibus, acutis. Bacca rubra, apicibus corollae coronata (quod vix cum staminum insertionem quadrat), saepius stylo terminata. Semen tunicâ albâ. *Aubl.* In nemoribus Guyanae. h.

1279. CLEOME.

A. GYNANDROPSIS *Decand.*; staminibus 6, circa torum monadelphis, apice tantum liberis.

1. *CL. sessilifolia*; glabra; foliis omnibus ternatis, sessilibus, infimis vix subpetiolatis: foliolis oblongis, integris. *Decand. Prodr. I. p. 237.* (sub *GYNANDROPSI sessilifolia*). *CL. triphylla* flor. gynandris, fol. 3-natis, caule ineremi. *Linn. Spec. p. 938. Willd. Spec. III. p. 565.* (excl. synon., monente *Dec. l. c.*, qui *CL. triphyllam* in *Herb. Vahl et Dahl* vidit.)

„Tres praecedentes“ addidit *Linnaeus* „(nimirum *CL. fruticosam* (nunc *CADABAM indicam*) *heptaphyllum*, *pentaphyllum*)“ ex eadem planta olim prognatas evincunt folia imprimis floralia sessilia; flores gynandri, hexandri; petala adscendentia; siliquae pedicel-

latae et habitus: vix itaque species sufficienter diversae.“

In Indiis. Linn.. Patria ignota. Dec. ☉.

2. **Cl. triphylla*; glabriuscula; foliis omnibus ternatis; floralibus (sub-) sessilibus, reliquis petiolatis; inferiorum petiolo foliis longiore. *Decand. Prodr. I. p. 237* (sub *GYNANDROPSI triphylla*.) *Cl. triphylla Linn. Spec. 938* (quoad synonymon: *Sinap. ind. triphyllum, flore carneo, non spinosum. Herm. lugdb. 564. t. 565.*) *Mill. Dict. n. 5. Poir. Enc. IV. 517.* (quoad synonymon *Herm.*).

An *Cl. pentaphyllae* varietas? *Dec.* Habitu affinis *pentaphyllae*; sed constanter *triphylla*: stamina vero breviora, et flos magis coarctatus. Caulis 2-pedalis, rectus, herbaceus, fere glaber, (vel pilis brevibus, praesertim superne); ramis foliosis. Petioli longi, pilis raris. Foliola subsessilia, ovato-lanceolata: intermedio longiore; cilia nulla, sed denticuli parvi, vix conspicui. Flores terminales ad apicem ramorum in spica brevi, (interdum tamen $1\frac{1}{2}$ ped.); bracteis lanceolatis, linearibus, acutis, acumine ciliato. Cor. carnea, unguibus filiformibus: pedunculus $\frac{2}{3}$ minor quam in *pentaphylla*. Siliqua oblonga, obtusa, stigmatate complanata. *Poir.* Siliqua $\frac{1}{2}$ -1 poll., pilis sparsis glandulosis, longitudine stipitis vel longior. Semina vermiculata, pallide fusca, glabra, striis longitudinalibus. *In Caribaeis, ad Senegal. ☉.*

5. **Cl. pentaphylla*; glabriuscula; foliis mediis quinatis, infimis floralibusque ternatis; foliolis integris subserrulatisve. *Decand. prodr. I. p. 238.* (sub *GYNANDROPSI pentaphylla*.) *Cl. flor. gynandr.*; staminibus medio stipitis insertis; foliis 5-natis, passim floralibusque ternatis; caule inermi. *Hort. Kew. ed. 2. IV. p. 130. Mill. Dict. n. 1. Poir. Enc. meth. IV. p. 317. Loureir. Fl. cochin. p. 482. Jacq. Hort. Vind. t. 24. Bot. Mag. 1681. Parkins. theatr. 397. f. 3. PODOGYNE pentaphylla C. a Hoffmannsegg. Verz. p. 185. GYMNOGONIA R. Brown in App. to Denh. et Clappert. Voy. p. 17. β. foliolis inferioribus subseptenis. Cl. pubescens Sieb. Herb. martin. n. 292. Cl. pentaphylla Roth Beytr. II. p. 91?*

Caulis herbaceus, fere 2-ped., rectus, simplex, fusco-ruber; rami patentes, villosi. Foliola 5 subpetiolata, ovato-rotundata, mucrone parvo, ciliis parvis aculeolata: petiolus communis longus, tenuis, villosus. Spica rara. Ad basin pedunculi communis bractea forma foliorum 3 parvorum sessilium, ovalium, ciliatorum. Petala 4 inaequalia, rotundata, patentia, unguibus filiformibus, longis. Germen longissime pedicellatum: pedicello huic stamina tenuissima, subtorta affixa, alte supra stamina elatum. Siliqua villosa, cylindrica, subulata, stigmatate lenticulari, obtuso. Semina rotundato-reniformia. *Poir. ad specim. ex Ind. orient.* Culta *Jacquini* foetida, erecta, tota glabra, vel inferne pilis raris. Caulis teres, ramosus. Foliola obovata, acuta, tenuissime serrata. Folia floralia ternata, obovata, obtusa, integerrima: infima breviter petiolata, reliqua sessilia. Racemi longissimi. Pedunculi patentes, 1-flori. Calycis foliola lanceolata. Petala alba vel carnea. Germen pedicello purpureo, tenui, et circum hoc filamenta concoloria, aequalia. Siliquae

pilis rigidis, brevissimis, obtusis scabrae, fere punctatae. *Nuttall. gen. II. p. 73* flores albos, *Pursh* purpureos dicit. *Nuttall* petala rotundata in unguibus capillaribus iisdem triplo longioribus dicit, antheras nunquam curvatas, et *Linnaei* adnotationem ad *triphyllam* omnino ex natura petitam esse monet. β hirsutiae potissimum differre videtur; est enim, monente jam olim *Roth*, tota pilis rigidis, tortilibus scabra. Foliola serrata, margine saepius revoluta, elliptica, inaequalia. Racemus 2-3 digit.. Petala post deflorescentiam rubicunda. *Cl. pentaphyllae* varietas dicitur: *Cl. Candelabrum Bot. Mag. 2656 in Spreng. Cur. post. p. 158.* In India, Cochinchina, Aegypto, Guinea etc., in America, ubi ab Aethiopibus allata monente *R. Brown.* ☉.

Obs. Divus *Linnaeus* *Cl. pentaphyllae* synonyma dicit: *Fl. zeyl. 239. Sloane jam. 80. Hist. I. p. 294. Raj. hist. 859. Papaver corniculatum acre quinquefolium aegyptiacum minus. Pluk. Alm. 280. Pentaphyllum peregrinum siliquosum bivalve minus. Moris. hist. 2. p. 289. Quinquefol. lupini folio. Bauh. pin. 326. Cara veela Rheed. Malab. IX. p. 43. t. 24. et., in Fl. zeyl. adhuc: Sinapistrum indicum, pentaphyllum, flore carneo, minus, non spinosum. Burm. zeyl. 216. Barrel. rar. t. 1235. Diversae hic forte plantae latere videntur. Burmann et Rheede quadrant icone et descriptione; minus bene vero a *Loureiro* laudata *LAGANSA rubra Rumph. Amb. V. p. 280. t. 96. f. 2*; caules enim striati, quod non in planta *Rhedeana*. Vix vero hujus loci planta *Morisoni*, ut ex descriptione patet. Planta, quae hodie dum adhuc *Caravela* Indis audit, in *Asiat. Research. IV. p. 285.* non nisi cum? *CLEOME pentaphylla* dicitur. Huic: „rad. albida, fibris capillaribus. Caulis herbaceus, pallide viridis, partim purpurascens, hirsutus; brachiatus, ramis cauli similibus, foliosis. Folia 5-na, rotundato-rhomboida, crenata, acuta, hirsuta, intense viridia: parium inferiorum aequalia, impar multo majus, grosse costata, processibus e petioli ramulis basi costarum coadunatis. striâ singulâ albidâ intus furcatâ. Cal. viridis, basi hians, dein erectus: foliolis ovatis, oblongis, concavis, tomentosus, deciduis. Petala alba, patentia, unguibus longis, rugoso-plicata. Nectaria glandulae 6-12, perforatae, in receptaculo gibbo. Filamenta 6, filiformia, pedicello sub germine inserta, subaequalia. Antherae erectae, acutae, sulcatae, aureae. Germen erectum, lineare, longum, pedicellatum. Stylus brevissimus. Stigma capitatum, planum, orbiculare. Siliqua 2-locularis, bivalvis, fusiformis, torulosa, stylo coronata. Semina numerosissima, rotundata, nutantia. Receptacula linearia, saepe plus quam 2.“ Specimina indica, aegyptiaca, americana cultaque nullo caractere constante differre videntur.*

4. *Cl. Candelabrum Sims*; caule petiolisque pilosis; foliis quinatis; foliolis lato-ovatis, acuminatis, supra hirsutis, subtus pubescenti-villosis: floralibus sessilibus ternatis; capsulis siliquaeformibus cylindratis, scabris. *Bot. Mag. t. 2656.*

Caulis erectus, teres, apice subdivisus. Folia caulina petiolata, 5-nata; floralia s. bracteae ternata. Pedunculi horizontaliter patentibus. Cal. foliola lanceolata. Petala longe unguiculata, alba v. carnea. Stam. 6. Thecaphorum pedunculo longius. Caps. poll. et ultra, crassa, hirsuta-scabra, stylo persistente coronata. Sem. plura, scabra. Proxima *Cl. pentaphylla* (cujus varietas dicitur in *Spreng. Cur. post.*) differt: caule plerumque glabro; foliolis potius ovalibus; pedunculis minus patentibus et fructibus longioribus tenuioribusque. A *Cl. muricata* diversissima hirsutiae molliori, foliorum formâ et fructibus. *Hab.?* ☉.

5. *Cl. muricata*; caule hispido; foliis quinatis: infimis floralibusque ternatis, foliolis cuneato-obovatis, obtusissimis, margine et subtus ad venas hispidulis; petiolis muricato-hispidis. *GYNANDROPSIS muricata Schrad. in Cat. sem. hort. Gott. ao. 1824.*

Caulis ped., ramosus, hispidus, pilis guttuliferis immixtis. Foliola

supra, uti pedunculi pars superior, pedicelli, calyces germinaque pilis exiguis guttuliferis, subtus ad venas hispidula. Flores racemosi fere *Cl. pentaphyllae*. Caps. siliquaeformis, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., cylindracea, stylo brevi terminata. Odor totius plantae ingratus. *Schrader in litt.* In India. ☉.

6. *Cl. denticulata*; glabriuscula; foliis infimis 7-natis, mediis 5-natis, summis ternatis: foliolis serrulatis. *Decand. Prodr. I. p. 238* (sub *GYNANDROPSI denticulata*).
In Angola. ☉. *Herb. Mus. Paris.*

Obs. In *Herbar. Schreber.* specimen, ut videtur cultum, nomine *Cl. heptaphyllae* insignitum invenimus, a *Cl. heptaphylla* omnino diversum, et optime cum brevi definitione *Cl. denticulatae Decand.* congruens. Caulis pilosiusculus, ut videtur teres, sulcatus, inermis, erectus, ramosus; ramis densius glanduloso-pubescentibus. Folia alterna, petiolata, inferiora 7-nata, media 5-nata, summa 3-nata; foliola oblonga, vel subinde rhomboidea, acuminata, basi attenuata, glabra, vel nervo medio basi pilis paucis glandulosis, nervosa, nervo medio subtus prominulo, inaequalia: medio maximo $2\frac{1}{4}$, fere poll., 9 lin. lato, lateralibus superioribusque sensim minoribus, margine obsolete remoteque denticulata, pallide viridia, brevissime petiolata, petiolis membranulâ connatis, ut *palmipedem* crederes, si folia integra essent. Petioli communes teretiusculi, supra canaliculati, basi dilatati, pilis sparsis, glandulosis, 2-3 poll. Folia floralia vel bractee ternatae, breviter petiolatae, pedunculis duplo breviores; foliolis obovato-oblongis, basi longe attenuatis, acuminatis, pilosiusculis. Racemi terminales, $\frac{1}{2}$ ped., densiflori, erecti. Pedicelli distantes, teretiusculi, glanduloso-pilosi, fere poll. Calycis foliola lineari-lanceolata, acuta, piloso-glandulosa, vix petalorum unguis aequantia, reflexa. Petala adscendentia, rosea(?) obovata, obtusa, in unguem longum angustum attenuata, venosa, 6-8-lin.. Stamina sectionis, petalis germinaeque breviora, erecta; antherae lineares, virescentes. Germen stipite brevius, lineari-oblongum, glandulâ obsitum, stigmate sessili, capitato, obsolete lobato.

7. *Cl. palmipes*; glabriuscula; foliis 5-7-natis: foliolis integris; petiolulis membranulâ subcohaerentibus. *Decand. Prodr. I. p. 238.* (sub *GYNANDROPSI palmipede*).
In Cayenna. ☉.

8. *Cl. heterotricha Burch.*; pilis aliis elongatis, aliis glanduloso-sessilibus pilosiuscula; foliis ternatis quinatis: foliolis subintegris. *Decand. Prodr. I. p. 238.* (sub *GYNANDROPSI heterotricha*) *Burch. trav. I. p. 537. Cat. n. 2011.*
In Promont. b. spei. ☉.

9. *Cl. brachycarpa Vahl*; viscoso-pubescentis; foliis 5-natis: foliolis integris; siliquâ glabrâ, ovali-oblongâ, thecaphoro breviora. *Decand. Prodr. I. p. 238* (sub *GYNANDROPSI brachycarpa*).
In Peruvia. *Herb. Juss.*

10. *Cl. hirsuta Ruiz et Pav.*; hispida; foliis 5-natis: foliolis integris; siliquâ hispidulâ thecaphoro breviora. *Decand. Prodr. I. p. 238.* (sub *GYNANDROPSI hispidula*).
In Peruvia. *Herb. Lamb.*

11. *Cl. speciosa Humb. et Bonpl.*; herbacea, inermis glabriuscula; foliis septenatis: superioribus quinatis aut rariis ternatis; foliolis longissimis, lanceolatis, acuminatis; floribus hexandris. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunt h V. p. 84 t. 436.* *GYNANDROPSIS speciosa*; apice subvelutina; foliis 5-

natis: foliolis subserrulatis, oblongis, acuminatis. *Decand. Prodr. I. p. 238.*

Ramosissima, inodora, caule ramisque sulcato-striatis, tetragonis. Folia alterna, longe petiolata, digitata, inferiora septenata; foliola petiolata, acumine obtuso submucronato, inferne valde angustata, integerrima, membranacea, laete viridia; subtus pallidiora, glabra, supra margineque pilis minutis subulatis, adjecto petiolo partiali 7-9 lin., 16-18 lin. lata; exteriora gradatim minora, extima duplo breviora. Petiolus 7 fere poll., interne canaliculatus, inermis, partialesque $\frac{1}{2}$ fere poll., hirtelli. Folia superiora multo minora. Racemi terminales erecti, 8 fere poll.. Flores sparsi, longe pedicellati, magnitudine *spinosa* H. et B., pedicellis $1\frac{1}{2}$ poll. filiformibus rhachique glabris. Bractea subovatae, acuminatae, foliaceae, virides, glabriusculae, pedicello dimidio breviores. Cal. glabriusculus, viridis (coloratus ex *Bonpl.*); laciniis lanceolato-linearibus, acuminato-subulatis, aequalibus, unguem petalorum aequantibus. Petala oblonga, obtusa, inferne valde angustata et longe unguiculata, integerrima, violacea, glabra, adjecto ungue 13-14 lin., aequalia. Stamina stipiti inserta, corollam duplo superantia, aequalia, declinata. Filamenta glabra. Antherae anguste lineares. Pollen flavum. Germen lineare, glabrum, longissime stipitatum, 4-5 lin., stamina subaequans stipite subbipollicari. Stigma capitato-emarginatum. Siliqua cylindrica, 3-4 poll.; seminibus pluribus, reniformibus. Spinaciae loco inservit. *Kunth l. c. In convalli fluminis Caucae, prope Carthagenam. 4.*

12. *CL. flexuosa Hortor*; floribus gynandris; foliis quinatis ternatisque; caule inermi, subpiloso, basi flexuoso; siliquis teretiusculis, pilosis, subtorulosis. *Dietrich Gart. Lexic. Nachtr. II. p. 296.* *CL. gynandra*, foliis quinatis cauleque subflexuoso laevibus; petalis spathulatis; ungue calyce duplo longiore. *Besser Catal. H. Cremenec. 1816. p. 35.*

Caulis herbaceus, erectus, basi ramosus, superne simplex, pilis brevibus. Folia plerumque ternata; petioli foliis duplo fere longiores; foliola ovato lanceolata, 1-2 poll., glabra, costata, margine minute serrato-dentata; in foliis 5-natis foliola 2 interiora minora. Spica multiflora, subovata, terminalis. *Bractea* parvae, ternatae, subsessiles. Pedunculi 1-flori, filiformes, tomentosi. Calycis foliola curvata, longitudine unguium petalorum. Petala alba, adscendentia, reflexa, subundulata. Filamenta 6 purpurea, antheris parvis oblongis, verticillata in medio pedicelli germen rubellum oblongum sustentis. Siliqua 2-poll. et longior. Flores supremi steriles. *Dietr. Hab? ☉.*

13. *CL. Blumeana*; glanduloso-pilosiuscula; foliis infimis floralibusque trifoliolatis, mediis 5-foliolatis: foliolis obovatis, integerrimis, glanduloso-ciliolatis. *GYNANDROPSIS affinis Blume Kruidk. Waarnem. II. St. p. 52.* *CL. affinis Spreng. Cur. post. p. 138.* (Nomen mutandum, cum jam sit *affinis*).

In ruderatis et siccis Javae.

Obs. *CLEOMES* species 2 *CL. pentaphyllae* et *triphyllae* proximas in Guinea detexit *div. Smith. Hornem. de ind. pl. guin. p. 13.*

B. CLEOMES *Decand.*; Stam. 6, rarius 4, liberis.I. *Pedicellaria*: toro carnosio, subgloboso; thecaphoro elongato.

14. **CL. gigantea*; fruticosa, velutino-pubescens, subviscosa; foliis septenatis; venis foliorum utrinque 30-40. *Decand. Prodr.* I. 258. *Linn. Mant.* 430. *Jacq. Obs.* IV. p. 1. t. 76. *Willd. Spec.* III. p. 567. *Poiret Enc.* IV. p. 319. *CL. inermis*, hexandra: staminibus juxta basin stipitis longissimi insertis; foliis 7-9-natis, hirsutis; racemo ebracteato. *Ait. Kew.* IV. p. 131. *CL. viridiflora* *Schreb. Nov. act. N. C.* IV. p. 136. t. 3. *SINAPISTRUM giganteum* *Mönch. meth.* p. 250.

„Caulis orgyalis, teres, pubescens, erectus, sempervirens. Rami ex alis ultimis progredientes sub florescentia simplices. Folia alterna, petiolata: foliolis lanceolatis, integerrimis, pubescentibus, supra sericeis. Petioli foliis longiores. Racemus terminalis erectus strictus, 2-ped.. Pedicelli remoti, exstantes, glutinosi, flore longiores, absque bracteis. Cal. foliolis 4, linearibus erectiusculo-patulis, deciduis, ciliatis. Petala oblonga, nodulosa (obtusa), viridia, arcte cohaerentia excepto latere antico pro genitalibus. Ungues distincti, longitudine petali. Stamina filamentis 6, receptaculo insertis, petalo longioribus, declinatis. Antherae oblongae, erectae, flavescens. Germen oblongum, stipitatum, stipite longitudine staminum, declinato, ut stamina. Stigma sessile, obtusum. Receptaculum fructificationis globosum, exsudans nectar in ungues petalorum. Saporis urentissimi, odoris virosissimi.“ *Linn. In Guinea. Linn. In America merid. Hort. Kew.* t.

15. *CL. arborea* *Humb. et Bonpl.*; arborea, inermis (?); foliis septenatis: foliolis sessilibus, oblongis, subacuminatis, supra hispido-pilosis, subtus petiolisque molliter hirsuto-pubescentibus et canescentibus; floribus racemosis hexandris. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth.* V. p. 86. *CL. fruticosa*, velutino-pubescens, subviscosa; foliis 7-natis: venis foliolorum utrinque 20. *Decand. Prodr.* I. p. 258.

Arbusecula 5 org.. Folia digitata, longe petiolata; foliola 7 inferne cucinato-angustata, integerrima, venis primariis approximatis subparallelis, membranacea, 4½-5 poll., 21-22 lin. lata: exteriora duplo breviora. Petioli 6-poll. et ultra, teretes, striati. Flores racemosi, magni; pedunculi sub 1½ poll., teretes, hirtelli. Cal. laciniis lineari-lanceolatis, subacuminatis, margine ciliato-glandulosis, aequalibus, ½ poll.. Petala oblongo-linearum, obtusa, inferne valde angustata, glabra, virentia (?), aequalia, superne cohaerentia, 16 lin.. Stam. 6? stipitis basi incrassatae inserta, corolla duplo longiora. Filamenta glabra. Germen oblongo-cylindraceum, glabrum; stipite 3 lin. longo, filiformi, glabro, inferne valde incrassato. Stigma depresso-capitatum. Fructus immaturus ovato-oblongus, teres, glandulis stipitatis, stipite 2 poll.. *Giganteae* proxima. *Kunth l. c.* An satis distincta quaerit *Decandolle?* *Sprengel S. V.* II. p. 122. sine dubio arboream hanc cum *gigantea* conjunxit. *In umbrosis juxta la Venta Grande, la Guayra inter et Caracas.* t.

16. *CL. dendroides*; floribus hexandris; foliis septenatis; caule arboreo, aculeato. *CL. arborea* *Weinm. in Sylloge* p.

227. CL. caule fruticoso, simplicissimo, aculeato; foliis 7-natis, pilosis. *Spreng. S. V. II. p. 123.* CL. *atropurpurea* Schott in *Schreiber's Nachr. v. d. oester. Naturforschern.* p. 129.

Nomen mutandum ob CL. *arboream* Humb., quae diversa. Caulis 6-7 ped., erectus, apice inclinatus, simplicissimus, inferne lignosus, glaber, aculeatus, superne pilosus, scabriusculus, inermis. Aculei post foliorum delapsum ad eorum latera egredientes, brevissimi. Folia alterna, petiolata; foliolis ellipticis, integerrimis, pilosis, ciliatis, nervosis, inaequalibus. Petioli teretes, pilosi, rubicundi, inferiores 6-8 unc., superiores sensim breviores. Racemus terminalis, $\frac{1}{2}$ ped. et ultra, apice subnutans. Pedicelli inferiores subdistantes, superiores conferti, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ unc., declinati. Petala adscendentia, oblonga, obtusa, unc., saepe torta vel margine revoluta, atro-violacea. Stamina colore petalorum, 3 unc., declinata, in receptaculo fructificationis opposita. Antherae oblongae, flavescens. Germen oblongum, stipitatum, longitudine staminum. Stigma sessile, globosum *Weinm.* In *Brasilia*. \dagger .

Obs. CL. *atropurpurea* l. c. *giganteae* affinis, caule aculeato, floribus minoribus atropurpureis dicitur: descriptio uberior nulla. Conf. CL. *arboream* Humb.

17. CL. *glandulosa* Ruiz et Pav.; subarborescens; pilis crassis, apice glandulosis hispida; foliis 7-9-natis: floralibus summis simplicibus, ovato-cordatis; germine piloso-glanduloso. *Decand. Prodr. I. p. 258.*

Siliqua thecaphori longitudine. *Dec.* In *Peruvia*. *Herb. Mus. Paris.* \dagger .

18. CL. *cardinalis* Fl. mex.; herbacea, glabra; foliis quinatis: floralibus sessilibus foliolisque ovali-lanceolatis. *Decand. Prodr. I. p. 258.* *Icon Fl. mexic. inedit.*

In *Mexico*; vulgo *Borla di Cardinal*. \dagger .

19. * CL. *heptaphylla*; herbacea, aculeata, hirsuto-viscosa; foliis 7-natis: floralibus simplicibus, cordato-subrotundis; siliqua thecaphoro longiore, viscoso-pubescente. *Decand. Prodr. I. p. 239.*

CL. floribus gynandris, fol. subseptenatis, caule aculeato. *Linn. Spec. 937. Mant. p. 430. Willd. Spec. III. p. 564. Poir. Enc. IV. p. 317. Swartz obs. p. 252.* CL.

Erucago Mill. n. 6. *Sinapistrum* ind. spinos. fol. 5-7. *Burm. zeyl. 215.* *Sinapistrum* aegypt. heptaphyllum, flore carneo.

Herm. ludgb. 564. Sloan. jam. 80. Hist. I. p. 194. Morris. Hist. II. p. 288. β . *Sinapistr. ind. majus quinquefolium*

asperum. Raj. Suppl. 418. Bractae lunares. *Linn.* In β caules asperi, hirsuti, ramosi, 2 ped., folia quina; pedunculi spinis brevibus, non pungentibus. *Ray.*

In *Indiis*. \odot .

Obs. Recte cl. *Decandolle* l. c. quaerit: „an plures hic confusae species? An indica eadem ac *jamaicensis* aut *essequiboensis*?” *Swartz* l. c., et cum illo *Poiret* l. c., describit *jamaicensem* sequentibus: „Caulis herbaceus, 3-5 ped., erectus, angulato-sulcatus; rami subdivisi, patentes, sulcati, hirsuti, viscosi, aculeati. Folia petiolata, alterna, sparsa, patentia: foliola petiolulata, lanceolata, acuminata, nervosa, patula, pubescentia, interiora gradatim minora. Petioluli breves, teretes, hirsuti. Petioli communes longiores, erecti, teretes, striati, viscosi. Aculei geminati, oppositi, crassi, breves ad basin petalorum. Flores terminales, spicati, bracteis cordato-subrotundis,

sessilibus, integris, pubescentibus, albis; gynandri, pedunculati. Pedunculi longiusculi, teretes, pubescentes. Cal. foliola lineari-lanceolata, acuta, patula, convexa, pubescentia, 2 paulo longiora. Petala unguiculata, reflexa, erecta, contigua, oblonga, concava, integra, alba. Filamenta corollâ longiora, deflexa, patula, rubro-purpurea. Antherae longae, erectae, lineares, bruneae. Germ. pedicellatum, lineari-tetragonum, viride. Stylus o. Stigma obtusum, nigrum. Siliqua pedicellata, longa. — Ab hac aliquibus differt *Cl. heptaphylla Meyer Fl. Essequib.* p. 222, ut jam ips. *Meyer* monuit, nam: caules ramique ubique aculeati, nec non petiolus et foliorum costa intermedia; aculei oppositi, divergentes, subrecurvati, nitidi, lutei. Foliola non lanceolata, sed oblonga, acuminata, basi attenuata. Cor. dilute viridis, nec alba. Petala non reflexa, sed recta, apice incurvata. Haec ad margines sylvarum plantationis Hamburg. ☉? — *Burmann* ad suum *Sinapistrum indicum spinosum*, foliis 5-7 numero incertis, quod nec amplius descripsit, nec depinxit, laudat *Lagansam albam Rumph*, quae inermis, aliisque notis abunde diversa, et quam *Loureiro* melius ad *icosandram* posuit. *Burmann* laudat etiam, praeter *Rajum*, *Tareriyam Marogr.* l. 1. c. 16. p. 34. (a *Rajo*, *Rheede* aliisque ad *Cl. pentaphyllam* ductam) et *Papaver corniculatum acre 5-folium*, americanum, flore carneo, majus, spinosum. *Pluk. Almag.* p. 280. Planta denique *Morisoni* hic adducta haud ita paucis iterum ablutit. „Rad. longa filamentis paucis; caulis 3-ped. circiter, valde ramosus. Folia inferiora lata, 5-7 na, oblonga, viridia, nervis venulisque multis, mollia et glutinosa: summa trifoliata, brevia, subrotunda. Pedunculi e foliorum floralium axillis longi. Calycis foliola parva, viridia, acuminata. Petala alba. Filamenta 6, 3-4 digitos transversos longa. Siliqua crassa, teres, 1½ unc. Semina plurima, subrotunda, alba, vix magnitudine seminis Sinapeos. Tota planta glutinosa, ad ramos vel ad petiolos spinulâ acutâ.“ An re verâ hujus loci? Confer *Obs.* ad *Cl. spinosam*.

20. *Cl. anomala Humb. et Bonpl.*; herbacea (?) inermis; ramis foliisque subtus hirtis, supra piloso-punctulatis, septenatis; foliolis sessilibus, oblongo-lanceolatis, acuminatis, glanduloso-serrulatis; floribus racemosis, secundis, hexandris; fructibus ellipticis, verrucosis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth V. p. 85.* *Cl. h. i. velutino-pubescentis; foliis septenatis; floralibus simplicibus, subcordato-rotundis; siliquâ ellipsoideâ, muricato-tuberculatâ. Decand. Prodr. I. p. 258.*

Rami teretiusculi, striati, piloso-pubescentes, canescentes. Folia sparsa, petiolata, digitata; foliola basi cuneato-angustata, venis primariis subparallelis, membranacea, subtus, praesertim in venis et nervo, hirta et pallidiora, 2½ poll. et ultra, 8 lin. lata; exteriora duplo triploque breviora. Petioli pollicares et longiores, (?) canescenti-hirti. Racemi terminales, bracteis subsessilibus, subrotundo-cordatis, obtusis, subtus hirtellis, pedicello duplo triploque brevioribus. Flores magnitudine *Cl. spinosae H. et B.*: pedicelli 4-lin., fructiferi paulo longiores et crassiores, hirtelli. Cal. hirtellus, laciniis ovato-oblongis, acutis, aequalibus, reflexis. Petala oblonga, longe unguiculata, obtusa, glabra, alba? apice cohaerentia? adjecto ungue 8-9 lin., 2 paulo breviora, ungue longitudine fere laminae. Stamina stipitis basi carnosae inserta, petalis duplo longiora. Filamenta glabra. Antherae lineares subarcuatae. Germen stipite inferne valde incrassato. Fructus longe stipitati, elliptici, suturis contrarie compressi, stigmatibus umbilicati, rugulosi. Semina reniformi-lenticularia, laevia. Stipes fructus fere 2 poll. *Kunth l. c. In nova Granata.*

21. *Cl. chilensis Dec.*; herbacea, inermis, glabra; foliis septenatis: floralibus 3-5-natis; calycis phyllis persistentibus; siliquâ pendulâ, glabriusculâ, thecaphoro vix longiore. *Decand. Prodr. I. p. 258.* *α. glabra: foliis septenatis. β. pubescens: foliis 3-5-natis.*

In Chili, ☉. Herb. Mus. Paris.

22. *Cl. longipes* Lamb.; herbacea, aculeata, glabra; foliis ternatis; siliquâ cylindraceâ, tenui, thecaphoro pedali dimidio brevior. *Decand. Prodr.* I. p. 259.

In *Huyaquil. Herb. Lamb.*

25. *Cl. spinosa*; aculeata, hexandra: staminibus juxta basin stipitis, germine aliquoties longioris, insertis; foliis 5-7-natis, acuminatis; bracteis racemi simplicibus, cordatis. *Ait. H. Kew. ed. II.* 4. p. 151. *Linn. Spec.* 959. *Willd. Spec.* III. p. 568. *Jacq. Coll.* III. 216. *Amer. p.* 190. *Swartz Obs.*

252. *Cl.* herbacea, aculeata, pubescens; foliis 5-7-natis, glabris: floralibus simplicibus, petiolatis, ovato-cordatis; siliquâ glabrâ thecaphoro longiore. *Decand. Prodr.* I. p. 259. *Marcgr. Brasil.* 35. t. 54.² *Brown Jam.* 275. *Cl. Erucago* *Mill. Dict. n.* 6. (fid. *H. Kew.*)

„Folia digitata, glabriuscula. Rami divaricati. Spinae e stipulis 2 foliorum, post eorum casum persistentes, induratae. Stamina flore longiora, sed non gynandra. *Linn.* Radix annua, ramosa, sordide albens. Caulis 2-3 ped., erectus, calamo gracilior, vix ramosus, teres. Stipulae 2 brevissimae, spinescentes, patentissimae vel recurvae, pungentes. Folia alterna, longe petiolata, inferiora 7-nata, superiora 5-nata, summa nonnunquam ternata: foliolis longe lanceolatis, utrinque acutis, integerrimis, venosis. Bractee ad pedicellos ovatae, acutae, integerrimae, breviter petiolatae, solitariae. Racemus terminalis, erectus, fere ped. Pedicelli unciales. Flores magni. Calycis foliola lanceolato-lineararia, reflexa, acuta. Petala oblonga, obtusa, plana, omnia sursum versa; unguibus longitudine calycis. Filamenta subulata, purpurea, petalis longiora, patula, ex receptaculo communi floris orta. Antherae lineares, erectae, virescentes, longae. Germen oblongum, teres, pedicellatum, staminibus paulo longius. Stylus brevissimus. Stigma peltatum, subrotundum. Siliqua teres, torulosa, 3 unc., gracilis, glabra. Semina plurima, nigra, subrotunda, compressa, plus minus cochleata. *Jacq. In pl. american.* divus *Jacquin* *Cl. spinosam fruticosam* dixit, 4-5-ped., erectam, ramosam, trunco diametro pollicis; ramis junioribus hirsutis. An haec eadem planta? An forte *pungens*, ad quam etiam pertinere videtur *Cl. spinosa Swartz?* In *America meridionali.* ☉.

Obs. *Cl. Erucago*, fl. hexandris, fol. septenis, caule spinoso, siliquis pendulis *Mill. Dict. n.* 6. (ad quod ducit *Herm. lugdb.* 564.) ad *Cl. heptaphyllum* potius spectare videtur, licet in *H. Kew.* (et etiam in *Bot. Mag.* 1640, ubi *pungens* et *spinosa* junguntur et excluditur syn. *spinosa* *Mill.* in *spinosa Willd.*) ducatur ad *spinosa*, 1^o quia descriptio quadrat; 2^o quia *Miller* *Cl. spinosa* sub n. 7. exhibet, descriptione omnino adaequatâ; 3^o quia *Cl. heptaphyllum* caret. *Cl. spinosa*: herbacea, glabra, aculeata; foliis quinatis: foliolis lanceolato-oblongis, inermibus; petiolis superne subaculeatis; floribus hexandris. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth V.* p. 33. ipso *Kunth* et *Decand.* dubia; cum clo. *Kunth l. c.* ex *Decandolle* adnotet: „aut *Cl. spinosa*, aut species proxima.“ Sic et nobis videtur, et *Bonplandiana* dicenda, si collatis sedulo speciminibus eruitur talis. In planta *Kunthii*: „Folia sparsa, longe petiolata, quinato-digitata, rarius ternata; foliola petiolata, apice angustata et obtusiuscula, basi cuneata, integerrima, reticulato-venosa, firmiter membranacea, glabra, laete viridia, 32-42 lin., 10-11 lin. lata; exteriora parum minora. Petioli 3-poll., superne interdum subaculeati partialesque glabri, 2 lin., basi membranacei et connati. Racemi terminales longissimi, rachi angulatâ glabrâ. Flores sparsi, longe pedicellati; pedicelli filiformes, glabri. Bractee subsessiles, reniformes, glabrae, pedicello 5-6-plo breviores. Cal. glaber, viridis; lacinae lineares, acutae, aequales, margine pilis minutis

glandulosis ciliatae demum revolutae. Petala lanceolata, obtusa, basi angustata et unguiculata, integerrima, alba, glabra, aequalia, apice cohaerentia, adjecto ungue 6-7 lin. Filamenta longissima, capillacea. Antherae 4-5 lin. Siliqua longissima, linearis, teres, tenuissime striata, virena, glabra, 4 fere poll., stipite sub 1½ poll. Semina reniformia, laevia, glabra, fuscescentia, magnitudine grani Sinapis. In ripa fluminis Magdalenae, prope Mompor. ☉.

24. *CL. horrida Martius*; herbacea? inferne glabra, superne pubescens; caulibus, petiolis foliolorumque nervis mediis spinis hamatis numerosissimis horridis; foliis quinatis: foliolis lanceolato-oblongis, acuminatis, nervosis; floralibus simplicibus, cordato-ovatis, brevissime petiolatis; germinibus glabris, saepius abortivis. *Marcg. Brasil. 33. t. 34?*

Caules erecti, pennâ gallinaceâ crassiores, teretes, basi glabri et obsolete striati, apice, ut videtur, viscido-pubescentes, pube brevissimâ tenui, ad foliorum ortum spinis 2 validis conicis, compressis, flavescens, patentibus vel recurvis, 1½ lin. longis. Petioli erecto-patentes, 2-3-poll., supra canaliculati, dorso striati, pube tenuissima, undique spinis compressis hamato-recurvis, flavicantibus, glabris, lin. longis, irregulariter positus. Folia alterna, omnia, quae vidimus, quinata; foliola brevissime petiolata, utrinque attenuata, integerrima, glabra, intense viridia, subtus pallidiora, intermedia majora 2 poll., lateralia minora, poll. circiter lata vel angustiora; subtus nervo medio costisque transversalibus parallelis prominentibus; nervo medio in foliolo intermedio plerumque spinis parvis hamatis. Racemi terminales, multiflori; rhachi angulatâ, puberulâ. Pedicelli longi, erecti, teretes, sub lente puberuli, inferiores 1½ poll., superiores breviores. Bractee subsessiles, vix acutae, nervosae, supra glabrae, dorso puberulae, inferiores basi spinis duabus parvis, 4 lin. longae, superiores minores, pedicello multoties breviores. Cal. sub lente tenuissime pubescens, viridis; lacinae lineari-lanceolatae, acutiusculae, aequales, primum erectae, dein reflexae et involutae, 1½-2 lin. Petala oblongo-lanceolata, obtusa, in unguem longum linearem angustata, integerrima, ut videtur, albida cum rubore quodam, adjecto ungue fere poll., glabra, ante expansionem apice cohaerentia. Filamenta longa, capillaria, glabra, petalorum ungui concoloria, in flor. abortivis breviora, ad thecaphori basin toro ovato magnitudine seminis Sinapeos inserta. Antherae lineares, 5 lin., flavae. Thecaphorum in floribus fertilibus 2 poll., in sterilibus cum germine petalis duplo fere brevius, glabrum, stamina superans, subfiliforme. Germen lineare, glabrum, thecaphoro multo brevius. Stigma depressum, capitatum. Proxima *CL. spinosae Humb. et Bonpl.*; sed spinis copiosissimis praesertim diversa. Ad specimen in *Herb. cli de Martius* a S. Princ. Max. Neuwied lectum. In Brasilia. ☉?

25. *CL. pungens Willd.*; herbacea, viscoso-pilosa; foliis quinatis septenatisve: foliolis oblongis aut lanceolato-oblongis, acuminatis; stipulis spinescentibus; floribus racemosis, hexandris. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth V. p. 85.* Cl. flor. hexandris; fol. quinatis, viscosis; caule spinoso *Willd. H. Berol. 1. p. 18. t. 18. (auct. Willd.) Ejusd. Enum. 2. p. 689.* Cl. herbacea, aculeata, pubescenti-viscosa; foliis 5-7-natis, glabris; floralibus simplicibus, sessilibus, cordatis; siliquâ gla-

glabrâ, thecaphoro brevior. *Decand. Prodr. I. p. 239.* CL. *spinosa* Poir. *Enc. IV. p. 320.* *Bot. Mag. t. 1640.* *Forst. G. M. V. t. 26.* *Sieb. Mart. 97.*

„Verisimiliter eadem ac CL. *pungens*; quamquam nostra pilosior et viscosior foliisque quinatis gaudeat. Folia a *Willdenow* constanter septenata (?) („nunquam septenata“ ait *Willd.*!) dicta in CLEOME *pungente*, observavi 5-7 nataque in specimine *H. Berlin.* — Viscosa, ramis angulatis, striatis, pilosis. Folia alterna longe, foliola breviter petiolata, basi subcuneata, integerrima, membranacea, utrinque, praesertim subtus, in venis et nervo pilis conspersa, 2-2½ poll., 8-10 lin. lata; extima 1½ poll. et breviora. Petioli 24-27 lin., canaliculati, basi aculeis 2 stipularibus, conico-subulatis, rectis, glabris, lin. longis. Racemi terminales 8 fere poll. Flores sparsi, (polygami), pedicelli 9 lin., rhachisque viscoso-pilosi. Bractee sessiles, approximatae, subrotundo-ovatae, obtusae, subcordatae, integerrimae, pilosiusculae, foliaceae, pedicello multo breviores. Cal. viscoso-pilosus, laciniis linearibus, aequalibus, corollâ triplo brevioribus. Petala alba, glabra, oblonga, obtusa, basi cuneata, et longe unguiculata, adjecto ungue 8 lin. Stamina basi stipitis inserta, corollam duplo triplo superantia. Filamenta glabra, (sanguinea), antherae angustissime lineares, (flavo-fuscae). Germen longe stipitatum, stamina aequans, lineare, glabrum, stipite filiformi, glabro. Stigma depresso-capitatum. Occurrit passim in herbariis nomine CL. *canadensis*, etiam in Schreberiano. Siliqua linearis, 4-poll., compressa, piloso-viscosa *Willd.* et in specim. junioribus nostris, glabra apud *Decand.* In America meridionali, in convalle *caracasana*, ad ripam flum. *Catoche*. ☉, culta etiam ♂ et ♀.

26. CL. *pubescens* Sims; herbacea, inermis, pubescens; foliis 5-7-natis: floralibus simplicibus, cordatis, sessilibus; siliquâ glabrâ thecaphori longitudine. *Decand. Prodr. I. p. 239.* CL. flor. 6-andris; staminibus basi stipitis insertis; bracteis oblongo-cordatis, simplicibus; calycibus reflexis; siliquis pendulis. *Sims Bot. Mag. t. 1857.*

Tota planta, praesertim caulis, pubescens. Radix annua. Caulis simplex, erectus. Foliola lanceolato-ovata, subtus parallele nervosa. Racemi simplices. Flores albi. Petalorum ungues laminis breviores. Stamina inferiori stipitis parti inserta. Filamenta longitudine naturali, adscendentia, lucide purpurea. Siliquae longae, pendulae. Patria? ☉.

27. CL. *psoraleaefolia* Dec.; herbacea, aculeata, pubescens; foliis ternatis, petiolis piloso-glandulosis: floralibus ovatis, petiolatis; siliquâ demum glabrâ, thecaphoro longiore. *Decand. Prodr. I. p. 239.* CL. *brasiliensis* *Weinm. Spreng. S. V. II. p. 121.* (quam confer!)
In Brasilia. *Herb. Mus. Paris.*

28. CL. *latifolia* *Vahl ined.*; herbacea, inermis, glabra; foliis infimis simplicibus, mediis ternatis, petiolatis: folioliis ovalibus, acuminatis; floralibus simplicibus, sessilibus, ovatis, pedicello dimidió brevioribus; thecaphoro pedicelli longitudine. *Decand. Prodr. I. p. 239.*
In Guiana. *Herb. Vahl.* ☉.
Syst. Vegetabil. Vol. VII.

29. *Cl. rosea Vahl ined.*; herbacea, inermis, glabra; foliis 5-foliolatis: infimis floralibusque 3-foliolatis, summis ovatis, sessilibus; siliquâ glabrâ, thecaphori longitudine. *Decand. Prodr.* 1. p. 259. *Bot. Reg.* n. 960.

Undique glaberrima. Caulis erectus, ramosus, 1½ ped., inermis, angulatus, alte sulcatus, atrovirens, purpureo-livescens. Petioli longi (superiores pollicis) patentis, sulcati, purpurascens. Folia superiora et inferiora ternata, intermedia quinata, suprema simplicia: foliola ovali-lanceolata, utrinque acuminata, alte penninervia, venis subtus coloratis: summa simplicia, sessilia, bractearum loco, cordato-ovata, obtusa. Racemus terminalis, corymbosus, pedicellis filiformibus, longis, rigidis, patentibus. Cal. foliola ovata, acuminata. Petala rosea, ovata, integra, (½ poll.). Torus carnosus, hemisphaericus. Stam. subaequalia, patentia (¾ poll.). Germen cylindricum, sub lente scabriusculum, stipite filamentorum fere longitudine. Stigma (roseum) ovario angustius. *Lindl. Ad Rio Janeiro Brasiliae.* ☉.

30. *Cl. purpurea Lamb.*; herbacea, inermis, glabra; foliis ternatis quinatisque: floralibus summis simplicibus, ciliatis; germine glabro thecaphoro duplo longiore. *Decand. Prodr.* 1. p. 259.

An ad sectionem sequentem? *Dec. In Peruvia. Herb. Lambert.*

31. *Cl. nummularia Dec.*; herbacea, inermis, pubescens; foliis superioribus simplicibus, petiolatis, orbiculatis; germine glanduloso, pubescente; siliquâ demum glabrâ thecaphoro longiore. *Decand. Prodr.* 1. p. 259.

Pars plantae inferior ignota. *Dec. In Brasilia. Herb. Mus. Paris.*

II. *Siliquaria: toro parvo; thecaphoro brevi aut nullo.*

a. *Foliis simplicibus:*

32. * *Cl. monophylla*; herbacea, pubescens; foliis simplicibus, petiolatis, lanceolatis, basi obtusis; siliquâ puberulâ subsessili. *Decand. Prodr.* 1. p. 259. *Linn. Fl. zeyl.* p. 110. *Willd. Spec.* III. p. 571. *Mill. dict.* n. 8. *Poir. Enc.* IV. p. 323. *Hort. Kew. ed. 2.* IV. p. 132. *α. malabarica.* Tsieru Veela. *Rheede malab.* IX. t. 34. *β. zeylanica.* Sinapistr. zeyl. viscos., folio solitario, flore flavo, siliquâ tenui. *Burm. zeyl.* 217. t. 100. f. 2.

Linnaeus utrasque varietates conjunxit, uti *Willdenow* et *Poiret*: *Decandolle* l. c. distinxit. *α.* quod describitur apud *Rheede* l. c. radice albicante, fibrosâ; caulibus viridibus, pilosis, intus parum lignosis; foliis oblongo-angustis, cuspidatis, pilosis; petiolis pilosis viridibus; floribus axillaribus, oblongo-rotundis, dilute rubris; calycis foliolis oblongo-angustis, cuspidatis, rubescentibus; staminibus 5 albicantibus; antheris oblongis, viridi-caeruleis; germine piloso, viridi, cuspidate rubescente, incurvo; siliquis oblongo-angustis, teretibus, cuspidatis, pilosis, striatis, viridibus. apud *Poiret*: Rad. sublignosa. Caulis herbaceus, rectus, striatus.

tus, villosus, apicem versus ramosus. Folia longa, angusta, simplicia, subvillosa, viscosa, acuta, tenuissimo denticulata: petioli folio breviores, ($\frac{1}{2}$ unc.). Bracteae similes foliis, sed minores; petiolo brevissimo. Cal. parvus, villosus, foliolis 4 linearibus. Cor. flava, rubro tincta. Stam. 6 longitudine petalorum. Antherae caeruleo-virentes. Germen sessile. Siliqua tenuis, cylindrica, subvillosa, striata, acuta. *Poir.* Caulis ped. teres, hirsutus. Folia alterna, sparsa, oblonga, acuminata; petiolis $\frac{1}{2}$ unc.. Flores e summorum foliorum axillis, plerumque solitarii; pedunculo tenui. *Burm.* Icon a *Burm.* data nullo modo similis plantae *Rhœdianae*. Species affinis, sed distincta, nec tamen descripta, in *Brown App. to Denh. et Clapp.* In India: *Malabar et Zeylona.* ☉.

33. *Cl. cordata Burch.*; subherbacea, pubescens; foliis simplicibus, breviter petiolatis, lanceolatis, basi cordatis; siliquâ puberulâ, subsessili. *Decand. prodr. I. p. 239.* *Burchell Cat. n. 2374.*

An satis distincta a *monophylla*? *Decand. Sprengel S. V. p. 123.* sine dubio conjunxit cum *monophylla.* In *Prom. b. spei.*

34. *Cl. glauca Dec.*; herbacea, glabra, glauca; foliis petiolatis, ovatis: floralibus ellipticis; siliquis pendulis, laevibus, breviter stipitatis; seminibus hirsutis. *Decand. Prodr. I. p. 239.*

In *Arabia. Herb. Mus. Paris. 4.*

35. *Cl. glaucescens Oliv. et Brugu.*; herbacea, glabra, glauca; foliis petiolatis, ovatis: floralibus ellipticis; siliquis pendulis, striatis, breviter stipitatis; seminibus glabris. *Decand. Prodr. I. p. 239.*

Sprengel S. V. II. p. 123. conjunxit cum *glauca*, quamvis somina omnino diversa. Inter *Bagdad et Mossul. Olivier et Bruguiera. 4.*

36. *Cl. quinquenervis Dec.*; herbacea, subpubescens, glauca; foliis petiolatis, cordatis, quinquenervibus: floralibus minimis; siliquis sessilibus, ovali-oblongis, glanduloso-asperis; seminibus glabris. *Decand. Prodr. I. p. 239.*

In *Persia. Herb. Mus. Paris. ☉?*

37. *Cl. scaposa Dec.*; herbacea; foliis subradicalibus petiolatis, rotundo-ovatis, strigoso-pilosis; scapo nudo, aspero; bracteis minimis; siliquis erectis, sessilibus, glabris. *Decand. Prodr. I. p. 239.*

Stam. 4? Habitus fere *CARDAMINES.* *Dec.* In *Aegypto. 4.*

38. *Cl. droserifolia Del.*; fruticosa, strigoso-pilosa; foliis petiolatis, obovato-orbiculatis, trinervibus, piloso-glandulosis; siliquis sessilibus, oblongis, pilis apice glandulosis hispidis. *Decand. Prodr. I. p. 239.* *Delile Fl. aeg. t. 56. f. 2.*

Cl. Roridula Poir. Enc. Suppl. IV. p. 4. *RORIDULA Forsk. Aeg. p. 35.* *R. tetrandra, Vitm. Summ. II. p. 48.* *RORIDA*

S. Veg. ed. nostr. III. p. 13. (quam deleas ibidem et huc transfer.).

In Aegypto. 4.

59. *Cl. guyanensis Aubl.*; herbacea, glabra (erecta); foliis simplicibus, filiformi-linearibus, sessilibus: (floralibus pedicello longioribus); floribus axillaribus, solitariis, hexandris (?); (siliquis subsessilibus, laevibus). *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth V. p. 83. Aublet Guj. 2. p. 675. t. 275. (auct. Herb. Juss.) Lam. Enc. IV. p. 323. Willd. Spec. III. p. 570. Decand. Prodr. I. p. 241.*

7-8 poll. (ped. *Aubl.*). Caulis erectus, superne ramosus, teres, ramis sparsis, angulatis, filiformibus, subfastigiatis, patulis. Folia sparsa, acuta, integerrima, enervia, glabra, 8-9 lin.. Flores pedunculati magnitudine *ABERNARIAE trinerviae*; pedicellis capillaceis, glabris. 4 lin.. Cal. laciniis linearibus, acuminatis, aequalibus. Pet. lutea, oblongo-lanceolata, calycem superantia. Stam. 8., (6 *Aubl.*), corollam subaequantia: 4 alterna sterilia, glandulifera. Antherae lineares. Stigma subsessile, capitatum. Siliqua linearis, acuminato-subulata, suturis parallele compressa, laevis, viridis, unilocularis, oligosperma, 4-5 lin., $\frac{2}{3}$ lin. lata. Semina subechinato-scabra, cinerea. *Kunth l. c. Prope Carichana, ad ripam Orinoci.* ☉.

40. *Cl. procumbens Jacq.*; herbacea, glabra, procumbens; foliis lanceolato-linearibus: floralibus pedicello fere brevioribus; siliquis sessilibus, teretibus, subtorulosis. *Decand. Prodr. I. p. 246. Cl. hexandra, glaberrima; fol. simplicibus, lanceolatis; caule diffuso. Hort. Kew. ed. II. IV. p. 133. Willd. Spec. III. p. 571. Jacq. Amer. 189. t. 120. Swartz Obs. 253. Leuc. sylvestre luteum Sloane Hist. I. t. 125. Brown Jam. 273. 2.*

Radix forte plus quam annua. Caules e radice fusiformi plures herbacei, ramosi, glabri, toti procumbentes in orbem. Folia lanceolata, acuta, integerrima, glabra, petiolata, alterna, 7-8 lin. Pedunculi uniflori, alares, solitarii. Flores parvi, flavi. Cal. deciduus: foliolis lanceolatis, concavis, acutis, patentibus, aequalibus. Petala ovalia, plana, utrinque acuta, patentia, calyce duplo longiora. Glandulae nectariferae nullae. Filamenta 6, subulata, erecta, aequalia, petalis paulo breviora. Antherae oblongae, erectae. Germen oblongum, erectum. Stylus brevis, persistens. Stigma crassiusculum, obtusum. Siliqua longa, stylo acuminata. Semina plurima, reniformi-subrotunda. *Jacq. Apud Swartz, cujus planta siliqua pedicellata differre videtur: caulis 2 poll. $\frac{1}{2}$ ped., procumbens, adscendens, suffrutescens, ramosus; rami erectiusculi, glabri. Pedunculi petiolis longiores, purpurascetes. Flores lutei, post florescentiam fulvi vel rubri. Cal. hians. Petala unguiculata. Filamenta longitudine petalorum. Antherae ovatae, nigricantes, revolutae. Germen subpedicellatum, acuminatum, compressum. Stylus subulatus, crassus. Siliqua pedicellata, erecta. Sem. echinata, nigra. *In Caribaeorum aridis sabulosis, praesertim in Hispaniola.* 4.*

b. *Foliis 3-5-7-natis:*

41. * *Cl. tenella*; herbacea, glabra; foliis ternatis: foliolis

linearibus, petiolo duplo longioribus; floribus hexandris; siliquis sessilibus, tenuibus. *Decand. Prodr.* I. p. 240. *Linn. Suppl.* 500. *Retz Obs.* IV. p. 28. *Willd. Spec.* III. p. 570. *Pluk. phyt.* t. 224. f. 5.

Spithamaea, ramosa, erecta. Foliola sessilia, longitudine petalorum. Siliquae lineares. *Linn.* Foliola petiolis longiora (4-5 lin. *Decand.*), impar lateralibus longius. Pedicelli solitarii in matura siliqua longitudine petiolos aequant. Cor. lutea. Stam. 6. *Retz.* In aridis arenosis Indiae orientalis. ☉.

42. *CL. tetrandra Banks Herb.*; herbacea, glabra; foliis ternatis: foliolis linearibus, petiolo triplo longioribus; floribus tetrandris; siliquis sessilibus, tenuibus. *Decand. Prodr.* I. p. 240.

Foliola 2-3 lin. longa. In nova Hollandia. *Herb. Banks.* ☉.

45. *CL. multicaulis Fl. mex. ic*; herbacea, glabra; foliis omnibus sessilibus, ternatis: foliolis oblongo-linearibus, obtusiusculis; floribus hexandris; siliquis brevissimis, stipitatis. *Decand. Prodr.* I. p. 240.

In Mexico. ☉.

44. *CL. secundiflora Schrad.*; herbacea, glanduloso-pubescens; foliis ternatis: foliolis ovali-lanceolatis; racemi pedicellis secundis foliis floralibus plus duplo longioribus; capsulis linearibus, nodulosis, deflexis. *Schrader in litt.*

Affinis *CL. violaceae*. Caulis spithamaeus, subdivisus; ramis subsecundis. Foliola supra glabra, subtus ut reliquae partes pilis guttuliferis; intermedio 8-9 lin., subsessili; lateralibus paulo minoribus, sessilibus. Racemus secundus; pedicellis $\frac{1}{2}$ poll. Petala omnia unguiculata, subrotundo-ovata, alba, rarius carnea. Stam. 6. Torus glandulâ latâ instructus. Caps. siliquaeformis, poll. circiter, magis vel minus curvata. *Schrader in litt.* Hab. ? ☉.

45. **CL. violacea*; herbacea, glanduloso-pubescens; foliis ternatis: foliolis foliisque summis linearibus; siliquis sessilibus, puberulis, deflexis, linearibus, stylo brevi acuminatis. *Decand. Prodr.* I. p. 240. *CL. hexandra*; calyce petalisque

inaequalibus; foliis ternatis, lanceolato-linearibus: floralibus omnibus simplicibus; siliquis teretiusculis; seminibus glabriusculis. *Hort. Kew. ed. 2. IV. p. 132.* *Linn. Spec.* p. 940. *Roth Beytr.* II. p. 93. *Willd. Spec.* III. p. 569. *Poir. Enc.* IV.

p. 521. *Lam. ill.* t. 567. Fig. 2. 5. *Schkuhr Handb.* t. 189. f. b. (excl. syn. *Gaertn.*) *CL. lusitanica Mill. Dict.* n. 3.

SINAPISTRUM violaceum Mönch. Meth. Suppl. p. 85. Trifol. siliquos., fl. violaceo, lusitanicum. *Barr. ic.* 866. β . *Sinapistrum peregr. alter. fl. luteo.* *Barr. ic.* 865.

Viscoso-pubescens. Folia subaequalia. Pedunculi laeves. Cal. luteus, apicibus purpurascens. Petala 2 superiora atropurpurascens, atomis flavis: lateralia 2 cordata, unguiculata, crenata, concoloria. Antherae purpurascens. Receptaculum supra stamina glandulis 3 flavis, globosis. Stam. Pistill. declinata.

Willd. Caulis nunc rectus nunc flexuosus, 1-2 ped.; ramis erectiusculis teretibus. Petioli longi. Folia $\frac{1}{4}$ -2 poll., 1-2 $\frac{1}{2}$ lineata, obtusa, basi attenuata, glabra, rarius pilosiuscula, ad margines ciliata. Folia floralia breviter petiolata, rarius sessilia, ceterum similia vel paulo latiora. Flores breviter pedunculati, solitarii in racemo laxo. Germen sessile, stamina superans, curvum, stigmatibus sessili. Siliquae teretiusculae, viscoso-pubescentes, deflexae, juniores quidquam curvatae, 2-2 $\frac{1}{2}$ poll., tenues. Semina reniformi-subrotunda, obscure olivacea, sub lente papillosa. In Lusitaniae sabulosis vinetis de Almada et Caparica trans Tagum. Brot. ☉.

46. *CL. deflexa* Ruiz et Pav.; herbacea, glanduloso-subpubescens; foliis ternatis: foliolis foliisque summis oblongo-linearibus; siliquis sessilibus, deflexis, glabris, acuminatis. *Decand. Prodr. l. p. 240.*

Affinis violaceae, quacum, cum ? licet, junxit *Sprengel S. V. II. p. 124.* Vix a quibusdam *CL. violaceae* formis distinguenda. *R. Brown in App. to Denham et Clappert. Voy. In Peruvia.* ☉ *Ruiz et Pav. in Herb. Lamb.*

47. **CL. ornithopodioides*; herbacea, glanduloso-pubescentis; foliis ternatis: foliolis oblongo-linearibus, petioli longitudine; siliquis subsessilibus, deflexis, puberulis, stylo apiculatis, oblongo-linearibus. *CL. Dilleniana Decand. Prodr. l. p. 240. Spreng. S. V. II. p. 124. CL. ornithopodioides; flor. hexandris, fol. ternatis: foliolis ovato-lanceolatis. Linn. Spec. 940. Willd. Spec. III. p. 569. (uterque excl. syn. Buxbaum, quod ad Stevensianam vel ibericam). Sibth. Fl. graec. t. 650. CL. hexandra; fol. ternatis, oblongo-lanceolatis, obtusis: floribus plerisque simplicibus; siliquis pendulis, sessilibus, torulosis; seminibus glabris. Hort. Kew. IV. p. 132. Sinapistr. orient. triphyll., ornithopodii siliquis. Dill. Elth. 359. t. 266. f. 345. Tournef. Inst. p. 17.*

Annua, 1-2 ped.. Caules teretes, erecti, dilute virentes, simplices, ramosique; pilis brevibus rigidiusculis. Folia graveolentia, oblonga, obtusa; petiolo $\frac{1}{2}$ unc. aspero; foliolis plerumque reflexis, utrinque pallide glaucescentibus, subasperis, pilis brevibus, crebris, in junioribus tantum conspicuis. Flores e summorum foliorum axillis, parvi, flavi, irregulares, solitarii. Pedicelli tenues, horizontales. Cal. parvus, regularis. Petala 4 parva, obtusa, aequalia, sed inaequaliter disposita. Stamina quidquam inflexa, antheris parvis croceis. Germen incurvatum, Siliqua subhirsuta, matura torulosa. *Dillen. In Oriente.* ☉. *Obs. Poir. Enc. IV. p. 331. et Dillen. et Burb. C. 1. t. 9. f. 9. laudat ad ornithopodioidem suam, et descriptio ex utriusque planta constata videtur. Jam Dillen. dubitavit, utrum planta sua eadem cum illa Buxbaumi. CL. ornithopodioides Mill. Dict. n. 2. a planta Dilleni differre videtur, licet Miller Linnaeam et Tournef. laudet; petala enim rubra; siliquas tenerae, 3 poll., torulosas.*

48. *CL. cardaminoides C. a Hoffm. segg.*; caule, petiolis germinibusque glanduloso-hirtis; foliis ternatis: foliolis oblongo-cuneiformibus; floribus terminali-axillaribus. *Com. a Hoffmann segg 2. Nachtr. p. 93. CL. canadensis Hortul.?*

Caulis subramosus, fere ped.. Folia fere 2 poll.; foliola fere poll., 4 lin. lata, obtusa, glabriuscula, glanduloso-subciliata, costâ subtus sparsim scabriusculâ. Flores pedunculati, pedicello 4-5 lin.. Calycis foliola lin., ovata aut oblonga. Petala 2 lin., alba, ungue virente. Stamina corollam subaequantia. Germen fusiforme, stamina subaequans, violascens, glandulositate virente. *C. arabicae* valde affinis; at petala non lutea, apice purpurea. An *Cl. Dilleniana* Dec. ?; sed foliola minime oblongo-lineararia. *C. a Hoffms.* *Hab. ? Verisimiliter in Prom. b. spei.* ☉.

Obs. Poir. Enc. IV. p. 319 notat varietatem *Cl. dodecandrae* in *H. paris.* nomine *Cl. canadensis* cultam, omnibus partibus eadem majorem, magis ramosam, sed foliis aequo ternatis, floribus axillaribus, licet numerosioribus; calyce purpurascens; petalis emarginatis; stam. 12-15; siliquis sessilibus, junioribus villosis; plantam graveolentem. An haec eadem? An illa de qua in nota ad *dodecandram*?

49. **Cl. arabica*; herbacea, glanduloso-pubescentis; foliis ternatis: foliolis oblongis; siliquis subsessilibus, puberulis, oblongis, deflexis; seminibus hirsutis. *Decand. Prodr. I. p. 240.* *Cl. fl. hexandris*; fol. simplicibus, subrotundo-ovatis; siliquis gladiatis. *Linn. Spec. 939. Amoen. acad. IV. p. 281.* *Cl. fl. hex.*; fol. ternatis, lanceolatis, obtusis; siliquis fusiformibus, viscoso-scabris. *Linn. Dec. 3. t. 8. Roth Beytr. II. p. 94. Willd. Spec. III. p. 569. Poir. Enc. IV. p. 321.* *Cl. hex.*; fol. ternatis, lineari-lanceolatis; siliquis pendulis; seminibus hirsutissimis. *Hort. Kew. IV. p. 132.* CLEOME (*Siliquaria*) *arabica* *R Brown* in *App. t. Denh. et Clappert. Voy. Cl. hexandra* *Steud. Nomencl. Siliquaria glandulosa* *Forsk. descr. 78. ic. t. 16. B. Sinapistrum lanatum* *Mönch Method. p. 250. Shaw. afr. p. et fig. 558.*

Viscoso-scabra, 2-ped., annua. Petioli longitudine foliorum. Folia sessilia, subtus scabra: floralia simplicia. Petala lutea, apice purpurea. Siliquae nutantes, subdiaphanae. *Linn. fil.* Maxime affinis *Cl. violaceae*, sed siliquâ brevioris magis torosâ, praeter characteres datos distincta. Caulis 2-ped.. Foliola subtus aspera, obtusa, (plerumque integerrima, rarius) denticulata. Petioli longitudine foliorum (vel breviores). Folia floralia simplicia, subinde nulla. Cal. hispidus. Petala flava, apice purpurascens, calyce duplo longiora. Siliqua diaphana, obtusa, brevis, apice incurva, pendula. *Poir.* Radix fusiformis, forte annua. Caules diffusi, ramosi, teretes, cubitales, virides, scabri glandulis fuscis. Folia alterna, ternata, simplicia, undique glandulis scabra; foliolis oblongis, obtusis, integris, lateralibus brevioribus. Petiolus supra canaliculatus. Racemi terminales, foliosi, spithamaei. Pedicelli folio solitario suffulti, aliis foliis interjectis, 1-flori. Calyx viridis, glandulosus; foliolis lanceolatis, persistentibus, infimo latiore. Cor. albida, venis luteis, apice ferrugineo-nebulosa; petala ad latus superius posita, calyce longiora, unguibus filiformibus, laminâ ovato-oblongâ, obtusâ, erectâ. Filamenta aequalia, subulata, incurva, corollâ breviora, flava. Antherae ovatae, erectae, ferrugineae. Stylus filiformis. Stigma capitatum. Siliquae cylindraco-subulatae, pendulae, virides, glandulosae, 1½ poll.. Semina fusca, villis albis. *Forsk.* In *Arabia.* ☉.

50. *Cl. iberica* *Dec.*; herbacea, glanduloso-pubescentis;

foliis ternatis, breviter petiolatis; siliquis breviter stipitatis, puberulis, subpendulis, torulosis, vix pedicello floris longioribus. *Decand. Prodr.* I. p. 240. *Cl. ornithopodioides Marsch. a Bieberst. Fl. Taur. cauc.* II. p. 150. (excl. syn. *Linn.* et *Dill. Elth.*). *Cl. ornithopodioides iberica Marsch. a Bieberst. Supp.* p. 452. *Buxb. Cent.* I. p. 6. t. 9. f. 24. (fide *M. a Bieb.*, sed quoad ic. potius ad *Cl. Stevensianam*).

„Folia floralia infima ternata, pleraque simplicia. Cal. luteo-viridis, margine violaceus. Petala alba, maculâ disci magnâ, atro-violaceâ. Pedicelli fructus purpurei, glabriusculi, in quibus siliqua ipsis paullo longior, recta, striata, torulosa parum nutat. Semina globosa, fusca, ad lentem punctis plurimis prominulis. Taurica planta pilis omnium partium glanduliferis praepollens, folia quoque quam iberica paullo angustiora et acutiora saepissime conduplicata habet. Caeteris ambae conveniunt. *M. a Bieb. Suppl.* In Iberia circa Tiflin. ☉.

51. *Cl. Stevensiana*; herbacea, glanduloso-pubescentia; foliis ternatis, breviter petiolatis: foliolis oblongo-linearibus; siliquis breviter stipitatis, puberulis, subpendulis, torulosis, pedicello floris triplo longioribus. *Cl. virgata Decand. Prodr.* I. p. 240. et hoc teste: *Buxb. Cent.* I. t. 9. f. 2 (ni forte ad *ibericam*).

Nomen mutandum, cum antiquior *Cl. virgata Thunb.* In Persia boreali. ☉.

52. *Cl. brevisiliqua*; suffruticulosa, junior glandulosa, adulta glabra; foliis ternatis: foliolis ovali-oblongis, crassis; siliquis sessilibus, ovato-teretibus, styliferis. *Cl. brachycarpa Vahl Decand. Prodr.* I. p. 240. *Cl. ornithopodioides Forsk. Fl. arab. n.* 402. p. CXVI.

Cls Sprengel S. V. p. 121 peruvianam tantum *brachycarpam Vahl* (quae GYNANDROPSIS) adduxit; hanc vero prorsus neglexit. Nomen mutandum erat, cum GYNANDROPSIS nobis CLEOME. *Fragrans Forsk.* In Arabia. In *Herb. Banks et Vahl.* 4.

53. *Cl. foliosa Oliv. et Brugu.*; herbacea, glabra, glauca; foliis subsessilibus, ternatis: foliolis foliisque summis suborbiculatis; siliquis subsessilibus, oblongo-linearibus, piloso-glandulosis. *Decand. Prodr.* I. p. 241.

In Persia. ☉ *Olivier et Bruguère in Herb. Mus. Paris.*

54. *Cl. canescens Stev.*; herbacea, glaucescens, substrigoso-pubescentia; foliis ternatis: foliolis foliisque summis oblongo-linearibus; siliquis stipitatis, puberulis, erectiusculis, torulosis, pedicello floris aequalibus. *Decand. Prodr.* I. p. 241. In Tauria meridionali. *Steven.*

55. *Cl. parviflora Brown*; herbacea, glanduloso-pubescentia; foliis ternatis: foliolis foliisque summis elliptico-ovatis; siliquis sessilibus, oblongis, glanduloso-pubescentibus, sty-

liferis, pedicello floris subbrevioribus. *Decand. Prodr.* I. p. 241. *Brown in Salt Abyssin.* p. 65.

In Abyssinia. ☉ *Salt in Herb. Banks.*

56. *CL. aspera König*; herbacea, piloso-aspera; foliis ternatis: foliolis oblongis; siliquis sessilibus, teretibus, glabris, stylo acuminatis. *Decand. Prodr.* I. p. 241.

Habitus *CLEOMIS felinae* (*POLANISIAE Dec.*); sed hexandra. *Dec. In Coromandelia.* *König inèd.*

57. *CL. flava Banks*; herbacea, glanduloso-pubescens, subglauca; foliis inferioribus quinatis, superioribus ternatis: foliolis oblongis; siliquis sessilibus, striatis, glanduloso-puberulis. *Decand. Prodr.* I. p. 241.

In Nov. Hollandia. ☉ *Herb. Banks.*

58. *CL. rytidosperma Dec.*; herbacea, glabra; foliis omnibus ternatis: foliolis ovali-oblongis; siliquis glabris, stipitatis, elongatis, apiculatis. *Decand. Prodr.* I. p. 241.

Habitus *CLEOMIS triphyllae*; sed torus minimus, non elongatus. *Dec.*

In Tabago? ☉.

59. **CL. polygama*; herbacea, glaberrima, inermis; foliis ternatis: foliolis lanceolatis, acuminato-mucronatis, argute denticulatis, intermedio majore; floribus hexandris. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth V.* p. 83. *CL.* floribus superioribus masculis tetrandris; fol. ternatis: foliolis sessilibus margine subaculeatis. *Linn. Spec.* 959. (auct. *Decand.* monente *Kunth l. c.*). *Willd. Spec.* III. p. 568. *CL.* herbacea, glabra; foliis petiolatis: inferioribus simplicibus, ceteris ternatis: foliolis ovato-lanceolatis, acuminatis, subserrulatis; siliquis subsessilibus, teretibus, glabris. *Dec. Prodr.* I. p. 241. *α. Sloane Jam.* I. t. 124. f. 1.

„Planta sicca mihi visa unica, caule erecto, laeviusculo, parum ramoso. Folia longius petiolata: foliolis ovato-lanceolatis, margine aculeis vix conspicuis scabris, sessilibus. Racemi longi: flore infimo fertili, reliquis minutis, tetrandris, masculis. Siliqua intra calycem sessilis.“ *Linn.* Erecta, ramosa, 2-5-ped., glaberrima. Folia alterna longe petiolata; foliola basi acuta, subintegerrima, venis primariis subparallelis membranacea, lacte viridia, intermedium brevissime petiolatum, 5 fere poll., 8-9 lin. latum; lateralia sessilia, 2 fere poll. Petioli 1½-2 poll., canaliculati. Racemi terminales 6-8 poll. Flores sparsi, longe pedicellati, magnitudine *CARDAMINES pratensis*, bracteis minutissimis capillaco-subulatis. Pedicelli filiformes, 4-5 lin.; fructiferi paulo longiores. Cal. laciniis lanceolatis, acutis, subciliato-denticulatis, aequalibus, corollâ triplo brevioribus, virentibus. Petala oblonga, obtusa, basi angustata, subunguiculata, alba, aequalia, subaequantia stamina. Antherae flavidae. Stigma subcapitatum. Siliquae suturis parallele compressae, utrinque attenuatae, brevissime stipitatae, striatae, virides, 2½ poll.; placentae 2. Semina reniformi-subglobosa, verrucoso-asperata, fusca, magnitudine grani *Sinapis*. *Kunth l. c.* *In convalle fluminis Magdalenae prope Badillas et prope Campeche.* ☉?

60. *CL. serrata* Jacq.; floribus hexandris; foliis ternatis: foliolis lineari-lanceolatis, serratis. *Linn. Spec.* 939. *Jacq. amer.* 26. ic. t. 190. f. 43. pict. t. 262. f. 73. *Willd. Spec.* III. p. 568. *CL. polygama* β *Decand. Prodr.* I. p. 241. (clo *Sprengel* nequidem varietas).

Planta annua, erecta, 2-ped.. Racemi laxi, simplices, terminales. Corolla alba. Stamina tetradynama. Siliqua teres, 2 poll. *Jacq.* In *America meridionali*; in sylvaticis *Carthagenae*. ☉.

61. **CL. aculeata*; herbacea, glabra; stipulis spinescentibus; foliis ternatis: floralibus ovatis; siliquis substipitatis, teretibus, torulosis, glabris. *Decand. Prodr.* I. p. 241. *CL.* floribus hexandris; fol. ternatis, integerrimis; stipulis spinescentibus. *Linn. Syst. Nat.* 3. p. 232. *Roth Beytr.* II. p. 95. *Willd. Spec.* III. p. 568. *Poir. Enc.* IV. p. 319. *Houtt. Linn. Pflanz. Syst.* 8. p. 385.

Caulis herbaceus. Stipulae binae, brevissimae, spinescentes, recurvae. Folia elliptico-lanceolata, longius petiolata: floralia ad basin pedunculi simplicia. Flores solitarii, pedunculati, parvi. Siliquae teretes. *Linn.* (qui in *Spec.* non adduxit). Caulis parum elevatus, villosus, subflexuosus. Spinae flavae. Petioli subvillosi. Folia acuta, subciliato-spinosa; petiolis propriis brevissimis. Petala pallide flava, unguiculo filiformi, longitudine limbi. Calycis foliola 4, decidua, lanceolata, acuta, tomentosa, albida. Stamina corollâ breviora, receptaculo inserta. Siliquae sessiles, pilis albis. *Poir.* In *Herb. Schreb.* siliquae glabrae. In *America*. ☉. *D. Zoesga.*


Obs. *CL. aculeata* *Desv.*; caule pubescente, ramosissimo; fol. ternatis: foliolis ovato-acutis, integerrimis, subpubescentibus; stipulis aculeiformibus, brevibus; floribus parvis, hexandris, axillaribus; siliq. sub-2-poll. *Hamilt. Prodr. pl. Ind. occ.* p. 48. ex *Hispaniola* in *Herb. Desv.* vix hujus loci, cum siliquae 2-poll., quae in *CL. aculeata* *Linn.* breves. An forte species distincta?

62. *CL. Houstoni* *Brown H. Kew.*; herbacea, glanduloso-velutinā, stipulis petiolisque spinescentibus; foliis ternatis quinatisque: floralibus ovali-oblongis; siliquis breviter stipitatis, glanduloso-velutinis. *Decand. Prodr.* I. p. 241. *CL.* *aculeata*, glanduloso-pubescentis, hexandra; staminibus basi stipitis germine brevioris insertis; fol. 5-3 nisque: floralibus simplicibus; siliquis breviter pedicellatis; stigmatibus dilatato. *Ait. Hort. Kew. ed. 2.* IV. p. 131. Sinapistr. ind. spinos. flore carneo. *Martyn dec.* 45.

In *Jamaica*. ☉.

63. *CL. brasiliensis* *Wein.*; suffruticosa, piloso-glandulosa; stipulis petiolisque spinescentibus; foliis inferioribus 3-, superioribus 5-natis: nervis intermediis subtus spinescentibus; floralibus subcordatis, acuminatis, breviter petiolatis; siliquis pedicellatis. *Weinm. in Sylloge* I. p. 122. II. p. 169.

Caulis 2-3 ped., ramosus, subangulatus, uti tota planta pilis longis brevibusque glanduliferis graveolens; rami alterni, erecto-patuli, rigidi, cauli similes. Folia alterna, petiolata; foliola intermedia

elliptica, acuminata: lateralia oblique cordato-ovata, omnia margine undulato-crispata, 1-3 unc., nervosa. Petioli teretes, superne paululum carinati, 2-4 unc., oblique patentés. Stipulae breves, recurvae, viridi-flavescentes. Racemi simplices, foliosi. Pedunculi $\frac{3}{4}$ unc., horizontaliter patentés. Flores parvi. Folia floralia simplicia, cordata, acuta, petiolis 2-3 lin. Calycis foliola lanceolata, acuminata, patula, lin. Petala adscendentia, albescenti-viridia, elliptica, obtusa, 3-4 lin. Stam. corollâ longiora, inaequalia. Antherae oblongae polline fusco. Stigma subglobosum. Siliqua teres, recurva, $1\frac{1}{2}$ unc. et longior. Proxima videtur *Cl. Houstoni*. *Weinm.* A *clo. Sprengel* huc trahitur *Cl. psoraleaefolia* *Decand.* sequente diagnosi: *Cl. brasiliensis*; caule fruticoso, glanduloso-piloso; fol. ternatis quinatisve, margine undulato-crispis; stipulis spinescentibus; foliis floralibus cordatis. *S. V. II. p. 121.* *In Brasilia. Culta h, spontanea*  videtur.

64. *Cl. malhadensis* *Martius*; suffruticosa, glanduloso-pubescens, aculeata; foliis omnibus ternatis: foliolis ovatis, acutis; lateralibus basi obliquis, planis, nervo medio inermi; floralibus simplicibus, ovatis, breviter petiolatis; staminibus longitudine corollae; siliquis linearibus, glaberrimis, thecaphoro multoties longioribus. *De Martius Flor. Brasil. ined.*

Caules erecti, 3-ped.; ramis subdichotomis, teretibus. Aculei compressi, recurvi, flavescentes. Foliola brevissime petiolata, pube brevi glandulosâ, subtus nervosa, breviter petiolata, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., poll. lata. Petioli communes supra canaliculati, $1\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ poll. Flores pauci, parvi, sordide flavi. Pedicelli erecto-patentes, filiformes, poll. Calycis foliola petalis 2-3 plo breviora. Petala breviter unguiculata, obovato-oblonga, obtusa, inaequalia, 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. Filamenta subaequalia. Siliquae juniores compressae, maturae teretes, torulosae, 2-2 $\frac{1}{2}$ poll., thecaphoro $1\frac{1}{2}$ lin. Semina rugis transversis elevatis, fuscis. Differt a *Cl. brasiliensi*: fol. omnibus ternatis; foliolis nunquam undulato-crispis; staminibus corollam subaequantibus; a *Cl. diffusa*: caule pubescente suffruticosa; siliquis linearibus, longioribus; a *Cl. psoraleaefolia*: thecaphoro brevi, nec elongato. *In fruticetis ad flumen S. Francisci prope Malhada Provinciae Bahiensis. De Martius. h?*

65. *Cl. Humboldtiana*; herbacea; foliis quaternatis glabris: foliolis oblongis, longe acuminatis, subtus in nervo petiolisque aculeatis; floribus hexandris. *Cl. parviflora* *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth. V. p. 83.* *Cl. Humboldtii* herbacea, glabra; petiolis longis, aculeatis; foliis 3-5-natis: floralibus ovatis, breviter petiolatis, pedicello brevioribus; siliquis stipitatis, glabris, stylo apiculatis. *Decand. Prodr. I. p. 241.*

Folia longe petiolata; foliola breviter petiolata, basi angustata, integerrima, reticulato-venosa, membranacea, 2 intermedia $3\frac{1}{2}$ -4 poll., 15-16 lin. lata; 2 lateralia 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll. Petioli $4\frac{1}{2}$ lin., partiales pilosiusculi. Aculei conico-subulati, recti, glabri, lin. longi. Racemi terminales 8 fere poll., rhachi pedicellisque pilosiusculis. Flores sparsi, magnitudine *Turritis erectae*. Bracteae

breviter petiolatae, subrotundo-ovatae, acutiusculae, tenuissime hirtellae, pedicello duplo triplove breviores. Pedicelli filiformes, glabri, 5 lin.; fructiferi duplo longiores. Cal. laciniis lanceolatis, acutis, petalis duplo? brevioribus, subhirtellis, aequalibus. Petala oblonga, obtusa, basi cuneata, alba?, aequalia? Capsulae siliquosae, stipitatae, lineares, rostratae, virides, striatae, 1½ poll., stipite 2-5 lin.. Sem. reniformi-lenticularia, laevia, fusca, magnitudine sinapis. *Kunth l. c.* Nomen mutandum, ob *Cl. parvifloram Brown* antiquiorem. *In calidis Nov. Granatae?*

66. *Cl. diffusa* *Herb. Banks*; herbacea, glabriuscula, diffusa; stipulis spinescentibus; foliis ternatis: floralibus ovatis, pedicello brevioribus; siliquis oblongo-linearibus, thecaphoro sextuplo longioribus. *Decand. Prodr. I. p. 241.*
In Rio Janeiro. ☉. Herb. Banks.

67. *Cl. affinis* *Dec.*; herbacea, glabriuscula, diffusa, inermis; foliis ternatis: floralibus ovatis, pedicello brevioribus; siliquis oblongo-linearibus, thecaphoro decies longiore. *Decand. Prodr. I. p. 241.*

Circa Rio Janeiro. ☉. Herb. Banks.

68. *Cl. rubella* *Burch.*; herbacea, glanduloso-pubescentibus; foliis quinatis: foliolis linearibus, glabris, glaucis; siliquis sessilibus, brevibus, subpubescentibus. *Decand. Prodr. I. p. 241.*
Burchell Cat. n. 2025. Trav. I. p. 545.

In Promont. b. spei. ☉.

69. *Cl. angustifolia* *Forsk.*; herbacea, glabra, apice punctata; foliis infimis 7-natis, summis 5-natis: foliolis linearifoliformibus; siliquis stipitatis, pendulis. *Decand. Prodr. I. p. 241.* *Forsk. Fl. arab. aegypt. p. 120.* *Poir. Enc. IV. p. 325.* *Cl. filifolia* *Vahl Symb. I. p. 48.* *Willd. Spec. III. p. 570.*

Caulis erectus, debilis, pedalis, ramosus, striatus, versus summitatem punctis elevatis minutis, sparsis. Folia petiolata, pollicaria. Petiolus foliis brevior. Siliquae digitales, pedicellatae, versus apicem parum incurvatae, angustiores. Convenit cum *tenella* figura foliorum; differt vero eorundem numero, altitudine, debilitate, siliqua apice attenuata, pendula; caudice punctato. *Vahl.* Annua cubitalis, teres. Folia alterna, digitata; foliola poll., latitudine petioli, plana, linearia, glabra, crassiuscula. Petioli 2 poll., teretes. Racemi terminales. Pedunculi folio ternato lineari suffulti, patentes, recti, 1½ poll., teretes, solitarii, 1-flori. Cal. aequalis. Petala flava, omnia ad latus superius congesta, basi violacea, exteriora majora, obovata: interiora 2 duplo breviora, lineari-oblonga. Filamenta violacea, per paria gradatim breviora, paria 2 inferiora apice surgentia; antheris pone nigris, ante flavis. Par supremum sterile, apice clavatum, flavum; rudimento antherae globoso, flavo, parvo. Siliquae 2-poll., subulatae, primum patentes, dein pendulae. Semina glabra. *Forsk.* *In Arabia felici circa Taaes ad agrorum margines. ☉.*

Species non satis notae:

70. *Cl. paradoxa* Brown; basi suffruticosa, glabra, apice herbacea, glanduloso-scabra; foliis ternatis quinatisve: foliolis glaucis, oblongo-linearibus, petiolo muricato multo brevioribus. *Decand. Prodr.* I. p. 241. *Brown in Salt. abyss.* n. 65.

In Abyssinia.

71. *Cl. cuneifolia* Mühlenb.; herbacea, laevis; foliis simplicibus, cuneatis, retusis; (floribus racemosis, hexandris;) siliquis stipitatis. *Decand.* I. p. 242. *Nuttall gen.* II. p. 73. Petala alba, unguibus longis, capillaribus. *Nutt.* *In Georgia.* *Herb. Baldw. et Mühlenb.*

C. POLANISIAE *Decand.*: Stam. 8-32, filiformia.

I. *Brachystyla*: stylo germine brevior.

72. *Cl. dianthera*; glabra, subaculeolata; foliis 7-natis: foliolis lineari-filiformibus; staminibus 8: 6 sterilibus, 2 antheriferis; siliquâ stipitatâ, pendulâ. *Decand. Prodr.* I. p. 242. (sub *POLANISIA dianthera*). *Cl. diandra* Burchell *trav.* 1. p. 548. *Cat. n.* 2105.

Ad Promont. b. spei. ☉.

73. *Cl. angulata*; glabra, subtriquetra; foliis 5-7-natis: foliolis oblongo-linearibus; siliquâ sessili, striatâ. *Decand. Prodr.* I. p. 242. (sub *POLANISIA? angulata*).

Flores ignoti, violacei ex *Leschenault.* *Dec.* *In Java.* *Herb. Mus. Paris.*

74. *Cl. oxyphylla* Burch.; glandulosa et pilosiuscula; foliis 5-7-natis: foliolis elliptico-oblongis, glaucescentibus; staminibus 8-12; siliquâ breviter stipitatâ, striatâ, puberulâ, pendulâ. *Decand. Prodr.* I. p. 242. (sub *POLANISIA oxyphylla*). *Burch. Cat. n.* 1887.

In Promont. b. spei.

75. *Cl. graveolens*; glanduloso-pilosa; foliis ternatis: foliolis elliptico-oblongis; staminibus 8-12; siliquis oblongis, basi attenuatis, glanduloso-muricato-pubescentibus. *Decand. Prodr.* I. p. 242. (sub *POLANISIA graveolente*, uti) *Rafin. in Journ. d. Phys.* 1819. T. 89. p. 98. et in *Sillim. Amer. Journ.*

I. p. 578., quo teste: *Cl. dodecandra* Mich. *Fl. Am. bor.* II. p. 52. *Pursh. Fl. sept. Amer.* II. p. 441. *Cl. dodecandra* var. *canadensis* Linn. *Spec.* 959. *Nutt. Gen.* II. p. 75. *Cornut. Canad.* 151. c. ic. *JACKSONIA trifoliata* Rafin. in *Med. Repos. of New Yorck.* T. V.?

Tota piloso-glutinosa, foetida, odore fere *ERIGERONTIS graveolentis*. Caulis erectus. Folia alterna, petiolata; foliolis sessilibus, medio longiore, oblongo, obtuso, integro, ad margines nervosque piloso. Flores racemosi, erecti, albi. Bractee petiolatae, ovatae, obtusae. Petala emarginata, crenata. Siliquae divaricatae, glu-

tinosa, magna, sessile. *Rafin.* Caulis angulosus. Petioli poll., pilosi. Foliola brevissime petiolata, intermedia $1\frac{1}{2}$ poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata, suprema lateraliaque minora. Pedicelli erecto-patentes, glanduloso-pilosi, $\frac{1}{2}$ poll. Bractee eorum longitudine vel paulo longiores, inferiores triphyllae, foliis similes, supremae simplices. Petala flavescenti-alba, obovata, in unguem angustata, 2 lin. Cal. lacinae apice purpurascens, lin. Filamenta petala superantia, purpurascens. Antherae ovato-oblongae. Stylus purpurascens, staminibus brevior. Siliqua $1\frac{1}{2}$ poll., 3 lin. lata. *Cls. Sprengel S. V. II. p. 125.* junxit cum *dodecandra* sine dubio, a qua certe diversa. *In Americae borealis sabbulis ad lacum Erie, fl. Missisipi et Missouri.* ☉

76. * *Cl. dodecandra*; puberulo-scabra; foliis ternatis; foliolis glabris, elliptico-lanceolatis, subserrulatis; staminibus 8-12; siliqua sessili, basi attenuata, glabra (?). *Decand. Prodr. I. p. 242.* (sub *POLANISIA dodecandra*). *Cl. floribus 12-andr., fol. 3 natis.* *Linn. Spec. p. 939.* *Roth Beytr. II. p. 92.* *Willd. Spec. III. p. 566.* Sinapistr. 3 phyll. pumil. glabr.; flosculo purpureo; siliqua membranacea. *Burm. zeyl. 216. t. 100. f. 1.*

„Folia ovato-lanceolata.“ *Linn. Spec. l. c.* „Caulis herbaceus; foliola lanceolato-ovata; corolla alba; pistillum rubrum; petala emarginata; stamina 8; glandula ad basin germinis a latere superiore; capsula crassa, hispida. *Linn. Fl. zeyl. p. 242.* *In Indiis.* ☉

Obs. Licet divus *Linnaeus* his ad *dodecandram* laudasset *Sinapistrum triphyllum pumilum* *Burm. zeyl. p. 216. t. 100. f. 1.*, descriptio tamen plantae a *Burm. zeyl.* datae haud ita paucis differt: „Radix tenuissima, longa, fibrillis raris, cinerea; caulis $1\frac{1}{2}$ ped., nunc erectus et solitarius, nunc procumbens et paulo supra terram ramulosus: ramuli subhirsuti, tenues. Petioli $\frac{1}{2}$ unc. Foliola ternata, glabra, integerrima, ovato-lanceolata. Flosculi axillares parvi, solitarii, fistulosi, purpurei. Cal. magnus. Siliquae longae, planae, glabrae, instar membranae translucens. Semina plurima, vario ordine sita, concava, fere reniformia, sed rotundiora, minutissima, glabra, splendens, fusca.“ *Willdenow l. c.* adjecit; „Caulis viscoso-pubescent, uti siliquae. Folia omnia ternata, elliptica, laevia: intermedio majore. Flores superiores fere masculi. Cal. purpurascens. Petala alba, emarginata. Stam. 10-14. Siliquae sessiles, erectae, fusiformes, subinflatae;“ quod forte ad *graveolentem* spectat. „*Sloane jam. hist. 1. p. 149. t. 124. f. 1.*, quem *Linnaeus* et *Willdenow* huc duxit, ad *graveolentem* spectare videtur. *Houttuyn Pl. Syst. VIII. p. 384. t. 60. f. 3.*, a *Willdenow* huc ductus, minime hujus loci. „Haec, quam nomine *Maman* ex *Java* accepi, omnino, ait, viscosa. Folia et siliquae petiolata. Calycis foliola 4 acute acuminata. Petala 4 obtusa. Stamina plerumque 12. Stylus subulatus, capitatus.“ *Houttuyn* interea eodem loco rite *dodecandram* L. descripsit, monuitque *Burm. zeyl.* plantam non spectare ad eandem. — *Mönch Meth. p. 150.* *Cl. dodecandrae* L. et *Burm.* nomen *SINAPISTRUM decandrum* imposuit, et notat: „petala emarginata, stamina constanter 10, rubra, ovario styloque rubro, glandulae 3 ad basin ovarii.“

77. * *Cl. viscosa*; piloso-glandulosa; foliis 3-5-natis; foliolis obovato-cuneatis oblongisve; staminibus 8-16; siliqua oblonga, sessili, (profunde) striata, glanduloso-hirsuta. *Decand. Prodr. I. p. 242.* (sub *POLANISIA viscosa* a.) *Cl. flor. 12-andris; foliis 3-5 natisque.* *Linn. Fl. Zeyl. 241. Spec. p. 938.* *Willd. Spec. III. 566.* *Cl. staminibus 15-20; fol. 5-5 nisque; siliquis oblique striatis; seminibus striis transversis, elevatis.* *Hort. Kew. ed. 2. IV. p. 130.* *Cl. icosandra Hort. lan. SINAPISTRUM viscosum* *Mönch. Meth. Suppl. p. 83.* Si

nap. zeylan. 3-5-phyll. viscos. flore flavo. *Mart. Dec. 25. Rheede Malab. IX. p. 41. t. 23.* (fid. Linn. Zeyl., cum? *Poir. Enc. IV. p. 318.*) *β. tetraphylla*, glabriuscula, minus viscosa. *Poir. l. c.*

Caulis herbaceus, erectus, ramosus; villis viscidis. Folia ternata petiolata, foliola obovata. Germen intra florem sessile; stamina 12. *Linn. Zeyl.* „Folia minora *C. icosandrae*, et flores minores. Petala inferiora magis divaricata. Stam. 10 ad 15 (mihi).“ *Linn. Mant. p. 430.* Stam 8-20 notat *Blume Waarn. II. p. 72.* Viscosissima. Caulis 3-4 ped., firmus, sublignosus, angulosus. Rami foliosi; foliolis villosissimis, ovalibus, utrinque attenuatis, acutis, (apud nos obtusis), ciliatis, subpetiolatis. Bracteae nullae, nisi folia gemina ad basin pedunculorum. Flores primum axillares, solitarii, dein racemosi: minores quam in *icosandra*. Calycis lacinae angustae, oblongae, subconcaevae, coloratae. Cor. flava, petalis ovalibus, unguibus brevibus: inferioribus magis divaricatis. Stam. receptaculo inserta, corollâ breviora. Siliqua circiter pollicaris, villosissima: stylo brevi. *Poiret.* Semina vermiculata, fusca, glabra, sed transverse striata. *In Zeylona, Malabaria.* ☉.

Obs. Cls SPRENGEL *S. V. II. p. 125.* huc instar synonymorum traxit *Cl. graveolentem* et *icosandram*. *ARIA-VRELA Rheed. l. c.* a divo *Linnaeo* sine dubio, a clo. *Poiret* cum? huc tracta, nobis non hujus loci esse videtur. In planta *Rheedi*: radix albicans, fibrosa. Caules virides, hinc inde rubescentes, striati. Folia 3-4-5-na., foliola parva, oblongo-rotunda, cuspidata, tenuia, mollia, plana, pilis brevibus, odore gravi, sapore subacri. Flores axillares, parvi, in pedunculis tenuibus, pilosis, plures e summitate surculorum. Petala rotundato-oblonga, flava s. lutea, striata. Stamina plura, tenuia, viridi-flava, antheris nigris. Stylus crassiusculus. Siliquae viridi-fuscae, 4 poll. et ultra, oblongo-angustae, rectae, parum compressae, lateribus striatae. Semina rotundo-plana, rufo-flavescentia, tandem nigricantia.

78. **Cl. icosandra*; floribus icosi-tetrandris; foliis quinatis. *Linn. Fl. zeyl. 240. Spec. 958. Willd. Spec. III. p. 566. Poir. Enc. IV. 318. Lour. Fl. Coch. II. p. 483. Cl. epilobioides Jan Elench.* (fid. specim). *Sinap. zeyl. pentaphyll. viscos.; flore flavo. Burm. Zeyl. 215. t. 99. POLANISIA viscosa β Decand. Prodr. I. p. 242.* (clo. *Spreng. S. V. II. p. 125.* nequidem varietas *viscosae*). *Lagansa alba Rumph. Amb. V. p. 280. t. 96. f. 3.*

Herba caule erecto, viscido-piloso. Folia omnia quinata, petiolata, foliolis integerrimis. Cor. luteae. Stam. brevia, 24. Siliqua teres, subulata, crassiuscula, villosa. *Linn. zeyl.* Habetus *pentaphyllae*, sed flore distincta. Caulis herbaceus, villosus, striatus, 2-ped., ramis adscendentibus. Foliola ovato-lanceolata (rhomboidea), sessilia, pilis viscosis aspera. Spicae solitariae in ramis caulisque apice. Calycis campanulati lacinae lanceolatae, caducae. Cor. flavicans, calyce duplo major, patens, petalis ovali-oblongis subaequalibus. Filamenta 18-22, aequalia, receptaculo inserta; antheris subulatis recurvis. Germen sessile, oblongum; stylo brevi, crasso: stigmatate brevi, obtuso. Siliqua longa, tenuis, oblique striata. Semina reniformia. *Lour.* Foliola majora quam in *Cl. viscosa*, ovato-lanceolata, acuta, quidquam undulata. Semina vermiculata, rugis transversis elevatis, pallidiora quam in *Cl. viscosa*. *In Zeylona, China, Cochinchina.* ☉.

79. * *Cl. felina*; strigosa; foliis subradicalibus, ternatis: foliolis cuneiformibus; staminibus 28 - 32; siliquâ sessili, glabrâ. *Decand. Prodr. I. p. 242.* (sub *POLANISIA felina*). *Cl.* polyandra, hispida; foliis ternatis, cuneiformibus, strigosis; floribus axillaribus, solitariis, pedunculatis; siliquis linearibus, compressis. *Linn. Suppl. 500. Willd. Spec. III. p. 567.*

Tota herba, una cum calyce, valde strigosa. Folia subretusa. Cor. angularis, parva, rubra. Siliquae breves, glabrae. Singularis est haec parvula foliis hispidis, pilis basi valde dilatatis, rigidissimis, foliis adpressis, ad apicem versis, ut exacte his linguam referant felinam. *Linn. fil.* „Anne forte *CORYNANDRA?*“
In Zeylona. König.

III. *Stylaria*: stylo germine multo longiore:

80. *Cl. uniglandulosa Cav.*; glanduloso-pubescens; foliis ternatis: foliolis bracteisque oblongo-lanceolatis; staminibus 8-16; siliquâ sessili, subpuberulâ. *Decand. Prodr. I. p. 242.* (sub *POLANISIA uniglandulosa*). *Cl.* floribus dodecandris, uniglandulosis: foliis ternatis, summis simplicibus viscoso-pubescentibus. *Willd. Enum. H. Berol. p. 689.* *Cl.* fol. sparsis, ternatis, lanceolatis, integerrimis, foetidis; floribus uniglandulosis. *Cav. ic. 5. p. 5. t. 506. Henckel adumbr. p. 5.*

Caulis teretes, villosi, $1\frac{1}{2}$ ped., erecti. Folia sparsa, ternata; petiolo communi iisdem subaequali; foliolis lanceolatis, integerrimis, (obtusis, $1-1\frac{1}{2}$ poll., 6-7 lin. latis) medio paulo longiore. Flores terminales, numerosi. Pedunculi poll. e bractee (oblongo-) ovatae axilla. Calycis foliola lanceolata, acuta, villosa, decidua, ($2\frac{1}{2}$ lin.). Cor. alba, (obsolete venosa); petala ascendentia, obovata, apice emarginata, (8 lin.), ungue longo capillari, cum calycis foliolis alternantia. Glandula 1 germen inter et calycis foliolum superius, concava, lutea. Filamenta purpurea, corollâ duplo longiora, 11-16, quorum 7-8 germen inter et glandulam; totidem paulo breviora, infra germen receptaculo inserta. Antherae ovatae, purpureae, parvae. Germen sessile, lineare, villosum, viride. Stylus purpureus, staminum longitudine. Stigma simplex. Siliqua subcylindrica, 2-poll.. Semina globuloso compressa. *Cav. In nova Hispania circa Acapulco. ☉. ? 4.*

D. *CORYNANDRAE Schraderi*: Stam. valde numerosis; filamentis clavatis.

81. *Cl. Schraderi*; foliis 5-7-foliolatis: setis rigidulis, sparsis, scabriusculis; foliolis foliorum inferiorum obovatis, superiorum oblongo-linearibus; petiolo foliolis multo longiore. *Decand. pl. rar. d. jard. d. Gen. fasc. 5. p. 57.* (sub *POLANISIA Schraderi*). *CORYNANDRA pulchella Schrader in litt. ad Decand. cum icon. ined. Cat. sem. h. Gott. 1826. Reichenb. Hort. Bot. Cent. II. p. 19. t. 147.*

Filamenta circiter 40, lilacino-violacea, apice dilatata, a medio clavulae ad apicem alba. Siliqua sessilis. *Decand. Annua, ? ped.*

ped. et ultra, subglaucescens. Caulis erectus, laevis, superne subflexus, simpliciusculus. Folia infima 5-nata, superiora ternata; florales bracteae simplices; foliola lanceolata, poll., petiolique ad margines costasque pilis rigidulis antrorsis. Racemus terminalis, latus. Pedunculi sub anthesi patentes, ultra poll., demum surrecti, longiores. Flores magnitudine *CRATAEVAE religiosae*; sepala ovata, acuta, viridia; petala calyce 6ies longiora, $\frac{3}{4}$ poll., obovato-oblonga, persicina, acumine brevi, virente. Stam. in toro hemisphaerico ultra 50, petala subaequantia, sub anthesi porrecta; filamenta laete violacea apice albo; antherae oblongae, terminales, reflexae, polline flavo, mediae steriles. Pistillum teretiusculum, staminibus paulo brevius, post anthesin fusiforme. Capsula *Dentariae* siliquam referens, 2 poll. et ultra, basi sensim, superne luculentius in stylum crassitie capsulae paulo longiorem acutum attenuata, valvulis a basi dehiscens, ut placentae setaceae suturales pedunculo styloque maneant junctae, et valvulae subconvolutae pendeant subincurvatae a stylo. Sem. abbreviato-cylindrica, subannulata, infra concava, hilo profundo centrali, testâ fuscâ verrucosâ. Embryo horizontaliter annularis, verticaliter in cotyledones fissus. *Reichenb. Habitat?*

82. *CL. Leschenaultii*; foliis 3-5-foliolatis, glabriusculis: foliolis omnibus obovatis, petiolo paulo brevioribus. *Decand. pl. rar. d. jard. d. Genev. Fasc. 3. p. 57.* (sub *POLANISIA Leschenaultii*).

Stamina alba, apice in clavam cylindrâceam dilatata. Flores dimidio quam in priore minores. Siliqua cylindrâcea, stylo brevi acuta, sessilis. *Decand. In India orientali. Leschen.*

83. **CL. Chelidonii*; piloso-hispida; foliis 7-9-natis: foliolis obovato-cuneatis; staminibus 24-32; siliquâ sessili. *Decand. Prodr. I. p. 242.* (sub *POLANISIA Chelidonii*). *CL. polyandra*, hirsuta; foliolis 5-7-nis, cuneiformibus, scabris; racemis terminalibus; siliquis filiformibus. *Linn. Suppl. 300. Willd. Spec. III. 567.* *CL. polyandra*: filamentis apice latioribus; foliis 5-9-natis: foliolis utrinque scabris, pilis adpressis; racemis terminalibus. *Hort. Kew. ed. II. IV. p. 130.*

Folia longe petiolata, digitata: foliolis acutis. Cal. 5-5-partitus, strigis hispidus. Corolla rubra, figurâ *CHELIDONII hybridi*. Stamina lutea. Siliqua glaberrima. Semina hispida. Certe affinitas *CHELIDONII* summa, nisi folia digitata *CLEOMES*, calyx plus quam diphyllus, et petala 5. *Linn.* Caules teretes, humiles, setis e basi lata subulatis, appressis, rigidis, albidis. Petioli foliorum majorum 2 poll., minorum 3-4 lin., teretes, setis sparsis appressis. Folia obtusa vel mucronulata, medium maximum, 4-8 lin., 3-4 lin. latum, lateralia minora, omnia canescentia, pilis rigidis appressis scabra. Pedunculi axillares, solitarii, foliis floralibus multo longiores. Calycis foliola ovata, acuta, dorso setis appressis, petalis multo breviora. Petala 3-4 lin., ovato-oblonga, obtusa, striata. Stamina longitudine petalorum. Antherae effetae apice contortae, sulfureae. Filamenta flava, apice incrassata.

Germen staminibus brevius.
König. 2.

In India prope Tanschaur.

Incertae sedis.

84. *Cl. digitata* Forsk.; foliis inferioribus digitatis; superioribus ternatis. Forsk. *Fl. aegypt. arab.* p. 120.

Caulis striati, villosi-hispidi. Foliola poll. Flores hexandri.
Forsk. In arvis Arabiae.

85. *Cl. virgata* Thunb.; foliis lanceolatis, glabris; calycinis foliolis lanceolatis; siliqua rugosa. Thunb. *Fl. cap. ed. nostr.* p. 498.

Caulis frutescens, totus glaber, ramosus, 2 ped. vel ultra; rami sparsi, filiformes, elongati, simplices, lati, virgati. Folia alterna, sessilia, acuta, integra, supra concava, subtus convexa, unguicularia, sensim minora. Flores racemosi, purpurei. Racemus spithameus, pedunculis vix lin. longis. Calycis foliola acuta. Genitalia inclusa. Siliquae ovatae, rostratae, glabrae. Thunb. In *Prom. b. spei.* 2.

86. *Cl. laxa* Thunb.; foliis linearibus; ramis incurvis. Thunb. *Fl. cap. ed. nostr.* p. 498.

Caulis frutescens, erectiusculus, glaber, totus pedalis; rami sparsi, frequentes, filiformes, virgati, laxissimi, ramulosi. Folia sparsa, filiformi-linearia, glabra, vix unguicularia. Flores racemosi. Racemus rarus, floribus remotis. Pedunculi capillares, vix unguiculares. Thunb. In campis sabulosis inter Verloren Valley et longe Valley *prom. b. spei.* 5.

87. *Cl. armata* Thunb.; foliis ovatis; ramis spinescentibus. Thunb. *Fl. cap. ed. nostr.* p. 498.

Caulis fruticosus, rigidus, flexuosus, cinereus, ped. et ultra; rami sparsi, divaricati, teretes, breves. Folia sparsa, brevissime petiolata, integra, glabra, $\frac{1}{2}$ lin. longa. Siliquae ellipticae, glabrae, acuminatae, poll. Thunb. In *Prom. b. spei.* 5.

88. *Cl. micrantha* Desv.; caule erecto, aculeato; foliis inferioribus quinatis, superioribus ternatis simplicibusque: foliolis glabris, lanceolatis, utrinque attenuatis, obscure dentatis, petiolis nervisque aculeatis; spicis laxis, bracteatis; siliquis glabris. Hamilt. *Prodr. pl. Ind. occ.* p. 47.

In Guyana. Herb. Desv.

Obs. *CLEOME juncea* clo. Decandolle cum *Necker* SCHEFFERIA est, ad OCTANDRIAM spectans. *CLEOME capensis* eidem HELIOPHILA cleomoides. *Cl. pinnata* Pursh est STANLEYA. — *CLEOME raphanoides*; herbacea, apice subsessili; foliis lanceolato-linearibus, acuminatis, basi runcinatis; siliqua subsessili, terete, stylo apiculata, glabra. Decand. *Prodr.* I. p. 240. (*Cl. longifolia* Vahl *Herb.*, *WORMERIOLIA heterophylla* Thonning *Vahl Herb.*, *RAPHANUS pilosus* Willd. *Sp.* III. p. 562.) clo. Decandolle nunc in *pl. rar. d. jard. d. Gen. Fasc.* III. p. 56. genus proprium est, TRICELIENNAS, sequente characteris generico: „Cal. ? Pet. 6? Stam. 5? Siliqua subsessilis, stylo apiculata, 3-valvis“. Genus hocce „novum et singulare ad PENTANDRIAM MONOGYNIAM pertinere“ affirmat Hornemann d. *ind. pl. guin.* p. 19., et petala 5, stamina 5 sine dubio notat Thonning in *Herb. Puerari*. *CLEOME* (*Gynandropsis*) *arborea* Schrader, arborea; foliis ternatis, glabris; foliolis ovatis acuminatis; floribus polyandris, ovario ovali thecaphoro multoties breviori Schrader in *Gött. gel. Anz.* 1831. p. 707., Dec. *prodr.* p. 242. o Paraiba (cui POLANISIA species videtur) nunc a *CLEOME* et affinis omnino diversa dicitur. Etiam Schrader in *litt.* cum A. Brown

in *Append. to Denk. et Clappert.*, fid. speciminis a *Schrader* missi, Cl. hanc arboream eandem dicit cum *CRATAEVA Tapia*. Specimina a *Soren. Princ. Newwied* lecta in *Herb. cli de Martius* asservata, quae nobis videre licuit, vix ad *CRATAEVAM Tapiam* L., sed potius ad *CRAT. acuminatam Decand.* pertinere videntur.

Quid: *CLEOME gynandra Forsk Fl. arab.* p. CXVI. n. 401? An Cl. *pentaphylla?*

— — *ofidocarpa Balb. Hort. Lugd. Allobr.* 1816.

1280. C L E O M E L L I A.

1. *Cl. mexicana. Decand. Prodr.* I. p. 237. *Fl. mexic. ined.*
Folia trifoliolata, glabra. Flores flavi. In Mexico. 4.

1281. P H Y S O S T E M O N.

1. *Ph. lanceolatum Mart.*; erectum; foliis lineari-lanceolatis; capsulis elongatis, linearibus, subteretibus; stylo persistente, brevissimo. *Mart. et Zuccar. nov. gen. et spec.* T. I. p. 73. t. 45.

Rad. perpendicularis, fibrosa, extus sordide flavescens. Caulis herbaceus, 1-1½ ped., ramosus, angulosus, sulcatus, rubentivirens, sursum viridis. Rami simplices, erecti, tenues, virgati, angulati. Folia alterna, inferiora lineari-lanceolata, summa linearia, omnia basi subrotunda, acuminata, integerrima, utrinque laete viridia, 1-1½ poll. Petioli breves, compressi, ad folii basin subarticulati, in rami angulum decurrentes. Racemi terminales, laxi, simplices, multiflori, 3-6 poll. Pedunculus angulatus, sulcatus; pedicelli breves, tenues, singuli bractea minutâ, setacea, aridâ, sub anthesi patentem, fructiferi nutantes. Calycis foliola ovato-lanceolata, acuta, tenuiter venosa, glabra, viridia, petalis duplo breviora. Petala ovato-rhombea, breviter unguiculata, acutiuscula, integerrima, flava. Stam. 6. Filamenta subulata, glabra, germine et stylo longiora, rubenti-pallida, 4 inferiora aequalia, declinata, 2 superiora erecta, parum minora, infra apicem in apophysin subgloboso-discoideam inflata. Antherae erectae, olivaceo-virides. Stylus brevis, subulatus, persistens. Stigma subcapitatum. Caps. linearis, subteres, striata, subtorulosa, stylo coronata, 1-1½ poll. Receptaculum persistens, filiforme. Semina rugis transversalibus et aculeis brevibus scabra, fusca, magnitudine circiter seminis Brassicae. *Mart. et Zucc.* In graminosis depressis non procul a flumine S. Francisci, in Provincia Pernambucana prope praedia Terra nova et Bom Jardim. ☉.

2. *Ph. tenuifolium Mart.*; totum glabrum; caule erecto; foliis lineari-subulatis; capsulis ovatis, stylum aequantibus. *Mart. et Zuccar. nov. gen. et spec.* I. p. 73. t. 46.

Radix perpendicularis, subsimplex, extus sordide flavescens, intus alba. Caulis jam a basi ramosus, 1-1½ ped., basi cortice griseo-flavescente, sursum viridis, angulatus, striatus. Rami erecto-patentes, simplices, tenues, virgati, angulati, striati. Folia sparsa, sessilia, acuta, laete viridia, 1½-2 poll. Racemi terminales, laxi, multiflori, 3-6 poll. Pedunculus angulatus, striatus. Pedicelli filiformes, patentem vel nutantes, singuli bractea s. folio florali ipsis longiore, 4-6 lin. longi. Calycis foliola aequalia, lanceolata, acuta, nervosa, glabra, corollâ breviora. Co-

rolla maxima, aurea. Petala adscendentia, ovato-rhombea, breviter unguiculata, acutiuscula, integerrima, glabra. Filamenta 6, subulata, glabra, petalis styloque breviora, 2 inferiora declinata ovarium superantia, 4 superiora apice in apophysin globosam incrassata, cui insidet anthera olivaceo-viridis. Stylus adscendens, arcuatus, longitudine petalorum, subulatus, glaber. Stigma obsolete capitatum. Capsula utrinque attenuata, stylo coronata. Semina 8-12, compressiuscula, apice subrostrata, aculeis longis rectis subulatis echinata, fusca, magnitudine seminis *RAPHANI arvensis*. *Mart. et Zucc.* In graminosis ad Terram Novam, haud procul a flumine S. Francisci in Provincia Pernambucana. ☉.

3. *Ph. rotundifolium Mart.*; foliis ovato-ellipticis, acutis; capsulis ovatis, compressis, stylum persistentem superantibus. *Mart. et Zucc. nov. gen. et spec. 1. p. 74. t. 47.*

Radix perpendicularis, sordide flavescens. Caules plures herbacei, decumbentes, simplices vel parce ramosi, hirti, sursum angulati. Folia alterna, approximata, ovata vel obovata, cuspidato-mucronata, integerrima, pilis simplicibus rectis conicis articulatis pubescenti hirtula, glaucescentia, venosa, nervo medio subtus prominente; inferiora majora in petiolum brevem decurrentia, 6-12 lin., 3-8 lin. lata; superiora floralia sessilia, duplo minora, scabriora. Pedunculi axillares, solitarii, filiformes, pubescentes, folio florali longiores. Flores congenerum minimi, flavi. Calycis foliola lanceolata, acuta, integerrima, enervia, pubescentia, patentia. Petala adscendentia, obovato-lanceolata, obtusiuscula, integerrima, venosa, glabra, calyce duplo longiora. Filamenta 6-8, subaequalia, filiformia, glabra, fusco-aurantiaca, stylum superantia, 2-4 superiora infra apicem apophysii pyriformi. Antherae erectae, ovatae, fusco-aurantiacae, effetae apice recurvatae. Stylus rectus, longitudine germinis, subulatus, glaber. Stigma acutum. Capsula pubescens. Semina 6-8, reniformia, globosa, aculeis conicis solidis echinata, fusca. *Mart. et Zuccar.* In sabulosis ad flumen S. Francisci prope Joazeiro, in confiniis Provinciarum Pernambucanae et Bahiensis. ☉.

1282. HERMUPOA.

1. *H. Löfflingiana Decand. Prodr. 1. p. 254. Löffl. Itin. 307.*

Flos coccineus. Calyx exterior longe tubulosus, apice 3-dentatus, inferius longior, dehiscens, coloratus, deciduus; interior foliolis 4 subquadrangularibus, truncatis, ad interstitia petalorum, deciduus. Petala erecta, convexa, calyce exteriori paulo longiora, obtuse acuminata. Filamenta subulata. Antherae oblongae, planae, curvae. Germen subulatum, parvum. Stylus filiformis, staminibus paulo brevior. Stigma parvum, globosum, capitatum. Bacca maxima, teres. Semina plurima, subrotunda, nidulantia. *Löffl. In America calidiora.*

1283. DIPHYLLA.

1. *D. cymosa Michx. Fl. bor. Amer. 1. p. 203. t. 19. 20. Parsh Flor. sept. Amer. 1. p. 218. Nutt. gen. p. 209. Decand. S. V. II. p. 30. Bot. Mag. 1666.*

Rad. repens, articulato-nodosa. Herba glabra, similis *Podophyllo peltato*. Caulis erectus, pedalis, teres, subsimplex. Folia caulina 2 alterna (in petiolis 2 poll., crassis, viridibus), 6 poll. diametro, extra centrum peltata, palmato-lobata, semibifida: lacinia singula 5-7-9-loba, acute et inaequaliter dentata, margine vero interiore (ubi per laminam circiter pollicarem junguntur laciniae) integerrima, subtus pallidiora. Cyma terminalis, simplex, ebracteata, in pedunculo longissimo. Pedicelli breves. Calycis phylla ovata, concava, $1\frac{1}{2}$ lin.. Petala oblonga, patula, concava, alba, obsolete trinervia, emarginata cum mucrone obtuso, 3 lin.. Filamenta cum antheris (effetis bicornibus) flava, petalis duplo breviora, plana; antheris elongatis 2-ocularibus. Stigma capitatum. Bacca atro-caerulea, seminibus purpureis. *Gawl. et Nutt. In altis montibus Carolinae boreal. et Virginiae. 4.*

1284. F L O E R K E A.

1. *FL. proserpinacoides Mühlenb.; Willd. Act. Nat. Cur. Berol. III. 1801. p. 448. FL. lacustris Pers. Syn. 1. p. 393. FL. uliginosa Mühlenb. Ms. Rafin. in Sillim. Amer. Journ. Vol. I. p. 375. FL. palustris Nutt. Gen. p. 228. Spreng. S. Veg. II. p. 135. NECTRIS pinnata Parsh Fl. sept. Amer. 1. p. 239.*

Succulenta, decumbens, glabra. Caulis natans, herbaceus, debilis, basi ramosus vel simplex; (flaccidus, erectus *Rafin.*). Folia alterna membranacea, viridia, petiolata, ima ternata: foliolis oblongis, obtusis: lateralibus indivisis, 2-3-fidis; intermedio petiolato, simplici vel iterum partito; superiora pinnata pinnatifidaque: laciniis plerumque 5, oblongo-lanceolatis; ultimis confluentibus, lateralibus 2-3-fidis, obtusiusculis. Pedunculi solitarii, axillares, longi, semicylindrici, canaliculati, deflexi, apice incrassati, 1-flori. Calyx persistens, foliolis ovato-lanceolatis, acutis, patentibus. Petala alba, oblonga, obtusiuscula, basi pilosa, calyce triplo breviora, cum calyce alternantia. Filamenta filiformia, alternatim articulata in glandulis 3. Antherae erectae. Germen didymum, subrotundum. Stylus filiformis. Stigmata 2, rotundata. Utriculi papilloso-rugosi. Semina rotunda (sublenticularia *R.*). *Willd. et Nutt. In Pennsylvania ad ripas Schuylkill; in inundatis prope Philadelphiam. ☉.*

1285. P E P L I S.

1. **P. Portula*; floribus hexandris, axillaribus, solitariis; foliis oppositis, petiolatis, subrotundo-ovatis; (petalis minimis nullisve). *Willd. Spec. II. p. 243. P. floribus apetalis. Linn. Spec. p. 474. Smith Fl. brit. 389. Engl. Fl. II. p. 187. Engl. Bot. t. 1211. Wulf. in Jacq. Coll. 1. p. 275. Roth Germ. 1. p. 137. II. 415. En. pl. Germ. I. 2. p. 11. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 605. Gmel. bad. II. p. 92. M. a Bieb. Fl. Taur. cauc. Suppl. p. 276. Schult. Obs. p. 70. Allion. pedem. II. p. 167. n. 1911. Savi Bot. Etrusc. I. p. 134. Mo.*

rett. Notiz, p. 10. n. 27. *Hall. Helv.* n. 856. *Fl. Dan.* 64. *Gaertn. Fruct.* 1. t. 51. *Curt. Fl. Lond.* IV. t. 27. *Dreves et Hayne T.* II. t. 6. *Sturm Deutsch. Fl.* 1 A. 1 H. *Svensk. Bot.* 592. *Mich. Gen.* 21. t. 18. f. 1. *Loesel. pruss.* 106. t. 20. *Bocc. Mus.* 107. t. 84. f. 1. *Vaill.* t. 15. f. 5. *PORTULA diffusa* *Mönch Method.* p. 661.

Rad. fibrosa. Caules prostrati, fluitantes aut repentes, (simplices vel ramosi, virides vel purpurascens,) poll. - $\frac{1}{2}$ ped., tetragoni, glabri. Folia obovata (subspathulata), integerrima, glabra, $\frac{1}{3}$ - 1 poll. Flores parvi, sessiles. Petala calyce inclusa, fugacia. Caps. (subovata), membranacea, pellucida; seminibus pluribus, parvis, triangularibus, (fuscis). *Smith.* Per omnem Europam a Lapponia ad Siciliam in inundatis; in Tauria. ☉.

Obs. Cs. Walker Arnott in *Edinb. Phil. Journ.* 1817. Jan. p. 150. *P. Portulam* ex agro monspeliensi a planta britannica differre, nomineque *P. australis* in *Herb. cli Gay* prostare dicit. Huic affinis, si non eadem, illi videtur *P. biflora* *Salzmann.*

2. *P. biflora* *Salzm.*; foliis obovatis cuneatisve, suboppositis, integerrimis, glabris; floribus breviter pedunculatis, axillaribus, binis; petalis calycis dentes duplo superantibus.

Repens, humifusa, a basi ramosa; rami plerumque alterni, apice adscendentes, glabri, pallide virides, compresso-angulosi, inferne ad nodos radicales: radiculis longis fusciscentibus. Folia opposita vel apice subalterna, sessilia, basi angustata, apice obtusa, rarius cum acumine vix conspicuo, utrinque glaberrima, venosa, pallide viridia, 5-6 lin., 3 lin. lata. Flores 2 in singula axilla, erecti, foliis 2-3 plo breviores; singuli basi bractea lineari, angustissima, acuta, membranacea, pallida, $\frac{1}{3}$ fere calycis aequante, subinde etiam pedunculum vix superante. Pedunculi brevissimi, angulosi, glaberrimi. Cal. inferne tubulosus, apice quidquam campanulatus, glaberrimus, 12-striatus, 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longus; dentes 6 exteriores lanceolato-subulati, patentes et subreflexi, 6 interiores ovati, acuti, latiores, $\frac{1}{2}$ lin. Petala maxima generis, calycis dentes interiores plerumque duplo superantia, obovato-oblonga, obtusa, intense caeruleo-violacea. Stamina 6, (an semper?) calyce breviora. Filamenta subulata, glabra. Antherae parvae, subrotundae, flavae. Stylus erectus, filiformis, calycem superans, persistens, longior quam in *P. Portula* et *borysthenica*. Stigma magnum, capitatum. Capsula ovata, inclusa, obtusa, stylo coronata, glabra, 2-locularis. Sem. pauca, ovata, obtusa, fusca, uno latere plana, altero convexa, majora quam in reliquis. Similis quidem *P. Portulae*, sed omnibus partibus major. Affinis etiam, ut videtur, *LYTHRO nummularifolio*, sed floribus geminis staminumque numero diversa. Ad specimen in *Herb. cli Koch.* In fossis exsiccatis prope *Tanger.* *Salzmann.* 4.

5. *P. borysthenica* *M. a. Bieb.*; foliis alternis, subsessilibus, obovato-oblongis, subintegerrimis; floribus subsessilibus, solitariis; calycibus 12-dentatis, ad angulos pubescentibus. *P.* foliis obverse lanceolatis, obsolete serrulatis; floribus sessilibus solitariis; calycibus 8-dentatis: dentibus subulatis.

Spreng. S. V. II. p. 135. Schrank in Bot. Zeit. 1822. p. 643. AMMANNIA borysthenica Decand. Rev. d. Lythraires p. 17.

Caules humifusi, ramosi, glabriusculi; ramis alternis, angulatis apice pubescentibus. Folia obtusa vel cum mucronulo parvo, sessilia, vel petiolo brevissimo, vix serrulata (juniora omnino integerrima), glabra (juniora tamen margine subtusque pilis brevissimis), $\frac{3}{4}$ poll., 3 lin. lata. Flores axillares, alterni, majores quam in *P. Portula*, sessiles vel pedicello brevissimo; bracteis 2 setaceis, patentibus, calyce dimidio brevioribus. Petala desunt in spec. nostr. defloratis. Calyx urceolatus, subcylindricus, 12-striatus pilis brevissimis, praesertim ad angulos; dentibus alternis brevioribus, minutioribus: majoribus e basi ovata acuminatis, erectis, capsulam paulo excedentibus; minoribus reflexis vel rarius uno alterove erecto, et inde calyx fere 8-dentatus (uti in *Sprengel* et *Schrank*). Capsula membranacea, basi pelucida, albida, superne purpurascens, glaberrima, 5-striata, duplo major quam in *P. Portula*, saepissime stylo persistente filiformi capsulam brevior coronata. Stigma capitatum. Semina numerosa, uno latere plana, altero convexa, minuta, fusca, nitida. *In inundatis ad Borysthenem circa Kew et Klementschnug. M. a Bieb.*

4. *P. occidentalis Spreng.*; foliis oppositis, lanceolatis, obtusis, basi attenuatis; floribus sessilibus, axillaribus, geminis, apetalis. *Spreng. S. V. II. p. 135. AMMANNIA occidentalis Decand. Revue de la Famille des Lythraires p. 17. In Portorico, Guadeloupe. Bertero.*

Obs. Specimen possidemus a clo *Bertero* in Portorico lectum et ab amicis *Balbis* nomine *P. indicae* communicatum, in quod obiter omnino fere quadrat definitio *P. occidentalis Spreng.*, quod vero potius ad *AMMANNIA* pertinet revidetur. Caulis basi decumbens, radicans, apice adscendens, obsolete tetragonus, glaberrimus, vix ped., crassitie pennae Corvi; ramis ramulisque oppositis, patentibus, subalato-tetragonis, glaberrimis. Folia opposita, oblongo-lanceolata, subsessilia vel in petiolum attenuata, obtusa, integerrima, glaberrima, nervo medio subtus prominente: inferiora fere $1\frac{1}{2}$ poll., 4 lin. lata, superiora $\frac{1}{2}$ -1 poll., 2 lin. lata. Flores in axillis oppositi, solitarii, sessiles vel brevissime pedicellati. Bractae ad basin florum 2 oppositae, lineari-subulatae, glaberrimae, patentibus vel reflexae, 2 fere lin., floribus longiores, capsulas maturas subaequant. Calyx inferus, persistens, ovato-turbinatus, fructifer quidquam ventricosus, glaberrimus, obsolete striatus, 8-dentatus; dentibus 4 interioribus e basi ovata subulato-acuminatis, erectiusculis; 4 exterioribus quidquam minoribus, acuminatis, patentibus vel reflexis. Petala fugacissima, saepius nulla (?), obovato-oblonga, flavicantia, calyce breviora. Stamina 4. Filamenta calycis basi inserta, subulata, basi quidquam dilatata, glabra, calyce breviora, germen cum stylo subaequantia; antheris minimis subglobosis. Germen ovatum, glabrum. Stylus brevis, filiformis, germine brevior, stamina aequans, inclusus, saepius persistens; stigmatibus sat magno, capitato. Capsula rotundato-ovata, calyce paulo brevior, membranacea, glaberrima, fusca, nitida, apice dehiscens, bilocularis, magnitudine seminis Cannabis. Semina numerosissima, minutissima, uno latere convexa, altero plana, fusca. Convenit plurimis cum *AMMANNIA repente Rottl. ex Ind. or.* — Haec scripta fuere, antequam cli *Decandolle* *Revue* nobis innotuit.

5. *P. alternifolia M. a Bieb.*; foliis alternis, petiolatis, lineari-spathulatis; floribus pedunculatis, solitariis, axillaribus, subcorollatis. *Spreng. S. V. II. p. 135. M. a Bieb. Fl. taur. cauc. Suppl. p. 277. Catal. H. Gorenk. 1812. p. 63. Bot. Zeit. 1822. p. 644. P. wolgensis Fisch in Dec. prodr. III. p. 77. Statura Portulae, cui etiam flores non absimiles. Folia multo angustiora, semper alterna. Semina semiglobosa, testacea, sub*

lente fortiori punctis minimis. M. a *Bieb.* *) Caules suberecti, vel basi tantum decumbentes et radicales, graciles, angulati, 2-2½ poll.; ramis alternis oppositisque, cauli similibus. Folia approximata, praesertim apicem versus, in petiolum brevem attenuata, obtusa, glaberrima, 2-3 lin., ⅓ lin. lata. Flores minores quam in *P. Portula*, brevissime pedicellati; basi bracteis 1-2 setaceis, flore brevioribus. Calyx subcampanulatus, capsulâ brevior, glaber, 12-dentatus; dentibus subulatis, alternis paulo brevioribus, angustioribus, magis patentibus. Stylus brevis, stigmate capitato. Capsula subglobosa, purpurascens, glaberrima, minor quam in *P. Portula*. Semina ovata, pallide fusca, plano-convexa. *Ad Volgam, in Sarepta, in sabuletis ad Borysthenem.*

6. *P. indica Willd.*; floribus tetrandris, spicatis, bracteatis; foliis oblongo-ovatis, sessilibus. *Willd. Spec. II. p. 244. Poir. Enc. V. p. 162. AMMANNIA peploides Spreng. Syst. Veg. II. p. 444. AMELETIA indica Decand. Revue d. Lythrair. p. 18. t. III. f. A.*

Caulis adscendens, ½ ped. et ultra, tetragonus, glaber. Folia opposita, subretusa, integerrima, venosa, glabra „(5-6 lin., 2-3 lin. lata).“ Spicae simplices, foliis longiores, ex omnibus axillis. Flores sessiles, oppositi, bractea lanceolata, flore duplo longiore. Cal. campanulatus „(glaber, ad medium usque)“ 8-dentatus, dentibus „(ovatis, subulato-acuminatis)“ alternis minoribus. Petala 0. Stam. 4 „(calyce breviora; filamenta capillaria; antherae rotundato-ovatae, obtusae)“. Stylus filiformis „(stamina calycemque superans)“. Stigma capitatum. *Willd. et specimina Schreberiana. In India orientali. ☉.*

7. *P? diandra Nutt.*; foliis oppositis, linearibus, apice subalternis. *Dec. Prodr. III. p. 77. Nutt. in litt. ad Decand.* Folia 8-10 lin., vix lin. lata. Flores axillares sessiles. Stigmata 2. Caps. globosa. Cal. 4-6-fidus. An genus proprium? *Dec. Anne forte CRYPTA? In udis territ. Arkansani Amer. bor. Nutt.*

Obs. PEPLIUS tantum 4 admittit cl. Decandolle in prodr.; 2 in Rev. Reliquae, praeter indicam, illi AMMANNIAE. PEPLIDIS biflorae Salzm. cl. Decandolle ne meminit quidem in Revue. PEPLIS diandra Nuttall, quae cl. Decandolle alius generis videtur, CRYPTA videtur

*) Ill. M. a *Höbnerstein* speciei huic sequentem adnotationem subscripsit. „Mentionem hic faciam, quamvis non suo fortassis loco, plantulae maxime singularis, incerti, sed cum nullo ex notis combinandi, forte potius *Myriophyllo* subjungendi generis in saluginosis deserti Cumani circa rivum *Gorkajam* nascentis, ubi semel vetula et matura semina spargens (quae terrae mandata non germinavere) ab amicis *Steven* lecta. Rad. tenuis, simplex, cinerascens, annua. Caules nonnulli tenues, circiter digitales, alterni ramosi, patuli, uti tota plantula glabri. Folia alterna, sessilia, infima vix anguicularia, in lacinulas angustas instar *Cornu Cervi* divisa, ascendendo in caule diminuta. Flores axillares, sessiles, ad ramulorum extremitates glomerato-spicati. Perigonium 4-phyllum, persistens; folioli subrotundo-ovatis, obtusis, scariosis, fusciscentibus, oppositam capsulam obtegentibus. Capsulae 4, sessiles, magnitudine grani *Sinapis*, 1-loculares, 2-valves, 1-spermae; valvulis caducis, orbicularibus, fusciscentibus, reticulato-venosis, laciniosis, grano dorsali globoso, barbato, nigro, totum pene discum occupante. Receptaculum centrale, filiformi-columnare, valvulis brevius. Semen receptaculi apici adhaerens, minutissimum, oculum nudum fugiens, oblongum utrinque acutiusculum, testaceum. Quod capsulae constanter monospermae sint, pro certo affirmare vix ausim; tales saltim in plantula vetula, ob caducas undique partes fructificationis examinata difficillima; oligospermae esse vero mihi plane constitit.“ Est *Ternstroemia* *Stev.*

minima Nutt. *Mant.* I. *Syst. nostr.* I. p. 232. ad quam etiam *P. americana* Pursh. *Peumus tetrandra* L. est *Hedyotis tuberosa* Sw. s. *DUXALIA tuberosa* S. V. ed. nostr.

1286. T U S S A C I A.

1. *T. elegans* Willd. *Reliqu. Willd. Ms.*

Caulis simplex, pedalis. Folia lanceolato-lineararia, decurrentia, obtuse mucronata, cano-pubescentia. Flores terminales, dense spicati, spicâ villosâ, conicâ. *In Carichaca. De Humboldt.*

1287. A D E N I A.

1. *A. venenata* Forsk. *Fl. Aeg.* p. 77. *Lam. Enc. meth.* I. p. 40.

Frutex scandens, valde venenosus; trunco viridi, crassitie brachii; ramis teretibus, flexilibus, alternis. Petioli teretes, erecti. Folia alterna, peltata, palmata, 5-loba; lobis medium versus majoribus, ovalibus; foliolis basi callo s. glandulâ gibbosâ, nigrâ. Cirrhi ex ramis lateralibus. Pedunculi ramuli conferti in apice ramorum, breves, ramulosi, rudimentis foliorum glandulâ crassâ, petiolatâ, subtus bidentatâ; ad axillam rudimenti flores 2-3, sessiles, spica ergo composita. Calyx teres, sursum crassior, 2-poll.; lacinae oblongae, albidae, $\frac{1}{2}$ poll. Petala alba, curva, calyce breviora. Filamenta filiformia, parum connata, mox libera, calyce breviora, alba. Antherae erectae, lineari-lanceolatae, flavae. Germen calycis tubo adnatum. Stylus oblongo-conicus, flavescens. *Forsk. In Arabia. h.*

1288. B O L D U S.

1. *B. chilensis* Molina *Sagg. d. Chili.* p. 158. *PEUMUS Boldus* Molina *Hist. chil.* p. 160. 200. *Feuill. peruv.* 3. p. 11. t. 6.

Arbor circiter 25-ped., sempervirens, odora. Folia opposita, lanceolata, subsessilia, villosa, integra, 4 poll. Flores terminales, racemosi, albi. Cal. laciniis 6 elongatis. Plures varietates observavi, sed defloratae erant. *Molina l. c. In Chili. h.*

„PEUMUS in LAUROS mutatis BOLDI nomen substituo pro PEUMO Boldo a me et a Feuillée observato, qui minime LAURUS, nec RUIZIA vel BOLDO Ruiz et Pav., quae longe alius classis. Varias arbores in Chili nomine Boldo salutari videntur.“ *Molina l. c.*

1289. P R I N O S.

* *Floribus saepius 4-5-fidis. PRINOIDES Decand.*

1. *Pr. ambigua* Mich.; foliis (deciduis) ovalibus, utrinque acuminatis, (undique glaberrimis); floribus 4-fidis: masculis ad imos ramos congestis, femineis solitariis. *Mich. Fl. Amer. bor.* II. p. 388. *Nutt. Gen.* I. p. 213. *Decand.*

Prodr. 2. p. 17. β . florum partitione quinariâ. *Mich. l. c.*

CASSINE caroliniana Walt. *Carol.* p. 242. Arbor parva, cortice laevi, albido. Folia ovata vel elliptica, semper integerrima, $1\frac{1}{2}$ poll., mucronata, utrinque glabra. Petioli $1\frac{1}{2}$ poll. Pedunculi fructiferi saepe 2-poll. *Nutt.* (qui

minime esse *ambiguam Pursh*). In specim. in Herb. *Decand.* folia apice serrata; an eadem? *In Carolina. h.*

2. PR. *nitida Vahl*; foliis oblongo-ovatis, remote et obsolete serratis, nitidis, membranaceis; pedunculis axillaribus, unifloris; floribus tetrandris. *Vahl. Eclog. II. p. 26. Willd. Spec. II. p. 225.*

Rami angulati, glabri, apice compressiusculi, floriferi fusco-purpurascens, nec, ut in *dioica*, albidi. Folia petiolata, alterna, 2-3 poll., 2 poll. saepe lata, parum acuminata, obtusiuscula, basin versus integerrima et saepe acuta, utrinque glaberrima, venosa, subtus pallidiora, tenuiora, lucidiora, quam in *dioica*, impunctata. Petioli unguiculares, fusci. Pedunculi 5 v. 6, longitudine petioli, glabri, fusci. Cal. 4-fidus, laciniis ovatis. Petala 4, ovata, patentia, demum reflexa. Filamenta petalis parum longiora. Antherae oblongae, erectae. Stylus fere nullus; stigma acutum. Bacca ovato-subrotunda, magnitudine *Piperis nigri. Vahl. In Montserrat. Ryan. h.*

3. PR. *dioica Vahl*; foliis oblongo-ovatis, subserratis, (utrinque) glabris, coriaceis; pedunculis axillaribus subunifloris; floribus dioicis, tetrandris. *Vahl Eclog. II. p. 25. t. 14. Willd. Spec. II. p. 225.*

Rami crassitie pennae cygneae, cortice griseo, punctis rarioribus elevatis, apicem versus angulati. Folia frequentia, alterna, 2 poll. lata, in mare saepe rotundiora, acumine brevi; in femina oblongo-ovata, interdum emarginata, omnia margine parum reflexa, basin versus integerrima, venosa, supra vix nitida, subtus pallida punctisque minutis elevatis. Petioli fusco-purpurascens, unguiculares. Masculi pedunculi 20 circiter, longitudine petioli, plurimi 3-flori; pedicelli brevissimi. Cal. minimus, 4-fidus. Pet. 4, oblonga longitudine petalorum, patentia. Feminae pedunculi pauciores, omnes uniflori. Flores parum majores. Cal. et cor. ut in mare. Antherae 4, steriles. Germen oblongum, obtusum. *Vahl. An potius Ilicis species? Decand. Prodr. 2. p. 17. In Montserrat. Ryan. h.*

Obs. Ad hanc sectionem ca. *Decand. Prodr. 1. p. 16.* adhuc posuit P. *decidua*, quam sub *Ilicis prinoide* exhibuimus.

** *Floribus saepius 6-fidis; foliis deciduis. AGERIA. Decand.*

4. *PR. *verticillata*; foliis oblongis, acuminatis, basi angustatis, subduplicato-serratis, glabris; pedunculis subumbellatis axillaribus, petiolum subaequantibus. *Willd. Enum. p. 394. W. Baumz. p. 232. 2 ed. p. 296. PR. fol. obovato-lanceolatis, venis subtus pubescentibus etc. Willd. Spec. Pl. II. p. 225. Linn. Spec. I. p. 471. Lam. Enc. I. p. 207. Mill. Dict. N. 1. Desf. Arbr. II. p. 366. Abbot Ins. II. p. 171. t. 96. (fid. Willd.). Hayne Dendr. Fl. p. 41. Bigel. Fl. Bost. p. 79. Amer. Bot. t. 56. Torr. Fl. N. M. U. St. p. 357. Guimp. Abbild. fr. Holz. I. p. 70. t. 56. PR. Gronovii Mich. Fl. b. Amer. II. p. 236. PR. conferta Mönch. Method. p. 481. Duham. Arb. 1. p. 62. t. 23. edit. nova. III. p. 216. Munt.*

Phyt. 213. t. 51. (uterque fid. *Linn.*). β . PR. *ambigua*; fol. deciduis ovalibus, utrinque acuminatis, mucronato-serrulatis, subtus pubescentibus; flor. 4-5-fidis: masculis ad imos ramos congestis, femineis solitariis. *Pursh Fl. Amer. sept.* 1. p. 220. (excl. syn. *Mich.* et *CASSINE caroliniana Walt. Carol.*).

„An dioïca quaerit *Willdenow*, ut *Gronov Virg.* II. p. 54?“

Dioïcam esse monet *Nuttall. gen.* p. 213. Variare flore 7-, rarius 8-fido, cum totidem staminibus. *Du Roi Harbk.* II. p. 157. Frutex 10-12 ped.; ramis cinereo-fuscis, laevibus, teretibus, junioribus fuscis, nitidis, albo-maculatis. Folia alterna, petiolata, obovata, lanceolata, longe acuminata, basi cuneata, supra glabra, laete viridia, subtus pallidiora, ad nervos pilis brevibus, albidis obsita, 2-3½ poll.. Flores albi, parvi in pedunculis 5-7-floris, axillaribus, petiolo ¼ poll. longo brevioribus. Baccæ purpureae, per hyemem persistentes. *Willd.* Nonne subinde etiam pedicelli uniflori in spontaneis, qualis in specimine in *Herb. Schreb.* invenimus, in quod ad amussim ceteris quadrat diagnosis et descriptio *verticillatae*? In β rami juniores pube tenuissimâ; folia 1-2 poll., 6-8 lin. lata, rugosa, subtus omnino pubescentia; petioli puberuli, 4 lin.; florum masculorum umbellulae petiolos fere superantes in pedunculo erecto supra medium bipartito in umbellulas 2, 4-6-floras cum flore solitario pedunculato ex dichotomia; calycis lacinae plerumque 5 ovatae, obtusae, ciliatae; corollae lacinae 5 ovatae, obtusae, patentes, glabrae, vix lin. longae, apice involutae; stamina in floribus masculis longitudine fere corollae, erecta; antherae ovatae, obtusae; flores feminei axillares solitarii in pedicello brevi vix ½ pedunculi aequante, majores; calyces magis ciliati; germina ovata; stigma depresso-capitatum. PR. *ambigua Pursh* tantum varietas, monente, *Nuttall.* Baccæ majores. In *Virginia et Pennsylvania.* h.

5. PR. *padifolia Willd.*; foliis ovatis, breve acuminatis, basi obtusis, rugoso-venosis, subtus pubescentibus; pedunculis subumbellatis, axillaribus, petiolum subaequantibus. *Willd. Enum. H. Berol.* p. 394. *W. Baumz. ed.* 2. p. 297. *Hayne Dendrol. Fl.* p. 41. PR. *verticillata*; fol. deciduis, ovalibus, serratis, subtus pubescentibus; fasciculis florum masculis axillaribus umbelluliformibus; femineis aggregatis, utrinque sexpartitis. *Pursh Fl. sept. Amer.* I. p. 220. (excl. fors syn. *P. Gronovii Mich.*) PR. *vert. β . tenuifolia Torr. Fl. N. M. U. St.* p. 357. Frutex 6-8 ped., ramis teretibus, fuscis, glabris, junioribus laeviter sulcatis, rubro-fuscis, glabris. Folia exacte PRUNI *Padi*, alterna, 1-2 poll., basi rotundata vel obtusa, nunquam angustata, simpliciter irregulariter serrata, serraturis acutis, appressis, supra glabra, intense viridia, subtus pilis brevibus, nec ad venas tantum pilosiuscula, ut in *P. verticillata*. Pedunculi 5-7-flori. Flores albi. *Willd.* Baccæ rubrae *Pursh. Sprengel S. V.* II. p. 132 PR. *verticillatam Linn.*, *padifoliam et ambiguam* nequidem tanquam varietates distinxit. Etiam *Decand. Prodr.* II. p. 17. *P. padifoliam* cum *PR. verticillata*, uti *Link* in *Enum.* p. 344. conjungit. In *Pennsylvania.* h.

6. PR. *laevigata Pursh*; foliis deciduis, lanceolatis, ad-

presso-serratis, acuminatis, utrinque glabris, supra nitidis, subtus ad nervos vix pubescentibus; floribus femineis axillaribus, solitariis, subsessilibus: masculis sparsis; omnibus 6-fidis. *Pursh Fl. sept. Amer. I. p. 221. Torr. Fl. N. M. U. St. p. 338?*

6-8 ped.. Folia $2\frac{1}{2}$ poll., $\frac{3}{4}$ poll. lata. Pedicelli ♂ 12, ♀ 2 lin. *Torr. Baccæ magnæ, purpureæ. In montibus Allegany a nov. Eboraco ad Virginiam. h.*

7. *Pr. lanceolata Pursh*; foliis deciduis, lanceolatis, tenuissime et remote serrulatis, utrinque acutis glabrisque; floribus femineis sparsis, subgeminis, pedunculatis, 6-fidis; masculis aggregatis, triandris. *Pursh Fl. sept. Amer. I. p. 220. An Pr. lanceolata Desf.?*

Baccæ parvæ, coccineæ. (*Sprengel* in *S. V.* hanc et *laevigatam* neglexit). *In demissis Carolinae et Georgiae. h.*

*** *Floribus plerumque 6-fidis; foliis persistentibus. WINTERLIA. Mönch. Dec. l. c.*

8. **Pr. glabra*; foliis oblongis, obtusis, nitidis, (coriaceis), glabris, basi angustatis, apice utrinque serraturis duabus; pedunculis axillaribus, 1- seu 3-floris. *Willd. Enum. h. berol. p. 394. W. Baumz. 2 ed. p. 298. Spec. II. p. 226. Linn. Spec. p. 471. (quo teste: Cassine fol. lanceolatis, alternis, sempervirentibus, flor. axillaribus. Mill. Dict. t. 83. f. 2. Catesb. Carol. II. t. 57.). Lam. Enc. I. p. 207. illust. t. 255. f. 2. Pursh bor. Amer. I. p. 220. Torr. N. M. U. St. p. 338. Mill. Dict. ed. 7. n. 2 fide Hort. Kew. ed. II. 2. p. 313. Hayne dendr. Fl. p. 41. Duham. arb. et arbr. ed. n. III. p. 215. t. 54. Loddig. Bot. Cab. 450. Abbot ins. 1. p. 69. t. 55. (fid. Willd.). WINTERLIA triflora Mönch Meth. p. 74.*

„Arbor foliis alternis, petiolatis, oblongis, consistentibus, glabris, apicem versus serraturis utrinque saepe binis, acutis, facie ferme MYRICAE. Pedunculi saepius triflori, axillares, parvi. Flores non vidi.“ *Linn. Frutex 3-5 ped.; ramis diffusis, glabris, teretibus, fuscis (junioribus angulosis). Folia 1-2 poll. et ultra, obtusa cum acumine parvo, nitida, intense viridia, subtus pallidiora (vel rufescentia, apice dentibus 2 brevibus remotis). Pedunculi 1, 2, 3, solitarii, 4 lin.. Flores albi. Cal. et Cor. ut in praecedentibus. Willd. Baccæ nigrae (Inkberries Americanorum). A nova Anglia ad Floridam. h.*

9. *Pr. atomaria Nutt.*; foliis sempervirentibus, cuneato-ovatis, acutis, coriaceis, apice subserratis, subtus atomiferis; ramis junioribus subviscidis; pedicellis lateralibus, unifloris; baccis tuberosis. *Nutt. gen. I. p. 213.*

Affinis *glabrae*, et multo magis *coriaceae*: illâ omnibus partibus major; folia $1\frac{1}{2}$ -2 poll., 10-12 lin. lata, serraturis mucronatis, plerumque 4, saepius nullis, subtus punctis minutissimis atris. Rami juniores fusci, viscidi, nec, ut in *glabra*, pubescentes. Bacca magna, 6-sperma. *Nutt. In Georgia circa Savannah, in australi et boreali Carolina rarior. h.*

10. *Pr. coriacea Pursh*; foliis sempervirentibus, cuneato-lanceolatis, coriaceis, glabris, nitidis, integerrimis; corymbis axillaribus, brevissimis, sessilibus, multifloris; floribus 6-fidis. *Pursh Fl. sept. Amer. I. p. 221.* α . foliis obovato-lanceolatis, acuminatis. *Pursh l. c.* β . foliis lanceolatis, acutis. *Pursh l. c.*

Frutex habitu *ILICIS Dahoon*. An hujus loci *Prinos coriacea*, foliis sempervirentibus, ovatis vel cuneato-ovatis, apice subserratis; pedicellis multifloris, brevibus, corymbosis. *Nuttall in Sillim. Amer. Journ. of Scienc. Vol. II. No. 2. p. 293.*, qui ipse dubius haeret, utrum sua planta eadem cum illa *Purshii*? *In sylvis sabulosis ad ripas fluviorum Georgiae.* \S .

Obs. In herbario cli *Panzer* vidimus specimen *P. coriaceae* a clo. *Bosc* lectum, in quo folia fere *Pr. glabrae*, inflorescentia vero *Pr. coriaceae*. Rami teretes, fusci, glabri; ramuli in apicibus ramorum approximati, alterni, angulosi, tenuiter pubescentes. Folia alterna, erectiuscula, lanceolata, vel cuneato-lanceolata, acutiuscula, basi attenuata, coriacea, utrinque glabra, supra obsolete nervosa, subtus subavenia et punctis raris nigricantibus parvis, margine revoluta, subcalloso, ultra medium usque integerrimo, apice utrinque dentibus 2 appressis parvis remotis, 9-18 lin., 3-6 lin. lata. Petioli supra pleni, dorso convexi, $1\frac{1}{2}$ -3 lin., juniores puberuli, serius glabri. Corymbi axillares, subsessiles, multiflori, paulo ultra $\frac{1}{2}$ poll., superiores minus compositi, summi in pedunculos trifloros transeuntes; rhachis angulosa, compresso-tetragona, glabra. Pedunculi erecto-patentes, glabri, plerumque triflori; pedicelli similes, 1-flori, basi bracteolâ minutâ ovatâ, glabrâ, appressâ. Flores 2 fere lin. diam., Cal. lacinae 5-6 ovatae, obtusae vel acutiusculae, glabrae, petalis multo breviores. Cor. lacinae 6, rotundato-ovatae, patentes, concavae, obtusae, obsolete crenulatae, vix lin., $\frac{3}{4}$ lin. latae. Stam. 6, corollâ paulo breviora; filamenta subulata, glabra; antherae ovatae, longitudine fere filamentorum; polline flavo. Stylus brevissimus.

11. *Pr. montana Swartz*; foliis ovatis, serratis, utrinque nitidis; floribus hexandris; pedunculis axillaribus, (trifloris). *Swartz Prodr. p. 85. Fl. Ind. occ. 1. p. 622. Willd. Spec. II. p. 225. Decand. Prodr. 2. p. 17.*

Truncus 20-30 ped., cortice laevi fusco; rami subdivisi, erectiusculi, teretes, glabri. Folia alterna, utrinque acuminata, apice subattenuata, toto margine serraturis remotis acutis, nervosa, glabra, $1\frac{1}{2}$ poll., rigidiuscula, siccata livida, atra. Petioli breves, teretes, glabri. Pedunculi solitarii, foliis breviores, $\frac{1}{2}$ unc., filiformes, compressiusculi, tripartiti v. triflori. Flores parvi, albi. Cal. lacinae minutae, ovatae, convexae. Cor. limbus ad basin fere 6-partitus; lacinae ovato-lanceolatae, patentes, apice reflexae. Filamenta brevia, inter divisuras corollae inserta, erecta. Antherae subrotundae, basi bifidae. Stylus brevissimus, crassus, persistens. Stigma subcapitatum, depressum, margine revolutum, sub 6-fidum. Bacca subrotunda, obtuse 6-gona, parva, stigmatate umbilicata, 6-locularis, matura nigra. Semina solitaria, oblonga, compressa, nitida, nigra. Simillima *Pr. lucidae Ait.*, quae differt: fol. apice tantum serratis, subtus pallidioribus, minus consistentibus; *Pr. glabra* L. distinguitur: fol. lanceolatis, apice serratis, utrinque glabris; *Pr. verticillata*: fol. lanceolato-ovatis, subtus pubescentibus, toto margine serratis; pedunculis multifloris. *Swartz.* In specimine meo folia subintegerrima. *Decand. In fruticetis montium altissimorum Jamaicae.* \S .

12. *Pr. lucida Ait.*; foliis sempervirentibus, ellipticis, acuminatis, laevibus, subtus pallidioribus, apice subserratis.

Decand. Prodr. 2. p. 17. *Ait. hort. Kew.* 1. p. 478. ed. 2. II. p. 313.

Clis *Decand.* l. c. et *Ait.* l. c. *P. lucida* species ab *ILICE canadensi Mich.* diversa est, quacum conjungitur a clo. *Link* in *Enum.* et a clo. *Spreng.* S. V. I. p. 495., praeunte *Pursh.* *Aiton* silet de foliis sempervirentibus subtusque pallidioribus. *Flores et Patria* desiderantur. †.

13. PR. *sideroxyloides Swartz*; foliis subrotundis, integerrimis, (obtusis, subcoriaceis; pedicellis 4-8 axillaribus, confertis, petiolis longioribus). *Swartz Prodr.* p. 58. *Fl. Ind. occ.* 1. p. 624. *Willd. Spec.* II. p. 226. *Decand. Prodr.* 2. p. 17.

Arbor ligno duro; ramis teretibus, inermibus; cortice cinerascete. Folia alterna, subrotunda, ovata, nervosa, venosa, utrinque glabra, subtus pallidiora. Petioli breves. Pedunculi uniflori. Flores parvi, albidi. Cal. minutus, persistens. Cor. ad basin usque 6-partita, fere 6-pétala; laciniis obovatis, patentibus, persistentibus, apicibus erectis. Filamenta basi corollae inserta, alternantia, subulata, compressa. Antherae oblongae incurvae. Stigma sessile, subcapitatum, 6-striatum. Bacca subrotunda, stigmate persistente adpresso coronata. Semina 6, oblonga, sulcata, arcte contigua. Numerus partium subinde variat. *Swartz. In Caribaeis; in insula St. Christophori, Montserrati monte sulphuris.* †.

D U B I A E.

14. PR. *obtusata Willd.*; foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, obtusis, serratis, basi angustatis, submembranaceis, glabris; pedunculis trifloris, axillaribus. *Reliqu. Willd. Ms. In monte Quindiu. De Humboldt.* †.

15. PR. *myricoides*; foliis oblongis, cuneatis, obtusiusculis, serratis, coriaceis, glabris; pedunculis axillaribus, unifloris, aggregatis. *Reliqu. Willd. Ms.*

Obs. Utramque communicavit de *Schlechtendal*, pater; filius nil adnotavit.

Quid PRINOS *canadensis Loddig Cat.* 1823.

longifolia Desfont.

prunifolia Desf. et Lodd. l. c.

undulata Hort. Cels et Carler.

1290. P R E P U S A.

1. PR. *montana de Martius nov. gen. et spec.* T. II. p. 121. t. 190.

Frutex 8-10 ped.. Rami erecti, fastigiati, lignosi, rigidi, inferne teretiusculi, crassitie digiti, superne obsolete tetragoni, cicatricibus foliorum densis. Folia in superiore ramorum parte conferta, decussata, erecta, sessilia, sibi basi subcontigua, oblongo-obovata, basi attenuata, apice emarginata, margine integerrimo extenuato albido, 3-nervia, nervo medio subtus valde prominulo pallidiore excurrente, lateralibus evanidis, uti tota planta glaberrima, laete viridia, 4-5 poll., 1-1½ poll. lata. Racemi terminales lateralesque, erecti, foliosi. Pedunculus communis teretiusculus, inferne paribus foliorum instructus ibique cristâ tenui

transversâ; partiales decussati, ex alis foliorum superiorum, compressiusculi, 2 - 1 $\frac{1}{2}$ poll., supra medium foliis floralibus 4 - 8 lin. longis. Flores speciosi, 1 $\frac{1}{2}$ poll., stramineo-flavescentes. Calyx ultra poll., ventricoso-campanulatus, ad $\frac{1}{4}$ usque 6-fidus; laciniis triangularibus acuminatis; nervis 6 firmatus, angulis in alas verticales, basi rotundatas, sursum attenuatas extensis, reticulato-venosus. Corolla calyce $\frac{1}{4}$ altior; tubus compage robustiore; limbus ad $\frac{1}{3}$ partitus in lacinias ovatas, acuminatas, nervo longitudinali; compage tenerâ, attamen firmâ, in flore marcescente subscariosâ. Filamenta filiformia, alba, corollae divisionibus longiora. Antherae 1 $\frac{1}{2}$ lin., ochroleucae. Stylus filiformis, albidus, staminibus brevior. Stigma flavescens, lamellis obovato-oblongis patentibus. Capsula cylindrica, acutiuscula, coriacea, extus helvola, nitida, intus straminea; valvulis omni longitudine intus utrinque in trophospermium griseum spongiosum scrobiculatum extensis. Semina minutissima, fusca. *Mart.* In alpestribus prope Sincora, in Provincia Bahiensi. h.

1291. A N O P T E R U S.

1. *A. glandulosa* Labill.; foliis serrato-glandulosis; racemis simplicibus. Labill. nov. Holl. 1. p. 86. t. 112. R. Brown Prodr. nov. Holl. p. 458. Poir. Illustr. gen. Cent. 10. n. 1.

Arbor 25 - 30 ped. (trunco gracili, glaberrimo Br.); ramis ramulisque patentibus, glabris, teretibus, cicatricibus exasperatis. Folia alterna (passim opposita Brown), subpetiolata, oblonga, fere lanceolata, basi attenuata, apice acutiuscula, utrinque glabra, nervis tenuibus, subsimplicibus, lateralibus, coriacea, glandulis nigris ad apicem dentium. Flores axillares ad apicem ramorum, in racemis simplicibus solitariis ternis quaternisque, floribus sparsis, pedicellatis: pedicellis simplicibus, subcurvatis. Calycis lacinae breves, subovatae, acutae. Cor. limbus 6 lin., laciniis ellipticis, obtusis. Stamina numero laciniarum, basi corollae affixa. Filamenta corollâ breviora. Germen ovale, acutum. Stylus brevis. Caps. oblonga, acuta, apice apiculis 2 obtusis. Semina ovata, subtrigona, subcompressa, nigro-fusca: alâ pallidâ, oblongâ, transparente. Labill. In Prom. van Diemen. h.

1292. D U P R A T Z I A.

1. *D. scoparia* Rafinesque Fl. Ludov. p. 55. Poir. Enc. meth. Ill. gen. T. III. p. 507. La Balayeuse Robin Itin. p. 420.

Caulis 3-4 ped.; ramis fastigiatis, virgatis, 4-angulis: angulis alatis; foliis sessilibus, linearibus, glabris, appressis; floribus numerosis, spicatis, verticillatis, sessilibus, violaceis. Rafin. In Louisiana. ☉.

1293. F R A N K E N I A.

* 1. Fr. pulverulenta; foliis obovatis, retusis, glabris, subtus pulverulentis (pubescentibusque), in petiolo ciliatis; radice exili. Decand. Prodr. I. p. 349. Fr. calycibus glabris,

etc. *Presl Fl. sicul.* 1. p. 140. *Linn. spec.* 474. *Willd. Spec.* II. p. 243. *Smith Fl. Brit.* 388. *Engl. Fl.* II. p. 186. *Engl. Bot.* t. 2222. *Sibth. Prodr. Fl. gr.* II. p. 213. *Fl. graec.* t. 344. *Desf. Atl.* 1. p. 316. *Allion. Fl. ped.* II. p. 90. *Savi due Cent.* p. 92. *Lam. et Decand. Fl. fr.* 4. p. 766. *M. a Bieb. Fl. Taur. cauc.* 1. p. 287. *Bertol. Amön. ital.* p. 146. n. 114. *Bivona Bernardi Sic. Cent.* II. p. 26. n. 35. *Broter. Fl. Lus.* p. 556. *Gaert. fil. t.* 184. f. 12. *Dict. Sc. natur.* 44 Cah. *Fr. laevis Habl. Taur.* p. 153. (fid. *Bieberst.*) *Bauh. Hist.* 3. p. 373. *Clus. Hist.* II. p. 186. f. 2. *Ger. Emac.* 567. *Lobel. Icon.* 421. β . *Fr. canescens*; fol. ovatis, obtusis, subtus canescentibus, margine revolutis; petiol. ciliatis; caul. diffusis, scabris; calycibus hispidis. *Presl Fl. sic.* 1. p. 140. *Del. Prag.* 1. p. 61.

Caules procumbentes vel adscendentes, ramosi, 4-5-poll.. Folia quasi *Euphorbiae Chamaesyces*, subtus albido-viridia et quasi pulverata. Flores dilute violacei, sessiles, axillares. *Brot.* Rad. fibrosa. Caules pubescentes, dichotomi fere a radice. Folia opposita quaternaque, subrevoluta. Flores pallide rubri. *Smith.* Calyx prismaticus, glaber, vel rarius ad angulos pilosus. In planta culta caules saepius glaberrimi, adscendentes; folia vix pulverulenta; petioli vix ciliati; flores pallidiores et paulo majores. — In *Fr. canescente Presl*, quae fid. *Jan in litt.* et fid. specim. certe nil nisi varietas *Fr. pulverulentae*: radix annua, exilis; caules spithamaei, dichotomo-ramosissimi, pilis brevissimis densissimis scabri et canescentes; folia opposita, supra glabra, subtus canescenti-pulverulenta; inferiora ovata, obtusa, margine revoluta, medio plana; superiora tota revoluta, et inde quasi linearia, folia *Fr. laevis* referentia; petioli brevissimi; flores in dichotomia axillares aut in ramulis terminales, sessiles; calyx angulis hispidus; petala parva, roseo-violacea, apice crenulata, obtusa. A *Fr. pulverulenta* eo differt, ut *Fr. intermedia* a *Fr. laevi. Presl.* Variare caule prostrato diffuso et erecto; specimina odessana dubia esse foliis obovato-spathulatis integerrimis (minime obovato-retusis) petiolatis, petiolis ciliatis, subtus parcissime pulverulentis, pilis rigidis crispis intermixtis, ramis pubescentibus: *Lang in Bot. Zeit.* 1827. *Beyl.* 3. p. 57. Specimina odessana nostra ab amiciss. *Besser* communicata vix differunt a hispanicis, gallicis etc., nisi caule magis erecto. In *Europae, Sibiriae, Africae borealis, forsitan Novae Hollandiae arenosis maritimis; ad lacus salcos Tauriae; β prope Panormam, Mondello, Sferacavollo Siciliae.* ☉.

2. *Fr. nodiflora Lam.*; foliis ovatis, glabris, in petiolo non ciliatis; caulibus prostratis calycibusque glabris. *Decand. prodr.* I. p. 349. *Burch. Cat.* n. 513. *Fr. caulibus simplicibus, filiformibus, subglabris; fasciculis florum lateralibus axillaribus et oppositis. Lam. Enc.* II. p. 543. *ill. t.* 262. f. 4.

Caules 6-8 poll., simplices vel subsimplices, foliosi. Folia margine revoluta, $2\frac{1}{2}$ lin.. Rami in quavis axilla novelli, oppositi, internodiis breviores, foliosi, floriferi. Flores fasciculati ad nodos caulis. Calyx oblongus, subangulatus, glaber. Habitus *Lythri. Lam.* In *Promont. b. Spei.* 2. h.

3. Fr. *Nothria Thunb.*; foliis linearibus, margine revolutis, glabris, basi ciliatis; ramulis pubescentibus; caulibus prostratis calycibusque glabris. *Decand. Prodr.* I. p. 349. *Thunb. prodr.* 58. *Fl. cap. ed. Schult.* 1. p. 295. *Willd. Spec.* II. p. 242. *NOThRIA repens Berg. cap.* 171. t. 1. f. 2. Fr. *hirsuta* β. *Lam. Enc.* II. p. 543.

Caulis decumbens, teres, glaber, articulatus, aphyllus, purpurascens, spithamaeus. Rami similes, oppositi, interdum alterni, manifeste hinc inde pilosi, adscendentes, foliosi, pollicares usque digitales. Ramuli filiformes, similes, breves. Folia opposita et verticillata, terna plurave, basi vaginata, connata, subteretia, carnosa, glabra, integra, supra sulcata, subtus margine revoluta, vix lineam longa, vaginâ ciliis albis. Flores axillares et terminales, aggregati, sessiles. Perianthium prismaticum. Filamenta 6 ad medium coalita. Stylus 1, stigmatibus 3. Differt caule decumbente, glabro. *Thunb.* „An a *laevi* diversa?“ quaerit *Decandolle.* *Ad Promont. b. spei.* 4. h.

4. Fr. *Krebsii Chamis. et Schlechtend.*; foliis linearibus, margine revolutis, glabris, basi subciliatis; caulibus flagelliformibus calycibusque hispida; floribus brachiato-paniculatis; petalis calyce duplo longioribus. *Chamisso et Schlechtend. in Linnaea* 1826. p. 36.

Differt a Fr. *Nothria*: hirsutie caulis et calycum corollisque multo minoribus; a Fr. *nodiflora*: hirsutie, fol. linearibus, margine revolutis, basi ciliatis totoque habitu. Proxima Fr. *hispidae Dec.*; at differt: floribus duplo majoribus; calycum dentibus multo profundioribus, $\frac{1}{4}$ (nec $\frac{1}{3}$) totius calycis aequantibus, petalis multo majoribus, 4 lin. longis (in Fr. *hispida* paulo ultra $2\frac{1}{2}$ lin. longis); squamulâ ad basin limbi transversâ, angustâ, nec erectâ; laminâ angustiore nec ellipticâ; caulibus flagelliformibus, $1\frac{1}{2}$ -2 ped., ramulosis; floribus magis distantibus in apicibus axillisque ramulorum quasi brachiatorum, nec arctius compactis. *Chamisso et Schlechtend. Clo. Spreng. in Cur. post.* p. 141. synonymon Fr. *Nothriae*, quod certe non est, fid. specim. a clo. *Zuccarini* communicati. *In Prom. b. spei. Krebs.* h.

5. * Fr. *laevis*; foliis linearibus, margine revolutis, glabris, basi ciliatis; caulibus prostratis calycibusque glabris. *Decand. prodr.* I. p. 349. *Linn. Spec.* 473. *Willd. Spec.* II. p. 241. *Lam. Enc.* II. p. 543. (omnes excl. syn. *Bocc.*) *Smith Engl. Fl.* I. p. 186. *Fl. Brit.* 387. *Engl. Bot.* III. t. 205. *Savi Fl. pis.* I. p. 369. *Desf. Fl. Atl.* 1. p. 317. *Lam. et Dec. Fl. fr.* 4. p. 765. *Schousboe Maroc.* I. p. 181. *Roth n. Beytr.* 1. p. 196. *Lam. Ill.* t. 262. f. 1. *Mich. gen.* 23. t. 22. f. 1. *Barrel. ic.* t. 714. (quod *Schousb.* excludit). *Lob. ic.* 422. f. *Dalechamp. hist.* 1124. f. *Bauh. hist.* III. 703. f. *Petit. H. Brit.* t. 10. f. 11. *Buxb. Cent.* I. t. 47. f. 1. (fid. *M. a Bieberst. Suppl. Fl. taur. cauc.* p. 275.) *Tournef. Inst.* 244.

Rad. lignosa. Caules prostrati (4-6 poll.), ramosi, teretes, subpubescentes, ramis adscendentibus, foliosis. Folia glaucescentia, *Syst. Vegetabil.* Vol. VII.

5-4 lin., supra convexa, fasciculis foliorum stipata. Flores solitarii in axillis ramorum terminalesque, sessiles, carnei. Nectarium squama flava ad unguem petali singuli. *Smith.* Variat floribus albis. *Lam.* Petala obovata, obtusa, subrepanda. In speciminibus cultis caules ramulique procumbentes; folia $1\frac{1}{2}$ lin.; flores majores; calyces ad angulos pilosi. *In maritimis Europae, maris caspii et Africae borealis.* 4. et h.

6. *FR. intermedia Dec.*; foliis linearibus, margine revolutis, glabris, basi ciliatis; caulibus prostratis, velutinis; calycibus hispidis. *Decand. Prodr.* I. p. 349. et hoc teste: *FR. hirsuta Linn. Spec.* p. 349. var. *calabrica.* *FR. hirsuta Lam. et Dec. Fl. fr.* IV. p. 766. *Desf. Fl. atl.* I. p. 317. *Spreng. S. Veg.* II. p. 134. Franca maritima, supina, multiflora, candida; caulibus hirsutis; foliis quasi vermiculatis. *Mich. Gen.* 25. t. 22. f. 2. *FR. intermedia Presl Fl. sicul.* I. p. 141. *FR. hirsuta intermedia Jan Elench.*

Radix lignosa, crassa, flexuosa, fusca. Caules basi lignescens et mox in ramos divisi numerosos procumbentes, teretes, ad nodos vix tumescentes, fuscis; pube brevissima, densa, canescente vel subferruginea; 5-10 poll. Folia opposita quaternave, vel quasi fasciculata, erecta, patentia, reflexa vel arcuata, linearia, sed ob margines revolutos, saepe teretiuscula, obtusa, subcoriacea, supra glabra, subtus albide pulverulenta, ad basin vel ad petiolum brevissimum, in membranam stipularem purpureo-fuscam dilatatum, ciliis longis albis, setosis; 1-2 lin. longa. Flores axillares et terminales, solitarii, sessiles. Cal. tubulosus, tetragonus, 2 lin., 5-dentatus: dentibus brevibus, lanceolatis, acutis; angulis 4-5 obtusis, prominentibus, totidemque sulcis, purpurascens-fuscus, undique pilis longis rigidis, patentibus, albis remotis. Petala 5, rarius 4, violacea et roseo-violacea; ungue cuneiformi, calycis tubum aequante, pallido; lamina ungue dimidio brevior, obovata, obtusa, crenulata, lin. longa. Stamina aequalia, longiora petalorum ungue paulo superantia; antherae ovatae, flavae. Stylus longitudine fere staminum longiorum. Stigmata filiformia. *In maritimis Europae australis ad Mediterraneum et in Africa boreali.* 4. h.

7. * *FR. hirsuta*; foliis linearibus, margine revolutis, glabris, basi subciliatis; caulibus diffusis calycibusque hispidis. *Decand. prodr.* I. p. 349. (sub *FR. hispida*, uti *Spreng. S. V.* II. 134). *FR. hirsuta*, caulibus hirsutis; floribus fasciculatis terminalibus. *Linn. Spec.* p. 475. *Willd. Spec.* II. p. 245. (uterque excl. syn. *Michel.* ad *intermediam* spectante). *Sibth. Prodr. Fl. graec.* II. p. 215. *Fl. graec.* t. 345. *FR.* ramis floriferis dichotomis: floribus axillaribus terminalibusque; petalis obtusis; foliis oblongis, revolutis; caule hirsuto. *M. a Bieb. Fl. taur. cauc.* I. p. 286. (excl. syn. *Mich.*). *Lam. ill. t.* 262 f. 2? *NOTHRIA hirsuta Berg.?* *Buxb. Cent.* I. t. 47. f. 2. (fid. *M. a Bieb. Fl. taur. cauc. Suppl.* p. 275. qui, quorsum *Buxb.* I. c. f. 3. pertineat, nescire se affirmat). *β. A. cretica maritima supina, caule hirsuto, fol. quasi vermi-*

culatis, fl. albo. *Tournef. Cor.* 45. (fid. spec. apud *Reichenb.*).

Flores non fasciculati, sed ad ramorum dichotomiam tam axillares, quam terminales, sessiles. Varietas dichotomiae ramis elongatis videtur pro *F. laevi* fuisse habita: haec enim nullibi circa Astrachan. *M. a Bieb.* Differt ab *intermedia*, cui valde affinis, et cum qua forte unam tantum eandemque speciem sistit: caulibus minus prostratis, sed adscendentibus, diffusis, minus fuscis; pilis longis, albidis, rigidis, patentibus; foliis verticillos magis remotos mentientibus; membranâ stipulari minus fuscâ; calycibus ad angulos praesertim strigoso-hispidis; petalis minus obovatis et paulo angustioribus longioribusque. Reliqua fere omnia ut in illa. — Huc nobis etiam spectare videtur *Fr. intermedia Lang* in *Bot. Zeit.* 1827. *Beyl.* 3. p. 56.; specimina odessana nostra a *clo. Besser* lecta saltem potius huc, quam ad *Fr. intermediam* pertinent, quamvis pili in caulibus quidquam breviores, quam in speciminibus creticis et caspiis. *NOTHRIA hirsuta Berg.* forte potius ad *Fr. Krebsii*. In *Creta, in salsuginosis deserti caspii, circa Odessam.* t. 4.

8. *F. strigosa Presl*; foliis linearibus, glabris, margine revolutis, basi ciliatis; caulibus diffusis, (vel erectis?) densissime strigosis; calycibus hispidis. *Presl Fl. sic.* 1. 141. *F. hirsuta Sieber herb. cret.*

Caulis undique pilis rigidis, albis, horizontaliter patentibus, densissimis. Folia basi glabra, in petiolo longe ciliata. Flores axillares in dichotomiis et subterminales. Cal. cylindricus, angulis hispidis. Petala rosea, emarginata, denticulata. A *F. hispida Dec. s. hirsuta Sibth. Bieb. Pall.* praecipue calycibus ovatis strigosissimis distinguitur. *Presl.* Specimen nostrum *Siberianum Fr. hirsutae* e *Creta* vix a *Fr. hispida Dec.* differt; melius vero cum planta *cli Presl* quadrare videtur *FRANK. hirsuta elatior*, quam *Sieber* in *Aegypto* prope *Damiatte* legit, et quae reverâ propriam sistere videtur speciem. In hac: caules basi, ut videtur, diffusi, sed rami stricti, ped., duplo validiores quam in *Fr. hirsuta*, crassitie pennae gallinae, teretes, fusci, strigosissimi pilis patentibus inferne flavescentibus, apice albidis; ramuli remotiores; folia omnino similia *hirsutae*, sed paulo majora, latiora, et magis falcata; flores in apicibus ramorum corymbosi (quam ob rem etiam *Fr. corymbosa* in herbariis passim dicta), vix majores quam in *Fr. hirsuta*; calyces ovati, $1\frac{1}{2}$ -2 lin., ob strigas tantum densissimas, longas, albas, patentes obsolete angulosi, omnino, nec ad angulos tantum, strigosi; petala cum unguibus 3 lin.: laminis obovatis, emarginatis, crenulatis, roseis ut videtur; filamenta subaequalia, subulata, basi dilatata; antherae ovato-oblongae, flavae. In *Creta Presl; in Aegypto, prope Damiatte.* 4. vel t.

9. *Fr. corymbosa Desf.*; foliis linearibus, margine revolutis, glabris, basi subciliatis; caulibus velutinis, erectis (?); calycibus glabris; floribus corymbosis. *Dec. Prodr.* 1. p. 550. *Fr. fruticosa*; fol. linearibus, pulverulentis, margine reflexis; flor. corymbosis. *Desf. Fl. Atl.* 1. p. 315. t. 95. et hoc teste: *Alsine marit. hisp. frut.*; fol. quasi vermiculatis. *Tournef. Inst.* 244. *Cavan. Annal. Hist. nat.* T. 1. n. 6. p. 43.

Omnino distincta ab *ericifolia*. Frutex ramosissimus. Caules lignosi, procumbentes et adscendentes, nodosi, ramosissimi. Folia numerosa persistentia, opposita, in axillis fasciculata. Corymbi densi. Cal. pentagonus, erectus, laciniis 4-5, rigidis, profundis, in tubum coalitis, basi foliolis 3-4 laxis persistentibus. Petala 5 linearia, longitudine calycis, ovata, subcrenulata, rosea. Filamenta approximata, subaequalia. Antherae parvae, subrotundae. Caps. oblonga, acuta, 1-locularis, 3-valvis. Sem. fusca. *Desf.* Caulis teres, ped. Folia 2 lin., internodiis longiora, pulverulenta, fere mollia. Calycis lacinae, acutae, convergentes, 2 lin. Cor. calyce major. Petala obtusa, basi angustata. Germen ovato-oblongum. *Cav.* In maritimis Barbariae prope Arzean, *Desf.*; prope Mogador Brouss.; in Valencia prope Alicante. *Cav.* h.

10. Fr. *ericifolia* C. Smith; foliis linearibus, petiolatis, margine revolutis, basi subciliatis, superne glabris, subtus, caulibus calycibusque pruinoso-velutinis. *Decand. Prodr. I. p. 350.* C. Smith in *Buch Can. p. 30.*

Ulterius inquirenda; nunc ad Fr. *corymbosam*, nunc fere ad *intermediam* habitu accedens. *Dec.* Sprengel in *S. V. II. p. 135.* sine dubio jungit cum *corymbosa*. In maritimis insul. *Canariensis.* h.

11. Fr. *velutina* Brouss.; foliis lineari-oblongis, obtusis, basi non ciliatis, utrinque cauleque calycibusque molliter velutinis. *Decand. Prodr. I. p. 350.* Fr. *canescens* Willd.; floribus terminalibus; foliis lineari-lanceolatis, incano-pubescentibus; caule fruticoso, diffuso. *Reliqu. Willd. MS.?*

Fruticulus parvus, radice crassa, lignosa, longissima, nigricante, fibris paucissimis. Rami procumbentes, ramulosi, foliosi. Folia sessilia, linearia, acuta, 3-4 lin., lin. lata. Flores terminales, solitarii? et fasciculati. Tota pilis brevibus, patentissimis, albis hirta, canescens. Forte haud diversa, licet omnibus partibus paulo major. *De Schlechtendal fil.* In Africa boreali. *De Broussonet.* h.

12. Fr. *mollis* M. a Bieb.; foliis ovato-lanceolatis, acutis, villosis; ramis floriferis alternis, paniculatis, villosis; floribus brevissime pedicellatis, axillaribus, alternis. *M. a Biebert. Suppl. taur. cauc. p. 276.* *Decand. Prodr. I. p. 276.*

Tota pilis mollibus, patulis subcanescens. Caules ramosissimi, ramis denuo ramosis, ascendendo brevioribus. Folia alterna, sessilia, plana. Racemi paniculati, elongati, foliosi. Differt potissimum inflorescentia paniculato-racemosa, nec dichotoma. *M. a Bieb. l. c.* Circa Sallian ad ostia Cyri fluminis. *Stev.* quo teste etiam circa Massiliam cum pulverulenta commutata.

13. Fr. *thymifolia* *Desf.*; foliis oblongis, obtusis, parvis, rigidis, glabris, cinereis, basi ciliatis; caulibus erectis, junioribus vix pubescentibus; calycibus glabris. *Decand. Prodr. I. p. 350.* Fr. fruticosa, erecta, ramosissima; fol. cinereis, linearibus, confertis, brevissimis; floribus axillaribus

Desfont. Fl. atl. I. p. 316. Schousb. Maroc. I. p. 182.
 (quibus testt: *Boccon. Mus. 1. t. 7. f. 2. et Barrel. ic. 714.*)
Roth n. Beytr. 1. p. 197.

Caulis ramosissimus, ramis fastigiatis, apice floriferis. Folia crustâ cinereâ. *Schousb.* Fruticulus 6-10 poll., cortice rimoso; ramis rectis, nodosis. Folia opposita, a basi ad apicem sensim attenuata, obtusiuscula, semicylindrica, in junioribus subimbricata. Flores sessiles. Cal. gracilis, oblongus, persistens, pentagonus. *Desfont.* Fruticulus totus cinereus. Folia foliorum fasciculis stipata, vix lin. superantia. Calyces foliis breviores, ad angulos pilosuli. Petala lineari-oblonga, obtusa, calyce duplo fere longiora. Reliqua conveniunt in specimin. nostris hispanicis. *In arenis deserti Barbariae circa Tozzer, Desf.; in maritimis Mogador, Schousb.; in Hispania circa Aranjuez. h.*

14. Fr. *revoluta Forsk.*; foliis ovatis, margine revolutis; caulibus dichotomis; (floribus solitariis); capsulis 4-valvibus. *Decand. Prodr. I. p. 350. Forsk. aegypt. 75.*

Habitus *F. corymbosae*; sed flores sparsi, solitarii; in specim. *Sieber.* calyces 5-phylli. Fruticulus erectiusculus, $\frac{1}{2}$ ped., ramosissimus; ramis teretibus, nodosis, erecto-patentibus, dichotomis, velutinis, fuscescentibus. Folia 2-4, foliorum fasciculis stipata, margine valde revoluta et inde fere cylindrica, obtusiuscula, glabra, ad petiolum brevissimum ciliata, canescentia, $1\frac{1}{2}$ -2 lin., internodia fere aequantia. Flores in dichotomiis vel in apicibus ramulorum sessiles. Calyx 5-6 angularis, persistens, ad basin fere usque 5-6-partitus: lacinae oblongo-lanceolatae, acutiusculae, a basi ad medium et ultra pilis setosis fuscescentibus, marginibus membranaceis involutae, foliis duplo fere longiores. Petala 5, oblonga, obtusa, apice crenulata, calyce longiora (albido-rufescentia. Stigma 3-fidum. *Forsk.*). Semina plerumque 2, fusca, ovata, uno latere sulcata. Ad spec. *Sieberian.* *In Alexandria. h.*

15. Fr. *microphylla Cav.*; foliis ovalibus, minimis, quadrifariam imbricatis, glabris; caulibus prostratis calycibusque glabris. *Decand. Prodr. I. p. 350.* Fr. fruticosa, laevis; fol. oppositis, quadrifariam imbricatis, subteretibus; floribus solitariis, subterminalibus. *Cavan. ic. VI. t. 597. f. 1.*

Caules lignosi, ramosissimi, 6 poll. Folia vix lineae, apice parum recurva. Flores erecti, sessiles. Cal. subcylindricus, pentagonus, laciniis linearibus, carinatis, apice acutis. Cor. alba, petalis calyce longioribus, apice dilatatis, crenulatis. Stigmata 3, obtusa. Caps. ovalis, acuta, 3-valvis. Semina parva, cinerea, receptaculo centrali affixa. *Cav.* *In America meridionali. h.*

16. Fr. *fruticulosa Dec.*; foliis linearibus, acutiusculis, margine revolutis, glabris, basi non ciliatis; caulibus erectis calycibusque acutis glabris. *Decand. Prodr. I. p. 350.*

In arenis Nov. Hollandiae ad ins. St. Francisci. Herb. Mus. Paris.

17. Fr. *pauciflora Dec.*; foliis linearibus, margine revolutis, fere filiformibus, glabris, basi ciliatis; caulibus erectis

tiuseulis, canescentibus calycibusque acutis glabris. *Decand. Prodr.* I. p. 350.

In insula van Diemen. h.

18. FR. *tetrapetala* Labill.; foliis linearibus, (crassis) margine revolutis, fere filiformibus, subsolutis; floribus (solitariis) 4-petalis; calycibus lobis 4 margine tomentosus. *Decand. Prodr.* I. p. 350. *Labill. Nov. Holl.* 1. t. 114.

Caules lignosi, prostrati, pedales et ultra. Folia opposita, conniventia, subcylindrica, carnosae, sulcata, poris glandulosis. Flores terminales. Calycis lacinae 4, lanceolatae, persistentes. Petala 4 obtusa, longitudine calycis. Stam. 6 exserta. Stylus simplex, stigmatibus obtusis. Caps. ovata, trigona. *Labill. In nov. Hollandiae insula van Diemen.* h.

19. FR. *grandifolia* Chamis.; foliis obovato-cuneatis, mucronulatis, margine revolutis, subcoriaceis, hirtellis, basi ciliatis; caulibus prostratis, ramis calycibusque hirtis. *Chamisso et Schlechtend. in Linnaea* 1826. p. 35.

Caules basi lignescens, crassitie $1\frac{1}{2}$ lin.; rami brachiati, obsolete tetragoni, hirtelli vel hirsuti, ad nodos tumescentes pilis longioribus densioribus. Folia membranâ stipulari connata, ramis ex axillis propullulantibus quasi verticillata aut fasciculata, obtusa vel mucronulata, integerrima, 6 lin., 2-3 lin. lata, plus minusve hirtella et ciliata, ciliis baseos et membranae connectentis insignibus. Flores axillares, alares et terminales, solitarii, sessiles. Cal. 4 lin., tubulosus, 5-dentatus; dentibus brevibus, obtusis, mucronulatis, rectis; striis 5 in dentes excurrentibus totidemque sulcis, hirtus. Petala 5, unguiculata; ungue cuneiformi longitudine tubi calycis; laminâ oblongâ ungue dimidio brevior, integerrimâ, mucronatâ, margine sub lente papillis minutissimis ciliato; squamulâ ad faucem minutâ, ellipticâ, apice ciliatâ. Stamina 6-7, demum exserta, inaequalia, longitudine petalorum; filamenta filiformia; antherae ovatae, medio affixae. Pistillum longitudine staminum; stylus longitudine calycis; stigmata 3 filiformia. Capsula lanceolata, obsolete triquetra, trivalvis, apice dehiscens. Semina 9 circiter, ovalia, utrinque subacuta, rufa. *Chamis. et Schlechtend. In sabulosis Novae Californiae ad portum St. Francisci.* h.

20. FR. *Beatsonia*; foliis subrotundis, carnosis, glabris; caule fruticoso, dumoso. *Decand. Prodr.* I. p. 350. (sub *BEATSONIA portulacifolia*, uti *Roxb. fil. in Fl. St. Helen. in itin. Beats* p. 300.) FR. *portulacifolia* Spreng. *S. V.* II. p. 134.

In rupibus maritimis ad littus australe ins. St. Helenae. h.

1294. T H E L Y R A.

Species non descriptae. Arbores alternifoliae. Species bracteis glandulosis spectabilis. *Aub. d. Pet. Thouars gen. mad.* n. 72.

In Madagascar. h.

-1295. C O S S I G N I A.

1. *C. triphylla* Lam.; foliis ternatis; foliolis obovato-cuneatis, obtusis v. emarginatis, supra nitentibus, subtus flavo-tomentosis. *C. fol. ternatis*, subtus tomentosis: foliolis oblongis, obtusis. *Lam. Enc.* II. p. 152. t. 256. *Willd. Spec.* II. p. 226. *C. borbonica* Decand. *Prodr.* I. p. 614. (partim). *Bory de St. Vinc. Voy.* II. p. 524. *C. splendens* Sieb. *Herb. Maurit.* II. n. 162. *C. Commersoni* Raeuschel.

Arbor 6-8 ped., ramis teretibus, apice pubescentibus. Folia alterna, foliola obtusa, integerrima, basi attenuatâ, superne viridia, scabriuscula, subtus sordide alba vel fere ferruginea, petiolo communi satis longo; foliolum impar quadrante majus. Flores albi, mediocres in racemis axillaribus terminalibusque unde panicula terminalis. Cal. 5-fidus. Petala 4. *Lam.* Rami inferne teretes rugulosi cinerascetes, crassitie pennae gallinae; superne angulosi, subtrigoni, floccoso-tomentosi, aurei. Folia in apice ramorum approximata, alterna, erecto-patentia, omnia ternata. Petioli communes $\frac{1}{2}$ -1 poll., dorso convexi, supra canaliculati, sat crassi, vetustiores rugulosi, juniores tomento floccoso aureo e pilis stellatis. Foliola obovata v. cuneata, plerumque emarginata, integerrima, margine revoluta, vetustiora supra glabra, nitentia, juniora ad nervos pilis stellatis sparsis, subtus tomento brevissimo, denso, appresso, fere aureo, in quo praeterea pili breves stellati; omnia in pedicellos $1\frac{1}{2}$ -2 lin., crassos attenuata, $1\frac{1}{2}$ -3 poll., 9-14 lin. lata; nervo medio subtus valde prominente magis floccoso-tomentoso; costis parallelis, obliquis. Panicula terminalis, erecta, composita, pyramidata, multiflora, $3\frac{1}{2}$ poll.; rami angulosi, compressi, sulcato-striati, floccoso-tomentosi, aurei uti ramuli pedicellique uniflori. Bractee oblongae, v. subspathulatae, obtusae, densissime tomentosae uti calyx, $1\frac{1}{2}$ -5 lin.. Cal. profunde 5-fidus, subcampanulatus; laciniae inaequales, 2 majores ovato-rotundatae, 3 minores ovatae, obtusae, concavae, crassae, petalis paulo breviores, 2- $2\frac{1}{2}$ lin.. Petala 4, rotundata, brevissime unguiculata, concava, margine glanduloso-ciliata, extus dense tomentosa, intus parum tomentosa. Stam. 6, erecta, corollâ breviora; filamenta subulata, glabra; antherae oblongae, flavae. Germen rotundatum, dense tomentosum, in floribus sterilibus parvum. Stylus brevior quam in *pinnata*, praesertim in sterilibus, basi tomentosus, ante anthesin deflexus. Stigma obsoletum, truncatum. Ad specim. in *Herb. Sieber.* *In insula Mauriti.* h.

2. *C. pinnata* Lam.; foliis pinnatis; foliolis quinis, (elliptico-) lanceolatis, (obtusis), subtus (cano-) tomentosis. *Lam. Enc.* II. p. 152. t. 256. *Willd. Spec.* II. p. 227. *C. borbonicae* var. Decand. *Prodr.* I. p. 614. *C. borbonica* Sieber *Herb. Fl. Maurit.* II. No. 165.

Statura *C. triphyllae*; foliola subsessilia, integerrima, fere glabra, supra scabriuscula, subtus alba. Petioli, pedunculi, rami tomento subferrugineo. Paniculae parvae terminales et axillares in apice ramorum. Flores albi, parvi, calyce tomentoso, laciniis 5 profundis. Petala 5 caduca. Stamina petalis longiora. Caps. tomentosae, stylo coronatae. *Lam.* Differt a *C. triphylla*,

quacum conjungitur a clo. *Decandolle* aliisque sub *Coss. borbonica*: foliis pinnatis: foliolis elliptico-lanceolatis, nec subcuneatis, minus nitentibus, subtus cano-nec flavo-tomentosis; floribus minoribus; omnium partium tomento minus floccoso, minusque flavo. Rami superne foliosi, subtrigoni, sulcato-angulosi, a foliorum lapsu cicatrisati, crassitie pennae anserinae, pube brevi, floccosa, sub lente stellata, superne flavâ. Folia alterna, erecto-patentia, omnia imparipinnata: paribus 2. Petioli communes cum rhachi $1\frac{1}{2}$ -2 poll., basi incrassati, dorso convexi, supra suleati, crassitie pennae corvi, pube brevi substellata flavescenti-rufâ; partiales similes, lin. tantum: terminalis $1\frac{1}{2}$ -3 lin.; e pedunculorum axillis folia minuta. Foliola elliptica, vel obovato-lanceolata vel elliptico-lanceolata, obtusa vel acutiuscula, rarius emarginata, integerrima, subcoriacea, adultiora supra glabra vix tamen nitentia, juniora supra ad nervos pilis brevissimis, appressis, stellatis, subtus omnia tomento brevissimo appresso incano, ad nervos flavescente; nervo medio subtus prominente: nervis lateralibus oblique margines versus excurrentibus, reticulatim conjunctis; $2-3\frac{1}{2}$ poll., 9-16 lin. lata. Panicula terminalis, composita, subpyramidata, erecta, 4 poll. et ultra; rami angulosi, superne compressi, sulcati, dense stellato-pubescentes, ramulosi, inferiores e foliorum summorum axillis longiores. Ad ramulorum pedicellorumque basin bractee subspathulatae, obtusae, basi angustatae, pube densâ, brevi, flavicante. Pedicelli angulosi, erecti, 1-flori, 2-3 lin.. Cal. subcampanulatus, profunde 5-fidus, tomento denso, floccoso, stellato, flavescente; lacinae inaequales, 2 majores ovatae, 3 minores oblongae, omnes obtusae, crassiusculae, concavae, ante anthesin sibi invicem incumbentes, petalis $\frac{1}{3}$ breviores. Petala 4, rotundato-ovata, ungue brevissimo, obtusa, concava, margine glanduloso-ciliata, extus dense tomentosa, intus glabriuscula et quidquam nervosa, sordide flavescenti-albida, 3 lin., lin. lata. Stam. 6, erecta, in fertilibus corollâ breviora, in sterilibus exserta; filamenta filiformia, glabra, in fertilibus vix lin., in sterilibus 4 lin., antherae dorso paulo supra basin affixae, oblongae, flavae. Germen subrotundum, tomento denso flavescente e pilis stellatis; in floribus sterilibus incompletum. Stylus in fertilibus sat longus, erectus, subulatus, serius exerescens, inferne ad $\frac{1}{3}$ pilis stellatis, ante anthesin deflexus et tortus; in sterilibus brevissimus, erectus. Stigma parvum, truncatum. Ad specimen in Herb. Sieber. *In ins. Mauritii.* b.

Obs. An huc *C. pinnata* Link Enum. p. 344., eum „foliola plura quam 5. obtusa, integerrima, nervis, praesertim primario, croceis, subtus fasciculis pilorum minutissimorum“ notet, et „an species diversa“ quaerat? Nondum floruit

1296. P E R I T O M A.

1. *P. serrulatum* Decand. Prodr. I. p. 257. CLEOME *serrulata*; glabra; floribus hexandris; foliis ternatis, foliolis lanceolatis, tenuissime serrulatis; racemo elongato; bracteis linearibus. Pursh. Fl. sept. Amer. II. p. 441. ATALANTA *serrulata* Nutt. gen. II. p. 75.

Caulis 3-4 ped., valde ramosus. Folia glabra, supra glauca, crassiuscula, subtus vix pubescentia, nullo modo viscida. Cal. parvus, membranaceus, per pedicellum descendens: dentibus 4 subulatis, cum petalis alternantibus. Cor. regularis: petala ovata,

subsessilia, splendide violaceo-purpurea, calyce triplo longiora, 2-3 lin.. Stam. capillaria, e toro quasi secundo nata ad basin stipitis. Antherae oblongae, parvae. Stipes pollicaris. Siliqua parva, stylo brevi terminata. Odor foetidus *Cl. graveolentis*. In sabulosis Americae borealis ad ripas Missouri frequentissima. ☉.

1297. G L E D I T S C H I A.

* 1. *Gl. triacanthos*; ramis spinosis: spinis crassis, tere-tiuseulis, triplicibus (simplicibusque); foliolis lineari-oblongis; leguminibus (acinaciformibus, compressis) polyspermis. *Willd. w. Baumz.* 132. ed. 2. p. 163. *Spec. IV.* p. 1097. *Linn. Spec.* 1509. *Mill. Dict.* 1. *Medic. Ök. Gesellsch. z. Lautern* 1774. p. 208. 1777. p. 39. *Wangenh. Amer.* 91. *Gl. spi-nis robustis, cruciatim ramosis; leguminibus longis, compres-sis. Lam. Enc.* II. p. 465. *Mich. Fl. Am. bor.* II. p. 257. *Pursh. Fl. Am. sept.* 1. p. 221. *Nutt. gen.* 1. p. 239. *Hay-ne dendrol. Fl.* p. 218. *Decand. Prodr.* 2. p. 479. *Mich. Arb.* 2. p. 164. t. 10. *Schkuhr Handb.* III. p. 554. t. 356. *Duham. Traité d. arbres et arb.* III. p. 100. t. 25. *Gl. spi-nosa Duham. Arb.* 1. p. 266. t. 105. *Gl. meliloba Walt. Carol.* 254. *Pluk. Mant.* 1. t. 352. f. 1. *Hort. angl.* t. 21. β . caule inermi *Lam. l. c.* *G. t. inermis Pers. Pursh. l. c.* *Decand. l. c. Leg. mem.* II. t. 22. f. 109. *G. inermis Hortul. Gl. laevis H. Paris. ACACIA laevis et inermis Hor-tul.* *Var. globosa. Link Enum.* II. p. 448.

30-40 ped., trunco recto, ligno duro, cortice griseo, comâ amplâ, ramosâ, laxâ. Folia alterna, pinnata et bipinnata, foliolis 10-15 jugis cum impari, apice subretusis, obsolete crenulatis, laete virentibus, 4-5 lin. (nervo medio subtus pube appressâ. Petio-lus communis latus, profunde sulcatus, pilis brevibus appressis). Spinae parum supra axillam foliorum lignosae, rufescentes, tri-plices, lateralibus oppositis: similes majores (2-) 4 fere polli-cum, etiam in trunco. Flores parvi, virentes, racemosi. (Ra-cemi simplices, axillares, 2-3 poll.) Legumina fere pedalia, $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, subinde torta. (Semina 10-20, formâ fabarum.) *Lam. GLEDITSCHIA inermis Linn. Spec.* 1509 (excl. huc spectante syn. Duhamel) *ACACIA Houstoni* est. *Ad littora maris Vir-giniae et Carolinae.* \dagger .

Obs. Nomen triviale decipiens, spinis non semper trifidis, sed saepius irre-gularibus, multifariam compositis, uti in *sinensi*. *Nutt. l. c.* Occurrit in hortis varietas *latisiliqua* et *flava*, leguminibus flavis. An hujus speciei va-rietates?

2. *Gl. ferox Desf.*; spinis maximis, compressis, tricus-pidatis; foliis bipinnatis pinnatisque; foliolis acutis, lanceola-tis, crenulatis. *Desfont. Hist. d'Arbr.* II. p. 247. *Dec. Prodr.* 2. p. 479. et, hoc teste: *G. orientalis Bosc ex Herb. Balb.* *Gl. macrocantha*; spinis simpliciter trifidis, clavato-incrassa-tis, compressis; leguminibus planis, subspiralibus, polysper-mis. *Willd. Arb. ed. alt.* p. 164. *Hayne dendr. Fl.* p. 218. Spinae ramulorum supraaxillares, per totam fere longitudinem

compressae, ramulis lateralibus brevibus oppositis. *Decand.* Species haec, quam per aliquod tempus pro varietate *GL. triacanthae* habui, spinis fructuque constanter differre videtur. Rami striati, ut in *ACERE pensylvanico*. Spinae praecipue in axillis, nam in trunco hucusque nullas vidi, 2-poll., pallidiores, basi quidquam angustatae, crassissimae, compressae, ramis lateralibus basi etiam incrassatis. Folia floresque ut in *GL. triacantha*. Legumen semper incurvum. *Willd.* *In Carolina.* †.

3. *GL. brachycarpa Pursh*; spinis crassis, brevibus, subternatis; foliolis oblongis, obtusis; leguminibus oblongis, brevibus. *Pursh sept. Amer. 1. p. 221.* *GL. triacanthos* β. *brachycarpus Mich. Fl. bor. Amer. II. p. 257.*

Certe distincta a *triacantha*; spinae nunc solitariae, nunc in ramis vetustis ternae. *Pursh.* *In montibus Alleghanis ad Indian river, Virginiae.* †.

4. *GL. caroliniana Lam.*; ramis subspinosis: spinis inferioribus longis, (teretibus, subtrifidis et) simplicissimis; foliolis ovato-oblongis, (acutis); leguminibus monospermis, ovalibus, mucronatis. *Lam. Enc. II. p. 465. ill. t. 857. f. 2.* *GL. monosperma Willd. Arb. 135. ed. 2. p. 165. Spec. IV. p. 1097. Walt. Carol. 254. Mich. Amer. II. p. 257. Pursh Fl. Sept. Amer. 1. p. 221. Hayne dendrol. Fl. p. 218. Decand. Prodr. II. p. 479. Mich. Arb. III. p. 169. t. 10. Duham. arb. et arbr. ed. n. IV. p. 101. GL. aquatica Marsh. Amer. 95. GL. inermis Mill. Dict. n. 2. GL. triacanthos Gaertn. fr. II. t. 146. Catesb. Carol. 1. p. 43. t. 45.*

Triacanthâ minor, licet satis in patria grandis. Spinae minores, acutissimae. Folia 4 poll., 10-12 juga; foliola minora, magis acuta, breviter petiolata, subintegerrima, $\frac{3}{4}$ poll., utrinque glabra vel subtus ad nervum medium pilosiuscula. Florum racemi axillares, simplices, 2-poll., virentes. Legumina 5-6, fasciculata, plano-compressa, coriacea, rotundato-ovalia, mucrone brevissimo, poll. et ultra. Semen compressum, ellipticum, nitidum, durum. *In sylvis ad ripas fluviorum Carolinae ad Floridam.* †.

5. *GL. sinensis Lam.*; spinis robustis, alterne ramosis, inferioribus compositis, subfasciculatis, maximis; foliolis ellipticis, (obtusis), laevibus. *Lam. Enc. II. p. 465. Desfont. Arbr. II. p. 246. Duham. Tr. arb. et arbr. IV. p. 101. Dec. Prodr. 2. p. 479. Mem. Leg. 1. t. 1. fol. var.* *GL. horrida*; truncis spinosis; spinis ramosis, validis, in trunco fasciculatis; leguminibus polyspermis, planis. *Willd. w. Baumz. ed. 2. p. 166. Spec. IV. p. 1098. Hayne Dendrol. Fl. p. 219. Link Enum. II. p. 448. GL. chinensis Auctor. — β crispifolia Zeyher H. Schwetz.*

Arbor magnitudine fere *GL. triacanthae*, trunco spinis (8-12 poll., fasciculatis) horridissimo. Folia bipinnata, plerumque 4-juga, jugo singulo foliolis 6-8, laete virentibus, quidquam nitentibus, crenulatis. Spinae ad axillas foliorum rufo-fuscae, 1-2 poll.: spinis lateralibus minoribus, semper alternis. Legumina subcy-

lindrica (plana *Hayne*), pendula, elongata. *Lam.* Foliis floribus fructuque vix a *GL. triacantha* distinguenda. *Willd.* Foliola latiora, obtusiora. Racemi breves, laterales, herbacei. Legumina intense fusca, plana, 6-8 poll. Sem. parva, ovata, quidquam compressa. *Duham.* In *China.* †.

6. *GL. macrocantha Desfont.*; spinis robustis, ramosis, plurimis; foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, rigidulis, crenulato-dentatis, (subtus reticulatis); leguminibus elongatis, pulposis, incrassatis. *Desfont. Cat. H. P. 4. p. 182. Hist. d. Arbr. II. p. 246. Poir. in Duham. ed. nov. IV. p. 102. Link Enum. II. p. 448.*

Arbor sat grandis, trunco spinoso; rami glabri, e viridi-cinerei, striati, ad axillas foliorum spinis apice ramosis; folia 6-8-12 juga, foliolis alternis, pedicellatis, lacte viridibus, utrinque glabris, obtusis, nervis simplicibus (subtus prominentibus, venis reticulatim junctis, fere 2 poll.); legumina pendula, subcylindrica. *Desfont.* In *China.* †.

7. *GL. caspia Desf.*; (spinis gracilibus, trifidis, compressis); foliis (saepius) bipinnatis; foliolis levissime crenulatis, elliptico-lanceolatis, obtusis. *Desf. Hist. d'arbr. II. p. 247. Dec. Prodr. 2. p. 479.*

Spinae ramorum supraaxillares, basi secus corticem utrinque subdecurrentes. Flores et fructus ignoti. *Decand. PROSOPIS Stephaniana Kunth s. LAGONYCHUM Stephanianum M. Bieb.*, quae clo. *Spreng. S. V. III. p. 919* huc spectare videtur, omnino diversa. *Ad mare caspium Desf.; in Lenckeran Fisch.* †.

8. *GL. indica Pers.*; spinis gracilibus, conico-subulatis, simplicibus ramosisque; foliolis elliptico-oblongis, acutiusculis. *Decand. Prodr. 2. p. 479. Pers. Syn. II. p. 623.*, cui ad *G. sinensem* spectare videtur.

Spinae axillares *Dec.*, lutescentes *Pers.* In *Bengalia.* *Olim culta in h. Paris.; sed nondum floruit.*

9. *GL. javanica Lam.*; caule inermi; foliolis numerosissimis, confertis, nitidis. *Lam. Enc. II. p. 466. Comel. Hort. 1. p. 207. t. 206. Ray. 477. n. 29. Pluk. t. 125.*

Folia bipinnata, pinnis quadrijugis, foliolis in pinna singula iterum 72-jugis. *Lam. Clo. Sprengel S. V. III. p. 919. SESBANIA cannabina Poir.* videtur; sed haec annua, cum *GL. javanica* arbor sit. Nec expunxit *Poir.* hanc speciem more solito in *Supplement.* In *Java.* †.

1298. A M U R A.

1. *A. cucullata. AMOORA cucullata;* foliis impari-pinnatis, foliolis oppositis, 2-4-jugis, obtusis; pedunculis hermaphroditis axillaribus paucifloris; masculis paniculatis. *Roxb. Coromand. t. 258.*

Arbor satis grandis, at tarde crescens; junior trunco striato, ramis paucis, cortice cinereo, laevi. Folia alterna, 6-18 poll.; foliola breviter petiolata, oblique ovato-lanceolata, obtusa, a nervo inaequaliter divisa, utrinque laevissima, firma, integerrima, 3-6

poll.; terminale saepius cucullatum. Petioli teretes laeviusculi. In ♂ paniculae axillares, solitariae, nutantes, longitudine fere foliorum, ramis numerosis, divergentibus. Flores numerosi, parvi, flavi. Squama parva, obscura, sub singulis paniculae ramificationibus; duae ad latus calycis. Cal. parvus, 3-dentatus. Petala ovata, concava, nectario adpressa turbinato, apice foramine triangulari contracto hiante. Antherae 6 intus circa nectarium sessiles, ut videtur, steriles. Germinis loco glandula clavata. In ♀ pedunculi 3-6 flori, floribus, quam in mare, majoribus. Cal. Cor. Nect. ut in ♂. Antherae semper 6. Germen triquetrum, squamis parvis minutis tectum, loculo singulo ovulis 2. Stylus o. Stigma latum, 3-lobum. Capsula subrotunda, magnitudine pomi, cortice crasso, carnosio. Semina arillo aurantiaco ad $\frac{3}{4}$ tecta, sub hoc integumento castanea. Albumen o. *Roxburgh.* In *Delta Gangis.* h.

1299. F L O S C O P A.

1. *Fl. scandens* *Lour. Cochin.* 1. p. 238. *Pers. Syn.* 1. p. 374.

Caulis fruticosus, scandens, inermis, acirrhus, longus, simplex, teres. Folia lanceolata, integerrima, vaginantia, multinervia, basi ciliata, supra scabra, subtus laevia, alterna. Flores parvi, dilute caeruleus. Spicae tenues, rigidae, fasciculatae, in formam scopae fastigiatae. Pedicelli proprii brevissimi. Cal. infundibuliformis, coloratus, persistens; laciniis ovatis, curvis, patentibus. Petala erecta, calyci aequalia. Filamenta subulata, corollae longiora. Antherae biloculares, subrotundae. Germen compresso-ovatum, bilobum, superum. Stylus subulatus, inflexus, staminibus longior. Stigma crassiusculum. Caps. subovata, 2-loba. Semina compresso-ovata, cornea, sulcis multis in orbem radiata. *Lour.* In montibus *Cochinchinae.* h.

1300. A J U V E A.

1. *A. gujanensis* *Aublet Guian.* 310. t. 120. *Laurus hexandra*; fol. lanceolatis; racemis axillaribus; floribus hexandris. *Swartz Fl. ind. occ.* 2. p. 708. *DOUGLIASSIA Schreb. gen. plant.* n. 1761. *COLOMANDRA Neck.* *EHRHARDIA Scop.*

Frutex truncus 6-poll. in diametro, 4-5 ped., apice cymâ patente; ligno albo, cortice viridi, rugoso, sulcato. Folia in apice ramorum alterna, simplicia, lanceolata, viridia, laevia, integerrima. Racemi ex apicibus ramorum paniculati, ramuli ultimi trifidi. Flores minuti. Calycis lacinae rectissimae. Petala flavescentia. Germen in fundo calycis subrotundum, stylo coronatum. Stylus longitudine staminum. Bacca nigrescens. Semen oleosum aromaticum. *Aubl.* In *Gujana.* h.

1301. T R I P H A S I A.

1. *Tr. Aurantiola* *Lour.*; foliis trifoliolatis; (floribus solitariis). *Decand. Prodr.* 1. p. 536. (sub *TRIPHASIA trifoliata*, uti *Spreng. S. V. II.* p. 133. et *Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. red. Kunth.* V. p. 205.) *Lour. Fl. Cochin.* 1. p. 189. *LIMONIA trifoliata* fol. ternatis, spinis geminis. *Linn. Mant.*

237. *Willd. Spec. II. p. 571. Jacq. Coll. III. p. 176. icon. rar. t. 465. Andr. Repos. t. 143. Burm. ind. 103. t. 35. f. 1. β. inermis, foliis sessilibus. Sonnerat it. nov. guin. p. 103. t. 63. (fid. Willd.).*

Arbor facie Citri, ramulis flexuosis. Folia alterna, petiolata, ternata, integerrima, aspersa poris, more Citri, magnitudine *Jasmini fruticosi*. Foliola lateralia sessilia: intermedium majus, emarginatum. Spinae stipulares, petiolo longiores. Bacca pedunculata, globosa, glabra, rubra, magnitudine *Vaccinii*. *Linn.* Folia breviter petiolata, apice 3-foliolata, foliolis ovatis, terminali saepius emarginato. Spinae rectae, parvae. *Dec.* Arbor tota glabra, cortice fusco-cinerascente, ramosissima, ramulis alternis patulis. Spinae subulatae, pungentes, patentis, laterales utrinque ad folia et ramulos, seniores fere $\frac{1}{2}$ unc. Folia subbifaria, nitida; foliolis obtusis, retusis, obsolete crenatis, utrinque pellucide punctatis; lateralibus $\frac{1}{2}$ unc., ovatis, intermedio lanceolato, unc. et ultra. Flores suaveolentes, brevissime pedunculati, axillares, gemini vel terni. Calyx parvus, campanulatus, obtusus, villosulus, viridis, ore trifido. Petala lanceolato-oblonga, obtusa, plana, inferne erecta, superne patentissima, alba. Filamenta subulata, erecta, aequalia, petalis paulo breviora, receptaculo inserta, alba. Antherae oblongae, incumbentes, ochroleucæ. Germen superum, ovale, obsolete trigonum. Stylus filiformis, erectus, staminibus longior. Stigma trilobo-capitatum, flavum. Bacca subrotunda, rubro-badia, mollis, magnitudine *Avellanae*, 5-locularis. Pulpa excolor, dulcissima cum levi terebinthinae sapore, immatura glutinosa, mere terebinthinacea. Semen plerumque 1, reliqua abortientia, pallidum, magnum, glabrum; nucleo viridi, bilobo, saporis ingrattissimi et acris. *Jacq.* In India, Cochinchina, China; in cultis ad ripam *Orinoci*. *h.*

Obs. An huc *Tr. trifoliata Blume*; foliis trifoliatis; foliolis ovatis, retusis, superne repando-crenulatis; lateralibus minoribus. *Blume Kruidk. Waarnem. III. p. 132?* — *Loureiro* plantam suam cum *Citro trifoliata Linn.* commutavit.

2. *Tr. sarmentosa Blume*; arborea; caule aculeato, ramulis sarmentosis, hamatis; foliis ternatis simplicibusque; foliolis oblongis, acuminatis, integerrimis, petiolatis; corymbis axillaribus. *Blume Kruidk. Waarnem. III. p. 132.*

Cal. 3-, rarius 4-dentatus. Stam. 8. Germen 2-loculare. Stigma obtusum, sessile. Bacca ovoidea, rugosa, 2-5 locularis, loculis 1-spermis, mucilage transparente repletis. *Blume.* In montosis *Salak et Yede Provinc. Buitenzorg*, ad montem *Tjirimai Prov. Cheribon*. *h.*

3. *Tr. monophylla Dec.*; foliis simplicibus, oblongis, (floribus racemosis). *Decand. Prodr. I. p. 536.*

Folia subsessilia, obtusa. Racemi parvi ad axillas spinarum, folio breviores. Flores minimi. Fructus? Habitus *ATALANTIAE*; flos *TRIPHASIAE*. *Dec. l. c.* In *Insula Timor*. *h.*

1302. COLOPHONIA.

1. *C. mauritiana Decand. Prodr. 2. p. 79. BURSERA paniculata Lam. Enc. meth. 2. p. 768. Willd. Sp. Pl. 4. p.*

1120. *COLOPHONIA* flor. racemosis, tripetalis; fol. pinnatis; cortice maxime resinoso. *Commers. Herb. Ic. et Mss.*

Arbor excelsa, trunco saepius 3-4 org. in circumferentia; e corticis rimis resina copiosa albida stillat. Rami tuberculosi, cicatrisati, saepius nigricantes. Folia alterna, magna, impari-pinnata; foliola 5-7, ovalia, acuta, integra, glabra, petiolata, nervis subtus quidquam prominentibus. Flores parvi, numerosi, purpurei, in racemis paniculatis terminalibus, 6 poll. longis. Cal. parvus, 1-phyllus, trifidus. Petala calyce longiora, basi dilatata, apice obtusa, mucronulo vix conspicuo. Filamenta 6, fere conniventia. Antherae fuscac, oblongae, sulcis 3. Pistillum nunc nullum, nunc stigma obtusissimum in centro receptaculi superne plani, pentagoni. (Flores ergo polygami, nec dielini ut in *Decand.*) *Lam. In insula Mauriti.* h.

1303. C A N A R I U M.

1. **C. commune*; foliis pinnatis; foliolis (7-11) ovato-oblongis, obtuse acuminatis, integerrimis, glabris; stipulis dentatis aut indivisis; panicula terminali, divaricata; floribus glomerulatis, subsessilibus, bibracteatis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 1161. Linn. Mant. 127. Willd. Spec. 4. p. 759. Lam. Enc. meth. t. 1. p. 598. C. foliolis 7-9 longe petiolatis, oblongis, acutis, integerrimis; panic. terminali. Decand. Prodr. 2. p. 79. C. Mehenbethene Gaertn. fruct. 2. p. 98. t. 102. Kön. Ann. bot. 1. p. 260. t. 7. f. 2. C. vulgare Rumph Amb. 2. p. 145. t. 47. Besl. Mus. t. 22. f. 5. — β zephyrinum, foliolis 13. Rumph Amb. 2. p. 151. t. 48. Willd. l. c. Dec. l. c. (quae nobis potius species videtur).*

Arbor excelsa, resinifera, cortice albido, cyma effusa, foliosa, ligno albido, sat duro. Folia alterna, impari-pinnata; foliola 9, magna, petiolis propriis brevibus (longis *Dec.*). Paniculae rami rigidi, divaricati. Flores sessiles albidi, dioici. ♂. Cal. foliolis 2 (5 *Rich.*) ovatis, concavis, persistentibus; cor. petalis 3, oblongis, patentibus; stamina 5, filamentis brevibus, antheris longitudine petalorum. ♀ cal. foliolis 2 patentibus; cor. petalis 5, germine supero, ovali; stylus nullus; stigma sessile, capitatum, trigonum. Nux ovalis acuminata, basi membrana crenulata cineta, nucleo ovali, trigono, acuto. *Lam.* Ramuli incurvi, nodosi. Petioli basi geniculati, rhachisque ipsa geniculis 1-2. Stipulae binae, subtriangulares, profunde serratae, rugosae, pallide virides, deciduae. Folia 5-5-juga; foliola 8-10 poll., ultra palmam lata, in arboribus adultioribus minora, integra, nervo medio venisque parallelis flavescens, glabra, firma, nigricantia, trita resinose odora. Panicula ramis paucis. Flores breviter pedicellati. Petala crassa, angusta, acuta. Stigma viride. In maribus racemi majores, magis extensi, calyx amplior; petala crassa, pingua, squalide albicantia; stamina 5, antherae fuscac, pistillum incompletum; flores odori. Fructus penduli, Juglande minores, glauci, glabri, laeves, caeruleo-nigricantes, oblongo-rotundi, subtrigoni, superne compressi, apice brevi; nux dura, ossea, angulis 5 rotundatis. *Rumph*, qui varietates 4 distinguit: 1. fructu majori, oblongo, 3 digitos longo, poll. crasso; glumae substantiam vix cultrum crassa; nuce lateri-

bus 3 poll. latis; putamine crassitie pennae; nucleo oblongo, compresso-triangulari, basi rotundato, apice acuto, pelliculâ rubente, intus albo. Amygdalis simillimo, sed duplo majori; sapore dulci. 2. fructu magno, rotundo, crassiore, digito transverso brevior: nucis angulis rotundatis; nucleo breviori, crassiori, duriori, meliori. 3. fructu parvo, oblongo, nuce 2 digit. transversos longâ: nucleo ut in 1. sed tenuiori, sapidiori; foliis minoribus; truncato altiori. 4. fructu parvo, subrotundo, cacterum ut in 2. Fructus omnium varietatum 1-rarissime 2-3-loculares. — In β *zephyrino* truncus altior, cortice albido vel cinereo, comâ minus eleganter disposita, ramis magis incurvis; foliola multo minora: inferiora 5-6, superiora 6-8 poll., $2\frac{1}{2}$ -3 poll. lata, longe acuminata, crassa, obscure virentia nervis flavescens, scabra, basi tuberculo, 5-6 jûga: rhaches geniculatae, teretes, striatae; stipulae triangulares, majores, copiosiores; flores minores, 2-5 ni; calycis foliola 2 post anthesin reflexa; petala alba, sericea, splendentia, campanulata; antherae croceae; pistillum viride: fructus var. 2. et 4. *C. communi* similes, rotundato-triangulares, fuscâ, rariores (6-8), penduli; nux simillima var. 2., sed paulo minor, trigona, putamine crasso, durissimo, semper 3-locularis: nuclei minores, sed ejusdem saporis: plerumque 2 tantum. Hujus varietas reperitur multo minor, nuce vix digit. longâ, vere triangulari, angulis acutis, triloculari, nucleis parvis, dulcioribus, sed siccioribus. Resina alba copiosior quam in *C. communi*. *Rumph.* In *Moluccis et in nova Guinea.* β .

2. *C. sylvestre Willd.*; foliolis ternatis pinnatisque (3-5), oblongis, utrinque attenuatis, integerrimis; floribus racemosis, terminalibus (?). *Willd. Sp. Pl.* 4. p. 760. *Dec. Prodr.* 2. p. 79. *Gaertn. fruct.* 2. p. 99. t. 102. *Rumph. Amb.* 2. p. 155. t. 49.

Arbor *C. communi* minor resinifera; cortice obscuro vel nigricante; comâ angustiore; ramis rarioribus; ramulis plurimis fragilibus nodosis. Foliolorum rhaches breviores; foliola minora, 4-7 poll., $2-2\frac{1}{2}$ poll. lata, longe acuminata, scabra, obscure viridia, nervo medio flavescente, costis lateralibus parallelis. Stipulae 2, squamosae, auriculatae. Racemi terminales lateralesque. Flores minores minusque splendentes, quam in *C. communi*. Fructus rari, solitarii, in pedunculis longis lignosis dependentes, oblongo-rotundi, basi angustati, primo virides, dein lividi, demum nigri, cinereo-maculati, quidquam rugosi. Nux oblonga, 2 digit. transversos longa, digit. lata, utrinque acuminata, subtrigona, fusca, plerumque 3, raro 4-locularis. Nuclei angusti, oblongi, pelliculâ fuscâ, intus albâ, dulces, edules. *Rumph.* Confer *C. Pimela.* In *Amboinae montibus.* β .

5. *C. microcarpum Willd.*; foliis pinnatis, exstipulatis; foliolis (5-9) ovato-lanceolatis, acuminatis, glabris, integerrimis; racemis axillaribus, elongatis, multifloris: fructiferis cernuis. *Willd. Sp. Pl.* 4. p. 760. *Dec. Prodr.* 2. p. 79. *Poir. Enc. meth. Suppl.* II. p. 72. et hoc teste: *AMYRIS oleosa*; fol. pinn., subtrijugis; floribus racemosis; baccis obovatis, ex caeruleo nigris. *Lam. Enc. meth.* 1. p. 562. *PINELA oleosa*

Lour. Fl. cochin. ed. Willd. 2. p. 496. Canarium minimum
Rumph. Amb. 2. p. 162. t. 54.

Arbor trunco erecto; comâ densâ; cortice laevi, cinereo, punctis obscure flavis. Foliola lanceolata, foliolo terminali saepius nullo. Ramuli fragiles. Baccae parvae, monospermae. *Lam.* Cortex fragilis, vix digitum crassus, ad radicem nodosus, nec alatus. Folia fructusque omnium minima; foliola 9-11, impari saepius etiam nullo, 5-7 poll., 2 poll. lata, fere rhomboidea, basi paulo latiora, scabra, nigro-viridia, quidquam complicata et sinuosa; nervo medio albicante, utrinque prominente; costis transversalibus subtus purpurascens; foliola speciminum in Manipa et Bonca 4-6 poll., 2 poll. lata, glabra, intense viridia, costis fusco-flavescentibus. Fructus oblongo-rotundati, longitudine unguis, penduli, primum virides, dein ex caeruleo-nigri, putamine tenui. Nux ejusdem fere magnitudinis, utrinque acuminata, trigona, oris aequalibus, cinerea. Nucleus parvus, mollis, albicans, sebaceus, non edulis. Ex cortice vulnerato oleum flavescentis odorum, cum mucositate nigrescente exsudat. *Rumph.* Arbor maxima, trunco altissimo, ramis adscendentibus. Folia petiolis glabris, teretibus nec tumescentibus, foliolis oblongis, repandis, glabris, subsessilibus. Flos albus. Drupa nuce 1-loculari, nucleo solitario. *Lour. In Moluccis et in Cochinchina. h.*

4. *C. Pimela* *Kön.*; foliis pinnatis; foliolis oblongis, acuminatis, integerrimis, glabris; stipulis nullis; racemis subterminalibus (casu foliorum), aggregatis; floribus fasciculatis, nudis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 1162.* *C.* foliol. 9-11, ovatis, acutis, integerrimis, subinaequalibus; racemis lateralibus, aggregatis; drupae putamine subtriloculari. *Dec. Prodr. 2. p. 80. Kön. Ann. bot. 1. p. 361. t. 7. f. 1. (Dec., f. 2. Pers.). PIMELA nigra Lour. Fl. cochin. 2. p. 495. (excl. syn. Rumph).*

Arbor magna, ramis subpatentibus. Folia sub 5-juga, laevia; petiolis glabris, basi tumidis; foliolis acutis, integerrimis, nitidis, nigrescentibus. Racemi simplices laterales; floribus albis. Drupa carnosâ, oleosa, extus glabra, atro-caerulea, intus rubescens, nuce durissimâ, plerumque biloculari; nucleo longiusculo, tereti. *Lour. In sylvis Chinae, Cochinchinae et Javae occidentalis.*

Obs. Hue clia *Poir. Enc. meth. Suppl. 2. p. 72. et Spreng. S. F. 2. p. 115. spectare videtur C. sylvestre Willd.*

5. *C. denticulatum* *Blume*; foliis pinnatis; foliolis elliptico-oblongis, acuminatis, superne obsolete denticulatis, glabriusculis; stipulis amplexicaulibus, laciniatis; paniculis subterminalibus (casu foliorum); floribus glomerulatis, subsessilibus, bibracteolatis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 1162.*

In sylvis montium Salak, Parang etc. Javae. Blume. h.

6. *C. decumanum* *Willd.*; foliis pinnatis; foliolis (9-11) ellipticis, integerrimis, acutis; racemis paucifloris, axillaribus; (drupae putamine 3-loculari). *Willd. Sp. Pl. 4. p. 760. Dec. Prodr.*

Prodr. 2. p. 80. *Gaertn. Fruct.* 2. p. 99. t. 102. *Rumph Amb.* 2. p. 166. t. 55.

Arbor maxima, vastissima, resinifera, trunco crassissimo; ligno albo, molli, laevi, spongioso, fragili; rami apice comam latissimam sistentes, cortice glabro, albide-cinereo, fragiles, apice rufo-lanuginosi. Folia magna, firma, rhachi rufo-lanuginosâ; foliola subsessilia, majora, sed haud ita scabra ut in *C. communi*, subtus lanuginosa, 9-10 poll., 4-4½ poll. lata, acumine brevi, subtus venis parallelis rufo-pilosis, lacte viridia, infima semper minora; juniora tota lanuginosa. Fructus magnitudine formâque ovi anserini, extus parum rugosi, punctis rufis. Putamen crassum, viscosum. Nux 3 poll., 2 poll. crassa, plerumque triangularis, angulis quasi fimbriatis, inter angulos rugosa striataque, utrinque acuminata, rarius subquadrata vel subrotunda, quae forte propria species; nam etiam folia in his rotundiora brevioraque; putamine facile cultro frangibili; nuces trigonae et rotundae, 3-loculares; quadratae, 4-loculares, loculo 1 tantum fructifero, reliquis abortientibus. Nucleus magnus, pelliculâ crassâ, verrucâ putamini adhaerente, rufâ, vix discernendâ; sapore oleoso. *Rumph.* In insulis *Xulassensibus* et *Moluccis*. h.

7. *C. album* *Raensch.*; foliis pinnatis; foliolis 11-13, scabris, ovato-lanceolatis; racemis confertis, subterminalibus; drupae putamine triloculari. *Decand. Prodr.* 2. p. 80. *PIMELA alba* *Lour. Fl. cochin.* 2. p. 495. *Poir. Enc. meth. suppl.* 2. p. 72. *C. sinense* *Rumph Amb.* 2. p. 154.

Arbor magna, ramis adscendentibus. Folia inferiora minora; petiolis teretibus; foliolis ½ ped., integerrimis, glabris, scabris, pallidis, petiolatis. Flores pallidi. Cal. tubulosus trifidus. Petala 3, erecta, crassa. Stamina 6 connata. Stylus filiformis, brevis; stigmatibus rotundo integro. Drupa trigono-ovata, glabra, rugosa, viridi-lutea, austero-acida; nuce subhexagonâ, utrinque acuminatâ; putamine crasso, durissimo. *Lour.* Truncus superne lanuginosus, uti etiam rami laterales. Folia 3-4-juga; foliola supera 6-7 poll., inferiora 4 poll., 2 poll. lata, in arboribus vetustis minora et integra, in junioribus minutissime dentata, basi latissima, acuta, breviter petiolata; nervo medio utrinque prominente, costis 7-8 sinuosis; trita odorem resinorum spirantia. Fructus oblongi, utrinque acuminati; nux trigona, utrinque acuminata, trilocularis; nucleis 3 angustis. Hujus 3 enumerantur varietates: 1 *Tsjacana*; fructu lignoso, maximo, ossiculis maximis, *C. communi* similibus. 2 *Cana*; fructu utrinque acuminato, *Canarium* trigonum odoratum „(?)“ referente. 3 *Tengio-Cana* v. *Cana caryophyllacea*, ossiculis *Caryophyllorum* formâ, saporis optimi. Omnes 3 exsulant gummi nigrum. *Rumph.* In sylvis *Chinae* et *Cochinchinae*. h.

8. *C. hispidum* *Blume*; foliis pinnatis; foliolis oblongis, acuminatis, basi passim subcordatis, inaequalateralibus, integerrimis, infra fructibusque hispidulis; stipulis petiolaribus, exiguis; racemis subterminalibus (casu foliorum), aggregatis; floribus subfasciculatis, nudis. *Blume Byd. Fl. Nederl. Ind.* p. 1163. β *scabrum*; fol. majoribus, infra scabris; racemis compositis. *Blume l. c.*

In montosis Provinciarum Buiténzorg et Bentam, β ad montem Salak in Java. h .

9. *C. altissimum* Blume; foliis pinnatis; foliolis (majusculis) oblongis, cuspidatis, basi subcordatis, integerrimis, utrinque pilosiusculis, barbato-ciliatis; stipulis petiolaribus, exiguis, subulatis; racemis axillaribus, simplicibus; fructibus hispidis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 1163.*

In montosis Parang Javae. *Blume. h.*

10. *C. littorale* Blume; foliis pinnatis; foliolis elliptico-oblongis, acuminatis, denticulatis, in venis infra tomentosis; stipulis nullis; paniculâ terminali effusâ; floribus dense glomeratis bracteatis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 1164.*

In sylvis littoralibus insulae Nusae Kambangae prope Javam. *Blume. h.*

Obs. Schema specierum sec. Blume: 1. Stam. basi in tubum membr. conata: C. commune, Pimela, denticulatum. 2. Stam. disco villosa ad marginem imposita: C. hispidum, altissimum, littorale. Sec. Decand. 1. Drupae putamine maturo 1-loculari: CANARIA: C. commune, sylvestre, microcarpum. 2. Drupae put. maturo 3-loculari: PIMELAE: C. decumanum, Pimela, album. C. balsamiferum et hirsutum sunt Roswelliae.

1504. S T E R I P H O M A.

1. *St. cleomoides* Spreng.; foliis oblongo-lanceolatis, valde acuminatis, vix petiolo longioribus. *Spreng. Cur. post. p. 159. STEPHANIA cleomoides Willd. Spec. II. p. 259. Decand. Prodr. p. 253. Kern. h. semperv. t. 186. CAPPARIS paradoxa; fol. lanceolatis, acuminatis, perennantibus; calycibus bipartitis. Jacq. Hort. Schönbr. 1. p. 58. t. 111.*

Frutex 6-ped., trunco erecto, fusco, poll. crasso; ramis junioribus cicatricibus protuberantibus; ramulis pilis stellato-fasciculatis. Folia sparsa approximata, petiolata, elongate lanceolata, integerrima, undulata, venosa, supra nitida, juniora utrinque et ad oras pilis stellato-fasciculatis; 4-6 poll. cum petiolo haud multo breviori, aspero, basi apiceque incrassato. Pedunculi uniflori axillares, solitarii, teretes, crassuli, villosuli, patuli. Calyci concolores, $\frac{1}{3}$ unc. Flores inodori parumper cernui. Calyx villosus, ex flavo pallens, basi leviter aurantiacus, subcoriaceus, tubulosus (campanulatus, ventricosus *Willd.*); laciniis semiovatis, concavis, erectis: superiore obtusâ, inferiore acuta et brevior. Petala 4, oblonga, caduta, erecta, calyce paulo longiora, pallide sordideque flavescentia. Filamenta ad basin usque libera, subulata, declinata, calyce triplo longiora, 2 inferiora paulo longiora, corollae concoloria. Antherae incumbentes, oblongae. Germen teres, pedicello crasso; stamina longitudine fere aquante. Stylus 0. Stigma simplex, obtusum, corollae concolor. *Jacq. In Caraccas. h.*

2. *St. ellipticum* Spreng.; foliis ellipticis, vix acuminatis, petiolo duplo longioribus. *Spreng. Cur. post. p. 159. STEPHANIA elliptica. Decand. Prodr. p. 253. In insula Trinitatis. Herb. Banks. h.*

1505. P S E U D A L E I A.

1. *Ps. madagascariensis* Decand. Prodr. 1. p. 553.

Ann. d. Bot. Thourars gen. mad. n. 51. OLAX Pseudaleia
Willd. Herb. in Link Jahrb. 3. p. 69. S. V. ed. n. Mant. I.
 p. 349.

Arbuscula ramosa. Folia alterna, laevia. Flores axillares; pedun-
 culi pauciflori. *Pet. Th. In Madagascar. h.*

1506. PSEUDALEIODES.

1. *Ps. Thouarsii Decand. Prodr. I. p. 555. Ann. d.*
Pet. Thourars gen. mad. n. 52. OLAX Pseudaleioides Herb.
Willd. sec. Link Jahrb. 3. p. 69. S. V. ed. n. Mant. I.
 p. 349.

Frutex debilis. Folia alterna. Racemi unilaterales, pauciflori.
Pet. Th. In Madagascar. h.

1307. CHISOCHETON*.)

1. *Ch. patens Blume; foliis 5-10-jugis; foliolis subop-*
positis, oblongis; paniculis supraaxillaribus, patentibus, fasti-
giato-ramosissimis. Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 169.

SCHIZOCHITON patens Spreng. Cur. post. p. 251.
 Arbor 50-ped. Flores minuti, hexandri. *In sylvis ad montem*
Salak Javae. Blume. h.

2. *Ch. divergens Blume; foliis 5-15-jugis; foliolis sub-*
oppositis, oblongis; paniculis supraaxillaribus, divergentibus,
virgatis. Blume l. c. SCHIZOCHITON divergens Spreng. l. c.

Arbor 60-80 ped. Flores majores, quam in praecedente, saepe
 7-andri. *Blume. Hab. cum praecedente.*

1308. FERREIRA.

1. *F. Vellozoana. FERREIRA Vandelli lusitan. et brasil.*
Spec. apud Römer script. hisp. p. 98. t. 6. f. 8.
In Brasilia. 4.

1309. HILLIA.

1. *H. longiflora Sw.; corollis 6-fidis: laciniis lanceola-*
tis, revolutis; foliis ovatis, acutis. Swartz Prodr. p. 58. Obs.
p. 135. t. 5. f. 1. Willd. Spec. II. p. 239. (excl. syn. FERREI-

RIAE). Bot. Repos. 145. Bot. Mag. 721. H. parasitica
Linn. Spec. 1662. Lam. Enc. III. p. 129. Jacq. Amer. 96.
t. 66. ic. pict. t. 97. (mala Swartz).

Non est parasitica, licet radicibus inter ligna muscosa et vetusta
 repat. Frutex caule orgyali, adscendens, ramosus, laxis, glaber,
 fragilis; cortice cinereo nitente; rami simplices, foliosi, teretes,
 glabri, fragiles. Folia petiolata, opposita, decussata, patentia,
 ovata, cum acumine brevi, integra, vix nervosa, avenia, gla-
 berrima, rigidiuscula. Petioli teretes, glabri. Flores termina-

*.) CHISOCHETONES: Arbores foliis abrupte pinnatis, foliolis inaequalibus; floribus
 laxè paniculatis axillaribus.

les, sessiles, solitarii, longissimi, albi, odoratissimi. Cal. superus 2-rarius 4-phyllus; foliola persistentia; inferus 4-6-phyllus: foliolis inaequalibus, coloratis, deciduis. Cor. tubus 3-4 poll.; limbus contortus; laciniis unc., reflexis. Filamenta 6 sub limbo brevissima. Antherae oblongae albidae. Germen oblongum. Stigma incrassatum, bifidum, glutinosum, saturate viride. Caps. 1-2 poll., leviter hexagona, sulcata, 2-locularis, 2-valvis. Sem. numerosa, parva, oblonga, acuminata, papposa, receptaculo lineari affixa. Pappus pilosus. *Swartz. Jacquin*, cujus iconem malam dixit *Swartz*, describit: caules teretes, basi procumbentes, ad genicula radicales; folia utrinque acuminata, 5 poll., flores $\frac{1}{2}$ ped., albido-flavescentes; calycem intra foliola floralia absconditum: foliolis oblongis, acutis, planis, erectis, longitudine fere germinis; cor. tubum 6-sulcatum, incurvum; limbi lacinias lanceolato-oblongas, obtusas, planas, patentissimas, tubo triplo breviores; filamenta vix ulla; antheras erectas; stigma capitatum, obtusum. Reliqua conveniunt. *In fruticetis humidis montium Jamaicae, Martinicae et Brasiliae.* h.

2. *H. tetrandra Sw.*; corollis quadrifidis, laciniis ovatis; foliis obovatis. *Swartz Fl. ind. occid.* 1. p. 630. icon. t. 11. *Willd. Sp.* II. p. 240.

Frutex 3-4 ped.. Radices repentes, filamentis longis; tubera aliquot parva, subrotunda, carnosae, succulenta, ferrugineo-hirsuta, fibrillis adhaerentia. Caulis laxus, teres, glaber, fragilis, cortice albide-cinereo; rami glabri, ex foliis deciduis quasi articulati, succulenti, fragiles, pallide virides. Folia opposita, basi cuneata, ovato-rotundata, integra, vix nervosa, crassiuscula, glaberrima, laete virentia. Petioli breves, teretes, glabri. Flores terminales et axillares, sessiles, solitarii, oppositi, erecti, flavo-albescentes. Cal. superus supra germen ad basin tubi; foliolis 4 cuneato-oblongis, 2 persistentibus; inferus sub germine, 4-phyllus, deciduus: foliolis 2 cuneato-oblongis, majoribus, albidis; 2 minoribus ovatis. Cor. tubus uncialis, aequalis, sub 4-gonus, limbum versus paulum ventricosus: fauce contracta; limbus patens: laciniis integris, ovatis, convexis. Filamenta 4 infra faucem inserta tubo brevissimo. Antherae oblongae in fauce. Stylus longitudine dimidia tubi, contortus. Stigmata 2, crassa, virentia. Germen inferum, oblongum, 4-gonum, glabrum. Caps. elongata, 4-gona, 8-sulcata, calycis foliolis coronata, 2-locularis, 2-valvis. Semina numerosissima, basi acuminata, apice pappo capillari, receptaculo lineari longitudinaliter affixa. Flores Jasminum spirant. *Swartz. In montibus altis Jamaicae radices inter fruticum.* h.

1310. C A N A R I N A.

1. *C. Campanula*; caule erecto; foliis (petiolatis) hastatis, oppositis ternisve. *Linn. Mant.* 225. *S. Veg. ed. Murr.* p. 344. *Willd. Sp. Pl.* II. p. 241. *Lam. Enc.* I. p. 598. *Ait. hort. Kew.* II. p. 315. *Bot. Mag.* 444. *Loddig Bot. Cab.* 376. *CAMPANULA canariensis*; capsul. 5-locularibus; fol. hastatis; dentatis, oppositis, petiolatis. *Linn. Sp. Pl. ed. 5. p.*

238. *Hort. Cliff.* 65. t. 8. *Mill. Dict.* n. 14. *Pluk. Alm.* 76. t. 276. f. 1.

Radix tuberoso-fusifformis (brachialis, ramosa, lactescens). Caulis 3-(6) ped., solitarius (vel plures), teres, laevis, articulatus; ramis ternis e singulis caulis geniculis, superioribus longioribus, apice dichotomis; ramulis (sub) alternis. Fol. caulina terna, ramea opposita, dentata vel denticulata, laevia, venosa (subtus glauca). Flores e dichotomia, pedunculati, cernui, solitarii (magni). Cor. (viridi-rubra, flammea vel) rufa, intus laetior, fundo flavescente; laciniis nervis 3 purpureis. (Stamina longitudine corollae.) Antherae flavae. (Stylus stamina superans, stigmate trifido, recurvo.) *Willd.* In insulis Canariis. 4.

2. *C. Zanguebar Lour*; scandens; foliis cordato-hastatis, alternis; capsulis 6-ocularibus. *Lour. Fl. Coch.* p. 240.

Caulis fruticosus, scandens, teres, laevis, ramosus. Folia integerrima, glabra, venosa, petiolata. Flos solitarius, lateralis, pallidus, generis. Caps. subovata, basi acuta, 6-nervis; basi dehiscens. Semina cordata, compressa, alâ turbinatâ cincta, odora. *Lour. Sprengel S. V.* II. p. 135., cum? licet, jungit cum praecedente. *Willdenow* vero l. c. de genere dubitat. In ora Africae *Zanguebar.* 4.

1311. RICHARDIA

1. **R. scabra*; caule alto, brachiato, subarticulato, obsolete tetragono, pilis reflexis rigidiusculis hispido; foliis lanceolato-ovatis; capitulis terminalibus verticillisque; involucri e foliis quatuor vel pluribus. *Linn. Spec.* 470. *Willd. Spec.* II, p. 222. *Houtt. Linn. Pflanz.* S. VI. p. 358.

Diagnosis petita e sequente adumbratione a *Linnaeo l. c.* data: „Caulis altus, brachiatus, subarticulatus, obsolete tetragonus, hispidus: pilis rigidiusculis, sparsis, reflexis. Folia lanceolato-ovata, alternatim nervosa, integerrima, subpetiolata, scabra. Flores in capitula terminalia, passim etiam in verticillos congesti; capitula terminalia, radiata foliis 4 vel pluribus, alternis scilicet minoribus. Corollulae ut in *Asperulis*, tenues, longae, sed sex-fidae, et fructus e seminibus 3.“ In *Vera Cruce.* 4.

2. *R. pilosa Ruiz et Pav.*; foliis oblongo-lanceolatis: floralibus geminis quaternisque; floribus capitulato-umbellatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv.* III. p. 50. t. 279. f. b. **RICHARDSONIA pilosa Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth** III. p. 350. t. 35. (?) **SPERMACOCE hirsuta Herb. Willd.** (*Syst. Veg. ed. nostr.* III. p. 531. (fid. Kunth).

Pedalis dense pilosa, herbacea, annua. Rad. longa, simplex, tenuis, flexuosa, fusca. Caulis procumbens, obtuse tetragonus, 4-sulcus, ramosus; rami inferiores brachiati, superiores subdichotomi, inaequales. Folia petiolata, oblongo-lanceolata, nonnulla ovato-lanceolata, integerrima, ovata, utrinque asperiuscula, margine scabra; floralia sessilia gemina, saepe 4, quorum exteriora 2 majora subdeltoidea. Petioli connato-vaginant, 3-4 lin.. Vaginae ciliis setaceis coronatae. Pedunculi axillares et ex dichotomiis, tetragoni, foliorum longitudine. Flores terminales, sessiles, plures, capitato-umbellati; capitula foliis flora-

libus involucrata. Cal. profunde 6-fidus; laciniis acutis, patulis, in fructu patentissimis. Cor. alba; limbus 6-fidus, aliquando 5-fidus. Semina hispidula, extus fusca, intus cinerea. *Ruiz et Pav.* In ruderatis et segetibus *Cercado et Limae R. et Pav.* ☉. In siccis prope *Ibague, Humb. et Bonpl.* 4.

Obs. Dubitat *cls. Martius* an a *scabra* diversa; omnino distincta videtur *clo Hayne*. Discrepat quoque planta *Hunthii* ab illa *Ruiz et Pav.* „Rad. subperpendicularis. Caules plures procumbentes et erecti, 5-6 poll., teretes, laeves, hirsuti. Folia petiolata, acuta, basi valde angustata, integerrima, membranacea, utrinque, praesertim margine, pilosa, canescenti-viridia, subpollicaria, 3-4 lin. lata. Petioli 2-3 lin. hirsuto-pilosi. Stipulae interpetiolares ciliato-setosae. Internodia 1-2 poll. Flores capitato-congesti, sessiles, foliis vix 4 lin. longis. Cal. 6-partitus, laciniis oblongo-lanceolatis, acuminatis, hispidis, aequalibus, tubo corollae dimidio brevioribus. Cor. alba, glabra, limbo 6-fido patente, laciniis ovato-oblongis, acutis, apice hispidis, aequalibus, tubo dimidio brevioribus, fauce glabriusculâ. Stam. 6 fauci inserta, cum laciniis alternantia, exserta. Stigmata glanduloso-pubescentia. Caps. turbinato-subglohosa, pilis papillosis densissime obsita, magnitudinis cannabis. *Hunth l. c.*

3. *R. brasiliensis Gomez*; caule procumbente; floribus omnibus capitatis, involucri tetraphyllis. *Gomez Mem. sobre a Ipecacuanha.* Lisboa. 1801. c. icone. *Virey Journ. compl. d. Dict. d. Scienc. med.* 1820. VI. p. 545. c. ic. *Journ. d. Pharm.* 1820. Jun. p. 279. c. ic. *Klingemann de Emetico. Diss.* 1825. p. 47.

RICHARDSONIA brasiliensis; caule decumbente, quadrangulari, piloso; foliis oblongo-ovalibus obovatisque, supra subglabris, subtus albido-villosis; capitulis axillaribus involucriatis; involucrio tetraphyllo inaequali. *Hayne off. Gew.* VIII. p. 21. t. 21. *RICHARDSONIA scabra*; caule prostrato vel adscendente, brachiato, piloso-hirto; foliis ovatis oblongo-ovalibusve, obtusiusculis, basi attenuatis, pubescenti-hirtulis; capitulis multifloris; foliis floralibus subquaternis capitulo 3-4-plo longioribus; laciniis calycinis triangularibus ciliatis; corollis calyces duplo superantibus, albis. *Martius Specim. Mat. med. brasil. p. 10. t. 9. f. 13. 14.* (excl. syn. *Linnaei*). *Ipec. blanca. Pisô med. brasil. L. IV. c. 53. p. 231.* (fide *Hayne*).

Rad. 4-8 poll., simplex, raro ramosa, subperpendicularis, apicem versus attenuata „(flexuosa *Hayne*)“, superne 2-3 lin. crassa, sulcis transversis annulata, interstitiis modo nonnullarum linearum, modo vix sulcis latioribus, passim striis parum conspicuis, longitudinalibus, fibrillis tenuibus, patentibus. Epidermis in planta recenti „(sordide *H.*)“ albida, in sicca albo-cinerascens, vel pallide fusca, laevigata; cortex albus, mollis, farinosus, friabilis, odore et sapore acriusculo, subnaucoso. Filum centrale fibrosum, tenax, pallide flavescens, cortice tenuius, inodorum, insipidum. Caules pedales et ultra „(herbacei, cavi *H.*)“, juxta radicem plerumque tenuiores, crassitie pennae columbinae, sursum crassiores, basi fusciscentes, ubique pilis albis lineam longis, recte patentibus, basi crassioribus, jam prope basin brachiato-ramosi „(ramis erectis *H.*)“, passim e nodis internodiisque 1-2 pollicaribus fibrillas tenues emittentes. Folia opposita, pollicaria circiter, obtusiuscula vel apice brevi obtusiusculo, in petiolum 1-2 lin. attenuata, utraque paginâ, subtus praecipue ad nervos, pilis adpressis albis vel subflavescenti-viridibus „(ciliata, 7 nervia; inferiora obovata, rotundata, obtusa *H.*)“. Vaginae

interpetiolares membranaceae, pilis longis, albis, margine setis 3-4. „(Petiolus stipulaceus, pilosus: stipulae petiolis oppositae, iisdem breviores et connatae, 3-5-fidae, laciniis longis, subulatis *H.*)“ Flores 20 et ultra in capitulo hemisphaerico „(pedunculato-sessiles *H.*)“; foliis 3-4, reliquis similibus, sed brevius petiolatis, latioribus „(patentibus, capitulo multo longioribus. pedunculo brevioribus, 2 oppositis majoribus *H.*)“, obvallati. Cal. laciniis 6, subaequalibus vel alternis paulo minoribus „(acutis *H.*)“, laete viridis, margine membranaceo-albus, pilis longis ciliatus, ceterum glabriusculus. Cor. tubulosa, medio parum ventricosa, limbi laciniis acutis, brevibus, glabra, praeter lacinulas tenuissime pilosiusculas. Stam. inclusa, alba, subulata „(cum laciniis alternantia *H.*)“, antheris subglobosis „(oblongis *H.*)“. Germen turbinatum, tenuissime pilosum. Stigmata alba, inclusa. Cocci obovati, compressiusculi, apice et basi emarginati, dorso, praesertim medio, pilis albis, crassis, castaneo-fusci, lineâ longitudinali cristatâ, pallide plumbei. „(Semina compressa, cuneata, basi dilatata, apice depressa, sulco longitudinali, ferruginea albidave, tenuissime pilosa. *H.*)“ *Martius. Ad Rio Janeiro, Minas geraes et alibi. 4.*

Obs. Cls. St. Hilaire in plant. usuell. d. Brésil 2. Livr. T. VIII. sub RICHARDSONIA scabra; caulibus pilosis; foliis ovatis ovato-lanceolatis; racemis oblongis, acutiusculis, margine praecipue scabris; stipulis non ad medium usque divisis; corollae laciniis apice pilosis; (floribus albis) conjungit: R. scabram L., R. pilosam R. et P. et Kunth, et brasiliensem Gomez. R. pilosa R. et P. fide speciminum apud St. Hilaire eadem planta. Nobis specimina culta R. pilosae Ruiz et Pav., praesertim radicibus annuis, tenuibus, fibrosis foliisque glaucioribus a R. brasiliensi spontanea, in qua radix perennis, crassa, annulatâ, differre videntur. R. scabra Linn. differt praecipue caule alto et pilis reflexis.

4. *R. emetica*; caule prostrato, ramoso, hirsuto-hispidulo; foliis ovato-lanceolatis, basi cuneatis, mucronato-acutis, praesertim margine pilosis; capitulis subpaucifloris; laciniis calycis linearibus, hispidulis; corollis ventricoso- (infundibuliformibus) calyces triplo superantibus, roseis. *Martius l. c. p. 11. (sub RICHARDSONIA emetica.) t. 9. f. 19.*

Rad. perpendicularis, 6 poll., fibris ubique tenuibus, epidermide albidâ, tandem cinerascenti-fuscâ, laevigatâ; cortice albedo, molli, aegre a parenchymate albo fibroso secedente, saporis vix ullius. Caules plures spithamaei, rare adscendentes, simplices vel brachiati, teretes, pilis albis sparsis patentibus. Folia opposita, breviter petiolata, parce pilosa, pilis adpressis, ad marginem crebrioribus, pollicaria. Internodia 1-2 poll.. Vaginae interpetiolares membranaceae, laxiusculae, albae: ciliis setosis nonnullis subulatis longiusculis, pilosiores quam in *brasiliensi*. Capitula hemisphaerica, terminalia, foliis plerumque 4 ovatis acuminatis, basi cordatâ sessilibus. Cal. 6-partitus, laciniis acutis, piloso-ciliatis. Cor. striis obscurioribus in fauce; limbo 6-partito, laciniis ovato-triangularibus, acutis, patentibus, apice pubescentibus. Stam. 6, paulo exserta, filamenta alba tubo adnata, filiformia; antherae albae, oblongae, biloculares. Germen globosum, virens, pilis papulosis. Stylus filiformis, albus, apice 3-fidus. Stigmata 3 papillosa, globosa. Caps. turbinata, cinereo-fusca, pilis brevissimis albis scabra, dilabens in cocculos 3, dorso convexos, intus concavos et suturâ longitudinali, ibidem plumbeos, imâ basi emarginatos. *Mart. In arenosis siccis Provinciae St. Pauli, Sebastianopolitanae et Minarum. 4.*

5. *R. rosea* *St. Hil.*; caulibus apice praecipue molliter hirsutissimis; foliis ovatis vel ovato-ellipticis, acutis, marginibus praecipue scabris, per paria distantibus; stipulis ultra medium divisis; corollae laciniis pilosis; (floribus roseis). *RICHARDSONIA rosea* *St. Hil. Pl. us. d. Bras. 2. Livr. T. VII.*

Radix tortuosa, crassitie pennae anserinae; fibris capillaribus, intus albis, extus atro-violaceis, sapore *Cephaelis Ipecacuanhae*. Caules prostrati, 1-1½ ped., ramosissimi, tetragoni; rami patentes vel adscendentes, caulibus similes; pili caulium, ramorum petiolorum stipularumque longi, albi, satis molles. Internodia 2½ poll.. Folia opposita, petiolata, 8-15 lin., 6-8 lin. lata, quidquam in petiolum decurrentia; superiora saepius angustiora ovato-lanceolata vel ovato-oblonga; pilis appressis, brevibus, subulatis, rigidis. Petioli 3-6 lin., sat lati, supra canaliculati. Stipulae intermediae, petiolis adhaerentes, ultra medium fissae in lacinias setaceas, patentes. Capitula in apicibus caulium ramorumque. Involucrum e foliolis sessilibus, scabris, 2 ovato-acutis, basi latis, vel 4, quorum 2 interiora minora, saepe angusta, oblongo-lanceolata. Praeter capitula terminalia, subinde etiam capitulum ad internodium proximum. Cal. obovato-pyramidalis, 5-gonus; tubus pilis brevibus, appressis, rigidis; limbus 5-7-partitus; laciniis semi-ovato-oblongis, acutis, ciliatis, subinaequalibus. Cor. 3 lin., 5-7-fida; lacinae stellatae, lanceolato-oblongae, acutae, saepe quidquam inaequales, extus pilis sparsis. Stamina 5-7, exserta, glabra, alba, summo tubo inserta, cum laciniis alternantia; filamenta capillaria; antherae lineares, angustae, versatiles, medio dorsi affixae, loculis 2 longitudinaliter dehiscentibus. Stylus exsertus, glaber; lobis 3 brevissimis; stigmatibus capitatis. Nectarium epigynum, annulare, breve, basin styli cingens. Germen adhaerens. Capsulae per medium valvularum dilabentes; cocci 3 indehiscentes, obcordati, applanati, intus concavi, extus convexi, pilosi. Semina coccis adhaerentia ejusdemque formae, orbiculato-cordiformia, peltata, parum arcuata. Integumentum proprium membranaceum rufescens. *St. Hil.* Confer cum *emetica*, a qua forte non diversa. Si eadem, icon a *St. Hil.* data haud bona. *Copiose in elevatis Comarcas de S. Joao del Rey et Villa ricca Brasiliae. 4.*

1312. A M A I O U A.

1. *A. guianensis* *Aubl.*; ramis triquetris; foliis ternatis binisque, lato-ellipticis, acuminatis, nervosis; floribus confertis, subsessilibus; calycibus elongatis. *Desfont. in Mém. d. Mus. T. VI. p. 12. t. 4. Aubl. Gujan. 2. Suppl. p. 13. t. 375. Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. red. Kunth III. p. 419. Syst. Veg. ed. nostr. V. p. 267. HAMELIA sessiliflora; flor. terminalibus, sessilibus; fol. ternis, glabris, (utrinque) acuminatis. Willd. Spec. 1. p. 981. HAMELIA glabra Lam. Enc. meth. III. p. 65. Pers. Syn. I. p. 203.*

Arbuscula 5-10 ped. (trunco 5-6 poll. in diam.; cortice rufescente; ligno albido;) ramis apice pluribus, nodosis, triangularibus, apice pilis brevibus, sericeis, rufis, appressis. Folia persistentia, integerrima, basi angustata, 5-8 poll., 2-3 poll. lata. Petioli

breves, sericei, canaliculati. E nervo medio nervi plures transversales, subtus prominentes, apice inclinati, venis reticulatis. Stipulae sericeae, deciduae, integerrimae, convexae, ovato-oblongae. Cor. tubus apice quidquam ampliatus, pilis appressis sericeus; limbus 4 - 5 lin. in diametro: laciniis 6, patentibus, ovato-oblongis. Stamina 6, inclusa, cum laciniis alternantia; filamenta brevissima; antherae lineares. Stylus gracilis, corollae tubo brevior. Stigma crassiusculum, leviter longitudinaliter sulcatum. Bacca secus *Aublet* carnosae, flavae, ovatae, 4-locularis; seminibus rotundis, compressis, 7-fariam longitudinaliter placentae centrali affixis. In specimine peruviano in *Herb. Juss.*, a planta *Aubletii* vix diverso, bacca bilocularis; semina bifaria in quovis loculamento. *Desfont.* In sylvis *Gujanac*, in *Peru*, h.

Obs. Cum icona ab *Aublet* data multo melius quadrant, quam cum illa a *Desfont.*, specimina fructifera a clo. de *Martius* in Brasilia in sylvis ad *Barra do Rio Negro* lecta. Haec: arbuscula 6-10 ped., ramis oppositis alternisque, strictis, inferne teretiusculis, apice obsolete trigonis, fuscis, inferne glabris corticeque cinerascens-fusco rimuloso, superne crassioribus, pilis densis longis substrigosis rufis, ad foliorum ortum tumidulis, crassitie pennae corvi ad pennam anserinam usque. Folia opposita vix unquam ternata, in apicibus ramorum approximata, patentia, breviter petiolata, oblongo-lanceolata, acumine acuto, 6-8 lin. longo, basi longe attenuata, integerrima, sicca fusca, firma, costato-nervosa, supra glaberrima, subtus ad nervos costasque pilis setosis appressis fuscescentibus, margine pilis similibus ciliata, 5-9 poll., 2-3 poll. lata; nervis subtus prominentibus; costis 10-13 parallelis per venularum rete prominens conjunctis. Petioli subtus convexi, supra canaliculati, pilis longis setosis appressis rufescentes, 3-6 lin. Stipulae floresque desunt. Baccae 6-12 in apicibus ramorum in capitulum congestae, brevissime pedicellatae, (pedicello anguloso vix $\frac{1}{2}$ lin. hirsuto) ovatae, obtusae, calycis vestigio cinctae, umbilico glabro nitido, basi paululum angustatae, siccae fuscae, corticatae, pilis appressis brevibus; immaturae 5 lin., 3 lin. in diametro, 2-loculares; septo transverso tenui fusco; loculis ovato-oblongis a receptaculo e septo paulo prominulo quidquam partitis. Ovula circiter 6 in quovis loculo, receptaculo bisetiatim affixa oblonga, subfalcata, obtusa, fusca, glabra, quidquam pendula. A planta a *Desfont.* depicta differre videtur: ramis vix triquetris; foliis majoribus, nunquam ternis, oblongo-lanceolatis nec lato-ellipticis; ab *A. fagifolia*: fol. duplo majoribus, minime obovatis, floribus brevius pedicellatis etc..

2. *A. fagifolia Desf.*; (ramis teretiusculis); foliis binis, oppositis, obovatis, acuminatis, nervosis; floribus corymbosis, terminalibus; calycibus abbreviatis. *Desf.* in *Mém. d. Mus.* T. VI. p. 14. t. 5.

A. gujanensi proxima; sed differt foliis oppositis, 3-4-poll., 2-3 poll. latis, FAGI *sylvaticae* similibus, sed majoribus; nervis transversalibus, subtus prominentibus, venis reticulatis. Pedunculi inaequales, minus approximati, quam in *A. gujanensi*. Calyx multo brevior: laciniis minoribus. Corolla fere ut in *gujanensi*. Stam. non tam prope basin corollae tubi inserta. Fructus? *Desf.* In speciminibus brasiliensibus a clo. de *Martius* lectis, quae nobis huc spectare videntur: rami stricti et erecto-patentes, oppositi alternique, quidquam nodosi, inferne teretes et obsolete angulosi, glabri, cortice cinereo-fusco, ligno albido duro, medullam sat amplam rufescentem; superne obsolete angulosi, a foliorum lapsu cicatrisati, pilis brevibus subsericeis appressis densis rufis, apice foliosi, crassitie pennae anserinae, florum capitulo vel gemma oblonga 4 lin. longa, rufa dense pilosa terminati. Folia opposita, patentia, in apicibus ramorum approximata, breviter petiolata, ovato-lanceolata ovatave acumine obtusiusculo, basi attenuata, firma, costato-nervosa, sicca fuscescentia, supra glaberrima, subtus pallidiora et ad nervos costasque pilis appres-

sis fuscis, iisdemque ciliata, 4-6 poll., $1\frac{1}{2}$ poll. lata; nervis subtus validis, costisque 9-12 parallelis prominentibus reticulatim junctis. Petioli supra canaliculati, pilis rufis densis sericeis appressis, 2-4 lin.. Stipulae mox deciduae, erectae, vix convexae, lanceolatae, acutae, integerrimae, rufae, pilis appressis, 5 lin., lin. latae. Flores circiter 12-18, congesti, pedicellis brevissimis angulosis hirsutis, multo brevioribus quam in ic. *Desf.* Cal. deciduus, subcampanulatus, truncatus, 2 lin., vix angulosus, utrinque pilis flavescenti-cinereis sericeo-pilosus; dentibus 6 acuto-subulatis, erectis, lin. longis. Cor? Germina obovata, oblonga, obtusa, basi attenuata, apice calycis vestigio coronata et umbilicata, sericeo-pilosa, rufescentia; loculis 2; ovulis subovatis, biserialibus. *In Gujana Martin; in sylvis ad Ega prov. Rio Negro Brasiliae. Martius. h.*

3. *A. intermedia de Martius*; fruticosa; ramis teretibus; foliis oppositis, oblongis, utrinque attenuatis, ciliatis; floribus confertis, subsessilibus, sericeis, stipulis 2 supremis involucreatis. *De Martius Fl. brasil. ined.*

Rami varie flexi, nodulosi, inferne teretes, glabri, cinereo-rufescentes, apice foliosi, crassiores, obsolete triangulares, pilis rufis appressis patentibusque, annulati, ramuli ramos e quibus nascuntur superantes; gemmis oblongis acutis rufo-pilosis. Folia erecto-patentia, acumine acuto 3-4 lin., firma, supra glaberrima, subtus ad nervos strigosa, laete viridia, $3\frac{1}{2}$ -5 poll., $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, minus nervosa quam in reliquis, praesertim in speciminibus fructiferis: nervis subtus prominentibus: costis transversalibus 6-8 ante marginem evanescentibus paulo prominulis. Flores 6-7 in capitulum terminale congesti, stipulis 2 supremis involucreatis ovatis, acuminatis, concavis, deciduis, extus rufo-pilosis, intus fuscis glabris, 4-5 lin., 3 lin. latis, ante expansionem capitulum globoso-ovatum acuminatum magnitudine *Pruni spinosae* formantibus. Cal. fere obconicus, $1\frac{1}{2}$ -2 lin.; dentibus 6 acuto-subulatis $\frac{3}{4}$ lin., utrinque sericeus, flavescenti-cinereus. Cor. cinerascenti-rufa, 3 lin.; tubus erectus, basi angustior et glaber, mox quidquam ampliatus, sericeus, intus glaber, 3 lin.; limbus patens 3 lin. in diametro; lacinae ovato-lanceolatae, acutae, utrinque sericeae, $1\frac{1}{2}$ lin., lin. fere latae. Antherae subsessiles, inclusae, dorso infra medium affixae, lineares, acutae, basi obtusae, pallide flavae, $1\frac{1}{2}$ lin. Stylus antheras subaequans, gracilis. Stigma clavatum, acutum, sulcatum. Bacca ovata, obtusa, basi in petiolum brevissimum angustata, apice umbilicata, laevis, sicca nigricans, pilis brevissimis appressis, detergendis, 2 locularis, 5-6 lin., 9-12 lin. in ambitu; cortice tenui firmulo; parenchymate paucis, costis nigricantibus percurso; membrana interiore fusca, nitida, glabra; septo glabro, nitido, fusco, receptaculo medio longitudinali costisque transversalibus 2-3 parum prominulis. Sem. 6-7 in quovis loculo, biseriali, pendula, ovata, dorso convexa, intus angulosa, badia, striolata, glabra, resinoso-nitida, basi obliqua et hilo parvo oblongo, quidquam impresso, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata; tunica exteriori difficilius decedente; interiore arete cum semine exteriorique cohaerente, tenuissima, fusca. Albumen semini conforme, corneum, albidum. Embryo intrarius, axilis, inversus; radícula supera, cylindrica, obtusa, crassa, cotyledonibus longior; cotyledones tenuissimae, albae, planae, parvae, cor-

dato-suborbiculatae. In sylvis provinciae Bahiensis Bra-
siliae. de Martius. †.

Obs. Hujus loci nobis esse videtur *ENANDEBEGIA ciliata*; fruticosa; foliis op-
positis, oblongis; floribus aggregatis, pedunculatis, hirsutis. *Spreng. S. V.*
II. p. 133. N. Entd. II. p. 129., quae certe AMAIOUAE species. Describitur
apud *Sprengel*: „Frutex. Folia subpetiolata, utrinque attenuata, glabra,
nervo medio subvillosa, ciliata, nervoso-venosa, 2 polli- ½ poll. lata. Pedun-
culi axillares terminalesque, brevissimi, uniflori. Cal. extus et intus hirsutus,
campanulatus, dentibus subulatis, post anthesin apertus. Cor. extus hirsuta,
calyce duplo longior. Antherae subsagittatae. Stylus simplex.“ Differt tan-
tum ab *A. intermedia*: foliis minoribus, brevius petiolatis; floribus peduncu-
latis, nec sessilibus, antheris subsagittatis.

4. *A. corymbosa Humb. et Bonpl.*; (arborea); foliis
oppositis, ovato-ellipticis, (acuminatis, nervosis); corymbis ter-
minalibus, tripartitis, ramosis. *Humb. et Bonpl. nov. gen.*
red. Kunth III. p. 419. t. 294. Desf. in Mém. d. Mus. T.
VI. p. 15. HEXACTINA corymbosa Reliqu. Willd. (fide de
Schlechtend. fil.).

Arbor 8-9 org., ramis teretibus, fuscescentibus, glabris; juniori-
bus pubescentibus. Folia brevissime acuminata, acumine obtuso,
basi in petiolum decurrentia, integerrima, coriacea, utrinque
glabra, subtus in venis substrigosa, ciliata, 5-6-poll. Petioli
½ poll. et ultra, pubescentes. Stipulae caducae? Corymbi bre-
vissime pedunculati, ramis ramulisque patulis et sericeis. Flores
breviter pedicellati. Cal. truncatus, sericeus, dentibus acuto-
subulatis, distantibus. Cor. externe sericea, tubo 4 lin., caly-
cem quadruplo superante: laciniis linearibus tubo paulo brevio-
ribus, fauce nuda. Stylus longitudine staminum. Fructus? Non
differt a *gujanensi* praeter characteres datos. *Kunth l. c.* Hue a
elo. *Spreng. Cur. post. p. 159. cum?* trahitur MELANOPSIDIUM ni-
grum *Colla II. Ripul. t. 35.*, stigmatibus 3 etc., abunde diver-
sum. In frondosis *Nov. Andalusiae prope Cumana-*
*ca. †. *)*

5. *A. peruviana Desf.*; foliis oppositis, ellipticis, ner-
vosis, acuminatis, superne nitidis; floribus aggregatis, corym-
bosis. *Desf. in Mém. d. Mus. T. VI. p. 16.*

A. corymbosae proxima, et forte hujus varietas; differt fol. ellipticis,
laevibus, superne nitidis, consistentiâ firmiore; floribus sessili-
bus vel in ramulis brevissimis. *Desf. In Peru. †. Herb.*
Juss.

6. *A? saccifera Martius*; ramis apice angulosis, seto-
sis; foliis ternatis, obovato-lanceolatis, basi attenuatâ scroti-
formi-saccatis, hirtis, costato-nervosis; floribus terminalibus,
congestis, breviter pedunculatis; calycibus elongatis. *De Mar-*
tius Fl. brasil. ined.

Frutex 6-8 ped.; ramis erectis, nodosis, inferne teretibus, cine-
rascenti-fuscis e pilorum tuberculis persistentibus scabris; su-
perne rufis pilis longis patentibus, rigidis, e basi tuberculata
subulatis; ad basin ramulorum vel ad folia inferiora ochreâ aretâ,

*) Character generis HEXACTINAE in *Reliqu. Willd.* „Cal. inferus, ovatus,
externe villosus, apice dilatatus, 6-dentatus, dentibus acutis, linearibus, distantibus. Cor. 6-fida, infera, ovato-ventricosa, laciniis angustioribus, subpungentibus. Antherae 6, oblongae, 4-sulcatae, fundo corollae adnatae. Ger-
men superum, rotundum. Stylus longitudine staminum. Stigma incrassatum.“

rufâ, truncatâ, crassâ, 2 lin., hispidâ. Folia patentia, acumine acuto, integerrima, margine subrevoluto, sicca ferrugineo-fusca, subbullata, utrinque pilis patentibus e basi tuberculata subulatis, fuscis, lin. longis ciliata, 5-9 poll., $2\frac{1}{2}$ -4 poll. lata; nervis valde prominentibus, setosis, costis 14-18 parallelis per venularum rete conjunctis. Mira saccorum constructio: lineâ 5â. vel 6â. ab insertione petioli 6 lin. longi, supra plani, crassi, hirti, reflectitur uterque margo versus nervum medium cum eodem concreescens, volvitur dein iterum extus, et in pagina superiore folii iterum cum petiolo coalescit, ita, ut inde sacculi formentur 2 inflati, apice rimâ obliquâ aperti, ovati, fuscis, nervosi, hirti, intus glabri, reticulato-nervosi, 5 lin., $2-2\frac{1}{2}$ lin. in diametro. Stipulae deciduae? Flores 8-14, bracteis 3 caducis foliisque 3 supremis suffulti. Pedunculi teretes, pilis longis, fuscis, rigidis, 3-4 lin. longi. Cal., ut videtur, inferus, tubulosus, cylindricus, truncatus, extus fuscus strigosus, intus pallidior sericeus, 6-8 lin., 3 lin. in diametro; dentibus 6 erectis, acuto-subulatis, distantibus, lin. longis. Cor. tubulosa, infundibuliformis, rigida, 14 lin., albide ferruginoso-cinerascens; tubus erectus, subclavatus, pilis longis densissimis, reversis, ferrugineo-albicans, intus glaber, fauce contractâ quidquam pilosus, crassus, 8-9 lin.; limbus erecto-patens, 8-12 lin. in diametro; lacinae ante anthesin subspiraliter sibi incumbentes, lanceolatae, acutae, rigidae, dorso albae, ferrugineo suffusae, pilis densissimis appressis subsericeae, intus pilis minus densis cinerascens, 5 lin. longae, 2 lin. latae. Stam. 6, inclusa. Antherae in medio tubi sessiles, medio dorsi adnatae, angustae, lineares, mucronulato-acutae, 5 lin., 2-loculares, pallide flavae, dorso fuscae. Stylus erectus, basi filiformis, glaber, dein paulo crassior et pilis patentibus albidis; supra medium glaber; 8 lin., faucem aequans, stamina paulo superans. Stigma simplex, clavatum, stylo crassius, erectum, inferne obsolete tetragonum, glabrum. Fructus? Dubitamus adhuc de genere; fructum non vidimus; cal. cor., antheraeque omnino fere ut in AMAJOUIS. *In sylvis ad Barra do Rio Negro Brasiliae, ubi folha de Comminao, Coajusara.* \dagger .

Obs. Clo Sprengel S. V. II. p. 126. COFFEA sanguinariensis (quam vide apud nos Syst. Veg. V. p. 197.) AMAJOUA africana est.

1313. P S A T H Y R A.

1. *Ps. borbonica* Lam. ill. t. 260. *Poir. Enc. meth.* T. VI. p. 582. *Willd. Spec.* II. p. 229. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wallich.* II. p. 159. *Ps. corymbosa* Gaert. fil.

Arbuscula *Erithali* affinis, ramis nodosis, fragilibus, glabris, dichotomis. Folia opposita, breviter petiolata, oblonga, utrinque attenuata, glabra, integerrima. Panicula terminalis corymbosa, trichotoma; etiam axillaris. Flores minuti, pentandri (hexandri *Poir.*). Stylus brevis. Stigma bilobum. Drupa magnitudine Pisi. Semina 5, nuciformia, rugosa, 1 in singulo loculamento. *Roxb. Wall.* (Sem. 6. *Poir.*). An hic forte species distinctae? *In insula Borbonia.* \dagger .

1314. I S E R T I A.

1. *I. coccinea* Vahl; foliis oppositis ternisve, oblongis, acuminatis, basi valde angustatis, subtus villosa-tomentosis aut

pubescentibus; paniculis terminalibus: ramis subverticillatis, dichotomis; (floribus longe tubulosis). *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 415.* I. fol. lanceolato-ellipticis, subtus villosis-incanis, acuminatis, utrinque acutis; pedunculis racemosis, bifidis; (fructu coccineo). *Vahl Eclog. II. p. 27. Willd. Spec. II. p. 240.* GUETTARDA *coccinea Aubl. gujan. I. p. 317. t. 123. Lam. Enc. III. p. 54.*

Arbor trunco 10-12 ped., ramis strictis, rectis, superne obtuse tetragonis, striatis, sordide cinereis (ferrugineisve, sub-) tomentosis. Folia patentia, $\frac{1}{2}$ ped., 4-5 poll. lata, acumine pollicari attenuata, integerrima, supra remote oblique tenuissime nervosa, inter nervos simpliciter obscure venosa, glabra, subnitida, subtus pilis stellatis villosis-tomentosa, incana, mollia, nervis extantibus. Petioli $1\frac{1}{2}$ poll., subtus convexi, supra canaliculati, cinerei. Stipula utrinque inter petiolos, membranacea, lanceolata, bipartita, ferruginea, substriata, glabra excepta basi in costa, fere pollicaris. Racemus terminalis erectus; pedunculus tetragonus; pedicelli pollicares, oppositi, infimi subinde terni, inferiores bis dichotomi, pedicellis 3-floris, unguicularibus, cinereis. Flos in singula dichotomia sessilis: laterales pedicellati: bractea utrinque ad basin pedunculorum lanceolata. Cal. villosis-tomentosus: laciniis 4 ovatis, acutis, intus glabris. Cor. fere 2 poll., extus flavescens-cinerea tomentosa: limbus pilis longis, densis; tubus intus glaber. Filamenta brevissima in fauce tubi. Antherae erectae, lineares, compresso-triquetrae apice mucronatae, limbo parum breviores. Germen obconicum. Stylus filiformis, longitudine corollae. Stigma oblongum, indivisum, compresso-tetragonum. *Vahl.* Bacca globosa, coronata, seminibus minutis, angulosis. *In Guiana Aubl. et von Rohr; prope S. Bartholome in ripa fluminis Magdalena. Humb. t.*

Obs. Plantae Aubletianae proxime affinia et vix diversa nobis esse videntur specimina brasiliensia a clo. de Martius lecta. Arbor ramis obtuse tetragonis, striatis, tomento sordide cinereo, medullâ amplâ; ramulis strictis basi tubulo 4 lin., cinereo-tomentoso, bilobo: lobis ovatis carinatis. Folia patentia, acumine $\frac{1}{2}$ poll., basi breviter attenuata, margine subrevoluto, supra nitida (sicca fusca), subtus tomento densissimo brevissimo albido, 10 poll., 5-6 poll. lata, costato-nervosa, nervis subtus prominentibus: medio valido purpurascens-fusco, parce tomentoso, costis 20-27 alternis parallelis per nervulos rectangulares conjunctis. Petioli $1\frac{1}{2}$ -2 poll., teretiuseuli, supra sulcati, fusi, tomentosi. Stipulae 4 vel 2 interpetiolares profunde bifidae, lanceolatae, subcutae, carinatae, striatae, cinereo-tomentosae, 3-4 lin. Panicula 5-7 poll., 5 poll. lata. Pedunculus communis strictus, obtuse tetragonus, ferrugineo-tomentosus vel glabriusculus, fuscus; rami erecto-patentes, inferiores remoti, oppositi, superiores approximati sparsi et subverticillati, compressi, apice incrassati, ferrugineo-vel fusco-scabri, pilis parvis brevibus, dichotomi, basi bractea patente, ovata, acuta, concava, rigida, 1- $1\frac{1}{2}$ lin. longa; ramuli similes, iterum dichotomi vel sessiles, bracteati. Flores solitarii, in dichotomiis et ad latera sessiles, terminali pedicellato, basi bracteis similibus. Cal. arceolatus, erectus, integer, vel obtuse 4-6 crenatus, pilis raris scabriusculus, lin. longus. Cor. crassa, rigida, coccinea, sicca flavescens-ferruginea: tubus cylindricus, erectus, extus pilis densis rigidis ochroleucis, $1\frac{1}{2}$ poll., intus fauce barbata; limbus subinfundibuliformis, 5 lin., 5-6 lin. in diametro; lacinae erecto-patentes, lineares, obtusae, extus verruculosae, intus barbata densissima ochroleuca, 4 lin., lin. latae. Filamenta brevissima, cum laciniis alternantia plana, glabra; antherae inclusae, medio dorsi affixae, erectae, triangulares, acutae, miniato-fulvae, $2\frac{1}{2}$ lin., effetae cribrosae. Germen obovato-oblongum, fuscum, verruculoso-scabrum. Stylus filiformis, glaber, antheras vix superans, 2 fere poll. Stigma crassum, ovato-oblongum, 6-sulcatum, lin. Drupa immatura ovata, calyce coronata, fusca, verruculoso-scabra, 4 lin. longa. *In sylvis ad flumen Japura prov. Rio Negro Brasiliae.*

2. *I. breviflora de Martius; foliis oppositis, oblongis,*

utrinque attenuatis, subtus cano-tomentosis; paniculis terminalibus, ovatis; ramis oppositis, alternis subverticillatisve, dichotomis; floribus brevibus, subcampanulatis. *de Martius Fl. Brasil. med.*

Arbor ramis obtuse tetragonis, sulcatis, tomento brevissimo, flavescenti-cinereo, crassitie digiti minimi; ramulis oppositis basi tubulo cylindrico, 4 lin. longo, bilobo: lobis ovatis bifidis. Folia patentia, acumine fere poll., margine quidquam revoluta, supra glaberrima, nitida, sicca fusca, subtus tomento brevissimo cano, 7-12 poll., 2½-4 poll. lata, costato-nervosa: nervis subtus prominentibus purpurascenti-fuscis; nervo medio crassitie pennae gallinae, pilis stellatis parce tomentoso; costis 20-25 parallelis per nervulos transversales parallelos conjunctis. Petioli 1½-2 poll., teretiusculi, supra sulcati, fusciscentes, parce tomentosi. Stipulae 4, vel 2 interpetiolares profunde bifidae, erectae, lanceolatae, obtusiusculae, carinatae, subtomentosae. 3-5 lin.. Panicula 5 poll.. Pedunculus communis firmus, crassitie pennae cygnae, angulatus, tomento scabriusculo; rami erecto-patentes, inferiores oppositi, superiores alterni, subverticillatique, compressi, apice incrassati, fusci, pilis sparsis scabri, poll., basi bractea scabra ciliataque, ovata, acuminata, subcarinata, rigida, patente, inferne 3 lin., superne 3 lin. longa; ramuli similes, 1½ poll.. Flores solitarii, in dichotomiis sessiles, in ramulis 2-3 laterales, alterni, sessiles, terminali pedicellato, 8 lin. longi. Bractea sub floribus 2, vel 1 sub flore, altera sub ramulo elongato, similes illis in ramulis. Cal. sub florescentia hypocrateriformis patens, serius suburceolatus erectus, obsolete 4-rarius 5-6 crenatus, verruculosus-scaber, firmus, vix lin.. Cor. sicca ferruginea, crassa, rigida, 6 lin.; tubus erectus, vix ultra lin., mox ampliatus in faucem campanaeformem, hexagonam, extus verruculosus-scabram, intus superne barbâ longâ albidâ; laciniâe primum erecto-patentes, serius medio reflexae, lanceolatae, acutae, extus glabrae, intus ad medium usque barbâ albidâ densâ, apice glabrae et tenuiores, 3 lin. longae, 1½-2 lin. latae. Filamenta brevissima, glabra. Antherae inclusae, dorso paululum infra medium affixae, lineares, acutae, triangulares, flavae. Stylus deciduus, tubum vix superans, antheris brevior. Drupa subglobosa, calyce glandulaque stylum cingente coronata, magnitudine Pisi majoris, cornea, verruculosus-scabra: pyrenis 6 oblongis, obtusis, triangularibus. Semina minuta, ovata, angulosa, foveolato-rugosa, pallide fusciscentia. *In sylvis Japurensibus Brasiliae. h.*

5. *I. parviflora Vahl*; foliis oblongis, acuminatis: inferioribus basi subcordatis; racemo ovato; tubo corollarum limbo duplo longiore. *Meyer Essequib. p. 151. l. fol. oblongis: inferioribus basi subcordatis; thyrsos ovato. Willd. Spec. II. p. 240. ex Vahl Eclog. 2. t. 15.*

Rami tetragoni, crassitie fere pennae cygnae, stricti, pilis copiosissimis, brevissimis, rufo-cinerascentibus; ramuli cinerei, basi tubulo unguiculari, 4-fido vaginati, oppositi, uti folia ½ pedalia, palmam lata, inferne parum angustata, inferiora auriculis rotundatis; 2 suprema obtusa basi; tenella utrinque acuta: omnia acuminata, acuta, firma, plerumque utrinque glabra costâ nervisque subtus exceptis; interdum subvillosa, venosa, supra

nitida, secundum nervos transversim remote lineata, subtus pallide viridia, nervis costis subpurpurascentibus. Petiolus teretiusculus, $1\frac{1}{2}$ poll. Stipula utrinque bipartita: laciniis lanceolatis, attenuatis, pollicaribus, erectis. Thyrsus terminalis, ovatus, spithamaeus. Pedunculus communis strictus, rigidus, angulatus; villosus - subtomentosus. Pedunculi partiales inferne saepe quaterno - verticillati, infimi remotiores, 2 inferiores interdum oppositi, superiores sparsi, approximati, dichotome quinquies divisi, villosi, superne compressiusculi, uti rami glabriusculi, altero latere convexiores, altero subcanaliculati. Flores dichotomiae sessiles solitarii: terminales terni. Bractea utrinque sub singula ramificatione et ad basin calycis, ovata, acuminata, glabra, ferruginea, rigida. Cal. margo persistens, brevis, 4-dentatus: dentibus 2 parum majoribus. Cor. hypogasteriformis, unguicularis, extus glabra: limbi lacinae 6 lineares, obtusae, hirsutae, apicibus nudis: tubus interne hirsutissimus. Filamenta in medio tubi, brevissima: antherae lineares, longitudine tubi. Germin obconicum, supra glandula glabra, convexa. Stylus glaber, longitudine tubi. Stigma crassum, altero latere planum, subconcavum, altero convexum, linea acuta, elevata, longitudinali. Pomum magnitudine pisi, globosum, calyce et glandula germinis coronatum, 5-6-loculare: loculis extus convexis, longitudinaliter torosis, vix adnatis. GUETTARDAE affinis. *Vahl.* *In insula*

Trinitatis. Ryan. h.

Obs. Cls. *Meyer* l. c. plantam suam eandem esse cum illa *Vahli* iconem docere, non vero descriptionem. Folia in planta cl. *Meyer* tomento tenui densissimo haud defricando; stipula triquetra integra, hinc inde apice fissa. Cal. carneus. Cor. ex albo-incarnata. Ovarium ad styli insertionem non glandula glabra convexa coronatum, sed foveola exsculptum. Stigma capitatum, profunde 6-sulcum, ut in *coccinea*. Baccae fuscae, pyrenis 6 oblongis obtusis, hinc convexis, inde angulatis, unilocularibus, polyspermis. *In regione rivi Supanamaknek.*

1315. MYRRHINIUM.

1. *M. atropurpureum Schott. Fasc. 1. plant. brasil. in Spreng. Cur. post. p. 405.*

Frutex orgyalis; folia opposita, elliptica, coriacea, glabra, punctata, subtus ferruginea; flores cymosi, hibracteati, atropurpurei; stamina longissima. Semina subreniformia. Embryo insigniter curvatus, *Schott.* *In Brasilia. h.*

1316. STEVENSI A.

1. *St. buxifolia Poit. Annal. Mus. IV. p. 235. t. 60. Pers. Syn. p. 592. Poir. Enc. VII. p. 441. Dict. Scienc. nat. 40. Cah. 74.*

Arbor dura, ramosa, recta, 10-12-ped.; cortice cinereo, fisso, ramis junioribus resinosis, viscosis. Folia opposita, petiolata, oblonga, utrinque acuta, firma, subtus alba, reticulata, supra lucida, $1-1\frac{1}{2}$ poll. Petioli breves, stipula integerrima, vaginante coadunati. Flores solitarii, albi, odori, externe tomentosi, axillares. Pedunculus longitudine petioli. Bractea calyciformis sub flore singula, 4-fida, laciniis 2 brevioribus obtusis, 2 duplo majoribus lanceolatis, saepius folia minuta simulantibus. Cal. perigynus, limbi laciniis lanceolatis, ante fructus maturitatem deciduis. Cor. extus quidquam sericea, tubo cylindrico, longitudine limbi calycis, apice vix dilatato: lacinae corollae 6-7,

oblongae, obtusae, patentés, vel reflexae. Stamina subinde 7. Antherae 6-7, similes, oblongae, erectae, bilobae, biloculares, apici tubi affixae. Germen globosum, calycis tubo coalitum. Stylus rectus, longitudine tubi. Stigma lacinae 2 virides, patentés. Caps. sphaerica, magnitudine pisi, cum calyce coalita, primum calycis laciniis 2, serius deciduis, coronata: loculi 2, apice dehiscentes, quidquam ossei; valvulae dorso ab apice ad basin dehiscentes, ut inde capsula fere 4-partita. Semina numerosa, parva, ovalia, quidquam compressa, flava, superne alâ membranaceâ brevi, basi attenuata, receptaculo hemisphaerico affixa. Radicula cylindrica infera. *Poit.* In insula *St. Dominica*.

1317. L O R A N T H U S.

a. *Flores tetrandri.*

1. *L. clandestinus Mart.*; glaber, ramis junioribus compresso-tetragonis; foliis oppositis, obovatis, coriaceis; floribus axillaribus, solitariis, sessilibus, minimis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami numerosi, secundi, scandentes, valde foliosi, virides. Folia patentia, basi attenuata, obtusa, juniora obsolete triplinervia, 8-12 lin., 4-7 lin. lata. Petioli supra plani, $\frac{1}{2}$ lin.. Flores vix $\frac{1}{2}$ lin., inexpansi ovati. Bractea gemmacea, suborbicularis, fusco-tomentosa, lacera. Cal. margo brevis, fuscus, irregulariter lacerus. Pet. 4, ovato-lanceolata, acuta, concava. Stam. 4, aequalia, petalis breviora; antherae sessiles, ovatae, flavae. Germina ovata. Stylus brevis, crassus, longitudine staminum. Stigma capitatum. Baccae oblongae, subcylindricae, $1\frac{1}{2}$ lin. In sylvis prov. *Paraensis Brasiliae*. \dagger .

2. * *L. tetrapetalus*; floribus ad articulos 4, verticillatis, tetrapetalis; foliis oblongis, oppositis, sessilibus. *Linn. Suppl.* 211. *Willd. Spec.* II. p. 232. *Forst. Prodr.* p. 156.

Folia subpetiolata, integerrima. Flos utrinque ad latera foliorum unus eoque ad singulum articulum 4, et sic per totum caulem. *Linn.* Folia elliptica (s. ovata) obtusa, coriacea, semiuncialia. Flores foliis longiores. *Willd.* Rami dichotomi, teretes, breves, nodosi, glabri, fusci. Folia sessilia, glaberrima, integerrima, avenia, utrinque angustata, $\frac{1}{2}$ -1 poll., 5-6 lin. lata. Flores coccinei (?), breviter pedicellati, poll., glabri. Calyx margo brevis, subinteger vel obsolete 4-dentatus. Petala linearia, tubum mentientia, obtusa. Stamina longitudine fere corollae. Stylus paulo longior, subtetragonus, purpureus. Stigma capitatum. Bracteas nullas observavimus in specim. *Forster. in Herb. Schreber.* In *Nova Zeelandia*. \dagger .

3. *L. Corynitis Spreng.*; foliis oppositis, lato-lanceolatis; floribus axillaribus. raris, tetrandris; corollâ irregulari, 4-fidâ; baccis clavatis. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall.* II. p. 210. (sub *clavato*.) *Spreng. Cur. post.* p. 140.

Parasiticus, delicatulus in *AVRERHOA Carambola*. *Roxb.* Nomen mutandum ob *L. clavatum* antiquiorem *Desr.* In *Silhet.* \dagger

4. * *L. Scurrula*; pedunculis unifloris, congestis; foliis obovatis. *Linn. Spec.* p. 472. *Willd. Spec.* II. p. 232. Et, *teste*

teste *Linn.*: *Scurrula Spec.* 110. *Viscum vitici innascens.*
Camell. luzon. III. n. 36. *Petiver. gaz.* t. 63. f. 8. *L.*
Scurrula; fol. ovato-cordatis, subtus tomento tenui albicanti-
bus; pedunculis 1-2-3-floris. *Roxburgh t.* 140. *Fl. ind. Car.*
et *Wall.* II. p. 206.

„Frutex parasiticus. Folia opposita, petiolata, ovata, integerrima,
glabra, altero latere paulo latiora. Flores axillares 3-6, pro-
priis pedicellis. Germina inferne attenuata. *Linn.* Utrum *L.*
Scurrula Roxb. re verâ huc pertineat, videant autoptae. Descri-
bit div. *Roxburgh* folia opposita, petiolata, cordata, repanda,
subtus tomento molli, albo, 2 poll., 1¹/₂ poll. lata; pedunculos
axillares, aggregatos, 1-multifloros; flores minores quam in *L.*
bicolore, ferrugineo-griseos, villo griseo, farinaceo tectos; brac-
teas germini, ut in *L. bicolore*, appressas; calycem fructus brac-
team; corollam tubo basin versus inflato; limbum 4-partitum,
fissurâ superiore profundiore: lacinias lineares, reflexas; stam.
et pistillum *L. bicoloris*; baccam 1-spermam.“ *In China,*
Linn.; *in Coromandel, Roxb.*

Obs. Si *Scurrula Roxb.* species distincta, *Roxburghiana* dicenda foret.

5. *L. buddlejoides Desrous.* *) ; foliis ovatis; floribus
congestis, axillaribus, quadrifidis; calyce truncato; fructibus
turbيناتis. *Lam. Enc.* III. p. 600. *illustr. t.* 258. n. 3. *Willd.*
Spec. II. p. 234.

Maxime similis *BUDDLEJAE indicae*. Caules lignosi, ramosi, teretes,
grisei, juniores pubescentes. Folia fere omnia opposita, ovata
s. elliptica, integerrima, nervosa uti in plerisque aliis, 2 poll.
et ultra; poll. lata, supra glabra, subtus leviter pubescentia.
Petioli 1¹/₂-2 lin. Pedunculi fasciculati, simplices et ramosi,
vix longitudinae petiolorum: ramosi, 2-4-flori. Flores peduncu-
lique tomento ferrugineo, uti in ramulis junioribus. Bractea sub
flore ovata, brevissima. Cal. margo truncatus. Cor. tubulosa,
arcuata, 5 lin.; laciniis 4: altera ad dimidium, reliquae ad 1/3
longitudinis corollae. Stam. 4, laciniis breviora, basi earumdem
inserta. Stigma parvum, globulosum. Germen oblongum, tur-
binatum, calyce coronatum. *Desrous.* *In India orien-*
tali. Sonnerat. h.

6. *L. fuscus Blume*; pedunculis axillaribus, subbifidis;
floribus tetrandris; foliis oppositis, obovatis aut ovalibus, basi
acutis, coriaceis, glabris: junioribus infra ferrugineo-lepidotis.
Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 660.

In sylvis primaevae montium Salak, Gede etc. Javae. Blume. h.

7. *L. fasciculatus Blume*; fasciculis lateralibus; flori-
bus tetrandris; foliis oppositis verticillatisve, obovatis: supra
venosis, subtus aveniis, coriaceis, glabris. *Blume Bydr. Fl.*
Nederl. Ind. 661.

Prope Linga Jattie Provinciae Cheribon Javae. Blume. h.

8. *L. umbellifer*; foliis oblongo-lanceolatis, glabris; fas-
ciculis axillaribus lateralibusque, subpubescentibus, trifloris,

*) LORANTHOS in *Enc. meth.* III. p. 595. div. *Desrousseau*, non *Lam-
marck*, descripsit. Nomen ergo *Desrousseau* apponendum fuisse.

subumbellatis; corollâ longissimâ, gracili, 4-fidâ; staminibus 4. *L. umbellatus Wallich* in *Roxb. Fl. Ind. ed. Car. et Wall.* 2. p. 222. *L. flor. fasciculatis*, 4-andr., tubulosis; fol. elliptico-oblongis, acutis. *Don Prodr. Fl. nepal.* p. 145. *Spreng. Cur. post.* p. 140.

Rami longi, graciles, teretes, glabri, rugosi. Folia opposita, acuminata, basi acuta, breviter petiolata, coriacea, 4-6-poll.. Umbellae 3-4-florae, axillares, vel e vestigiis foliorum delapsorum, fasciculatae. Pedunculi quidquam ferrugineo-tomentosi, 3 lin., pedicellos aequantes. Flores fere 2 poll., pubescentes, coccinei. Cal. minutus, inaequalis, obtuse 4 dentatus. Tubus longissimus, gracilis, primum filiformis, curvatus, striatus; limbi laciniis 4, linearibus, $\frac{1}{6}$ tubi partem aequantibus, reflexis, 2 multo profundius fissis. Stamina diffusa. Germen villosum bracteolâ minutâ suffultum. Stylus filiformis, staminibus longior. Stigma clavatum. *Wallich.* Nomen nutandum erat ob antiquiorem *L. umbellatum Heyne* abunde diversum. In montosis Sheopore et Gossain-Than in Nepal. †.

9. *L. ferrugineus Roxb.*; ramis junioribus foliisque ovalibus subtus, pedicellisque, floribusque longis gracilibus regularibus tetrandris, fructibusque ferrugineo-pubescentibus. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall.* II. p. 207. *Jack Malay. Miscell.* I. p. 9.

Rami longi, pendentes. Folia opposita, breviter petiolata, coriacea, elliptica, obtusa, integerrima, supra viridia. Stipulae nullae. Pedunculi fasciculati, 1-4 in singula axilla, 2-6-flori. Bractea squamiformis, parva, ad basin germinis. Cal. margo integerrimus. Cor. extus ferruginea, intus viridis, tomentosa, glabra, tetrapetala, petalis basi, altero latere altius cohaerentibus. Stamina tubo inserta, longitudine limbi. Filamenta plana, profunde purpurea. Stylus longitudine corollae, stigmatate subrotundo. Bacca ovata, ferruginea, 1-sperma. *Jack l. c. Clo. Sprengel* in *Cur. post.* p. 140 varietas *L. vestiti.* In sylvis Pulo-Pinang. *Roxb.*; in Singapore et Sumatra. *Jack.* †.

10. *L. vestitus Wallich*; foliis oblongo-lanceolatis, attenuatis, acutis, convexis: supra glabris, lucidis: subtus dense ferrugineo-tomentosis; floribus fasciculatis, tetrandris, tubulosis, ferrugineo-tomentosis. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wallich* 2. p. 218. *Don Prodr. Fl. nepal.* p. 143.

Parasiticus, ramosus. Rami teretes, fusci, punctati; juniores, folia, petioli floresque tomento denso, molli, ferrugineo, stellato, farinoso. Folia opposita, approximata, oblongo-lanceolata, saepius ovata, 3 poll., subtus obsolete nervosa, margine revoluta. Petioli breves, teretes. Fasciculi numerosi, breviter pedunculati, in axillis foliorum delapsorum, multiflori, dense tomentosi. Flores sessiles, bracteolis parvis, ovatis, acutis. Cal. obsolete 4-dentatus. Cor. cylindrica, apice ante expansionem subglobo, extus ferruginea vel cinnamomea, intus glabra purpurea; limbi laciniis linearibus, reflexis, tubo 8-lin. longo duplo brevioribus. Bacca oblonga, tomentosa. Differt a proximo *L. ferrugineo Roxb.* foliis approximatis, oblongis, attenuato-acutis, supra convexis, omnino lucidis, nec obtusis, planis, remo-

tiusculis. *Wallich.* *In montibus Chandagiri et Sheapore in Nepal.* †.

11. *L. gracilifolius Roxb.*; foliis oppositis, lanceolatis, tenuibus: junioribus stellato-pubescentibus; florum fasciculis 1-3 axillaribus vel ad basin ramorum, foliis brevioribus, 2-4-floris; floribus longe tubulosis, extus tomentosis, arcuatis.

Frutex ramosissimus; ramis oppositis, decussatis, horizontaliter patentibus, teretibus, vix nodosis, glabris, cinerascentibus, ruguloso-punctatis, crassitie pennae gallinaceae; ramulis ramis similibus, patentissimis, junioribus apice tomento albide cinereo. Folia breviter petiolata, erecto-patentia, lanceolata, rarius ovato-lanceolata, utrinque angustata, acutiusecula, vel obtusa, integerrima, adultiora glabra vel pilis raris albidis, sub lente stellatis, juniora utrinque albide stellato-tomentosa; nervo medio subtus prominulo, nervis reliquis parum conspicuis, vix coriacea, sed tenuia, $1\frac{1}{2}$ -3 poll., $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata. Fasciculi 1-3, patentes vel reflexi; pedunculi communes teretiusculi, tomentosi, grisei, 1- $1\frac{1}{2}$ lin., plerumque 4, rarius 2-3-flori; pedicelli brevissimi, angulati, tomentosi. Flores extus cinereo-tomentosi, intus glabri, purascentes (?). Cal. minutissimus, truncatus, obsolete 4-dentatus, tomentosus. Cor. poll.; tubus arcuatus, obsolete angulatus, medio parum dilatatus, facie concava ad basin fere usque longitudinaliter fissus; limbi lacinae 4, reflexae, lanceolatae, apice dilatatae, concavae, obtusiusculae, intus glabrae, 2 fere lin.. Stamina basi laciniarum inserta iisdemque paulo breviora: filamenta fere plana, purpurea; antherae lineares, obtusae, loculis 2 longitudinaliter dehiscentes, polline luteo. Stylus filiformis, purpureus, glaber, longitudine staminum. Stigma capitatum. Germen obovatum, dense albide-tomentosum, bracteâ ovatâ, acuminatâ, tomentosâ, appressâ, germine duplo brevioris suffultum. Ad specimen in Herb. cli de *Martius* ab ill. *Lambert* communicatum. *In India orientali.* †.

12. *L. pulverulentus Wall.*; superne pilosus, farinosus; foliis late-ovatis; petiolis teretibus, gracilibus; racemis laterilibus fasciculatis, tomentosis; floribus pedunculatis, tetrandris; tubo longo, curvo, cylindrico: laciniis 4 brevibus, reflexis, unilateralibus. *Wallich* in *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall.* II. p. 221.

Rami teretes, fusci: juniores racemique tomento denso, farinaceo, stellato, ochroleuco. Folia opposita, coriacea, magna, subinde ovato-oblonga, acuta obtusave, basi rotundata vel subcordata, 5-7 poll., glabra, costâ elevata, nervis obsolete prominulis. Petioli teneres, fere pollicares. Racemi in axillis foliorum deciduorum, 3 poll., floribus numerosis, viridibus, longis, curvis, tubuloso-clavatis, sparsis, dense tomentosis. Pedicelli teretes, 2-3 lin., apice squamâ exiguâ, parvâ, ovatâ. Cal. vix discernendus. Cor. $1\frac{1}{3}$ poll., curva, intus glabra, limbo clavato, $\frac{1}{2}$ longitudinis tubi, 4-fido: laciniis linearibus, unilateralibus, 2 profundioribus. Antherae 4 conniventes, laciniis parum breviores. Germen ovatum, farinosum. Stylus filiformis. Stigma minutum, capitatum, scabrum, supra antheras emergens. Bacca magna, farinosa, clavata. *Wall.* *Circa Hetounra et ad ripas Rapti in Nepal.* †.

13. *L. cordifolius Wallich*; farinoso-villosus; foliis ovato-cordatis, obtusis; racemis fasciculatis: floribus tubulosis, 4-fidis, tetrandris. *Roxb. Fl. Ind. ed. Car. et Wallich 2. p. 222. Don Prodr. Fl. nepal. p. 143.*

Rami teretes, cinerei, villosi, punctati, juniores, uti omnes plantae partes graciliores, tomento denso, pallide-ferrugineo vel albido, stellato. Folia opposita, late-ovata, basi rotundato-cordata, subinde tantum retusa, 4-poll., utrinque villosa, adultiora glabriuscula; sicca nervosa. Petioli teretes, poll.. Racemi axillares, subsessiles, villosi. Pedicelli breves. Cor. poll., clavata, villosa; limbo 4-fido, brevi: laciniis lanceolatis. *Wallich. In Shreenagur Kamroop. h.*

14. *L. Wallichianus*; glaber; foliis subalternis, ovatis, obtusis, basi acutis; racemis breviter pedunculatis, axillaribus, oppositis, solitariis binis ternisve fasciculatis circa basin ramorum, folio brevioribus; floribus parvis, longe pedunculatis, adscendentibus, tetrapetalis, tetrandris; baccis globulosis, reflexis. *L. polystachyus Wall. in Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall. II. p. 217. Spreng. Cur. post. p. 140. L. tetrandrus Heyne: Courtallum Herb. Heyn.*

Species magna, ramis gracilibus, teretibus, punctatis. Folia 5-4 poll., 2½-5 poll. lata et ultra, plerumque alterna, sicca reticulata et venosa, breviter petiolata. Racemi numerosi, 2-5 poll., rhachi gracili. Pedicelli 3 lin., bracteâ parvâ, ovatâ, obtusâ, concavâ, gibbâ, persistente, germen ambiente. Flores parvi, 4 fere lin., cylindrici, primum erecti, dein patentes. Petala 4-linearî-cuneata. Stigma capitatum. *Wall. ad specimen in Herb. Heyn.. Nomen mutandum erat, quia ambo prius usitata. Patria? h.*

15. *L. atropurpureus Blume*; racemulis confertis, axillaribus; floribus tetrandris; foliis oppositis, ovalibus, obtusis, subtus leprosis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 660. Blume l. c.*

Variat foliis basi rotundatis et attenuatis. *Blume. In regionibus cultis supra arbores circa Bataviam, Buitenzorg, Tjikao etc. h.*

16. *L. lepidotus Blume*; racemulis confertis, axillaribus; floribus tetrandris; foliis suboppositis, ovalibus, subtus ferrugineo-lepidotis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 660.*

Cum brevi hac adumbratione *L. lepidoti* omnino convenit *L. melanostemon Reinwardt ex Java in Herb. cli de Martius.* Ramus strictus, teres, basi fusco-cinereus, glabriusculus, punctatus, apice ferrugineo-tomentoso-lepidotus. Folia opposita et subopposita, petiolata, ovata, utrinque obtusa, integerrima, coriacea, nervosa, superne viridia, tomento ferrugineo stellato deciduo, subtus dense tomentosa cum squamulis minutis, ferrugineis, praesertim ad nervum medium subtus prominentem, 1½-2½ poll., 1-1½ poll. lata. Petioli teretiusculi, supra canaliculati, ferrugineo-lepidoti, 4 lin.. Racemuli e foliorum axillis, 2-5, erecti, patentes vel reflexi, breviter pedunculati, pauciflori, foliis plus quam duplo breviores. Flores 3-5, pedicellati, sparsi

oppositique, extus ferrugineo-tomentosi. Pedicelli erecto-patentes, $\frac{1}{2}$ - 1 lin., ferruginei, articulati. Bractea ad basin germinis minuta, ovata, obtusa, appressa, tomentosa. Calyx margo minutissimus, integer, tomentosus. Cor. inexpansa, ut videtur, tubulosa, clavata, 4-fida, 2-6 lin.. Stamina 4, tubi fauci inserta, nigricantia, corollâ vix breviora; antheris parvis, oblongis. Stylus stamina paulo superans, nigricans vel atropurpureus (?) sulcatus, stigmathe subcapitato. Germen obovatum, parvum, ferrugineo-tomentosum, serius excrescens, clavatum, apice rotundatum, basi angustatum, 3 lin.. Alterum specimen: ramis oppositis, sat validis, $1\frac{1}{2}$ ped., crassitie pennae anserinae; foliis paulo majoribus; corollis tubulosis, 7-8 lin., uno latere ad medium usque fassis: laciniis omnino reflexis, lanceolatis, concavis, acutis; tubo vix curvato, fauce quidquam angustato, extus ferrugineo lepidoto, vidimus in herb. mus. monac. nomine L. *leprosi* ex Java missi. In sylvis altioribus Javae. h.

17. L. *obovatus* Blume; racemulis confertis, axillaribus; floribus tetrandris; tubo corollae elongato; foliis suboppositis, obovatis, glabris. Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 663. Circa Linga Jattie ad pedem montis Tjerimai in Java. Blume. h.

18. L. *ligustrinus* Wallich; junior et inflorescentiâ villosus; foliis lanceolatis, acuminatis, glabris; racemis multifloris; corollis 4-angularibus, 4-petalis, tetrandris. Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall. 2. p. 219. L. racemis subumbellatis, etc. Don. Prodr. Fl. nep. p. 145.

Rami subfasciculati, cortice cinereo, glabriusculo; ramulis junioribus villosiusculis, punctatis. Folia opposita alternave, attenuato-acuta, 1-2 poll., coriacea, venosa. Petioli breves. Racemi subumbellati, axillares, 2-3, foliis breviores; floribus villosis, parvis, subsessilibus, intus profunde rubris, extus pallide carneis. Cal. minutissimus, integer. Cor. 6 lin. longa; petalis linearibus, patentibus, ad medium in tubum 4-angularem, quidquam ventricosum convergentibus, intus sulcatis. Filamenta 4 rubra, ad petalorum basin inserta. Germen ferrugineum, villosum, bracteolâ ovali suffultum. Stigma purpureum, sub-4-gonum. Wallich. In sylvis et nemoribus montium valliumque in Nepal.

Obs. Cum hoc plurimis convenit specimen e Nepalia in herbario cli de Martius asservatum et ab illo Lambert communicatum. Rami teretes, glabri, juniores apice ferrugineo-tomentosi, vetustiores cinerei punctati. Folia alternata, breviter petiolata, ovato-lanceolata, acuminata, basi attenuata, integerrima, coriacea, glabra, suprema ferrugineo-tomentosa, nervo medio subtus prominente, obsolete venosa, 1-3 poll., $\frac{1}{3}$ - $1\frac{1}{3}$ poll. lata. Petioli 2 fere lin., supra plani, dorso convexi, glabriusculi vel ferrugineo-tomentosi. Racemi e foliorum axillis, foliis 2-3-plo breviores, plerumque gemini, altero minori paucifloro, patentes, pedunculati. Pedunculi communes crassi, teretiusculi; juniores ferrugineo-tomentosi, serius glabri, 4-5 lin.; pedicelli lin., horizontaliter patentes, 1-flori, caeterum pedunculis similes, bractea ovato-cucullatâ, obtusiusculâ, appressâ, ferrugineo-tomentosâ, germine breviora. Calyx minutissimus, obsolete dentatus, ferrugineus. Cor. 3 fere lin., ferrugineo-tomentosa, ante anthesin 4-gona, basi apiceque incrassata; expansa ad basin usque 4-fida: laciniis linearibus basi et apice paulo latioribus, obtusis, medio reflexis. Stamina corollâ breviora. Filamenta erecta, corollae laciniis sub medio inserta, purpurea (?). Antheras lineares, obtusae, rubescentes. Stylus stamina paulo superans, tetragonus; stigmathe capitato, purpureo. Germen ovatum, ferrugineo-tomentosum.

19. L. *rugulosus* Roth; foliis oblongis, ellipticis, obtu-

sis, glaucis, ruguloso-reticulatis, margine laevi, cartilagineo; racemis axillaribus oppositis; pedicellis unifloris; corollis tubulosis, arcuatis, tetrandris. *Roth nov. spec. p. 194.*

Innominata in Collectione plantarum Heynii. Caulis teres, griseus, glaber, articulatus, ad nodos parum dilatatus et subcompressus. Folia opposita, rarius alterna, brevissime petiolata, integerrima, coriacea, crassiuscula, glabra, rugulis tenuissimis, costata, obsolete venosa, margine nitido, fuscescente; per siccitatem undulata, 3 fere unc., unc. lata. Racemi vix pedunculati, stricti, digiti minimi longitudine, multiflori. Flores atropurpurei, alterni. Pedicelli solitarii, retorti, $1\frac{1}{2}$ lin., nudi. Bractea calycem arcuato amplectens illoque brevior, orbiculata, concava. Cal. truncatus, subobliquus, hinc denticulo minimo auctus, lin. longus. Cor. glabra, fere $1\frac{1}{2}$ unc.; tubus cylindraceus, circa medium parum dilatatus et arcuatus; limbi lacinae 4, lanceolatae, obtusae. Stam. longitudine fere laciniarum limbi. Filamenta brevia, fauci inserta. Antherae lineares. Stylus filiformis. Stigma subincrassatum, obtusum. *Roth. In India orientali. h.*

20. *L. lucarquensis Humb. et Bonpl.*; foliis elliptico-subrotundis, acutis, basi rotundatis, submembranaceis, glabris; racemis axillaribus et terminalibus, paucifloris; floribus subsessilibus, sparsis, tetrapetalis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 440. n. 18.*

Frutex parasiticus, ramosissimus, glaberrimus, ramis teretibus, striatis? Folia obsolete venosa, nervo medio subtus prominente, pollicaria, 9-10 lin. lata. Petioli 4-5 lin.. Racemi solitarii, 3 lin., rhachi angulata, glabra. Flores minuti, brevissime pedicellati, sparsi, $1\frac{1}{2}$ lin.. Cal. margo obsolete. Petala albo-flavescentia, glabra, oblonga, acuta, subconcava, patula. Stam. alterna breviora?, longitudine styli; stigma subcapitatum, 4-sulcatum. Bacca minuta, ovata. *In temperatis Peruviae prope Lucarque. h.*

21. *L. salicifolius Mart.*; dioicus (?); ramis superne compresso-tetragonis; foliis oppositis, lanceolatis, acuminatis, glaucis, coriaceis; racemis solitariis, axillaribus, folio triplo brevioribus; ramulis brevibus, trifloris; floribus sessilibus, bracteatis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami erecto-patentes, inferne teretes, glaucescentes. Folia erecto-patentia, basi attenuata, juniora margine fere suberoso, nervosa, 2-3 $\frac{1}{2}$ poll., 9-11 lin. lata. Petioli canaliculati, marginibus fere suberosis, 3-4 lin.. Racemi erecti, 7-12 lin., juniores subgloboso-glomerati; pedunculus basi teretiusculus, flores inter angulosus; ramuli patentes, $\frac{1}{4}$ lin.. Bractee 3 ovatae, cucullatae: laterales obtusae, media acuta $\frac{1}{2}$ lin.. Flores in specim. nostris masculi, tetrapetali, lin., in expansi mox supra basin incrassati. Cal. denticulatus, obsolete. Pet. 4, lineari-lanceolata. Stam. 4 petalis breviora; filamenta brevissima, 2 longiora; antherae rotundato-ovatae, flavae. Stylus o. hujus loco rudimentum parvum subovatum. *In campis Ta-boleira prov. Minas Geraës Brasiliae. h.*

22. *L. coccineus Jack*; floribus spicatis, tetrandris; spi-

cis axillaribus, erectis; foliis subovatis, glabris. *Jack Malay. Miscell.* 1. 8. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall.* II. p. 215.

Rami longi, viminei. Folia alterna, petiolata, oblongo-ovata, subcordata, apice attenuata, obtusa, integerrima. Petioli breves. Spicae solitariae geminae, foliis longiores: flores sessiles, ante expansionem rhachii arcte adpressi. Bractea solitaria, parva, ferruginea ad basin floris singuli. Cal. subintegerrimus, vix dentatus. Cor. coccinea, tetrapetala, erecta, tubulosa: limbo patente; petala fere linearia, basi latiora. Stamina rubra, erecta, medio petalorum affixa horumque longitudine. Antherae oblongae, adnatae, rubrae. Stylus ruber, erectus, staminibus vix longior. Stigma obtuse capitatum. Bacca ovata, apice elongata, semine unico testâ durâ tetragonâ inclusum, apice glutini immersa. Embryo inversus. Affinis *pentapetalo Roxb.* habitu et inflorescentiâ. *Jack l. c.* Circa *Singapore*. h.

Obs. Plurimis cum hoc convenit *Lor. erythrostachys* in *Herb. cli de Martius* asservatus et ab illo. *Lambert* communicatus: differt tamen fol. oppositis; petiolis 6-7 lin.; specimen nimis incompletum, quam ut aliquid certi statuere liceret.

23. *L. tetrandrus Ruiz et Pav.*; floribus aggregato-umbellatis, tetrandris; bractea tripartitâ, ciliatâ; foliis ovatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv.* 3. p. 46. t. 275. *Smith Rees Cyclop.* Periclymenum, fol. acutis, floribus profunde dissectis, vulgo *Ytiu. Feuill.* p. 760. t. 45. *LORANTHUS corymbosus Desr.* in *Lam. Enc.* III. p. 599. *LONICERA corymbosa*; corymbis terminalibus; foliis acutis. *Linn. Spec.* I. p. 249. *Willd. Spec.* I. p. 990. *Linn. Syst. Veg. ed. nostr.* T. V. p. 259. (ubi delenda). *FRÖLICHIA violacea Spreng. S. V.* 1. p. 406. (quatenus *L. corymbosa* L.).

Frutex parasiticus, ulnaris. Caulis ramosus, teres; rami patentes, oppositi et suboppositi, altero saepe abortivo, teretes; teneri pubescentes, ferruginei. Folia opposita et subopposita, breviter petiolata, ovata, acuta obtusaque, rotundata, integerrima, parum venosa, utrinque glabra. Petioli pubescentes. Pedunculi ex axillis superioribus petiolis vix longiores, 7-12-flori, teretes, erecti, pubescentes. Calyx: fructus lateralis, tripartitus, brevis; laciniis ovatis, ciliatis, intermediâ majori; floris parvus, 4-crenatus. Cor. profunde 4-fida, rarius 5-fida, croceo-punicea. Filam. 4, nunquam 5, quamquam corolla 5-fida, subulata, lutea. Antherae flavae. Baccae ovales. Cor. rarissime 3-fida, et tunc calyx inferus 4-partitus. *R. et Pav. Specimen in Herb. de Martius*, lecto ab *Eschholz* in Chili, exactissime quadrat: frutex ramis junioribus ad foliorum ortum compressis: adultioribus fusco-cinereis, pube tenui, ferrugineo-punctatis; junioribus subferrugineo-tomentosis. Folia approximata, obtusa, rarius acutiuscula, glabra, vel basi ad nervum medium margineque quidquam pubescentia, coriacea, nervo medio basi tantum prominente, patentia vel recurva, pollicis vel paulo ultra, poll. lata: e foliorum axillis gemmula parva, pubescens, subpungens. Petioli 1-2 lin., supra plani. Flores in apicibus ramorum numerosi, dense racemoso-umbellati. Pedunculi uniflori, 3-4 lin., glabri, subinde pilis sparsis. Cal. brevis, acetabuliformis, obsolete 4-dentatus, glaber vel ad marginem pilis raris, glandulosis. Bracteae ad basin germinis 3, ap-

pressae, acutae, concavae, fuscae, pilis flavis glandulosis ciliatae. Cor. $1\frac{1}{2}$ poll., ante anthesin inferne in tubum acute tetragonum, angulis basi denticulatis, connata, apice oblonge dilatata, obsolete tetragona; post anthesin ad basin fere usque fissa in lacinias 4 lineares, glabras, basi dilatatas, carinatas, apice in lanceolam concavam desinentes, reflexas. Filamenta medio laciniarum affixa, apice subulata, corollâ paulo breviora. Antherae dorso infra medium adhaerentes, lineares, obtusiusculae, basi emarginatae, 2 lin.. Stylus filiformis, tetragonus, stamina corollamque superans, coloratus; stigmatе parvo, subcapitato, glabriusculo. Bacca calyce coronata, ovata, bracteis suffulta, glabra, fusca, 5 lin.. Semen 1, ovatum, compressiusculum, fuscum. Ad tingendum colore nigro inserviunt. *In regni chilensis sylvis.* h.

24. *L. luzonensis Presl*; ramis verticillatis, teretibus, nodosis; foliis 3-4 verticillatis, sessilibus, ellipticis, obtusis, glabris, coriaceis; cymis corymbosis terminalibus; pedunculis, bracteis, calycibus corollisque pubescentibus. *Reliqu. Haenk. ined.*

Divaricato-ramosissimus; ramî ramulique 3-6 verticillati, saepius plures decidui et ramî subdichotomi, omnes teretes, valde nodosi et ad nodos articulati, crassitie pennae anserinae ad penam corvi usque; cortice glabro, cinereo vel cinereo-fusco, verruculis numerosis, parvis, fuscis. Folia erecta vel patentia, internodiis breviora longioraque, inaequalia, plura saepius deformia et minora, plerumque elliptica, obtusa, basi quidquam angustata, utrinque glaberrima, enervia, sicca subtus ferruginea, 10-15 lin., 6'-8'-lin. lata. Cymae solitariae, e centro summi foliorum verticilli, erectae, rarius deflexae. Pedunculus communis gracilis, teres, 6-9 lin., tenuiter pubescens, siccus fascescens, 6-multiflorus. Rami vel cymae radii 3 vel numerosi, erecto-patentes, teretes, triflori, pube densâ brevi fusciscente, 1-2 lin.. Flores breviter pedicellati, erecti, medius pedicello paulo breviori. Bractee ad germinis basin solitariae, ovatae, acutae, concavae, germini subappressae eoque duplo breviores, integerrimae, fusco-pubescentes, $\frac{1}{2}$ lin.. Cal. margo acetabuliformis, subinteger, pubescens, $\frac{1}{2}$ lin.. Cor. 14-15 lin., extus tenuiter pubescens, intus glabra, ut videtur olim coccinea, ad basin usque 4-partita vel 4 petala, petala vero 2 plerumque connata, ut corolla in 2 partes erectas, apice bifidas, fissa videatur; ad 13 lin. erecta, dein reflexa. Stam. 4, corollâ paulo breviora, aequalia; filamenta petalis ibidem inserta, ubi reflectuntur, plana, crassa, glabra, $1\frac{1}{2}$ lin.; antherae parvae, erectae, oblongae, flavae. Stylus staminibus paulo longior, gracilis, filiformis, glaber. Stigma obsoletum, truncatum. Germen oblongum, basi angustius, fusco-pubescentis, lin. longum. *In insula Luzon. Haenke h.*

b. Flores pentandri:

1. inflorescentiâ axillari.

25. *L. glaucus Thunb.*; pedunculis axillaribus, unifloris; foliis ovatis, glaucis. *Thunb. prodr.* 58. *Willd. Spec. II. p.* 233. *Thunb. Fl. cap. ed. Schult.* p. 295. Frutex erectus, teres, glabriusculus, pedalis et ultra. Rami sparsi,

breves, pauci. Folia subpetiolata, alterna, obtusa, integra, rore glauco utrinque tecta, unguicularia. Petioli $\frac{1}{2}$ lin.. Flores axillares, pedunculati, erecti: pedunculi 2-3 pluresve, lineam longi. Cor. cylindracea, 5-partita, pulverulenta, pollicaris. Filamenta 5. Bacca calyce persistente coronata, ovata, pulverulenta. *Thunb.* In *Promont. b. spei, in Saldanhabay.* h.

26. *L. cuneatus Heyne*; foliis alternis, cuneiformibus, obtusis; pedunculis axillaribus, subternis, petiolum subaequantibus; corollis tubulosis, subarcuatis, pentandris. *Roth nov. spec. p. 195.*

Cl^s *Roth* huc quidem cum? ducit *L. cuneifolium Ruiz et Pav.*; et in *obs.* addit non diversum videri *cuneatum Heyne* a *cuneifolio*: attamen nobis ex descriptione abunde distinctus videtur. „Caulis cum ramis teres, glaber, cinereus, punctis elevatis parum exasperatus, tuberculis alternis valde nodosus. Folia obovata, basi in petiolum brevem attenuata et decurrentia, apice rotundata, obtusissima, glabra, integerrima, costata, venosa, unc. paulo longiora, nunc breviora. Pedunculi 1-2-3, uniflori, nudi. Bractea cordato-subrotunda, concava, ciliata, calycem basi arcte amplectens illoque brevior. Cal. parvus, truncatus, villosus, margine subscariosus, ciliatus, subinteger vel obsolete crenatus. Cor. 4 fere lin., extus punctata, vix pubescens; tubus basin versus subincrassatus, sursum cylindraceus, subarcuatus; limbi lacinae 5 oblongae, obtusae, patienti-reflexae. Filamenta brevissima, fauci inserta. Antherae lineares, limbo paulo breviores. Stylus filiformis. Stigma obtusum.“ *Roth. - In India orientali. Heyne.* h.

27. *L. tomentosus Heyne*; foliis alternis, suborbiculatis, basi subcuneatis: junioribus tomentosis; pedunculis subtrifloris, axillaribus; corollis pentandris, tubulosis, arcuatis, villosis: tubo rimâ longitudinali dehiscente. *Roth nov. spec. p. 191.*

Rami teretes, grisei, pubescentes, alterni, juniores tomentosi. Folia costata, venosa, integerrima, punctis elevatis subaspera, ad costas purpurascens, 2 unc. longa lataque; juniora tomento denso ferrugineo. Petioli fere 3 lin., teretiusculi, pubescentes. Pedunculi solitarii, 2-vel 3-flori, longitudine petiolorum, tomentosi. Bracteae obovatae, obtusissimae, 2-3, floribus approximatae, subtus praesertim tomentosae, sessiles, vix ultra 2 lin.. Calyx minimus truncatus, dense tomentosus. Corolla fere $1\frac{1}{2}$ unc., densissime villosa, in medio parum dilatata, parum arcuata, utrinque attenuata, a fauce ad basin latere incurvato rimâ longitudinali subhians; lacinae 5, lineares, patientes, extus villosae. Filamenta fauci constrictae inserta. Antherae longitudine laciniarum corollae, lineares, erectae. Stylus corollam superans, ferrugineus, filiformis. Stigma obtusum. Fructus? Ob corollam rimâ longitudinali hiantem accedere videtur *Scaevolis*, quibus etiam staminum numero respondet. At non totus tubus, sed ex parte tantum dehiscit, nec genitalia exserit, nec corollae limbus inde secundus, nec stigma indusio ciliato auctum. Filamenta fauci, nec receptaculo inserta. *Heyne. In India orientali.* h.

28. *L. Reinwardtianus*; pedunculis confertis, (subumbellatis), axillaribus, 1-floris; floribus 5-andris; tubo corollae

longissimo, clavato; foliis oppositis, oblongis, utrinque attenuatis, coriaceis, subtus aveniis. *L. coccineus* Herb. Reinw. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 664.*

Nomen mutandum ob tetrandrum *coccineum* Jack. In specimine in herb. de Martius a Reinwardt lecto: Fruticulas ramis ternis, patentibus erectisque, glabris, teretiusculis, ad foliorum ortum subcompressis, cinereis, junioribus fuscis, crassitie pennae corvi ad pennam gallinaceam usque. Folia inferiora alterna, superiora opposita, oblonga vel ovato-oblonga, acuta, basi in petiolum brevem, supra planum, subtus convexum attenuata, erecto-patentia, utrinque glaberrima, supra nervis obsoletis, subtus avenia, nervo medio paulum prominente, $2\frac{1}{2}$ -4 poll., 1-2 poll. lata. Pedunculi e foliorum axillis 3-8 erecti, intense colorati, teretes, glaberrimi, crassiusculi, basi paululum incrassati, 5 circiter lin., longitudine circiter petiolorum. Calyc acetabuliformis, truncatus, integer, glaberrimus, coloratus, 2 fere lin., basi bracteis 5 ovatis, acutis, integerrimis, glabris, patentibus, fuscis (?), calyce 3-4-plo brevioribus. Flores fructusque desunt. *In sylvis montosis Javae. Reinw. et Blume. h.*

29. *L. involucratus* Roxb.; foliis oppositis, ovato-cordatis ovatisque, glabris; umbellis axillaribus; involucris tetraphyllis, quadrifloris; floribus regularibus, pentandris. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall. II. p. 208.*

Rami juniores cortice glabro, lucido, obscure fusco (in speciminibus e Silhet pilis mollibus pallide ferrugineis, uti involucria Wall.). Folia breviter petiolata, saepe inaequilatera, integerrima, 3-4 poll. Umbellae subsessiles, aggregatae, foliis breviores: involucri foliolis glabris, integerrimis. Flores sessiles, sat magni, longitudine involucri. Cal. superior brevis, 5-dentatus, villosus. Cor. fauce tubi ampliata, villosa; limbo regulari, 5-partito: laciniis linearibus, revolutis. Filamenta longitudine laciniarum corollae, iisdem medio inserta. Antherae ovaes. Germen ovatum, sericeum. Stylus corollam quidquam longior: stigma bilobum. *In finibus Bengaliae orientalis; Roxb.; in Silhet, Wallich. h.*

30. *L. Heyneanus*; tomento cinereo stellato; foliis parvis, obovatis, obtusis, basin versus attenuatis, alternis, longius petiolatis; umbellis axillaribus; calyce 5-dentato, bracteam magnam linguiformi suffulto; corollam clavata, elongata; staminibus 5. *L. bracteatus* Heyne in *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall. II. p. 221. Spreng. Cur. post. p. 141.*

Rami teretes, punctati, aetate glabrescentes. Folia alterna, vix pollicaria, plerumque adhuc minora, subinde subrotunda. Petioli graciles, longiusculi. Umbella 5-flora, dense villosa. Pedicelli $\frac{1}{3}$ poll.; bractea $\frac{1}{2}$ poll. Cor. fere $1\frac{1}{2}$ poll., gracilis, basi cylindrica, sursum dilatata, fauce coarctata: laciniis 5, linearibus, unilateralibus, tubo multo brevioribus. *Wallich ad specim. in Herb. Heyn. — Nomen mutandum, cum jam duo sint bracteati americani. In India orientali? h.*

31. *L. clavatus* Desrouss.; foliis ovatis, obtusis; floribus congestis: lateralibus, subsessilibus, longe tubulosis. *Lam. Enc. III. p. 598. Willd. Spec. II. p. 254.*

Caules teretes, ramosi, subdichotomi, cortice cinereo albidove. Folia opposita, integerrima, satis crassa, glabra, sine nervis manifestis, subtus ferruginea, subinde quasi violacea, margine revoluta, 2 - 2½ poll., 15 - 18 lin. lata. Petioli 2 - 3 lin.. Flores axillares, aut in ramis circa articulos. Pedunculi simplices, fasciculati, vix 1½ - 2 lin.. Membrana irregularis extus sub flore. Cal. dentibus 5 obtusis. Cor. tubulosa, angusta, arcuata, 1½ poll., apice clavata et in lacinias 3 concavas, parum profundas, divisa: laciniarum harum 2 interdum latiores, bifidae. Stam. 5. Stigma capitatum, corollâ quidquam altius. Fructus ovatus, brevis, calyce coronatus. *Desrouss.* In *Madagascar, Martin; in Pondicheri, Commerson Herb.* †.

52. *L. elasticus Desrouss.*; pentander; foliis sessilibus, ovatis, acutis, nervosis; corollis junioribus medio fenestratis. *Lam. Enc. III. p. 599.* et, hoc teste: *Velutta itti-canni Rheede Hort. Mal. V. p. 7. t. 3.* (sphalmate t. 4.). *L. corymbis axillaribus; floribus pentandris, nutantibus (?); foliis oblongis, utrinque attenuatis, nervosis. Willd. Spec. II. p. 552.* *L. glaber; ramis columnaribus, crassis, breviter articulatis; foliis sessilibus, valde crassis, ovatis, subacutis, obsolete 5-nervibus; floribus subsessilibus, circa genicula fasciculatis, 5-andris; tubo cylindrico; limbo ante expansionem rostrato; laciniis linearibus, longis, a basi sursum dehiscentibus. Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall. II. p. 217.*

Rami foliis oppositis vel subalternis, subacuminatis, densis, obscure viridibus, subtus nervis pluribus longitudinalibus, parum prominulis. Flores circa articulos congesti, plus minus numerosi, ut videtur, sessiles. (Pedunculi breves purpurascens. *Rheed.*) Corollae longe tubulosae, primum virentes, serius basi rufescentes, apice albicantes, erectiusculae, demum profunde divisae in lacinias 5 angustas, elastice replicatas. Lacinae hae medio se primum findunt, et sese ab invicem separant, ut ibidem foramen rotundum appareat: attactu tunc levissimo dehiscunt lacinae ex integro. Stamina 5 (rubra, antheris longis e viridi flavicantibus. Stylus tenuis, ruber. *Rheed.*). Stigma capitatum. Baccae ovato-rotundatae, 1-spermae, purpureae (cuspidate oblongo, purpureo-rubro. *Rheed.*) *Desrouss.* Folia etiam tri- et triplinervia. *Wall.* Ad littora *Malabariae.* †.

53. *L. coriaceus Desrouss.*; pentander; foliis ovalibus, oblongiusculis, subsessilibus; floribus ad axillas racemoso-capitatis. *Lam. Enc. II. p. 597.* (excl. synonym.) *Sprengel* sine dubio junxit cum *loniceroidem.*

Div. *Desrousseau* cum? huc duxit *L. loniceroidem Linn.* cum tota synonymia, et discrepat sane descriptio sua a planta *Rheedeana.* „Tota“ ait „glabra. Caules teretes, foliosi. Folia nunc opposita, nunc alterna, subsessilia, obtusiuscula, integerrima, coriacea, crassa, nitida, saturate viridia, nervis aliquot obliquis, 3½ - 4 poll., 2 poll. lata. Racemi laterales brevissimi. Cal. minimus. Cor. tubulosa, subarcuata, pollicaris, apice in lacinias 5 angustas, parum profundas, apice reflexas divisa. Stam. 5, longitudine corollae. Antherae flavicantes.“ *Desrouss.* ex *Herb.*

Commerson. ubi *Glutinago*. Confer *loniceroidem*. In India orient. *Sonnerat.* h.

54. **L. loniceroides*; floribus aggregato-capitatis. *Linn. Spec.* p. 473. *Mant.* p. 369. *Willd. Spec.* II. p. 236. *L. pedunculis* multifloris; involucris pentaphyllis; foliis ovato lanceolatis, petiolatis. *Fl. zeyl.* 33. *Pluk. Alm.* 287. t. 212. f. 5. *Itti Canni Rheed. Mal.* 7. p. 55. t. 29.

Flores huic saepius pentandri. *Linn.* In Asiae arboribus. h.

Obs. *Cls. Wallich* in *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall.* II. p. 217. sequentem *L. lonicerioidis* diagnosin dedit: „Glaber; foliis ovatis lanceolatisque attenuatis, obtusis, basi rotundatis; pedunculis oppositis petiolo longioribus; floribus capitatis, sessilibus, hexandris: capitulo singulo bracteis 4 lato ovatis, acutis, concavis; corollâ gracili, tubulosâ, longâ: limbo irregulari, 5-fido, lobis cuneatis, patentibus,“ additque, praeter omnem descriptionem: „Specimina *L. coriacei Lam.* in *Herb. Heyne* satis bene quadrare cum descriptione data in *Lamarck Enc.*; sed differre ab *Itti Canni*, cui flores polyandri, barbati. *Pluckeneti Periclymenum surrectum Persicae foliis Almag.* 277 t. 242 f. 5. huc ductum MORINDAM potius videri. *L. umbellatum Heyne* in *Roth nov. pl.* p. 192 differre praecipue petiolis decurrentibus, cum in suo *lonicerioides* simplices.“ Dubia ergo ex *Wallich* et *Linnaeo* planta *Lamarckiana* a *Desrousseaux* descripta. *Itti Canni* apud *Rheede*: frutex ramis 4-angularibus, geniculatis, cinereis. Folia e geniculis oblongo-rotunda (in icone ovata, longe acuminata), coriacea, rigidiuscula, fragilia, trita grate odora, subamara. Petioli longi, crassi, intus plani. Flores in petiolum axillarem conferti, flavi, 5-petali; tubo oblongo, flavo, intus subtilissime flavo-lanuginoso. Stamina plura, flava, tenuia sine apicibus: quaedam vertice bifida. Gemmae florum oblongae, ex una parte nonnihil inflexae, vertice obtusiori, coloris flavi. Fructus rotundi, globosi, vertice angustati, viridi-flavi, medio excavati; nucleo rotundo, albo, parvo, amaro. An reverâ LOBANTHUS?

55. *L. Koenigianus Ag.*; racemis axillaribus; floribus nutantibus; foliis ellipticis, venosis. *Agardh* in litt. ad div. *Römer.*

Specimini in *Herb. Retz.*, sub nomine *L. loniceroidis* a *König* misso, rami cortice laevi; folia inferiora subopposita, superiora alterna, interdum etiam opposita, omnia breviter petiolata, integerrima, glabra, venis subsimplicibus. Racemi axillares, digitales. Pedicelli unguiculares, deflexi. Calyculus monophyllus, e squama unica laterali, late ovata. Cal. truncatus, obsolete dentatus. Cor. 1½ unc., clavata. A *L. lonicerioides* differt: floribus racemosis; a *longifloro* floribus racemosis foliisque late ellipticis; a *pentandro* fol. oppositis, venosis; racemis petiolo multo longioribus. *Ag.* In India orientali. *König.* h.

56. *L. sessilifolius Pal. d. Beauv.*; foliis oppositis, sessilibus, ovato-rotundatis, basi cordatis; floribus axillaribus. *Palis. d. Beauv. Fl. d'Oware* II. p. 8. t. 63. *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 499.

Rami simplices, elongati, glabri, teretes. Folia LONICERAE *Capri-folii*, obtusiuscula, glabra, crassa, approximata, integerrima, poll., ¾ poll. lata. Flores verticillati, 9-12-ni, subsessiles, deflexi, poll., sordide rufi, cylindrici, basi angustati; calyce 5-dentato; corollâ tubulosâ, 1⅓ poll.; limbo brevi, subrevolutato, 5-fido, flavescente. Stam. 5, laciniis calycis opposita. Stylus corollâ longior. Bacca carnosâ, 1-sperma, calyce inclusa. *P. d. Beauv. et Poir.* In Koto ad Oram Benin. h.

57. *L. lanceolatus Pal. d. Beauv.*; ramis simplicibus; foliis suboppositis alternisque, crassis, petiolatis, ovato-lan-

ceolatis; floribus axillaribus, numerosissimis. *Pal. d. Beauv. Fl. d'Ow. II. t. 64. Poir. Enc. III. p. 498.*

Rami teretes, fusci. Folia brevissime petiolata, acuta, carnosae, basi subcordata, integerrima, glabra, reticulato-venosa, 3-4 poll., basi $2\frac{1}{2}$ poll. lata. Verticilli axillares, 12-18 flori. Flores sessiles, deflexi, subverticillati, penduli, cylindrici, $\frac{2}{3}$ poll., (poll. *Poir.*) sordide fuscescentes. Cal. uterque 5-dentatus. Cor. tubulosa; limbi laciniis 5 angustis, revolutis, flavescenti-viridibus. Stam. 5 inclusa. Stylus corollâ longior, stigmate crasso ovato. Baccaglobulosa, carnosae. *P. de Beauv. et Poir. Chamae in Africa. t.*

38. *L. pentapetalus Roxb.*; foliis oppositis, lanceolatis ovato-cordatisque, oblique attenuatis, glabris; racemis axillaribus; floribus pentandris; petalis 5 basi dilatatis, triangularibus. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall. II. p. 211.*

Grandis, ramosus, ramis ramulisque columnaribus, glabris. Folia petiolata, integerrima, glabra, 3-4 poll., 2 circiter poll. lata. Racemi axillares, solitarii geminive, recti, simplices, saepius longitudine foliorum, glabri. Flores numerosi, breviter pedicellati, parvi, sparsi, rubri. Bractea oblique ovata extus germen amplectens. Cal. exiguus, subintegerrimus, glaber. Petala 5, basi corpore carnosae, trigono (unde corolla basi globosa, parvumque pro stylo foramen) apice linguiformia, recurva. Filamenta 5 petalis inserta, antheris obovatis. Germen oblongum, 1-loculare. Stylus tetragonus, medio articulatus. Stigma quidquam dilatatum. Baccâ oblonga, glabra, viridi-flava. *Roxb.* Rami juniores alternatim compressi. Folia coriacea, supra lucida, quidquam vasculosa, subtus pallidiora, costâ carinata fuscescente, margine purpurascencia inaequalia. Petioli graciles, sulcati, $\frac{1}{2}$ poll.. Racemi 6-8 poll., saepe 2-3 in axilla, cylindrici, crassitie digiti minoris, toti coccinei, breviter pedunculati, carnosae, primum erecti, dein patentes, subinde ad basin foliolo florali. Rhachis crassa, carnosae, obsolete angulosa. Flores ante expansionem cylindrici et rhachi paralleli, dein patentes, 5-lin. circiter. Filamenta subulata, basi ad medium usque petalis affixa, hisque fere breviora. *Wall. In Silhet Roxb., Nepal. Wall. t.*

39. *L. bicolor Roxb.*; foliis ellipticis (oppositis, glabris); racemis axillaribus; floribus pentandris: (corollâ 5-fidâ, irregulari; baccis oblongis). *Roxb. Corom. II. p. 20. t. 159. Fl. ind. Car. et Wall. II. p. 205. Kerner Hort. semperv. t. 441.*

Truncus vix ullus. Rami numerosi, adscendentes, lignosi, cortice griseo. Folia subopposita, sessilia aut brevissime petiolata: inferiora ovalia, oblonga vel lanceolata; superiora lineari-lanceolata, undulata, integerrima, reclinata, subavenia (coriacea), 3-5 poll., 1- $1\frac{1}{2}$ poll. lata, in Bengalia 5-6 poll., 4-5 lata (sic etiam in specim. *Herb. Martius*). Racemi solitarii, simplices, erecti, multiflori ($1\frac{1}{2}$ -2 poll.). Flores coccinei, ut videtur in specim. sicco, approximati, petiolo brevi, tereti, glabro, lin., cum rhachi articulato). Bractee minutae, concavae, cordatae (s. potius ovatae, obtusiusculae) basi germinis hinc appressae. Perianthium floris integrum, acetabuliforme, persistens ($1\frac{1}{2}$ lin.). Corollae tubus longus (poll.), paululum curvatus, a basi usque ad tertiam faucis partem ventricosus, tunc subconstrictus: limbus

5-partitus, fissurâ superiore multo profundiore: lacinae lineares, reflexae (4-5 lin., $\frac{1}{2}$ lin. latae, obtusiusculae). Filamenta 5 e basi laciniarum corollae, brevia. Antherae lineares (angustae, filamentis longiores). Germen nudum. Stylus longitudine corollae. Stigma capitatum. Bacca calyce persistente coronata, oblonga, glabra, pulposa, 1-locularis. Semen 1. *Roxb.* In arboribus *Coromandel.* *Yellinga Wadinika Telingar.* h.

40. *L. curvatus Blume*; racemis axillaribus, solitariis; floribus pentandris; corollae tubo elongato, curvato; foliis oppositis alternisve, oblongis, obtusiusculis, basi acutis, coriaceis, subvenosis, glabris. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 665.*

Corollae tubus flavus, limbus dilute aurantiacus. *Blume.* In altis montis *Salak in Java.* h.

41. *L. cylindricus Jack*; foliis alternis, petiolatis, lanceolatis, utrinque acutis; racemis axillaribus longitudine foliorum; limbo corollae tubo cylindrico longiore. *Jack MS. apud Wallich in Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall. II. p. 213.*

Habitus inflorescentiae structuraeque cylindricae floris RHOPALAE, quae subinde tetrandra. Rami lignosi, recti, cortice obscuro. Folia integerrima, glabra, nervosa, 4-5 poll.. Petioli circiter pollicares. Racemi rigidi. Flores pedicellato-divaricati, quidquam distantes. Bractea extus germen cingens. Cal. distinctus, fere integer. Cor. rubra, ante expansionem perfecte cylindrica, 5-petala, petalis linearibus: limbo reflexo, tubum triplo excedente. Stamina 5, petalis inserta, eorundem longitudine. Stylus filiformis, erectus. Stigma parvum. Germen cylindricum, 1-loculare. *Jack. Ms.* In *Sumatra.* h.

42. **L. pentandrus*; racemis simplicibus; floribus 5-fidis; foliis alternis, petiolatis. *Linn. Mant. 63. Lam. Enc. III. p. 598. Willd. Spec. II. p. 237.* *L. racemis subsolitariis, axillaribus; flor. 5-andris; fol. alternis, oblongis, obtusiusculis, glabris. Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 661. $\beta.$ L. flavus; racemis confertis, tubo corollae inflato. Blume l. c.*

„Frutex ramis ad folia dilatatis. Folia subnervia, figurâ *Lauri.* Racemi axillares, solitarii s. bini, petiolis paulo longiores. Corollae semiquinquefidae. Filamenta 5, e medio laciniarum corollae, antheris breviora. Antherae erectae, longitudine corollae.“ *Linn.* Confer *farinosum.* In *India; in Java.* h.

45. *L. venosus Blume*; racemis confertis axillaribus; floribus pentandris; foliis oppositis alternisve, oblongis, pergamenis, infra subsanguineo-venosis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 662.*

Affinis *L. pentandro.* Variat foliis utrinque attenuatis et apice obtusis. *Blume.* In *Java circa Buitenzorg.* h.

Obs. Hanc speciem, ni fallimur, vidimus in *Herb. Mus. monac.* nomine *L. purpurascens* ex *Java* communicatam. Magnus, rigidus, strictus; rami oppositi, dichotomique, teretes, glabri: inferne fusco-cinerei, punctati; superne purpurascenti-fusci, punctis albidis; juniores ad foliorum ortum compressi et incrassati. Folia alterna et subopposita, erecto-patentia, oblonga et ovato-oblonga, acuta et obtusiuscula, utrinque attenuata, glaberrima, crasse co-

riacea, margine in siccis undulato, pallide viridia, nervosa: nervis lateralibus parum prominentibus, et, ut videtur, olim purpurascens, 2½-6 poll., 2 poll. lata. Petioli breves, dorso convexi, supra plani, glaberrimi, crassi, 3-4 lin. Racemi axillares, solitarii vel 2-3, multiflori, erecti, foliis duplo triplove breviores, 1-1½ poll. Flores pedicellati, flavi, sparsi oppositique, 8-10 lin. Pedicelli erecti, erecto-patentes et reflexi, teretiusculi, parce albidè tomentosi, vix ultra lin. Bractea ad basin germinis late ovata, acumine subcuspidato, horizontaliter patens, quidquam concava, integerrima, tomento tenui, ½-¾ lin. Cal. urceolato-hypocrateriformis, 5-dentatus: dentibus ovatis, obtusis, vix ¼ lin. superantibus, parce tomentosis. Cor. tubus inferne ventricosus, inflatus, in faucem valde angustatus, erectus, angulosus, rubro-flavus, extus tomento brevissimo albido, ultra medium divisus in lacinias lineares, quidquam concavas, acutas, basi erectas, dein reflexas, extus tomentosas, sordide fusciscenti-luteas, intus glabras, lacte flavas, 5 lin. longas, ½ lin. latas. Stam. erecta, basi laciniarum inserta et in tubum decurrentia, corollâ paulo breviora; filamenta filiformia; antherae lineares, strictae, angustae, obtusae, longitudine filamentorum, flavae. Stylus stamina corollamque superans, erectus, sulcatus. Stigma capitatum. Germen ovatum, calyce coronatum, bracteâ duplo majus, tomento brevissimo albido. *L. pentandro* β valde affinis.

44. *L. farinosus Desrouss.*; pentander; foliis ovato-oblongis; racemis farinosis, axillaribus; corollis tubuloso-ventricosis, apice reflexis. *Lam. Enc.* III. p. 597. *L.* foliis alternis, glabris, coriaceis, ovatis, obtusis; petiolis brevibus, crassis; racemis axillaribus, fasciculatis, tomento albido stellato obtectis; corollae tubo ventricoso, ad duas tertias longitudinis suae in lacinias lineares semirecurvas diviso; staminibus 5. *Roxb. Fl. ind. ed. Wall. et Car.* II. p. 221.

Caules lignosi, teretes, ramosi, glabri. Folia alterna subopposita, subinde acutiuscula, integerrima, coriacea, nervosa, uti in plerisque aliis, utrinque glabra, 3-6 poll., 1½-5 poll. (subinde palmum) lata. Petioli 5-6 lin. Flores pedicellati, sparsi in racemis simplicibus, vix bipollicaribus, pube brevi albidâ, pulverulentâ inspersi, uti etiam pedunculi. Squama extus sub flore singulo parva, ovata, acuta. Cal. margo dentibus 5 obtusis. Cor. tubulosa, mediocris, laciniis linearibus 5, ad duas tertias ab apice divisis, intus rubro-flavis, reflexis. Stam. 5. Antherae rectae, filamentis parum longiores. Stigma capitatum, vix corollâ longius, staminibus lineâ circiter longius. *Desrousseaux*, qui, an satis distinctus a *pentandro* quaerit. Fol. valde crassa, margine inaequalia, costis prominentibus, nervis remotis. Flores lacte rubri, pollicares, tubo amplo, ventricoso, ultra medium diviso in lacinias 5 longas, basi erectas, apice reflexas ibique lineares, triangulares. Bacca magna, ovata, subtomentosa. *Wallich. In Singapore; Wall.; in Java; Herb. Commerson.* h.

45. *L. incarnatus Jack*; pentandrus; foliis junioribus ramulisque pube stellatâ, deciduâ; foliis adultis alternis, late ovatis, acutis; racemis pilosis, sub foliis; calyce 5-dentato; limbo corollae tubo multo breviorè. *Jack MS.* apud *Wallich in Roxb. Fl. ind.* II. p. 213.

Proximus *farinoso Lam.*; sed longitudine corollae pubeque in foliis ramisque junioribus diversus. Folia apice attenuata, integerrima, adulta glabra, nervis distinctis, 9 poll. Petioli breves. Racemi plerumque plures conferti, subinde solitarii. Flores sessiles. Bractea parva ad basin germinis, quod, uti pedicelli et calyces, piloso-lanatum. Cal. distincte 5-dentatus. Cor. 2 circiter poll., extus leviter tomentosa, pallide rosea, limbo virente. Tubus basi gibbus, supra basin parum contractus, dein dilatatus iterumque

contractus. Limbus $\frac{3}{4}$ tubo brevior, 5-partitus, laciniis reflexis. Stam. 5 erecta, stylo breviora. Stigma clavatum. Bacca calyce coronata, pilosa, farinosa, ovata. *Jack.* In insula Pulo Nias. h.

45. *L. longiflorus Desrouss.*; pentander; corollae tubo praelongo, superne incrassato: laciniis brevibus, apice reflexis. *Desrouss.* in *Lam. Enc.* III. p. 598. *L. corymbis* axillaribus; floribus pentandris, nutantibus; foliis ovato-lanceolatis, obtusis, venosis. *Willd. Spec.* II. p. 235. *L. glaber*; foliis obtusis, supremis subcordatis, venosis; racemis axillaribus; floribus longis, clavatis, pentandris; corollâ sub limbo contractâ: laciniis cuneatis. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall.* p. 217, et, fide *Wallich*: Valli itti canni *Rheed. Mal.* X. t. 4. (nec 3 uti in *Lam.*). *L. pentandrus L. Herb. Heyne.*

Distinctus a plerisque foliis venosis. *Willd.* (qui non vidit plantam, in qua plane contrarium!). Notabilis racemis brevibus, simplicibus, pedunculatis, floribus numerosis, subcorymbosis; corollis arcuatis, inferne angustissimis. Caules lignosi, teretes, uti tota planta glabri. Folia opposita vel subalterna, ovali-oblonga, nitentia, coriacea, integerrima, nervis obliquis, parum prominulis, subinde vix discernendis, $2\frac{1}{2}$ poll., 10-13 lin. lata. Petioli $\frac{1}{2}$ -2 lin. Pedunculi solitarii, axillares et terminales, erectiusculi, fere pollicares, apicem versus 12-20-flori; flores pedicellati, 2 poll., subirregulares, rubri. Cor. lacinae inaequales, maxima vix ad $\frac{1}{3}$ longitudinis corollae descendens: plerumque 2 lin.. Filamenta brevia, libera, supra basin lacinae inserta. Stylus corollâ et staminibus parum longior, stigmatate capitato. Membrana irregularis, concava, ad basin ovarii, extus latior. Cal. margo sinuatus, truncatus. *Desrouss.* Non esse *L. pentandrum*, uti videbatur *Heyne*, cui folia alterna. *Wall. l. c.* In Pondichery. *Herb. Commerson.* h.

Obs. Apud *Rheede*: Radix instar nodi rotundi, cortice crasso, rufo-fusco, scabro, intus albicante. Stipites plures cortice fusco; novelli virides. Folia passim bina, nodis insidentia, vel etiam solitaria extra nodos, oblonga, inâ parte rotunda, oris rotundis et ibi nervo albicante circumdata, brevissime petiolata, in cuspidem contracta, crassa, densa; costâ mediâ utrinque valde crassâ, supra (adversâ parte) rubrâ, nitente. Flores 9-10, per paria in surculis congesti; tubo nonnihil inflexo, basi strictiori, saturate rosaceo; apice oblongo-rotundo, viridi, caeterum viridescentes collari viridi, venis 5 striati; stamina rubra; antherae albicantes vel flaviusculae; stylus ruber, tenuis, subulatus. Fructus teretes, vertice plano latiori, viridi-fusci, maturi rubescentes, vertice late umbilicato. Semen grandiusculum, oblongo-rotundum, viride.

47. *L. praelongus Blume*; racemis solitariis, axillaribus; floribus 5-andris, secundis; tubo corollae longissimo, clavato, angulato; foliis alternis, ovalibus, obtusis, basi parum attenuatis, pergamenis, glabris. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind.* p. 664.

Accedit ad *L. clavatum* et *L. longiflorum*. Prope Tjiradjas in Java. *Blume.* h.

48. *L. retusus Jack*; foliis oppositis, obovato-oblongis, retusis emarginatisve; racemis subsolitariis; limbo corollae tubo clavato brevior. *Jack MS.* apud *Wallich* in *Roxb. Fl. ind. Car. et Wall.* II. p. 212.

Cortex fuscus. Folia breviter petiolata, etiam obcuneiformia, in-

tegerrima, glabra, coriacea, 3 poll.. Flores pedicellati, bractea una alterave ad basin. Cal. margo integer. Tubus corollae superne gibbus, angulosus, roseus, sub limbo immediate contractus. Limbus 5-6-partitus, flavo-viridis, laciniis anguste lanceolatis, reflexis. Stam. 6, subinde 5, stylo parum breviora. Stigma capitatum. *Jack Ms. In Singapore. h.*

49. *L. Hoffmannseggianus*; foliis ovato-oblongis, acutis; racemis axillaribus, subgeminatis; floribus verticillatis. *L. verticillatus Com. d. Hoffmannsegg in Herb. Willd..*

Adest monente *de Schlechtendal fil. L. verticillatus* genuinus in *Herb. Willd.*; sed praesens alia videtur species. *Ad Para Brasiliae. Com. de Hoffmannsegg. h.*

50. *L. Haenkeanus Presl*; glaber; foliis suboppositis, lanceolato-oblongis, acuminatis, obsolete venosis, coriaceis; umbellis densis in pedunculo solitario suberecto e ramorum dichotomia; pedicellis deflexis germinibusque ferrugineo-pubescentibus; corollis uno latere ultra medium fissis. *Rel. Haenk. ined.*

L. malifolio similis. Rami, ut ex unico videtur specimine, dichotomi, erecto-patentes, longi, teretes, nodis remotis, crassitie pennae cygnae, juniores tenuiores; cortice in ramis adultioribus cinereo-fusco verruculis numerosis, in junioribus glabro, flavescenti-cinereo. Folia opposita et subalterna, plana vel complicata, acumine saepius obtusiusculo, basi quidquam attenuata, saepius valde difformia obliqua obtusaque, utrinque glaberrima, crasse coriacea, sicca subtus ferruginea, $3\frac{1}{2}$ -6 poll., $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata; nervo medio subtus valde prominente. Petioli vix crassi, supra plani, glabri, 8-12 lin.. Umbella conferta, multiflora. Pedunculus communis e ramorum dichotomia (an semper?), teres, quidquam arcuatus, nec tamen refractus, vix crassitie pennae corvi, pube tenuissimâ brevissimâque, 9 lin.; pedunculi partiales ita flexi, ut flores fere omnes deflexi, teretes, triflori, 3 lin., ferruginei. Flores 13 lin., ut videtur rubri, extus ferrugineo-pubescentes, intus ad filamenta decurrentia puberuli; laterales in pedicello patente lin.; medius sessilis. Bractea sub singulo flore ovata, concava, obtusiuscula, integra, germine 3-plo brevior, $\frac{3}{4}$ lin., pube brevi ferruginea. Cal. urceolatus, subinteger, pubescens, $\frac{1}{2}$ lin.. Corolla tubulosa, tubo erecto, superne subclavato, uno latere ad $\frac{2}{3}$ fere usque fissio, 9 circiter lin.; lacinae reflexae, lineares, apice paulo latiores, acutae, $3-3\frac{1}{2}$ lin., $\frac{2}{3}$ lin. latae. Stam. 5, corollâ paulo breviora; filamenta stricta, crassa, basi laciniarum inserta, glabra, 2 lin.; antherae erectae, oblongae, obtusiusculae, fere croceae, lin.. Stylus strictus, glaber, longitudine corollae, ruber (?). Stigma obsoletum, truncatum. Germen obovato-oblongum, ferrugineum, lin.. *In insula Luzon. Haenke. h.*

51. *L. malifolius Presl*; glaber; foliis suboppositis, ovatis, acutis, obsolete venosis, coriaceis; umbellis densissimis in pedunculo axillari, solitario, refracto; pedicellis germinibusque ferrugineo-pubescentibus; corollis ultra medium 5-fidis. *Reliqu. Haenkean. ined.*

Rami adultiores validi, teretes, nodosi, crassitie pennae cygnae, cortice glabro pallide cinerascete; juniores subcompressi, glabri,

sicci purpurascenti-fusci. Folia opposita alternaque, plana, rarius complicata, basi rotundata, utrinque glaberrima, crasse coriacea, margine non revoluto, sicca subtus ferruginea, $2\frac{1}{2}$ -5 poll., $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll. lata; nervo medio subtus valde prominente; venis vix conspicuis. Petioli crassi, semiteretes, supra planiusculi, basi incrassati, glabri, 5-7 lin.. Umbella confertissima, capitato-congesta, subhemisphaerica. Pedunculus communis teres, jam a basi reflexus, fere poll., crassus, tenuissime subferrugineo-pubescent; pedunculi partiales teretes, triflori, 3 lin., pube brevissimâ ferrugineâ. Flores 12-14 lin., ut videtur rubri, extus tenuissime pubescentes, laterales in pedicello brevissimo patente erecti, medius sessilis. Bractea sub singulo flore ovata, concava, obtusa, integra, $\frac{1}{2}$ lin., germine 3-plo brevior, pube brevissimâ ferrugineâ. Calyx margo urceolatus, erectus, subinteger vel denticulis obsoletissimis, vix pubescens, $\frac{1}{2}$ lin.. Cor. ad $\frac{2}{3}$ usque 5-fida, uno latere etiam profundius; tubus subcylindricus; lacinae lineares, $\frac{1}{2}$ lin. latae, ad 2-3 lin. infra apicem usque erectae, dein paulo latiores et reflexae, acutae. Stam. 5, corollâ paulo breviora, aequalia; filamenta crassa, stricta, glabra, ibidem inserta ubi lacinae reflectuntur, 2 fere lin.; antherae oblongae, obtusiusculae, croceae, $\frac{1}{2}$ lin.. Stylus erectus, staminibus paulo longior, ruber (?). Stigma obsoletum truncatum. Germen obovato-oblongum, pube densissimâ brevissimâ ferrugineâ, lin. longum. *In insula Luzon. Haenke. h.*

52. *L. Forsterianus*; glaber; foliis oppositis, petiolatis, ovatis, obtusis, venosis, tenuibus; cymis axillaribus, solitariis, folio brevioribus; pedunculis trifloris; bracteis ovatis, obtusis. *L. Stelis Forst. prodr.* (fid. specim in *Herb. Schreb.*).

Nomine *L. Stelidis* in *Herb. Schreber* asservatur, a quo vero plurimis differt. Rami teretes, glabri, fuscescentes. Folia ovata vel ovato-oblonga, obsolete venosa, integerrima, subinde levissime subarcuato-inaequalia, in petiolum teretiusculum supra canaliculatum 2-3 lin. attenuata, tenuia nec coriacea, siccata fusca, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll., 10-16 lin. lata. Cymae petiolis longiores. Pedunculus communis teres, glaber, erectus, 9 lin.; partiales subtus convexi, supraplani, vix ultra lin.. Flores in pedicellis terni, in specimine observato inexpandi (serius ut videtur 5-petali), 5-goni, apice subclavati, glabri, sicci fuscescentes, 7 lin. longi; laterales pedicello brevissimo; medius sessilis. Calyx acetabuliformis, truncatus, integerrimus, vix ultra $\frac{1}{2}$ lin., glaber. Stamina corollâ paulo breviora; filamenta linearia, plana, fusca, parte liberâ antheris fere breviora; antherae lineares obtusae, erectae, filamentis vix latiores, flavae. Stylus longitudine staminum, filiformis, fuscus (?); stigmatate obtuso, obsoleto. Germen ovatum, glabrum, vix lin., bracteam ovatam vel rotundato-ovata, integerrimam, glabrâ, membranaceam, fuscescente, germine duplo fere breviora suffultum. *In insulis Societatis. Forster. h.*

53. *L. congener Sieber*; glaber; foliis oppositis, petiolatis, oblongis, utrinque angustatis, aveniis, coriaceis; cymis axillaribus, 3-4-partitis, folio brevioribus; bracteis ovatis, acutis; corollis ad basin usque 5-fidis.

Rami dichotomi, erectiusculi, teretes, ad articulos tantum quidquam compressi, glabri, cortice cinereo. Folia petiolata, ob-

longa, rarius obovato-oblonga, obtusiuscula, integerrima, 2-2½ poll., ½-1 poll. lata. Petioli supra plani, subtus convexi, glabri, 3-4 lin.. Cymae e foliorum axillis, solitariae, multiflorae, plerumque 5-partitae; pedunculo communi, erecto, basi incrassato, tereti, glabro, foliis triplo brevior, 6-9 lin.; pedicellis erecto-patentibus, teretibus, glabris, cum pedunculo communi articulatis, 3 lin., plerumque 3-rarius 1-vel 2-floris; floribus 2 lateralibus in pedicellis brevibus, patentibus, teretibus, glabris; intermedio sessili. Calyx acetabuliformis, truncatus, integerrimus, glaber vel margine tenuissime ciliatus, minimus. Bractea ad basin germinis appressa, glabra, ½ lin. vix longior. Cor. utrinque glabra, fusca vel badia in specim. sicco, poll., ante anthesin longe tenuiterque tubulosa, apice clavato, serius ad basin usque 5-fida: laciniis vel petalis linearibus, angustissimis, apice dilatatis, acutis, a medio reflexis. Stamina longitudine corollae, stylo paulo breviora. Filamenta corollae laciniis medio affixa, plana, latitudine fere laciniarum, erecta, apice angustiora. Antherae basi affixae, lineares, angustae, acutae, flavicantes, lin. longae. Stylus staminibus corollaque paulo longior, glaber, filiformis, tetragonus, ut videtur, colore corollae; stigmatibus parvo, capitato. Baccae desunt. *In Nova Hollandia.*
Sieber. h.

2. inflorescentiâ terminali.

54. *L. grandiflorus Ruiz et Pav.*; floribus corymboso-racemosis, pentandris, pendulis; bractea ovata, concava; foliis ovalibus, subvenosis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 45. t. 275. f. a. Kern. Hort. Semperv. t. 466.*

Frutex parasiticus, 2-6 ped., glaberrimus, pulcher. Radix ramosa, fibrillosa. Caulis dependens, teres, dilute viridis; rami similes. Folia opposita, breviter petiolata, ovalia et oblongo-ovata, integerrima, crassa, parum venosa, supra nitidiuscula, plana (2-3 poll., 1½ poll. lata). Flores terminales, subcorymbosi, tandem racemosi, dependentes. Pedicelli oppositi, breves, 1-flori. Calyx fructus squama integerrima, germine duplo longior; floris cyathiformis, brevis, 5-dentatus. Cor. hypalmaris, semi-5-fida, 5-sulcata, uno latere in decidentia ad basin usque longitudinaliter scissa. Filamenta filiformia. Antherae linear-oblongae, luteo-virescentes. Stylus puniceus corollâ vix longior. Bacca ovalis, caerulea, olivae fructus magnitudine. Semen ovale, album. *Ruiz et Pav. In nemoribus Andium Peruviae, prope Pozuzo, Pillao. etc. h.*

55. *L. corymbosus Dietr.*; foliis ovato-oblongis, obtusis, basi rotundatis, coriaceis; pedunculis unifloris, unibracteatis, in apice ramulorum congestis; floribus pentapetalis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. red. Kunth III. p. 438. (sub L. glaucus). L. glaucus; flor. racemoso-corymbosis, pentandris; bractea lanceolata; foliis ovato-lanceolatis. Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 45. t. 275. f. b. Pers. Syn. p. 389. L. caesius Spreng. S. V. II. p. 132. L. corymbosus Dietr. Gaertn. Lex. Nachtr. IV. p. 468.*

Frutex glaucus, 2-3 ped.. Radix ramosa, fibrosa. Caulis ramosus, teres, granulatus; rami similes, oppositi, plerumque secundi.

Folia opposita, saepius secunda, breviter petiolata, saepe lanceolata, obtusa acumine minimo, integerrima, glabra, avenia, crassiuscula, aliquando retroflexa. Pedunculi terminales in flore subcorymbosi, in fructu remotiores, in racemum simplicem subdigesti. Flores secundi, breviter pedicellati. Bractea integerrima, germine triplo longior. Cal. marginalis, obsolete 5-crenatus. Cor. $1\frac{1}{2}$ poll., profunde 5-fida, apice basique rubra, medio lutea; laciniis spathulato-lanceolatis, reflexis. Filamenta subulata e medio laciniarum. Antherae lineares, incumbentes, biloculares, reflexae, laciniarum fere longitudine. Stylus ruber, corollae longitudine. Stigma obtusum, derasum. Bacca atropurpurea, ovato-ovalis, umbilicata, calyce diminuto coronata. Semen ovato-ovale. *R. et Pav.* Affinis *L. longibracteato* Lam. monente *Kunth* l. c. Rami verrucosi, nigrescenti-fusci. Folia interdum acutiuscula, nervo subtus prominente, poll. et paulo ultra, $\frac{1}{2}$ poll. lata. Petioli vix 2 lin., basi dilatati, glabri. Pedunculi apice unibracteati, 2-5 lin.. Bractea oblonga, acuta, coriacea, glabra. Flores 2 fere poll.. Petala glabra, angustissime linearia, superne patenti-reflexa, longitudine staminum longiorum. Stylus stamina paulo superans. Stigma obtusum. Bacca subglobosa, laevis, glabra, magnitudine *PRUNI spinosae*. *Kunth.* In Peruviae Andium nemoribus ad Huassahuassi, Pillao etc. \dagger .

56. *L. Sternbergianus*; ramis ramulisque glabris; foliis ovatis, obtusis, glabris, coriaceis; pedunculis numerosis, terminalibus, corymbosis, glabris, unifloris; bractea unica, ovata, glabra, integra, germine duplo brevior. *Reliqu.* *Haenkean.* ined.

Frutex ramis oppositis dichotomisque erecto-patentibus, teretibus vel superne obsolete angulosis, glaberrimis, in siccis intense purpurascenti-fuscis, crassitie pennae anatinae. Folia opposita alternaque, erectiuscula, satis approximata, plerumque ovata et obtusiuscula, saepius difformia obovata, crassa, subavenia, utrinque glaberrima, 8-16 lin., 6-9 lin. lata. Petioli crassi, supra canaliculati, glaberrimi, lin.. Pedunculi in apicibus ramorum in corymbum densum multiflorum congesti, erecti, minime secundi, teretes, glabri, in siccis fusci, $1\frac{1}{2}$ -2 lin., extus producti in bracteam erectam, crassam, concavam, acutam, glaberrimam, $\frac{1}{2}$ lin.. Cal. margo urceolatus, glaberrimus, integerrimus, $\frac{1}{3}$ lin.. Cor. $1\frac{1}{2}$ poll., ut videtur, purpurascens, glaberrima, erecta, inexpansa tubuloso-5-gona, apice in clavam obtusam 3 lin. longam incrassata; expansa ad basin usque 5-fida vel 5-petala; petala linearia, apice in lanceolam, lin. latam, concavam dilatata, ad medium usque erecta et tubum mentientia, supra medium primum patentia, serius revoluta-reflexa. Stam. 5, aequalia, corollam paulo breviora, erecta; filamenta medio petalorum inserta, subulata, glabra, 7 lin.; antherae crassae, oblongae, utrinque cum acuminulo parvo, dorso infra medium affixae, 2 lin., ut videtur intense flavae. Stylus longitudine staminum, ruber (?), erectus, filiformis. Stigma obsolete, capitato-truncatum. Germen oblongum, $1\frac{1}{2}$ lin.. *L. tetrandro* valde affinis, sed differt: ramis ramulisque glabris; petiolis glabris; pedunculis numerosioribus, glabris; bracteis solitariis integerrimis, nec tripartitis; staminibus semper 5. A *L. corymboso* *Dietr. (glauco Ruiz. et Pav.)*, differt, praeter colorem, praesertim

bracteâ germine duplo brevior, nec triplo longior. In
Cordilleris Chilensibus. Haenke. t.

57. *L. Eschscholzianus Martius*; ramulis asperis; foliis ovatis rotundatisve, obtusis, glabris, coriaceis; pedunculis corymboso-racemosis terminalibus axillaribusque, erectis, plerumque 3-floris: flore medio sessili; bracteis ovatis, apice fimbriatis, germen subaequantibus.

Frutex ramis alternis, erecto-patentibus, teretibus vel junioribus angulatis, adultioribus cinerascens rugoso-asperis, junioribus setulis brevibus, rigidis, ferrugineo-asperis. Folia alterna, sparsa, rarius opposita, approximata, erectiuscula, brevissime petiolata, integerrima, margine paululum reflexo, utrinque glaberrima, subavenia, plerumque obtusa, rarius acutiuscula, maxima 8 lin., 7 lin. lata, minima ad basin apicemque ramulorum 3 lin. longa lataque. Petioli crassi, glabri, vix $\frac{1}{2}$ lin.. Racemi plerumque axillares, foliis plerumque duplo triplo longiores, 1 - $1\frac{1}{2}$ poll.. Pedunculi communes rhachesque ferruginei, scabri, basi teretes, superne angulati; partiales horizontaliter fere patententes, breves, crassi, angulati, scabridi, ferruginei, lin. longi; pedicelli 2 laterales brevissimi ad florem medium sessilem. Bractea acutae, concavae, fuscae, longitudine germinis, apice ad margines ciliis ferrugineis fimbriatae. Cal. minimus, acetabuliformis, truncatus, obsolete repandus, glaber. Cor. 3 lin., glabra, purpurascens (? in siccis), inexpanse clavata; expansa ad basin usque 5-fida: laciniis vel petalis lineari-spathulatis, angustis, a medio reflexis, acutiusculis. Filamenta medio lacinarum inserta eorumque longitudine, erecta, satis crassa. Antherae ovatae, obtusae, satis magnae, dorso affixae, flavae. Stylus longitudine staminum, erectus, corollâ pallidior; stigmatibus obsolete, truncato. Germen oblongum, glabrum. *Ad specimen in Herb. cli de Martius ab Eschholz in Chili lectum. t.*

58. *L. verticillatus Ruiz et Pav.*; floribus aggregato-capitatis, subverticillatis, pentandris (nec hexandris); bracteis ovatis; foliis ternis lanceolatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 47.*

Frutex parasiticus, ulnaris. Radix ramosa, fibrillosa, luteo-fusca. Caulis teres, erectus, ramosus. Rami verticillati, terni, teretes, erecti. Folia subverticillata, integerrima, enervia, glauca, erecta, plerumque secunda. Flores terminales, secundi, in capitulum aggregati, subverticillati. Bractea concava, integerrima. Calyx marginalis. Corolla punicea, semi-5-fida; laciniis spathulato-lanceolatis, revolutis. Filamenta 5, lutescentia. Antherae rubrae, oblongae. Stylus lutescens. Stigma simplex, minimum. Bacca ovalis, purpureo-nigra. Semen ovale. *Ruiz et Pav. In sylvis regni Chilensis, ad ripas fluvii Andalien. t.*

59. *L. longibracteatus Desrouss.*; pentandrus; lanceolatis, enervibus, subsessilibus; spicis terminalibus teis floriferis. *Lam. Enc. III. p. 599. Willd. S. p. 255.*

Caulis lignosi, teretes, ramosi, glabri. Folia sparsa, lanceolata, acuta, coriacea, integerrima, $1\frac{1}{2}$ - 8-9 lin. lata, rugosula. Flores longi; singuli in bractea li

lanceolata, 8-10 lin. longa, pedunculi vices gerente: insidet nempe cuique ad basin flos in excavatione propria, parva. Cal. brevis, obsolete dentatus. Cor. ante explicationem tubus longus, $2\frac{1}{2}$ poll. circiter, apice clavatus; finditur dein ultra tertiam inferiorem partem in lacinias 5 lineares, apice parum dilatatas, a medio reflexas, medioque primum, ut in *elastico*, dehiscentes. Filamentum circa medium 7-8 linear., anthera oblonga, transversa. *Desrouss. In Peruvia. Jos. de Juss. in Herb. Juss. h.*

60. *L. Lambertianus*; dichotome-ramosus, glaber; foliis oppositis, ovato-lanceolatis, utrinque angustatis, acutis, nervosis; spicis terminalibus, solitariis; rhachi foveolata; floribus pentapetalis, sessilibus, subimmersis.

Fruticulus habitu *L. europaeo* simillimus; rami dichotomi, patentes, articulati, ad articulos nodosi, glabri; adultiores teretes, cortice cinereo; juniores compressi, fuscii. Folia brevissime petiolata, tenuia, vix coriacea, utrinque, subtus evidentius, nervosa: infima obovata, obtusa; reliqua ovato-lanceolata, acuta, integerrima, utrinque glabra, $1\frac{1}{2}$ poll., 5-6 lin. lata: par infimum multo minus. Petioli vix lin., supra plani, dorso convexi, glabri. Spicae in ramulis terminales, erectae, articulatae, breviter pedunculatae, foliis supremis breviores, poll.; rhachis subangulosa: foveolis profundis, oppositis, decussatis, margine inferiore majori, germen ad $\frac{1}{2}$ aequante. Flores parvi, remoti, horizontaliter patentes. Calyx minutus, integer, glaber. Petala 5, lanceolata, acuta, concaviuscula, glabra, patentia vel reflexa, $1-1\frac{1}{2}$ lin., in specimine sicco fusca. Stamina petalis breviora; filamenta brevissima, petalorum medio inserta et decurrentia; antherae sat magnae, subrotundae, didymae, dorso affixae, polline luteo. Germen minutum, ovatum, glabrum, foveolae ad medium usque immersum ejusque margine inferiore suffultum. Stylus longitudine staminum, crassus, teres; stigmatibus capitato, subobliquo, glabro. Ad specimen in *Herb. cli de Martius* ab illo. *Lambert* communicatum. *In Nepal?* h.

61. *L. rotundatus Willd.*; foliis ovatis, rotundato-obtusis, coriaceis; floribus pentandris. *Reliqu. Willd. Ms. In America meridionali. De Humb.*

c. Flores hexandri.

1. *Pedunculi 1-3-flori, axillares, solitarii vel plures.*

62. *L. montevidensis Spreng.*; ramis teretibus; foliis spathulato-linearibus, mucronatis; floribus axillaribus, solitariis, erectis. *Spreng. S. Veg. II. p. 128. Circa Monte Video. Sellow. h.*

63. *L. cuneifolius Ruiz et Pav.*; ramis teretiusculis; foliis alternis, cuneiformibus, obtusis cum acumine, trinerviis; floribus axillaribus, subsolitariis; bractea cyathiformi, trigona, tridentata. *L. floribus axillaribus, 1-3-nis; bractea cyathiformi, trigona, tridentata; foliis cuneiformibus, acuminatis. Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 46. t. 276.*

Frutex parasiticus, subglaucus, valde ramosus, glaberrimus. Rad. ramosa, fibrosa. Caulis erectus, teres, virescens; rami sparsi,

diffusi, virides (in specim. a *Haenke* lectis saepe subsecundi, apice quidquam compressi). Folia sparsa, subsessilia (in speciem petioli attenuata), cuneiformia cum acumine parvo, integerrima, carnosae, utrinque nitidae, avenia, obsolete 3-nervia (in siccis nervis 3 basi evidentioribus), nonnulla emarginato-retusa, vix poll. (8-16 lin., 2-5 lin. lata). Pedunculi solitarii vel (raro) 2-3, uniflori, foliis triplo breviores (2-3 lin.), in flore recurvi (erecto-patentes vel subarcuati potius), in fructu erecti. (Bractea erecta, germen laxè cingens, lin. fere; dentibus 3 lanceolatis, acutis, carinatis, in fructibus obtusioribus.) Cal. (urceolato-) tubulosus ($\frac{3}{4}$ -1 lin.), denticulis 6 vix manifestis. Cor. punicea, 1-1 $\frac{1}{2}$ poll., profunde 6-fida; laciniis lineari-spathulatis, incurvatis (ultra medium angustissimis, suberectis, dein latioribus reflexo-patentibus, acutis). Filamenta medio petalorum inserta longitudine (fere) laciniarum. Antherae lineari-oblongae, luteae, sulco rubro. (Stylus erectus, filiformis.) Stigma capitatum, parvum. Bacca subrotunda, calyce tubulato coronata, nigra (magnitudine fructus Juniperi). Semen globosum pulpâ viscosâ involutum. *Ruiz et Pav.* In Peruviae vallibus, copiosa prope *Huanocco*. *Ruiz et Pav. et Haenke.* ♀.

64. *L. biflorus Desrouss.*; foliis ovato-subrotundis; pedunculis axillaribus, bifloris; corollâ tubulosâ, arcuatâ. *Lam. Enc. III. p. 600. Willd. Spec. II. p. 232.*

Affinis quodammodo *buddlejoidi*. Caules lignosi, teretes, ramosi, glabri, cinerei. Folia alterna oppositaque, integerrima, viridia, glabra, crassiuscula, fere 2 poll., 15-18 lin. lata. Petioli canaliculati, 4-5 lin.. Pedunculi solitarii, raro gemini, petioli parum breviores, sub medio bifurcati. Sub flore singulo membrana brevissima, orbicularis, extus ovata. Cal. truncatus. Cor. gracilis, valde arcuata, 9-10 lin., pube rufescente tenuiore quam in *buddlejoide*. Fructus parvus, coronatus, rugosus. *Desrouss.* In India orientali. *Sonnerat. Herb. Lamarck.* ♀.

65. *L. nodosus Desrouss.*; foliis ovato-rotundatis; pedunculis axillaribus, fasciculatis; corollae tubo longissimo; (caule) articulis nodosis. *Lam. Enc. III. p. 601. Willd. Spec. II. p. 234.*

Caules teretes, lignosi, cinerei, ramis dichotomis. Folia opposita, integerrima, patentia et deflexa, firma, coriacea, glabra, utrinque viridia, 3 $\frac{1}{2}$ -4 poll., 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll. lata, plerumque 7-nervia. Petioli crassi, 5-6 lin.. Flores axillares et ad dichotomiam. Pedunculi vix petioli longiores, 1-2-flori. Squama parva, orbicularis, irregularis sub flore. Cal. margo brevis, truncatus. Corollae tubus tenuis, 3-poll. et ultra; lacinae 6 lineari-lanceolatae. (Corolla ante expansionem acuta, nec clavata.) Antherae 6, erectae, 6-7 lin., corollam non excedentes. *Desrouss.* In Peruvia. *Jos. de Jussieu.* ♀.

66. *L. Blumeanus*; pedunculis confertis, axillaribus, subbifloris; floribus hexandris; foliis oppositis, angusto-lanceolatis, coriaceis, glabris, haud venosis. *L. avenis Blume* *Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 663.*
In sylvis montanis *Salak, Gede, Burang rang* in Java. *Blume.* ♀.

67. *L. cupulifer* Humb. et Bonpl.; foliis oblique ovato-oblongis, apice angustatis, obtusis, reticulato-multinervi-
bus, submembranaceis; pedunculis axillaribus bi-triflorisve,
unibracteatis; baccis cupulâ inclusis. Humb. et Bonpl.
nov. gen. red. Kunth III. p. 438. n. 15.

Rami teretes, laeves, glabri, cinerascens? nodis tumidis. Folia
subsessilia, basi in petiolum brevissimum decurrentia, reticulato-
multinervia, submembranacea, glabra, 5 poll. et ultra, 2 poll.
lata. Pedunculi glabri, bractea ovata, acutiuscula, coriacea,
glabra, pedicellum aequante. Flores $1\frac{1}{2}$ poll. et ultra, subses-
siles. Pedicelli brevissimi, ampliati in cupulam ovato-cylindri-
cam, apice irregulariter dentatam, subcoriaceam, glabram, ger-
men multo superantem. Cal. margo integer, glaber. Petala 6
glabra, angustissima, patula, apice revoluta, longitudine stami-
num. Stylus staminibus paulo longior, stigmate obtuso. Bacca
elliptica cupulâ inclusa, eamque longitudine aequans, calyce co-
ronata, laevis, glabra, magnitudine fructus Coffeae. *Kunth l. c.*
Prope Lozam Peruviae. h

68. *L. eucalyptifolius* Humb. et Bonpl.; foliis ovatis,
apice rotundatis, crasso-coriaceis; pedunculis axillaribus tri-
floris, ebracteatis. Humb. et Bonpl. *nov. gen. red. Kunth*
III. p. 455. n. 1.

Ramosissimus, ramis teretibus, laevibus, glabris, cinerascens.
Folia basi in petiolum paulo angustata, subavenia, nervo medio
obsoleto, glaberrima, 5 poll., 22-23 lin. lata. Pedunculi folio
breviores, glabri. Flores suaveolentes, $1\frac{1}{2}$ fere poll.; pedicelli
longitudine pedunculi, $\frac{1}{2}$ poll., glabri, apice cupuliformi-am-
pliati (calyculum efformantes). Cal. margo angustus, edentulus,
laxus, germen coronans, glaber. Cor. petalis 6 flavis, glabris,
angustato-linearibus, apice paulo dilatatis, subcarnosis, basi sub-
cohaerentibus, aequalibus, patulis. Stam. petalis paulo breviora.
Germen globosum. *Kunth l. c.* In arboribus prope *Villa*
de Cura prov. Caracas. h

Obs. Occurrit in *Reliqu. Willd. l. eucalyptifolius*; foliis ovato-lanceolatis,
subfalcatis, obtusis, ex eodem loco natali. An idem?

69. *L. obmunitus* Spreng.; ramis teretibus, strictis; fo-
liis spathulato-linearibus, apice incrassatis; pedunculis nutan-
tibus subsecundis; calyce duplici, exteriori tridentato. Spreng.
Cur. post. p. 139.

In *Rio Grande. Sellow.* h

70. *L. parvifolius* Swartz; pedunculis axillaribus, tri-
fidis; pedicellis unifloris; foliis ovatis, integris. Swartz
prodr. 85. *Fl. ind. occid.* 1. p. 628. *Willd. Spec. Pl.* II.
p. 253.

Frutex pedal., laevis; rami diffusi, suberecti, stricti, fragiles.
Folia petiolata, opposita, parva, basi attenuata, enervia, avenia,
utrinque glabra, tenuiora. Pedunculi oppositi, axillares, foliis
breviores, apice 3-fidi; pedicelli breves. Calyx inferus, cyathi-
formis; dentibus 3 minutis, erectis. Petala 6 lanceolata, acuta,
patentia, intus magis colorata. Filamenta medio petalorum in-
serta, purpurea, petalis breviora. Antherae 3 quasi interiores
subrotundae, 3 exteriores trigonae, loculamentis lunulatis ad la-

tera petalorum inclusae, rubrae. Stylus erectus, longitudine petalorum. Stigma capitatum, luteum. Bacca minuta, oblonga, calyci insidens, truncata, 1-sperma, nigra. Differt a *L. paucifloro* foliis semper parvis; pedunculis trifidis nec racemosis etc. *Swartz.* In specimine auctoris in *Herb. Schreber.*: folia obtusa cum mucronulo brevi, cum petiolis brevibus 8-12 lin. longa, 3-6 lin. lata. Pedunculi 2-3 lin.; plerumque 3-, rarius 2-5 flori; pedicelli vix lin.. Baccae $1\frac{1}{2}$ lin., calyce brevissimo membranaceo integerrimo coronatae, bracteis cyathiformibus tridentatis suffultae. *In altissimis montibus Jamaicae in ramis arborum* h.

2. *Pedunculi 4-6-flori, dichotomi, axillares, solitarii vel plures.*

a. parviflori.

71. *L. rotundifolius St. Hil.*; caulibus diffusis; foliis subrotundis, glabris; floribus axillaribus, congestis, bracteatis, 6-andris; pedunculis brevibus, plurifloris. *A. St. Hilaire Annal. d. Mus. IX. p. 328.*

In Brasilia. h.

72. *L. glomeratus Mart.*; glaber; ramis teretibus, radicanibus; foliis oppositis, breviter petiolatis, ovatis, acumine brevi, glaucis, coriaceis; pedunculis brevissimis, axillaribus, glomeratis, bifidis; floribus ternis, sessilibus, bracteatis; stylo petala aequante. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Caulis nodosi: rami oppositi, patentes, cinereo-fusci, radiculis crassis viridibus; ramulis rore glauco. Folia patentia, margine tenui pergameno, avenia praeter nervum medium, $1\frac{1}{2}$ poll., 10-12 lin. lata. Petioli supra canaliculati, 2-3 lin.. Pedunculi dense glomerati, 2-, rarius 3-fidi vel simplices, lineae; pedicelli brevissimi. Bractae 3, ovatae, acutae, concavae, $\frac{1}{2}$ lin.. Flores flavescenti-virides, 2 lin., inexpandi tubulosi, teretes, obtusi. Cal. integer. Pet. 6, linearia, obtusa, a medio reflexa, $\frac{1}{3}$ lin. lata. Filamenta petalis styloque breviora, subulata, albida, alterna longiora. Antherae ovatae, basi subhastatae, flavae. Germina cum calyce in bractea abscondita. Stylus cylindricus, albidus. Stigma depresso-capitatum, fuscescens. *In sylvis Catingas prov. Minas Brasiliae. h.*

73. *L. confertus Mart.*; glaber; ramis radicanibus, teretibus; foliis oppositis, ovatis subrotundisve, obtusis cum acumine brevi, coriaceis, nervosis; pedunculis axillaribus, congestis, dichotomis simplicibusve; floribus ternis, sessilibus, bracteatis; stylo petalis duplo breviora. *De Mart. Fl. Bras. ined.*

Rami diffusi, nodosi, cinerei; juniores fuscis punctati; epidermide solubili; radiculis numerosis. Folia patentia, subinde margine fere calloso subrevoluta, 15-18 lin., 9-14 lin. lata. Petioli 2-3 lin.. Pedunculi 2-4, subverticillati, erecto-patentes, lin., plerumque dichotomi; ramuli divergentes, teretiuseculi, $\frac{3}{4}$ lin.. Bractae 3, ovatae, acutae, $\frac{1}{4}$ lin.. Flores 2 lin., inexpandi basi graciles, apice clavati. Cal. brevissimus, denticulatus.

Pet. 6, linearia, acuta, ad medium patenti-reflexa. Stam. 3 petala subaequantia, 3 breviora, filiformia; antherae ovatae, flavae. Germina vix $1\frac{1}{2}$ lin.. Stylus vix lin., subulatus. Stigma obsoletum. *In citris Brasiliae, ubi etiam Erva de Passerinho. h. Seren. Princ. Max Neovid.*

74. *L. phillyreoides* Humb. et Bonpl.; ramis elongatis, (sub) filiformibus: foliis oblongis, acutis, in petiolum decurrentibus, subcoriaceis, glabris; pedunculis axillaribus, subdichotomis, foliis duplo triplove brevioribus; floribus sessilibus subternis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 459. n. 17.* L. foliis ellipticis, acutis; pedunculis bi-trifidisque; pedicellis trifloris, foliis brevioribus. *Reliqu. Willd. Ms. fid. de Schlechtendal fil.*

Frutex parasiticus, pendulus; ramis oppositis geminis aut solitariis, teretibus, laevibus, glabris, radicanibus (?). Folia breviter petiolata, avenia, nervo medio subtus prominulo, cum petiolo 9-10 lin., $2\frac{1}{2}$ -3 lin. lata. Pedunculi multiflori glabri. Flores parvi, bracteis 3 minutis, abbreviato-ovatis, acutiusculis ad basin. Cal. margo obsoletus. Petala 6 linearia, patula. Fructus? Viva denuo examinanda. *Kunth l. c. In arboribus prope Cumana. h.*

75. *L. cochinchinensis* Lour.; foliis oppositis, ovato-oblongis, acutis, reflexis; pedunculis axillaribus, multifloris, congestis; corollis tubulosis, hexagonis. *Lour. Fl. Coch. p. 241.*

Caulis parasiticus, lignosus, tortuosus, brevis, ramosissimus. Folia integerrima, densa, glabra, incurva. Flores viridi-lutei. Calyx (bracteae) inferus, 3-phyllus, minimus. Corollae tubus amplus; limbus profunde 6-partitus: laciniis lanceolato-linearibus, elastice dehiscentibus, revolutis. Stam. 6. Stylus staminibus longior; stigmatate sphaeroideo. Bacca inter calycem et corollam, luteo-rubra, coronata. Semen 1, ovatum, sexsulcatum. *Lour. In ramis arborum hortensium Cochinchinae. h.*

β. grandiflori:

76. *L. dichroos* Mart.; glaber; ramis teretibus; foliis oppositis, obovatis, emarginatis, crasse coriaceis, haud venosis; pedunculis axillaribus, solitariis, dichotomis: ramis 2-3-floris; floribus bicoloribus; bracteis cupuliformibus, germine brevioribus, unidentatis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami validi, subnodosi, virides. Folia basi attenuata, glaucescenti-viridia, $2\frac{1}{2}$ -5 poll., $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata. Petioli crassi, supra plani, 4-5 lin.. Pedunculi teretiusculi, 3 lin.; rami patentes, 3-4 lin., apice bractea suborbiculari concava extus in dentem expansa; pedicelli teretiusculi, 5 lin.. Cupulae glabrae, lineae, extus dente ovato, acuto. Flores 18-20 lin., coccinei, apice virides; inexpandi basi incrassati, apice clavati, acuti. Cal. crenato-dentatus, $1\frac{1}{2}$ lin.. Pet. 6, linearia, acuta, supra medium patentia-reflexa. Stam. petalis breviora; filamenta filiformia, 3 longiora 7 lin.; antherae lineari-oblongae, flavae. Germina cum calyce $2\frac{1}{2}$ lin.. Stylus longitudine petalorum, basi crassior,

apice obsolete articulatus. Stigma capitatum.

In provinc.

Sebastianopolitana Brasiliae. †.

77. *L. dichotomus Ruiz et Pav.*; pedunculis geminis, dichotomis; bractea semicyathiformi; foliis 3-4-nis, oblongis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 45. t. 274. f. a. Kern. h. semperv. t. 261.* *L. fol. ovato-ellipticis, apice rotundatis, crasso-coriaceis, margine revolutis, supra nitidis, subtus glaucescentibus; pedunculis axillaribus, subdichotomis, plurifloris; petalis in tubum connatis. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 455. n. 5. L. clusiaefolius; fol. ovatis, obtusis, basi angustatis, margine revolutis, subtus glaucis; corollis longissimis, tubulosis. Reliqu. Willd. Ms. (fid. de Schlechtend. fl.)*

Frutex parasiticus, glaberrimus. Radix ramoso-fibrosa. Caulis erecto-patulus, ramosus, teres, geniculatus, granulatus; rami similes, saepius terni, rarius quaterni. Folia verticillata, 3-4, praesertim terminalia, breviter petiolata, oblonga oblongo-ovataque, integerrima, crassa, plerumque bipalmata, $1\frac{1}{2}$ palmata, parum venosa. Pedunculi gemini, ad singula interstitia foliorum verticillatim dependentes, dichotomi, 2-3-furcati, 4-6-flori, breves, articulati, compressiusculi. Cal. fructus cyathiformis, concavo-planus, extus parum protensus; floris tubulosus, brevis, marginalis, denticulis 6 vix manifestis. Cor. fere $1\frac{1}{2}$ palmaris, pendula, inferne punicea, superne lutea, 6-fida; laciniis divergentibus revolutis. Antherae incumbentes luteae. Stylus filiformis. Stigma turbinatum, parvum, derasum. Bacea ovalis, viridi-lutescens, calyce dimidio coronata. Semen ovale, lutescens. *Ruiz et Pav.* Folia basi in petiolum decurrentia, obsolete venosa, 5 fere poll., $2\frac{1}{2}$ poll. lata. Petioli 8-9 lin., teretes, crassi, glabri. Flores 3 poll. et ultra. Cal. margo integer glaber. Petala 6 rubra, glabra, angustissime linearia, in tubum connata, apice paulo dilatata, concava et patienti-reflexa. Stam. corollam subaequantia. Germen cylindraceo-ovatum, $2\frac{1}{2}$ lin.. Stigma clavato-capitatum. *Kunth l. c. In ripa Orinocensi prope S. Balthasar, H. et B., in Peruviae Andium nemoribus R. et Pav. †.*

78. *L. crassifolius Mart.*; ramis teretibus; foliis oppositis, late ovatis, obtusis, margine subrevolutis, crasse coriaceis; pedunculis axillaribus 1-5, dichotomis; floribus binis ternisve, pedicellatis, longe tubulosis; tubo supra medium ventricoso, fauce constricta; bractea cupuliformi. *De Mart. Fl. Brasil. ined.*

Rami validi, nodosi, fusco-cinerei, superne lepidoto-rufi. Folia basi vix attenuata, nervo medio subtus prominulo et ad latus sulcato, avenia, 3-4 poll., $2-2\frac{1}{2}$ poll. lata. Petioli 3-4 lin.. Pedunculi teretes, lepidoto-rugulosi, rufi, 2-5 lin.; rami patentes vel reflexi, $2-2\frac{1}{2}$ lin., apice bractea ovata, obtusiuscula, concava, $\frac{1}{2}$ lin.; pedicelli subtrigoni, rufi, lepidoto-rugulosi, $2\frac{1}{2}$ lin.. Cupulae glabriusculae, $\frac{1}{2}$ lin., extus dente brevi, ovato, acuto. Flores $2-2\frac{1}{2}$ poll., purpurascens. Cal. $\frac{3}{4}$ lin., denticulatus. Cor. tubus basi gracilis, glabriusculus; lacinae 6, lineares, apice

patentes, $\frac{1}{2}$ poll.. Stamina corollâ breviora, aequalia; filamenta $\frac{1}{2}$ lin.; antherae lineares, flavae, subsessiles. Germina cum calyce 2 lin.. Stylus corollâ longior, filiformis. Stigma oblongo-capitatum. *L. dichotomo* proximus; sed abunde diversus; an huc forte potius *L. clusiaefolius Willd. Herb.?* In sylvis Japuren-sibus provinc. Rio Negro Brasiliae. \dagger .

79. *L. Mutisii Humb. et Bonpl.*; foliis ternis, subsessilibus, suboblique elliptico-oblongis aut obovatis, apice rotundatis, crasso-coriaceis; pedunculis axillaribus, paucifloris, ebracteatis; floribus longissimis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 455. n. 2.* *L.* foliis rotundato-ellipticis, coriaceis; corymbis axillaribus, pedunculatis, 4-5-floris; corollis longissimis, tubulosis. *Rel. Willd. Ms. fid. de Schlechtendal fl. LORANTHUS longiflorus Mutis Ms.*

Rami teretes, rimosi, glabri. Folia saepius obliqua, basi cuneata, obsolete venosa, glabra, $2\frac{1}{2}$ -5 poll., $1\frac{1}{2}$ poll. lata. Pedunculi dichotomi? glabri, articulis abbreviatis, apice membranaceo-ampliatis. Flores $\frac{1}{2}$ ped.. Cal. margo irregulariter 6-dentatus, glaber, dentibus acuminatis. Petala 6 glabra, angustissima, connata? Germen oblongo-cylindricum, glabrum, 2- $2\frac{1}{2}$ lin., pedicello apice ampliato calyculatum. Stylus longitudine staminum. *Kunth l. c. Prope S. Fe de Bogota. †.*

3. *Pedunculi axillares dichotomi, terminales cymosi vel subpaniculati. (Omnes grandiflori).*

80. *L. grandifolius Mart.*; ramis teretibus; foliis oppositis, breviter petiolatis, ovato-lanceolatis, acuminatis, crassis; pedunculis dichotomis, terminalibus 3-4, axillaribus solitariis; floribus pedicellatis, ternis, tomentosis: bracteâ cupuliformi unidentatâ. *De Mart. Fl. Bras. ined.*

Rami robusti, oppositi et dichotomi, nodosi, virides. Folia patentia, nervo medio valde prominente, pallide viridia, subtus ferruginea (in siccis), 4-7 poll., $1\frac{1}{2}$ -5 poll. lata. Petioli crassi, canaliculati, 3 lin.. Pedunculi subcymosi, erecti, teretes, 3-4 lin.; rami 2, tenuissime tomentosi, 3- $3\frac{1}{2}$ lin., extus teretes et apice bracteâ late ovatâ, acutâ, lineae, intus plana apice cum denticulo parvo; pedicelli tenuissime cinerascenti-tomentosi, 3-4 lin.. Cupulae germine duplo breviores, cinereo-tomentosae, obsolete repando-dentatae, extus dente ovato acuminato, carinato. Flores $1\frac{1}{2}$ -2 poll., purpurascens (?), extus tomento tenui, cinerascenti. Cal. $\frac{1}{2}$ lin., subinteger. Pet. 6, linearia, obtusiuscula, basi apiceque latiora. Filamenta 3 longiora, petala subaequantia, 6 lin.. Antherae oblongo-lineares, flavae 2 lin.. Squamae ad basin petalorum 6, lanceolatae, acutae, $\frac{1}{2}$ lin.. Germina cum calyce $1\frac{1}{2}$ lin., tenuiter tomentosa. Stylus longitudine corollae, apice bis subarticulato-incrassatus. Stigma globoso-capitatum. *In sylvis Japuren-sibus prov. Rio Negro Brasiliae. †.*

81. *L. biternatus C. a Hoffmanns.*; ramis teretibus; foliis suboppositis, petiolatis, ellipticis, obtusis, crassis, glaucis; pedunculis axillaribus terminalibusque, inferioribus solita-

riis dichotomis, superioribus subpaniculatis; floribus pedicellatis, pubescentibus; bracteis ovatis.

Rami sat validi, oppositi alternique vel dichotomi, nodosi, viridifuscescentes, tenuissime pubescentes, et juniores veluti rore glaucescenti. Folia opposita et subopposita, patentia, elliptica vel ovato-elliptica, subnervia, sub lente punctata, rore glauco, sicca sub rore ferruginea, margine quidquam calloso, in siccis plerumque nigricante; $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll., 12-18 lin. lata. Petioli tenuissime pubescentes, supra plani, subtus convexi, crassiusculi, 5 lin.. Pedunculi terminales pauci vel nulli, axillares solitarii, foliis multo breviores, inferiores dichotomi, biternati 6-flori, superiores subpaniculatim divisi, 12-flori; omnes teretiusculi, fere glabri, apice quidquam incrassati; rami vel ramuli erecto-patentes, triflori, 2 - $2\frac{1}{2}$ lin., apice extus in bracteam ovatam subcucullatam obtusiusculam integerrimam $\frac{1}{2}$ lin. longam producti; pedicelli similes, medius erectus, laterales quidquam longiores et patentes, omnes sub lente tenuiter pubescentes, $2\frac{1}{2}$ -3 lin., apice in bracteam acutam concavam subcarinatam integerrimam tenuissime pubescentem germen subaequantem, lin. fere longam transeuntes. Flores tenuiter pubescentes, ut videtur, rubri, 12-18 fere lin., inexpansi apice subclavati, obtusiusculi, basi dilatati. Cal. hypocrateriformis, integer, sub lente tenuiter pubescens. Petala 6 linearia, acuta, basi dilatata, erecta, vel apice tantum subpatentia, extus pubescentissima, marginibus infra medium crenato-denticulatis, basi $\frac{1}{2}$ lin. lata. Stamina petalis breviora; 5 alterna longiora. Filamenta medio petalorum inserta, erecta, filiformia, apice subulata, longiora 7 lin.. Antherae oblongae, acutae, paulo infra medium affixae, versatiles, flavae, $1\frac{1}{2}$ lin.. Squamae ad basin dilatatae concavam petalorum 6 lanceolatae, acutae, glabrae, erectae, flavae, lin.. Stylus petala paulo superans, erectus, filiformis, apice bis geniculato-flexus. Stigma capitatum. Germen ovatum, glabrum, sub lente pubescentissima, vix ultra lin. longum. Ad *Herb. Willd.* In *Brasilia. Com. a Hoffmannsegg. t.*

82. *L. robustus Mart.*; glaber; ramis tetragonis; foliis oppositis, decussatis, breviter petiolatis, oblongo-ovatis, obtusis, crassis; pedunculis terminalibus et in summis axillis corymboso-congestis, trifloris; floribus erectis; bracteis suborbicularibus, brevibus. *De Martius Fl. Brasil. ined.*

Rami robusti, oppositi geminique, nodosi, virides. Folia suberecta, enervia, pallide viridia, $2\frac{1}{2}$ -3 poll., $1\frac{1}{2}$ poll., valde crassa. Petioli $1\frac{1}{2}$ lin., crassi. Pedunculi terminales circiter 6, in axillis rariores, suberecti, teretiusculi, 4 lin., apice bracteam ovatam acutam concavam, integerrimam vel tridentato-laceram; pedicelli 3 lin., apice bracteam fere cupuliformi, integerrimam vel subinde denticulatam, $\frac{1}{2}$ lin.. Flores flavi, glabri, $2\frac{1}{2}$ -3 poll., inexpansi tubulosi, graciles, angulosi, apice clavati. Cal. obtuse crenato-dentatus. Pet. 6 linearia, acuta, infra medium reflexa. Filamenta petalis paulo breviora, flava, filiformia, 3 longiora. Antherae lineares, flavae. Germina cum calyce 2 lin.. Stylus corolla paulo longior, filiformis. Stigma capitatum. In *sybis Japurensibus prov. Rio Negro Brasiliae. t.*

83. **L. americanus*; racemis subramosis, cymosis; flo-

ribus subnutantibus; foliis ovatis, difformibus. *Swartz Obs.* 132. *Linn. Spec.* I. p. 531. II. ed. p. 472. (excl. syn. *Browne* monente *Linn. Mant.* p. 569.). *Amoen. acad.* V. p. 596. *Willd. Spec.* II. p. 255. *Jacq. Amer.* 97. t. 67. pict. p. 50. t. 98. (excl. syn. *Browne*). *Lam. Ill.* t. 258. f. 1. *Plum. gen.* 17. ic. 166. f. 1. (fid. *Linn.*).

Rami erectiusculi. Folia lanceolato-ovata. Spicae oppositae, compositae, quasi ramosae. *Linn.* Fruticosus, ramosus, diffusus, fragilis, praecipue in *Coccoloba grandifolia* nascens. Folia subovata, crassa, coriacea, avenia, integra, nitida, petiolata, opposita, rarius alterna, plerumque praemorsa et fere omnia difformia, pallida. Corymbi ramosi, inaequales, axillares et terminales; ramuli ultimi saepius triflori. Flores numerosi, inodori, coccinei, elegantes, pedunculati, $1\frac{1}{2}$ poll., penduli. Calyx fructus concavus ore inaequali, floris margo inaequalis. Petala acuta, longissima, ultra medietatem corollam 1-petalam tubulosam hexagonam incurvam mentientia; limbus patens, subsecundus. Stamina longitudine corollae; antheris obtusis. *Linnaeus* in *Syst. Nat.* p. 988. hanc plantam confudit cum *Scurrula* I. *Browne* et cum *Löfflingiana Stelide* I., quae, etiamsi ejusdem generis, specie a *Plumeriana* evidenter differunt, ut patebit ex descriptione. *Jacq.* Petioli breves, compressi, glabri. Racemi cymas mentientes; ramulis trigonis. Pet. superne patentia, revoluta; corollae inexplicatae parum curvae. Filamenta petalis supra medium affixa, purpurea. Antherae verticales, luteae. Stylus longitudine corollae. Stigma pubescens. Bacca ovata. *Swartz.* In *Americae arboribus; in Jamaica.* h.

Obs. 1. *Desrousseaux* monuit in *Lam. Enc.* I. e. se non consentire cum *Gaertner*, qui ad *Loniceram Zeylanicam* ducit *Plum.* t. 166. f. 1. Se vidisse plantam *Plumieri* in *Herb. Juss.*, quae etiam a *Jacquini* planta ablutere videtur. Sunt nempe illi „folia ovato-oblonga, obtusiuscula, integerrima, obscure viridia, basi in petiolum attenuata, 3 circiter poll., 15-20 lin. lata, nervis 5-7 longitudinalibus, parum prominulis, margine altero magis convexo. Flores subcymosi in pedunculis duplicato-ternatis. Corollae satia verticales, tubo medio inflato, apice incurvo collum caputque anseris referentes. Bacca turbinata, nigrescens, magnitudine cerasi.“

Obs. 2. *LORANTHUS americanus Sieber Herb. Martin.* n. 95 L. *americano Jacq.* affinis; sed tamen diversus, et forte nova species. Differentia a planta *Jacquini* patebit ex descriptione: rami crassitie pennae anserinae, inferne teretes, superne compressi, glabri, erecti, fusi (?). Folia magna, opposita alternaque, breviter petiolata, crassa, coriacea, subavenia, difformia, plerumque late ovata, basi angustata obliqua, integerrima, sed vario modo mutilata, obtusa vel acutiuscula, acuminataque, utrinque glaberrima, 4-5 poll., $2\frac{1}{3}$ -4 poll. lata. Petioli breves, torti, glabri, supra plani, dorso convexi, crassi, 4-5 lin. Pedunculi in apicibus ramorum 6 et plures, corymboso-congesti, articulati, erecti vel suberecti, teretes, glabri, inaequales, dichotome biflori, $\frac{1}{2}$ -1 poll.; ad dichotomiam bractea circularis, brevis, uno latere quidquam producta, ovata, obtusa. Pedicelli omnino pedunculis similes, sed paulo breviores, erecto-patentes, apice quidquam incrassati et in cupulam cyathiformem, glabram, integerrimam, germine duplo breviorum, ore quidquam inaequalem transeuntes. Calyx margo acetabuliformis, truncatus, integer, glaber, germine brevior. Corolla erecta, coccinea, glaberrima, $1\frac{1}{2}$ poll., inexpansa subcylindrica vel obsolete 6-angulata, apice clavato-dilatata, acutiuscula; expansa ad basin usque 6-fida, lacinae (v. petala) lineares, angustae, involutae, apice basique quidquam dilatatae, basi tubum mentientes, superne patentia, subsecundae. Filamenta corollae breviora, ejusque laciniis medio inserta et decurrentia, apice subulata. Antherae dorso affixae, lineares, obtusae, $1\frac{1}{2}$ lin., polline luteo. Stylus stamina paulo superans, longitudine corollae, erectus vel inflexus, glaber, coloratus, obsolete 6 angularis; stigmatem parvo, clavato-truncato, intensius colorato. Germen rotundato-ovatum, glabrum.

84. *L. furcatus Martius*; glaber; ramulis apice tetra-

gonis; foliis oppositis, obovatis, emarginatis vel obtusis, crasso-coriaceis, subnervibus: pedunculis axillaribus terminalibusque solitariis binis ternisque, dichotome 2-6-floris, bracteatis: floribus pedicellatis, basi tubulosis. *De Martius Fl. Brasil. ined.*

Rami oppositi, nodosi, flavescenti-vel cinerascenti-virides. Folia emarginata cum mucronulo brevissimo, basi attenuata, nervo medio quidquam prominulo, pallide-vicidia, 1 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ poll., 8-18 lin. lata. Petioli supra plani, 2 lin.. Pedunculi axillares 1-2, terminales plerumque terni, teretiusculi, 4 lin.; partiales 2-5 lin., 5-rarius 1-flori; pedicelli compresso-tetragoni, fusci, 4-5 lin.. Bractee ovatae, acutiusculae, concavae, fuscae, $\frac{1}{2}$ lin.; summae cupuliformes, carinatae, obsolete bidentatae, fuscae, lineae, germine triplo breviores. Cal. obsolete 5-6 dentatus, purpureus, vix lineae. Cor. inferne coccineae, superne pallidiores, intus flavae, 1-1 $\frac{1}{2}$ poll., inexpanse rectae, apice clavatae, expansae fere hexapetalae; lacinae (v. petala) acutae, apice patienti-reflexae. Stamina corollae paulo breviora, 3 longiora; filamenta flava, 6-7 lin.. Antherae flavae, oblongae. Germina cum calyce 2 lin., ovata. Stylus staminibus paulo longior, infra apicem articulato-inerassatus. Stigma ovato-capitatum. *In sylvis ad flumen S. Francisci Brasiliae. h.*

85. *L. divaricatus* Humb. et Bonpl.; ramis divaricatis; foliis oblongis aut ellipticis, apice rotundatis, coriaceis, glaucescenti-(?) viridibus; pedunculis in apice ramulorum paniculatis, trifloris, ebracteatis; floribus pedicellatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 455. n. 4.* *L. divaricatus*; racemis cymosis, axillaribus terminalibusque; pedicellis 5-floris; foliis ovato-oblongis; obtusis, glaucis. *Reliqu. Willd. Ms.*

Rami suboppositi, teretes, laeves, glabri, virescentes. Folia subopposita, brevissime petiolata, subavenia, glabra, 10-15 lin., 5-9 lin. lata. Petioli glabri. Paniculae foliatae, ramis glabris: primariis oppositis (?), secundariis ternis: ramulis trifidis, trifloris. Flores pedicellati, pollicares et ultra. Pedicelli 2 lin. (intermedius paulo brevior) apice ampliato membranacei et cupuliformes; cupulam integram, glabram, germen calyculi instar cingens, ipsoque duplo brevior. Cal. cupuliformis, obsolete 6-dentatus, glaber. Petala 6 glabra, linearia. Germen minutum, semiglobosum, glabrum. Stigma subcapitatum, Bacca ovato-oblonga, laevis, glabra, monosperma? magnitudine fabae Coffeae. *Kunth l. c.* *Cum dichotomo. h.*

86. *L. brasiliensis* Desrouss.; hexapetalus; foliis lanceolato-ovatis; corollis ante florescentiam longe tubulosis, rectis, clavatis. *Lam. Enc. III. p. 526.* *Willd. Spec. II. p. 237.* Folia similia AVICENNIAE tomentosae, sed glaberrima, uti tota planta. Caules lignosi, teretes. Rami flavicantes. Folia petiolata, alterna, raro opposita, integerrima, glabra, supra lucida, mediocriter crassa, oblique nervosa, 3-3 $\frac{1}{2}$ poll., 12-15 lin. lata. Petioli canaliculati, 3-4 lin.. Flores in apice ramorum in pedunculis plerumque biternatis, aliis solitariis e foliorum supremorum axillis. Sub pedunculis tribus turbinatis, 3 lin., bractea adest squa-

mosa. Cal. margo erectus, membranaceus, obsolete dentatus. Cor. tubus ante expansionem rectus, hexagonus, 18 lin., apice clavatus, dein ad basin usque finditur in petala 6 linearia, apice quidquam latiora. Stam. 6 petalis quidquam breviora. Filamenta tertia tantum, supremâ, parte libera. Antherae oblongae. *Desrouss. In Brasilia. Herb. de Jussieu. t.*

87. *L. bicalyculatus Martius*; ramis teretibus; foliis oppositis, cordato-ovatis, obtusis, subamplexicaulibus, crassis, glaucis; paniculis terminalibus, dichotomis, bracteatis; pedunculis 2-5-floris, tomentosiss; germinibus bractea cupulaeformi tomentosâ: *De Martius Fl. Brasil. ined.*

Caules nodosi cortice flavescenti-cinereo; rami divergentes, glabri, apice glauci. Folia sessilia, margine subcallosa, subtus venosa, densa, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll., 1- $1\frac{1}{2}$ poll. lata. Paniculae vix folia superantes, 6-9-florae, bi-vel trichotomae; rami divergentes bractea ovato-cucullata flavo-tomentosâ; ramuli densius tomentosi; pedicelli compresso-tetragoni, 2 lin. longi; laterales medio longiores, tomento lutescente, apice in cupulam cyathiformem, truncatam, quadri-carinatum, bidentatam, flavescenti-tomentosam $\frac{1}{2}$ lin., germen ad $\frac{2}{3}$ laxe eingentem transeuntes. Flores coccinei, apice extus tenuissime tomentosi, 14 lin., inexpandi tubulosi, crassitie pennae corvi. Calyx acetabuliformis, glaber, fere lineae, denticulis 6 obsolete, coccineus. Petala 6, linearia, obtusiuscula. Stamina 3 breviora; filamenta coccinea, $\frac{1}{2}$ poll.; antherae $1\frac{1}{2}$ lin., flavae. Stylus petala superans, staminibus longior, purpurascens. Stigma capitatum. Baccae glaberrimae, 3 lin. longae, cupula duplo triplove longiores. *In sylvis provinciae Piauiensis Brasiliae, t.*

88. *L. cordatus C. a Hoffmanns.*; ramis teretibus; foliis oppositis, e basi cordata amplexicauli longe acuminatis, coriaceis, 3-5-tuplinerviis; floribus in apicibus ramorum summisque axillis racemoso-paniculatis; pedunculis bifloris, subtomentosis; bracteis cupulaeformibus.

Rami oppositi, glabri, subnodosi, cinereo-flavescentes, crassitie pennae anserinae. Folia patentia vel erecto-patientia, basi omnino cordata, sed mox in acumen longum obtusiusculum protensa, margine callosa et subundulata, glabra, sub lente punctis crebris micaceis, utrinque nervis 3-5 prominentibus, ad apicem fere usque excurrentibus, per nervulos numerosos junctis. 2-4 poll., basi 12-22 lin. lata. Paniculae racemosae in apicibus ramorum plerumque ternae, in summis alis solitariae, erectae, folia vix superantes; pedunculus communis teres, basi apiceque incrassatus, glabriusculus, bractea fere orbiculari brevi; ramuli erecto-patientes, subtomentosi, intus plani, dorso convexi et subcarinati, margine angulis 2 acutis, 3 circiter lin., apice extus bractea cucullata, ovata, carinata, acuta, minus tomentosâ, erecto-patiente, pedicellos subaequante, intus bractea late ovata acutiuscula multo minori; pedicelli plerumque bini, ramulis similes, 2-3 lin., tomentosi, tomento saepius flavescente, apice in cupulam cyathiformem truncatam 2-3 carinatum obsolete denticulatam flavescenti-tomentosam germen subaequantem $1\frac{1}{2}$ -2 lin., $1\frac{1}{2}$ lin. in diametro transeuntes. Flores rubri, ut videtur, glabri vel apice sub lente subtomentosi, 12-16 lin.; in-

inexpansi apice subclavati, erecti, obtusiusculi. Cal. acetabuliformis, glaber, lin., obsolete denticulatus. Petala 6 linearia, acuta, $\frac{1}{2}$ lin. lata, supra medium patentia. Filamenta medio petalorum inserta iisque breviora; 3 longiora $\frac{1}{2}$ poll., sulcata (in siccis), apice subulata, erecta. Antherae oblongae, obtusae, flavae, biloculares, 1 lin.. Stylus longitudine petalorum, staminibus longior, erectus, filiformis, sulcatus (?). Stigma capitatum, glabrum. Germen ovatum, glabrum, in cupula absconditum. Ad *Herb. Willd.* In *Brasilia. Com. a Hoffmannsegg.* h.

89. *L. falcifrons Mart.*; glaber; ramis teretibus; foliis oppositis, sessilibus, oblongo-lanceolatis, subfalcatis, tripli-vel quintuplinervibus, coriaceis; paniculis terminalibus axillaribusque, subdichotomis; floribus ternis, glabris; pedicellis bracteam aequantibus, in cupulas germina multo superantes productis. — β . fol. brevioribus, ovato-oblongis, vix falcatis. *De Martins Fl. Brasil. ined.*

Rami dichotomi et oppositi, divergentes, nodosi, albide cinerei, verruculosi. Folia arcuato-deflexa vel patentia, obtusiuscula, nervis ad apicem fere excurrentibus, fuscescenti-viridia (juniora glaucescentia), $2\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ poll., $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata. Paniculae axillares solitariae, terminales 3, 2-3-chotomae; pedunculi communes $\frac{1}{2}$ -1 poll., teretes; rami patentis, supra plani, angulis 2 flavescenti-callosis, 5-6 lin.; pedicelli 3 subtrigoni, medius lineam paulo brevior; ad eorum basin bractea ovata, cucullato-concava, acuta, lineae. Cupula urceolata, irregulariter 5-dentata, 2 lin.. Flores aurei, basi intensius colorati, 14-18 lin.; inexpansi angulosi, acutiusculi, apice incurvi. Cal. brevissimus, denticulatus. Petala 6, linearia, acuta, supra medium reflexa. Filamenta petalis breviora, 3 longiora, flava, 5-6 lin.. Antherae oblongae, lineae, flavae. Stylus longitudine petalorum, apice subflexuosus. Stigma oblongo-capitatum. Bacca ovata, longitudine cupulae. — In β folia basi inaequalia, rarissime falcata, $2\frac{1}{2}$ -3 poll., 1- $1\frac{1}{2}$ poll. lata; paniculae minores; flores flavo-aurantiaci. In *sybis Japurensibus provinciae Rio Negro Brasiliae.* h.

90. *L. mexicanus Presl*; glaber; ramis teretibus; foliis oppositis, subsessilibus, ovato-lanceolatis, subfalcatis, tripli-vel quintuplinervibus, coriaceis; paniculis terminalibus axillaribusque, subdichotomis; floribus ternis, velutinis; pedicellis bracteam brevioribus in cupulas germina multo superantes productis. *Reliq. Haenk. ined.*

L. falcifronti valde affinis, ut tantum foliis majoribus, pedicellis brevioribus crassioribusque, cupulis majoribus, corollis extus velutinis differat. Rami oppositi et forte dichotomi, nodosi, crassitie pennae anserinae, glabri, cortice viridi-cinerascenti glabro. Folia patentia, vel inferiora subarcuato-deflexa, ovato-lanceolata vel oblongo-lanceolata, acuta vel obtusiuscula, in petiolum brevissimum attenuata, falcata vel basi tantum quidquam obliqua, utrinque glaberrima, nervis ad apicem fere usque excurrentibus, prominentibus, 3-5 poll., 1-2 poll. lata. Paniculae in summis axillis solitariae, terminales plerumque ternae, 2-3-chotomae, 2-poll.. Pedunculus communis teres, glaber, 6-8 lin.; rami

erecto-patentes, dorso convexi, supra plani, et ad margines angulis callosis, 5-6 lin.. Flores terni, erecti, laterales in pedicellis crassis vix ultra $\frac{1}{2}$ lin. angulosi, medius subsessilis. Bractea ad florum basin unica ovata, acuta, cucullato-concava, subcarinata, glabra, flori medio appressa, 2 fere lin., basi 2 lin. lata. Cupulae urceolatae, a pedicellorum angulis productis 2-3-carinatae, glabrae, inaequaliter 2-3-denticulatae, 3 lin., 2 lin. in diametro, germen 4-plo superantes. Cal. brevissimus, hypocrateriformi-acetabuliformis, membranaceus, glaber. Cor. 18-20 lin., ut videtur aureae, extus praesertim apice velutinae; inexpancae angulosae et subclavatae, erectae; petala linearia, acuta, angusta, supra medium revoluta-reflexa. Stam. 6, petalis breviora, 3 longiora; filamenta erecta, subulata, 6-7 lin.; antherae oblongae, obtusae, flavae, $1\frac{1}{2}$ fere lin.. Stylus longitudine corollae, filiformis, erectus, glaber. Stigma capitatum. Germen ovatum, glabrum, vix lineae. *In Mexico. Haenke. h.*

91. *L. acinarius Mart.*; foliis lanceolatis, acuminatis, obliquis, subfalcatis, glabris, crassis, haud venosis; cymis 5-partitis; ramulis 3-floris; floribus pedicellatis; bracteis cupuliformibus, magnis, truncatis, subintegris; calycibus 6-dentatis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Folia uno latere magis curva, 4-5 poll., 2 poll. lata. Petioli crassi, supra plani, 2 lin. longi latique. Pedunculus teretiusculus, crassitie pennae anserinae, $1\frac{1}{3}$ poll.; rami 8 lin., extus in bracteam ovatam, acutiuseculam, lineam longam producti; pedicelli obsolete trigoni, 3-6 lin.. Cupulae subcylindricae, integerrimae vel crenis irregularibus, glabrae, 3 lin., 3 lin. in diametro. Flores glabri, $1\frac{1}{2}$ poll.; inexpansi clavati obtusiusculi. Cal. dentibus 6 ovatis, rotundatis, $1\frac{1}{2}$ lin. longus. Pet. 6, linearia, basi apiceque latiora. Stam. petalis breviora; filamenta 3 longiora, subulata, 5 lin.; antherae oblongo-lineares, $1\frac{1}{2}$ lin., flavae. Germina cupulam superantia, cum calyce 4 lin.. Stylus longitudine petalorum, apice bis articulato-incrassatus. Stigma obtusum, subobliquum. *In sylvis prov. Piauhensis Brasiliae. h.*

92. *L. cucullaris Lam.*; foliis lato-lanceolatis, (sub) falcatis, nervosis; bracteis cordatis, basi cucullatis, sub 3-floris. *Lamarck Journ. d'Hist. nat. p. 445. t. 25. Poir. Enc. Suppl. III. p. 497.*

Frutex vel suffrutex, siccatione niger; ramis teretibus, geniculis nodosis. Folia acuta, coriacea, integerrima, 3-4-poll., $1\frac{1}{2}$ poll. lata, in petiolum attenuata. Pedunculi terminales axillaresque, subpaniculati, crassiusculi, oppositi, semel pluriesve dichotomi. Flores in bracteis pollicaribus sessiles, ante explicationem cornu subsimiles. Cal. exterior maximus, subtridentatus, urceolatus. Cor. lacinae lineares, revolutae, glabrae, $1\frac{1}{2}$ poll., 6, rarius 5. Stamina totidem, corollâ longiora, antheris cordatis. Germen pentagonum, apice truncatum. Stylus longitudine staminum. Stigma ovatum *Lam.* An hujus generis? *In Guyana. h.*

4. *Paniculae terminales axillaresve.*

93. *L. rufus Mart.*; ramis teretibus; foliis suboppositis, breviter petiolatis, ovato-oblongis, longe acuminatis, co-

riaceis; spicis terminalibus paniculatis; rhachibus rufo-lepidotis; pedicellis brevissimis, trifloris, bracteatis. *De Martius Fl. Brasil. ined.*

Rami oppositi, longi, cinerei. Folia erecto-patentia, crassa, supra intense, subtus flavescenti-viridia, sub lente punctata, 3-5 poll., 10-18 lin. lata. Petioli canaliculati, 3-4 lin.. Panicula terminalis, diffusa, $\frac{1}{2}$ ped., e spicis 8-10 patentibus, subdistichis, 2 poll.; rhachis communis teretiuscula, erecta, lepidoto-granulosa, colore caryophyllorum; partiales similes subtrigonae; pedicelli densi. Bractee 3, ovatae, obtusiusculae, germen subaequant. Flores sessiles, $1\frac{1}{2}$ lin., albidi, inexpansi subovati. Cal. glaber, repando-dentatus. Petala 6, linearia, obtusiuscula, erecto-patentia, vix $\frac{1}{2}$ lin. lata. Filamenta petalis breviora, 3 longiora sterilia (?), reliqua brevissima, crassa, latere excavata. Antherae rotundato-ovatae, flavae. Stylus longitudine petalorum, subelavatus. Stigma obsoletum. Baccae ovato-oblongae, 5-lin.. *In sylvis Japurensibus prov. Rio Negro Brasiliae.* ♀.

94. *L. paniculatus* Humb. et Bonpl.; foliis ovato-ellipticis, utrinque acutis, subcoriaceis, glabris; paniculis terminalibus ramosis, diffusis; ramulis brevissimis trifloris. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 242. n. 24. *L. tetragonus*; floribus paniculatis, axillaribus; fol. ovatis, acuminatis, longioribus; ramis tetragonis. *Reliqu. Willd. Ms. (fid. de Schlechtendal fil.)*

Frutex parasiticus, ramis teretibus, laevibus, glabris; ramulis floriferis tetragonis. Folia obsolete venosa, nervo medio subtus prominente, 2 fere poll., 13-14 lin. lata. Petioli 4-5 lin., glabri. Paniculae ramis divaricatis; ramulis approximatis, apice tribracteatis, ramis rhachique glabris. Bractee minutae, ovatae, acutae, glabrae. Flores? Baccae sessiles, oblongae, laeves, glabrae, magnitudine fructus BERBERIDIS vulgaris, glaucescentes? Forte idem cum marginato. Kunth l. c. *Prope Cumanã in arboribus.* ♀.

95. *L. conduplicatus* Humb. et Bonpl.; foliis ovatis, subacuminatis, basi acutis, conduplicato-recurvatis, subcoriaceis, glabris; paniculis terminalibus, ramosissimis, foliatis; ramis geminis; nodis quadrangulato-ancipitibus; ramulis brevissimis, trifloris. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 441. n. 22. *L. anceps*; spicis ramosis; foliis subrotundo-ovatis, acuminatis; ramulis ancipiti-tetragonis. *Reliqu. Willd. Ms. (fide de Schlechtendal fil.)*

Simillimus marginato. Frutex parasiticus (ramis teretibus, fuscescentibus), ramulis tetragonis, laevibus, glabris. Folia (pallida), obsolete venosa, 24-27 lin., 14-17 lin. lata. Petioli 4-5 lin., glabri. Paniculae ramis oppositis: primariis geminis rhachique quadrangularibus et infra ramificationem (nodos?) dilatato ancipitibus, glabris; ramulis suboppositis, subapproximatis; bracteis subtribus brevissimis (ovatis), acutis. Flores (2-3) sessiles (pallidi) vix 2 lin.. Cal margo integer, glaber. Pet. glabra, 6, linearia, obtusiuscula. Stamina alterna longiora. (Filamenta pe-

talis infra medium inserta, plana, lateribus excavata; antherae subtriangulares, acutae, parvae, pallide flavae. Ad specim. a clo. *Bertero* lectum.) Germen semiglobosum, glabrum. Stylus longitudine staminum, superne paulo incrassatus. Stigma capitatum, verrucosum. Fructus? *Kunth* l. c. *Prope Cumanana et Cumanacoa.* h .

96. *L. avicularius Mart.*; glaber; ramis junioribus tetragonis; foliis suboppositis, ovatis, subacuminatis, coriaceis; paniculis axillaribus terminalibusque solitariis, diffusis, folio longioribus; ramis oppositis, basi bracteatis, floribus ternis, sessilibus, bracteatis. *De Mart. Fl. Bras. ined.*

Rami longi, tenues, teretes, cinerei, epidermide solubili. Folia patentia, basi subattenuata, nervis parum prominentibus, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., 9-12 lin. lata. Petioli 3 lin.. Paniculae 2-2 $\frac{1}{2}$ poll.; pedunculus communis compresso-tetragonus; rami plerumque 4 patentes, compresso-tetragoni, 9 lin., basi bractea lineari-lanceolata, acutiuscula, concava, lin.; ramuli suboppositi, $\frac{1}{2}$ lin.. Bracteae 3 ovatae, acutae, concavae; exterior major, $\frac{1}{2}$ lin.. Flores $1\frac{1}{2}$ lin.; inexpandi conico oblongi. Cal. obsoletus, subinteger. Pet. 6, lineari-lanceolata, acutiuscula. Stam. petalis duplo breviora; filamenta brevissima, crassa, ad latera excavata, 3 longiora apice contracta et dein capitata; antherae subtriangulares, flavae. Stylus longitudine staminum longiorum, apice subclavatus. Stigma obsoletum. Baccae ovatae, 2 lin.. *In Brasilia frequens, ubi Erva de Passerinho.* h .

97. *L. Theobromae Willd.*; foliis ovatis, acuminatis; floribus paniculatis, axillaribus terminalibusque foliis longioribus, sessilibus, aggregatis. *Reliqu. Willd. Ms.*

Rami patentes, subteretes, juniores tetragoni, verrucosi, cinerascens, hinc inde radicans. Folia breviter petiolata, ovata, obtuse acuminata, pollice haud multo longiora, dimidio latiora, valde fragilia. Paniculae axillares 3-4 poll.. Flores terni, brevissime pedicellati in apicibus ramorum paniculae, 2 circiter poll. longi. *De Schlechtendal fil.* An idem cum praecedente? *Ad Para Brasil. ubi Herva dos passeros.* In Theobromate Cacao. *Com. de Hoffmannsegg.* h .

98. *L. virgatus Mart.*; glaber; ramis radicanibus, superne tetragonis; foliis oppositis, ovatis, acuminatis, complicatis, subcoriaceis; paniculis axillaribus, solitariis, virgatis, folio triplo longioribus: ramis tetragonis, basi bracteatis: ramulis brevibus; floribus ternis, sessilibus, bracteatis. *De Martius Fl. Brasil. ined.*

Rami graciles, nodosi, inferne teretes, fuscescenti-cinerei, epidermide non solubili, saepe radiculis sat longis, rubro-fuscis. Folia patentia, basi subattenuata, nervosa, 2-2 $\frac{1}{2}$ poll., 13-15 lin. lata. Petioli 2-3 lin.. Paniculae patentes, 4-5 $\frac{1}{2}$ poll.; pedunculi compresso-tetragoni; rami 6-8, divergentes, 2-2 $\frac{1}{2}$ poll., basi bractea decidua, lanceolato-subulata, lineae; ramuli oppositi alternique, patentes, $\frac{1}{2}$ -1 lin.. Bracteae 3, ovatae, laterales obtusae, media acuta $\frac{1}{2}$ lin.. Flores $\frac{1}{2}$ lin.; inexpandi oblongo-ovati. Cal. integerrimus. Pet. 6, lineari-lanceolata, supra medium reflexa. Stam. petalis breviora; filamenta crassa, breviss-

sima, superne ad latera excavata, 3 longiora apice attenuata et dein capitata; antherae subtriangulares, flavae. Germina $\frac{1}{2}$ lin.. Stylus longitudine petalorum, apice crassior. Stigma capitatum subobliquum, verruculosum. *L. aviculario* proximus; sed differt praesertim foliis magis acuminatis, complicatis; paniculis multo majoribus, et stigmatibus capitato, verruculoso, subobliquo. *In sylvis Japurensibus prov. Rio Negro Brasiliae.* \bar{h} .

99. *L. patulus* Jack; foliis oppositis, elliptico-ovatis, glabris; floribus longe pedicellatis, paniculato-racemosis, axillaribus aut sub foliis; tubo corollae acute hexagono, longitudine laciniarum limbi. *Jack Ms. apud Wallich in Roxb. Fl. ined. ed. Car. et Wall. II. p. 214.*

Rami glabri. Folia obtusiuscula, integerrima, coriacea, 3 fere poll. Racemi foliis breviores. Bracteae 2-3, germen calycis ad instar ambientes. Cal. margo integer. Cor. viridis, apice dilute rubra, basi purpurascens: tubo corollae clavato, limbo 6-partito, laciniis longitudine tubi, angustis, revolutis. Stam. 6, erecta, styli longitudine. Stigma capitatum. Bacca subglobosa. *Jack. In interioribus Bencolen.* \bar{h} .

5. Racemi;

a. terminales, vel terminales axillaresque:

100. **L. europaeus*; racemis simplicibus, terminalibus; floribus dioicis. *Linn. Spec. p. 1672. Willd. Spec. II. p. 233. Jacq. Vind. 230. t. 3. Austr. 1. p. 20. t. 30. Pall. Iter. 1. 372. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 605. Roth En. pl. Germ. I. p. 8. Tenor. Fl. neap. 1. p. 192. n. 213. Plenck Off. t. 248. Schkuhr Handb. t. 99. Sturm D. Fl. 34.* „Statura *Visci albi*. Calyx obsolete 6-dentatus. Petala et stamina 6. Germen inferum. Bacca monosperma, flavescens.“ *Linn. Frutex dichotome ramosissimus, diffusus, 2-4 ped.; cortice fusco, glabro, cicatricibus notato; rami virides teretes, apice compressi. Folia obovato-oblonga, in petiolum brevem attenuata, obtusa, integerrima vel obsolete repanda, opposita, 1-1 $\frac{1}{2}$ poll., $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ poll. lata, viridia, venis adscendentibus. Racemi 6-18-flori, poll. Flores flavescenti-virides, oppositi, sessiles vel subsessiles. Calyx margo parvus, germen coronans. Petala 6, rarissime 4-5 vel 7, patentia, in floribus sterilibus lanceolata, acutiuscula, in fertilibus oblonga, obtusa. Filamenta 6, rarius pauciora (4-5) vel plura, subulata, crassa, petalis breviora. Antherae crassae, obtusae, erectae. Stylus subulatus erectus, longitudine variâ. Stigma in fertilibus obtusum, subcapitatum; in sterilibus vix conspicuum. Bacca flavens, nitida, subrotunda, basi in pedicellum attenuata. Semen solitarium, subovatum, fuscum. *In quercubus Europae meridionalis, orientalis; in Sibiria; non in Gallia.* \bar{h} .*

101. *L. floribundus* Labill.; pedicellis racemorum trifloris; bracteis ternis; caule arboreo; foliis linearibus obtusis. *Labill. nov. Holl. t. 113.*

Arbor 15-20 ped., crassitie 1 $\frac{1}{2}$ ped., ramis numerosis, divergentibus. Folia sessilia, alterna, crassa, integerrima, 3-4 poll., utrinque glabra. Racemi simplices, terminales, 5-6 poll., basi

squamis aliquot foliaceis. Pedicelli vix longitudine corollae, bracteis 5 ovatis. Cal. dentibus 5 - 5 inaequalibus. Petala 6, linearia, sulfurea, staminibus totidem medio petalorum insertis iisdemque brevioribus. Antherae subhastatae. Germen turbinatum, subtrigonum. Stylus subulatus, striatus, corollâ brevior, stigmatate acuto. Bacca pulposa. *Labill.* In *N. Hollandiae Terra van Leuwin, in Eucalypto.* h.

102. *L. punctatus Ruiz et Pav.*; racemis longissimis; pedicellis subverticillatis, trifloris; floribus hexandris; bractea obovatâ; foliis obovatis, (subtus nigro-punctatis.) *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 47. t. 277. f. a.*

Arbor non parasitica, 4-org.. Truncus erectus, teres, mediocriter crassus, comâ frondosâ, fere globosâ; rami oppositi suboppositique, saepe verticillato-terni, aliquando granulis adpersi; teneri angulati, purpurascens, foliosi, adultiores teretes, nudi. Folia opposita, interdum sparsa, erecta, petiolata, leviter obtuso-acuminata, coriacea, avenia, integerrima, punctis atris minimis, 2-poll., poll. lata, marginibus compressis, retroflexis. Petioli $1\frac{1}{2}$ lin., canaliculati. Racemi terminales et ex axillis superioribus, erecti, angulati; axillares solitarii, foliis paulo longiores; terminales terni, tripalmares et ultra, intermedio longiori. Pedicelli verticillato-terni, angulati, breves, plures, sparsi. Flores secundi, intermedii sessiles, lateralibus breviter pedicellatis. Bracteae ovatae, integerrimae, reflexae; intermedia triplo longior. Cal. marginalis, integerrimus, planiusculus. Cor. lutea; petala lineari-spathulata, inferne erecta, superne patienti-reflexa. Filamenta medio petalorum inserta, lutea. Antherae oblongae, incumbentes, luteae. Germen lutescens. Stylus luteus, subulatus. Stigma minimum. Bacca subrotunda, calyce coronata, pisi magnitudine, luteo-virescens. Semen globosum. *Ruiz et Pav.* In speciminibus a divo *Haenke* lectis: rami oppositi; folia obovata ovataque, basi attenuata, obtusa, nervo medio subtus prominente, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll., 12-14 lin. lata. Petioli crassi, 2-4 lin.. Racemi terminales et ex axillis supremis semper solitarii, erecti, 4-5 poll.. Pedunculus communis inferne teres, crassitie pennae anatinae; rhachis tetragona; pedicelli 3-4 subverticillati vel oppositi, decussati, crassi, $2\frac{1}{2}$ -3 lin.. Bracteae 3 reflexae, obovatae, obtusae: media lateralibus paulo, nec triplo longior, 2 lin., $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Cal. urceolatus, $\frac{1}{2}$ lin., nec planiusculus. Cor. desunt. Baccae immaturae ovatae, apice paulo angustatae, $1\frac{1}{2}$ -2 lin.. Reliqua exacte conveniunt. In montibus nemorosis frigidiusculis Peruviae Andium ad Pillao, Chacalla, etc. h.

103. *L. cinctus Mart.*; ramis teretibus; foliis oppositis alternisque, oblongo-ovatis, obtusis, crassis, marginatis; racemis terminalibus axillaribusque compositis; ramulis suboppositis, bifloris, bracteatis; floribus tomentosis; bracteis cupulaeformibus. *De Martins Fl. Bras. ined.*

Rami validi, oppositi et subverticillati, nodosi, juniores rufescenti-cinerei, apice lepidoti. Folia margine calloso nigricante, nervis parum conspicuis, 3-4 poll., 14-18 lin. lata. Petioli supra plani, crassi, 1-2 lin.. Racemi terminales 2 vel plures, axillares solitarii, 2- $3\frac{1}{2}$ poll.. Pedunculi flores inter tetragoni, ramos po-

tius referentes, rubro-fusci, lepidoto-scabriusculi; ramuli teretiusculi 3-4 lin., apice bractea ovato-lanceolata, acuta, cucullata, lepidota, 2¹/₂-3 lin.; pedicelli teretiusculi, rubro-fusci, lepidoti, 3-4 lin.. Cupulae lepidotae, crenato-dentatae, 2 lin., 1¹/₂ lin. in diam.. Flores 1-1¹/₂ poll., tomento denso, aeneo; inexpandi basi incrassati, apice clavati, incurvi. Cal. crenato-dentatus, 1/2 lin.. Pet. 6, crassissima, sublinearia. Stam. corollae breviora, alterna longiora. Antherae oblongae, flavae, lineae. Ad basin concavam petalorum glandula oblongo-linearis. Germina glauca, glabra, cum calyce 1¹/₂-2 lin.. Stylus longitudine petalorum, apice articulatus, basi incrassatus. Stigma capitatum. In sylvis Japurensibus prov. Rio Negro Brasiliae. h.

104. *L. destructor* Humb. et Bonpl.; ramulis quadrangularibus; foliis oblongis, acutis, coriaceis; racemis terminalibus; ramis approximatis, secundis, trifloris, ebracteatis; floribus pedicellatis. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 435. n. 7. *L. pereskiaefolius*; floribus corymbosis terminalibus; foliis ovato-oblongis, acutis, subcarnosis. Reliqu. Willd. MS. fide de Schlechtend. fil.

Rami verrucosi, glabri, fusci. Folia utrinque acuta, nervo medio subtus prominente, 2 fere poll., 8-9 lin. lata. Petioli vix 3 lin., canaliculati, glabri. Racemi ramis sparsis, secundis, trifloris, rhachique glabris. Flores subpollicares. Cal. margo obsolete dentatus, glaber. Petala 6 aurantiaca, glabra, angustissime linearia, superne patenti-reflexa. Germen cylindricum? Stylus staminibus longior. Bacca globosa, laevis, glabra, matura nigra, magnitudine fructus *Pruni spinosae*. Semen hexagonum. Kunth l. c. In arboribus prope Villa de Ibarra r. Quitans. h.

105. *L. eugenioides* Humb. et Bonpl.; arboreus; ramis teretibus; foliis ovato-oblongis, acuminatis, in petiolum decurrentibus, subcoriaceis; racemis axillaribus et terminalibus, solitariis et geminis; ramis abbreviatis, approximatis, trifloris, ebracteatis; floribus pedicellatis, (medio sessili.) Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 435. n. 9.

Arbor ramulis oppositis, teretibus, rugosis, glabris. Folia glabra, obsolete venosa, conduplicata?, 2¹/₂ poll., 15 lin. lata. Petioli 4 lin., glabri. Racemi terminales, 1¹/₂-2 poll.; ramis sparsis rhachique glabris. Flores suaveolentes: intermedius sessilis, fere 1/2 poll. Cal. margo integer, glaber. Petala 6, interdum 5, alba, glabra, linearia, acuta. Stam. corollae paulo breviora. Germen oblongo-cylindricum? Kunth l. c. In Andibus Peruvianorum, prope Guancabamba. h.

106. *L. ligustrifolius*; ramis teretibus; foliis oppositis, oblongo-lanceolatis, acuminatis, subcoriaceis; corymbis axillaribus terminalibusque, foliis duplo brevioribus, solitariis; ramis congestis 2-3-floris, ebracteatis; floribus omnibus pedicellatis. Reliqu. Haenkean. ined.

Ex descriptione *L. eugenioidi* Humb. et Bonpl. proximus, sed satis diversus. Frutex, ut videtur, parasiticus, nec arbor ut *L. eugenioides*; rami oppositi dichotomique, patentes; adultiores crassitie fere pennae anserinae, cortice fusco ruguloso verruculoso-

que; juniores tenuiores, apice compresso-tetragoni, cortice glabro, flavescenti cinereo, epidermide facile decedente. Folia patentia, lanceolata vel subovato-lanceolata, acumine acuto, basi attenuata, sed non decurrentia, glaberrima, nervo medio subtus parum prominente, venis paucis superne magis conspicuis; sicca fusca, plana, nec conduplicata, 2 - 2 $\frac{1}{2}$ poll., 7 - 11 lin. lata. Petioli crassi, supra canaliculati, glabri, 2 - 3 lin.. Corymbi plerumque axillares, oppositi, sed etiam terminales, erecti, patentes vel subreflexi, densi, poll. circiter, basi gemmarum squamis pluribus ovatis, acutis, carinatis, glabris, margine fuscis, dorso nigricantibus, deciduis; ceterum ebracteati. Pedunculus communis brevissimus, uti rhachis angulosus, crassus, glaber; rami valde approximati, angulosi, breves, glabri, 2 - 5 flori; pedicelli ramis longiores, subtrigoni, erecto-patentes, glabri, 1 - 1 $\frac{1}{2}$ lin., omnes aequales, nec in flore medio nullus, apice quidquam incrassati, quod forte pro bractea suborbiculari habendum. Cal. margo fere hypocrateriformis, glaber, $\frac{1}{3}$ lin.; dentibus 6 ovatis, acutis, inaequalibus. Cor. 4 $\frac{1}{2}$ lin., glabrae, siccae nigrae; inexpansae subclavatae; petalis linearibus, superne paulo latioribus et concavis, acutiusculis, $\frac{1}{2}$ lin. latis, ad 1 $\frac{1}{2}$ lin. usque erectis, dein reflexis. Stam. 6, alterna breviora, corollam breviora; filamenta erecta, subulata, longiora 1 $\frac{1}{2}$ lin.; antherae sat magnae, ovatae, utrinque cum acumine parvo, flavae, inferiore longae. Stylus crassus, erectus, glaber, stamina superans, 4 - lin.. Stigma obsoletum, truncatum. Germen oblongum, basi attenuatum, glabrum, lineae. *In Peruvia vel in Chili.*
Haenke. h.

Obs. Huc pertinere videtur *Lon. ligustrinus*; corymbis axillaribus, pedunculatis; foliis oblongo-lanceolatis, basi acutis, rigidis. *Reliqu. Willd. Ms. quem Humboldt in Amer. merid. legit.*

107. *L. heterophyllus Ruiz et Pav.*; floribus racemosis, hexandris; pedicellis 3-floris; bractea ovata, adpressâ, scabrâ; foliis polymorphis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 48. t. 273. f. 6. Molina Saggio d. Chili p. 285.*

Frutex 2-4 ped.. Radix ramosa, fibrillosa, parva. Caulis ramossissimus, teres; rami sparsi, conferti ternique, teretes, minutim granulosis; juniores angulati, scabri, ferruginei. Folia conferta, sparsa, subrotunda, ovalia, oblonga ovataque acumine minimo, subavenia, crassiuscula, nonnulla basi leviter excavata, glabra. Petioli vix lin., canaliculati. Pedunculi axillares terminalesque, solitarii, poll. et ultra, erecti, angulosi, racemosi. Pedicelli sparsi, breves, patuli. Flores laterales pedicellati, medius sessilis. Bractea parvae, concavae, margine scabro-ciliatae, persistentes. Cal. marginalis, scabriusculus, minimus. Cor. albedo-purpurascens, $\frac{1}{2}$ poll.; petala ad medium usque erecta, superne divergentia, reflexa, lineari-spathulata. Filamenta e medio petalorum. Antherae luteae. Stylus filiformi-subulatus. Stigma minimum, obtusum. Bacca subrotunda, coronata, viridiglaucâ. Semen ovale. *Ruiz et Pav. In sylvis Chili, praesertim in speciebus Myrti. h.*

108. *L. orinocensis Spreng.*; foliis ovato-ellipticis, acuminatis, basi rotundatis, subcomplicatis, subcoriaceis, glabris; racemis axillaribus et terminalibus, paniculatim dispositis, diffusis; ramulis brevissimis, trifloris. *Humb. et Bonpl. nov.*

gen. et spec. III. p. 442. t. 299. (sub *L. marginato* excl. synonym.)
Spreng. S. V. II. p. 129.

Plantam suam a *LORANTHO marginato* *Lam. in herb. Juss.* racemis folia superantibus et floribus parum majoribus differre monet *cls. Kunth.* Sed differt adhuc aliis descriptio *Kunthiana*: Frutex parasiticus, ramis suboppositis, subtetragonis, striatis, glabris; folia subopposita, vix in petiolum decurrentia, obsolete venosa, $2\frac{1}{2}$ poll., $1\frac{1}{2}$ poll. lata. Petioli 5 lin., semiteretes, margine submembranacei, glabri. Racemi axillares solitarii, terminales subterni simplices, patentes, 2 poll. et paulo longiores, paniculam terminalem ramosam foliatam diffusam referentes; ramulis sparsis et suboppositis approximatis, apice tribracteatis, ramisque glabris. Flores sessiles vix 5 lin.. Bracteae ad basin florum ovatae, obtusae, concavae, subcoriaceae, ovario paulo longiores, glabrae, ut cal. margo integer. Petala 6 alba, glabra, lineari-lanceolata, acuta, aequalia, ternis cohaerentibus. Stam. corollâ breviora. Ovarium semiglobosum, glabrum. Stylus longitudine staminum, stigmate obtuso. Fructus? *Kunth l. c.*
In ripa Orinocensi. h.

109. *L. marginatus Desrous.*; foliis ovatis, subacuminatis, margine scariosis; racemis solitariis, axillaribus; pedicellis trifloris. *Lam. Enc. III. p. 597. Willd. Spec. II. p. 236.*

Totus glaber. Rami lignosi, teretes, tenuiter striati, graciles. Folia opposita, vel subalterna, integerrima, medioeriter crassa, 2 poll., 12-15 lin. lata, nervis aliquot obliquis, margine fusco, transparente. Petioli canaliculati, 3-4 lin.. Racemi nunc erecti, nunc horizontales, foliis quidquam breviores: ramificationibus lateralibus oppositis vel suboppositis, patentibus, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin., remotiusculis, apice trifloris. Flores parvi, sessiles, basi squamis brevibus. Cal. margo obsolete denticulatus. Cor. vix 2 lin., ante expansionem clavata, ad basin demum usque divisa in petala 6 linearia, staminibus longiora, medio reflexa. Antherae parvae, ovatae, medio affixae. *Desrousseau.* *In Brasilia. Dombey. Herb. Juss. h.*

110. *L. citricola Mart.*; glaber; ramis teretibus; foliis subalternis, ovatis, subacuminatis obtusisque, submarginatis, venosis; racemis axillaribus terminalibusque folio brevioribus; superioribus solitariis, infra ad ramos subverticillatis; ramulis brevibus, oppositis; floribus ternis, sessilibus, bracteatis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami divergentes, graciles, cinerei, verruculosi; subinde radiculis brevibus, teretibus. Folia patentia, basi rotundata, margine incisicis tenui lucido fuscescente, subcoriacea, recentia colore foliorum citri, $4\frac{1}{2}$ -5 poll., 1-2 $\frac{1}{2}$ poll. lata. Petioli 2-4 lin.. Racemi 10-20 lin.; pedunculi basi compressi, flores inter subtetragoni; ramuli $\frac{1}{2}$ -1 lin.. Bracteae ovatae, acutae, concavae, $\frac{1}{3}$ lin.. Flores albi, 2 lin., inexpansi apice clavati, obtusi. Cal. brevis, subinteger. Pet. 6, linearia, acuta, supra medium reflexa. Stam. petalis breviora; filamenta subulata, alba, 5 longiora. Antherae ovatae, flavae. Stylus longitudine staminum minorum, subulatus. Stigma obsolete capitatum. *L. marginato*

Lam. proximus, et forte idem. In Citris prov. Sebastiano-politanae Brasiliae, ubi Erva de Passerinho. h.

111. *L. interruptus Humb. et Bonpl.;* foliis oblongis, acutis, in petiolum decurrentibus, subcoriaceis, glabris; racemis axillaribus et terminalibus; ramis brevissimis, suboppositis, distantibus, trifloris; floribus sessilibus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 441. n. 20.* L. fol. ellipticis, acutiusculis; floribus interrupte spicatis. *Reliq. Willd. MS. (fide de Schlechtendal fil.)*

Frutex parasiticus, pendulus; ramulis teretibus, laevibus, glabris, subflexuosis. Folia obsolete venosa, 2 fere poll., 9 lin. lata. Petioli 2-5 lin., glabri. Racemi solitarii, fere 1½ poll.; ramis glabris. Bracteae nullae. Cal. margo obsoletus. Cor.? Germen semiglobosum, glabrum. Stylus apice spiraliter tortus. Stigma subcapitatum. Fructus? *Kunth l. c. Frequentissimus in truncis Anonae Humboldtii Dunal, prope Ario Mexicanorum. h.*

112. *L. erythrocarpus Mart.;* glaber; ramis teretibus; foliis suboppositis, ovato-lanceolatis, acuminatis, basi attenuatis, coriaceis, venosis; racemis subspicatis, interruptis, axillaribus terminalibusque, solitariis binis ternisve; ramulis brevissimis; floribus ternis, sessilibus, bracteatis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami erecto-patentes, oppositi et dichotomi, cortice fuscescenti-cinereo. Folia erecto-patentia, venoso-reticulata, venis parum prominentibus, 2½-3½ poll., 10-15 lin. lata. Petioli canaliculati, 3-4 lin.. Racemi axillares 1-2, terminales 3-4, longitudine foliorum. Pedunculi communes obsolete tetragoni, 2-3 poll.; ramuli oppositi alternique, patentes, vix conspicui. Bracteae 3, ovatae, acutae; media paulo major et acutior, ½ lin. Flores 2 lin.; inexpansi conici, obtusiusculi. Cal. integerrimus. Pet. 6, linearia, acutiuscula, erecto-patentia. Filamenta petalis breviora, brevissima, crassa, 3 longiora ad latera excavata et fere fornicata, apice antice antheras ovatas flavas gerentia, dein in mucronem conicum producta. Antherae filamentorum longiorum minores. Germina longitudine bractearum. Stylus petalis brevior, apice subincrassatus. Stigma obsolete capitatum, Baccae aurantiacae. *In sylvis camporum prov. Rio Negro Brasiliae. h.*

113. *L. retroflexus Ruiz et Pav.;* racemis compositis; floribus hexandris, retroflexis, subternis, minimis; bracteis foliisque ovatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 49. t. 279. f. a.*

Frutex glaber, 2-ularis. Radix fasciculata, filiformis, tortuosa, ferruginea, striata, scabriuscula. Caulis erectus, teres, ramulosus, saepe punctatus, cinereus; rami divergentes, longi, teretibus angulosi, subcinerei, juniores angulati. Folia opposita, aliquando petiolata, retroflexa, ovata, acuta, integerrima, venosa, subcoriacea, plerumque 1½ palmaria, 2 poll. lata, plana, viridilutescentia: nonnulla oblongo-ovalia, acuminata. Petioli 2-5 lin., canaliculati. Racemi axillares terminalesque, 1-2-3, 1-2-palmares, patentiusculi, angulosi; pedunculi partiales horizon-

taliter patentibus, retroflexi; bracteis ovatis, concavis, parvis, deciduis; pedicelli brevissimi, oppositi sparsique, 2-4-flori, retroflexi. Flores minimi, vix lin., sessiles; bracteis ovatis concavis parvis integerrimis. Cal. marginalis, integer. Petala 6, ad medium usque erecta, deinde divergentia, retroflexa, minima, purpurea, linearia. Stamina petalorum longitudine, eorum medio inserta. Bacca ovalis, calyce coronata, luteo-glaucâ, pisi magnitudine, viscosa. Semen ovale, lutescens. *Ruiz et Pav. In nemorosis Andium Peruviae ad Chinchao et Macora. h.*

114. *L. pyrifolius* Humb. et Bonpl.; foliis oblongis, obtusis, basi acutis, submembranaceis, complicatis, glabris; racemis axillaribus et terminalibus, solitariis geminis aut ternis; ramulis brevissimis, suboppositis, trifloris; floribus sessilibus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 441. n. 21. L. floribus racemosis; foliis ellipticis, acuminatis. Reliqu. Willd. MS. (fide de Schlechtend. fil.)*

Frutex in *CRESSENTIA Cujete* parasiticus, pendulus; ramulis teretibus ad nodos, compressis, laevibus, glabris, ferrugineis. Folia superiora subalterna, obsolete reticulato-venosa, nervo medio subtus prominente, 2½-3 poll., 15-15 lin. lata. Petioli 5 lin. longi, glabri. Racemi terminales terni, subtripollicares, ramulis trifloris, obsolete tribracteatis, rhachi ferrugineâ. Flores (ex *Bonpland*) sessiles, minuti. Cal. margo obsoletus. Petala 6 incarnata, lanceolata, acuta. Stigma capitatum, viride. Baccæ ovatae, laeves, glabrae, magnitudine grani *Cannabis*. *Kunth l. c. Valde affinem esse retroflexo monet de Schlechtendal fil. Sprengel S. V. II. p. 129. junxit cum paucifloro Sw. In calidis prov. Popayanensis, prope Carthaginem. h.*

β. axillares:

115. *L. flexicaulis* Mart.; glaber; ramis sarmentosis, radicanibus; foliis subalternis, oblongis, obtusis cum mucronulo, basi attenuatis, planis, reflexis; racemis axillaribus, solitariis geminisve, erectis, folio brevioribus; ramulis brevibus, oppositis, trifloris. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Caulis ex arboribus sertorum modo dependentes; rami suboppositi, teretes, compresso-nodosi, fusco-cinerei, radiculis longis varie flexis; ramulis compresso-tetragonis. Folia mucronulo parvo, reflexo, subavenia praeter nervum medium, 1½-2 poll., 8-10 lin. lata. Petioli reflexi, supra canaliculati, ½ poll. Racemi poll. Pedunculi communes tetragoni; pedicelli patentibus, angulosi, ⅓ lin. Bracteae 3 ovatae, acutae, concavae; exterior major, ½ lin. Flores 5, sessiles, pallide flavescentes, lineae, inexpansi superne clavato-incrassati. Cal. integerrimus. Pet. 6, linearia, obtusiuscula, supra medium patentia. Filamenta petalis breviora, subulata, brevissima, alterna longiora. Antherae subglobosae, flavae. Germina vix bracteas superantia. Stylus staminibus brevior, subulatus. Stigma obsoletum. *L. pyrifolius proximus. In campis Taboleira prov. Minas Geraës Brasiliae. h.*

116. *L. polyrrhizos* Mart.; glaber; ramis scandentibus,

radicantibus; ramulis tetragonis; foliis subalternis, obovatis, emarginatis, planis, venosis; racemis axillaribus, solitariis, compositis, erectis; ramulis tetragonis, trifloris; floribus sessilibus. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Frutex ramosissimus; ramis cinerascanti-fuscis, alternis, oppositis dichotomisve; radiculis varie flexis ferrugineis, scariosis; ramulis glaucescentibus, compresso-tetragonis. Folia patentia et reflexa, basi attenuata, apice cum mucronulo brevi in emarginatura, nervis parum conspicuis, 10-21 lin., 6-16 lin. lata. Petioli canaliculati, 2-3 lin.. Racemi foliis duplo breviores, 6-9 lin., subinde trichotomi et paniculam referentes. Pedunculi compresso-tetragoni; partiales 1-1½ lin.. Bracteae ternae, ovatae, acutae, concavae, longitudine germinum. Flores virides, 2 lin.; inexpandi superne dilatati. Cal. integerrimus. Petala 6, linearia, a medio reflexa, ½ lin. lata. Filamenta petalis breviora, subulata, 3 longiora ½ lin.. Antherae ovatae, flavae. Stylus petalis brevior, subulatus. Stigma obsolete capitatum. *In sylvis prov. Bahiensis Brasiliae. h.*

117. *L. tetraqueter Mart.*; glaber; ramis compresso-tetragonis, scandentibus, radicantibus; foliis suboppositis, ovatis, obtusis, reflexis, subcoriaceis; racemis axillaribus binis ternisve; ramulis brevissimis, suboppositis, trifloris; floribus sessilibus, bracteatis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami longi, angulis 4, 2 acutissimis et subalatis, virides, radicalis parvis fuscescentibus. Folia obtusa cum mucronulo parvo reflexo, obsolete nervosa, 1½-2 poll., poll. lata. Petioli 4-5 lin.. Racemi 2-3, rarius 1 vel 4, erectiusculi, folia subaequantes. Pedunculi compresso-tetragoni, 1½-2 poll.; ramuli patentes, ½ lin.. Bracteae 3 ovatae, acutae, concavae; media paulo major germen aequans. Flores vix lin., inexpandi subrotundi, obtusi. Cal. obsoletus, integerrimus. Pet. 6, linearia, obtusiuscula, mox reflexo-potentia. Filamenta petalis breviora, brevissima, subulata: 3 longiora. Antherae rotundato-ovatae, flavae. Stylus staminibus brevior, subulato-filiformis. Stigma obsoletum. *In campis prov. Minas Geraës Brasiliae. h.*

118. *L. staphylinus Mart.*; glaber; ramis superne compressis; foliis suboppositis, obovatis emarginatisve, basi attenuatis, planis, coriaceis, nervosis; racemis axillaribus, solitariis, folio longioribus; ramulis abbreviatis, refractis; floribus ternis, sessilibus, bracteatis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami glaucescentes, graciles. Folia patentia, 1½ poll., 8-9 lin. lata. Petioli 3-4 lin.. Racemi stricti, 1-2 poll.; pedunculus flores inter compresso-tetragonus, subflexuosus; ramuli suboppositi, lin.. Bracteae 3, ovatae, acutae, germina aequantes; media acutior, ⅓ lin.. Flores lineae; inexpandi mox globoso-dilatati. Cal. obsoletus, integerrimus. Pet. 6, linearia, reflexo-potentia. Stam. petalis breviora; filamenta subulata, 3 longiora; antherae rotundato-ovatae, flavae. Germina ¼ lin.. Stylus longitudine staminum longiorum, filiformis. Stigma obsoletum. *In sylvis prov. Rio Negro Brasiliae. h.*

119. *L. cuspidatus Mart.*; ramis radicantibus, tereti-

bus; foliis suboppositis, obovatis, basi attenuatis, apice cuspidatis, coriaceis, glaucis; racemis axillaribus, solitariis, folia subaequantibus, paucifloris; floribus in ramulis ternis, sessilibus, bracteatis. *De Martius Fl. Brasil. ined.*

Rami adultiore fusco-cinerei, verruculosi, juniores glaucescentes; radiculis crassis fuscis. Folia erecto-patentia, nervis parum prominentibus, 9-16 lin., 3-6 lin. lata. Petioli 2 lin.. Racemi erecto-patentes, poll.; pedunculus basi teretiuseculus, dein compressus, flores inter compresso-tetragonus; ramuli 4 circiter, paterites, 2 lin.. Bracteae 5, ovatae, acutae, concavae, germina aequantes; media acutior $\frac{1}{2}$ lin.. Flores 2 lin., inexpansi apice clavati, obtusi. Cal. brevissimus, subintegerrimus. Pet. 6, lineari-lanceolata, a medio reflexa. Stam. petalis breviora, subulata, 3 longiora; antherae ovatae, flavae. Stylus longitudine staminum subulatus. Stigma obsoletum. *In sylvis Piauhienisibus Brasiliae. h.*

120. *L. longipedunculatus Mart.*; glaber; ramis teretibus; foliis oppositis, oblongo-ovatis, acuminatis, basi attenuatis, subcoriaceis, nervosis; racemis axillaribus, solitariis, folio longioribus; ramulis paucis, subreflexis; floribus ternis, sessilibus. *De Mart. Fl. Bras. ined.*

Rami oppositi, erecto-patentes, cortice flavescenti-cinereo. Folia acumine 3 lin., sub lente punctata, nervis parum conspicuis, 2-3 poll., 9-15 lin. lata. Petioli canaliculati, 7-9 lin.. Pedunculi communes inferne teretiuseculi, superne compressi, flores inter subflexuosi, 2-3 poll.; ramuli 3-4 lin.. Bracteae 3 ovatae, acutae, subcarinatae, media major $\frac{1}{2}$ lin.. Flores virescenti-pallidi, 4 lin.; inexpansi clavati, obtusi. Cal. obsolete denticulatus. Petala 6, linearia, acutiuscula, supra medium patentia, apice latiora. Filamenta petalis breviora, subulata, 3 longiora lin. Antherae ovatae, flavae. Germina ovata, bractea paulo longiora. Stylus petalis brevior, teres, albus. Stigma parvum, depresso-capitatum. *In campis prov. Bahiensis Brasiliae. h.*

121. *L. syringaefolius Martius*; glaber, hexandrus; foliis oppositis, petiolatis, ovatis, longe acuminatis, subcoriaceis; racemis axillaribus, solitariis, paniculatis, folio brevioribus; pedunculis compresso-tetragonis; pedicellis brevibus, crassis, trifloris. *De Martius Flor. Brasil. ined.*

Rami juniores fusco-virides, vetustiores cinerei, punctis raris albidis. Folia patentia, basi rotundata, obsolete venosa, nervo medio subtus prominulo, $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ poll., $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata. Petioli supra canaliculati, $\frac{1}{2}$ poll.. Racemi $1\frac{1}{2}$ -2 poll.. Pedunculi communes 4-angulares, angulis 2 acutioribus, circiter poll.. Pedicelli horizontaliter patentibus, trigoni, $1\frac{1}{2}$ -2 lin.. Bracteae 3 ovatae, acutae, concavae, carinatae: exterior germine longior; laterales germinibus aequales. Calyx obsolete 6-denticulatus, germine 4-plo brevior. Petala 6, linearia, obtusiuscula; inexpansa in tubum basi obsolete 6-gonum, apice clavatum, conata. Stam. petalis breviora, alterna breviora; filamenta subulata, longiora fere lin.. Antherae erectae, basi hastatae, parvae, flavae. Stylus stamina superans, petalis paulo brevior; stigmate parvo, depresso. Germen rotundato-ovatum. *In*

sybis ad Managueri et Barra da Rio Negro provinciae Rio Negro. Brasiliae. h.

122. *L. lancifolius Poir.*; floribus racemosis, hexandris; pedicellis trifloris; bracteâ ovatâ reflexâ; foliis lanceolato-oblongis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 47. t. 278. f. b. (sub L. lanceolato.)*

Frutex parasiticus, 3-ped. et ultra, glaber. Radix ramosa, fibrillosa. Caulis erectus, teres, ramosus; rami erecti, teretes: teneri obscure angulati. Folia opposita, petiolata, plana, integerrima, 2-poll., poll. lata, superne parum venosa; venis obsolete subhorizontalibus. Petioli 2-3 lin., supra canaliculati. Pedunculi axillares, solitarii, racemosi, foliis breviores, angulosi; pedicelli oppositi interdum alterni, breves. Bractea subtus concava, supra convexa, integerrima, persistens. Cal. marginalis, obsolete crenatus. Cor. lutea, $\frac{1}{2}$ poll., 6-rarius 7-8-petala; petala lineari-spathulata, ad medium usque erecta, dein reflexa. Filamenta lutea, subulata, e medio petalorum, erectopatula. Antherae luteae, ovales, incumbentes. Stylus subulatus; stigma parvum, obtusum. Bacca oblonga, coronata, 1-sperma. *Ruiz et Pav. In montibus Pillao Andium Peruviae. h.*

125. *L. acutifolius Ruiz et Pav.*; glaber; ramis teretibus; foliis oblongo-lanceolatis, acutissimis, coriaceis; racemis axillaribus solitariis, patentibus, folio duplo brevioribus; ramulis 5-floris; floribus pedicellatis; bracteis minimis, orbicularibus. *L. floribus racemosis, hexandris; pedicellis 1-5-floris; bracteâ minimâ, orbiculatâ; foliis lanceolatis, acutissimis. Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 48. t. 274. f. b.*

Frutex 5-5-ped., glaber. Radix ramosa, fibrillosa. Caulis valde ramosus, teres; rami divergentes, teretes. Folia opposita, (et subopposita), integerrima, (basi vix attenuata, sicca fusca, nervo medio prominente) obsolete venosa venis simplicibus, 2-3-poll., poll. fere lata. Petioli 2-3 lin., canaliculati, subcontorti. Racemi axillares, foliis duplo breviores, (1-1 $\frac{1}{2}$ poll.) multiflori, (densissimi), in flore divergentes, in fructu patentiores. Pedicelli angulati, breves, bractea communi parvâ, ovato-lanceolatâ, acutâ. Flores pedicellati. (Pedicelli angulosi, patentés, 1 $\frac{1}{2}$ lin.). Bracteae margines tumidi, semicirculares. Cal. cyathiformis, obsolete 6-dentatus, parvus, (vix $\frac{1}{2}$ lin.). Cor. $\frac{1}{2}$ poll., alba; petala lineari-spathulata, ad medium usque erecta, superne divergentia, inflexa, (reflexa). Filamenta medio petalorum inserta, erecta. Antherae incumbentes, luteae, ovales, (terrasae). Stylus longe persistens, (crassus, stamina paulo superans. Stigma truncatum). Bacca ovalis, coronata, pisi magnitudine, nigrescens. Semen ovale. *Ruiz et Pav. In Peruviae praeruptis calidis, prope Huanocco; in Chili? Haenke. h.*

124. *L. patens Mart.*; glaber; ramis teretibus; foliis oppositis, lanceolatis, longe acuminatis, tenuibus; racemis axillaribus, solitariis, patentibus, folia fere superantibus; ramulis trifloris; floribus pedicellatis; bracteis minutissimis, orbicularibus. *De Mart. Fl. Brasil. ined.*

Rami oppositi, virgati, cinerei, superne subcompressi. Folia patentia, basi attenuata, nitida, vix coriacea, nervosa, $2\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$ poll., 6-9 lin. lata. Petioli 3 lin.. Racemi 2-3 poll.. Pedunculi basi teretiusculi, flores inter subcompressi; ramuli suboppositi, patentés, lineae, rarissime 1-flori; pedicelli angulosi, 2 fere lin.. Bracteae integerrimae, basin germinis cingentes. Flores $4\frac{1}{2}$ lin., inexpanși tubulosi, subclavati. Cal. integerrimus, $\frac{1}{4}$ lin.. Petala 6, sublinearia, infra medium reflexa. Filamenta 3 longiora, petala subaequantia, rubra, subulata. Antherae ovatae, flavae, ante nuptias mucronatae. Stylus longitudine staminum longiorum, filiformis. Stigma truncatum. Germinum cum calyce lineae. In provincia Minas Geraës Brasiliae. h .

125. *L. suaveolens* Humb. et Bonpl.; ramis teretibus; foliis ovato-oblongis, acuminatis, basi rotundatis, coriaceis; racemis axillaribus geminis aut quaternis; ramulis abbreviatis, approximatis, trifloris, ebracteatis; floribus breviter pedicellatis. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 455. n. 8.

Frutex erectus aut pendulus; ramis teretibus, laevibus, glabris. Folia venosa, glabra, supra nitida, 26-27 lin., pollicem lata. Petioli 2- $2\frac{1}{2}$ lin., glabri. Racemi 3-4 poll., ramis sparsis rhachique glabris. Flores breviter pedicellati (intermedius subsessilis, 3 lin.), gratissimi. Cal. margo angustus, obsolete dentatus, glaber. Petala 6 alba, glabra, linearia, acuta, aequalia, patula. Stam. corollâ paulo breviora. Kunth l. c. In arboribus prope Gonzanama Peruvianorum. h .

126. *L. venetus* Humb. et Bonpl.; foliis elliptico-oblongis aut obovatis, apice rotundatis, crasso-coriaceis, glaucescentibus; racemis axillaribus solitariis; ramis abbreviatis, trifloris, ebracteatis; floribus subsessilibus. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 454. n. 6.

Frutex parasiticus in *Diospyro obtusifolia*, dextrorsum scandens; ramis teretibus, laevibus, glabris. Folia basi in petiolum angustata, integerrima, subavenia, glabra, adjecto petiolo fere 2 poll., 10-12 lin. lata. Petioli 2 lin. longi, glabri. Racemi fructiferi penduli, subbipollicares; ramis suboppositis, paulo distantibus, rhachique glabris. Baccæ ovato-oblongae, pedicello brevissimo crasso fultae, calyce persistente umbilicatae, laeves, 4 lin.. Sem. oblongum. Kunth l. c. Prope Cuernavaca r. Mexican. h .

Ob. Rationem nominis specifici non intelligimus.

127. *L. orbicularis* Humb. et Bonpl.; foliis orbiculatis, acutiusculis, crasso-coriaceis; racemis axillaribus, solitariis; ramis abbreviatis, trifloris, distantibus, ebracteatis; floribus sessilibus. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 454. n. 5.

Frutex sarmentosus; ramis tetragonis, laevibus, glabris. Folia obsolete venosa, nervo medio subtus prominente, glabra, 16-17 lin. lata, 18 lin. longa. Petioli 3-4 lin., glabri. Racemi penduli, 4-5 poll.; ramis brevissimis, glabris. Rhachis angulata, glabra. Stam. corollâ paulo breviora. Germinum cylindræum, glabrum. Kunth l. c. Prope Guayaquil Quitensium. h .

128. *L. elegans Mart.*; glaber; ramis basi teretibus, apice compressis; foliis suboppositis, subovatis cum acumine brevi, reflexis, subcoriaceis; racemis axillaribus, solitariis, folio duplo longioribus; ramulis oppositis, brevissimis, trifloris; floribus sessilibus, ebracteatis. *De Mart. Fl. Bras. ined.*

Rami graciles, patentēs, pallide virides. Folia basi attenuata, obsolete nervosa, laete viridia, 12-15 lin., 7 lin. lata. Petioli 3-4 lin.. Racemi erecto-patentes, 2-3¹/₂ poll.. Pedunculi compresso-tetragoni, nitide flavescenti-virides; ramuli patentēs, angulosi, vix lin., ebracteati vel apice marginibus 3 semicircularibus, vix conspicuis. Flores teneri, albi, 1¹/₂ lin.; inexpandi apice globoso-clavati. Cal. obsolete 6-denticulatus. Pet. 6, lineari-lanceolata, acuta. Stam. petalis breviora, subulata, alterna longiora. Antherae ovatae, flavae. Germina cum calyce ¹/₂ lin.. Stylus longitudine staminum. Stigma acutum. *In Brasilia. h.*

129. *L. rubens Mart.*; glaber; ramis teretibus, radiantibus; foliis oppositis, subreflexis, lanceolatis, utrinque attenuatis, nervosis, subundulatis; racemo folio breviori pedunculoque trifido in axillis solitariis; ramulis brevibus, suboppositis; floribus ternis, sessilibus, bracteatis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami stricti, purpurascētes, hinc inde radiculis rubro-fuscis. Folia veluti crenis latis obsolete undulata, subinde planiuscula, coriacea, 2¹/₂-3 poll., 6-9 lin. lata. Petioli 3-5 lin.. Racemi patentēs, 1¹/₂ poll., pedunculo flores inter tetragono, ramulis suboppositis, lineae. Pedunculus racemum singulum concomitans, 3-4 lin., apice in pedicellos 3 brevissimos patentēs divisus. Bracteae 3 ovatae, acutae, concavae; exterior major, ¹/₃ lin.. Flores? Baccae ovato-oblongae, umbilicatae, 3-4 lin.. *In sylvis Japurensibus provinc. Rio Negro Brasiliae. h.*

150. *L. acuminatus Ruiz et Pav.*; racemis axillaribus; floribus hexandris, parvis; bracteis minimis, concavis; foliis ovatis, longe acuminatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 49.* Frutex glaber, 2-5-ularis. Caulis teres, parum granulosis, ramosus; rami longissimi, angulosi, purpurascētes, subsarmentosi. Folia opposita, saepius alterna, plana, remota, integerrima, subavenia, 2-poll., fere poll. lata, nonnulla ovata valde acuminata. Petioli 2 lin., canaliculati. Racemi axillares, solitarii, foliis dimidio breviores, erecti, angulati. Pedicelli brachiati. Flores parvi, sessiles, terni. Bracteae ovatae, acutae, germine breviores. Cal. minimus, membranaceus, obsolete 6-crenatus. Petala lutescentia, linearia, a medio ad apicem reflexa. Filamenta breviter e petalorum medio. Antherae ovatae. Stigma capitato-peltatum. Bacca fusco-lutescens, granis piperis magnitudine, ovalis. Semen ovale. Differt a *L. sarmentoso* ramis non radicanibus; fol. subaveniis planis, longe acuminatis; stigmatē capitato-peltato; baccae magnitudine et colore. *Ruiz et Pav. In nemoribus Andium Peruviae, ad Pilao et Panoa. h.*

131. *L. sarmentosus Ruiz et Pav.*; racemis brevibus; floribus ternis, sessilibus, hexandris; bracteis ovatis; foliis oblongo-lanceolatis, carinatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 49. t. 278. f. a.*

Glaber. Radix fibroso-ramosa, ferruginea. Caulis ramosissimus, subscandens, hinc inde radicans, subteres. Rami dependentes, longi, subsarmentosi, angulati, ferruginei, granulati. Folia opposita, acuta, integerrima, parum carnosa, subtus venosa, 1½ poll., fere poll. lata. Petioli 2 lin., supra canaliculati. Racemi axillares, solitarii, ferruginei, angulosi, in fructu elongati. Pedicelli brachiati, breves, angulati, triflori. Bracteae 3 acutae, concavae. Calyx marginalis, brevissimus, membranaceus, obsolete 6-crenatus. Petala lineari-spathulata, reflexa, lutescentia, vix 2 lin.. Filamenta subulata, medio petalorum inserta. Antherae luteae, subcordatae, incumbentes. Germen oblongum, truncatum. Stylus longitudine staminum. Stigma obtusum. Bacca oblonga, viscosa, grisea, parvi pisi magnitudine. Semen oblongum, albicans. *Ruiz et Pav.. In nemoribus Peruviae Andium, prope Munna. h.*

132. *L. polyanthos Martius*; ramis teretibus, glabris; foliis oppositis, lanceolatis, mucronato-acuminatis, planis, subcoriaceis; racemis axillaribus, multifloris, folia subaequantibus; floribus ternis, in apicibus pedicellorum sessilibus; bracteis ternis, ovatis, acutis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Caulis graciles cortice flavescenti-cinereo; rami cinerei, nullibi radicanes. Folia basi attenuata, glaucescentia, nervo medio paulum prominente, cum petiolis 1½-2½ poll., 6-8 lin. lata. Petioli supra plani, 3 lin.. Racemi 1½ poll., graciles. Pedunculi compresso-tetragoni, cinerascens; in eorundem axilla mascula gemmaeformis, fusca; pedicelli oppositi, horizontales, angulosi, lin.. Bracteae concavae, longitudine germinum. Flores flavescens, 2 lin., inexpansi apice clavati. Calyx brevissimus, obsolete denticulatus. Petala 6, linearia, acutiuscula, a medio reflexa. Stamina petalis breviora, alterna breviora, subulata; antherae ovatae, obtusae, flavae. Stylus petalis staminibusque brevior, filiformis. Stigma parvum, obtusum. Germen minutum, glabrum. Proximus *L. sarmentosus*. *In sylvis Catingas Provinciae Bahiensis Brasiliae. h.*

133. *L. sessilis Jacq.*; racemis simplicibus, solitariis; floribus ternis, sessilibus. *Willd. Spec. II. p. 236. Jacq. Amer. p. 99.* *L. pedunculis axillaribus furcatis; floribus subternis terminalibus, sessilibus; bracteis ovatis; foliis ovalibus (breviter) mucronatis. Meyer Essequeb. p. 150.?*

Habitus pedunculati; at rami diffusi, fragiles. Folia ovata, 1½ poll.. Flores absque pedunculis propriis insident pedunculi partialis apici incrassato. Filamenta saepe omnia antherifera. Baccae e rubro sordide virentes. *Jacq. In sylvis Carthagenae.*

Obs. Descriptio *Jacquiana* nimis brevis, quam ut certi quid circa plantam cl. *Meyer* vel ab ipso auctore statui possit. In hac folia alterna, basi in petiolum attenuata, 1½ poll., lin. 10-11 lata. Pedunculi solitarii ½ poll., apice bifidi. Flores parvi. Bacca coccinea. *In arboribus insulae Arowabisch.*

134. *L. pedunculatus Jacq.*; (foliis cordato-ovatis, pe-

tiolatis, venosis); racemis simplicibus, solitariis; floribus ternis, pedunculatis. *Jacq. Amer.* 98. *Willd. Spec.* II. p. 256.

Radix ramos bifide ambiens. Rami nitidi, longi, reclinati, saepius radiceantes. Folia cordato-ovata, integerrima, acumine brevi, nitida, coriacea, petiolata, opposita, 2 poll., venosa. Racemi axillares, foliis breviores, floribus circiter 21, pedunculo principali compresso, plano latoque: partialibus 3-floris, propriis 1-floris. Flores inodori, parvi, calyce ovato, concavo, integro. Petala alba, caeterum ut in *L. unifloro*. Filamenta petalis duplo breviora, quorum 3 alterna augentur superne appendiculis 2 subrotundis. Antherae saepe omnino desunt, et harum loco tunc corpora cuspidata, erecta; hinc flores saepissime abortivi. Fructus? *Jacq.* In *Carthagenae arboribus maritimis, inundatis.* h.

155. **L. uniflorus*; racemis simplicissimis longitudine foliorum; pedunculis unifloris, elongatis; foliis obovato-obtusis, mucronatis. *Willd. Spec.* II. p. 255. *L. racemis simplicissimis.* *Linn. Spec.* 1672. *Mant.* p. 369. *Jacq. Amer.* 98. t. 69. pict. p. 51. t. 100. *Dict. Sc. nat.* 22. *Cah.* *L. parviflorus Desrouss.* in *Lam. Enc.* III. p. 595.

Frutex parasiticus, radice ramos bifariam ambiente. Folia subovalia, obtusa, cum acumine brevi, integra, glaberrima, coriacea, venis lateralibus e nervo medio, petiolata, opposita, saepe difformia. Racemi axillares terminalesque, solitarii. Flores parvi, inodori. Calyx fructus trifidus, laciniis ovatis, concavis, acutis erectisque. Petala purpurea, obtusa, patentissima, longitudine germinis. Filamenta petalis duplo breviora, 5 alterna longiora plerumque sine antheris, sed harum loco corpusculo antheris simili, at decolori nullumque continenti pollen. Bacca cylindracea utrinque depressa, cortice atro, pulpa glutinosa lactea. *Jacq.* Flores albi in *Dict. d. Sc. nat.* De germinatione *L. uniflori* conf. *Mirbel* in *Ann. d. Mus.* 1810. t. 21. In *sylvaticis Domingo.* h.

156. **L. occidentalis*; racemis simplicibus, floribus irregularibus. *Linn. Spec.* p. 472. *Loefl. it.* 187. *Amoen. Acad.* V. p. 396. n. 58. *Willd. Spec.* II. p. 255. *Swartz Obs.* 155. *Sloan. jam. hist.* II. p. 92. t. 200. f. 2. *Scurrula 2. Brown jam.* 197. fide *Linn.*

Rami divaricati. Folia ovata. Spicae oppositae, laterales, simplices. *Linn.* Racemi oppositi. Calyx margo minimus florem cingens. Petala 6, linearia, angustissima, ad medium in tubum erecta, superne patenti-revoluta, longitudinaliter concava. Filamenta linearia, acuta, plana, petalis breviora eorumque basi inserta. Antherae lineares, acutae. Germen brevissimum. Stylus filiformis. Stigma globosum, capitatum. Bacca cylindrica, oblonga. Semen 1, cylindrico-oblongum. *Löfl.* In *Americae arboribus.* h.

Obs. Si *Swartz* omnino hujus loci, aliam fere plantam descripsisse videtur. Rami subdivisi, laxi, scabri, fragiles. Folia majora, petiolata, opposita, patentia, glabra, succulenta, dilute viridia. Petioli breves. Racemi axillares, solitarii, teretiusculi; pedunculis brevissimis, crassis. Flores sessiles, minuti atropurpurascens. Cal. minutus, indivisus, viridis. Petala 6, basi fere connata, 3 paullo breviora, acuta. Filamenta petalorum medio insidentia, iisque breviora. Antherae 3 ovatae, luteae, fertiles, 3 steriles lateribus excavatae.

Germen subrotundum, calyce tectum et marginatum. Stylus petalorum longitudine, filiformis. Stigma simplex, obtusum. Bacca subrotunda, viscosa, monosperma. *Swartz*, ipse dubius haerens, quaerit: an *L. spicatus* ab hoc diversus, cum inflorescentia, flores et *Sloane l. c.* vix discrepent? Si planta *Swartzii*, ut videtur, diversa, *Swartzianus* LORANTHUS hicce dicendus erit.

137. *L. domingensis* *Desv.*; ramis biangulatis, virentibus; foliis obovato-oblongis, mucronulatis, carnosiss, in petiolum decurrentibus; racemis simplicibus, subternis; floribus subremotis. *Hamilt. Prodr. Pl. Ind.* p. 53.

In Hispaniola. *Herb. Desv.* h.

138. *L. laxiflorus* *Desv.*; ramis teretibus, subfuscis, foliis subconsistentibus, subrotundo-ovatis, leviter marginatis, in petiolum decurrentibus; racemis plerumque solitariis, longe pedunculatis, cinereis; floribus remotis; pedicellis elongatis. *Hamilt. Prodr. Pl. Ind. occ.* p. 53.

L. paucifloro *Sw.* affinis. In Hispaniola. *Herb. Desv.* h.

139. *L. pauciflorus* *Swartz*; racemis tripartitis, foliis obovatis brevioribus. *Swartz prodr.* 58. *Fl. ind. occid.* 1. p. 627. *Willd. Spec.* II. p. 237. *L. occidentalis* *Aubl. Guian.* p. 310.

Frutex 1-2 ped.; rami patentes, teretes, glabri. Folia obovata v. subrotunda, basi angustiora, opposita, patentia, venosa, utrinque glabra, fusco-viridia, exsiccata atra. Petioli breves. Racemi axillares solitarii. Flores parvi, purpurei, subsessiles, decussati. Calyx duplex: inferus indivisus concavus, superus margo germinis integer. Petala 6 basi contigua, lanceolata. Filamenta nulla. Antherae 6 ovatae, petalis insertae. Stylus subulatus. Stigma obtusum. Similis *L. occidentali*; sed illi racemi simplices, nec tripartiti. Specimina *L. occidentalis* *Aubl. in Mus. Banks.* vero conveniunt. *Swartz.* Ergo satis distinctus a *pyrifolio* quocum junxit *els. Sprengel.* In arboribus *Jamaicae interioris.* h.

140. **L. Stelis*; racemis trichotomis; pedunculis trigonis; floribus aequalibus. *Loefl. it.* 187. *Linn. Spec.* II. p. 473. *Desrouss. in Lam. Enc.* III. p. 597. *Willd. Spec.* II. p. 237.

Rami patentes, tetragoni. Folia opposita et alterna, ovata et suboblonga, integerrima, glabra, firma, coriacea, satis crassa, 1 $\frac{1}{2}$ poll., poll. lata, nervis obliquis, parum prominulis. Petioli 2-3 lin.. Flores parvi, viridi-flavescentes aut ochroleuci. Pedunculi 6-8 lin., plures in axilla foliorum, apice bi-trifidi, incrassati, triflori. Bractea squamiformis sub singulo flore. Cal. margo brevis, irregulariter denticulatus. Petala 6 tenuia, medio reflexa. Bacca ovato-oblonga, nigricans. *Desrouss. ex Herb. Juss.* Caulis frutescens, lignosus, brachiatus; ramis basi tubere magno. *Löfl.* In *Cumanac arboribus.* h.

141. *L. aduncus* *Meyer*; racemis axillaribus trichotomis simplicibusve; floribus sessilibus; bracteis ovatis; foliis oblongo-subrotundis in apicem aduncum terminatis. *Meyer Essequib.* p. 149.

„Frutex scandens 3-4 ped., radicibus per intervalla crassis, obtusis, curvatis, teres, nodosus, cortice rimuloso, glabro, fusco. Rami pauci, oppositi, erecto-patentes, breves, angulosi. Folia opposita, subcoriacea, 2½ poll., 1½ poll. lata, integerrima, venosa, utrinque tuberculata. Petioli 4 lin., angulosi. Racemi oppositi, ramo intermedio longiori, 3 poll., angulosi, rugosi. Flores nunc sparsi, nunc suboppositi, plerumque 3-6 aggregati, basi bractea persistente, subtriangulari, concava. Cal. margo integerrimus. Cor. parva laciniis brevibus obtusis. Filamenta corollae breviora. Antherae oblongae. Meyer l. c. Parasiticus in arboribus Essequibo. h.

142. *L. viridiflorus Wallich*; glaber; foliis oppositis, breviter petiolatis, lanceolatis, utrinque attenuatis, acuminatis vel obtusis; racemis axillaribus, subfasciculatis; floribus remotis, pedicellatis, 6-andris, 6-fidis, breviculis; bracteis 3 subgermine. Roxb. *Fl. ind. ed. Car. et Wall.* 2. p. 219.

Rami numerosi, cortice cinereo, punctato; primarii saepius subverticillati. Folia lanceolata vel ovato-lanceolata plerumque acuminata, marginibus gibbis, (2-) 3 poll., (1-1½ poll. lata), glaberrima, minus coriacea quam in plerisque ceteris, (pallide viridia), conspicue reticulata, (nervo medio subtus prominente). Racemi solitarii vel 2-3, subsessiles, foliis ½ breviores (1½ poll.). Flores virides (plerumque 5-7), irregulariter sparsi; pedicellis 4 lin., basi articulatis, (patentibus, glabris, teretibus vel subanapitibus). Cal. margo minimus, obsolete repandus, glaber. Cor. tubus 1½ poll. (? 2-5 lin.), quidquam ventricosus, obtuse 6-angulatus; limbi lacinae 6, rarius 5, lineares, reflexae, fere longitudine tubi, intus rugosae, apice late concavae, acutae. Filamenta erecta, 5-6, laciniis inserta, ad basin corollae usque decurrentia. Antherae parvae (ovatae, flavae). Germen oblongum, basi rotundatum, bracteolis 5 persistentibus ovatis inaequalibus concavis adpressis subacutis (germine 2-3-plo brevioribus) suffultum. Stylus filiformis. Stigma sublente rugosum, capitatum. Bacca parva, ovata. *Wallich*. Varietatem fol. brevioribus angustioribusque 1½ poll., 6-7 lin. latis; racemis brevioribus; floribus confertioribus, tubo basi magis ventricoso, ceterum nullo modo discrepantem observavimus in *Herb. cli. de Martius*, qui eam inter Nepalensia sine nomine ab illo. *Lambert* accepit. *In sylva Goukurrun in valle Nepal.* h.

Obs. *Cls. Don* in *Prodr. Fl. nep.* p. 143. *L. viridiflorum* perperam cum *L. odorato* conjunxit. Liceat nobis hanc commutationem corrigere, quae casu fors accidebat. Prostat nempe in *Herb. cli. de Martius* *L. odoratus* ab illo. *Lambert* communicatus et exactissime cum descriptione a *Wallich* data congruens; sed prostant ibidem etiam specimina *L. viridiflori* ab illo. *Lambert* communicata (in quae omnino quadrat descriptio *L. viridiflori* praeter magnitudinem corollae in descriptione, ubi iterum sphalmate, ut videtur, corolla sesquipollicaris dicitur, in diagnosi vero brevis), sub quibus et verus *L. viridiflorus* *Wall.* et casu quodam *L. odoratus* *Wall.* sub eadem charta latuit. Hoc, ut videtur, *cls. Don* ansam praebuit commutationis harum specierum omnino diversarum, quam *cls. Sprengel* sancivit.

145. *L. subumbellatus Blume*; racemis confertis, axillaribus; pedicellis ultimis subumbellatis; foliis oppositis, oblongo-lanceolatis, longiter acuminatis, coriaceis, glabris. *Blume* *Bydr. Fl. Nederl. Ind.* p. 662.

Affinis *L. sphaerocarpo*. *Juxta Tjiradjas in Provincia Krawang Javae. Blume.* h.

144. *L. sphaerocarpus* Blume; racemis axillaribus, solitariis geminisve; floribus hexandris; foliis breviter petiolatis, oppositis, ovato-oblongis, coriaceis, glabris, subtus aveniis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind.* p. 661.

In Java circa Bataviam, Buitenzorg etc. *Blume.* h.

145. *L. tetragonus* Blume; racemis confertis, axillaribus; floribus hexandris; foliis oppositis, sessilibus, ovalibus, acutis s. obtusis, pergamenis, glabris; ramulis tetragonis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind.* p. 663.

Circa Tjiradjas Provinciae Krawang Javae. *Blume.* h.

146. *L. formosus* Blume; racemulis confertis, lateralibus (casu foliorum); floribus hexandris; tubo longissimo, clavato, angulato; foliis suboppositis, ovato-oblongis, coriaceis, subaveniis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind.* p. 664.

Flores speciosi, coccinei; corollae lacinae revolutae, margine atropurpureae. *Blume.* In sylvis Salak in Java. h.

147. *L. ampullaceus* Roxb.; foliis oblongis, oppositis, lucidis; racemis axillaribus, simplicibus; floribus calyculatis, regularibus, hexandris; tubo corollae gibboso; baccis longis, ovalibus. *Roxb. Flor. ind. ed. Car. et Wall.* II. p. 209.

β. Ampuraro Wall. l. c. p. 210.

Caulis magnitudine varius, bi-tri-quadrifidus, glaber. Folia breviter petiolata, integerrima, 3-4 poll., 2 lata. Racemi solitarii geminive, foliis multo breviores. Flores oppositi, breviter pedicellati, sat magni, viridi-flavescentes. Bractee ovatae, singula ad singulum pedicellum, et duae ad basin germinis instar calycis bilabiati. Cal. proprius integerrimus, rotatus. Cor. limbo 6-fido, laciniis revolutis, subspathulatis. Filamenta 6 ad faucem tubi, longitudine laciniarum. Stylus corollae longior; stigma grande. Bacca glabra, flava, magnitudine cerasi. Seminis integumentum duplex: exterius fibris 6 longitudinalibus. *Roxb.*

In *β.* Caulis ramorumque cortex glaber, cinereo-albus; folia ovato-lanceolata ovataque, acute acuminata, glaberrima, uti tota planta, 4-5 poll., coriacea, supra lucida, sicca venosa, venis reticulato-arcuatis. Racemi axillares plures in singula axilla. Bractee 2 oppositae, ovatae, germine breviores; altera acuta margine in pedicello decurrente, altera obtusa, biloba: bractee sub flore nullae. Cal. obsolete 5-lobus. Cor. circiter pollicaris, ante expansionem ampullacea, basi ventricosa, apice angustata, hexagona, apice rotundata, punctato-scabra. Reliqua uti in planta *Roxburghiana*. Forte distincta species. *Wall.* In arboribus *Silhet.* h.

148. *L. indicus* Desrouss.; foliis ovato-oblongis, obtusiusculis; racemis simplicibus, elongatis, axillaribus; fructibus ovato-cylindricis. *Desrouss.* in *Lam. Enc.* III. p. 600. *Lam. ill.* t. 258. f. 2. LONICERA zeylanica Gaertn. *fruct.* p. 152. t. 27.?

Caulis lignosi, teretes, ramosi, glabri, uti tota planta. Folia alternata, fere subopposita, integerrima, coriacea, nervis aliquot obliquis, 3½-4 poll., 18 lin. lata. Petioli 1½-2 lin.. Racemi

erectiusculi, 2 - 2½ poll., floribus sparsis, pedicellatis. Baccæ ovato-cylindricæ oblongæve, carnosæ, calyce parvo, membranaceo, basi membranâ brevî, integerrimâ, coriaceâ, scariosâ. Embryo qualis in figura Gaertneri. Resina camphoracea, albida, crystallina, qualem *Gaertner l. c.* notavit. *Desrouss.* ad specimen mancum in *Herb. Lam.*. In *India orientali*. *Sonnerat.* h.

149. **L. falcatus* *Linn. Suppl.*; racemis paucifloris, axillaribus; foliis linearibus, obtusis, lateraliter falcatis, glaucis. *Linn. Suppl.* 211. *Willd. Spec.* II. p. 253.

Folia margine deorsum vergente falcata, integerrima, avenia, cana. Racemi axillares, pauciflori. Flores falcati, fulvi. *Linn. fl. l. c.* In *India orientali circa Madras.* h.

6. Spicæ.

150. *L. concinnus* *Mart.*; glaber; ramis gracilibus, teretibus; foliis oppositis, lanceolatis, acuminatis, membranaceis, supra nitidis; spicis axillaribus terminalibusque solitariis, interruptis, folio brevioribus; floribus ternis, oppositis, sessilibus, subverticillatis, bracteatis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami divergentes, graciles, fuscæcentes; epidermide solubili, cinereâ, diaphanâ. Folia patentia, margine subrevoluto, subtus nervosa pallidioraque, 18-24 lin., 6-8 lin. lata. Petioli 1½-2 lin.. Spicæ graciles, racemos referentes, 1-1½ poll.. Pedunculi obsolete tetragoni, fasciculorum paribus 4-6. Flores 3, rarius 2 in fasciculis oppositis, patentes, 1½ lin.; inexpansi clavati, obtusi. Bracteæ 3 lanceolatae, acutæ, ⅓ lin.. Cal. obsoletus, integerrimus. Pet. 6, linearia, acuta, reflexa. Stam. petalis breviora, subulata, alterna longiora. Antheræ ovatae, flavæ. Germina minutissima, cum calyce ¼ lin.. Stylus longitudine staminum breviorum, subulatus. Stigma obsoletum. In *sylvis ad Ega prov. Rio Negro Brasiliæ.* h.

151. *L. nitens* *Mart.*; glaber; ramis teretibus, subinde radicanibus; foliis alternis, ovato-lanceolatis, acuminatis, nitidis, membranaceis; spicis racemosis, interruptis; superioribus axillaribus, solitariis; inferioribus paniculatis; floribus ternis, sessilibus, bracteatis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami divergentes, nodosi, flavicanti-cinerei; subinde radiculis brevibus, glabris, cinereis. Folia patentia, basi attenuata, subtus nervosa, utrinque nitentia, 1½-2 poll., 7-10 lin. lata. Petioli 1½-2 lin.. Spicæ superiores 1-1½ poll., pedunculo tetragono, pedicellis vix conspicuis, oppositis alternisque; inferiores ad ramorum ortum paniculatae, e spicis 4-6 oppositis, patentes, 2 poll.; pedunculo communi tetragono. Bracteæ 3: laterales ovatae, longitudine germinis; media ovata, subulato-acuminata, longior. Flores lineæ, inexpansi ovato-conici. Cal. brevis, integerrimus. Pet. 6, lineari-lanceolata. Stam. petalis breviora; filamenta crassa, angulosa, longiora ad latera excavata. Antheræ ovatae, mucronatae, flavæ. Stylus petalis brevior, apice articulo gibbo. Stigma obsoletum. In *sylvis prov. Rio Negro Brasiliæ.* h.

152. *L. subcampestris* Mart.; ramis teretibus, apice ferrugineo-lepidotis, compressis; foliis oppositis, ovato-ellipticis, obtusis, coriaceis, nervosis, glabris; spicis axillaribus solitariis geminisque, interruptis, folio duplo brevioribus; floribus suboppositis, ternis, sessilibus, bracteatis, minimis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

Rami stricti, inferne teretes, fusco-cinerei. Folia patentia, basi quidquam attenuata, nervo medio subtus prominente, ferrugineo, suberoso-lepidoto, $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ poll., $1\frac{1}{2}$ - 2 poll. lata. Petioli subtus ferrugineo-lepidoti, 3 lin.. Spicae 1 - $1\frac{1}{2}$ poll.; pedunculus inter flores subtetragonus, ferrugineo-lepidotus. Flores in rhachi sessiles vel in ramulo vix conspicuo subreflexo, $\frac{1}{2}$ lin.; inexpandi ovati, acuti. Bracteae 3, ovatae, acuminatae, subcarinatae, germina superantes. Cal. obsoletus, integerrimus. Pet. 6, lineari-lanceolata, acuta. Stam. petalis breviora, 3 longiora. Antherae ovatae, flavae. Stylus longitudine staminum longiorum, apice incrassatus; stigma obsoletum. Baccae ovato-oblongae, 1 - 2 lin.. *L. retroflexo*, ut videtur, affinis. *In campis provinciae Minas Geraës. t.*

153. *L. affinis* Mart.; ramis teretibus, apice compressis ferrugineo-lepidotis; foliis suboppositis, ovato-ellipticis, acuminatis, coriaceis, nervosis, glabris; spicis axillaribus, solitariis, interruptis, folio duplo brevioribus: floribus ternis, sessilibus, retroflexis, bracteatis, minimis. *De Martius Fl. Bras. ined.*

L. subcampestri valde affinis et tantum ramis minus ferrugineo-lepidotis; foliis semper acuminatis, saepe complicatis, paulo brevioribus; petiolis 2 lin., spicis semper solitariis et quidquam gracilioribus, floribus in pedicellis magis conspicuis retroflexis diversus. *In sylvis Japurensibus prov. Rio Negro Brasiliae. t.*

154. *L. ovalifolius* Ruiz et Pav.; spicis solitariis geminisque brevibus; floribus confertis, hexandris, minimis; foliis ovalibus, subaveniis, carnosis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 50. t. 277. f. b.*

Affinis *spicato*; sed differt praecipue foliis alternis subaveniis; spicis cylindricis. Planta parasitica, herbacea, glabra, valde carnosissima. Radix fasciculata, ramosa, fibrillosa, fusco-cinerea. Caulis erectus, simplicissimus, ped., teres. Folia alterna, breviter petiolata, integerrima, leviter emarginata, poll.. Petioli 2 lin., canaliculati. Spicae axillares petiolis duplo longiores. Flores confertissimi, sessiles, minimi, rhachi crassae infixi, ebracteati. Calyx vix conspicuus. Petala 6, minima, purpurea, retroflexa, linearia. Stamina 6 medio petalorum inserta. Bacca ovalis, calyce minuto coronata, obscure purpurea, grani piperis nigri magnitudine. Semen ovale, albidiusculum. *Ruiz et Pav. In nemoribus Andium Peruviae ad Pillao et Chacahuassi. t.*

155. * *L. spicatus*; spicis quadrangularibus. *Linn. Mant. 63. Jacq. Amer. 97. t. 68. pict. p. 50. t. 99. Willd. Spec. II. p. 257. — β . melananthus. L. sp. atroanthus; spicis inferioribus axillaribus, superioribus racemoso-confertis, aphyllis. Meyer in Nov. Act. Ac. Nat. Cur. T. XII. p. 788.*

„Folia opposita, obtusa, nervosa.“ *Linn.*. Fruticosus, ramosus. Radix bifariam ramulum ambiens, postea confluens; fibrillis ubique emissis per ramos decurrens. Rami lignosi, diffusi, fragiles. Folia integerrima, obtusa, glabra, coriacea, pinguis, petiolata, venis e basi communi adscendentibus, ovata, ovalia, obovata vel subrotunda. Spicae oblongae, crassae, quadrisulcatae, axillares, solitariae, folia non superantes. Flores exigui, inodori, rubri, serie 4-plici in spica profunde sessiles. Calyx fructus squama ore inaequali. Petala semierecta, basi corollam monopetalam mentientia, superne aequaliter patentissima, staminibus duplo longiora. Bacca ovato-oblonga, virescens, apice rubro, gluten lacteum continens. *Jacq.* β forsitan nova species; sed ob specimina incompleta non rite distinguenda. A planta *Jacquiniana* differt praesertim inflorescentia magis composita, venisque foliorum minus expressis; convenit cum illa foliorum forma variabili, saepius ovata, obtusa et pinguedine, fructibusque foveis rhacheos quadrifariam insidentibus, ejusdem formae et magnitudinis. *E. Meyer.* *Carthagenae parasiticus.* \dagger .

Obs. Certe hujus loci esse videtur specimen nomine *L. occidentalis* ab amico *Balbis* communicatum, et a clo. *Bertero* in Jamaica lectum, quadrat nempe et icon et descriptio a *Jacq.* data, cui sequentia addimus: rami teretes, squamulis minutis ferruginei, crassitie pennae Corvi. Folia opposita, subsessilia, margine subcalloso quidquam undulata, plerumque 2 poll., 1-1/2 poll. lata. Spicae 8-lin. in pedunculo tereti, ferrugineo, erecto, 1/2 poll. Flores lin., horizontaliter patentem, decussati. Calyx proprius margo obsolete-tissimus. Petala lineari-oblonga, obtusiuscula. Stamina alterna breviora. Filamenta purpurascens, plana, basi petalorum inserta iisque breviora. Antherae subrotundae, didymae, flavae, apice mucrone earundem fere longitudine. Stylus sat crassus, staminibus paulo longior, purpureus, stigmate subcapitato. Baccae ovatae, retusae, fere umbilicatae.

146. *L. emarginatus Swartz*; spicis axillaribus; foliis cuneato-ovatis, emarginatis. *Swartz prodr.* 58. *Fl. ind. occid.* 1. p. 625. *Willd. Spec. Pl.* II. p. 255.

Caulis 1-2-ped., subscandens, ramosus, laxus, teres, laevis; rami breves, oppositi, angulosi, glabri. Folia opposita, basi cuneata, obcordata v. obovata, enervia, subcoriacea, glabra. Petioli breves. Spicae (l. racemi simplices) terminales, axillares oppositae, solitariae, simplices, 4-gonae, erectae, longitudine foliorum; floribus subsessilibus, oppositis, minutis, vix apertis, purpurascens. Cal. cyathiformis, 3-dentatus; dentibus brevissimis, ovatis, acutis. Petala 6 lanceolata, 3 quasi interiora, breviora, decidua. Filamenta 6 infra medium petalorum inserta, brevissima, purpurea, sterilia latiora longioraque. Antherae 3 acuminatae, steriles; 3 subrotundae, fertiles, sterilibus utroque latere excavatis semitectae. Stylus subulatus, longitudine petalorum. Stigma simplex, obtusum. Bacca oblonga, calyci insidens, apice retusa, nigra. Semen hexagonum, oblongum. *Swartz.* *In arboribus montium Hispaniolae.* \dagger .

Obs. Nominis *L. spicati* plurima in *Herb. Schreber.* asservantur specimina ex Antillis, a *L. spicato Linn.* et *Jacq.* toto coelo diversa, in quae omnino definitio et descriptio *L. emarginati* a divo *Swartz* data quadrat praeter spicarum longitudinem, quae rarius foliorum longitudine, sed plerumque foliis breviores. In his speciminibus rami cinereo-fuscescentes, compresso-4-angulares, angulis 2 acutioribus. Folia plerumque obovata emarginata, rarius obovata obtusa cum mucronulo, nervo medio acuto subtus prominente, 1-1/2 poll., 8-10 lin. lata. Petioli subtus convexi, supra plani, acute marginati, 1 1/2-2 lin. Racemi 1/2-1 poll., a medio floriferi. Pedunculi compresso-subtrigoni; pedicelli brevissimi, crassi, 1-flori, suboppositi. Flores vix ultra lin. Calyx margo brevissimus, integerrimus. Fructificationis partes exacte ut in *Swartz.* Baccae ovato-oblongae, 2 fere lin., bractea inaequaliter 3-dentata suffultae; dentibus ovatis, acutis, infimo vel exteriori longiore latioraque.

157. *L. anceps Desv.*; ramis compresso-ancipitibus, virentibus; foliis breviter petiolatis, elongatis, ovato-obtusis; spicis breviter pedunculatis, solitariis, axillaribus, folio multo brevioribus; floribus parvis, subimbricatis. *Hamilt. Prodr. pl. Ind. occ. p. 33.*

In Guyana. Herb. Desv. h.

158. *L. globosus Roxb.*; foliis (plerumque) oppositis, oblongis, glabris; spicis axillaribus; corollis regularibus, 6-fidis; baccis ovato-globosis. *Car. et Wall. Fl. ind. II. p. 206.*
Kanneli itti kanni. *Rheed. Mal. X. 9. t. 5.*

Folia subinde, rarius vero, alterna ternaque, breviter petiolata, integerrima, crasse coriacea, subavenia, 2-3 poll.. Racemi s. potius spicae, inter folia, ex axillis antiquis, plerumque solitarii, subinde bini ternique, foliis multo breviores. Flores oppositi, per paria 3-6, sessiles, parvi, e viridi aurantiaci. Bractea 2 sub fructu; inferior et exterior cordata, interior bidentata: calyx margo circularis. Cor. tubo gibbo, sexangulari. Cor. sexpartita, laciniis reflexis. Filamenta 6, basi laciniarum inserta. Germen ovatum. Stylus longitudine staminum. Stigma magnum, globosum, umbilicatum. Bacca ovato-globosa, magnitudine pisi, glabra, flava, glutinosa, elastica. Semina solitaria, integumento albo, striis 12. Embryo centralis. *Roxb. In arboribus Bengaliae. h.*

Obs. Planta *Rheedi* certe non hujus loci, nam: rami cinerei, ligno albo; folia breviter petiolata, viridia, opposita, oblongo-rotunda, crassa, solida, plana, glabra; costâ utrinque nonnihil prominente. Flores in racemis brevibus, 4-7-floris, lateralibus. Calyx rotundus, viridiusculus, corollae tubum arcte cingens. Corollae tubus oblongus, sanguineus; lacinae 4. Stamina 4, rubra, tenuia; antherae albicantes. Germen planum, viride; stylus albicans, superne rubescens. Fructus rotundi vel parum oblongi, umbilico plano in vertice, maturi fusco-rubescens, lacte albicante viscido turgentes. Species forte propria, ulterius observanda, et, si species propria, *tetrandros* inter referenda et *L. Kanneli* dicenda.

159. *L. odoratus Wallich*; glaber; foliis suboppositis, ovato-lanceolatis, carnosis; spicis axillaribus, subfasciculatis; rhachi carnosâ, foveolatâ; floribus articulatis, sessilibus, subimmersis, patulis, 6-petalis, 6-andris. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall. 2. p. 215.* *L. spicis folio elliptico obtuso brevioribus; flor. patulis, 6-andris; antheris subrotundis; stylo petalis brevioribus.* *Don Prodr. Fl. nepal. p. 145., et hoc teste: L. hexapetalus Hamilt. Mss. et L. viridiflorus Wallich.*

Rami teretes: cortice pallido, punctato; juniores fusciscentes, glabri uti tota planta. Folia rarius omnino opposita, plerumque subalterna, utrinque acuta, marginibus undulatis, planis, avenia, pallide-viridia vel flavescens, 4-6-poll. (1-2 poll. lata). Petioli breves, graciles, canaliculati. Spicae suboppositae, vel fasciculatae s. subverticillatae, plerumque sessiles (in specim. indico in *Herb. cli Martius* spicae in axillis oppositae, breviter pedunculatae, 1½ poll.), foliis breviores, multiflorae. Rhachis crassa, subangulosa, foveolis profundis, acute marginatis, in quas ovaria dimidio immersa et subarticulata. Flores minuti, albidi, sparsi, approximati, fragrantis. Cal. minutissimus, integer. Cor. 3 lin. et longior, primum clavata, demum patens; petalis cuneatis, apice paulum concavis, basi cum calycis facie interiore connatis. Stamina 6, petalis quidquam bre-

viora. Germen minutum, globosum, flavescens, bracteâ nulla suffultum, nisi margine acuto foveolae rhacheos subtus quilibet latiore. Stigma scabrum, nutans. *L. pentapetalo* Roxb. affinis; sed abunde differt: floribus articulatis, sessilibus, semper patulis, 6-petalis, 6-andris; rhachi foveolata. *Wallich. In montibus Chandagiri et Sheapore Wall., ad Narainhetty in Nepal. Hamilt.* Confer *L. viridiflorum*.

160. *L. leptostachyus* Humb. et Bonpl.; foliis ovato-ellipticis, acuminatis, basi rotundatis, subcoriaceis, glabris; spicis axillaribus geminis aut ternis, (?) folio duplo triplove brevioribus; floribus sparsis, distantibus, sessilibus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 440. n. 19.*

Ramuli subtetragoni, laeves, glabri. Folia reticulato-venosa, nervo medio subtus prominente, glabra, 5 poll., $2\frac{1}{2}$ poll. lata. Petioli $\frac{1}{2}$ fere poll., glabri. Spicae $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll., graciles, rhachi compresso-quadrangulata, glabra. Flores solitarii, sparsi aut suboppositi, valde distantes, minuti, vix 2 lin.. Cal. margo integer, glaber. Petala 6, lanceolato-lineararia, acuta, glabra, patula. Stam. 6 petalis breviora, longitudine styli. Stigma obtusum. Fructus? *Kunth l. c.* *In Andibus Quinduens., Carthaginem inter et Buga. t.*

161. *L. alveolatus* Humb. et Bonpl.; ramis teretibus; foliis subrotundo-ovatis, subobliquis, apice rotundatis; spicis axillaribus solitariis, geminis aut ternis, inarticulatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 444. n. 50.* *L. rotundifolius*; foliis ellipticis, subrotundis, subpetiolatis; spicis axillaribus tetragonis. *Reliq. Willd MS. sive de Schlechtend. fil.*

IN CRESCENTIA *Cujete* parasiticus frutex et ramosissimus, glaberrimus; ramis laevibus, fuscis: junioribus pendulis. Folia basi acuta, avenia, obsolete multinervia, subcoriacea, 24-27 lin., 17-19 lin. lata. Petioli 2 lin., inferne incrassati, glabri. Spicae axillares et terminales, breviter pedunculatae, 1- $1\frac{1}{2}$ poll. Rhachis quadrangularis pro floribus fructibusque profunde excavata. Flores quadriseriati (ex *Bonpl.*), rhachi semiimmersi, sessiles, remoti. Cal. margo obsolete, integer. Petala 6 albivirentia, lineari-lanceolata. Stylus longitudine staminum. Stigma capitatum viride. Baccae rhachi semiimmersae, sessiles, remotae, ovatae, magnitudine grani piperis. Affinis *Visco purpureo* in *Herb. Juss.* *Kunth l. c.* *Prope Carthaginem Popayanensium. t.*

162. *L. amplexicaulis* Humb. et Bonpl.; ramis teretibus; foliis reniformibus, sessilibus, amplexicaulibus; spicis axillaribus geminis, inarticulatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 445. n. 51.* *L. foliis subrotundis, basi cordatis, amplexicaulibus; flor. axillaribus, spicatis. Reliqu. Willd. MS. (sive de Schlechtendal fil.)*

Frutex parasiticus, glaberrimus, ramulis striatis? glabris, fuscis centibus. Folia integerrima, siccata obsolete nervosa, coriacea, $1\frac{1}{2}$ poll. lata. Spicae subsessiles, fructiferae ut in *alveolato*, cui proximus. Baccae semiimmersae ovatae. *Kunth l. c.* *In*

temperatis Prov. Caracasanae prope villam Curae (hacienda del Conde de Tovar); Valles de Arasica. In Herb. Willd.

163. *L. pterygopus Mart.*; glaber; ramis apice compressis; foliis oppositis, brevissime petiolatis, ovatis, acuminatis, coriaceis; spicis axillaribus, solitariis, folio longioribus; pedunculis compressis, alatis; floribus ternis, sessilibus.
De Martius Fl. Bras. ined.

Rami oppositi, stricti, basi teretes, cinerascens. Folia e basi ovata longe acuminata, sub lente utrinque minute punctata, obsolete venosa, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., 10-20 lin. lata. Petioli vix lin. Spicae erecto-patentes, $1\frac{1}{2}$ -3 poll. Pedunculi elliptico-oblongi et oblongo-lineares, 8-11 lin., 1-2 lin. lati. Rhaches subquadrangulares. Flores 3, rarius 2 in rhacheos excavationibus suboppositi, vix $\frac{1}{2}$ lin., bracteis e marginibus excavationum protensis. Calyx brevissimus, integer. Petala 6, lineari-lanceolata, vix patentia. Filamenta corollae breviora, brevissima, petalorum basi inserta, inaequalia. Antherae rotundato-ovatae, flavae. Stylus longitudine staminum longiorum, subulatus. Stigma obsoletum. *In sylvis provinciae Bahiensis et Minas Gerais Brasiliae. h.*

164. *L. polystachyus Ruiz et Pav.*; spicis ternis laxis; floribus sessilibus, hexandris, minimis; bracteis obsoletis; foliis ovato-lanceolatis, amplis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 50.*

Frutex parasiticus, glaber, 2-ulnaris. Caulis erectus, teres, articulationibus compressiusculis, ramosus; rami similes, longi. Folia opposita, acuta, venosa, integerrima, plerumque bipalmaria, 2 poll. lata, crassa. Petioli 2-5 lin., contorti, canaliculati. Spicae axillares, inaequales, leviter flexuosae, foliis dimidio breviores, divergentes. Flores terni, in oppositionibus remotiusculis. Bractee vix conspicuae, semiannulares. Cal. minimus, subinteger. Petala 6, minima, purpurea. Bacca ovalis, parvi pisi magnitudine, luteo-fusca. Semen ovale. *Ruiz et Pav. In nemoribus Andium Peruviae ad Muna, Pillao, Panoo etc. h.*

165. *L. angustifolius Humb. et Bonpl.*; ramis teretibus, subverticillatis; foliis lineari-lanceolatis, subensiformibus, apice angustatis et obtusis; spicis axillaribus solitariis, geminis aut ternis, articulatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 444. n. 25. L. salignus; spicis axillaribus, foliis lineari-lanceolatis, elongatis, obtusis, brevioribus. Rel. Willd. Ms. (fid. de Schlechtend. fil.). Viscum stenophyllum Spreng. S. V. 1. p. 487.*

An haec, ita ut sequentes, Viscer species? Frutex parasiticus, ramosissimus, erectus pendulusve, ramis ternis quaternisve laevibus? glabris, viridibus. Folia basi in petiolum decurrentia, obsolete trinervia, subcoriacea, glabra, 4-5 poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata. Petioli 3-4 lin. glabri. Spicae articulis apice membranaceo-cupuliformibus, 1- $1\frac{1}{2}$ poll.; floriferae? fructiferae baccis undique arcte obsitae. Baccae depresso-globosae, in excavationibus rhachis sessiles, subquadriseriatae, hyalinae, magnitu-

dine grani minoris cannabis. *Kunth l. c.* In temperatis
Andium peruv. Olleras inter et montem Aipate. h.

166. *L. piperoides Humb. et Bonpl.*; ramis teretibus; foliis oblongis, apice angustatis et obtusis, subsensiformibus; spicis axillaribus, geminis ternisve, articulatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 443. n. 26.* *Viscum dichotomum Bertero. Sprengel S. V. 1. p. 488.*, quo teste etiam *Viscum flavescens Pursh (excl. syn. Swartz.)*

Frutex parasiticus, dichotome ramosissimus, pendulus, glaberrimus; ramis articulatis, laevibus; articulis apice bidentatis: nodis tumidis, compressis. Folia brevissime petiolata, basi in petiolum decurrentia, integerrima, avenia, nervo medio obsoleto, coriacea, 3 poll. et ultra, 12-14 lin. lata. Petioli 2 lin.. Spicae sessiles, articulis apice bidentatis, fructiferae pollicares. Baccae arcte quadriseriatae, sessiles, rhachi paulo immersae, sphaericae, laeves, magnitudine grani Cannabis minoris. Semen orbiculatum, compressum. Flores? *Kunth l. c. ex Bonpl. Prope Carthaginem Popayanensium. h.*

167. *L. torulosus Humb. et Bonpl.*; ramis teretibus; foliis subrotundo-obovatis aut ellipticis, obliquis, apice rotundatis; spicis geminis aut ternis (?) articulatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 443. n. 27.* *L. granularis*; spicis geminis, axillaribus, imbricatis; foliis ellipticis, coriaceis, duplo brevioribus. *Rel. Willd. MS. (fide de Schlechtendal fil.). Viscum buxifolium Lam.? Sprengel S. V. 1. p. 488.*

Frutex parasiticus, ramosissimus, glaberrimus, saepius pendulus; ramis laevibus, nodis tumidis. Folia basi cuneata, avenia, nervo medio obsoleto, submembranacea, 30-33 lin., 16-20 lin. lata. Petioli 2-3 lin.. Spicae axillares, breviter pedunculatae, fructiferae 1½ poll., articulis apice membranaceo-bidentatis basi que nudis, medio incrassatis et bacciferis. Baccae arcte quadriseriatae, basi in excavationibus favosis rhachis immersae, sessiles, subglobosae. *Kunth l. c. In arboribus prope Guayaquil Quitens. h.*

168. *L. viscifolius Humb. et Bonpl.*; ramis quadrangularibus; foliis subsessilibus, oblique oblongis, apice rotundatis; spicis axillaribus, geminis ternisve, articulatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 443. n. 28.* *Viscum trinervium Lam. Spreng. S. V. 1. p. 488.*

Frutex parasiticus, ramosissimus, glaberrimus; ramis articulatis, laevibus, glabris, viridibus. Folia basi cuneata, obsolete 3-5 nervia, subcoriacea, glabra, 1½-2 poll., 7-9 lin. lata. Spicae articulis apice urceolato-membranaceis; fructiferae subpollicares, undique baccis arcte obsitae. Baccae globosae, arcte quadriseriatae, in excavationibus rhacheos sessiles, laeves, magnitudine grani piperis. Affinis *Visco trinervi* in *Herb. Paris. Kunth l. c. Cum toruloso. h.*

169. *L. quadrangularis Humb. et Bonpl.*; ramis quadrangularibus, subalatis; foliis lanceolato-oblongis, obtusis,

subensiformibus; spicis axillaribus, geminis (?), articulatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 444. n. 29.*
Viscum rubrum Spreng. S. V. I. p. 488.

Frutex in *Guazuma* parasiticus, ramosissimus, pendulus, glaberrimus; ramis articulatis, striatis, viridibus. Folia brevissime petiolata, apicem versus paulo angustata, submucronata, obsolete 3-nervia, subcoriacea, glabra, 24-27 lin., 6-8 lin. lata. Petioli lineam longi, glabri. Spicae fructiferae 1½ poll. Baccae globosae, arete quadriseriatim sessiles, laeves, parvae. *Kunth l. c.* In temperatis regni *Nov. Granatens.*, prope *Pandi et Fusagasuga*. *h.*

170. *L. florulentus Rich.*; ramis oppositis, patentissimis, quadrangulis; foliis oblongo-ovatis, obtusissimis; spicillis in omnibus axillis solitarie sessilibus. *Richard act. soc. h. nat. p. 107.*

In *Cayenna. Le Blond. h.*

7. Cymae vel umbellae axillares.

171. *L. nutans Spreng.*; ramis teretibus, dichotomis, glabris; foliis oblongis, utrinque attenuatis, laevibus; pedunculis axillaribus geminis, cymosis, paucifloris, reflexis. *Sprengel S. V. II. p. 128.*

In *Brasilia. Sellow. h.*

172. *L. pendulus Sieber*; glaber; ramis teretibus; foliis suboppositis, petiolatis, aversis, lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis, obsolete trinervibus: junioribus ferrugineis; cymis erectis, axillaribus, foliis multo brevioribus; floribus ternis: lateralibus pedicellatis, medio sessili.

Rami longi, tenues, penduli?, ad foliorum ortum tumiduli compressique, fusci, apice ferruginei, glabri, sed sub lente papulis minutissimis ferrugineis resinose nitentibus. Folia opposita et subalterna, erecta, apice acuminata vel rarius obtusula, in petiolum glabrum, teretiuseculum, gracilem, pollicarem angustata, integerrima, coriacea, nervis obsolete 3, rarius 5, longitudinaliter parallelis, cum petiolis 5-6 poll. v. spithamaea, 4-6 lin. lata. Cymae foliis triplo breviores, plerumque 3-partitae, rarius 2-4 partitae, 9-florae. Pedunculus communis poll., basi paululum incrassatus, teres, glaber, ferrugineus, sub lente squamulis minutissimis ferrugineis; ramuli 3, (2-4) erecto-patentes, pedunculo conformes, subangulati, 2-5 lin., 3-flori; flores erecti, ferruginei, poll., laterales in pedicello horizontaliter patente, angulato, lin.; medius sessilis. Bractae ad basin germinis ovatae, acutiuseculae, squamulis minutissimis ferrugineae, marginibus fimbriato-ciliatae. Calyx minutus, obsolete 6-dentatus, acetabuliformis, squamuloso ferrugineus, margine fimbriis brevibus ferrugineis. Corollae inexpansae angustae, apice clavatae, subsexangulares, ferrugineae; expansae, ut videtur, ad basin usque 6-fidae; laciniis linearibus apice lanceolato-dilatatis, acutiuseculis. Filamenta longitudine fere corollae, laciniarum medio inserta, filiformia, fusca. Antherae lineares, acutiuseculae, basi affixae, lin. Stylus filiformis, stamina vix superans, stigmatibus

parvo capitato. Ad specimen in *Sieb. Herb. Nov. Holl.* 241. In *Nova Hollandia.* h.

173. *L. umbellatus* Heyne; foliis oppositis, ovato-lanceolatis; petiolis dorso decurrentibus; umbellis axillaribus, oppositis, breviter pedunculatis, paucifloris; corollis tubulosis, coriaceis, hexagonis. *Roth nov. plant. spec.* p. 192. *L. umbellatus*; foliis ovatis, acuminatis, rigidis, glaucis; umbellis pedunculatis, capitatis, paucifloris, axillaribus, petiolo brevioribus. *Reliqn. Willd. MS.* (fide specim. Klein a Heyne.)

Caulis angulosus, glaber, articulatus, griseus, valde nodosus, ad nodos fragilis, articulis a petiolis dorso utrinque linea elevata decurrentibus, subnerviis. Rami alterni, flexuosi. Folia basi vix parum attenuata, obtusa, integerrima, coriacea, glabra, pallide viridia, costata, obsolete venosa, $2\frac{1}{2}$ unc., basi $1\frac{1}{2}$ unc. fere lata. Petioli $\frac{1}{2}$ -1 unc., semiteretes, supra planiusculi, superne parum dilatati, praesertim in ramis junioribus, dorso linea elevata a nodo ad nodum fere per totum articulum decurrentes. Pedunculus petiolo duplo brevior. Bracteae ad quemvis florem oppositae, coriaceae, glabrae, minutae, sessiles, cordato-orbiculatae, brevissime mucronatae, calyci adpressae. Flores sessiles, atropurpurei, glabri, per exsiccationem valde caduci. Cal. coriaceus, minutus, truncatus, urceolaris, margine integerrimus. Cor. fere unc., glabra, supra medium punctis 6 elevatis, parum dilatata et costis 6 recta decurrentibus, ad puncta usque 6-fida; lacinae lineares, obtusae, apice parum attenuatae. Filamenta 6, ad corollae lacinas decurrentia. Antherae lineares, caerulescentes, interiore latere dehiscentes. Germen ovatum. Stylus filiformis. Stigma subcapitatum. *Roth.* In *India orientali.* Heyne. h.

8. Flores in apice ramulorum vel in gemmis sessiles.

174. *L. microphyllus* Humb. et Bonpl.; foliis minutis, oblongis, obtusis, submucronatis, sessilibus, crassiusculis, pubescenti-hirtis, canescentibus; floribus sessilibus in apice ramulorum congestis, subhexapetalis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth* III. p. 459. t. 500. n. 16. *L. daphnoides*; canescenti-pubescentibus; foliis ellipticis, acutis floribusque aggregatis sessilibus. *Reliqn. Willd. MS.* (fide de Schlechtendal fl.)

Frutex parasiticus? ramosissimus, ramis oppositis? aut dichotomis? teretibus, hirsuto-pubescentibus, canescentibus; ramulis brevissimis, subternis, apicem versus foliatis et floriferis. Folia sparsa, sessilia, in apice ramulorum approximata, basi paulo angustata, avenia, 4 lin., $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Flores axillares et terminales vix 2 lin. Cal. margo integer, germen supra medium cingens, hirtellus. Petala 6-7 lanceolato-linearibus, acuta, externe pubescenti-hirta, aequalia, patula, staminibus paulo longiora. Germen semisuperum, externe pubescenti-hirtum. Stylus longitudine staminum, glaber, stigmatibus obtusis. *Kunth l. c.* In montibus nov. Hisp. prope Cuernavaca. h.

175. *L. gemmiflorus Reinw.*; gemmis (involucris imbricatis) axillaribus, solitariis, sessilibus, multifloris; floribus hexandris; foliis oppositis, ovatis s. ovalibus, obtusis, coriaceis; ramulis tetragonis. *Blume Byd. Fl. Nederl. Ind. p. 665.*
 in specimine in Herb. ill. de Martius ab ill. Reinwardt lecto: rami oppositi, erecti, glabri, fusco-virides; juniores acute, adultiores obsolete tetragoni, ad foliorum ortum compressi. Folia petiolata, ovata, cum acumine obtuso, integerrima, utrinque glaberrima, obsolete nervosa, nervo medio acuto subtus paulum prominente, $2\frac{1}{2}$ -4 poll., $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata. Petioli teretiusculi, glabri, supra canaliculati, subtus nervo medio a folio decurrente leviter carinati, 4 lin. - $\frac{1}{2}$ poll. Gemmae solitariae, oppositae, in foliorum axillis sessiles, ovato-subrotundae, glabrae, fuscae, nitore paucio subresinoso, magnitudine circiter Avellanae; squamae imbricatae, crassae, firmae; exteriores inferiores minores, lunato-cordatae cum acumine brevi, dorso obsolete carinatae, cornubus lateralibus obtusiusculis, 2 lin., 4 lin. latae; interiores sensim majores, magis rotundatae, obtusae, tenuiores; intimae maximae, late ovatae, coriaceae, margine tenuissimo subdiaphanae, ferrugineo-fuscae, 6 lin., 4 lin. latae, flores circiter 12 sessiles includentes. Flores nimis incompleti, quam ut exacte describi possint. An hujus generis? Habitus, inflorescentia valde singularis, nulli alii speciei similis. *In sylvis montanis Provinciarum Buitenzorg, Bantam etc. in Java.*

176. *L. albidus Blume*; involucris imbricatis, pedunculatis, confertis, axillaribus, (casu foliorum lateralibus), multifloris; floribus hexandris; foliis oppositis, ovato-oblongis, acutis, coriaceis. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 665.*
L. loniceroidi affinis. In sylvis montanis Salak in Java. Blume.

d. *Flores heptandri, octandri.*

177. *L. ellipticus Ruiz et Pav.*; floribus corymboso-umbellatis, 7-andris; pedicellis 5-floris; bractea ovata, reflexa; foliis ellipticis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 47. t. 276. f. a.*

Frutex parasiticus 4-6-ped., erectus, glaber. Radix ramosa, fibrillosa. Caulis erectus, teres, valde ramosus; rami teretes, nudi: teneri conferti, virgulati, angulosi, foliosi, floriferi rubescentes. Folia opposita, conferta, petiolata, erecto-patula, subacuminata, plana, avenia, crasso-coriacea, supra nitida, poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata. Petioli 2 lin., sulcati. Pedunculi terminales et ex axillis superioribus, breves, angulati, divisi, corymboso-umbellati. Pedicelli breves, angulosi. Flores erecti, sessiles, terni, totidem bracteis retroflexis acutis: media majori. Calyx marginalis, obsolete 7-crenulatus. Cor. 4 lin., lutea: petala lineari-spathulata, inferne erecta, superne divergentia, reflexa. Filamenta e medio petalorum, lutea. Antherae luteae. Stylus subulatus. Stigma minimum. Bacca?. *Ruiz et Pav. In nemoribus altis frigidis Andium Peruviae prope Pozuzo. b.*

178. *L. Tagna Humb. et Bonpl.*; arboreus; foliis oblongis, acutis, in petiolum decurrentibus, coriaceis, supra

nitidis, subtus punctatis; racemis axillaribus, solitariis; ramis abbreviatis, subternis, approximatis, trifloris, tribracteatis; floribus breviter pedicellatis, heptapetalis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 436. n. 10.* *LORANTHUS arboreus Mutis MS. n. 10.* *L. arboreus*; fol. oblongis, coriaceis, margine revolutis, subverticillatis, subtus punctatis; racemis terminalibus. *Reliq. Willd. MS. fide de Schlechtendal fil.*

1. *punctato Ruiz et Pav. in herb. Paris. simillimus.* Arbor ramulis teretibus, glabris. Folia simpliciter venosa, subtus punctis glandulosis, minutissimis, 3-3 $\frac{1}{2}$ poll., 14-18 lin. lata. Petioli $\frac{1}{2}$ poll., semiteretes, glabri, basi paulo incrassati. Racemi breviter pedunculati, recti, patuli, subquadripollicares, ramis glabris. Flos intermedius sessilis, 9 lin.. Bractea oblongae aut ovatae, obtusae, carnosae, coriaceae, integerrimae, glabrae, calycem subaequant, interdum una reliquis duplo major. Cal. margo membranaceus dentatus, persistens, glaber. Petala 7, linearia, acuta, patula, glabra. Stam. petalis subaequalia. Germen lineari-cylindraceum, 2 lin., glabrum. Stylus longitudine fere staminum, stigmate obtuso. Bacca ovato-oblonga, laevis, glabra, magnitudine *Berberidis vulgaris*. *Kunth l. c. Prope S. Fe de Bogota. t.*

179. *L. laurifolius Humb. et Bonpl.*; arboreus? foliis elliptico-oblongis, obtusiusculis, in petiolum decurrentibus, coriaceis, supra nitidis; racemis axillaribus solitariis et terminalibus, paniculatis; ramis abbreviatis subternis, approximatis, trifloris, tribracteatis; floribus sessilibus, hepta-vel octopetalis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 437. n. 11.*

L. Taguae et punctato proximus. Rami teretes, rugosi; ramuli subangulati glabri. Folia avenia, nervo medio subtus prominente, 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll., 12-15 lin. lata. Petioli 3 lin., glabri. Racemi 5-5 $\frac{1}{2}$ poll., ramis 3 lin. rhachique angulatis glabris. Bractea ovato-oblongae, obtusae, longitudine germinis, glabrae, reflexae. Flores 9 lin.. Cal. glaber. Petala angustissima, linearia, apicem versus vix dilatata, superne patentia-reflexa. Stamina petalis paulo breviora. Stylus longitudine staminum. Stigma simplex. *Kunth l. c. Cum L. Tagua. t.*

180. *L. puracensis Humb. et Bonpl.*; arboreus; foliis lanceolato-oblongis, acutiusculis, in petiolum decurrentibus, coriaceis, supra nitidis, subtus nigro-punctatis; racemis terminalibus; ramis abbreviatis, ternis quinisque approximatis, tribracteatis, 1-3 floris; floribus sessilibus, 6-8-petalis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 437. n. 13.*

Arbor 2-3 org., ramulis teretibus, laevibus, glabris. Folia avenia, nervo medio subtus prominente, subtus pallidiora, 22-27 lin., 9-10 lin. lata. Petioli 4 lin., subcanaliculati, glabri. Racemi terminales, 4-6 poll.; ramis 3-4 lin.. Bractea oblongae, acutae, coriaceae, glabrae, subaequales, patentia, $\frac{1}{2}$ fere poll.. Flores sessiles. Cal. margo obsolete. Petala flava, linearia, reflexo-patula, staminibus paulo longiora. Germen subgloboso-ova-

ovatum, glabrum. Stigma simplex. *Kunth l. c.* In *Andibus Popayanensium, Parama de Purace.* h.

181. *L. nitidus* Humb. et Bonpl.; arboreus; foliis oblongis, apice rotundatis, basi obtusis, coriaceis, supra nitidis; corymbis terminalibus: ramis bi- aut trifloris, tribracteatis; floribus sessilibus, octopetalis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 437. n. 12.*

Arbor 3-4 org., ramulis teretibus, laevibus, glabris. Folia avenia, nervo medio obsoleto, glaberrima, 2 poll., 10 lin. lata, adulta majora? Petioli 5 lin., canaliculati, glabri. Bractee ovatae, oblongae aut ellipticae, obtusae, coriaceae, glabrae, inaequales: major germen paulo superans, 4-5 lin., reliquae duplo triplove minores. Flores subpollicares, suaveolentes. Cal. margo angustus, obsolete dentatus. Petala flava, glabra, angustissime linearia, apice patenti-reflexa. Stam. corollâ paulo breviora. Antherae submucronatae. Germen oblongo-cylindraceum. Stylus longitudine staminum. Stigma simplex. Baccae ovatae. *Kunth l. c.* In *temperatis Andium Quitensium, in Paramo de Savaguru.* h.

Obs. L. nitidus; fol. ovato-lanceolatis, obtusis, basi acutis, utrinque nitidis, subcoriaceis; Reliqu. Willd. Ms. vix hujus loci videtur e fragmentis in Herb. Willd. superstibus. De Schlechtendal fil.

Species minus bene notae.

182. *L. bracteatus* Rich.; foliis falcato-oblongis, nervosis; pedunculis bifidis; bractea terminali, cordatâ, 3-florâ. *Richard Act. soc. h. nat. paris. p. 107.*

An generis, cum *Poiret* eundem non adduxisset? In *Cayenne.*
Le Blond.

183. *L. Utui* Molina; floribus axillaribus, pedunculatis, tetrapetalis, tetrandris; foliis oppositis, lanceolatis, subsessilibus; baccâ punctis 4 minutis coronatâ. *Molina Sagg. d. Chili p. 139. Hitigu Feuill.*

Truncus ramosus, 3-ped.; folia parva, laete viridia; calyx minutissimus; corolla alba; bacca polysperma, succo purpureo dulci repleta. *Molina.* — An *LORANTHUS* cum bacca polysperma? An *LORANTHUS tetrandrus* ob synonymon *Feuill.*? In *Chili.* h.

184. *L. terniflorus* Willd.; racemis axillaribus; pedunculis trifloris; foliis oblongis, petiolatis, acutis. *Reliqu. Willd. MS.*

Rami teretes, e cinerascete fusci, verrucosi. Folia opposita, acuminata, in petiolum longe attenuata. Racemi axillares, oppositi, foliis breviores, pedunculis trifloris. Cor. magnitudine pedunculorum. *De Schlechtend. fil.* In *Caracas. Bredemeyer.*

185. *L. celtidifolius* Willd. *); pedunculis axillaribus, aggregatis; foliis ovatis, obliquis, subtus glaucis. *Reliqu. Willd. MS.*
In *Guinea. Arnim. h.*

*) *LORANTHUS* ab hinc usque ad *membranaceum* sequentium diagnoses benignissime communicavit ill. *de Schlechtendal* pater; alius nihil insuper monuit.

186. *L. laurinus Willd.*; floribus terminalibus, aggregatis; foliis coriaceis, oblongis, acutis, in petiolum attenuatis. *Reliqu. Willd. MS.*

In America merid. De Humb.

187. *L. cardiphyllus*; foliis ovato-cordatis, amplexicaulibus, obtusis; floribus terminalibus spicato-aggregatis. *L. cordifolius Reliqu. Willd. Ms.*

In America merid. De Humb.

188. *L. tubulosus Willd.*; floribus tubulosis, terminalibus, subspicatis; foliis lanceolatis, acutis. *Reliqu. Willd. Ms.*

In America merid. De Humb.

189. *L. cneoroides Willd.*; cymis axillaribus terminalibusque, foliis lanceolatis basi attenuatis obtusis glaucis multo longioribus. *Reliqu. Willd. Ms.*

In America merid. De Humb.

190. *L. multiflorus Willd.*; racemis axillaribus; pedunculis trifloris, foliis ovatis acuminatis longioribus. *Reliqu. Willd. Ms.*

In America merid. De Humb.

191. *L. alternatus Willd.*; foliis oblongis, apice attenuato-acuminatis; floribus axillaribus terminalibusque paniculatis. *Reliqu. Willd. MS.*

In America merid. De Humb.

192. *L. obvallatus*; foliis oblongis, obtusis, coriaceis; floribus terminalibus, racemoso-paniculatis; pedicellis trifloris; bracteis ovatis calyce longioribus. *L. bracteatus Reliqu. Willd. MS.*

In America merid. De Humb.

193. *L. microstachys Willd.*; foliis ellipticis, rotundatis, petiolatis; racemis cymosis, axillaribus, folio quadruplo minoribus. *Reliqu. Willd. MS.*

In America merid. De Humb.

194. *L. macrostachys Willd.*; foliis oblongis, utrinque attenuatis, obtusiusculis, coriaceis; spicis folio longioribus, sessilibus, verticillatis. *Reliq. Willd. MS.*

In America merid. De Humb.

195. *L. membranaceus Willd.*; foliis ovatis, apice productis, basi in petiolum attenuatis, membranaceis, nervoso-venosis. *Reliqu. Willd. MS.*

Inflorescentia? Flores gemini, 2 poll.

De Humb.

In America merid.

196. *L. maculatus Blume*; floribus? foliis oppositis alternisve, elliptico-oblongis, obtusis, basi acutis, nigro-maculatis, coriaceis, glabris. *Blume Bydr. Fl. Nederl. Ind. p. 662.*

In montanis provinciae Bantam in Java. Blume. h.

LORANTHI celastroidis Sieber Herb. nov. Holl. 244 specimina nimis incompleta, quam ut aliquid certi inde eruendum. Rami, ut videtur, dichotomi, teretes, glabri, cortice cinereo-nigricante. Folia opposita, breviter petiolata, obovato-oblonga ellipticaque, obtusa, basi attenuata, integerrima, glabra, coriacea, avenia, erecto-patentia, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., poll. lata. Pedunculi vix 2 lin., supra plani, subtus convexi, glabri. Flores fructusque omnino desunt. Habitu *L. congeneri Sieber* proximus.

Etiam in speciminibus *Lor. eucalyptifolii Sieber Herb. nov. Holl. n. 242*, cujus nomen mutandum ob *L. eucalyptifolium Humb. et Bonpl.* omnino diversum, flores desunt. Rami dichotomi et oppositi, erecto-patentes vel parum flexi, teretes, ad articulos paulum incrassati, glabri, lignosi, crassitie pennae gallinae, cinerei, juniores fusci. Folia aversa, opposita, petiolata, longe oblongo-lanceolata, plerumque falcata et obliqua, obtusa, in petiolum longe attenuata, integerrima, utrinque glaberrima, coriacea, avenia, pallide viridia, 4-5 $\frac{1}{2}$ poll., poll. fere lata. Petioli teretiusculi, glabri, poll. Flores, ut videtur, in racemis terminalibus, paucifloris, erectis, breviter pedunculati. Haecae oblique oblongo-ovatae, glabrae, fuscae (?), calycis margine brevissimo integerrimo coronatae, 4 lin.

Inter specimina *LORANTHORUM* a divo *Haenke* lectorum, quorum adspicuum munificentiae excell. *Com. de Sternberg* debemus, duo occurrunt specimina, alterum e Chili, *cordati* nomine insignitum, quod floribus tetrandris, alterum sine nomine a portu Sorzogon, quae habitu sane distincta ab omnibus nobis hucusque visis, sed dente temporis nimis exesa, quam ut in genere tam amplo totque calamitatibus oppresso describi possint ita, ut certe atque tuto ab aliis sive e speciminibus melius conservatis, sive in viventibus recognosci possint.

Dr. Oudney in Arboribus *Acaciae niloticae* a *Fezzan* ad *Bournou* speciem *LORANTHI* invenit, quam *cls. Brown* in *App. to Denh. et Clappert.* nullo nomine insignavit. *LORANTHI* speciem indescritam in *Prom. b. spei* legit *Burchell*.

Desideratur in historia *LORANTHORUM* designatio arborum, quibus innascuntur, hucusque nimis neglecta; qui enim in diversis arborum generibus nascuntur *LORANTHI* diversas quoque sistere species videntur.

Quid *LORANTHUS calycinus* }
 congestus } *Salt Abyss. ?*
 lactus }
 serrulatus } *Roxb. apud Steudel. ?*

1318. SPIROSTYLI S.

1. *Sp. Haenkei Presl ad Herb. Haenk. in Mas. Prag.*
 Frutex parasiticus, habitu omnino *Loranthorum*; rami oppositi vel subalterni vel abortu alterni, patentes, quidquam flexuosi et, ut videtur, scandentes, teretes, apice compresso-tetragoni, ad foliorum ortum nodosi, glabri, crassitie pennae corvi v. pennae gallinae; cortice pallide fusciscenti-cinereo, tenuiter verruculoso. Folia subalterna, patentia v. reflexa, petiolata, coriacea, glaberrima, integra, vel exsiccatione leviter undulata, lanceolata v. oblongo-lanceolata, utrinque attenuata, plana, nervo medio subtus prominente, nervis reliquis obsoletis, sicca nigricantia, 18-24 poll., 6-11 lin. lata. Petioli crassi, dorso convexi, supra plani, rugulosi, glabri, 3-4 lin.. Florum racemi axillares, solitarii geminique, folio breviores, cum ramo articulati, patentes, saepius etiam reflexi, 12-18 poll.. Pedunculi communes basi teretes, mox compresso-tetragoni, uti rhachis, glabri; pedicelli oppositi, patentes, crassi, glabri, angulosi, cum rhachis articulati, remoti (in paribus circiter 4), ebracteati, vix lin., triflori. Flores in apice pedicellorum sessiles et cum iisdem articulati, forte rubri, sicci fusci, inexpansi oblongi, glabri. Calyx margo minimus, urceolatus, pergamenus, glaber, obsolete denticulatus. Petala 6, aequalia, linearia, acutiuscula, glabra, coriacea, ad medium usque erecta, dein reflexa, 2 lin., $\frac{1}{4}$ lin. lata. Stam. 6 subaequalia, corollâ breviora, erecta, medio laciniarum inserta; filamenta brevissima, subulata; antherae ovatae, acutae, basi subhastatae, dorso paulo supra basin affixae,

biloculares, siccae fuscae. Germen oblongum, glabrum, calyce styloque coronatum, cum calyce $\frac{3}{4}$ lin.. Stylus stamina superans, corollâ paulo brevior, crassus, mox supra basin spiraliter contortus, anfractibus approximatis, glaber, sulcatus, per aliquot tempus persistens. Stigma parvum, subcapitatum, glabrum. Bacca glutinosa, ovato-oblonga, obtusa, apice umbilicata, glabra, immatura 2-2 $\frac{1}{2}$ lin.. Semen solitarium, ovatum, compressum. Ad portum Acapulco. Haenke. ♀.

1319. SCHRADERA.

1. Sch. *capitata* Vahl; involucreo dentato; calyce integerrimo; foliis obtusis. Willd. Spec. II. p. 238. Pers. syn. I. p. 201. (cui pentandra). Vahl Eclog. I. p. 35. t. 5. (excl. syn.). Trattin. tabul. 83. URCEOLARIA Coth. disp. veg. p. 10. n. 74. URCEOLARIA *exotica* Gmel. Syst. II. p. 390.

Parasitica radicum arborum, caule sublignoso, plerumque pendula, interdum scandens, 6-8-ped., apicem versus tantum ramosa. Rami tetragoni, glabri, cortice cinereo, apice fusci, articulis bipollicaribus. Folia petiolata, opposita, patentia, 3-4-poll. (1-2 poll. lata), elliptica, integerrima, apice obtusa, basi parum acutiora, subcoriacea, utrinque glaberrima, avenia, obscure nervosa (subtus pallidiora nervoque medio prominente). Petioli ($\frac{1}{2}$) pollicares, fusciscentes. Stipulae nullae. Flores terminales conglomerati, 7-24 in capitulo, pentandri et hexandri interdum in distincta planta. Pedunculus terminalis, solitarius, compressus, sursum parum latior, (1 $\frac{1}{2}$)-2 poll.. Bractee 2 membranaceae, (vix) pollicares, oblongae, obtusae, pedunculi basin laxè vaginantes (purpurascens). Flores plures receptaculo carnosò innati, basi involucreati: involucreum cum receptaculo connatum, margine liberum, lobatum. Cal. margo superus integerrimus, basin corollae arcte cingens. Cor. crassa. Tubus (vix) unguicularis, sursum versus latior, intus inferne glaber, superne hirsutus. Limbus 5-6-partitus, laciniis carnosis, lanceolatis, parum reflexis, supra versus faucem planis, antice triangularibus, e lateribus compressis carinatis, denticulo carnosò triangulari ad basin carinae, subtus planis. Filamenta vix ulla. Antherae 5-6, lineares, inter lacinias limbi, erectae, limbo triplo breviores. Germen tetragonum, lateribus parum impressis, angulis acutis. Stylus tubo corollae brevior. Stigmata 2 crassa, oblonga. Bacca 4-locularis, polysperma, intra calycem urceolatum, inflatum, persistentem. Semina plurima minuta. Vahl et Ryan. In montibus altis insulae Montserrat; in Martinica. Sieb. ♀.

Obs. „Margo“ ille „superus integerrimus, basin corollae arcte cingens“ minime calyx est, uti videbatur divo Vahl, qui etiam eundem depinxit pro calyce. Ambit enim corollae tubus hunc marginem et includit eundem, ita, ut germinis apici tanquam apophysis quaedam, non vero tanquam calyx, inhaereat. Calyx hic, uti Vahl ipse sese corrigit in descriptione baccae, „urceolatus, inflatus“ et „Bacca intra calycem“ nec calyx superus, licet basi cum germine connatus.

2. Sch. *brasiliensis* de Martius; involucreo integerrimo; calyce integerrimo; foliis ellipticis, obtusis. Mart. Fl. Bras. ined..

Rami teretes vel obsolete tetragoni, basi lignosi, apice crassiores, cortice glabro flavescenti-cinereo, articulis 1-2 $\frac{1}{2}$ poll., subinde radiculis coacervatis tenuibus brevibus. Folia patentia, margine

quidquam revoluta, utrinque glaberrima, subcoriacea, subtus pallidiora nervosaque, nervo medio prominente, nervis lateralibus obliquis, 2 - 3 $\frac{1}{2}$ poll., 1 - 2 poll. lata. Petioli facile decidui, supra planiusculi, glabri, 6 - 7 lin.. Pedunculus terminalis, solitarius, erectus, glaber, subcompressus, apice incrassatus, 1 $\frac{1}{2}$ - 2 poll.. Bracteae 2 connatae in ochream subcylindricam, apice rotundato-bilobam, glabram, purpurascentem, deciduam, 2 $\frac{1}{2}$ - 6 lin., 3 - 4 lin. in diametro. Flores 7 - 15 in capitulum congesti. Involucrum margine liberum, crasse coriaceum, hypocra-teriforme, 3 lin., $\frac{1}{2}$ poll. in diametro. Cal. glaber, siccus pur-
 purascenti-fuscus, carnosus, ore paulo constricto, cor. tubum ad medium laxe cingens; pars libera 2 $\frac{1}{2}$ - 3 lin., 2 lin. in diame-
 tro, pars germi adnata 2 lin.. Cor. subinfundibuliformis, 6 - 8 lin.; tubus fauce quidquam ampliatus, intus ad faucem pilis den-
 sis longis albidis, superne crassior, 4 - 5 lin.; limbus 5 - 6 partitus; lacinae reflexae, carnosae, 3 - 4 lin., $\frac{3}{4}$ lin. latae, lineari-lan-
 ceolatae, acutae, ad medium usque planae, dein acute triangulares et crassiores, medio denticulo parvo triangulari, acuto. Stamina 5 - 6, inclusa, basi partis hirsutae tubi inserta, cum laciniis alter-
 nantia; antherae sessiles lineares, obtusae, biloculares, flavae, 2 lin.. Germen calyce subinflato carnosum absconditum, oblongum, retusum, apice margine brevi calycem mentiente cinctum, basi attenuatum, angulosum, glabrum, 1-loculare, polyspermum. Sty-
 lus crassus, erectus, tubo brevior, 3 - 4 lin.. Stigmata 2 crassa, oblonga, erecta, basi coalita, lin.. Differt a *Schn. capitata*: in-
 volucro integerrimo, foliis obtusioribus, bracteis in ochream connatis. In sylvis ad lacum d'Almada prov. Bahiensis
 Brasiliae. h.

3. *Sch. cephalotes Willd.*; involucro integerrimo; ca-
 lyce dentato; corollis 8-fidis; foliis acuminatis. *Willd. Spec.*
 II. p. 238. *Pers. Syn.* I. p. 201. *FUCHSIA involucrata*
Swartz prodr. 62. *Fl. ind. occid.* II. p. 674.

„Annente el. *Swartz in litt.* hanc a praecedente distinxi. Descrip-
 tio auctoris citati diversam esse plantam abunde demonstrat. Vidi
 tantum hujus folia, quae tenuiora, et multo acutiora. Ceterum
 in hac numerus octonarius frequentissimus est, rarior denarius,
 vel 5 - 7 - 9 - rius. *Willd.* Truncus arborescens, vimineus, sub-
 scandens, subparasiticus, ramosus, cortice laevi. Rami diver-
 gentes, subdivisi, teretes, glabri, fragiles, subsucculenti. Fo-
 lia opposita, petiolata, oblonga, crassiuscula, glabra, venosa,
 nec nervosa, subtus pallidiora. Petioli teretes, glabri. Pedun-
 culi terminales, solitarii, breves, crassi, 4-goni, glabri, multi-
 flori. Involucrum flores 4 - 8 continens, 1-phyllum, truncatum,
 4-gonum, glabrum, crassum. Calyx ovato-campanulatus, erec-
 tus, involucro parum longior, indivisus, subtruncatus, denticu-
 lis 8 minutissimis. Cor. tubulosa, alba, succulenta; tubus elon-
 gatus, cylindricus, calyce multo longior, vix curvus; limbus 8-
 fidus: laciniis lanceolatis, acuminatis, patentibus, apicibus tri-
 quetris basi compressis; foveola a basi ad medium cum denticulo
 pro insertione antherarum; faux villosa. Filamenta 8 brevissima,
 ori tubi inserta, subulata. Antherae longitudine dimidia limbi,
 erectae, subulatae, acutae, apicibus subrecurvis, faucem versus
 longitudinaliter dehiscentes. Germen oblongum, truncatum, per-
 foratum. Stylus incrassatus, erectus, staminibus brevior. Stigma
 4-partitum, laciniis erectis, longis, conniventibus. Bacca ob-

longa, calyce tecta et coronata, 4-locularis, dissepimentis succulentis, mollis, dulcis, insipida. Semina numerosa, minuta, angulata, badia. Swartz. In sylvis et montibus Jamaicae. h.

4. *S.?* *ligularis* Rudge; stipulis emarginatis, brevibus; foliis lanceolatis, acuminatis; bracteis ligularibus, longissimis. Rudge Plant. Gujan. Rar. I. p. 29. Tab. XLV. Trattin. tabul. 84.

Rami cinerei, articulati, glabri. Stipulae latae, quasi duae utrinque. Folia opposita, 8 poll., utrinque glabra, nervosa. Petioli basi subtus prominentes. Pedunculus 2-3 poll., compressus, sursum parum latior, solitarius. Bracteae circiter 9, ligulares, pollicares. Flores dense conglomerati. Calyx cyathiformis, margine parum 5 dentatus. Corollae lacinae lanceolatae, reflexae, dorso apicis (intus) mucronem mitem obtusum, exserentes. Stigmata 2 crassa, reflexa. In Gujana. h.

Obs. Differt a Genere RUDERA, fructu polyspermo, praeter totum habitum.

1320. C A S S U P A.

1. *C. verrucosa* Humb. et Bonpl. pl. aequin. 1. p. 45.
 t. 12. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 412.
 Arbor 30-40-ped., trunco erecto, cylindrico, 15-20-ped., diametro pedali, ramis oppositis, patentibus, inferne nudis; cortice laevi cinereo, ramulis viridibus. Folia opposita, obovato-oblonga, acuta, basi cuneata, margine integerrima et subrevoluta, subtomentosa, coriacea, supra viridia et nitida, subtus glauca, 2 ped.. Petioli semiteretes, inferne incrassati, folio quadruplo breviores. Stipulae lanceolatae, acutae, persistentes. Paniculae terminales, simplices, pedunculatae, ramis inferioribus oppositis. Flores spicati, brevissime pedicellati, 2 poll., pedicellis calyce brevioribus, basi bracteis 2-3 parvis, acutis, persistentibus, unâ saepissime germi insidente. Cal. germi adnatus, coloratus, subcarnosus; limbo integro membranaceo. Cor. 4-2 poll., pallide rubra, inferne 6-gona, superne verrucosa; laciniis ovato-oblongis, patentibus, aequalibus, interne fauceque albo-sericeis. Stam. complanato-membranacea. Styl. longitudine tubi corollae. Bacca satiate rubra, magnitudine PRUNI spinosae. Bonpl. l. c. In sylvis umbrosis fluvii nigri, prope S. Carlos. h.

1321. V A N H A L L I A.

1. *V. tomentosa*. CERAMIUM tomentosum Blume; Bydr. Pl. Nederl. Ind. p. 1155.

Herba suffruticosa; foliis alternis, ovatis s. ovalibus, acutis, coriaceis, supra glabris, subtus reticulatis et arachnoideo-tomentosis; racemis lateralibus bracteatis. Blume. In sylvis montanis insularum Javae et Nusae Kambangae. h.

1322. T A C C A.

1. **T. pinnatifida*; foliis ternato-decompositis; foliolis pinnatifidis, inaequaliter sinuatis, acutis; involucri foliolis lanceolatis. Blume Enum. pl. Jav. p. 83. T. foliis tripartitis, pinnatifidis; floribus subumbellatis. Poir. Enc. VII. p.

548. (excl. *TACCA sativa* Rumph Amb. V. p. 324. t. 112., uti etiam in Linn. Suppl. et Willd., cum monente Roxburgh Corom. III. p. 68. t. 272. eadem ac *ARUM campanulatum*). Forst. gen. n. 35. pl. escul. n. 28. prodr. n. 209. Linn. Suppl. p. 251. (ubi in Dodecandr. Trigyn.) Willd. Spec. II. p. 200. R. Brown prodr. n. Holl. p. 340. Loddig. bot. Cab. t. 692. LEONTICE *leontopetaloides*; fol. simplicibus, tripartito-multifidis; corollis monopetalis, campanulatis. Linn. Spec. 448. (qui jam valdopere de genere dubitavit). Leontopetaloides Amman Act. petropol. VIII. p. 211. t. 113. *TACCA littorea* (foliorum laciniis oblongo-lanceolatis, acuminatis, subintegrissimis; floribus subumbellatis filis interjectis; calycis laciniis acutis). Rumph Amb. V. p. 238. t. 144. Katuschena Rheed. Malab. II. p. 41. t. 21. (fide Poirer).

„Foliis similis *DRACONTIO polyphylo*. Linn. fil. l. e. Rad. crassa, tuberosa, fibris capillaribus. Folia omnia radicalia, petiolata, amplissima, similia foliis *DRACONTII polyphylli*, laciniis imparipinnatifidis, lacinulis decurrentibus, lanceolato-oblongis, angustissimis, integerrimis, utrinque glabris, acutis. Subinde folia tantum digitato-palmata. E medio foliorum scapus erectus, nudus. Flores alii subsessiles, alii in pedunculis capillaribus inaequalibus, filis longissimis subsetaceis intermixtis. Involucrum exterius e foliolis pluribus sat magnis, inaequalibus, flores superantibus, anguste lanceolatis, longe acuminatis. Bacca sicca, ovali-oblonga, utrinque attenuata, carinis 6. Semina striata. Poir. ex Herb. Juss. In *TACCA littorea* Rumph (cui flores fructusque Taccae appicti), rad. magnitudine 2 pugnorum, pelliculâ gilvâ, intus alba. Scapus 3-6 ped., teres. Involucri foliola tenuia viridia, erecta, cuspidata. Flores penduli, virides, filis longis purpureofuscis intermixti. Baccæ magnitudine prunorum minorum, inferne latae, superne acuminatae, umbilicatae, 6-costatae. Semina multa fusca, instar granorum Tritici, intus alba, foetida. Frons minor, sed lacinae majores et rugosiores magisque flavescens. In maritimis arenosis Indiae orientalis, Madagascar, novae Hollandiae.

2. *T. dubia*; foliis tripartitis, pinnatifidis: laciniis ovato-lanceolatis, infimis incisis; floribus subcapitatis, filis interjectis; calycis laciniis obtusis. *TACCA phalifera* Rumph Amb. V. p. 326. t. 113. f. 1. (nec 2, quae, monente Roxburgh Corom. III. p. 68. t. 272., *ARUM campanulatum*).

Rumph l. c. ait: „Species sylvestris *Taccae sativae* esse videtur; primâ enim vice mihi provenit ex sylvestri specie ex montibus deducta et in horto plantata, ubi perierat.“ Jam vero haec *sativa*, monente Roxburgh, *ARUM campanulatum* est, aequè ac figura 2. t. 113. f. 2, quam Rumph l. c. amplissime describit, tanquam ex eadem radice proveniente, ex qua depingit flores fructusque plantae, quae omnino ad Taccam pertinent. Diagnosin ex icone dedimus, nescientes, an descriptio a Rumph exhibita ad fig. 2. vel ad primam fuisset destinata, tum ait: „superius sese dividebat hic caulis in 3 primarios ramos, perfecte in triangulo positos, atque horum quivis iterum successive in binos alios mi-

nores ramos; hisce folia imposita erant in similes distincta laciniis, quales habet *Tacca sativa*, sed illa flavescebant, quum in sativa sint nigricantia, rhachides vero et caules albicant; inter laciniis aliae minores tam arcte et copiose conspiciuntur, ut neque caulis, neque primarii rami notari possint, licet plantae prope adstemus. Tota vero haec corona amplam refert rotam, 5 ped. diametro, qualem sativa nunquam profert, ita, ut tam elegans sit planta, quam horrendus primum erat Fungi (fig. 2) abortus, immo elegantior ipsa *Paeonia*.⁴ *In Amboinae sylvis, regione Hitoës. 4.*

3. *T. montana Rumph.*; foliis radicalibus pedatis: laciniis 5-7 lanceolatis, acuminatis; floribus umbellatis, longe pedunculatis, involucri iisdem longiore tetraphyllo: foliolis ovato-lanceolatis: filis nullis. *TACCA montana Rumph Amb. V. p. 329. α. minor. β. major s. rubra. Rumph. l. c. t. 115. T. palmata Blume*; fol. pedato-5-7-partitis; lobis acuminatis, indivisis; involucri foliolis ovatis. *Blume Enum. pl. jav. I. p. 83.*

In α radix rotunda instar Rapae, e cujus centro caulis tenuis, ulnam altus, inferne crassitie pennae. Folium unum alterumve circa radicem, maxime ad terram inflexum, fere digitatum in foliola 8 pallide virentia. Capitula ut in *T. littorea (pinnatifida)*. Involucri foliola tenuia, trigona. Baccae plerumque 7, formae baccarum Lauri, apice umbilicatae et in tres apices distinctae, maturae rubentes. Semina plura, fusca, rugosa, amara. *β* paulo major; rad. oviformis, transversalis, fibrillis brevibus, quae in hortum transplantata duplex se obferebat: una directe sub caule, rotunda, recens alba, magnitudine Pruni; altera magis angulosa et minor, undique fibrillosa, ex qua caules 3 tenues, quorum 2 laterales 14-16 poll. laciniam producebant foliosam, in 3-4 divisiones majores distinctam, atque haec iterum in 2-5 laciniis inaequales, palmam longas, tenues, obscure virentes ac subtus multis costis obliquis rugosas. Culta unicum tantum producebat caulem foliosum, firmum, vix crassitie pennae, superne parum striatum. Folium palmatum, digitatum, lacinae 7, quarum 3 exteriores bifidae, 6-7 pollicares, omnes uno versu positae, ita tamen, ut 2 exteriores sibi incumberent sinumque formarent. — In planta sylvatica radix major, instar placentae minoris, vix 4 digitos lata, in medio foveam notata, fibrillis mollibus. E fovea petioli 4-5, longi, tenues, teretes, firmi, 4 digit. supra basin geniculati. Folia digitata, lacinae 8, spitham. fere longae, exteriores minus profunde divisae. Scapus e medio foliorum non geniculatus, superne valde angulosus, striatus, 2-ped.. Involucri foliola 4, trigona, viridia; 2 inferiora lata, cordiformia, instar januae erecta, 2 minora auriculis rotundis sibi imposita. Flores pedunculati 8-11; pedunculi involucri breviores. Baccae triangulae, striatae, instar Capparidum majorum, floris residuo coronatae, virides, paucae maturitate rubent. Semina 10-12, parva, angulosa, fusca, forma Fagopyri, sed minora, in pulpa viscosa. Herbae crudae radicisque sapor ingratus. Proxime convenit cum *Katu Schena H. Malab. II. t. 21.*, quod in notis vocatur *Arum malabaricum minus*, polyphyllum radice globosa, et ad *Anapodophylli Fournes.* genus pertinet, quod *Podophyllum* in *H. Cliff* vocatur.

Rumph. α in montibus sub arboribus; β in sylvis umbrosis ad pedes montium, ad ripas in Amboina, Java, Nusa. 2.

4. *T. integrifolia* *Gawl.*; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, integerrimis: nervo medio depresso alios remotiusculos oblique parallelos utrinque oblique emittente. *Gawl. Bot. Mag.* 1488. *Roxb. Coromand.* III. p. 54. t. 257. Sylloge in *Bot. Zeit.* 1824. p. 203. T. fol. oblongo-lanceolatis, utrinque acuminatis, venosis: involucri foliolis lanceolatis. *Blum. Enum. pl. jav.* I. p. 83. *Link Enum.* p. 343.

Rad. tuber oblongum mediae magnitudinis, fibris filiformibus, intus pallide flavum. Caulis vix ullus. Folia radicalia, petiolata, recurvata, oblonga, integra, acuminata, glabra, nervis parallelis, validis, quidquam bullata, 8-16 poll., 4-8 poll. lata. Petioli foliis breviores, basi vaginantes, supra basin intus sulcati, toti scabri punctis parvis asperis. Scapi axillares solitarii, longitudine petiolorum, uti hi scabri, teretes, erecto-divergentes, saepius varie flexi. Involucrum 4-phyllum: filis pluribus pedicellis intermixtis. Foliola 2 exteriora amplexicaulia, reflexa, late ovato-lanceolata, acuminata, multinervia, 2-3-poll., 1 $\frac{1}{2}$ poll. lata; interiora multo longiora, late petiolata, flores includentia instar fornicis, ovato-ventricosa, multinervia, glabra, colorata, cum petiolis 5-poll., 3-poll. lata. Flores 4-8 longe pedicellati, primum suberecti, dein cernui, e viridi purpureo flavoque varii. Cal. basi poculiformis: limbi lacinae 3 exteriores angustiores, acutiores, pallidiores: 3 interiores oblongae, obtusae vel emarginatae, mox post expansionem omnino reflexae. Cor. nulla, nisi segmenta marginis calycis. Filamenta (petala *Forst.*) medio calycis tubo inserta, fornicem conicum referentia. Antherae intus ad parietem fornicis. Germen clavatum, 6-costatum: ovula numerosa, receptaculis 3 bifidis parietalibus adnata. Stylus brevis. Stigmatis lobi magni, colorati, extus emarginati. Bacca oblonga, carnosae, 1 $\frac{1}{2}$ poll., poll. lata, 6-costata, calycis vestigiis 3 semilunaribus coronata. Semina numerosa, reniformia, costata, integumento simplici intense fusco. *Roxb.* In culta apud *Gawler* ex icone: caudex et petioli basi vaginato-dilatati, atrofusci, punctis aureis. Folia lacte viridia, nitida. Scapus nunc repens, nunc deflexus. Spathae ovatae, contortae, acuminatae, sordide albae, violaceo striatae. Pedunculi 3-4, saturate violacei, crassi. Cor. plumbea, diametro 1 $\frac{1}{2}$ poll.; laciniis oblongo-ovatis, obtusis cum mucrone. In India orientali; in montibus umbrosis Javae. *Blume.* 2.

1323. K E R N E R 'A.

1. *R. oceanica* *Willd.*; foliis linearibus, elongatis, integerrimis, apice obtusissimis; stipulâ intrafoliaceâ brevissimâ, truncatâ (*R. Brown*). *Willd. Spec.* IV. p. 947. *Poiret Enc. meth. Suppl.* III. p. 215. *ZOSTERA oceanica* *Linn. S. V.* p. 829. *Mant.* 125. *Caulini Diss. d. Zostera. Neap.* 1792. *Usteri Annal.* IX. St. p. 57. *POSIDONIA Caulini* *König Ann. of Bot.* II. p. 96. c. fig. *CAULINIA oceanica* *Pers. Syn.* II. p. 562. *Decand. Fl. fr.* 3. p. 156. *R. Brown prodr. Fl. nov. Holl.* p. 339. *Dict. Sc. natur.* 36. Cah. Alga marina

Lob. ic. 251. *Tournef. inst.* t. 237. *Gin. Adr.* p. 26. t. 28. n. 64.

Rad. tenuis, multiplex, teres, palmaris, ramosa. Caulis (rhizoma) subteres, sublignosus, lentus, ramosus, repens, squamis veterum foliorum vestitus. Folia ex ramorum apicibus, sibi parallele incumbentia, longissima, plana, membranacea, intense viridia, (disticha, 5-6 lin. lata). Scapus angustior linearis, crassiusculus, e centro foliorum, (erectus, 4-5 poll.), sustinens fructificationem in spicam disticham coarctatam, complanatam. Flores in spicis partialibus saepius terni, rarius bini. Singulae spicae: cal. exterior: spatha bivalvis; valva exterior longissima, ligulata, basi appendicibus 2 stipuliformibus, oblongo-ovatis amplexantibus; interior retusa, emarginata, membranacea, appendicibus suis amplexantibus non longior. Cal. interior: spatha bivalvis: valvis subaequalibus, ligulatis, subacutis, basi appendicibus quoque amplexantibus. Spica e centro assurgens, rhachi subtereti, flores 3 sustinens, 2 alternos, reliquo terminali; laterales bini pedicello vix elevato. Antherae 6 teretes, oblongae, sessiles, appressae, erectae, medio affixae margini receptaculi, longitudinaliter dehiscentes, sub maturatione rubescentes; polline copioso, lanae instar gossypinae. Corolla antheris interior; petala 3 profunde concava, crassiuscula, aristata, pistillum amplexantia, ad maturitatem persistentia. Pistillum teres, corollâ vix longius. Stylus brevissimus. Stigma crinitum. Pericarpium ovatum, pulposum, germine maturo deciduum. Semen gemma nuda, oblongo-ovata, altera parte convexa, altera sulcata. In flore terminali cujusque spicae loco pistilli appendix corniformis inter antheras erecta e margine receptaculi, et corollae interius petalum in se ipsum convolvitur. In tertia spica valva interior calycis interioris brevissima, membranacea, concava; deest flos terminalis et ejus loco saepe corniculum erectum; aliquando deest et alter flos ideoque flos unicus pedicellatus. In secunda spica rarius deest flos terminalis. In spica terminali semper deest valva interior calycis exterior. Spica igitur universalis constat e 4 spicis, aliquando e 3; tunc deest spica tertia. *Caulini.* *In mediterraneo et atlantico.* 4.

Obs. Planta *Nov. Holl.* in ora meridionali et insula *van Diemen* forte distincta spicâ 4-6-florâ. *R. Brown l. c.*

2. *K. serrulata*; fol. linearibus, apice rotundatis, extrorsum serrulatis; stipulâ intrafoliaceâ truncatâ brevissimâ. *CAULINIA serrulata R. Brown Prodr. Fl. N. Holland. p. 359.* *POSIDONIA serrulata Spreng.*

Absque fructificatione. *In ora merid. Nov. Hollandiae.*

Obs. Cls. *R. Brown l. c.*, tanquam „speciem dubiam, foliis alternis“ huc ducit *RUPPIAM antarcticam Labill. II. t. 264, Syst. Veg. ed. nostr. III. p. 518*, quae illi:

3. *K. (CAULINIA) antarctica*, caulibus ramosis, annulatis; foliis approximato-alternis, linearibus, truncatis, bidentatis; stipulâ intrafoliaceâ, truncatâ, brevissimâ (absque fructificatione). *POSIDONIA antarctica Spreng. S. V. I. p. 181.* *In ora merid. N. Holland., Port Jackson, Ins. v. Diemen*) et adhuc illi „incerti generis et ordinis, foliis oppositis, ob folia opposita vix hujus generis, forsân diversi ordinis“:

4. *K? (CAULINIA) spinulosa*; foliis oppositis, cuneato-linearibus, sessilibus, trinerviis, spinuloso-serratis, basi hinc conduplicatis, ramis indivisis erectis (absque fructificatione). *Intra Tropicum N. Hollandiae.*

5. *K? (CAULINIA) ovalis*; caule repente; foliis oppositis, petiolatis, ovali-oblongis, integerrimis (absque fructificatione cum praecedente. *ZOSTERAM stipulaceam Forsk. Fl. aeg. arab. CAULINIAE ovali affinem dicit).*

6. *K? nodosa*; foliis angustis, linearibus, longissimis; geniculis radican-

bus; caulibus sarmentosis. *ZOSTERA nodosa* Ucria in Röm. Arch. 1. p. 70.
Alga graminea folio triphylla, sarmentis vitis. Cup. Panph. In Sicilia.

1324. A N A N T H O P U S *).

1. *A. clandestinus* Rafin.; foliis lanceolatis, retrorsum scabris, subtus glabris; floribus terminalibus; spathâ saccatâ, mucronatâ, demum planâ, basi reniformi. Rafin. Fl. Ludov. p. 21. Poir. Enc. Illust. gen. III. p. 594. OPHRYS prima Rob. itin. p. 351.

In Louisiana. 4.

2. *A. cordatus* Rafin.; caulibus virgatis; foliis lanceolatis, supra basin echinatis; floribus axillaribus terminalibusque; spathâ cordatâ. Rafin. l. c. OPHRYS secunda Robin. itin. p. 352.

In Louisiana. 4.

1325. O R O N T I U M.

1. * *O. aquaticum*; foliis lanceolato-ovatis. Ait. Hew. l. p. 474. Linn. Spec. 465. Amoen. acad. III. p. 17. t. 1. f. 3. (mala). Willd. Spec. II. p. 199. Lam. Enc. IV. p. 627. Gron. Virg. 113. Pursh Fl. Sept. Am. 1. p. 255. Nuttall gen. p. 226. Elliott Sk. I. p. 404. Bart. Fl. sept. Amer. II. t. 37. Torr. Fl. N. M. U. St. p. 558. Giseck. ic. fasc. 1. n. 6. Hook. Exot. Bot. t. 19. Loddig. Bot. Cab. 402. Catesb. Carol. 1. p. 82. t. 82. POTHOS ovata Walt. Fl. carol. p. 224. β foliis linearibus. Pursh l. c.

Rad. alte descendens. Scapus teres, longus, glaberrimus, pallidus, punctis fuscis. Folia lanceolato-ovata, acuminata, integerrima, glaberrima, petiolata. Pedunculus sub spica s. spadice lacteae albedinis. Linn. Amön. l. c., in quibus folia venosa depicta esse monet Willdenow l. c. Tota planta glabra, monente Smith, foliis instar *Potamogetonis* natantibus, longe petiolatis, nunc late ellipticis, acutis, nunc lanceolato-ovatis (in β linearibus), integerrimis, fere planis, supra atro-viridibus, costis parallelis, petiolo tereti inarticulatis (crassis, 5-8 fere poll., 1-3 latis). Scapus (erectus, 7-20 poll., crassitie pennae anseris cygnive) virens, superne incrassatus et magis flavescens. Spadix albo-virens, conico-cylindricus, fere 2 poll., absque spatha (1-4 lin. diametro.) Flores congesti; in inferioribus squamae viridi-flavae 5-6, carnosae, convexae, margine attenuatae, scariosae, apice inflexae, genitalia occultantes; in superioribus squamae similes 4-5. Stamen sub squama singula. Filamentum breve, latum, planum, apice quidquam contractum. Anthera bilocularis, biloba, longitudine fere filamenti, apice dehiscens, polline flavo. Germen semiglobosum, lineis 5 parum elevatis. Stylus 0. Stigma conicum, obtusum, obsoletum. Hook. et Spec. spont. Utriculus nudus, viridis, globosus, magnitudine

*) Radix repens; caulis ramosus, cylindricus, geniculatus, pubescens; folia alterna, uninervia, retrorsum ciliata; petioli vaginales; spatha intus gelatinosa; pedicelli floriferi flexuosi; pedunculus abortivus strictus rigidus. Rafin.

psi majoris, viviparus. *Nuttall.* *A Canada ad Carolinam in uliginosis.* β *in salsis circa Nov. Eborac.* 4.

2. *O. cochinchinense* *Lour.*; foliis ensiformibus, longis, carinatis. *Lour. Fl. Cochinchin.* p. 258. (excl. synonym.).

Perennis, caule subnullo. Radix horizontalis, simplex, repens, ramis articulatis, sulcis articularibus approximatis, radículas emittentibus, compressa, extus fusca, intus pallida, subaromatica. Folia dorso utrinque elevato, 3 ped., poll. lata, glabra, basi equitantia, superne expansa. Scapus, pedunculi, calyx nulli. Spadix cylindricus, 2-pollic., solidus, flosculis tectus, e latere folii supra medium erumpens. Corollae 6-partitae, patentes, nudae. Stamina 6. Stylus 0. Stigma obtusum. Bacca subrotunda, exsucca, vel, si malis, folliculus 4-spermus, superus. *Lour.* (qui *Acorum palustre Rumph* l. 8. p. 179. t. 72. f. 1. (a *Willd.* ad *Acorum verum* ductum) et *ORONTIUM japonicum Thunb.* instar synonymorum citat, utrumque vero non omnino cum planta sua convenire dicit.) *Spreng. S. V. II.* p. 118. *O. cochinchinense* cum *O. japonico* junxit, cujus descriptio tamen genere differt. *In paludibus Cochinchinae et Chinae, non fluctans.* 4.

1526. R O H D E A.

1. *R. japonica* *Roth*; rhizomate oblongo; foliis ensiformibus; spicâ ovali-oblongâ. — *ROHDEA japonica Roth nov. spec.* p. 197. *Spreng. S. V. II.* p. 117. (excl. syn. *Lour.*). *ORONTIUM japonicum Thunb. jap.* p. 144. *Willd. Spec. II.* p. 200. *Hort. Kew. ed. 2. II.* p. 306. *Gawler Bot. Mag.* 898. *Kiro Kaempf. Amoen. exot.* p. 785. *Banks ic. Kaempf. t.* 12.

Gawler l. c. plantam cultam sequentibus describit. „Rhizoma oblongum, subcylindricum, crassum, carnosum, fibris crassis, amarum. Folia radicalia plura, opposita, lanceolata, nervoso-striata, basi convoluta, 1-2 ped., 1-3 poll. lata, glabra, obscure viridia. Scapus aroideus, 1-3 poll. Spica 2 poll., favose conferta; floribus sessilibus, bracteis membranaceis. Cor. campanulata, laciniis apice inflexis, (flavis). Baccae magnitudinis et formâ olivae minoris, pulpâ coccineâ. Semen solitarium, cordatum, osseum.“ „Scapus palmaris. Spatha intra folia ad basin scapi diphylla, spadiceam ante evolutionem arcte includens: foliolis ovato-acuminatis, obtusis, albis, subcoriaceis, demum marcescentibus, membranaceis, inaequalibus: altero dimidio brevioribus. Spadix cylindricus, simplicissimus, truncatus, magnitudine et figurâ *CALLAE palustris*. Bracteae ad apicem scapi et inter flores sparsae, oblique ovatae, membranaceae, niveae, floribus breviores: ad basin spathae solitaria, subfoliacea, ovato-lanceolata, pallide viridis, spatham basi involvens illamque supereminens, demum marcescens, membranacea. Flores sessiles, densi, flavescentes. Cor. persistens, marcescens, leviter 6-fida. Germen subrotundum. Bacca purpurea, magnitudine *Ribis nigri*, glabra. Semen subrotundum, subpellucidum.“ *Roth l. c.* *Thunberg* in *Fl. Jap.* unicum tantum folium radicale ensiforme, inferne attenuatum, convolutum, longitudinaliter venosum, 2 ped., 2 poll. latum adesse dicit. Spica 2 poll. *In Japoniae siccis, prope Nangasaki et alibi.* 4.

2. *R. Tupistra*; rhizomate cylindrico; foliis lanceolato-oblongis; spicâ oblongâ cylindricâ. *TUPISTRA squalida* *Gawl.* *Bot. Mag.* 1655. *Poir. Enc. Suppl.* V. p. 374. *Bot. Reg.* 704. *Loddig. Bot. Cab.* 515. *Spreng. S. V.* II. p. 118.

Balbus fuscus, subrotundus, tunicatus, rhizomate descendente (stolonifero): fibris crassissimis. Folia radicalia, pauca, 2-3 (?), latius lorata, basi convoluta, supra plana, nervosa, medio costata, lacte viridia, integerrima, acuta, 1-2 ped. (4-5 poll. lata, in pedunculum strictum canaliculatum angustata *B. Reg.*). Scapus foliis duplo et ultra brevior, centralis, teres, inclinatus, crassitie digiti, obscure violaceus, maculis aureis. Spica conferta (inferne laxior, erecta, 4-5 poll.). Bracteae aridae, floris longitudine, interdum bivalves: valvâ alterâ magnâ ovatâ inferne flori appressâ; alterâ minutâ. Flores sessiles, extus pallide et sordide purpurascens (intus melino-squalentes), inodori, $\frac{2}{3}$ poll., $\frac{1}{3}$ poll. diam.. Cor. horizontalis, bilabiato-campanulata; laciniis ad medium fere concretis, ovatis, obtusis, dorso convexis: labii superioris planioribus, inferioris magis concavis. Antherae albae imperfectae: an dioica? Stylus brevis, crassus, griseus; stigmatibus 4-lobo (in genere 3-lobo), flavo. *Gawl.* Antherae laciniis oppositae, oblato-subrotundae, loculis 2 basi subdivergentibus, polline grumoso-farinaceo. Pistillum tubo altius, ochroleucum; saepius violaceo nimbatum. Stylus germine pluries longior; stigmata 3 subrotunda. Germen viride. *Bot. Reg.* *In ins. Amboina. Loddigges.* 4.

1327. A C O R U S.

1. * *A. Calamus*; scapi mucrone longissimo, foliaceo. *Ait. Kew.* I. p. 474. 2. ed. II. p. 305. *Willd. Spec.* II. p. 199. *Linn. Spec.* p. 462. *Smith Engl. Fl.* II. p. 157. *Fl. brit.* p. 373. *Engl. Bot.* V. t. 356. *Roth Fl. germ.* I. 153. II. p. 398. *En.* p. 72. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 569. *Wahlenb. Fl. succ.* p. 207. *Lam. et Dec. Fl. franç.* III. p. 157. *Allion. Fl. pedem.* II. p. 217. *Pursh Fl. sept. Amer.* I. p. 235. *Elliott Sk.* I. p. 405. *Torr. Fl. N. M. U. St.* p. 359. *Gmel. sibir.* I. p. 1. *Ludw. ectyp.* t. 34. *Kniph. C.* IX. n. 3. *Blackw. t.* 466. *Plenck off. t.* 275. *Woodv. Med. Bot.* t. 173. *Fl. Dan.* t. 1158. *Svensk Bot.* t. 100. *Hayne term. bot.* t. 39. f. 3. *Off. Gew.* VI. t. 31. *Schkuhr Handb.* t. 97. *A. odoratus* *Lam. Fl. fr.* III. p. 299. *Hall. helv. n.* 1507. *Moris. Hist.* 3. p. 246. s. 8. t. 13. f. 4.

Rad. crassa, horizontalis, spongiosa, fibrillis numerosis. Folia erecta, 2-3 ped., poll. lata, lacte viridia, ensiformia. Scapus 2-3 ped., folio similis, sub spadice incrassatus. Spadix 2-5 poll., patens, attenuato-cylindricus. Flores numerosi, pallide virentes. Membrana sub spadice tenuis, undulata. — Petala obovata. Filam. lata, compressa, apice attenuata, alba, rubro oblonge punctata. Semina nunquam maturescunt, nec haccam unquam perfectam invenies. *De Schlechtend. fil.* *Per omnem Europam, in Sibiria et septentr. America in uliginosis, inundatis; in Japonia Thunb.* 4.

Obs. An eadem species *A. Calamus*; fol. late lineari-ensatis: bractea spadice quintuplo longiore. *Don Prodr. Fl. nepal.* p. 20.? LINNÆ I. c. ad β suum laudat *Wambu Rheede Mal.* XI. t. 60. p. 99. et *Acorum Rumph* t. 72. f. 1, plantas toto coelo diversas. *Wambu Rheede* fere europaeam plantam exprimit, et in descriptione ait: „radix peracris, repens, sicca; fibris numerosis flavescens capillatis; cuticulâ molli albicante; corculo signaturâ flavâ annulari ab interiore carne interstinctum. Folia lato-oblonga vel oblongo-angustata, 3-4 ped., inferne equitantia, venis subtilioribus striata, radicem basibus flavescens mutuo convolutis investientia, saporis ac odoris acris.“ Cum hoc *Wambu* omnino convenit *Acorum palustre Rumph*, non vero ejusdem *ACORUM terrestre* t. 72. f. 1, quod vide. *Loureiro* *ACORUM palustre Rumph* perperam ad *ORONTIUM cochinchinense* traxit.

2. *A. terrestris Rumph*; foliis ensiformibus, brevibus; scapi mucrone spadicem triplo superante. *ACORUS terrestris Rumph Amb.* V. p. 178. t. 72. f. 1. *A. asiat.* radice tenuiore *Herm. Ludgb.* 9. *Burm. Zeyl.* 9. *Fl. zeyl.* 152. *A. Calamus β verus Linn. Spec.* 465. (excl. syn. *Rheede*). *Mant.* 368. et hoc teste: *Calam. aromat. Garz.* 288. c. fig. *Willd. Spec.* II. p. 199. (excl. *Rheede*). *A. Calamus Lour. Fl. Coch.* I. p. 259. *A. terrestris*; fol. ensiformibus, abbreviatis; scapi foliacei apice vix elongato. *Spreng. S. Veg.* II. p. 118. (quatenus *Loureiro* laudat). *A. gramineus Herbar.*

Rumph sequentia monuit de *A. terrestri* suo: „Folia minora graciliora; radix extus magis fusca sapore magis acri. Inter folia unicum aliquando crassius et angustius, inferne triangulare et in summo triangularis partis cauda (parva (*steertje*), in versione latinâ male stellula dictâ) $\frac{1}{2}$ digitum longâ, crassitie pennae vel paulo crassiore, terete, coloris hepatici, rugosâ, lineis obliquis striata, ubi aliquando quid Muscosi apparet, quod pro floribus habeo.“ Apud *Loureiro*: „caulis 0. Rad. horizontalis, repens, simplex, tenuis, compressa, articulis multis, subrotundis, extus fulvis; odore aromatico; sapore ardenti amaricante. Folia ensiformia, vix ped., subplana, erecta, equitantia. Spadix digitiformis, parvus, flosculis tectus, e folio prodiens infra apicem. Flosculos et capsulam non vidi.“ In specimine indico in *Herb. Panzer.*: folia erecta, lineari-ensiformia, acuminata, obsolete striata, glabra, inferne equitantia et margine membranaceo subdiaphano, albido vel pallide fuscescente, 6-8 poll., $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapus foliis similis, sed crassior magisque striatus, lin. latus; apex foliiformis erectus, $3\frac{1}{2}$ poll., lin. latus, basi angustior. Spadix erectus, cylindricus, poll., crassitie $1\frac{1}{2}$ lin., floribus densissimis minutis fuscescentibus, Cal. foliola vel petala ovata, obtusa, concava. Stam. longitudine petalorum. Antherae sat magnae, ovato-oblongae, flavae. In siccis et montibus *Indiae orientalis et Cochinchinae*. 4.

3. *A. gramineus Ait.*; scapi mucrone spadicem vix excedente. *Ait. Kew.* 1. p. 474. ed. 2. II. p. 305. *Willd. Spec.* II. p. 199. *Smith Spicil.* p. 15. t. 17.

Odorem aromaticum fere ut in *A. Calamo* notat *Smith*, qui totum quintuplo minorem et scapi supra spadicem brevitate differre dicit. In specimine culto: radix tenuis, flavicans, crassitie pennae anatinae. Folia stricta, anguste lineari-ensiformia, acuminata, obsolete striata, inferne equitantia et margine membranaceo albido, diaphano, lacero, 4-6 poll., $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lin. lata. Scapus foliis similis, sed paulo tenuior, vix striatus, cum spadice

4-poll., $\frac{1}{2}$ lin. latus; apex foliiformis, angustissimus, spadiceum aequans, 11 lin.. Spadix suberectus, cylindricus, 11 lin., lineâ paulo crassior. Flores densissimi, fuscescentes, minuti. Cal. foliola v. petala ovata, concava, obtusiuscula. Stamina petala aequantia; antherae ovatae, flavae. Germen ovatum, cum acumine brevi, petala mox superans, viride. Nescimus cur *Sprengel S. Veg.* II. p. 118. diagnosin hujus plantae mutasset in: „foliis linearibus; scapi foliacei apice subelongato;“ quod fere contrarium characteris ab *Aiton* dati. *Cultus in China.* 4.

J U N C U S *).

A. *Testâ seminis nucleo conformi:*

a. *foliis nullis; variis corneis, teretibus.*

1. *J. arcticus Willd.*; aphyllus; scapo subnitente, rigido; anthelâ simplici, brevissimâ; spathâ subpungente; perianthii laciniis ovato-lanceolatis, acutis, capsulâ ellipticâ obtusâ parum brevioribus. *Meyer Syn. Junc.* p. 11. n. 2. *Diss.* p. 18. *J. panic. simpl.*, glomeratâ, pauciflorâ; perigonii foliolis lanceolatis: interioribus vix brevioribus obtusiusculis, exterioribus mucronulatis, caps. ellipticam vix triquetram fere aequantibus; stam. 6. *Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'hist. nat. d. Paris* III. p. 217. *J. culmis nudis, strictis, acutis; paniculâ versus apicem, densâ, capitatâ, pauciflorâ; bracteâ paniculâ brevioribus; caps. oblongâ, obtusâ.* *Smith Engl. Fl.* II. p. 163. (excl. syn. *Hooker* monente *Laharpe*). *Willd. Spec.* II. p. 206. *Wahlenb. lapp.* 79. *Fl. suec.* p. 210. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 577. *Roth Enum. pl. Germ.* I. 2. p. 77. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 165. *Gaud. Agr. helv.* II. p. 214. *Svensk Bot.* t. 479. f. 5. *J. effusus* α *Linn. Spec.* p. 464. (excl. syn. *Scheuchz.*). *J. effusus* β *Linn. Suec.* ed. 2. III. T. n. 116. *Linn. lapp.* ed. I. 85. ed. 2. 90. (excl. syn. *J. Jacquini* et syn. *Scheuchz.* et *Rudb.*). *J. effusus* β *Retz. Prodr. Scand.* 2. p. 419: *J. Jacquini Fl. Dan.* 1095. (nec 1035.) *J. acuminatus Barb. Add. ad. Fl. ped.* 87. et in *Röm. Arch.* III. p. 129. *J. pauciflorus Mönch* (sec. *Meyer*). *Schleich. Catal.* (fid. *Gaud.*).

*) *Conspectus dispositionis specierum Juncorum apud Laharpe Essai d'une Monographie des vraies Joncées in Mémoir. d. l. Société d'hist. natur. d. Paris.* T. III. Sect. I. Culmus nudus. Folia (si adsunt) teretia, absque diaphragmatibus. Panicula pseudo-lateralis. Flores segregati: *J. glaucus, balticus, compressus, glaucescens Lah., communis, canariensis, vaginatus, filiformis, arcticus, pauciflorus, setaceus, Pylaei Lah., pallidus, capillaceus, patens.* Sect. II. Culmi nudi. Folia teretia absque diaphragmatibus. Panicula terminalis. Flores in fasciculos paucifloros aggregati. Stam. 6: *J. maritimus, acutus.* Sect. III. Culmi foliosi. Folia teretia absque diaphragmatibus. Panicula terminalis. Flores segregati. Stam. 6: *J. multiflorus.* Sect. IV. Culmi foliis teretibus diaphragmatibus interceptis. Panicula terminalis. Flores in fasciculos aggregati. §. 1. Stam. 6: *J. microcephalus, pelocarpus, scheuchzerioides Lah., lampocarpus, ustulatus, anceps Lah., acutiflorus, pyramidatus Lah., atlanticus Lah., obtusiflorus, lagenarius Gay, Fontanesii Gay, Holoschoenus, ebracteatus, tri-*

Rad. valde repens (sublignosa, pallide fusca). Culmi 8-12 poll. (et ultra), firmiores quam in *filiformi*, laeves, subpungentes, basi squamis pluribus obtusis dilute fusciscentibus. Panicula vix pollic. (vel 2 poll.) ab apice distantia (5-7-flora, saepius vix ultra 3 lin.); bractea submembranacea, concava, obtusa, pedunculis longiore. Flores aggregati, obliqui; bracteis pluribus, tenuibus, crassis. Cal. foliola lanceolata, obtusa, fusca, nitentia, carina pallidiore. Caps. longitudine calycis, mucrone exiguo. *Smith. E. Fl.* Cal. foliola atrofusca, dorso striata viridi, margine albida: exteriora lanceolata, acuta; interiora fere ovata, obtusiuscula, latiora brevioraque. Stylus inconspicuus. Caps. ovata. Culmus medulla fere continua. In cultis speciminibus panicula saepius 15-flora, sic etiam apud *Mert. et Koch.* *Gaudin* inflorescentiam sessilem simpliciusculam dicit, et capsulas magnas nigrescentes. Differt a *J. filiformi*: fol. nigricantibus, culmo magis solido; a *J. communi* panicula simplici; flor. 6-andris; a *J. glauco* perig. foliolis lanceolatis, quidquam obtusis; a *J. baltico*: flor. rarioribus, magis congestis, minus rotundatis; folio florali breviora; caps. magis 3-gona. *Laharpe.* In alpibus *Laponiae, Norvegiae, Helvetiae, Tyrolis, Pedemontii et in Pyrenaeis (Lapeyr.). 2.*

Obs. Cls. *Meyer* huc trahit *J. Jacquini Linn. lapp. Smith*, quem *Smith* excludit. Cls. *Laharpe* sub *J. arctico J. arcticum Hook. et Smith* excludit, ut, fid. specim. *Hooker in Herb. Gay.*, ad *J. balticum* spectantem: hoc forte valet de *J. arctico Hook.*; sed vix de *J. arctico Smith Engl. Fl.*, cum descriptio ibidem data bene quadret, et ill. *Smith* specimina lapponica contulisse dicat, ad quae forte descriptio facta est.

2. **J. conglomeratus*; culmo nudo, stricto (striatulo); panicula densa, globulosa, longo ab apice intervallo; capsula retusa; floribus triandris. *Smith Engl. Fl. p. 161. Fl. brit. 376. Engl. Bot. t. 835. Linn. Spec. 464. Willd. Spec. II. p. 205. Bichenov Trans. Linn. Soc. XII. p. 302. Ehrh. Calam. 65. Rostk. Junc. n. 1. (Roth germ. I. 153. II. 398. Mert. et Koch Deutsch. Fl. II. p. 572. Wahlenb. Fl. suec. p. 208.) Leers Fl. Herb. 86. t. 13. f. 1. (Allion. Fl. pedem. n. 2072. Savi Bot. etrusc. II. p. 66. n. 349. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 163. Gaud. Agr. helv. II. p. 211. Mühlenb. Am. p. 36. Pursh Am. I. p. 236. (Lam. ill. t. 250. f. 1. (nimis obtuse). Host. gram. III. t. 82. (obiter). Svensk Bot. t. 479. f. 2.). Fl. Dan. t. 1094. (perperam hexandrus). I. communis; aphyllus; culmo laevi, viridi, rigidiusculo; corymbo suprafastigiato, supradecomposito, in-*

cephalus Gay, Dombeyanus Lah., Rostkovii, punctorius. §. 2. Stam. 3: *J. canadensis Gay, uliginosus, subtilis, acuminatus, Leschenaultii Gay, sinensis Gay, concinnus, valvatus, prismatocarpus, Wallichianus Lah., polycephalus, macrostemon Gay, paradoxus, pygmaeus.* Sect. V. Folia plana vel canaliculata; culmus nudus v. foliosus. §. 1. Flores in spicas aggregati: *J. Cephalotes, capensis, planifolius, capitatus, cyperoides, repens, aristulatus.* §. 2. Flores in pedunculis solitarii: *J. squarrosus, platycaulos, falcatus, bicornis, imbricatus Lah., plebejus, gracilis, revolutus, bulbosus, bottnicus, Tenageja, bufonius, magellanicus, rhiphioides.* Sect. VI. Semina scobiformia; folia teretia, canaliculata vel compressa; flores parum numerosi, solitarii vel in capitula congesti: *J. trifidus, grandiflorus, Jacquini, stygius, castaneus, triglumis, biglumis.* Dubii: *J. biscephalus, attenuatus, insulanus.*

flexo; perigonii laciniis lanceolatis, acuminatis, capsulâ ob-
 ovatâ retusâ sublongioribus; stam. 3. α *conglomeratus*; corym-
 bo conglomerato, capituliformi. *Meyer Syn.* p. 12. n. 3.
Diss. p. 20. *J. communis*; paniculâ supradecompositâ; perig.
 foliolis lineari-lanceolatis, aequalibus, acutissimis, capsulam
 ellipsoideam prismaticam retusam aequantibus; stam. 3. α pa-
 nic. densiore plerumque rufescente. *Laharpe l. c.* p. 115.
Roth. Enum. pl. Germ. I. 2 p. 74. *J. effusus Spreng. S.*
V. II. p. 106. (partim). *J. glomeratus Thunb. Fl. jap.* p. 145.
J. laevis α *Wallr. Sched. crit.* p. 142. *J. lapponicus Quo-*
rund.) Hall. Helv. n. 1312. (*Gmel. Sib.* 1. p. 70.)
Scheuchz. Agr. 343. *Moris. III.* 231. *Sect.* 8. t. 10. f. 7.
J. laevis Dalech. hist. 984. f. *J. Matthioli Bauh. Hist.* II.
 p. 520. *Camer. Epit.* 780. f. β *J. conglom. effusus Hop-*
pe Dec. Gram. 152. et *J. congl. altissimus Hoppe*; 3-ped.;
 paniculâ duplici, superiore pedunculatâ. γ paniculâ minimâ.
Poir. Enc. Suppl. p. 155.

Rad. repens, horizontalis. Culmi fere 2 ped., erecti, omnes fere
 fertiles, gramineo-virides, striati, acuti nec pungentes, basi
 squamis appressis, (pallide) fuscis, obtusis. Panicula supra
 medium culmi, e fissura parva membranaceo-marginata, ebrac-
 teata, corymbosa. Calycis foliola acuta, interiora fere mem-
 branacea, bicostata. Stam. semper 3. Caps. ovata, distincte
 triangularis, mucrone exiguo, purpureo-fusca, nitens, longitu-
 dine circiter calycis. *Smith E. F.* l. c. Culmi medullâ conti-
 nuâ farcti, striis sub lente prominentibus; apex ad paniculae or-
 tum subspathaceo-dilatatus. Panicula 3-8 poll. ab apice di-
 stans. Cal. foliola lanceolata, acute acuminata, subaequalia, fus-
 cescentia, dorso viridia, margine membranaceo. Stylus brevis-
 simus. Caps. ovata obovatave, truncata, mucronulo brevi trun-
 caturae angulos superante, fusca vel virescenti-fusca. In β
 culmi multo majores, basi crassitie pennae anserinae majoris,
 striis tamen non evidentioribus; e panicula minus densa rami
 oriuntur 1-3 iterum paniculâ densâ terminati; flores capsulae-
 que paulo majores, ceterum omnino similes. γ culmo gaudet
 folii ad instar complanato, striato, bipedali, molli, debili.
Poir. — Rarissime hexandrus. *Hoppe Bot. Zeit.* 1826. p.
 65. *In humidis ad vias et in pascuis per omnem Europam,*
Asiam borealem; in America boreali; in Japonia. 4.

Obs. „Stamina 6, aut interdum tria.“ *Brotero Fl. lusit.* p. 511. cujus
 descriptio quidquam recedit. Culmi plures cespitosi, teretes, laeves, stricti,
 apice acuti, 1¹/₂ ped., medullâ spongiosâ, basi vaginis striatis, obtusis arista-
 tisque. Folia radicalia pauca, culmis simillima illisque breviora. Capitulum
 solitarium, subglobosum, ad 3-5 uncias infra apicem culmi rectum, ex fissura
 laterali, floribus plurimis dense conglomeratis, parvis, ex fusco flavescenti-
 bus, brevissime pedunculatis. Capsula obtusa, apice angulis prominulis. *In*
uliginosis Lusitaniae borealis. 4.

3. *J. bogotensis Humb. et Bonpl.*; culmo aphylo, te-
 reti, stricto; paniculâ laterali, conglomeratâ; floribus triandris;
 capsulâ trigonâ, truncatâ, laciniis calycinis subulatis breviora.
Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 235. I. cul-
 mo nudo, stricto; paniculâ laterali, coarctato-capitatâ; flori-
 bus hexandris. *Reliqu. Willd. MS* (fide de Schlech-
Syst. Vegetabil. Vol. VII.

tend. fil.) *J. communis* *α Meyer Syn. p. 12. Laharpe l. c. p. 116. (partim.)*

Valde affinis *conglomerato Linn.*. Culmus strictus, 2 - 3 - ped. ? basi vaginatus?, glaber, crassitie pennae gallinaceae. Panicula infra apicem subulatum culmi 8 - 12 poll. distans, sessilis, ramosissima, subglobosa, magnitudine fere fructus Pruni minoris, ramis subdichotomis. Pedicelli teretes, glabri, 1 - 2 lin., bracteati. Cal. basi bibracteatus, laciniis lanceolatis, acuminato - subulatis, nervibus fuscis, margine membranaceo - diaphanis, planiusculis, 3 exterioribus paullo longioribus. Bractee pedicelli ovato - lanceolatae, acuminato - subulatae, carinatae, tenuissime membranaceae, albidae; bractee sub calyce subrotundo - ovatae, acuto - mucronatae, concavae, membranaceo - diaphanae, albidae, subaequales, calyce triplo breviores. Stylus brevissimus. Caps. oblongo - triquetra, nigro - fusca, nitida, glabra. Semina minuta, hyalina, fuscescentia. *Kunth l. c. In alta planitie Bogotensi prope Tenjo, Coto et Suba. 4.*

*Obs. Cls. Meyer l. c. junxit cum conglomerato, quia flores fructusque J. bogotensis secum communicati non differunt, nec descriptio data a cl. Kunth ullum prorsus discrimen offert. At offert, et distinxit etiam cl. de Schlechtendal fil. In Syn. Luz. p. 28. cl. Meyer monet differre tantum, „eo, quod solito aliquantum robustior sit.“ Etiam cel. Laharpe J. bogotensem sec. Herb. Kunth. ad J. communem *α* (conglomeratum) ducit.*

4. *J. mexicanus Willd.*; culmo nudo, tereti, nutante; umbellâ laterali compositâ, multiflorâ; floribus secundis; petalis lanceolatis, cuspidatis, capsulâ oblongâ acutâ longioribus. *Reliqu. Willd. MS.*

In Mexico. De Humb. 4.

5. * *J. effusus*; culmo nudo, stricto, (laeviusculo); paniculâ laxâ, effusâ, supradecompositâ, longissimo ab apice intervallo; capsulis obtusis. *Smith Engl. Fl. II. p. 162. Brit. p. 576. Reliq. Rudb. 24. f. Engl. Bot. t. 856. Linn Spec. 464. (excl. *α*). Willd. Spec. II. p. 205. Bicheno Trans. Linn. Soc. XII. p. 303. (Rostk. Junc. p. 10. n. 5.) Ehrh. Calam. n. 75. (Roth Germ. I. 153. II. p. 599. (excl. syn. Poll.) Mert. et Koch Deutsch. Fl. II. p. 573. Wahlb. Fl. succ. p. 209. Savi Bot. etr. II. p. 67. n. 550. Seb. et Maur. Prodr. Fl. rom. p. 131. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 163. Balbis Fl. Lyon. I. p. 738. Gaud. Agr. II. p. 210. M. a Bieb. Taur. Cauc. n. 700. Pursh Fl. sept. Am. I. p. 256. Elliott Sketch. I. p. 405. Torrey Fl. n. et m. U. St. I. p. 559. Thunb. Jap. I. p. 145. R Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 258.) Leers Herb. 87. t. 13. f. 2. Fl. Dan. t. 1096. (Host Gram. III. t. 85. Fl. batav. 84. Svensk Bot. t. 479. f. 1. *J. communis β effusus*, corymbo laxo, patente. *Meyer Syn. p. 12. Diss. p. 22. 29. J. communis β paniculâ laxiore pallidiore Laharpe l. c. p. 116. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 74. J. glaucus α Meyer Syn. p. 13. Diss. p. 29. J. laevis β Wallr. Sched. crit. p. 143.) Hall. helv. n. 1311. β. J. laevis paniculâ sparsâ ma-**

ior. *Bauh. Theatr.* 182 f. *Scheuchz. Agr.* 341. et 344. *Moris.* III. 231. s. 8. t. 10. f. 4. *J. laevis* *Ger. Emac.* f. β *J. laevis* alter *Moris* III. 231. n. 5. (paniculâ minus diffusâ). *J. effusus compactus* *Hoppe Dec. Gram.* 154. γ *J. laevis* γ *diffusus*; pedunculis elongatis in paniculam supradecompositam effusis; culmo procero. *Wallr.* l. c. δ calycis foliolis duplo majoribus, capsulas duplo fere superantibus; floribus sessilibus. *Ian in litt.* *J. expansus* *Jan Catal.* ϵ *pallidior*; floribus minoribus pallidis.

Radix parum repens. Culmi *conglomerati*, sed molliores, pallidiores, plicatiles. Panicula ramôsissima, divaricata, floribus numerosis, parvis, viridibus. Cal. foliola tenuiter acuminata: 3 exteriora carinâ latâ, obtusâ, interiora nervis 2 distantibus. Stam. plerumque 6, raro 5. Caps. parva, obtusa, sed minus quam in *conglomerato* truncata. *Smith* l. c. Conf. *J. diffusum*. In pascuis humidis et ad vias per omnem terram; δ in Sicilia; ϵ in America boreali. 4.

Obs. Secuti hic sumus auctoritatem potius possessoris *Herb. Linnaeani*, ill. *Smith*, in *Engl. Fl.* l. c., quam illam acutissimi *Meyer*, qui *J. effusum* *Linn. Spec.* ad communem suum β , *J. effusum* *Smith* vero ad suum *glaucum* α ducit cum plurimis synonymis, numero, ut videtur staminum, per motus. Stamina 3 semper vidimus cum *Meyer*, *Ehrh. Beytr.* III. p. 59., *Link*, *Mert. et Koch*, *Roth*, *Wenderoth Beytr. z. Fl. Hess.* p. 33., et etiam cum *Torrey*, *Elliott*, *Mühlenberg descr. ub.* p. 204. „Qui stamina 6 numerarunt auctores in *J. effuso*, absque dubio varietatem *J. glauci* prae oculis habuerunt. *Roth*.“ Culmi striae etiam lente minime prominentes, medullâ continuâ. Caps. impresso-truncatae, mucronulo fere nullo, *Mert. et Koch*; magis carinatae et breviores quam in *conglomerato*. In β culmi apex brevior; panicula densa fere ut in *conglomerato*; reliqua ut in α . In δ , cujus paniculae ramulum tantum vidimus: flores in apicibus ramulorum subcapitulato-congesti, subsessiles; cal. foliola lanceolata, longe attenuata, $1\frac{1}{2}$, fere lin., dorso viridia, margines versus membranaceos utrinque nervo fuscescente: interiora multo breviora; capsula calyce duplo brevior, obovato-trigona, obtusa cum mucronulo, vix impressa. An hujus loci? In ϵ cal. foliola minora, pallide viridia; bractae albae; capsulae? *J. effusus* *Brotero*; culmo nudo, stricto, laevi, omnino farcto; paniculâ laterali; corollae petalis aequalibus; capsulâ obtusâ obsolete mucronatâ; *Fl. lusit.* p. 511. differt non paucis a nostro ex descriptione. Caulis 2 ped. et ultra, teres, strictus, sublaevis, sub lente vix tenuissime striatus, intus medullâ albâ, mucrone tenui arido, interdum recurvo, basi vaginis striatis, fuscis, obtusis, cum mucrone. Folia simillima, breviora. Panicula laxiuscula ex fissura laterali, 5-6 poll. infra culmi apicem, $1\frac{1}{2}$ - 2 poll., ac si cyma supradecomposita; pedunculi inaequales: primarii hinc convexi, extremis brevibus, 1-2 lin. longis. Bractea ad exortum paniculae brevis, 3-5 lin., lateribus membranaceis, apice obtuso, aristâ brevi; aliae multae sensim minores, membranaceae, ovatae, acuminatae, ad basin pedunculorum et sub singulo flore. Flores plurimi congesti: petala acuminata. Caps. eviridi-flavescentes, trigona, obtusa, mucrone obsolete, longitudine corollae. Semina fulva. Variat paniculâ altiore et laxiore. Convenit cum hoc *effuso* *Broter. effusus* quem describit *cls. Lagasca* in *Herrera Agricult.* ed. 1818 p. 303., cui „culmi erecti, laeves, striati, teretes, nudi, 2-ped., mucrone terminali acutissimo. Folia radicalia, cylindrica, acuta, pungentia, erecta. Panicula plerumque laxa et ex bractearum lateralis elongatione, subinde vero agglomerata ut in *conglomerato* floribus obtusa, polysperma. Varietas agglomerata differt a *conglomerato* floribus albidis, acutissimis et strangulatione parvâ circulari sub panicula. — *Cls. Laharpe* *J. effusum* *Desf. Atl.* 1. p. 312. potius ad *J. glaucum* spectare dicit.

6. *J. canariensis* *Willd.*; aphyllus; scapo laevi, viridi; anthelâ supradecompositâ, longissimâ, flexuosâ; perianthii laciniis angustissimis, acuminatis, capsulam triquetro-ellipticam obtusam rugulosam superantibus. *Meyer Luzul.* p. 29. *J. culmo* glaucescente, laevi; paniculâ supradecompositâ, capillaceâ, laxâ; floribus minutis, numerosis; perig. foliolis lan-

ceolato-linearibus, acutis: exterioribus longioribus, capsulam ellipsoideam obtusam aequantibus; stam. 3. *Laharpe* l. c. p. 116. J. culmo nudo, tereti, stricto; paniculâ laterali supradecompositâ, proliferâ, valde elongatâ et diffusâ; petalis subulatis, capsulâ obtusâ longioribus. *Reliq. Willd. Ms. J. rigidus Brouss. Herb. Mert.?* apud *Meyer*.

Nimis affinis *Juncus effusus*; at panicula multo amplior; pedicelli capillares; flores tenuiores, minores. Superest tantum caulis pars superior. *De Schlechtendal fil.* Primo intuitu cum *J. communi* confundendus, sed culmo glauco; paniculâ amplissimâ, ramis capillaribus; floribus minimis pallidis; perig. foliolis inaequalibus; caps. valvis tenuissimis, rugosis; stylo subnullo diversus. *Laharpe. In Canariis. 4.*

7. *J. glaucescens LaHarpe*; paniculâ supradecompositâ; perigonii foliolis linearî-lanceolatis, acutissimis, aequalibus, capsulam ooideam subaequantibus; staminibus 6. *LaHarpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'hist. nat. III. p. 115.*

J. communi valde affinis, et tantum staminibus 6, capsulâ apice rotundatâ nec retusâ diversus; *J. glaucus* differt habitu capsulaeque calycem superante. Culmus basi vaginis vestitus, teres, lineatus, subflaccidus, glaucescens. Folia nulla. Panicula conglobata, folio florali multo brevior, fuscescens. Flores numerosi. Perig. foliola striata, subfusciscentia. Stam. perigonio dimidio breviora; antheris filamenta aequantibus. Caps. vix triquetra, semitrilocularis, perigonium vix aequans. Stylus brevissimus. Sem. numerosa, oblonga, nitida. *Laharpe. In montibus Nelly-Gerry Indostan. Leschenault. 4.*

8. *J. diaphragmarius Brôtero*; culmo stricto valde striato, intus inter diaphragmata fistuloso; petalis inaequalibus; capsulâ mucronatâ. *Fl. lusit. p. 611. J. glaucus a Meyer diss. p. 29., ß Meyer syn. p. 15.?*

„Pro varietate habetur *J. effusi*; sed culmus minor, striatus, interdum quasi angulosus; in florescentia intus medullâ fere destitutus, maxime e medio ad apicem, et solum numerosis diaphragmatibus, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ lin. inter sese distantibus, refertus; folia fere similia; panicula laxissima valde longior; petala inaequalia, longiora; capsula subfusca, longior, superne angustior, evidenter mucronata, et petalis longioribus paulo brevior: quae omnia speciem esse diversam suadent. *Brotero. In fossis udis Europae meridional. praesertim in Lusitania. 4.*

Obs. Dicitur passim synonymon *glaucci* et cum? adducitur ad eundem a *clo. Meyer*; sed nobis potius *J. effusus* y *Lam. II. p. 265* videtur, s. *J. aquaticus*, medullâ fere destitutus. *Scheuchz. gram. 343. n. 2. Juncus n. 35. Retz Obs. I. p. 16.* — An huc forte *J. fistulosus Gussone*, qui medius *J. glaucum* inter et *effusum*, et a posteriore, cui magis similis, culmo fistuloso, capsulis acutis diversus dicitur? *Cls. Bertoloni in litt. J. fistulosum Gussone. Prodr. Fl. sic. 1. p. 431.* specie distinguit a *J. glauco* et *effuso* sequente diagnosi: *J. aphyllus*; culmo fistuloso; umbellâ laterali, supradecompositâ; floribus congestis, subumbellatis; sepalis acuminatis, capsulâ obtusâ longioribus. Culmus teres, striatus, tenax, 1 ped. et ultra. Umbella spuria lateralis, supradecomposita, inaequalis. Praelongus culmi apex hinc illi supereminet, inde bractea perbrevis, acuminato-setacea. Flores numerosi, congesti in apice ramorum. Perigonium spadiceo-viride; sepalis lanceolatis, acuminatis, capsulam acute triquetram, apice obtusam superantibus. *Habitus Junc. glaucci*, ut flores *J. effusi* quoad formam. *In Sicilia. 4.*

9. *J. diffusus Hoppe*; culmo nudo, tenuiter striato; me-

dullâ continuâ; vaginis radicalibus aphyllis; paniculâ laterali, decompositâ; cal. laciniis lanceolatis, acutissimis; stylo conspicuo; capsulâ obovatâ, obtusâ, mucronatâ. *Mert. et Koch Deutsch. Fl.* II. p. 576. *Hoppe Dec. gram. n.* 155. *Wenderoth Beytr. z. Fl. Hess.* p. 33. *Bot. Zeit.* 1819. p. 186. 1826. p. 65. *J. glaucus* β *Meyer Syn. Luzul.* p. 28.

Culmi 2-2½ ped., erecti, virides, striis vix evidentioribus quam in *J. effuso*; basi vaginis tenuiter striatis, atrofuscis, nitidis, obtusis. Panicula erecta, effusa, 2½ poll., paulo supra medium culmi, supradecomposita; rami majores 3-4; bracteae ad eorum basin lanceolatae, acuminatae, carinatae, basi dorsoque nitidae fuscae. Bracteae sub floribus 2, ovatae, acutae, concavae, floribus multo breviores, fuscescentes. Cal. foliola lanceolata, acuminata, quidquam carinata, dorso viridia, margine membranaceo fusca, interiora paululum breviora, capsulam teretiusculam superantia. Stamina 6, calyce ⅓ breviora; antherae lineares, flavae, staminibus paulo breviores. *J. glauco* simillimus; sed diversus culmorum viridium striis multo minus manifestis, medullâ continuâ, nec cellulôsâ, faretis; floribus paulo minoribus; capsulis minoribus pallidioribusque, magis obovatis, vix majoribus quam in *J. conglomerato*. A *J. conglomerato* et *effuso* differt: vaginis atrofuscis, paniculâ laxiore magisque erectâ; bracteis calycisque foliolis fuscis; staminibus semper 6; stylo majori. An hic forte *J. effusus Smith*, in quo stamina semper fere 6? In fossis prope Ratisbonam. *Hoppe.* 4.

10. *J. glaucus Sibth.*; culmo nudo, sulcato-striato, glauco: medullâ interruptâ; paniculâ suberectâ, subaggregatâ; floribus approximatis, fuscescentibus; cal. foliolis lanceolatis, acutissimis, capsulam ellipticam, obtusam, mucronatam fuscâ paulo superantibus. *J. culmo nudo, stricto, glauco; paniculâ erectâ, longe ab apice remotâ; capsulâ ellipticâ, acutâ, calyce parum brevior.* *Smith Engl. Fl.* II. p. 160. *Fl. Br.* 375. *Engl. Bot.* t. 665. *Sibth* 113. *Willd. Spec.* II. p. 206. *Bichenov Trans. Linn. Soc.* XII. p. 500. (*Rostk. Mon.* 9. *J. aphyllus; culmo striato, glauco, tenaci; corymbo suprafastigiato, supradecomposito; perigonii laciniis lanceolatis, acuminatis, longitudine capsulae ellipticae, obtusae, mucronatae.* *Meyer Syn.* p. 13. n. 4. *Diss.* p. 31. sub *J. glauco* β . *J. panic. decompositâ; perig. foliolis subaequalibus, linearibus, acutissimis, capsulâ elliptico-ovoideâ brevioribus; staminibus 6.* *Laharpe l. c.* p. 113.) *Hook. Scot.* 100. *Ehrh. Calam.* 85. (*Decand. Fl. fr.* V. p. 307. *Gaud. Agr. helv.* II. p. 208. *Savi Bot. etrusc.* II. p. 67. n. 351. *Seb. et Maur. Prodr. Fl. rom.* p. 131. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 575. *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 75. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 209. (excl. β). *Host. III. t.* 81.) *Fl. Dan.* t. 1159. *J. effusus* β *Huds* 149. (*Lam. Enc.* II. p. 265. β . *J. effusus* γ *Poll. Pal.* 1. p. 345. *Krock. Siles.* n. 545. *J. effusus* γ *Retz Obs.* 1. p. 16. *J. inflexus Willd. Prodr.* n. 390. fide

de Schlechtend. Fl. Berol. p. 196. *De Gort.* p. 310. (fid. *van Hall Fl. Belg. sept.* p. 286.) *Lam. et Decand. Fl. fr.* III. p. 164. [fid. *Dec. Syn.* p. 151.] *Relh.* 141. *With.* 345. *Leers* 87. t. 13. f. 3. *Roth Fl. germ.* II. p. 400. *Hall. Hist.* n. 1511. α . *J. acutus* panic. sparsâ *Scheuchz.* 345. (fid. *Herb. Schreb.*). *J. acutus* *Ger. Emac.* 55. f. *Dod. Pempt.* 605. f. *J. acutus vulgaris.* *Moris. Hist.* III. 252. *Sect.* 8. t. 10 f. 15. *Lob. Ic.* 85. f. 5. (et fide harum iconum: *J. tenax* *Poir. Suppl.* III. p. 156). *J. foliaceus* *Bauh. Hist.* II. 521. f. β paniculâ pauciflorâ, brevi, densâ. *J. glaucus compactus* *Hoppe Dec.* n. 158. γ paniculâ laxiore contractâ. *J. glaucus contractus.* *Hoppe Dec.* n. 159. δ bracteaâ spathaceâ erectâ. *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 76.

Rad. modice repens, nigricans, fibris crassis. Culmi rigidi, tenacissimi, glauci, striati, 18 poll. - 2 ped. (et ultra), tenuiores quam in *maritimo*, apice attenuati, acuti, vix pungentes, basi stipulis magnis, fuscis, nitidis, partim acuminatis (apud nos plerumque obtusis vel mucronulatis), appressis. Panicula plerumque in medio culmi, sine bracteaâ exteriori, aggregata; ramis (sub)teretibus inaequalibus, fere erectis, cymosis. Calycis foliola subulata, pallide fusca, carinâ obscuriora (apud nos margine fusca, dorso virescentia). Stam. 6, antheris longis, splendide flavis. Caps. acute triangularis, elliptica, mucronulata, vix longitudinis foliorum calycis 5 interiorum breviorum, (apud nos calycis foliolis interioribus paulo longior, exterioribus paulo brevior). *Smith Engl. Fl.*, in quo excludendum synonym. *Wahlenb. Lapp.* 79 (mouente ips. *Wahlenb. Fl. carp.* n. 327). Differt a similibus *conglomerato* et *effuso*: colore glauco, culmis tenuioribus, vaginis inferioribus obscurioribus nitentibus; calycis foliolis magis acuminatis coloratisque; capsulâ maturâ longiore, mucronata, nigricante, nitente, perigonium aequante. *De Schlecht.* l. c. Occurrit passim nomine *J. stricti*. In β culmi tenuiores, humiliores; vaginae apice laxiores pallidioresque; paniculae 8-10 lin. longae lataeque multo densiores; flores brevius pedicellati, ceterum ut in α ; capsulae calycis foliola exteriora subaequantes, intensius coloratae. In γ vaginae basi tantum fasciae; culmi gracilioris apex abbreviatus; paniculae erectae, laxae, 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll.; flores longius pedicellati, remotiores; cal. foliola tenuiora, dorso minus viridia; capsulae minus trigonae, calyce paulo breviores; habitu *J. paniculato* similis.

In pascuis et ad vias in uliginosis a Suecia ad Mediterraneum, vix unquam in alpibus; in Tauria et Madeira, in America arctica Richardson. 4.

Obs. 1. Synonyma plura et figuras a *Linnae* ad *J. inflexum* laudatas, quem Nonnus suspicatur et frustra ubique quaesivit, spectare ad *glaucum*: *Smith Engl. Fl.* II. p. 161. Vix tamen, uti videtur clo. *Meyer* p. 13., *J. effusus* *Smith* et ejusdem *glaucus* merae varietates. Ad primum, qui clo. *Meyer* *J. glaucus* α , ab eo refertur: *J. inflexus* *Leers*, *J. glaucus* *Ehrh.* et *Willd.* et *J. tenax* *Poir.* cum *Host* t. 31.: ad secundum, qui ejusdem *glauci* β trahitur: *J. effusus* β *Lam.*, *acutus* *Thuill.* et *diaphragmarius* *Brot.* et in *Syn. Luz.* p. 28. *J. diffusus* *Hoppe*. Cum? *Steudel* huc instar varietatis δ trahit *J. coarctatum* *Hoppe*, et instar ϵ *J. contractum* *Hoppe*. An huc *J. tenax* *Forst. prodr.* n. 511. dubios inter solo nomine adductus, nova Zeelandia? Ita videtur clo. *Dryander in litt.* ad *Montin.* *Wickstr. Act. holm.* 1813. p. 2. An huc forte quoque *J. tenax* *Russel Besch.* v. *Alepp.*, de quo nil praeter brevem hanc diagnosin: „*J. culmo nudo, striato, paniculâ laterali rarâ; squama radicalibus nitidis.*“

Obs. 2. Cla. *Wenderoth* in *Beitr. z. Flor. Hess.* p. 34. *J. inflexum* *Herb.*

Mönch nec ad *J. inflexum* Linn., nec ad *J. inflexum* Less. s. *glaucum* Ehrh. spectare monet. Videtur illi forsitan propria species, quam ad interim *J. reflexum* dicit. *J. glaucus* semper minor, rigidior, nunquam glaucus; apex (qui in *J. glaucus* rectus vel parum versus paniculae latus flexus), semper reflexus, ita ut panicula ad sinistram, apex vero ad dextram spectet. Inflorescentia floresque ut in *J. glaucus*.

11. *J. paniculatus* Hoppe; culmo nudo, tenuiter striato, apice reflexo, medullâ continuâ; paniculâ laterali, elongatâ, laxâ: floribus remotis, pallidis; cal. foliolis lanceolatis, acutissimis, capsulam ovatam, mucronatam, pallidam aequantibus. Hoppe Dec. Gram. n. 156. Mert. et Koch Deutsch. Fl. II. p. 574. *J. pallidus* Hoppe. *J. glaucus* Salz. n. 2. *J. glaucus* γ Meyer Syn. p. 14. *J. longicornis* Bast. Journ. d. Bot. 1814. 1. p. 20.?

Radix repens fibris crassis fuscis Culmi plures, cespitosi, erecti, apice plerumque reflexi, 2 ped. et ultra, pallidi, crassitie pennae corvi ad pennam gallinaceam usque, aphylli, basi vaginis 2-3, sat arctis, striatis, inferne fuscis, nitidis, apice obtusis cum mucrone aristaeformi. Panicula paulo supra medium culmi, 4-6 poll., apice culmi plerumque duplo brevior, supradecomposita; rami valde inaequales, graciles, debiles, suberecti, 3-4 longiores iterum paniculati, compressi, pallidi. Bracteae ad ramorum basin lanceolatae, subulato-acuminatae, margine membranaceae, dorso nervoso-carinatae, pallidae; bracteae sub ramulis ovatae, acuminatae, carinatae, albidae, subdiaphanae. Flores medii subsessiles, laterales in pedicellis capillaribus, flore triplo longioribus; bracteae ad florum basin 2 ovatae, acutae, concavae, amplexantes, albidae, flore multo breviores. Cal. foliola dorso subcarinato pallide viridia, margine albida, nunquam fusca vel castanea, longe acuminata; exteriora $\frac{1}{2}$ lin., capsulam aequantia, interiora breviora. Stam. 6, calyce duplo breviora; antherae lineares flavae. Caps. obsolete trigono-ovata, styli basi persistente mucronata, viridis vel pallide fusca, minus nitida quam in *J. glaucus*. Sem. ovato-oblonga, fusca. *J. glaucus* valde affinis; sed habitu graciliore, paniculae formâ coloreque facile distinguendus. Ad specim. Hoppeanum. In arenosis ad littora maris mediterranei Salz. n. 2. in pascuis humidis inter Duinum et Monfalcone. Hoppe. 4.

Obs. Etiam clo. Meyer *J. glaucus* γ suus, ad quem rigidum et longicornem cum?, sine dubio vero *glaucum* Salz. n. 2. et *pallidum* Hoppe ducit, species propria videtur staturâ graciliore; colore pallidiore; paniculâ elongatâ laxâ; cui icon Morisoni S. 8. t. 10. f. 25. a Linnaeo ad *inflexum* laudata similior, quam ulli alteri: sed spatha membranacea desideratur. Huc videtur spectare *J. inflexus* Scop. Carn. n. 419.

* *J. inflexus*; culmo nudo, apice membranaceo incurvo, paniculâ laterali. Linn. Spec. p. 464. (sphalmate: *filiformis*). Lam. Enc. III. p. 265. (qui adjecit Scopoli carn. 2. p. 429., uti Willdenow Spec. II. p. 206., et Leers herb. n. 263. p. 13. f. 3. (quem Smith ad *J. glaucum* ducit.)) *J. culmo* nudo, paniculam arcuatim tegente. Sauv. monsp. 9. (quem Lam. neglexit). *J. acumine* reflexo major. Bauh. 12. Prodr. 184. Moris. hist. III. p. 255. s. 8. t. 10. f. 25. (quam (rigido simillimam Meyer), bonam praedicat Lam.; qui supperadit Tournef. 146. et *J. melancranin* Dalech. hist. 985.) Barrel. ic. 204. (quem laudat Lapeyr. hist. arbr. pl. Pyr.

p. 193.) *Hall. helv.* 252. (quem *Lam.* et *Willd.* omisere). *J. foliaceus Bauh. hist.* 2. p. 221. *Juncus* 3. *Dodon. cer.* 25 adduntur a *Willdenow*. β . *J. acumine reflexo alter. Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *Scheuchz. gram.* 345. γ . *Junc. paniculâ universali laterali culmo longiore, secundariis sparsis, Guett. stamp.* 412. *J. acutus panicula sparsa Bauh. pin.* 11. (laudantur etiam a *Willdenow*, negliguntur prorsus a *Lamarck*, cujus *inflexum* esse omnino *inflexum Linn.*, nec *glaucum, Poiret Enc.* III. p. 155. monet). Confer *Hoppe bot. Taschenb.* 1811. p. 182. 196. et *Meyer diss. d. Junco* p. 33.

Planta valde dubia, „cujus synonyma a Linnaeo citata ad *glaucum* spectant, quem tamen haud bene notant, et quem frustra in natura, in hortis et in Herbariis quaesivi, atque NONENS suspicor „*Smith Engl. Fl.* p. 161. *Willdenow*, qui tamen non vidit plantam, addit: „Culmi suprema pars non est teres, sed folii ad instar compressa.“ *Lamarck* l. c. ait pro *effusi* varietate habitum fuisse, sibi tamen videri speciem, si synonyma excluduntur a *Scheuchzer, Linnaeo* et *Haller* eidem adscripta, et describit culmos valde graciles, fere filiformes, teretes, striatos, nudos, pedales et ultra; flores in panicula laterali, laxa, ramosa, longe ab apice remota, saepe in medio caulis, cujus apex elongatus, filiformis, tenuissimus, arcuatur varie et saepe marcidus dependet. Caps. illi ovato-globosa, calyce parum brevior, cujus foliola acutissima, subinaequalia. *Decandolle J. inflexum Lam.* ad *glaucum* ducit. *J. inflexus verus Herb. Schreb.* nil nisi *glaucus*. Attamen occurrunt in *Herb. Schreberi* specimina cum schedulis, quibus „*J. acutus acumine reflexo major C. Bauh. Pin.* 12, *Seguier* 1. 126.“ inscriptus, in quae descriptio data a *Lamarck* quadrat ad amussim, quaeque habitu a *glaucum* quidquam alieno, licet characteribus specificis, non differant. *Balbis Fl. Lyon.* 1. p. 739. *J. inflexum L.* staminibus 3 nec 6 a *J. glauco* differre dicit, uti etiam *Pollini Fl. veron.* 1. p. 126, qui quoque *C. Bauh.* et *Seguier veron* II. cc. laudat. *Laharpe* l. c. p. 113. *J. inflexum* pl. pl. auct. natum ex fallaci descriptione in *Morison*; et *J. inflexum Lam.* (fid. herb. *Lam.*) ad *J. glaucum* citat, cuique apicem complanatum et incurvum exsiccationi et ejusdem longitudini tribuit. In *Europae australis humidis.* 24.

12. *J. balticus Deth.*; culmo nudo, stricto; paniculâ laterali trifidâ (?); petalis oblongis, acutis, capsulâ ovatâ brevioribus. *Willd. Berl. Mag.* 1809. p. 298. *J. aphyllus*; scapo laevi, viridi, rigidiusculo; anthelâ compositâ, patente; perianth. laciniis ovatis, mucronatis, capsulam ellipticam acutiusculam vix aequantibus. *Meyer Syn.* p. 15. n. 5. *Diss.* p. 35. *J. culm. crassiusculo, tereti*; panic. subcompositâ, erectâ, laxiusculâ; perig. foliolis lanceolatis: exterioribus acute mucronulatis; interioribus obtusiusculis subbrevioribus, capsulam ovoideo-ellipsoideam obsolete trigonam subaequantibus; stam. 6. *Laharpe* l. c. p. 114. α culmo crassiore; paniculâ compositâ, erectâ, longiusculâ (excl. syn. *J. arctici Smith*). *Hagen Chlor. borass.* p. 127. *Baer Bot. Zeit.* 1821. p. 404.

• (ubi jam 1818. p. 522. 1819. p. 564.) *Mert. et Koch Deutsch. Fl.* II. p. 576. *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 76. *Fries novit. Fl. suec.* II. p. 51. *J. inflexus Retz Scand.* 2. p. 79. *J. effusus Schumach. Saell.* n. 526. *J. glaucus Wahlenb. Lapp.* 79. n. 149. (excl. syn., se teste in *Fl. Carp.* n. 527.) *Svensk Bot.* 479. f. 5. *J. glaucus littoralis Wahlenb. Fl. suec.* 1. p. 209. *J. helodes Link Enum. h. berol.* 1. p. 305. *J. arcticus Hook. Scot.* (sec. *Laharpe*, qui fid. specim. in herb. cli *Gay*). β culmo tenui, stricto; paniculâ simplici, globosâ; floribus paucis. *Laharpe* l. c.

Radices filiformes. Culmi numerosi, cespitosi, teretes, acuti, pedâ. Squamae 4 vaginantes, obtusae ad basin culmi, exteriores sensim breviores. Panicula poll., 3-4 poll. ab apice. Bracteae ovato-lanceolatae, cuspidatae, membranaceae, vaginantes ad ramos; sub floribus 2 oppositae, membranaceae, ovatae, acutae. Petala 3 interiora parum breviora, margine membranacea. Caps. acuta petalis parum longior. *Willd.* *J. glauco* similis; sed primo intuitu distinguendus. Robustior attamen plerumque humilior; culmi, licet filiformes, basi crassiores, minus graciles, virides nec glauci, subinde torti, sicci apice tenuiter striati, medullâ continuâ nec cellulosâ; squamae vaginaeque luteo-fuscae; rami paniculae effusae floresque pauciores; hi majores. Cal. lacinae ovato-lanceolatae, interiores obtusae; capsulae duplo majores, obtusiores, castaneae nec atro fuscae. Differt a *J. diffuso*, *effuso* et *conglomerato* paniculâ rariore; cal. laciniis ovato-lanceolatis, mucronatis, capsulis duplo majoribus; a *J. diffuso* vaginis luteo-fuscis culmisque laevibus; a *J. effuso* panic. ramis erectis, bracteis castaneis; floribus hexandris; stylo evidentiori. *M. et Koch.* Caps. matura calycem quidquam superat *Meyer.* Habitu medius *J. compressum Humb.* inter et *J. arcticum*; differt a priori: culmo teretiuseculo; floribus in ramis terminalibus nec lateralibus, et patriâ; ab altero: panicula magis elongatâ plerumque compositâ; folio florali longiore, capsulis rotundatis; filamentis brevibus. Hinc forte *J. Haenkei Meyer*, cum *J. balticus* etiam in Terre neuve, et culmi compressi in Juncis nullius fere momenti. *Laharpe.* In littore arenoso totius *Baltici* et a *Lapponia ad Lusitaniam*; in *Terre-neuve. Lappylae.* 4.

15. *J. complanatus*; culmo aphylo, compresso, erecto; floribus subsessilibus, hexandris; laciniis calycinis acuminatis. *J. compressus Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth* III. p. 255. *J. aphyllus*; scapo compresso, laevi, rigidiusculo; anthelâ floribus subsecundis compositâ; perianthii laciniis lanceolatis: exterioribus acuminatis, interioribus acutis, capsulam triquetra-oblongam acutiusculam vix superantibus. *Meyer* in *Reliqu. Haenk. Fasc.* II. p. 141. *Syn. Luzul.* p. 27. *J.* paniculâ subcompositâ; perig. foliolis subaequalibus, lanceolatis, acutis, capsulam oblongo-ellipsoideam obtuse prismaticam subaequantibus?; stam. 6. *Laharpe* l. c. p. 114. β anthelâ subsimplici. *Meyer* l. c. *J. Haenkei Meyer Syn. Junc.* p. 10. n. 1. (se teste).

Rad. repens, teres, crassitie pennae gallinaceae, squamis nitidis, fuscis, vaginantibus. Culmi cespitosi, $1\frac{1}{2}$ ped., striati, glabri, apice subulati, basi vaginis 3 aphyllis, acutis, striatis, pallide fuscescentibus, glabris, nitidis, inaequalibus, exterioro brevissima, interiore $1-1\frac{1}{2}$ poll. Corymbus lateralis, aut pedunculi subterni, bifidi, 6-8 pollicibus infra apicem culmi erumpentes, $1\frac{1}{2}$ poll., striati, glabri, basi foliolis 2 subulatis. Flores subunilaterales, distantes. Bracteae ad basin pedicellorum solitariae, ovatae, acuminatae, glabrae, membranaceo-diaphanae, fuscescentes. Bracteae sub calyce 2, oppositae, subrotundae, acutae, concavae, diaphanae, fuscescentes, glabrae, calyce triplo breviores. Cal. laciniis lanceolatis, concavis, glabris, nitidis, medio nigro fuscescentibus, margine diaphanis, basin versus obsolete trinerviis; 5 exterioribus paullo majoribus. Stylus elongatus. Stigm. 3. Germ. oblongum, triquetrum? glabrum. *Kunth.* *J. baltico* valde affinis; sed floribus secundis fere ut in *J. bicorni Mich.* facilis distinctu. Culmi compressi, subinde torti. *Laharpe.* Medius *J. balticum* inter et *arcticum*. — β differt tantum scapo tenuiore debiliore anthelâque 4-8-florâ, erectiusculâ. Ab affini *J. baltico* differt: scapo evidenter compresso; perianthii laciniis paulo angustioribus: exterioribus acuminatis, nec mucronulatis; capsula perianthium nunquam superante. *Meyer.* Nomen mutandum fuit ob antiquissimum *J. compressum Jacq.* nunc a *Smith* restitutum. In frigidis et temperatis Nov. Hispaniae prope *Chapoltepec, S. Augustin de las Cuevas* etc.; β in *Nootka-Sund* vel *Portu Mulgraave.* *Haenke.* 4.

14. *J. patens Meyer*; aphyllus; scapo compresso, laevi, rigidiusculo; anthelâ patente, floribus subsecundis compositâ; perianthii laciniis ovato-lanceolatis: exterioribus longioribus cuspidatis, capsulam trigono-subglobosam obtusam superantibus. *Meyer* in *Reliqu. Haenk. Fasc. II. p. 141. Syn. Luzul. p. 28. Laharpe l. c. p. 120. J. compressus Meyer Syn. Junc. p. 16. n. 6. (se teste).*

Rhizoma densissime scapigerum. Scapi spitham., erecti, levissime striati, pallidi, pennâ corvi vix crassiores, basi vaginis inferne fuscis, superne stramineis, superioribus submucronatis. Anthela fere ut in *J. tenui*; floribus solitariis, subsessilibus in ramis recurvatis. Bractea spathacea, recta, 2 unc., compresso-teres, cuspidata, sed non pungens. Perianth. lacinae virescentes lineis 2 fuscis, acuminatae, fructiferae subpatentes, interiores breviores muticae. Stam. 6, perianthio duplo breviora; antherae filamentis aequales. Caps. mucronulata, viridis, apice fuscescens. Differt a *J. compresso H. et Bonpl. (complanato)* staturâ minore firmiore; floribus fructibusque minoribus; perianthii laciniis magis inaequalibus, capsulam alienae formae longius superantibus; staminibus perianthii dimidium vix aequantibus. *Meyer.* *J. pallido* proximus videtur clo. *Laharpe.* Prope *Mont Real.* *Haenke.* 4.

15. *J. vaginatus R. Brown*; culmo nudo, tereti, aphylo, basi vaginato; paniculâ pseudolaterali, subumbellatâ: umbellis decompositis; floribus aggregatis; capsulis ovalibus, obtusis, perianthium acutum aequantibus. *R. Brown Prodr. p. 258. Meyer Syn. p. 16. n. 7. J. panic. supradecompositâ, con-*

gestâ, multiflorâ; perig. foliolis aequalibus, lanceolatis, acutis, capsulâ ovoideâ vix brevioribus; stam. 6. *Laharpe* l. c. p. 116.

Giganteus, 2-6 ped.. Culmi basi vaginis magnis, obtusis, nitidis, fuscis. Panicula plus minus globulosa vel diffusa. Flores flavescens, irregulariter dispositi, *J. maritimo* quidquam similes. Caps. pallida, perig. foliolis arcte appressis paulo longior. Sem. numerosissima. *Laharpe* ad specimen a *Gaudichaud* lectum. *Circa Port Jackson.* 4.

16. *J. pallidus* *R. Brown*; culmo nudo, tereti; paniculâ pseudolaterali: ramis inaequalibus, divisis: ramulis congestis; floribus alternis, subimbricatis; capsulis ovalibus, perianthio acuto paulo longioribus. *R. Brown Prodr.* p. 258. *Meyer Syn.* p. 16. n. 8. *J.* paniculâ decompositâ, cymosâ, laxiusculâ; perig. foliolis aequalibus, lanceolatis, acutis, capsulam subsphaeroideam aequantibus; staminibus 5. *Laharpe* l. c. p. 119.

Culmi plures, cespitosi, stricti, aphylli, glabri, tenuiter striati, medullâ interrupta, pallidi, 10-18 poll., tenuiores quam in *J. glauco*; basi vaginis 2 obtusis: inferiore minore striatâ; superiore 1 poll., pallidior, apice laxiore et margine submembranaceo, minus striatâ. Culmi apex (vel bractea) paniculâ paulo vel duplo fere longior, teres, subulatus, erectus vel apice deflexus. Panicula 1 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ poll., erecta, sessilis; bractea interiore lanceolato-subulata, 3 fere lin.; rami valde inaequales? majores erecti, 2-poll., teretiusculi, ramulosi; minores $\frac{1}{2}$ poll., erecto-patentes, simplices; ramuli minores simplices congesti, majores dichotomi, omnes bracteis minutis. Flores brevissime pedicellati, secundi, rarius alterni, solitarii, basi bracteis 2 ovalis obtusiusculis albidis diaphanis membranaceis. Cal. lacinae aequales, oblongo-lanceolatae, acutae, glabrae, subnerves: interiores margine magis membranaceae, exteriores magis convexae, pallidae, vel dorso levissime purpurâ suffusae, lin., $\frac{1}{4}$ lin. latae. Stam. 5, calyce duplo breviora; antherae pallide flavae, longitudine filamentorum. Capsulae oblongae, triquetrae, obtusae, vel subinde cum apiculo brevi a stylo remanente, glabrae, nitidae, pallide fuscescens, 1 $\frac{1}{4}$ lin.. Semina minuta, oblonga, acuta, fuscescens. Ad Specimen Sieberian. *Laharpe* ad specim. Herb. *Delessert* et *Mus. Paris.* describit: culmum rigidissimum, glaucum, 6-10 poll.; folium florale paniculâ paulo longius, quidquam recurvum; flores pallidos, subimbricatos, sparsos; perig. foliola navicularia, capsulam fuscescens submuticam arcte includentia; stylum brevissimum; antheras filamenta superantes, perigonio paulo breviores; semina rotundata, laevia. An idem ac noster, cum *Laharpe* capsulas subsphaeroideas dicat, quae ovales vel oblongae, trigonae? *In ora meridionali Novae Hollandiae.* 4.

17. *J. pauciflorus* *R. Br.*; culmo tereti, filiformi, nudo, basi vaginato; paniculâ pseudo-laterali pauciflorâ; capsulis ovalibus, obtusis, perianthio acuto longioribus. *Brown Prodr.* p. 259. *Meyer Syn.* p. 17. n. 9. *J.* culmo stricto; paniculâ compositâ, laxâ; perigonii foliolis lineari-lanceolatis, aequali-

bus, acutissimis, capsulâ ovoideâ submuticâ paulo brevioribus; stam. 6. *Laharpe l. c. p. 118.*

Habitu structurâque partium medius *J. filiformem* inter et *glaucum*; a priori culmo rigido, duro, gracili; paniculâ magis multiflorâ laxiore, folio florali brevior; ab altero floribus pallidis, minus numerosis; capsulâ paulo brevior, antheris minimis, paniculae ramis capillaribus satis elongatis diversus. *J. pallidus* differt paniculâ, florum dispositione et staminibus 5; sic etiam *J. filiformis* et *setaceus*. *Laharpe* ad specim. in Herb. Mus. Paris. a *Gaudichaud* lectum. In *N. Hollandia* circa *P. Jackson*, in ora meridionali et in insula *van Diemen*. 4.

Obs. Huc vel ad *J. effusi* varietates nobis pertinere videtur *J. vaginatus* *Sieber Herb. nov. Holl.*, in quo: culmi cespitosi, stricti, glauci, teretes, nudi, tenuiter striati, floriferi sterilesve, medullâ interruptâ, 1½-2 ped., crassitie pennae corvi; vaginae 2 inaequales, arcte appressae, obtusae, rarius setaceo-aristatae: inferior fere poll., basi badia nitida, superne pallidior, striata; superior 3-poll., basi badia nitida, superne striata, flavescens, glabra. Culmi apex (vel bractea) paniculâ multoties longior, teres, subulatus, erectus, minus striatus, 5-7 poll. Panicula 1-2-poll., erectiuscula vel horizontaliter patens, sessilis; bractea interiore brevi, lineari-subulatâ, 3 circiter lin.; rami inaequales, graciles, filiformes, erecti, vel apice recurvi, glabri, 3-7: majores 1-2 poll., subumbellato-ramulosi; minores vix ½ poll., simplices. Flores brevissime pedicellati, alterni et subsecundi, numerosi, approximati et subimbricati vel rari, remoti, solitarii. Bractee ad basin ramorum lanceolato-subulatae, carinatae, obsolete nervosae, albiae, margine membranaceae, diaphanae, glabrae; ad basin pedicellorum, ovatae, acutae, carinatae, concavae, albiae, diaphanae, ½ lin.; ad basin florum 2 similes, sed minores latioresque. Cal. lacinae subaequales: exteriores paulo angustiores, lanceolatae, acutae, concavae, carinatae, subnerves; interiores minus acutae, margine magis membranaceae; omnes glabrae, pallidae, ½-¾ lin. Stam. 3, calyce ⅓ breviora; antherae filamenta subaequant. Capsulae ovatae et ovato-subglobosae, obtusae, vix angulosae, fere 3-loculares, nitidae, stramineo-fuscescentes, plerumque fere lin. et calyce longiores, rarius longitudine calycis. Semina ovata, acuta, fusca. *J. pauciflorus* a clo. *Laharpe* descriptus differt a nostro: staminibus 6 et calyc. foliolis acutissimis; de quibus tamen etiam cel. *R. Brown* silet.

18. **J. filiformis*; culmo nudo, filiformi, nutante; paniculâ subsimplici, corymbosâ, pauciflorâ, longissimo ab apice intervallo; bractea attenuato-acuminatâ; capsulâ subglobosâ. *Smith Engl. Fl.* II. p. 162. *Fl. Brit.* 377. *Engl. Bot.* t. 1775. *Spicil.* II. t. 5. *Linn. Spec.* 465. *Willd. Spec.* II. p. 207. *Bichenov Trans. Linn. Soc.* XII. 305. *Rostk. d. Junc.* p. 12. n. 7. (*J. subaphyllus*; culmo debili, pallido; corymbo suprafastigiato, subsimplici; perigonii laciniis lanceolatis, acutis, longitudine capsulae subglobosae, obtusae, pallidae. *Meyer Syn.* p. 17. n. 10. *Diss.* p. 56. *Syn. Luz.* p. 29. *J. folio florifero praelongo; paniculâ simplici, pauciflorâ; perigon. foliolis lanceolatis, aequalibus, acutis, capsulam ovoideam vix aequantibus; stam. 6. Laharpe l. c. p. 117.) Ehrh. Calam. 95. (Roth Germ. I. 159. II. 401. Enum. pl. germ. I. 2. p. 77. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 578. Wahlenb. Fl. p. 210). Dicks. Enc. 52. H. sicc. Fasc. 14. 16. (Allion Fl. Ped. II. p. 215. fid. specim. apud Bertol. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 164. Gaud. Agrost. helv. II. p. 215.) Leers Herb. t. 15. f. 4. Fl. Dan. t. 1207. (Römer Fl. Eur. F. 2. Host. Gram. III. t. 84. Svensk Bot. t. 479. f. 4. Sturm D. Fl. H. 36. n. 10.) Hall. Helv. n. 1313. Pluk. Phyt. t. 40. f.*

8. *Scheuchz. Agr. 347. t. 7. f. 11.* β . *pusillus*: culmo stricto, apice subinflexo; vaginis superioribus foliiferis; foliis subcanaliculatis. *Fries Nov. Fl. suec. p. 31.* *J. arcticus Lapeyr. Pyren. p. 193.* (fide *Meyer l. c. et Dec.*; sed monente contra *Lapeyrouse Suppl. d. l'Hist. arbr. d. Pyren. p. 49.*)

Rad. repens. Culmi circiter pedales, admodum tenues, plicatiles, laete virides, apice incurvi (basi squamis aliquot fusciscentibus, longius aristatis: intima subinde in verum folium abeunte). Panicula in medio fere culmi e flosculis 5-8 viridibus, ramis bifloris, basi bracteâ descriptâ. Cal. foliola obsolete nervosa. Stam. semper 6 (perianthio dimidio breviora. Stigmata rosea). Caps. longitudine calycis, tumida, mucrone exiguo. *Smith E. Fl.* Differt a similibus, *conglomerato* et *effuso*, quorum forma minor haberi posset: culmis multo gracilioribus plerumque minoribus; vaginâ summâ saepe foliiferâ non coloratâ, folio unciali aut longiore, inferioribus obtusis parum coloratis; corymbo subsimplici; floribus paucis multo majoribus; capsulis duplo majoribus, subglobosis; foliolis calycis parum brevioribus, mucronulo brevissimo. *De Schlechtend. Fl. berol. p. 197.* In herb. cli de *Martius* prostant specimina a clo. de *Vest* communicata omnino ad *J. filiformem* spectantia, in quibus stamina semper 3. In β culmi stricti crassiores, firmiores, at duplo triplove breviores, apice fere membranaceo subinflexo. Panicula 2-3-flora; calycis foliola subaequalia; capsulae mucronatae. *In uliginosis paludosis turfosis a Lapponia ad Siciliam, in Tauria et in America septentrionali in Terre neuve; β in palustribus maritimis Sueciae rarius.* 4.

Obs. *Juncus* culmo nudo nutante, paniculâ laterali *Gmel. Sib. 1. p. 71. n. 35* a plurimis huc citatus vix tamen hujus loci esse videtur, licet *Scheuchzer* et *Haller* citet. In planta *Gmelini* e *Kamtschatka*: rad. longe transverse repens, vix crassitie pennae anserinae, luteo-fusca, dura, fibris copiosis crassis et tenuibus. Culmi cubitales, inferius duri e fusco spadicei, nitentes, squamis aliquot ejusdem coloris striatis, superius molliores, virides, aliquanto crassiores, quam in praecedente (*J. conglomerato?*). Ad $\frac{1}{3}$ altitudinis panicula e pedunculis 6-9 compressis, latiusculis, $\frac{1}{2}$ unc. et minoribus, saepe simplicissimis unifloris, interdum 2-3 floris. Flosculi spadicei; petala 3 interiora minora et saturatiora. Glumae 2 mucronatae, longiusculae, basi spadiceae, mucronem versus albiae, nitentes. Involucrum paniculam superans $\frac{1}{2}$ ped. et ultra. In planta ad *Baicalem lacum* a *Stellero* lecta (*J. radice arundinea horizontaliter repente; calamo supra paniculam longius producto, acuto Stell. Fl. Irk.) involucrum longius.*

19. *J. setaceus Rostk.*; culmo foliisque corneis filiformibus, laevibus; anthelâ elongatâ simplici; bracteis floralibus ternis, perianthii laciniis interioribus obtusiusculis, capsulam obovatam mucronatam superantibus. *Meyer Syn. p. 18. n. 12.* (ic. ined.). *J. culmo striato; paniculâ subsimplici, laxâ; perigon. foliolis lanceolatis, acutis, exterioribus longioribus, capsulam ovoideo-ellipticam vix aequantibus; stam. 6.* *Laharpe l. c. p. 118.* *J. culmo nudo, filiformi, nutante; umbellâ laterali, compositâ, pauciflorâ; pedunculis multifloris; calyce subulato.* *Rostk. Junc. 13. t. 1. f. 2.* (minus bona, monente *Meyer*). *Pursh Sept. Am. 1. p. 256.* (*Rostkovii* diagnosi utente). *Mühlenb. Desc. uber. p. 204.* *Elliott. Sketch. 1. p. 404.* *Torrey Fl. n. et m. U. St. 1. p. 360.* *J.*

filiformis Mich. Fl. bor. Am. 1. p. 191. (fid. Torrey et Laharpe).

Foliis pluribus a *capillaceo* jam distinctus: Meyer. Culmi recti, ped., apice subulati, subinde inflexi. E medio culmi panicula parva (vix poll.), subumbellata, pedunculis 3-4, altero 1-floro, reliquis bis ter divisis, 2-8-floris. Braectae oblongae, fuscae, acutae. Cal. foliola lanceolata, subulata, subaequalia. Stam. corollâ duplo breviora. Rostk. Culmi 2 ped., teretes, fistulosi, stricti, mucrone arescentes. Folia radicalia fusca, spathacea, obtuse mucronata. Pedunculi umbellae 20-florae, 3-5-bracteati: braectae sub singulo flore 2 ovatae. Calycis spadicei foliola 5 majora marginata, subulata. Antherae 6 luteae. Stigmata calyce longiora. Caps. trigona, acuta, calyci aequalis, polysperma. Mühlenb. Rad. fibrosa, repens, cespitosa. Culmus profunde striatus, basi vaginatus. Pedunculi compressi. Cal. foliola exteriora capsulam aequantia. Styl. brevis. Stigmata filiformia, fusca. Torrey. Floribus rufescentibus *J. glauco* affinis; sed perigonio inaequali; capsulâ brevior et paniculâ pauciflorâ abunde diversus. Affinior *J. filiformi*, quocum confunditur a botanicis americanis; sed floribus coloratis, perigonio inaequali abunde diversus: Laharpe, qui sec. Herb. Richard cum? huc ducit *J. filiformem* Mich. bor. am. p. 191. Mirum, quod els. Meyer *J. setaceum* Pursh hic, cum Pursh eâdem omnino, quâ Rostkov, diagnosi et figurâ utatur, excludat, et hujus loco laudet *J. filiformem* Pursh, cum? licet. Torrey l. c. ad *J. setaceum* Rostk., Pursh, Mühlenb., Elliott sine dubio laudat *J. filiformem* Mich., cum? vero *J. filiformem* Pursh.. In demissis a Canada ad Virginiam; in Terre Neuve. 4.

Obs. Vix hujus est loci: *Juncus setaceus*; fol. filiformibus, setaceis, glabris; culmis parum foliosis, filiformibus; paniculâ pauciflorâ; cal. laciniis subulatis. Rafin. in Med. Repos. of New York T. V. p. 356. Desv. Journ. 1. p. 231. In Maryland prope Annapolin.

20. *J. Pylaei* Laharpe; culmo flaccido, striato, tereti; paniculâ glomerulatâ, vix compositâ; folio florali praelongo; perigonii foliolis lineari-lanceolatis: exterioribus longioribus, acutissime subulatis; interioribus mucronato-aristatis, capsulam subglobosam triquetram aequantibus; staminibus 3. De Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'hist. nat. T. III. p. 119.

J. setaceo proximus; sed diversus culmo crassiore magisque flaccido; perigonio subinaequali: foliolis acutioribus; staminibus 3; capsulâ brevior, trigonâ, triloculari. Culmus erectus, striatus (certe in sicco, an etiam in vivo?), 40-46 poll.. Panicula parum composita, laxiuscula, folio florali multo brevior, virescens; braectis linearibus, aristatis. Perig. foliola exteriora lineari-lanceolata, striata, apice subulata, acutissima, virescentia; interiora breviora, linearia, margine late membranacea, mucronato-aristata, pallescentia. Stam. perigonio paulo breviora; filamenta antheris longiora. Caps. apice subobtusa, trilocularis, fusca. Stylus brevissimus. Sem. pauca, ellipsoidea. Laharpe. In insula Saint-Pierre de Miquelon, prope Terre-Neuve. La Pylae. 4.

b. foliis caulinis teretibus enodulosis; floribus segregatis.

21. *J. multiflorus* Desf.; culmo inferne nodoso, folioso,

foliis teretibus, paniculâ terminali, elongatâ, erectâ; pedunculis inaequalibus, multifariam decompositis, fasciculatis. *Desf. Atl.* 1. p. 318. t. 91. *Poir. Enc. Suppl.* p. 157. *J. folio caulino subsolitario, tereti, enoduloso. Meyer Syn.* p. 19. n. 13. *J. paniculâ supradecompositâ, cymosâ; perig. foliolis aequalibus, subacutis, navicularibus, capsulam ellipsoideam aequantibus. Laharpe l. c. p. 122. Vivian. Fl. cors. p. 5. Guss. Fl. sic. I. p. 452. Sieber Herb. Aeg. J. subulatus; fol. subulatis, paniculis terminalibus; involucrio diphylo, subulato. Forsk. Aeg. p. 75. (sec. Delile; Meyer traxit ad acutum).*

Culmi firmi, teretes, 5 ped. et ultra, crassitie pennae anserinae, basi nodo uno alterove folioque unico vel altero tereti, striato, apice attenuato. Panicula saepe ped., densa, interrupta, basi bracteis 2 rigidis, subulatis, inaequalibus. Pedunculi numerosi angulati, striati, centrales brevissimi; singuli bracteolis 2 siccis inaequalibus, acutis. Flores parvi, similes illis *J. effusi*; laciniis calycis aequalibus, acutis, persistentibus. Caps. ovatae, parvae, fuscae, lucidae, subacuminatae, longitudine calycis. *Desf. et Poir.* Forte propriae sectionis. *Meyer.* Flores pedicellati. Staminibus in urceolum connatis, seminibus scobiformibus habituque *J. acuto* et *maritimo* proximus. *Laharpe.* In speciminibus nostris ex Aegypto et e Sicilia: radix repens, lignosa, fusca. Culmi 1-2 ped., rigidi, glauci, laeves, basi crassitie pennae anserinae, et vaginis 2 aphyllis, laxis, fusciscentibus: superiore 1½ poll. mucronatâ; inferiore ½ poll. obtusâ. Folia caulina 4-5, nec unicum tantum, stricta et subpungentia, glaucescentia, 2½-5 poll.; vaginae aretae, margine apice membranaceae, vix striatae; ligulâ brevi obtusâ integrâ. Panicula 1½-5 poll., stricta, decomposita: ramis inaequalibus teretiuseculis et subtrigonis, glabris. Involucrium diphyllum: foliola vaginantia, stricta, apice subulato foliiformi terminata, 6-8 lin. longa; bractee sub ramis lanceolatae, subulatae, carinatae, membranaceae, pallidae, 3 lin.; bracteolae sub ramulis duplo et triplo minores; bractee sub floribus 2, ovatae, acuminatae, subcarinatae, albidae, enerves, diaphanae, floribus 2-3 plo breviores. Flores in dichotomiis et in ramulis unilaterales subsessiles. Calycis foliola inaequalia: exteriora capsulam superantia, lanceolata, acuminata, carinata, valde obsolete 3-nervia, margine membranacea, pallida, dorso purpurâ suffusa, lin. longa vel paulo longiora; interiora breviora capsulam aequantia, ovato-lanceolata, acuminata, pallidiora, magis membranacea, vix lin. longa. Antherae 6, magnae, flavae. Capsula ovata, trigona, obtusiuscula cum mucrone brevi, longitudine calycis foliolorum internorum, vel paulo longior, fusca, lucida. *In paludibus ad mare mediterraneum Barbariae Desf., Syriae, Aegypti Sieber, Archipelagi, Siciliae Jan., Galliae meridionalis. Laharpe. 4.*

c. foliis caulinis teretibus, nodulosis; floribus aggregatis.

a. hexandri:

22. *J. punctorius Thunb.*; durus; folio caulino subsolitario, noduloso spathâque pungentibus; anthelâ compositâ; floribus dense capitatis; perianthio subaequali, capsulam subglo-

bosam superante. *Meyer Syn.* p. 20. n. 14. J. culmis unifoliatis, erectis, teretibus; fol. pungent.; paniculâ subsimplici; spicis multifloris approximatis, paucis, densis; perig. foliolis subaequal., lanceolatis, acutis, capsulam ellipsoideo-oblongam trigonam vix aequantibus. *Laharpe l. c.* p. 154. J. culmo nudo, tereti; fol. subulato; panic. compositâ coarctatâ. *Thunb. Prodr.* 66. *Flor. cap. ed. Schult.* p. 337. *Linn. Suppl.* p. 208. *Willd. Spec.* II. p. 210.

Culmus glaber, inanis, subtilissime striatus, erectus, 1½-2 ped. Folia nulla, nisi sub panicula florum 2 spathaeformia, quorum exterius teres, subulato-acutum, incurvum, paniculâ longius, palmare usque spithamaeum; interius simile, pollicare. Panicula decomposita. Bractee spathaeformes sub floribus, lanceolatae, acuminatae, carinatae. *Thunb.* Culmus laevis. Foliorum radicalium loco membranae duae. Folium caulinum unicum, culmo simile, sed longius paulo, strictum, mucronatum, pungens, intus articulatum. Panicula terminalis arcte glomerata in aliquot glomera e gluma exorta. Affinis *articulato*, sed robustior. *Linn. fil.* Differt a *J. Dombeyano*, quocum confusus fuit a *Lamarck*: foliis teretibus; capsulis longioribus, angustioribus magisque trigonis. *J. tricephalus* et varietates aliquot *J. lampocarpi* non differunt nisi foliis compressis. Flores fusciscentes. Sem. elliptica. *Laharpe. In Prom. b. spei.* 4.

Obs. „*J. punctorium Sprengel N. Entd.* II. p. 107. varietatem *acutiflori* esse voluit. At specimen Sprengelianum sub nomine *punctorii* communicatum a vero *J. punctorio* prorsus diversum est. Peculiaris speciei esse videtur, ad quam rite determinandam meliora specimina desiderantur.“ *Meyer l. c.*

23. *J. Dombeyanus La Harpe*; foliis culmeis nodulosis; anthelâ compositâ; capitulis subtergeminis, coadunatis; perianthii laciniis lanceolatis, acuminatis, capsulam trigono-obovata obtusam mucronulatam subunilocularem superantibus; staminibus 6 dimidio perianthio parum longioribus. *Meyer in Reliq. Haenk. Fasc.* II. p. 142. J. culmo foliisque erectis, compresso-teretibus; paniculâ subsimplici, densâ; spicis paucis, approximatis, 10-50-floris; perigonii foliolis aequalibus, lanceolatis, acutiusculis, capsulâ ovoideâ mucronatâ paulo longioribus. *Laharpe in Mem. d. l. Soc. d'Hist. nat. d. Paris.* III. p. 152. α; paniculâ laxiusculâ; spicis 2-3, pedicellatis, ceteris sessilibus. *Lah.* *J. punctorius Lam. Enc.* III. p. 269. (quoad specim. amer.) *J. rubens Lam. l. c.* p. 266.? (sec *Herb. Mus. par.*) non *Thunb.* β paniculâ densâ, spicis aggregatis. *Laharpe. J. densiflorus Meyer Syn. Luz.* p. 29. (non *Hunth*)?

Robustus. Culmus 1½ ped., basi foliis vestitus, superne nudus. Folia culmum subaequantia, in specim. Haenkeanis ex nimio forte prelo compressa, fere plana, nam spatha tenuior, teres. Anthela in specimine perfectiore e capitulis 3: terminali sessili, lateralibus in pedunculis angulosis, inflexis, subaequalibus, unc. longioribus; singula densa, magnitudine nucis Avellanae, evidenter tergemina et non globosa, sed irregularia. Bractea spathacea, anthelam aequans, ad medium usque vaginans, dum teres nodulosa; ca-

capitulorum bracteae lanceolatae, pellucidae; florales solitariae acuminatae. Perianth. lacinae aequales, fuscescentes, margine diaphano. Stam. $\frac{2}{3}$ perianthii aequantia; antherae filamentis paulo breviores. Caps. nigricans. Sem. sub lente apiculata et eleganter reticulata. *Meyer*. Culmus subuninodis, strictus, 4-8 poll.. Folia longiuscula, erecta, nodulosa, acuta, breviter vaginantia; nonnunquam basi rubicunda, striata. Panicula laxiuscula v. densa, folio florali vix brevior, rubescens; spicis 4-8 plus minus densis, sphaericis, non echinatis. Perig. foliola margine latiuscule membranacea, ex rubro fuscescentia, nervosa. Stam. 6 perigonio paulo breviora; filamentis antherâ longioribus. Caps. obtuse trigona, subunilocularis, fusca. Sem. numerosissima, ellipsoidea, utrinque attenuata. Differt a *J. punctorio* capsulâ ovoideâ, perigonio brevior, caulibus compressis. *Laharpe*. *Prope Lima Dombey, in Peruvia in Quebrada de Carte et L'Obrachillo, Haenke. 4.*

24. *J. rubens Lam.*; culmo nudo, basi vaginato; involucrio spathaceo, (suave rubente), multifloro, terminali. *Lam. Enc. III. p. 266. Willd. Spec. II. p. 209.*

Culmus $1\frac{1}{2}$ ped., teres, nudus, basi ad pollices 2-4 vaginatus squamis alternis, terminatus valvulis 2 rectis, pollicaribus, concavis, acutis, spathaceis, e quibus fasciculus spicularum pedicellatarum, rubentium, congestus, unilateralis. Spicula singula e floribus 2-3 inter totidem squamas acutas, longitudine florum. Flores non examinavi. *Lam.* Clo. *Meyer* dubia analysis; hinc, saltem quoad categoriam, secuti sumus *clm. Laharpe*, qui eundem, fid. herb. Mus. Paris., cum? ad varietatem a *J. Dombeyani* ducit. *Circa Montevideo. Commers.*

25. *J. Holoschoenus R. Br.*; culmo unifolio, tereti; folio involucrioque monophyllo articulatis, teretiusculis; cymâ terminali; capitulis multifloris hexandris; capsulis prismaticis, perianthium acutum aequantibus; seminibus striatis. *R. Brown prodr. Nov. Holl. p. 259. Meyer Syn. p. 20. n. 15.* *J.* culmo foliisque erectis, teretibus; paniculâ subsimplici, subnutante; spicis 5-20-floris, densis, distantibus; perig. foliolis aequalibus, lanceolatis, acutis, capsulâ oblongâ prismaticâ paulo brevioribus. *Laharpe l. c. p. 131.*

J. Fontanesii affinis et tantum paniculâ majore, spicis numerosioribus densioribusque, capsulâ oblongâ, angulis 3 prominentibus diversus. A *J. punctorio* differt: spicis remotioribus, pallidis, capsulis abrupte in mucronem attenuatis, foliis non pungentibus; a *tricephalo* et *Dombeyano*; foliis teretibus; paniculae ramis elongatis; spicis in apicibus ramorum sparsis, 15-20-floris. *Laharpe. In nov. Hollandia prope P. Jackson.*

26. *J. obtusiflorus Ehrh.*; foliis teretibus, articulatis; culmo dissepimentis interstincto; paniculâ supradecompositâ: ramis divaricatis, reflexis; calycis foliolis obtusis, longitudine capsulae. *Smith Engl. Fl. p. 176. Comp. 55. Engl. Bot. t. 2144. Ehrh. Calam. 76. Davies Trans. Linn. Soc. X. p. 13. Bichenov Trans. Linn. Soc. XII. p. 327.* (*J.* fol. culmeis dense nodulosis, strictis; anthelâ supradecompositâ, divaricatâ; *Syst. Vegetabil. Vol. VII.*

perianthii laciniis subaequalibus, obtusis, capsulam triquetro-ovatum acutam subaequantibus. *Meyer Syn.* p. 20. n. 16. J. culmo foliisque erectis, teretibus, crassiusculis; paniculâ supradecompositâ, divaricatâ; spicis 5-6-floris; perig. foliolis aequalibus, oblongis, subobtusis, capsulam ovoidem triquetram subaequantibus. *Laharpe l. c.* p. 129. *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 158. (excl. syn. *Bauh. et Moris.*) *Mert. et Koch Deutsch. Fl.* II. p. 585. *Roth Enum. pl. Germ.* I. 2. p. 78. *Fries Nov. Fl. suec.* p. 115. (sed non *halland.* fid. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 210.) *Svensk Bot.* t. 615. J. *articulatus* Lam. et *Dec. Fl. fr.* III. p. 169. α). J. *articulatus* β *Smith brit.* 379. (excl. omn. syn.) (*Lam. Enc.* III. p. 268.) J. *articulatus* γ *With.* 547. J. *retroflexus* *Raf. dan.* 1. p. 485. *Schumacher Saelt.* n. 552. J. *bifolius* *Hoppe Taschenb.* 1810. p. 165. (excl. synonym. aliqu.) J. *divergens* *Zitz et Koch palat.* p. 19. J. *Neesii* *Heller Wirceb. Suppl.* p. 27. (omnes β fide *Meyer*). J. *divaricatus* *Wolff* (in *Heller l. c.*) J. *aquaticus* *Seb. et Mauri Prodr. Fl. rom.* p. 152. n. 426. (excl. syn. fid. *Bertol.*) *Allion. Pedem.* n. 2089. (a *Pollini* ad *acutiflorum* ductus). *Fl. Dan.* t. 1097. J. *obtusatus* *Kitaib.* (in *Schult. Oest. Fl.* 1. p. 566.) *Hall. helv.* n. 1525. (excl. syn.) *Segu. Ver.* 3. 85. — β paniculis minus compositis, compactis. J. *congestus* *Nees* in *Heller l. c.* J. *compactus* *Nees* in *Herbariis.* γ paniculâ subsimplici; spicis sub 10-floris. J. *obtusiflorus* β *Laharpe l. c.* p. 129.

Major et gracilior J. *lampocarpo*. Rad. subrepens „(et valde repens, crassa, albida, sublignosa).“ Culmi (1-5 ped., glauco-virides) foliaque teretia, nec compressa: haec rigida (1-3 ped.), acuta, fere pungentia: utraque dissepimentis copiosis, extus non distinguendis, nisi in siccis, et tunc in foliis tantum, quorum non nisi duo in caule, nullum ad radicem. (Vaginae ad culmorum basin pallide fusciscentes, obtusae, rarius aristatae, 1½-4 poll.; foliorum vaginae laxiusculae, pallide virides, margine membranaceo pallide fusciscente in ligulam brevem bifidam obtusam producto.) Panicula ter quaterve subdivisa; ramis ultimis refractis. (Involverum foliis caulinis simile, sed multo minus, 1-3 poll., strictum, paniculâ brevius. Bracteolae fusciscentes, ovato-lanceolatae, acuminatae.) Capitula numerosa, sed parva, 4-5-flora. Calycis foliola elliptico-oblonga, concava, pallide fusca, margine lato, albo, membranaceo: interiora minora, saepius fere rosea. (Stam. calyce breviora.) Caps. rotundata, s. late obovata, triangularis, acuta, fusca, splendens (subtrilocularis). Semina (8-10) minuta, non tunicata. *Smith E. F.* Panicula dilutior; pedunculi crassiores quam in *acutifloro*; capsula gracilior. Firmior; culmus plerumque binodis. *Davies.* Tota panicula ante florescentiam albida. Variat paniculâ supradecompositâ et subsimplici, valde divaricatâ et compactâ. In uliginosis coenosis totius Europae ad *Baleares* usque inque *Siberia*. 4.

Obs. *Wahlenberg* in *Fl. lapp.* p. 81. n. 156 sub suo J. *articulato* J. *obtusiflorum* *Ehrh.* et *lampocarpo*, saltem quoad synonyma, commutavit. *Poll. Fl. veron.* p. 473. J. *sylvaticum* *Willd.* *Allion.* II. p. 217. et *Balb. et*

Nocc. ticin. I. p. 166. huc duxit, et commutavit, ut videtur, cum *acutifloro*.
Laharpe *J. obtusiflorum* *Poir.* excludit et cum? ad *J. ustulatum* (*fusco-*
atrum) citat.

27. *J. microcephalus* *Humb. et Bonpl.*; culmo foliato, tereti, erecto; foliis teretibus, articulatis, glabris; corymbo terminali involucrato; glomerulis sessilibus; laciniis calycinis acuminato-cuspidatis, subaequalibus, capsulâ obovatâ trigonâ obtusâ longioribus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth* III. p. 237. *J.* foliis caulinis nodulosis, striatis; anthelâ supradecompositâ, patente; perianthii laciniis subaequalibus, ovato-lanceolatis, acuminatis, capsulam obovatam obtusam superantibus. *Meyer Syn.* p. 21. n. 17. (*ic. ined.*) *J.* culmo foliisque erectis, compressis; paniculâ compositâ, erectâ, laxiusculâ; spicis 3-6-floris, pallidis; perig. foliolis aequalibus, lanceolatis, acutis, capsulâ ellipsoideâ retusâ longioribus. *Laharpe* l. c. p. 123. α . β *intermedius* *Meyer in litt.*; culmo altiore; foliis longioribus; corymbo composito, majori. *Mart. Fl. brasil. ined.* γ *major*. *J. microcephalus* β *Meyer et Laharpe* II. cc. *J. floribundus*, paniculâ terminali irregulariter ramosissimâ, involucrâtâ; reliquis uti supra. *Humb. et Bonpl.* l. c. δ *pusillus*; capitulis 2 subglomeratis tertioque pedunculato (fere ut in *J. capitato*) *Meyer in Reliqu. Haenk. Fasc. II.* p. 142.

Proximus *J. nodoso* *Rostk.*. Rad. repens. Culmi cespitosi, glabri, adjecto corymbo 8-10-poll. Folia subulata, culmo breviora. Vaginae striatae, glabrae, margine subdiaphanae. Corymbus simplex, subdichotomus, 2-4 poll. Involucrum 1-phyllum, corymbo quadruplo brevius, foliis simillimum. Flores capitato-congesti, glomerulis semiglobosis, distantibus, bracteâ oblongâ, acuminatâ, striatâ, fuscescente, magnitudine pisi minoris. Bractea unica ad basin cujuslibet floris, eoque duplo brevior, ovato-oblonga, cuspidata, tenuissime membranacea, diaphana: bractee sub calyce nullae. Calycis lacinae lanceolatae, fuscescentes, margine tenuissime membranaceae, albae, subaequales. Stam. 6. Caps. fusco-nigra, nitida. Semina minutissima, oblonga, utrinque acuta, fusca, eleganter striata. In β culmi 2-ped. striati, crassitie pennae gallinae. Folia culmo breviora, fere ped. Corymbus 4-poll.; rami 4 minores dichotomi, 2 majores iterum corymbiferi. Involucrum 14 lin. longum; bractee ad basin ramorum lanceolatae acuminatae, margine membranaceae, 4 lin. longae; bractee sub glomerulis ovatae, acuminatae, uninerves, subdiaphanae, glomerulo breviores, lin. longae; bractee sub floribus similes. Glomeruli magnitudine pisi minoris. Cal. lacinae lin. longae, carinatae, capsulam superantes. In γ culmi crassitie pennae anserinae, striati, adjectâ paniculâ 3-pedales. Folia culmo duplo breviora. Vaginae 2-4 poll. Panicula subpedalis; rami dichotomi, fasciculatim congesti, corymbos referentes. Involucrum 1 $\frac{1}{2}$ poll. acuminatum et plura ad basin ramorum similia. Glomeruli terminales, laterales et alares, magnitudine Pisi minoris. Bractea oblonga, acuminato-cuspidata, uninervis, glomerulo brevior; bractea simillima minor ad basin cujuslibet floris; bractee sub calyce nullae. Cal. lacinae fuscae. A *microcephalo* vix

diversus nisi staturâ multo majore et inflorescentiâ ramosiore. *Kunth.* α in temperatis Andium *Quinduensium*, γ in opacis humidis sylvarum *Orinocensium* juxta *Esmeraldam*; α , β et γ in provincia *Minas Geraes Brasiliae*, de *Martius*. δ in montanis *Peruviae*. *Haenke.* 4.

Obs. *J. dichotomus*; culmo folioso; foliis nodoso-articulatis, teretibus, paniculâ corymbosâ; capitulis multifloris; capsulis obovatis, mucronatis, corollâ brevioribus. *Reliqu.* *Willd. Mes.* fide de *Schlechtendal fl. in litt.* et fide *Meyer Syn. Luzul.* p. 30. tam ad α quam ad β pertinet.

28. *J. pelocarpus Meyer*; erectus? foliis caulinis nodulosis, teretibus; anthelâ subdivaricatâ; perianthii laciniis lanceolatis, obtusis: interioribus longioribus capsulâ triquetro-ovatâ mucronatâ subuniloculari brevioribus. *Meyer Syn. Luzul.* p. 30. *J. erectus*; culmo subunifolio, compresso; foliis setaceis, compressis, subenodulosis; paniculâ pyramidali, patente; spicis subbifloris; perig. foliolis oblongis, obtusis: interioribus paulo longioribus, capsulâ triquetro-ovatâ brevioribus. *Laharpe l. c.* p. 124. *J. lampocarpos var. Spreng. N. Entd.* II. p. 107. (excl. syn. *Elliott.*)

Satis differt tam a *J. lampocarpo*, quam a *paradoxo*, ejus habitum refert. *Meyer.* Rhizoma breve, tenue, squamis pallidis tectum, culmos paucos pectinatim emittens. Culmus singulus, erectus, tereti-compressus, tenuis, subuninodis, basi squamis obtusis fusciscentibus, vel purpurascens, 3-6 poll.. Folia radicalia plerumque abortiva; caulina 1-2, tereti compressa, obscure nodulosa, internodia subaequantia. Panicula quandoque secunda, laxa; ramis subverticillatis dichotomis, inferioribus longis, superioribus brevibus; folio florali paniculam non superante; floribus sparsis subbinatis axillaribus terminalibusque: plurimis abortivis v. viviparis et tunc elongatis; perfectis oblongis, parvis, virescentibus. Perig. foliola obtusiuscula margine latiuscule pellucida, interiora $\frac{1}{2}$ lin.. Stam. 6 perigonio vix breviora; antheris filamenta subaequantibus. Germen pyramidatum, triquetrum; stylo longiusculo. Caps. mucronata. Habitu *J. bufonio* quidquam similis. *Laharpe.* In *Massachusetts, in Terre Neuve. La Pylaie.* 4.

29. *J. scheuchzerioides Gaudich.*; culmo tereti, foliis filiformibus brevioribus; spicis subbinis, 3-5-floris; perigonii foliolis aequalibus, ovato-lanceolatis, mucronatis, capsulam subglobosam aequantibus. *Laharpe l. c.* p. 124. *Gaudich. in Ann. d. Sc. natur.* T. V. p. 100.

Rhizoma longum, rubescens, articulis longiusculis. Culmus brevissimus (1-2 poll.) foliis vaginisque plurimis basi vestitus iisdemque inclusus, circa basin tantum nodosus. Folia late vaginantia, culmum superantia, acuta, diaphragmatibus plurimis. Spicae 1-2 terminales, bibracteatae; bracteis inaequalibus: exteriore longiore, floribus atrofuscis. Stam. 6, perigonio vix breviora; antheris filamentis longioribus. Caps. obtuse trigona, mucronata, fusca, vix 1-locularis, perigonium aequans. Sem. pauca, ovoida, villosiuscula. Speciminibus minoribus *SCHEUCHZEBIAE* similis, *J. biglumi* et *J. Jacquini* vix affinis. *Laharpe.* In *Maluinis ad rivulos stagnaque.* 4.

30. *J. inconspicuus Gaudich.*; culmo brevissimo, dense

cespitoso; flore solitario, terminali, vix pedunculato; basi glumâ bifidâ, scariosâ, subaequali; perianthii foliolis aequalibus, acutis; capsulâ ovatâ, mediocri; foliis minutis, canaliculatis, distichis, culmum vaginantibus, florem longe superantibus. *Gaudich. in Ann. d. l. Soc. linn. d. Par. 1826. p. 603.*

Vix pollicaris. Culmi dense cespitosi. Flos magnus. Rhizoma longum, flexuosum, albescens. An varietas *J. scheuchzerioidis*?

Gaud. In insulis Maluinis. 4.

31. *J. fusco-ater Schreb.*; erectus; foliis culmeis teretibus, compressis, nodulosis; corymbo suprafastigiato, erecto; perigonii laciniis subaequalibus, obtusis, capsulâ (triquetro-) ellipticâ obtusâ mucronulatâ brevioribus. *Meyer Syn. p. 22. n. 18. Schreb. apud Schweig. et Körte Fl. Erl. p. 149. Mert. et Koch Deutschl. Fl. II. p. 586. Roth Enum. pl. germ. I. 2. p. 79. De Schlechtend. Fl. berol. p. 179., (quo teste: *J. articulatus Willd. Prodr. n. 391.?* (ex parte) *J. sylvaticus Kunth berol. p. 96. (ex parte). J. sylvaticus β Hartm. Vet. Ac. Handl. 1814. p. 97. (fid. Wahlenb.) J. acutiflorus α Gaud. Agr. helv. p. 222. (fid. Meyer, β fid. Laharpe.)**

J. ustulatus; culmo tereti, stricto, foliato; foliis valvatis, compressiusculis, substriatis, subcanaliculatis; paniculâ erectâ, elongatâ, simpliciusculâ; capitulis semiglobosis, multifloris; perigonii foliolis ovalibus, obtusissimis, capsulâ nitidâ triquetro-oblongâ, obtusâ, mucronatâ brevioribus. *Hoppe Anl. Graes. z. trockn. n. 15. J. culmo erecto foliisque subteretibus; paniculâ plus minusve compositâ, erectâ; spicis 3-5-floris; perig. foliolis aequalibus, oblongis, exterioribus mucronulatis: interioribus obtusis, capsulâ oblongâ obtuse triquetrâ paulo brevioribus. Laharpe l. c. p. 126. J. alpinus Schrank baier. Fl. n. 557. (cum? Meyer). Reichenb. in Mössl. Handb. p. 584. J. nodulosus Wahlenb. Fl. suec. p. 211. (excl. syn. Fries nov. Fl. suec. sec Wahlenb. l. c. p. 1054.)*

J. subnodulosus Hopp. Taschenb. 1801. p. 231.? *J. articulatus β Fries Novit. Fl. suec. II. p. 22. J. rariflorus Hartm. Scand. Fl. p. 141. J. dubius Wolff in Herb. Schreb. J. intermedius Poir. Enc. meth. Suppl. III. p. 158. var alpina. J. erectus Besser Prim. Fl. gal. n. 419. (fid. specim.). Scheuchz. Agr. 393. Hall. Helv. 1321. (fid. Laharpe).*

β minor, anthelâ subsimplici. Meyer et Laharpe II. cc. et hoc test: J. alpinus, humilis; fol. artic., paniculam simplicissimam subaequantibus; capitulo laterali terminalique subpedunculato. Vill. Delph. 2. p. 233. (ergo et Pers. Syn. I. p. 384.)

J. culmo erecto; fol. subarticulatis; paniculâ simplici; calyc. foliolis subaristatis, aequalibus, nitidulis. Decand. Syn. p. 152. Fl. fr. III. p. 170. J. articulatus β Willd. Spec. II. p. 211. J. articulatus γ Lapeyr. Abr. Pyr. p. 194.

Hall. Helv. n. 1521. Scheuchz. Gram. 355. (ab ill. Smith ad lampocarpum ductus). J. geniculatus Schrank baier. Fl. n. 559. (cum? Meyer). J. alpestris Hartm. Fl. scand. 141.

Rhizoma transversum, repens, sublignosum, pallide fuscum; fibris numerosis albidis. Culmi erecti, rigidiusculi, teretes, graciliores quam in *obtusifloro*, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ped., crassitie pennae corvi et paulo ultra. Folia caulina plerumque 3, erecta, subcompressa, subulata, intense vel fuscescenti-viridia, $1\frac{1}{2}$ - 6 poll. Vaginae longae, superne laxae, striatae, margine membranaceae, apice ligula brevi rotundata subemarginata, albidâ, diaphanâ; infimae laxae, striatae, aphyllae, basi purpurascens. Corymbus compositus, elongatus; 1 - 6 poll.; rami ramulique erecti, rigiduli, teretes, variae longitudinis, nunquam refracti, rarissime quidquam patentes. Involucrum monophyllum, corymbo brevius, foliis simile; bractee ad ramos ramulosque lanceolatae, acuminatae, carinatae, inferiores evidentius striatae, fuscae, margine membranaceae; sub capitulis ovato-lanceolatae, acutae, fuscae, nitidae, capitulis paulo breviores. Capitula terminalia, subinde supraposita, ovata, quasi truncata, subgloboseque; floribus 2 - 8 minoribus quam in *obtusifloro* et *lampocarpo*, atro-fuscis. Cal. foliola oblonga: exteriora paulo longiora magisque concava; interiora obtusiora margine apice latius membranaceo. Stam. calyce $\frac{1}{3}$ breviora; antherae parvae filamentis breviores. Caps. trigono-ovata, calyce $\frac{1}{3}$ longior, atro-fusca, nitida, ad medium usque trilocularis. Sem. minima, fusca, utrinque acutiuscula. In β , quod facillime commutatur cum speciminibus imperfectis *J. lampocarpi*: culmi 4-10 poll., nodis remotioribus magisque obsoletis; panicula simplicissima subumbellata e ramis 2 - 4; capitula minora 2 - 5 flora; flores intensius adhuc colorati; cal. foliola acutiora. *J. rariflorus Hartm.* habitu β potius refert; sed flores pallidiores et calyces obtusiores; folia etiam tenuiora minusque erecta. In graminosis udis et ad margines paludum totius Europae a Lapponia ad Siciliam; in America boreali; β in alpinis. 4.

Obs. *Wahlenberg* in *Fl. ups.* p. 114. ad *J. nodulosum* traxit: *J. subnodulosum Hoppe Taschenb.* 1801 p. 231. et *J. obtusiflorum Gaud*; de utraque vero silet in *Fl. succica. Laharpe* cum? huc trahit *J. obtusiflorum Poir.* et *J. polycephalum Hook (multicapitatum)*.

52. *J. multicapitatus*; foliis articulatis, teretibus, subulatis; panicula erecta, bis ter dichotoma, ramis subsimplicibus; capitulis multifloris; calycis foliolis lanceolatis, acutis, capsula elliptico-ovata obtusiuscula brevioribus. *J. polycephalus Smith Engl. Fl. p. 177. Don MS. Hook Scot. 109.*

Ramificationes paniculae simplices. Capitula rara, magna, floribus 5 - 8 patentibus in pedunculo brevi *Hook.* Calyce acuto excepto quadrat cum *ustulato Hoppe*; at specimina nulla vidi. *Smith.* Nomen mutandum erat, cum sit antiquissimus *polycephalus Mich.* A clo. *Laharpe* cum? ducitur ad *J. ustulatum (fuscoatrum)*. In alpibus Scotiae. 4.

55. *J. anceps Laharpe*; culmo erecto, basi subancipiti, apice tereti; foliis subancipitibus; vaginis dorso carinatis; panicula decomposita, erecta; spicis 4 - 6 - floris; perigonii foliolis subaequalibus, exterioribus acute mucronatis: interioribus obtusis, capsula oideo-ellipsoidea triquetra rostrata

vix brevioribus. *de Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'hist. nat. T. III. p. 126.*

J. ustulato et acutifloro affinis; perigonium fere *J. ustulati*, capsula *J. acutiflori*, sed paulo brevior; ab utroque diversus culmo foliisque compressis, angulis 2 plus minus prominentibus. Rhizoma tortuosum, squamis crebris vestitum, culmos pectinatim emittens. Culmus singulus erectus, 2-3-foliatus, basi compressus, subanceps, apice teres, 10-20 poll.. Folia tereti-compressa, leviter ancipitia, diaphragmatibus crebris, subacuta; vaginis dorso carinatis. Panicula decomposita supradecompositave, erecta, pyramidalis v. secunda, folium florale superans; spicis numerosis, subapproximatis, parvis; floribus oblongis, fusciscentibus. Perigonii foliola oblongo-lanceolata; exteriora submucronata; interiora obtusissima vix breviora. Stam. 6, perigonio paulo breviora; antheris filamentis longioribus. Capsula subovoidea, semitrilocularis, perigonium paulo superans, fusca. Sem. pauca, ooidea. *Laharpe. In Gallia, prope Le Mans, Montpellier, Bayonne. 4.*

34. *J. lampocarpus Ehrh.*; foliis articulatis, compressis; paniculâ erectâ, compositâ, dichotomâ; calycis foliolis interioribus marginatis; capsulâ ovatâ, coloratâ, nitidâ, calycem excedente. *Smith Engl. Fl. II. p. 175. Comp. p. 55. Engl. Bot. t. 2143. Ehrh. Calam. n. 126. Davies Trans. Linn. Soc. X. p. 13. Bichen. ibid. T. XII. p. 325. (J. adscendens; fol. culmeis nodulosis, tereti-compressis; anthelâ subpatente; cal. laciniis subaequalibus lanceolatis: exterioribus acutis, interioribus obtusis, capsulâ triquetro-ovatâ acutâ mucronatâ brevioribus. Meyer Syn. n. 19. p. 23. J. culmo basi adscendente foliisque compressis; paniculâ subcompositâ divaricatâ; spicis 4-10-floris; perigonii foliolis aequalibus lanceolatis, exterioribus mucronulatis: interioribus obtusiusculis, capsulâ triquetra oblongo-lanceolatâ brevioribus. Laharpe l. c. p. 125.) Hook. Scot. 109. (Hoppe Anl. Graes. z. trock. n. 14. Mert. et Koch Deutsch. Fl. II. p. 587. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 80. Fl. Bat. V. mala, monente van Hall Fl. belg. p. 286. J. lampadocarpus Davies Welsh. Bot. p. 34.) J. articulatus Linn. Spec. α β 465. Willd. Spec. II. p. 211. α (excl. pl. syn.). (Lam. Enc. III. p. 268. Willd. Enum. h. berol. p. 391. J. articulatus γ Willd. Prodr. n. 291. Rostk. d. Junc. p. 41. n. 36.) Smith Fl. brit. α . p. 379. Huds. α 149. With. var. 1. p. 347. Leers 88. α t. 13. f. 6. (Schränk Fl. bav. 1. p. 615. (fid. Hoppe). M. a Bieberst. Fl. Taur. cauc. Suppl. p. 275. Wahlenb. Fl. suec. p. 211. quo teste cum? Fl. Dan. t. 1097.) J. compressus Relh. ed. I. 142. Sibth. 114. (J. aquaticus Roth Germ. 1. p. 155. II. p. 403. (fide specim.) Brotero Fl. Lusit. p. 517. J. obtusiflorus Mönch Method. p. 240. (fid. Meyer). J. foliosus Hoppe Taschenb. 1810. p. 159. (se teste). J. acutiflorus β Gaud. Agr. II. p. 223. (acutiflorus α Gaud. sec. Lah.) J.*

acutiflorus α et ε *Hartm. Scand.* 142. (teste *Fries*). *Hoffm. Germ.* p. 125. (fid. *Roth*). *J. sylvaticus* β *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 159. (fid. *Laharpe*). *J. adscendens* *Host Gram.* t. 87. *Fl. aust.* 1. p. 80. (excl. syn. *J. obtusiflori* *Engl. Bot.*) *Hall. Helv.* n. 1322. *J. ramulosus* *Gesn. Fasc.* 10. t. 4. f. 12. *J. fol. caps. triangulis.* *Bauh. Hist.* 11. 521. f. *Arundo minima* *Dalech.* 1001. f. *Gr. junc. fol. art. aquat.* *Bauh. Prodr. ff. Theatr.* 76. f. 77 f. *Scheuchz. Agr.* 331. 333. *Gr. junc. artic. pal. humilius, utriculis frequenter donatum.* *Moris. hist.* III. 227. s. 8. t. 9. f. 2. (ergo etiam *J. sylvaticus* β *Willd. Spec.* II. p. 212.) *Gr. aq. alterum.* *Lobel. ic.* 12. f. β culmo suberecto; anthelâ magis compositâ. *Meyer l. c.* γ spicis paucis, multifloris, densis; culmo foliisque duris. *Laharpe l. c.* δ. *Laharpe l. c.* *J. sylvaticus* *Desv. in Herb. Gay.* ε culmo suberecto; anthelâ minus compositâ. *J. lamp.* γ *Meyer l. c.* β *Lah.* *J. affinis* *Gaud. helv.* II. p. 224. fid. *Gaud. in herb. Steudel.* *J. alpinus* *Suter Fl. helv.* 1. p. 208. ζ caule decumbente radicante. *J. lamp.* δ *Meyer l. c.* ε *Laharpe l. c.* et hoc teste: *J. repens* *Requ. Vaubl.* 2. p. 253. *Lam. et Dec. Fl. fr.* V. p. 308. (a *Meyer ad uliginosum* γ ductus). η caule fluitante. *J. lamp.* ε *Meyer et Roth* (quo teste: *J. stolonifer* *Wohltleb. Suppl. ad fl. hal.* p. 12. c. fig.) *J. fluitans* *de Vest.* θ viviparus. *Wallr. Sched. crit.* p. 147. *J. articulatus* var. *utriculosa* *Hoffm. Chabr. Stirp.* 196. f. 6. *J. lampocarpus* ζ *Laharpe.* *J. utriculosus* *Autor.* ι giganteus. *J. lampocarp.* η *Laharpe.*

Rad. repens (albida). Culmi erecti aut adscendentes (vel decumbentes), $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ped., fistulosi, dissepimentis inferne tantum paucis nodisque 2, 3, 4, basi praecipue foliosi (et vaginis fuscis). Folia dissepimentis numerosis, apice parum recurva (tereti-compressa, supra basia canaliculata, viridia, erecta, cum vaginis 2-7 poll.). Vaginae laxiusculae, glaucescenti-virides, striatae, margine membranaceo; ligulis bifidis oblongis obtusis, subdiaphanis, $\frac{1}{4}$ -1 lin. longis. Involuerum paniculâ duplo brevius). Panicula magis, quam in *acutifloro*, erecta, ramis fortibus, elongatis, unde capitula florum magis elongata, sibi superimposita (2-12 flora), paucioribus in dichotomia. Flores capsulaeque majores: bracteae fere eadem. Calycis foliola lanceolata, acuta: 5 interiora obtusiora, obscurius fusca, margine albido membranaceo magis distincto. Caps. magna (calyce $\frac{1}{3}$ longior), rubro-fusca, quasi polita, ovata v. elliptico-oblonga, triangularis, mucrone obtuso. Semina parva (ovata), non tunicata. *Smith E. F.* Culmi interdum vivipari (*J. sylvaticus* β *utriculosus* *Pers. Syn.* p. 581) in hac specie, quod non in aliis monente *Smith*, qui tempestati pluviosae hoc attribuit: ex larva *LIVIAE Juncorum* *Latr. petit de Schlechtend Fl. berol.* p. 198 (qui interea, uti *Roth*, radicem saepius potius cespitosam quam repentem, et corymbum valde patulum, notat, quod etiam nos saepius observavimus). Ad ε fid. specim. et adnot. ab ipso r. *Gaudin in Herb.*

Steudel pertinet *J. affinis* *Gaud.*, qui in *Meyer* ad *J. uliginosum* β trahitur, ad quem certe non spectat. In planta *Gaudini*: rad. valde repens; culmi $1\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ poll., erecti, foliosi; folia culmum aequantia vel superantia, vaginis laxis; capitula pauci-vel multiflora, solitaria vel unum supra alterum, vel plura in panicula paupere; cal. foliola subaequalia, purpurascenti-fusca, exteriora acuta, interiora obtusiuscula margine membranaceo albido; stam. 6, calyce duplo fere breviora; caps. ovato-trigonae, mucronatae, calyce longiores, atro-fuscae. Valde affinis *J. fuscoatro* β (*J. alpino* *Vill.*), quocum ab aliquibus conjungitur. In *J. repente* apud *Decandolle*: culmi longi, repentis, ramis non ex axillis foliorum, sed foliis ex axillis ramorum; folia teretia, nodosa, minora quam in *J. sylvatico*; flores pauci in panicula decomposita, albidii, in fasciculis parvis; perianth. lacinae acutae, subaequales. η varietas est insignis, quam *ill. de Vest in litt. ad clm. de Martius* sequentibus specie distinguit: „*J. fluitans*: culmo folioso, fluitante, radicante; fol. nodoso-articulatis, septis numerosis; florum fasciculis subbinis, erectis: altero longius pedunculato; glumis mucronatis.“ In pratis et pascuis aquosis humidis *Europae*, *Tauriae*, *Siberiae*; β in solo lutoso ex alluvionibus; γ in montibus et depressis sterilibus; δ et ϵ in uliginosis rarissime. 4.

Obs. Synonyma *J. lampocarpo* adscripta in *Spreng. N. Entd.* II. p. 107. omnia delenda, cum non in America occurrat *lampocarpos*, *Meyer* l. c. p. 24.

Cls. *Steudel* *J. aquaticum* *Roth* tanquam speciem propriam exhibuit, atque eidem, praeter adscendentem *Host* et articulatum α *Linn.* (qui omnino iidem cum *aquatico*), jungit *J. obtusiflorum* *Ehrh.* et *bifolium* *Hopp.*, excludit vero *foliosum* *Hoppe*. *Host* in *Fl. austr.* p. 448. non admisit *lampocarpon*, sed *J. adscendentem* retinuit, cujus descriptio omnino in *J. lampocarpo*, minime vero in *obtusiflorum* quadrat, quamvis ad eundem *J. obtusiflorum* *Engl. Bot.* 2144 laudasset. *Roth* ad varietatem η caule fluitante ob stam. 6, nec 3, laudat *J. stoloniferum* *Wohleb.*, a *clm. Meyer* ad *J. uliginosum* ductum. *Linn.* in *Mant.* p. 368. monuit: „utrum *J. articulati* α *aquaticus* sit a γ *sylvatico* vere specie divisus, aut a solo natali mutatus, ulterius inquirendum.“

35. *J. heterophyllus* *Duf.*; culmo basi repente, adscendente; foliis immersis elongatis, filiformi-setaceis, tenuissime articulatis: emersis teretibus, nodosis, basi vaginantibus; paniculae pedicellis erectis, rigidis; floribus semi-verticillatis; perigonii lobis acutis, fuscis, capsulâ longioribus. *Dufour* in *Ann. d. scienc. natur.* T. V. p. 88.

J. articulato proximus, sed diversus. Folia immersa hyeme tantum prostant formâ filorum numerosorum, confervas simulantium, natantium, 3-4-poll., tenuissime nodulosorum. Folia in culmo florifero crassiora quam in *J. articulato*, nodulis magis remotis. Panicula minus composita quam in *J. articulato*. *Dufour*. An *J. uliginosi* vel *lampocarpi* forte varietas? In aquaticis prope *Saint-Sever* (*Dep. des Landes*) et in *Corsica*. 4.

36. *J. Richardsonianns*; foliis subulatis, nodoso-articulatis; capitulis subpaniculatis, paucifloris (3-5-floris); capsulis ovalibus, calyce obtuso hexandro longioribus. *J. affinis* *Brown* *Mss.* in *Richardson App. Frankl. Journ.* p. 11. Nomen mutandum erat ob antiquiorem *J. affinem* *Gaudin.* In *sylvis Americae arcticae*. *Richards*.

37. *J. tricephalus* *Gay.*; culmo erecto foliisque teretibus compressis; paniculâ simplici, subtristachyâ; spicis multiflo-

ris; perigonii foliolis aequalibus: interioribus obtusiusculis, capsulâ oblongo-lanceolatâ subbrevioribus. *de Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d. Hist. nat. T. III. p. 132. et hoc teste cum? J. macrocephalus*; culmo folioso; fol. articulatis; florum capitulis terminalibus, densis, pedunculatis sessilibusque; capsulis acutis calycem superantibus. *Viv. cors. spec. p. 5. J. trichocephalus Recens. Laharp. in Bull. d. Sc. nat. 1828. Jan.*

Species dubia, *J. lampocarpo* affinis et tantum culmo erecto, capitulis plerumque ternis diversa. Culmus 2-3-foliatus, 6-8 poll.. Folia erecta, nodulosa, subacuta. Flores subcapitati in spicas 3 aggregati, folio florali eosdem excedente. Perig. foliola lanceolato-lineararia, exteriora submucronata, interiora obtusiuscula, fuscescentia, subnervosa. Stam. 6, perigonio paulo breviora; antheris filamenta aequantibus. Caps. mucronata, prismatica, fuscescens, subunilocularis. Sem. ovoidico-oblonga, utrinque attenuata, numerosa. *Laharpe. In Corsica, Calabria. Thomas. 4.*

*Obs. Juncus macrocephalus Viviani Flor. cors. Diag. p. 5 etiam elo. Bertoloni ignotus. Species propria vero illi in litt. est: J. Thomasii Tenore Append. in ind. Sem. 1827, quem sequentibus definit et describit: „J. umbellâ abbreviatâ, subdecompositâ; floribus dense capitatis; capsulis obtusis, mucronulatis, perigonio acuminato subaequalibus; foliis articulatis. Caulis foliosus, striatus, circiter 2 ped.. Folia tereti-compressa, acuminata, noduloso-articulata. Umbella brevis, simplex vel subdecomposita. Flores parvi, numerosissimi, atrorubentes praecipue in fructu, densissime capitati in apice radiorum. Sepala lanceolata, angusta, acuminata, longitudine capsulae oblongae, obtusae cum mucronulo. In Calabria. 4.“ Vix a *J. tricephalo* Gay supra a *Laharpe* exhibito differre videtur, licet descriptio haud paucis abludat.*

38. *J. acutiflorus Ehrh.*; foliis nodoso-articulatis, subcompressis; paniculâ decompositâ, dichotomâ; calycis foliolis setaceo-acuminatis, capsulâ attenuato-rostratâ brevioribus. *Smith Engl. Fl. II. p. 174. Ehrh. Calam. 66. Davies Trans. Linn. Soc. X. p. 15. Engl. Bot. XXX. p. 2143. (ad calcem). Bicheno Trans. Linn. Soc. XII. p. 525. (J. fol. caulinis remotis, nodulosis, tereti-compressis, strictis; corymbo suprafastigiato, supradecomposito; perig. laciniis acuminatis: interioribus sublongioribus, capsulâ triquetrâ acuminato-rostratâ brevioribus. Meyer Syn. p. 24. n. 20. J. culmo foliisque erectis, vix compressis; paniculâ supradecompositâ pyramidali; spicis 8-10-floris, approximatis, numerosis; perig. foliolis inaequalibus, lineari-lanceolatis, acutissimis: interioribus longioribus, capsulâ pyramidatâ acutâ v. acute rostratâ brevioribus. Laharpe l. c. p. 127.) Hook. Scot. 109. (Mert. et Koch Deutsch. Fl. II. p. 588. Roth Enum. pl. germ. I. 2. p. 82. Fries nov. Fl. suec. p. 115. J. acutiflorus ß Hartm. Scand. p. 142. J. sylvaticus Willd. Spec. II. p. 211. (excl. pl. syn.) Roth Germ. I. p. 155. II. 405. Rostk. d. Junc. p. 40. n. 55. Willd. Enum. H. Berol. p. 591. Pursh Fl. sept. Am. I. p. 257. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 169. a. All. Ped. n. 2088.? Balb. Fl. Lyon. I. p. 742. Gaud. Agr. helv. II. p. 221. Brotero Fl. lus. p. 517. (a*

Meyer ad *J. obtusiflorum*). *Sebast. et Maur. Prodr.* p. 132. *Wahlenb. suec.* p. 211. *Fl. Lapp.* p. 82. (excl. syn. aliq.) *Host. Gram.* III. t. 86.) *J. articulatus Engl. Bot.* t. 238. *Relh.* 143. (*Savi Fl. pis.* 1. p. 362. fid. *Bertol.* *J. articulatus Willd. Prodr.* n. 391. (excl. γ .) *J. articulatus β Smith Fl. brit.* 379. (*Lam. Enc.* III. p. 268. *J. articulatus γ Leers Herb.* 265. fid. *Laharpe*.) *J. nemorosus Sibth. Ox.* 114. (*J. pratensis Wolff* in herb. *Schreb.* *J. spadicus Schreb.* in *Schweig. et Hörte Fl. Erl.* p. 148. *J. nigricans Schreb. ibid.* *J. niger Wolff.* in herb. *Schreb.* *J. atratus Besser galic.* n. 418. *J. subnodulosus Schrank bayr. Fl.* 1. p. 616. (fid. *Meyer*). *J. schoenoides Mer. Fl. par.* (sec. *Laharpe* nil nisi specim. juniora.) *J. micranthus Desv. Obs. pl. ang.* p. 82. (fid. *Lah.* ad herb. *Gay*). *J. aquaticus All. ped.* 11. n. 72. (fid. *Poll. Fl. veron.* p. 472, ubi vero *J. adscendens Host* excludendus. *J. acutiflorus α microcephalus Reichenb. Mössl. Handb.* p. 585.) *Bauh. Theat.* 75. f. 76. *Moris. Sect.* 8. t. 9. f. 1. *Gr. junc. sylv.* *Ger. Em.* 22. f. (*Scheuchz. Agr.* p. 354. t. 331. sec. *Lah.*) β . capitulis magnis densifloris; capsulis brevius rostratis. *Meyer* l. c. quo teste: *J. acutifl. β multiflorus Weihe Gr.* n. 91. *J. intermedius Rhode* (fid. *Herb. Mertens.*) *J. brevirostris Nees ab Esenb. Bluff et Fingerh. Comp.* I. p. 432. γ . pallidior, anthelâ laxiore; cal. foliolis viridibus. *Meyer* l. c. *J. acutif. δ exoletus Reichenb.* in *Mössl. Handb.* p. 585. δ . capitulis plurimis densissime congestis; caps. brevius rostratis; culmo elato. *J. sylvat. multiflorus Rochel Pfl. Umr.* 1. *Lief.* t. 1. n. 2. (ined.) *J. lampocarpos Baumg.* (fid. *Rochel*). ϵ . minor; spicis paucis, 15-20-floris; paniculâ simplicî. *J. acutiflorus β Laharpe* ad *Herb. Gay*. ζ . *repens*, culmo radicante. *J. acutiflorus γ Laharpe* l. c. *J. repens Herb. Gay* (non *Dec.*)

Rad. repens. Culmi erecti, stricti, 2-3-ped., nodis 4-6, graciles, subcompressi, glabri, cavi, basi squamosi. Folia 3-4 in culmo singulo, alterna, distantia, erecta, teretia, attenuato-acuminata, cava, septis intus transversis numerosis. Panicula terminalis erecta, ramis 2-3, semel aut his dichotomis, partim racemosis, capitulis florum numerosis, sessilibus, lateralibus terminalibusque, globosis, ferrugineis. Bracteae solitariae, foliaceae sub panicula ramisque principalibus: interiores breviores, membranaceae, attenuato-acuminatae: intimae sub singulo capitulo congestae, ovatae, breves, filamentosae. Calycis foliola lanceolata, uniformia, ferruginea. Caps. acute triangularis, lateribus concavis, ferruginea. *Smith.* A *lampocarpo* distinctus (praeter characteres datos), paniculâ magis ramosâ; ramis tenuioribus; foliolis calycis angustioribus, longioribus; capsulâ tenuiore, magis acuminatâ dilutiore; culmi nodis paucioribus, staturâ majore: fructificatione seriore. *Davies.* ζ vix a *J. Rostkovii* distinguendum. In sylvarum humidis coenosis totius Europae planioris ad Italiam

et *Baleares* usque, in *Sibiria* et *America boreali*; δ in pratis frigidis *Banatus*, *Rochel*; ζ prope *Monspelim*. γ .

Obs. „*J. nigricans* Schreb. (atratus Bess.) nonnisi colore perianthii capsularumque plus minus nigricante (ramisque tenuioribus, laciniis calycis capsularisque acutioribus) a *sylvatico* ejusdem auctoris distinctus, qui medius *spadiceum* Schreb. inter et *brevirostrem* Nees, et hos separari vetat. Germen *J. acutiflori* reverâ vix acutum, nec nisi sensim in capsulam rostratam abit. Perianthii lacinae, margine evanescente praeditae, sensim breviores angustioresque fiunt, ut capsulam minus tegant. Accedit anthelae coloris internodiorumque longitudine inconstantia, unde speciei certe naturalis cognitio toties perturbata.“ Meyer syn. p. 26. — δ varietas est insignis culmo fere 4-ped., crassitie pennae anserinae, subcompresso, striato; foliis articulis distantibus, striatis, 1-1½ ped.; bracteis multo pallidioribus, longioribus; capitulis densissime congestis; calycibus magis nigricantibus: foliolis longe acuminatis, interioribus vix longioribus; capsulâ immaturâ breviter rostratâ longitudine calycis foliorum externorum. *J. sylvaticum* Willd. non occurrere in *H. Berol.* monet Link En. p. 306. *J. nigricans* Schreb. et *spadiceus* Schreb. varietates notabiles, colore faciles distinctu, sisterè videntur.

39. *J. pyramidatus* Laharpe; culmo foliisque erectis, subcompressis; paniculâ compositâ, corymbosâ; spicis laxè 6-10-floris; perigonii foliolis aequalibus, lanceolato-linearibus. de Laharpe Monogr. in Mem. d. Soc. d'hist. nat. T. III. p. 128.

J. acutifloro affinis; sed perigonio aequali, floribus magnis abundè diversus. Culmus verisimiliter tereti-compressus, 2-5-nodis (nodis saepe proliferis), 16-24 poll. Folia tereti-compressa, diaphragmatibus crebris, acuta, crassiuscula, internodio longiora. Panicula subcorymbosa, laxiuscula, folio florifero vix longior; spicis laxis, echinatis; floribus longiuscule pedicellatis, fuscis. Perigonii foliola acuta, subaristata, nervosa, subincurva. Stam. 6, perigonio vix dimidio breviora; filamentis antherarum subaequantibus. Caps. 1-locularis, perigonio triente longior, fusca. Stylus brevis. Sem. elliptica, nitida. An certe distinctus a *J. atlantico*, a quo culmo erecto; perigonio acuto; antheris filamenta aequantibus differt? Laharpe. In Syria, Aegypto. Herb. Gay. et Delessert. γ .

40. *J. atlanticus* Laharpe; culmo basi adscendente foliisque compressis; paniculâ simplici, corymbosâ; spicis 2-4-floris, distantibus; perigonii foliolis aequalibus, lanceolatis, obtusiusculis, capsulâ? de Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'hist. nat. T. III. p. 128.

Species dubia, habitu *J. pyramidato* affinis, sed longitudine styli antherarumque diversus. Culmus compressus, nodis plurimis, saepius proliferis, 10-12 poll. Folia erecta, acuta, crassiuscula, diaphragmatibus crebris, internodio multo longiora; vaginae diaphragmatibus crebris. Panicula erecta laxa, folio florifero brevior; spicis rubescentibus; floribus longiuscule pedicellatis. Perigonii foliola striata, margine latiuscule membranacea. Stam. 6, perigonio paulo breviora; antherae filamentis subduplo longiores. Caps. (immatura) pyriformis. Stylus longiusculus. Laharpe ad specim. unicum in herb. ill. Delessert. In Barbaria. γ .

41. *J. lagenarius* Gay; culmo basi subadscendente foliisque compressis; paniculâ compositâ, cymosâ, densâ; spicis laxè 6-10-floris; perigonii foliolis aequalibus, lineari-lanceolatis, acutis, capsulâ turbinatâ obsolete trilobâ brevioribus.

de Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'Hist. nat. T. III.

p. 130.

Rhizoma longum, sparsim culmos protrudens. Culmus basi adscendens, dein erectus, tereti-compressus, strictus, 4-5-foliatus, 6-10 poll. Folia tereti-compressa, subarcuata v. erecta, acuta, internodio longiora, diaphragmatibus paucis. Panicula composita v. subsimplex, corymbosa s. plerumque cymosa, erecta, congesta, folio florifero vix longior; spicis laxis approximatis, pallescentibus. Perigonii foliola substriata, pallida, straminea. Stam. 6, perigonio paulo breviora; filamentis brevibus. Capsula basi subsphaerica, rostrata, unilocularis, pergamena, perigonium superans paululum. Stylus longiusculus. Semina numerosa, ooidea, pallida. *Laharpe. In Gallia meridionali, prope Toulon, Montpellier etc. 4.*

42. *J. Fontanesii Gay*; culmo foliisque erectis, teretibus; paniculâ vix compositâ, laxâ; spicis remotis, 20-50-floris; perigonii foliolis lineari-lanceolatis, acutissimis, aequalibus, capsulam pyramidalam acutam subaequantibus. *de Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'Hist. nat. T. III. p. 130. (excl. syn. J. striati Meyer). J. articulatus Desf. Atl. 1. p. 313.*

Culmus rigidus, laevis, subbinodis, 10-14 poll.. Folia erecta, teretia, dura, abbreviata, acuta, diaphragmatibus numerosis prominentibus. Panicula subsimplex erecta, folio florali longior; ramis teretibus, elongatis, paucis, simplicibus v. semeldivisis; spicis subsphaericis, distantibus, 20-50-floris, subechinulatis, virescentibus. Perig. foliola striata, conniventia, virescentia, hinc inde rubescentia. Stam. 6, perigonio dimidio breviora; filamentis brevibus. Caps. pyramidalis, acuta, obsolete triquetra, 1-locularis, perigonium adaequans, pallescens. Sem. pauca, ooidea. *J. polycephalo* affinis, sed stam. 6; spicae minus densae; flores majores; perigon. foliola aequalia. *Laharpe. Differre videtur a J. striato, quocum conjungitur a clo. Laharpe, culmis teretibus binodibus; foliis teretibus; paniculae ramis teretibus elongatis; spicis (capitulis) distantibus, magis multifloris et virescentibus; capsulis obsolete triquetris, pallescentibus. In Barbaria. Desf. 4.*

45. *J. striatus Schousb.*; foliis culmeis approximatis, nodulosis; vaginis striatis; anthelâ e floribus capitatis; perianthii laciniis aequalibus, lanceolato-acuminatis, capsulam triquetram acuminatam superantibus. *Meyer Syn. p. 27. n. 22. J. proliferus Vahl Herb. (fid. Meyer). J. sculus Jan Elench. (fid. specim. et consent. Jan in litt.)*

Radix stolonifera repens; fibris longis, sat crassis, albidis; stolonibus horizontalibus, vaginatis, teretibus, pallide fuscis. Culmi stricti, vel basi adscendentes, 6-10 poll., foliosi, nodis 3-5, crassitie pennae corvi, compressiusculi, glaucescentes. Folia caulina alterna, 3-5, approximata, erecta, tereti-compressa, subulata, dense-nodulosa, sine vaginis 2-3 poll.; vaginae inferiores 1-2 amplae, laxae, fuscescens, margine membranaceae, striatae, obtusae, vel mucrone foliiformi terminatae, 6-12 lin.; superiores foliiferac arctiores, culmos omnino fere vestientes, glauco-virides, minus striatae, apice ligulâ oblongâ obtusâ diaphanâ, fere lin..

Capitula 3-5: medium sessile, solitarium; lateralia pedunculata, solitaria, vel capitulo altero supraposito, subglobosa, magnitudine pisi majoris, 4-18-flora. Involucrum 1-phyllum, foliis omnino simile, sed vix capitula aequans; bracteae sub floribus ovatae, acutae, concavae, diaphanae, floribus duplo breviores. Cal. foliola aequalia, lanceolata: exteriora acuminata, obsolete nervosa, margine membranacea; interiora minus acuminata, nervo medio valido carinata, purpurascens-fusca, margine membranaceo albedo, lato; omnia $1\frac{1}{2}$ lin., in junioribus capsulam aequantia, serius capsulam breviora. Stam. 6, calyce duplo breviora; antherae luteae, filamentis triplo longiores. Capsulae oblongae, triquetrae, rostrato-acuminatae, 2 fere lin., bediae, nitidae, subuniloculares; valvulae lanceolatae, acuminatae, septo obsolete. Semina ovata, apice acuta, basi obtusa, pallide fusca. Ad specim. sicula. In regno tingitano Schousb. (herb. Agardh), in Sicilia Jan, in Sardinia Müller. 4.

Obs. Fide Sprengel S. Veg. II. p. 106. huc spectaret: *J. stellatus* Willd.; culmo folioso; foliis nodosis, articulatis; capitulis florum racemosis. Reliqui Willd. Ms. *J. articulatus* variet. Desfont. Clo. de Schlechtendal fil. forsan *J. lampocarpus* videtur. Cls. de Laharpe *J. striatum* Schousb. cum *J. Fontanesii* Gay conjungit, cui sane valde affinis.

44. *J. fasciculatus* Schousb.; culmo striato, unifolio foliisque nodulosis compressis strictis; perianthii laciniis angustissimis, apice subulatis. Meyer Syn. p. 28. (ic. ined.) n. 23. *J. acuminatus* Salzm. Pl. hisp. tun. Fasc. III.

*Facies fere *J. capitati* majoris; sed foliorum noduli evidentissimi. Meyer. Radix repens, nodosa, fuscescens. Culmi 4-5 poll. compressiusculi, uni-, rarius bifolii, flavescens-virentes, inferne purpurascens, crassitie fili emporetici. Folia inferiora culmum aequantia, subulato-acuminata, remote sed evidenter nodulosa, flavescens-viridia; vaginae laxae, striatae, purpurascens, margine membranaceae, pollicares et ultra, omnes foliiferae; culmea omnia similia, culmum aequantia vel paulo breviora, vaginis utroque latere in ligulam ovato-oblongam, acutiusculam, albidam, diaphanam $\frac{1}{2}$ lin. terminatis. Capitula 5-7 in corymbo simplici; medium sessile, lateralia in pedunculis strictis, $\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll., striatis, solitaria vel capitulo altero supraposito, subglobosa, magnitudine PRUNI spinosae; floribus 4-12 stellato-patentibus. Involucrum monophyllum, foliis simile, corymbi ramos subaequans vel paulo brevius, $\frac{1}{2}$ -2 poll.; bracteae ad pedunculorum basin lanceolatae, striatae, purpurae suffusae, acumine foliiformi; sub floribus late ovatae cum acumine subulato, diaphanae, nervo medio basi purpurascens, $\frac{1}{2}$ lin.. Cal. $2\frac{1}{2}$ -3 lin.; foliola anguste lanceolata, acutissima, carinata, striata, margine membranacea; exteriora magis virescentia, dorso apiceque purpurascens; interiora paulo longiora, planiora, purpurascens, margine diaphana. Stam. 6 calyce styloque plus duplo breviora; antherae lineares, filamentis multo longiores, pallide flavae, lin. fere longae. Germen oblongo-triquetrum virescens, stamina superans, in stylum longum trigonum purpurascens exsertum desinens. Stigma trifidum. Capsulam maturam non vidimus. Ad specim. a Salzm. lectum in Herb. cli Koch, quod omnino idem cum specim. cli. Agardh. A Laharpe cum? varietas hexandra *J. pygmaei* dicitur. In regno tingitano, prope Tanger. Schousb. Salzm. 4.

†. * *J. nodosus*; foliis nodoso-articulatis; petalis mucronatis *Linn. Spec.* 566. *Willd.* II. p. 210. (uterque excl. syn. *Pluk.* et *Maris.* monente:) *Retzius* Obs. 1. p. 16. n. 37. *J. fol. minor, pericarp. ovat., americ. Gronov. virg.* 15.

„Simillimus *J. articulato*; sed flores magis capitati, paniculis rarioribus, majoribus, et paniculae rami simplices, nec supradecompositi; imprimis distinguitur petalis in acumen subulatum protractis. *Linn. l. c.* Sub *J. nodoso* *Linn.* plures hujus cohortis species latere, sicuti europaeae sub *articulato* ejusdem: *Meyer* Syn. p. 27., qui *nodosum* *Linn.* aequae ac ejusdem *inflexum* praeterivit.“ Si fides habenda *Birolio* vulgatissimus in oryzetis novariensibus.“ *Pollin Fl. veron.* p. 475. *In America septentrionali.* 4.

45. *J. Rostkovii* *Meyer*; foliis culmeis nodulosis; floribus in capitulis densis; perianthii laciniis subaequalibus, lanceolatis, acuminatis, capsulâ triquetra acuminato-rostratâ brevioribus; staminibus 6 perianthio multo brevioribus; antheris linearibus. *Meyer* Syn. p. 26. n. 21. *J. culmo foliisque erectis, teretibus, strictis, lineatis; paniculâ 1-2-stachyâ; spicis globosis, multifloris, echinatis; perig. foliolis subaequalibus, lanceolato-linearibus, acutissimis, capsulâ pyramidatâ rostratâ subtrigonâ paulo brevioribus. Laharpe l. c. p. 153. J. nodosus Rostk. d. Junc. n. 33. t. 2. f. 2. Pursh Fl. Sept. Am. p. 256. Mühlenb. Descr. ub. p. 206. Torrey Fl. n. et m. U. St. 1. p. 361. Spreng. S. Veg. II. p. 105. (excl. syn. *J. scirpoidis* *Lam.*). β capitulo terminali solitario. *Meyer.* Simillimus *J. polycephalo*; β humilior, crassior. *E. Meyer.* Vix distinguendus a *J. acutiflori* γ, attamen diversus, cum ille in arenosis, hic in stagnis crescat. Stylus brevior quam in *acutifloro*; perig. foliola minus inaequalia; caps. magis pyramidata et magis attenuata. *Laharpe.* Rad. bulbosa. Culmus pedalis, subteres, apice setaceo, fistulosus. Folia remota 2-5, alterna, nodoso-articulata, culmo longiora. Capitulum laterale, pedunculatum, multiflorum, solitarium v. proliferum sive alternans. Squamae 2 ovatae, acutae, albae sub capitulo. Foliola calycis mucronata. Stam. 6. Pist. elongatum, 3-fidum. Caps. triquetra acuminata, calyce longior. *Mühlenb. l. c.* In specimin. huc spectantibus in *Herb. Schreb.* nomine *J. nodosi* asservatis: culmi filiformes, graciles, ped.; folia inferiora crassiora breviora, superiora culmum superantia subfiliformia; vaginae laxiusculae, superne ad margines membranaceae: ligulis brevibus, acutis. Capitula 8-12-flora, magnitudine pisi majoris, 2-3, rarius solitaria; medium subsessile, lateralia in pedicellis strictis 6-12 lin.. Bractee sub capitulis ovatae, acuminatae, carinatae, diaphanae, capitulis breviores. Cal. foliola aristato-acuminata, carinata, substriata, basi pallida, apice purpurascens, aequalia, 1½ lin.. Stam. calyce duplo breviora, Caps. fuscae, 2 fere lin., angustae, rostratae. *In Pennsylvania et Carolina; in nova Hispania. Haenke.* 4.*

Obs. „Huc pertinere videtur *J. Rostkovii* *Meyer* in *Reliqu. Haenk. Fass.* II. p. 142. ab ips. *Meyer* cum? adductus et ob specim. pauca et nondum fructifera dubius. Differre videtur a *J. Rostkovii* foliis adeo compressis, ut fore complanata aversa; hoc vero forte e nimio prelo, cum etiam capitula valde

compressa, et folia in quibusdam speciminibus minus compressa. Perianth. lacinae apicem versus paulo latiores esse videntur. A *J. ensifolio Wikst.* cui affinis, si folia re verâ complanata, differt: staminibus 6 longioribus, geminis formâ et rostro, unde capsulam longe rostratam, ut in *J. Rostkovii*, suspicor." *E. Meyer.* Prope Mont Real, *Haenke.* 4.

46. *J. ebracteatus Meyer*; culmo filiformi, prolifero; foliis nodulosis; floribus subgeminis ebracteatis in anthelae irregularis pedunculis elongatis; perianthii laciniis lanceolatis, acutissimis, capsulâ subprismatico-acuminatâ multo brevioribus; staminibus dimidio perianthii brevioribus. *Meyer* in *Reliqu. Haenkean. Fasc. II. p. 145. Syn. Junc. p. 28. n. 24. Laharpe l. c. p. 151.*

Habitus *J. uliginosi*, sed omnia paulo robustiora, fere ut in *J. lampocarpî* speciminibus gracilioribus. Caulis palmaris, flexuosus. Folia caule parum crassiora, tereti-compressa, radicalia 1-2 unc., caulina sensim longiora, caulem aequantia vel superantia. Anthela ut in *J. uliginoso* valde irregularis, loco florum vere terminalium (quos in anthela semper inferiores esse constat) proliferationes seu foliorum fasciculi. Capitula 2-3-flora; floribus breviter pedunculatis; bracteis ad anthelae ramos longis foliaceis interne vaginantibus planiusculis, superne subsetaceis, floralibus fere nullis. Per. lacinae subaequales, anguste lanceolatae, acutissimae, sed non acuminatae, exteriores nervo medio parum prominulo subaristatae, interiores muticae. Antherae vix longitudine filamentorum. Caps. fusco-nigricans, nitida, immatura calycem aequans, serius $\frac{1}{3}$ superans, perfecte 3 locularis. *Meyer.* Prope *Acapulco. Haenke.* ☉.

47. *J. subtilis Meyer*; caule radicante foliisque capillaceis; floribus subbinis; perianthii laciniis obtusis, interioribus longioribus; (staminibus 3?) *Meyer Syn. Luzul. p. 51. J. culmo debili, decumbente, geniculato; fol. setaceis, culmeis saepius vaginiformibus; axillis proliferis; perig. foliolis oblongis, obtusis: interioribus longioribus; flor. subbinis; caps.? Laharpe l. c. p. 158. J. fluitans Mich. Am. bor. 1. p. 191. (fid. Meyer uti) J. verticillatus Pursh Amer. 1. p. 257. (clo. Laharpe valde dubius).*

Germen prismatico-pyramidatum, in stylum attenuatum, perianthio parum brevius. *Meyer* l. c. Differt a *J. uliginoso* culmi nodis numerosis, quorum uterque folio brevissimo; vaginâ latissimâ, diaphanâ, limbo rotundato, recurvo, paulum elongato terminatâ. Ex omnibus foliorum axillis gemma e foliis 2-3 minutis vaginâ mucronatâ brevioribus. Flores terminales plerumque 2, basi bracteis 2 ovatis. Perig. foliola virescentia, rubro maculata. *Laharpe.* In uliginosis et rivulis *Canadae. Bosc.* 4.

Obs. Vix eruendum quorsum spectet *J. verticillatus Pursh* (sphalmato ut videtur e *J. subverticillato* enatus) cum definitione *J. subverticillati* a *Willdenow* data usus sit, et *J. uliginosum Roth, fluitantem Lam., J. subverticillatum Host Gram. t. 88. et Fl. Dan. t. 817.* instar synonymorum laudet, praetereaque nihil addat. — Quoad synonyma ad *J. subtilem* spectaret *J. subverticillatus Mühlenb., Descr. ub. p. 209,* ubi laudatur *J. fluitans Mich.* et *J. nodosi* varietas *Schultz* (nobis ignota). Attamen omnino differt, cum describatur: „culm. 1 $\frac{1}{2}$, ped., compresso, erecto, fistuloso; foliis compressis, nodoso-articulatis; pedunculis subverticillatis, basi vaginatis, inaequalibus, hinc planis, inde teretibus, glomerulo terminatis; glomerulis 3-5-floris; calyce exteriori 2-phyllo, ovato, mucronato; interiore 6-phyllo, lineari, viridi, subaristato; capsulâ triquetra, acuminatâ, 3-valvi, polyspermâ, calycem superante.“ *Cl.*

Cls. *Torrey* in *Fl. n. et m. sect. un. Stat.* 1. p. 364. *Mühlenbergi* plantam (quam non vidisse asserit, nisi eandem pro varietate *J. nodosi* v. *polyccephali* habuerit), nomine *J. subverticillati Willd.* exposuit, et instar synonymorum laudavit: *J. subverticillatum Willd.*, *Bicheno*, *Mühlenb.*, *J. fluitantem Mich.* (fid. *Mühlenb.*) et *J. verticillatum Pursh.* — JUNCUS No. 15. *Mühlenb. Descr. ub.* p. 209, a clo. *Meyer* cum? ad *J. subtilem* ductus, melius, at vix omnino, quadrat in *J. subtilem*, cum: „culmus spithameus, foliosus, striatus, nodosus, glaber; folia setacea subarticulata; glomeruli sessiles pedunculati, 3-flori; cal. acuminatus, diphyllus, aristatus; cor. acuminata, 6-petala, linearis, aristata; stam. ?; pistilla 3; caps. angulata, corollâ major acuta; radix fibrosa.“

b. *triandri.*

48. *J. uliginosus Sibth.*; caule filiformi; foliis subnodulosis; strictis; floribus in anthelae irregularis ramis elongatis, subcapitatis; perianthii laciniis subaequalibus, acutis, capsulâ oblongâ obtusâ subuniloculari brevioribus; staminibus 3 dimidii perianthii longitudine. *Meyer Syn.* p. 29. n. 25. *J.* culmo saepius decumbente, radicante, subcompresso; foliis setaceis; paniculâ subsimplici, irregulari; spicis 4-8-16-floris, sparsis; perig. foliolis aequalibus, oblongis, subacutis, capsulâ oblongo-ellipsoideâ vix brevioribus. *Laharpe* l. c. p. 135. *J.* culmo folioso, basi bulboso; foliis setaceis, canaliculatis; capitulis terminalibus lateralibusque subtrifloris; capsulâ obtusâ calycem parum superante. *Smith Engl. Fl.* II. p. 169. *Fl. Brit.* 380. *Engl. Bot.* t. 801. *Bicheno Trans. Linn. Soc.* XII. p. 315. *Hook. Scot.* 108. *Relh.* 158. *Don H. Br.* 84. *Roth Mag. f. Bot.* II. p. 16. n. 9. *Fl. Germ.* II. p. 405. *Enum. pl. Germ.* I. 2. p. 83. *Mert. et Koch Deutsch. Fl.* II. p. 590. *Sturm D. Fl.* 13. n. 8. *J. bulbosus* *Linn. Spec. ed.* I. p. 327. *Ehrh. Beytr.* III. p. 111. (fid. *Meyer*). *J. articulatus* *γ* *Huds.* 150. *With* 347. *Ehrh. Beytr.* 2. p. 78. (fid. *Roth*). *J. supinus* *Don H. Br.* 85. *Gaud. Agr. helv.* II. p. 226. *J. mutabilis* *β* *Lam. Enc.* III. p. 270. *J. verticillatus* *Pers.* p. 384. *J. stolonifer* *Wohllieb. Hal. Suppl.* p. 13. (fid. *Meyer*, sec. *Roth* ad *J. lampocarpum*). *J. fasciculatus* *Schrank bayer. Fl.* n. 560. *J. alpinus* *Fries nov. fl. suec.* p. 32. (fid. *Meyer*). *J. setaceus* *van Hall. App.* n. 12. (fid. ejusd. *Fl. belg. sept.* 1. p. 288.) *J. capitatus* *Schk.* (fid. *Mert. et Koch*). *Hall. helv.* 1320. *Moris. Hist. sect.* 8. t. 9. f. 3. *β supinus*; caule humiliore, erectiusculo vel decumbente, saepe viviparo. — *J. ulig. β* *Smith Engl. Fl. et Fl. brit.* II. cc. *Bicheno* l. c. *Meyer* l. c. (excl. syn. *J. affinis* *Gaud.*) *Roth* l. c. *J. supinus* *Mönch Hass.* n. 296. t. 5. *Roth Germ.* II. 1. p. 409. *J. culmo* erectiusculo, ramoso; fol. linear., canalic.; capitulis triphyllis; capsulis triangularibus. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 168. *Fl. Dan.* t. 1099. (excl. syn.) *Wahlenb. Fl. suec.* p. 212. et hoc teste: *J. nodulosus* *Fries nov. Fl. suec.* p. 114. *J. subverticillatus* *β* *Willd. Spec.* II. p. 212. *Wallr. Sched. Crit.* p. 146. *J. verticillatus* *γ* *Pers. Syn.* 334. *J. ericetorum*

Krock. Siles. n. 552. J. triandrus Vill. Catal. Strasb. p. 81. c. ic. (fid. Meyer). J. viviparus Relh. Cant. p. 123.? Juncoides calyculis paleaceis, glomeratis, folio varians. Scheuchz. Agr. t. 7. f. 10. Gr. junc. aquat. etc. Pluk. Phyt. t. 32. f. 3. Moris. l. c. t. 9. f. 4. (ergo ex hoc synonymo, cujus figuram optimam dicit: J. mutabilis γ Lam. Enc. III. p. 270.). γ subverticillatus; capitulis sub 5-floris, subverticillatis. J. subverticillatus, culmo subdichotomo; fol. subulato-subsetaceis; flor. fasciculato-subverticillatis. Wulf. in Jacq. Coll. III. p. 51. (excl. syn. aliq.) J. culmo folioso, prostrato; fol. setac., canalic., leviter articulatis; panic. dichotomâ; capitulis lateralibus terminalibusque sub 5-floris, subverticillatis; caps. obtusâ, calycem parum superante. Smith Engl. Fl. II. p. 170. Bich. Trans. Linn. Soc. XII. p. 322. Hook. Scot. 109. J. subverticillatus α Willd. Spec. II. p. 212. (partim). Host Gram. III. t. 88. J. setifolius Ehrh. Calam. 86. J. uliginosus γ Bicheno l. c. p. 316.? J. bulbosus var. Fl. Dan. t. 817. J. Chamaeschoenus Wolff in Herb. Schreb. δ fluitans; culmo fluitante. J. ulig. γ Meyer l. c. (excl. syn. J. repentis Requ., sec. Laharpe ad J. lampocarpum spectantis). J. fluitans Lam. Enc. III. p. 270. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 169. J. articulatus β fluitans Wahlenb. Lapp. n. 156. J. verticillatus β Pers. Syn. p. 384. J. supinus β Wahlenb. Fl. ups. p. 115. J. subverticillatus γ Wallr. Sched. Crit. p. 146. Rad. fibrosa. Culmi 2-6 poll., subfoliosi, apice ramosi, primum erecti, demum decumbentes. Folia tenuia, acuta, semicylindrica, extus non articulata nodosave, licet intus concamerata, uti in genere: radicalia plura, basi dilatata, membranacea, saepe rufescentia, bulbosam culmi partem vaginantia. Flores ut plurimum 3, in capitulis parvis bracteisque rufescentibus. Calycis foliola lanceolata, acuta, carinata, tenuiter 3-nervia, marcescentia, fusca. Capsula dilute fuscescens, angusta, prismatica. Smith. In β culmi breviores, 1-3 poll., erectiusculi vel adscendentes, subinde etiam decumbentes, simplices v. superne ramosi. Folia breviora, setaceo-subulata. Capitula 3-6 flora. Flores breviter pedicellati, virides v. spadicei, saepissime vivipari. In γ rad. longe fibrosa, nec repens. Culmi plures, cespitosi, basi vix bulbosi, decumbentes vel fluitantes, radicanes, et subinde ex articulis cespites foliorum emittentes, teretes, graciles, glabri, 6-12-poll., medullâ faretî. Folia acuminata, basi semicylindrica, superne canaliculata, concamerata, sed extus vix conspicue articulata, basi dilatata, striata, margine lato, abrupto, membranaceo, saepius rufescente: radicalia numerosa, erecta, 2-3 poll., caulina solitaria parum longiora. Panicula semel vel bis dichotoma. Capitula etiam axillaria, subsessilia, saepe bractea solitaria brevi foliaceâ, squamis albis membranaceis subtensa. Flores 3-5, patentes, quasi verticillati, in fluitantibus rariores, paniculâ minus compositâ. Cal. et caps. pallidiores. Smith. In δ : habitus SCIRPI fluitantis; folia JUNCI articulati; flores J. supini; culmus gracilis, debilis, fluitans v. repens; folia longa, filiformia, gracilia, quidquam nodosa; panicula sparsa, pauper; flores 3-4 in

capitulum approximati, nudi vel foliolis setaceis circumdati; capsulae perianthii lacinias oblongas obtusiusculas superantes. *Dec.*
In pascuis humidis, inundatis, turfosis, arenosis totius Europae. 4.

Obs. Cls. *Laharpe* varietates sequentes, uti ait mere artificiales, distinguit: α culmis cespitosis diffusis; paniculâ simplici irregulari. β culmis fluitantibus, spicis saepius viviparis. γ culmis erectis rigidulis; paniculâ compositâ umbellatâ; δ culmis brevissimis; paniculâ submonostachyâ. — *Wulfen* ad suum *J. subverticillatum*, cujus descriptio satis bene congruit cum illa a *Smith* data, quæ tamen vix speciem propriam sistere videtur, citat, praeter *J. bulbosum* β *Fl. Dan.* 817: *Hall. Helv.* n. 1320., *Scheuchz. Agr.* p. 330. n. 5. t. 7. f. 10., *Pluk. Phyt.* t. 31. f. 3. et cum? *Gram. bufon. glomeratis ntriculis.* *Barrel.* II. 94. — *Gmelin Fl. sibir.* I. p. 70. t. 18. f. 1. iconem exhibet *Junci* foliis subulatis, angulatis, paniculâ terminatrice rarâ, foliis brevioribus, cujus synonymon dicit *Morison* l. c. t. 9. f. 3.; at, si hic *uliginosus*, *Gmelini* planta *uliginosus* certo non est. Descriptionem nullam dedit, et icon pessima Caricem potius exprimit; *Vaillantii Juncum repentem capsulis triangularibus Paris.* 110 adhuc instar synonymi adducit. *Fries Novit. Fl. suec.* p. 101. *J. alpino Willd.* (?) instar synonymi addi jubet *J. supinum Mönch.*

49. *J. canadensis Gay*; culmo tereti, erecto, rigido, subbifolio; foliis teretibus; paniculâ compositâ; spicis 4-8-16-floris; perigonii foliolis lanceolato-linearibus, acutissimis: interioribus sublongioribus, capsulâ oblongâ prismaticâ brevioribus; seminibus utrinque caudatis. *de Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'Hist. nat.* T. III. p. 154. α culmo foliisque tenuibus; paniculâ sublaxâ, spicis 10-15-floris remotiusculis. β culmo foliisque tenuibus; paniculâ coarctatâ; spicis 4-8-floris approximatis. *Laharpe* l. c.

Culmus strictus, laevis, 1-2-nodis, 6-12-poll.. Folia erecta, rigida, longiuscula, vix striata, nodulosa. Panicula erecta, plus minus coarctata vel laxiuscula, folium florale vix superans; ramis simplicibus vel dichotomis, teretibus, rigidis; spicis plus minusve distantibus vel approximatis, echinatis, fuscescentibus. Perig. foliola substriata, acute aristata. Stam. 3, perigonio breviora; antheris minutis; filamento longiusculo. Caps. triquetra, utrinque leviter attenuata, vix mucronata; stylo brevissimo. Sem. utrinque in caudam albidam abeuntia. α *Juxta lampocarpum* γ , β *J. ustulato (fuscoatro)* similis. *Laharpe.* *In Canada, Terre-Neuve, ad sinum Hudsonis.* 4.

50. *J. paradoxus Meyer*; foliis caulinis tereti-compressis, nodulosis, strictis; anthelâ capitulis paucifloris supra-decompositâ; perianthii laciniis lanceolato-acuminatis: exterioribus longioribus capsulam triquetro-ovatum acutam mucronatam subunilocularem non aequantibus; staminibus 3 perianthio vix brevioribus; antheris minutis. *Meyer Syn.* p. 31. quo teste: *J. sylvaticus Pursh Fl. Amer. sept.* I. p. 257. *J. polycephalus Elliott Carol. et Georg.* I. p. 409. *J. paradoxus*; culmo subadscendente foliisque tereti-compressis; paniculâ sub-simplici compositâve, laxâ; spicis 4-10-floris, sparsis; perigonii foliolis lanceolatis, acuminatis, exterioribus paulo longioribus, capsulam pyramidato-oblongam vix attenuatam subaequantibus. *Laharpe* l. c. p. 141.

E longinquo simillimus *J. lampocarpum*, cujus morbo aequè obnoxius. Ab *acutifloro* praeter formam capsulae etiam perianthii laciniis ex-

terioribus longioribus differt. *Meyer*. Culmi flaccidi, compressi, basi adscendentes, 8-12 poll.. Panicula plus minus irregularis, plerumque simplex et pauciflora. Spicae rubro-fuscae. Capsulae nitidae, pallide fuscae. Sem. ooidea, pauca. Differt tantum a *J. lampocarpo* perigonio acuto et inaequali; stam. 3 et capsulâ pallide fuscâ. Plerumque nomine *J. articulati* in herbariis occurrit. *Laharpe*. In speciminibus in Herb. *Schreber* ab ipso clo. *Meyer* pro *paradoxo* declaratis: culmi $1\frac{1}{2}$ fere ped., erecti, teretes, apice tantum remote obsoleteque nodulosi, laeves. Folia caulina pauca, teretiuscula, subulato-acuminata, remote nodulosa, suprema 6 poll.; vaginae sat amplae, laxiusculae, laeves, apice membranaceae et utrinque ligulâ ovatâ, obtusâ, diaphanâ, lin. longâ. Panicula supradecomposita, stricta diffusaque: ramis ramulisque compressis, rigidulis. Involucrum monophyllum, erectum, basi subspathaceum, margine membranaceum, apice foliiforme, paniculâ brevius; bractee ad ramos ramulosque lanceolatae, subulato-acuminatae, membranaceae, dorso pallide fuscescentes; bractee sub floribus ovatae, acuminatae, carinatae, appressae, diaphanae cum stria media purpurascente, floribus breviores. Capitula semiglobosa, 3-7-flora, magnitudine pisi majoris. Calycis foliola lanceolata, longe acuminata, basi concava carinataque, striato-nervosa, purpurascenti-fusca, margine nervoque medio albida, inaequalia: exteriora paulo longiora, firmiora et evidentius nervosa, capsulam aequantia vel paulo superantia, $1\frac{1}{2}$ lin.; interiora longitudine fere capsulae. Stamina 3, perianthio breviora, vix lin. longa. Antherae filamentis paulo breviores. Capsulae triquetro-ovatae, acutae, vix mucronatae, lineam vix superantes, glabrae, nitidae, fuscae, subuniloculares, valvulis infra medium tantum septo parum prominulo. Semina oblonga, utrinque âcuta, pallide fusca. *J. pallescenti* affinis. In *Carolina, Georgia, Pennsylvania*. 4.

51. *J. Leschenaultii* Gay; culmo adscendente foliisque compressis; paniculâ simplici, divaricatâ; spicis 6-8-floris, paucis; perigonii foliolis vix aequalibus, lanceolatis, acutis: interioribus subbrevioribus capsulâ subpyramidatâ triquetrâ brevioribus. de *Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'Hist. nat. T. III. p. 137.*

J. lampocarpo affinis et tantum perigonii foliolis acutis staminibusque 3 distinctus. Culmus subtrinodis, 2-4 poll.. Folia hinc inde diaphragmatibus intercepta, acuta, internodio longiora; vaginis dorso leviter carinatis, saepe rubicundis. Panicula subsimplex, subcorymbosa; ramis paucis, sparsis; spicis remotis, raris, 6-10-floris, fusciscentibus. Perig. foliola lin. circiter, ex viridi purpurascencia: interioribus paulo brevioribus. Stam. 3, perigonio paulo breviora; filamentis setaceis, antherâ duplo longioribus. Stylus brevissimus. Caps. apice attenuata, submutica, perigonio triente longior, 1-locularis, fuscescens. Sem. nitida, ooidea, obsolete venosa. *Laharpe. In Indiae orientalis montibus Nelly Gerry. Leschenault. Ⓞ.?*

52. *J. sinensis* Gay; culmo foliisque erectis, compressis; paniculâ erectâ, decompositâ, laxâ; spicis 3-6-floris, numerosis; perigonii foliolis lanceolato-linearibus, acutis: exterioribus subbrevioribus, capsulâ oblongo-pyramidatâ triquetrâ

brevioribus. *De Laharpe in Mem. d. l. Soc. d'hist. nat. T. III. p. 137.*

J. Leschenaultii affinis; refert etiam omnibus partibus *J. bufonium* praeter inflorescentiam. Rhizoma nullum. Culmus subuninodis, flaccidus, 6-8 poll.. Folia apice subulata, flaccida, 4-6 poll. Panicula decomposita v. supradecomposita, ampla, culmo nonnunquam longior; spicis sparsis. Perigonii foliola leviter inaequalia, lin. longa, virescentia: interiora sublongiora, striata. Stam. 3, perigonio triente breviora; filamenta antheris subduplo longiora. Stylus vix ullus. Caps. apice attenuata, vix mucronata, unilocularis, pallida. Semina ellipsoidea, nitida. *Laharpe. In China, Staunton; Japonia. Thunb. ☉.*

53. *J. concinnus* Don; culmo tereti, oligophyllo, striato; foliis teretibus, articulatis; fasciculo terminali, multifloro; involuero polyphyllo, brevi, scarioso; perianthii foliolis lanceolatis, obtusis, coloratis; capsulâ triquetrâ, stylo elongato coronatâ. *Don Prodr. Fl. nep. p. 44. Laharpe l. c. p. 138.*

Culmus erectus, palmaris. Flores glomerati, majusculi, lutescentes. *Don. J. Leschenaultii*, ut videtur, affinis, in quo tamen culmi foliaque teretes et perigonium acutum. A *J. Wallichiano* differt: perigonio obtuso, colorato, capsulâ stylo elongato terminatâ et staturâ humiliore. *Laharpe. In regione alpina Gosaings-than, in regione Himalayae Nepal. Wallich.*

54. *J. Wallichianus* Laharpe; culmo erecto, rigido foliisque teretibus; paniculâ subsimplici, laxâ; spicis 4-8-floris; perigonii foliolis lineari-lanceolatis, acutissimis: interioribus subbrevioribus, capsulâ oblongâ triquetrâ paulo brevioribus. *De Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'Hist. nat. T. III. p. 139.*

Habitus *J. lampocarpus* var. *pallescentis*; structura florum *J. sinensis*, a quo aequae ac a *J. Leschenaultii* praesertim culmis foliisque teretiusculis, capsulâ pallidâ minus acuminatâ diversus. Culmus strictus, adscendens, 3-5-nodis. Folia rigida, abbreviata, diaphragmatibus crebris. Panicula pauciflora; spicis 4-5 (supra 8-) floris, remotiusculis, paucis, virescentibus. Perigonii foliola subaequalia, nervosa; interiora vix breviora. Capsula utrinque leviter attenuata, mucronulata, pallescens, perigonium paulo superans. Stam. 3, perigonio breviora; filamentis antherâ longioribus. *Laharpe. In Nepal. Wallich. 4.?*

55. *J. prismatocarpus* R. Br.; culmo compresso; foliis alternis, verticalibus; cymâ terminali nudâ, effusâ; capitulis multifloris, triandris; capsulis prismaticis: maturis unilocularibus, perianthio subulato longioribus; seminibus obsolete striatis. *R. Brown prodr. p. 259. Meyer Syn. p. 38. n.*

57. *J.* culmo foliisque erectis, compressis; paniculâ decompositâ, divaricatâ; spicis 8-12-floris; perigonii foliolis aequalibus, lanceolatis, acutis, capsulâ pyramidatâ triquetrâ attenuatâ brevioribus. *Laharpe l. c. p. 139.*

Radix cespitosa, fibris albidis. Culmi erecti, stricti, simplices, glabri, foliosi, valde compressi, fuscescentes vel intense virides,

1-1½ ped., plerumque 5-nodes. Folia erecta, verticalia, valde compressa et inde fere plana, acuta, glabra, obsolete striata, dissepimentis obsolete, ad 2-3 poll. a basi margine lato membranaceo albido vaginante; inferiora pedalia, caule breviora; caulina 1-3, internodiis duplo longiora, 1-1½ lin. lata, fusco-viridia. Cymae simplices vel compositae; ramis plerumque 5 inaequalibus, majoribus dichotomis. Capitula majora multiflora, minora 5-5-flora. Involucrum 1-phyllum, planiusculum, lineari-subulatum, glabrum, cymâ brevius. Bracteae ad cymae ramos ovato-lanceolatae, acuminatae, obsolete striatae, margine quidquam membranaceo, pallidae, 2-3 lin.; florales ovatae, acuminatae, nervo medio carinatae, membranaceae, albidae, calycibus duplo breviores. Calycis foliola lanceolato-subulata, striata, exteriora paululum latiora brevioraque, purpurascenti-fusca, margine albido membranaceo, 2 lin., capsulis maturis ⅓ fere breviora. Filamenta 5, calycibus plus duplo breviora, calycis foliolis exterioribus opposita. Antherae erectae, sat longae. Capsula exacte trigona, acuta, lucida, fusca, ½ lin.. Semina oblonga, utrinque acutiuscula, pallida. *In Nova Hollandia prope P. Jackson.* 4.

56. *J. echinuloides Brotero*; culmo erecto, tereti, simplicissimo aut simplici, subpaniculato; foliis compressiusculis, articulato-nodosis; capitulis densissimis, globosis, echinulatis, terminalibus, folio fultis. *Brotero Fl. lusit. p. 518.* *J. valvatus*; culmo folioso; foliis compresso-teretibus, nodoso-articulatis s. valvatis; floribus capitatis; capitulo laterali et terminali bractea suffulto. *Link apud Schrader Journ. 1799. 4 St. p. 316.* *J. valvatus*; ascendens; fol. culmeis tereti-compressis, nodulosis; anthelâ capitulis paucis, globosis; perianthii laciniis angustissimis, apice subulatis: exterioribus brevioribus; stam. 5, antheris brevissimis. *Meyer Syn. p. 52. n. 28. Laharpe l. c. p. 137.*

Culmus 5-14 poll., subsolitarius, teretiusculus, glaber, trinodis, capitulo unico, vel ramulis 2-3, et tunc plus minus pedalis. Folia culmea saepius 3, basi latiusculâ vaginante, inde subteretia, acuta, apice molli, similia illis *J. aquatici*; ad singulum ex duobus s. tribus nodis paniculae duo valde inaequalia: unum exterius longius, basi pedunculos duos vaginans, altiori brevius; aliud interius minimum, submembranaceum, mucronatum, pedunculum tantum modo altiore vaginans. Panicula in culmis altioribus simplex, ramis 3-4, raro ultra, gradatim inaequalibus, altiori 2-5 poll., hinc convexo. Fasciculi florum plures, in capitulum globosum, magnitudine nucis avellanae collecti. Capitula 3-4, raro ultra, omnia terminalia, infimum subsessile, s. brevi pedunculo impositum, nulla vero in bifurcationibus duabus, sed ejus loco folium minimum. Sub singulo capitulo folium unum reflexiusculum, subovatum, acuminatum, ½ poll., et ultra illud alia minora floralia, majora quam bracteae interiores ad basin floris singuli. Flores densissimi, numerosissimi, ad 50; bracteae membranaceae ovatae, acuminatae, subaristatae, arista molli, corollis breviores, inaequales aut subaequales. Petala ex fulvo fusca, subulata, carinata, apice rigidiuscula, unde capitula echinulum referunt. Capsula subfulva, subulata, petalis vix longior, polysperma, in centro nonnullae abortivae. *Affinis scirpoidi et punctorio Lamarck.*

In dumetis subhumidis, ad fossulas lutosas in Lamorosa Beirae australis; circa Montachique Link. 4.

Obs. Cls. Meyer recte monet, nomen a Brotero inditum servandum esse, si eadem *echinuloides*, quem non vidit, cum *valvato* species, quem vidit. At ex descriptione uberiore a Brotero data omnino idem videtur. *J. valvatum* Junci *Rostkovii* varietati minori non esse absimilem Meyer l. c. notavit.

57. *J. pallescens* Lam.; foliis subteretibus, tenuibus, articulatis; paniculâ strigosâ; calycibus acutis, submembranaceis. *Lam. Enc. III. p. 268.* *J. fol. caulinis tereti-compressis, nodulosis; anthelâ capitulis paucifloris; perianthii laciniis subaequalibus lanceolatis, acuminatis, (capsulam acutam aequantibus?); staminibus 3 dimidium perianthium vix superantibus.* Meyer *Syn. p. 31. n. 27.* *J. acuminatus; culmo folioso, erecto; foliis subnodoso-articulatis; paniculâ terminali compositâ; glomerulis subtrifloris, pedunculatis sessilibusque; calycibus gracilibus, acuminatis, triandris, (capsulâ acutâ brevioribus Torr.) Mich. bor. Am. 1. p. 192. Pursh Sept. Am. 1. p. 237. Elliott Sketch. 1. p. 409. Torrey Fl. n. et m. U. St. 1. p. 363. Poir. Enc. III. p. 160. J. culmo foliisque erectis, compressis; panic. decompositâ, laxâ; spicis 4-6-floris; perig. foliolis aequalibus, lineari-lanceolatis, acutissimis, capsulam ellipsoideam obtuse trigonam subaequantibus. Laharpe l. c. p. 136. J. sylvaticus Mühlenb. Cat. p. 36. Descr. nb. p. 206. Darlington Florul. cestr. p. 43. (qui vero *J. acuminatum* Mich. et Ell. non nisi cum? ad *sylvaticum* Mühl. trahit.) *J. nodosus* Herb. Schreb.*

Culmus 8-10 poll., subinde ped.. Folia radicalia plura, compresso-teretia, acuta, mollia, glabra, longitudine fere culmorum. Culmi cespitosi, folio uno alterove radicalibus simili, praeter folium minus grande sub panicula mediocri, rara, parum ramosa, subinde in formam spicae contracta, pallida vel albicante. Flores bini, terni quaterni fasciculati, squamis sub singulo fasciculo 2 membranaceis, scariosis, albidis, longitudine fere calycis. Lam. l. c. Mühlenberg describit suum *sylvaticum* culmo pedali, tereti, fistuloso, foliis longiore, nec articulato; foliis teretibus, nodoso-articulatis, basi vaginatis, fistulosis, acuminatis, vaginâ striatâ; paniculâ subterminali, erectâ, divaricatâ, culmo longiore, pedunculis basi bractea lanceolatâ acuminatâ; capitulis 3-6-floris; bracteis sub calyce 2 ovatis, acutis; calycis foliolis acutis linearibus, capsulâ brevioribus; antheris 3 albis, inclusis; stigmatibus exsertis; caps. triquetra, acutâ, purpurascente, calyce paulo majore; seminibus parvulis utrinque acuminatis. Monstrositatem viviparam notat Darlington l. c.. Specimina majora *J. acutifloro* similia, sed panicula flavescens; minora vix a *J. microcephalo* distinguenda nisi staminibus semper 3; antheris filamentis duplo brevioribus et capsulis pallidis, valvulis tenuibus. Laharpe. In America boreali et meridionali; circa Buenos Ayres. Commers. 4.

Obs. Cls. Lamarck laudat ad suum *pallescentem* Pluk. Alm. t. 92. f. 9. nunc ad *polycephalum*, et Moris. hist. III. S. B. t. 9. f. 15. nunc ad *bicornem* ductum: ambos Linnaeus olim ad *J. nodosum* traxit. Poir. dicit se non haesitare de synonymo *pallescentis*, licet paulo diversi, si securus esset, suam plantam esse omnino *acuminatum*. Describit in suo culmos rectos, subcompressos, circiter pedales, folia articulata, alterna, mediocriter compressa, apice subulata, basi longe vagina, articulationibus prominulis; paniculam

terminalem densam pedunculis rectis, ramosis; pedicellis brevissimis, inaequalibus, 3-4-floris: floribus aliis lateralibus, aliis sessilibus; bracteas inaequales, pedunculis vix longiores, apice subulato recurvas; foliola calycis erecta, acutissima, coloris straminei. Stamina 3. Cls. *Laharpe* specimen *J. pallescens* *Lam.* in *Herb. Lam.* tam incompletum esse notat, ut vix citandum: at tamen cum? ad *J. acuminatum Mich.* refert. Patria: America merid., clo. *Laharpe* dubia, cum specimina *J. pallescens* ex Amer. merid. in *Herb. Paris.* ad *J. Dombeyanum* spectent. Cls. *Steudel* cum? ad *pallescentem* citat *J. obtusiflorum Ehrh.* et addit sec. *Hoppe.*

58. *J. macrostemon Gay*; culmo folisque teretibus, erectis; paniculâ subsimplici, erectâ; spicis multifloris, subsphaericis; perigonii foliolis lineari-lanceolatis, acutis, aequalibus, capsulam pyramidatam attenuatam aequantibus; stylo praelongo; antheris exsertis. *Laharpe* l. c. p. 140. *J. scirpoides Lam. Enc. III.* p. 267.? α fol. crassioribus, capitulis pluribus. *Laharpe* l. c. quo teste: *J. polycephalus* β *Mich. Bor. Am. 1.* p. 192. (plerumque). *J. polycephalus*; culmo duriusculo stricto; fol. culmeis remotis, brevibus, compresso-teretibus, nodulosis; anthelâ capitulis paucis, globosis; perianth. laciniis subaequalibus, lanceolato-acuminatis; stam. 3 perianthium subaequantibus; antheris minutis. α major; fol. crassioribus compressis. *Meyer Syn.* p. 55. n. 29. quo teste: *J. echinatus* (culmo folioso; fol. nodoso-articulatis; petalis mucronatis; flor. globoso-capitatis, dichotome corymbosis. *Reliqu. Willd. Ms.* ad specim. *Mühlenb.*) *Mühlenb. Cat.* p. 56. *Descr. ub.* p. 207. β fol. tenuibus; capitulis paucis. *Laharpe* l. c. quo teste: *J. polycephalus* α *Mich.* (qui saepius ad *polycephalum* spectat). *J. polyceph.* β fol. subfiliformibus, capitulo subsolitario. *Meyer.* *J. nodosus* β *polycephalus Pers. Syn. 1.* p. 584.

Hucusque cum *J. polycephalo* confusus, sed perigonii structurâ, staminibus styloque satis diversus. Culmus strictus, durus, binodis, 6-10 poll. Folia stricta, subobtusâ, diaphragmatibus frequentibus. Panicula plerumque simplex, erecta, rigida; spicis multifloris, sphaericis, pallidis. Perig. foliola aequalia, apice conniventia, leviter striata. Stam. 3; antheris minutis exsertis; filamentis perigonium aequantibus. Caps. submucronata, perigonio vix longior, 1-locularis, pallida. Stylus longus, tenuis. Semina pauca, ellipsoidea, nitida. *Laharpe.* In America septentrionali a Pennsylvania ad Carolinam; in Terre Neuve. 4.

Obs. Synonyma *J. polycephali* et *J. macrostemonis* difficulta extricatu, cum non tantum *Michaux*, sed etiam *Pursh Fl. Sept. Am. 1.* p. 237., *Elliott Sketch. 1.* p. 410. et *Torrey Fl. north. et mid. U. Stat. 1.* p. 364. utrumque confudisse videantur. Cls. *Meyer* *J. polycephalo* adiecit: „A *J. paradoxo*, quem *Elliott* perperam pro *polycephalo Mich.* habet, diversissimus; perquam similis autem *Juncus Rostkovii*, ita, ut synonymon *Lamarckii Lam.*; fol. teretibus, articulatis; capitulis globosis, echinatis; paniculâ subsimplici. *Lam. Enc. III.* p. 267. (ubi *Pluk. Alm. t. 417. f. 3.* laudatur, et qui clo. auctori *J. nodosus L.* videtur) tam ad *polycephalum* quam ad *macrostemonem* cum? citat. Subjungimus ergo descriptionem a *Lamarck* datam: „Culmus teres, 12-15 poll., folio uno alterove. Folia tereti-subulata, glabra, laete viridia, subglaucoscentia: inferiora minus articulata, nodis rarioribus minusque conspicuis. Panicula medioeris, terminalis, simplex aut subsimplex, capitulis 5-6, in pedunculis inaequalibus, Flores in singulo capitulo 12-18, divergentes, virentes, foliolis calycis subulatis, rigidis, fere spinulosis. Bractea sub capitulis membranaceae, apice subulatae. Ubi pedunculi omnes simplices, uti in fig. *Plukenet*, inflorescentia umbellam inaequalem sistit, quae

subinde duplex, pedunculo altero iterum multo longiore." *J. echinatum* Mühl. ad *macrostemonis* et citavimus, cum a clo. Meyer ad *polycephalum* et laudetur, et cl. Laharpe eundem non excludat, sed omnino de eodem sileat. Plures attamen species videntur sub *J. echinato* Mühlenb. latere, quamobrem descriptiones speciei et cospecierum a Mühlenberg datas subiungimus. Culmus teres, foliatus. Folia teretia, articulata, setacea, alterna et basi longe vaginata. Pedunculi teretes, glomeruliferi, simplices trifidique. Glomeruli 3, pedunculati, subrotundi, 9-flori. Bracteae 2 ovatae, mucronatae. Cal. foliola linearia, erecta, aristata. Caps. acuta, calyci subaequalis, 3-valvis, mucronata. Sem. plura, minuta, ovata, utrinque acuta. Habitus *J. verticillati*. α (quod illi cospecies prioris, *J. polycephalo crassifolio* respondens) describit: „culmo erecto, farto, subcompresso, foliato; foliis basi vaginantibus, ultra medium compressis, articulatis, supremo culmo longiore, basi plano, ultra medium compresso; floribus terminalibus subpaniculatis; glomerulis sessilibus pedunculatisque 15-floris; pedunculis triquetris, glabris, subverticillatis; bracteis 2 ovatis, acuminatis, albis; cal. foliolis lanceolatis, aristatis; staminibus brevibus, 6, an semper?; stigmatibus 3 exsertis luteis; caps. triquetra, acuta, calycem paulo excedente; seminibus utrinque acutis. Intermedius *sylvaticum* (i. e. *pallescentem*) inter et *nodosum* (i. e. *Rostkovii*) β denique (quod illi cospecies altera, *polycephalo tenuifolio* Mich. respondens) „culmo compresso; folio caulino lineari, compresso, articulato; paniculâ terminali, uni-bracteata bractea subarticulata, paniculâ breviora; pedunculis erectis 7 inaequalibus, simplicibus et proliferis; glomerulis terminalibus et lateralibus brevi pedunculatis, 4-7-floris; bracteis albis mucronatis; calycis foliolis linearibus aristatis; capsulâ trigonâ, calyci aequali, acuta."

59. *J. polycephalus* Mich.; culmo foliisque erectis teretibus; paniculâ simplici v. saepius compositâ; spicis multifloris, sphaericis; perigonii foliolis inaequalibus, linearibus, acutissimis: exterioribus longioribus, capsulam pyramidatam subaequantibus. Laharpe l. c. p. 140. (excl. β, *J. densifloro* Humb. et Bonpl.) α Laharpe l. c. (excl. *J. micrantho* Schrad.) *J. polycephalus* Mich. Fl. bor. Am. 1. p. 192. (ubi cum *macrostemone* confusus). *J. scirpoides?* Lam. Enc. III. p. 267. β *J. polyceph.* γ Laharpe. *J. crassifolius* Bosc in Herb. Mas. Paris.

„magis vulgaris et plerumque cum *J. macrostemone* confusus, a quo differt: perigonio inaequali, staminibus styloque brevioribus. β (γ Laharpe) differt: paniculâ valde elongatâ, decompositâ; spicis virescentibus, remotis. An varietas in locis humidis nata, vel propria species? Laharpe qui *J. densiflorum* Humb. et Bonpl., teste Kunth, tantum spicis valde approximatis et culmis crassioribus differre dicit. In America septentrionali ad Floridam usque; β in Carolina. Bosc. 4.

Obs. In Herb. cli Steudel specimen vidimus a Freedley in America boreali lectum, et nomine *J. echinati* Mühlenb. insignitum, in quod bene quadrat definitio *J. polycephali* a clo. Laharpe data praeter calycis longitudinem, quod vero haud paucis recedit a descriptione in Mühlenb., quam supra dedimus. Culmus nempe 1½ ped., crassitie pennae gallinae. Folia compresso-teretia, acuminata, minime setacea, sed crassitie culmi, striata, absque vaginis 4-5 poll.; vaginis 1½-2½ poll., margine membranaceo pallide fusco in auriculas breves producto; vaginis 2 infimis laxioribus aphyllis vel mucronulo terminatis. Panicula erecto-patula; ramis 5-7 inaequalibus simplicibus, vel apice capitula 2-3 gerentibus, 1-3 poll. Involucrum universale 1-phyllum, foliis simile, paniculâ paulo brevius. Bracteae sub ramis lanceolatae acutae, virides albo marginatae; sub floribus ovatae, acuminato-aristatae, membranaceae, albidae, nervo medio fusco, calyce duplo breviores. Capitula magnitudine Pisi, 6-10-flora. Cal. foliola subaequalia, lanceolata, longe acuminata, capsulâ paululum longiora, viridia, margine albida; interiora plantiora paulo angustiora et quidquam breviora. Stam. 3, calycis dimidium vix superantia; antherae parvae. Capsula oblongo-trigona, subtruncato-obtusa, cum mucrone vix conspicuo, pallide fusca. Semina oblonga, acuta, pallide fusca. — Alia specimina americana *J. polycephali* Mich., quae vidimus, differunt ab his culmis rigidioribus; foliis brevioribus; capitulis minoribus; staminibus longioribus; capsulis subacutis. Haec nobis ad *macrostemonem* pertinere videntur.

60. *J. densiflorus* Humb. et Bonpl.; culmo foliato, erecto foliisque teretibus articulatis; corymbo terminali contracto, involucrato; glomerulis sessilibus; floribus triandris; laciniis calycinis acuminato-subulatis, subaequalibus, capsulâ obovatâ, trigonâ, acuminatâ longioribus. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 258. *J. fol. caulinis nodulosis; anthelâ capitulis subtergeminis, coadunatis; perianthii laciniis lanceolatis, acuminatis, capsulâ trigono-obovato-obtusâ, mucronatâ longioribus; staminibus 5.* Meyer Syn. p. 35. n. 50. *J. cyperinus; culmo folioso; foliis nodoso-articulatis, teretibus; capitulis globosis, subquinis, corymbosis; petalis mucronatis: involucrio universalis diphyllo.* Reliqu. Willd. MS. (ut videtur clo de Schlechtendal fil.) *J. polycephalus* Poir. n. 57. (fid. Steudel). *J. polycephalus* β Laharpe l. c. p. 140. Affinis *J. polycephalo* Michx. Culmi bipedales, glabri, crassitie pennae gallinaceae. Folia subulata, 4-fere poll., glabra. Vaginae striatae, margine membranaceae et fusciscentes. Corymbus terminalis, confertus, involucratus, 2-5 poll.. Involucrum 1-phyllum, 2 poll., acuminato-subulatum, striatum, glabrum, vaginis simile. Flores capitato-congesti, glomerulis subglobosis, magnitudine fructus PRUNI spinosae, lateralibus, terminalibus et alaribus, approximatis, basi bractea suffultis. Bractea oblongo-lanceolata, acuminata, fusciscentes, glabra, glomerulo duplo brevior. Bracteae similes, sed majores ad basin ramorum corymbi; bractea sub quolibet flore unica, ovato-lanceolata, acuminato-cuspidata, carinata, diaphana, carinâ obscurior, flore duplo brevior. Bracteae sub calyce nullae. Cal. lacinae lanceolatae, fusciscentes, margine tenuissime membranaceae et albidae, glabrae. Stam. 3. Caps. fusca, glabra. Semina minutissima fusca, oblonga, apice et basi acuta, punctato-scabriuscula. Kunth. Specimina Brasiliensia a clo. de Martius lecta perfecte triandra, et ab ipso Meyer pro densifloro habita, differunt a descriptione a Kunth data: culmis 3-4-ped.; foliis inferioribus 2-3-ped., supremis 2-5 poll.; involucrio communi diphyllo; corymbo majore; capitulis sessilibus pedicellisque; cal. laciniis exterioribus $1\frac{1}{2}$ lin., interioribus pallidioribus 1 lin.. In ripa fluminis Atabapi, juxta catarractam Quarinuma; in Brasiliae provincia Minas Geraës. de Martius. 4.

61. *J. micranthus* Schrad.; culmo foliato, erecto foliisque subcompressis; paniculâ terminali, subcorymbosâ; capitulis terminalibus; calycinis laciniis acuminato-subulatis: exterioribus longioribus; capsulâ trigonâ calycem aequante. Schrad. in litt. *J. fol. caulinis teretibus, subnodulosis, perianthii laciniis anguste lanceolatis, acuminato-subulatis: exterioribus parum longioribus; capsulâ rostratâ.* Meyer Syn. Luz. p. 31.

Culmi cespitosi, $1\frac{1}{2}$ -2 ped., altero vel utroque latere subcanaliculati, rigidi, ut folia et reliquae partes. Folia 2 l. 3 in culmo, subcompressa: inferiori pedali et ultra. Paniculae rami 3 s. 4, $1\frac{1}{2}$ poll. et breviores, vaginati, apice in ramulos s. pe-

dunculos 3-6 linear., bractea membranacea amictos divisi. Capitula solitaria, piso minora, hemisphaerica, bracteata, e floribus numerosis, exiguis, dilute ferrugineis composita. Bractee capitula fulciantes ovato-lanceolatae, ut calycinae lacinae acuminato-subulatae, membranaceae; bractee sub calyce duae, lato-ovatae, cuspidatae, tenuissime membranaceae, calyce duplo longiores. Stylus brevis, stigmatibus 5. Capsula oblonga, acuta. *Schrad. l. c. Cls. Laharpe l. c. p. 110. J. micranthum ad J. polycephalum a ducit. In Brasilia. Princeps Sereniss. Max. de Neowid.*

62. *J. Mühlenbergii Spreng.*; culmo foliato foliisque linearibus compressis, nodosis; paniculae ramis divaricatis; floribus geminis, sessilibus; sepalis lanceolatis, obtusiusculis capsula triquetra mucronata brevioribus. *Spreng. S. V. II. p. 106.*, quo teste cum? JUNCUS No. 16. *Mühlenb.*

Quid sit, et unde cl. *Sprengel* eundem habuerit, nescimus, cum JUNCUS No. 16. in *Mühlenberg Descr. uber.* non existat. *In Nova Caesarea.*

d. *Folius canaliculatis planisve.*

a. *triandri:*

63. *J. biflorus Elliott*; culmo tripedali, tereti; foliis linearibus, planis; panicula decomposita, elongata, glomerulis bifloris, (*Elliott*, et ex ejusdem adumbratione: perianthii laciniis interioribus brevioribus, capsulam ovatam superantibus; staminibus 3.) *Meyer Syn. p. 54.* (excl. syn. *J. bulbosi Mühlenb.* fid. *Meyer in Syn. Luzul. p. 52.* qui apud *Torrey et Darlington* species propria, i. e. *compressus*). *Elliott Carol. et Georg. I. p. 407.*

A clo. *Laharpe l. c. p. 146.* cum? ducitur ad *J. aristulatum a.* Conf. Obs. ad *J. compressum.* *Inter Savannah et Augustam, prope Charlestown. 4.*

64. *J. aristulatus Mich.*; radice bulbosa; culmo folioso, erecto, compresso; foliis angustis, subcanaliculatis; panicula composita, glomerulis 5-floris; calycibus triandris bracteisque aristatis. *Mich. Flor. bor. Amer. 1. p. 192. Pursh Sept. Am. p. 257. Poir. Enc. Suppl. III. p. 160. J. culmo compresso; fol. planiusculis, trinerviis; anthela supradecomposita, erecta; perianthii laciniis exterioribus obtusiusculis, interioribus longioribus, obtusis, capsula obovata brevioribus; staminibus 5. Meyer Syn. p. 55. n. 52. Luzul. p. 52. J. culmo erecto, compresso, foliato, basi bulboso; fol. subplanis, lineatis; panicula simplici v. supradecomposita; spicis 5-6-floris; perig. foliolis oblongis: exterioribus aristatis paulo brevioribus; interioribus obtusis, capsulam globosam aequantibus; stam. 5; antheris rubris. a panicula supradecomposita, pyramidalis; culmo erecto. Laharpe l. c. p. 147. (excl. syn. *J. biflori Ell.*) *J. aristatus Pers. Syn. 1. p. 585. J. triglumis**

Walt. Carol. p. 124. (teste *Elliott*). *J. bulbosus Walteri Bosc* (fid. *Meyer*). β paniculâ 2-4-stachyâ; flor. majoribus. *J. aristulatus. \gamma* *Laharpe* l. c. ad herb. *Decand.*

Similis *J. compresso Jacq.*. Culmi erecti, gracillimi, fere filiformes, $1\frac{1}{2}$ ped.. Folia alterna, angustissima, vix longitudine internodiorum. Panicula terminalis mediocriter ramosa. Pedunculi setacei. Flores in capitulis sessiles. Bracteae acuminatae. *Poir.*. Lacinae exteriores margine lato tenuissimo cinctae. *Meyer*. Antherae violaceae. *Laharpe*. *Link* in *Enum.* p. 306. *J. aristatum Mich.* ad tenuem *Willd.* ducit. *Darlington Flor. cest.* p. 43. cum? *Sprengel* vero *S. V.* II. p. 105. huc cum *Torrey Fl. n. et m. s. U. St.* p. 562. traxit sine dubio *J. marginatum Mühlenb.*, qui *marginatus Rostk.* In demissis *Georgiae et Carolinae.* 4.

65. *J. marginatus Rostk.*; foliis planis, glabris; corymbo terminali, simplici, prolifero; capitulis sub-10-floris; calyce capsulam obtusam aequante. *Rostk. d. Junc.* 30. t. 2. f. 3. *Pursh Sept. Am.* p. 256. *Mühlenb. Desc. ub.* p. 202. *J. culmo compresso; fol. planiusculis trinervibus; anthelâ compositâ, subpatente; perianthii laciniis ovato-oblongis, obtusis; interioribus longioribus, capsulam subgloboso-obovatam vix superantibus; stam. 5. Meyer Syn.* p. 55. n. 55. *J. aristulatus \beta* paniculâ simplici, culmo flaccido, subnutante. *Laharpe* l. c. p. 146. (qui cum? citat *L. angustifoliam Poir. Enc.* III. p. 550.) *J. triandrus Herb. Bosc.* *LUZULA juncoides Poir. Enc. Suppl.* III. p. 535. $\beta?$ odoratus; culmo elato, subtereti, folioso; paniculâ valde ramosâ. *Torrey Fl. n. et m. U. St. I.* p. 362.

Rad. bulbosa et tuberosa. Culmus $1\frac{1}{2}$ ped., compressus, foliosus. Folia radicalia plana, linearia, superiora alterna, canaliculata planaue, glabra. Vaginae glabrae. Panicula terminalis subcorymbosa, erecta, superans bracteam, glomerulis 5-10-floris, fuscis. Bracteolae 2 ovatae, acuminatae. Calycis foliola alterne minora, aristata, reliqua obtusa, marginata. Antherae 5 luteae. Stylus brevissimus. Caps. obtusa, 3 loc., 3 valv., calyci aequalis et parum major. Semina plura flavescentia minima, utrinque acuta. Variat glomerulis 2 alternis pedunculatis, bracteâ paniculâ brevioris. *Mühlenb.* l. c. qui *aristulato* affinem dicit. In specimenibus in *Herb. Schreber*: radix bulbillis magnitudine seminis *Cannabis* fibrisque albidis. Culmi stricti, rarius quidquam flexi, laeves, crassitie pennae corvi. Folia caulina in junioribus stricta, serius laxa, plana, linearia, acuta, trinervia: nervo medio fortiori, $2\frac{1}{2}$ -4 poll., lin. lata. Vaginae arctae, inferiores laxiusculae, dorso striâ longitudinali e nervo medio protenso; margine membranaceae, apice ligulâ brevi obtusâ. Panicula primum erecta, serius quidquam patens, 1- $2\frac{1}{2}$ poll., involucrum paulo superans; rami 5-6, compressi. Capitula magnitudine *Pisi* majoris, fructifera subglobosa, sessilia pedicellataque. Involucrum 1-phyllum, foliis simile; bracteae ad ramos lanceolatae, subulato-acuminatae, fuscae; bracteolae ovatae, acuminatae, carinatae, diaphanae, fuscescentes, dorso intensius coloratae. Calycis foliola exteriora lanceolata,

obsolete striata, apice margine membranacea et aristulata: aristulâ in fructiferis magis obsoletâ, fuscescentia, interiora longiora oblonga, obtusa, dorso viridia, dein fusca et inde margine lato albido cincta, longitudine capsulae vel paulo longiora, $1\frac{1}{2}$ lin.. Stamina calyce duplo breviora. Antherae filamentis paulo longiores flavae. Capsulae subglobosae, obtusissimae, lucidae, nitidae, pallide fuscae, purpura maculatae. In β , quod ipsi *Torrey* dubium: culmus 2-ped., leviter compressus. Folia ped. et ultra, 2 lin. lata, omnia plana glaberrima. Panicula terminalis, subcorymbosa, valde ramosa. Capitula numerosissima, his vel ter prolifera. Cal. foliola inaequalia, capsulâ potius breviora: exteriora lanceolata, subaristata; interiora obtusa, margine scariosa. Stam. 5. Caps. subglobosa, obtusissima. Sem. numerosissima, flava, utrinque attenuata, striata. Vanillam spirat. *Torrey*. In collibus siccis Pennsylvaniae, β in sylvis udis prope Novam Caesaream. 4.

Obs. Cls. *Meyer* in *Syn. Luzul.* p. 24. ad *J. marginatum*, et cl. *Laharpe* l. c. (fid. specim. auct. in herb. *Desf.*) ad *J. aristulatum* β (*J. marginatum* *Rostk.*) citat *Luzulam juncoidem*; caule compresso, rigido foliisque glabris; corymbo subdecomposito; floribus subaggregatis solitariisve, subpedicellatis (sessilibusve). *Poir et Enc. Suppl.* III. p. 535., quae secus *Bois*: „media *Juncos* inter et *Luzulas*, et ulteriore examine digna, cum capsulae defuissent. Culmi striati, pedales et ultra, glaberrimi. Folia ad basin speciem bulbi sistunt, recta, rigidissima, angusta, crassa, dura, saepius involuta, striata, 8-9 poll., obtusa vel acutiuscula. Corymbi basi bractea parvâ, subulatâ, dilatatâ, basi striatâ. Pedunculi apice in pedicellos breves divisi, floribus rubellis, saepe binis ternisve. Calycis foliola ovata, acutiuscula. Stam. 3.“ In *Carolina*.

66. *J. planifolius* *R. Brown*; culmo nudo; foliis radicalibus planis, linearibus; cymâ terminali compositâ et decompositâ; floribus capitatis, triandris; capsulis triquetris, mucronatis, basi trilocularibus, perianthium acutum vix aequantibus; involucreo subdiphylo, plano. *R. Brown Prodr. nov. Holl.* p. 259. *Meyer Syn.* p. 56. n. 54. *J.* culmo erecto, nudo, compresso; fol. gramineis; paniculâ subcompositâ; spicis 6-10-floris; perig. foliolis aequalibus, oblongis: exterioribus mucronatis; interioribus obtusiusculis, capsulam ooidem aequantibus; stam. 3. *Laharpe* l. c. α paniculâ compositâ; fol. praelongis. β paniculâ simplici, fol. abbreviatis. *Laharpe* l. c.

Repens. Culmi plures, stricti, glabri, teretes, striati, basi foliosi vaginatique, spithamaei. $1\frac{1}{2}$ ped.. Folia radicalia plura, vaginantia, erecta, culmo breviora eumque aequantia, planiuscula, e basi dilatata vaginante linearia, acuta, glabra, striata nervosaque, basin versus purpurascens, 1-3 lin. lata; foliorum vaginae laxae, sat longae, glabrae, striatae, margine membranaceae, purpurascens; ligula nulla; subinde ad basin culmorum vagina pollicaris, aphylla, laxa, ovato-lanceolata, setaceo-acuminata, purpurascens, apicis medio diaphana, striis 2 marginalibus purpurascens. Cyma decomposita et omnino simplex; radii 3-9, erecti, inaequales, $\frac{1}{2}$ -2 poll., simplices vel iterum cymosi; capitula magnitudine Pisi, 2-10-flora. Involucrum foliola inaequalia, subplana, erecta, acuta, basi dilatata fuscescente; altero 8-18 lin., altero triplo brevior. Bractea sub cymae ramis ovato-lanceolatae, acuminatae, nervo medio carinatae, fuscescentes, membranaceae; bractea interiores his similes, magis acuminatae,

margine diaphanae. Cal. foliola ovato-lanceolata, concaviuscula, carinata, exteriora acutiora et paulo breviora, fusco-purpurascencia, margine albo membranaceo, dorso virescente. Stamina 5, calycem subaequantia. Antherae flavae, filamentis triplo breviores. Capsulae fuscae, glabrae, nitidae, calycem subaequantia, ovato-triquetrae, mucrone brevi, erecto. Semina oblonga, acuta, fusca. Habitus *LEZULAE erectae*. Ad specimina in Herb. Sieber. In *insula van Diemen, in nova Hollandia.* 4.

67. *J. capitatus* Weig.; culmo erecto, simplici, basi folioso; foliis setaceis, canaliculatis; capitulo uno alterove laterali aut terminali; staminibus 5; calyce carinato, setaceo-acuminato, capsulam duplo excedente. *Smith Engl. Fl.* II. p. 170. *Weig. Obs.* 28. t. 2. f. 5. *Ehrh. Culam.* 8. *Willd. Spec.* II. p. 209. (synonymis plerisque dubiis). *Hook Scot.* 106. (*J. culmo foliisque subsetaceis strictis; corymbo suprafastigiato, capitulis subcomposito; perigonii laciniis exterioribus acuminatis, interioribus brevioribus, acutis, capsulam ovatam, acutam trilocularem superantibus.* *Meyer Syn.* n. 55. p. 36. *J. culmo exiguo, setaceo, erecto, nudo; foliis canaliculatis, setaceis; spicis subsolitariis, 4-10-floris; perig. foliolis acuminatis, pelucidis, interioribus brevioribus capsulam subglobosam retusam superantibus; stam. 5.* *Laharpe l. c.* p. 144. (excl. syn. *Cav.*) *Gaud Agr. helv.* II. p. 219. *Balb. Misc. alt.* p. 15. (fid. specim. apud *Bertol.*) *Savi bot. Etr.* II. p. 69. (excl. syn. *Cav.*) *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 584. (excl. syn. *Pav.*) *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 85. *Sturm Deutsch. Fl.* 13. t. 7. *Fl. Dan.* t. 1690. *Schkuhr Handb.* 1. p. 302. t. 98. b. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 216. (quo teste: *J. bufonius* δ *Retz. Scand.* ed. 1. p. 65.) *J. gracilis* β *capitatus* *Roth Germ. T.* II. p. 402.) *J. supinus* *Bichenov Trans. Linn. Soc.* XII. 317. (corr. syn.) *J. stellatus* *Soland.* *J. tenellus* *van Geuns* apud *van Hall. Fl. Belg. sept.* p. 290. *J. ericetorum* *Balb. Fl. Lyon.* 1. 2. p. 739. (excl. *Cavan.*) *J. ericetorum* β *capitatus* *Gmel. Fl. bad.* II. p. 72.) *SCHÖNUS minimus* *Forst in Sym. Syn.* 197. (*SCHÖNUS ferrugineus* *Krock er Siles.* t. 8.) *J. foliat. minimus* *Bauh. Hist.* II. 523. f. β capitulo solitario sessili. *Meyer l. c.* *J. ericetorum* *Poll. Pal.* n. 350. *Decand. Fl. fr.* III. p. 165. *J. triandrus* *Gouan Monsp.* p. 25. *J. gracilis* *Roth Germ.* II. p. 402. *Ejusd. Catal.* 1. p. 45. *Brot. Fl. Lusit.* p. 512.? *J. mutabilis* α *Lam. Enc.* III. p. 270. (partim. sec. *Laharpe.*)

Nunc solitarius, nunc valde cespitosus. Rad. fibrosa, annua, ut videtur, simplex, nec repens, nec bulbosa; fibris glabris. Culmi solitarii pluresve e radice, 1-4 poll., simplices, stricti, glabri, angulares, striati, basi sola foliosi. Capitulum pollicis ab apice distantia, raro in luxuriante capitula 3. Folia plura radicalia, vaginantia, erecta, culmo triplo breviora, tenuissima, acuta, subtus convexa, basi vaginantia, margine membranacea. Bractea

una alterave sub singulo capitulo, similis foliis, sed brevior, basi dilatata, concava: bracteae interiores 3-5 sub singulo capitulo, patentibus, lanceolatae, acutae, membranaceae, carinatae, calyce breviores. Flores 2-5, subinde 10 et plures in capitulo singulo congesti, undique patentibus. Calycis foliola ovato-lanceolata, concava, eximie carinata, membranacea, dilute fuscescentia, nervia: carinam viridi, firmam, in setam terminatam; tria interiora minoribus, tenuioribus. Filamenta 3 brevissima, calycis foliolis exterioribus opposita. Antherae oblongae, erectae. Caps. globoso-triangularis, membranacea, obtusa. Semina minima, oblonga, striata.

Smith E. F., qui hanc speciem saepissime commutatam fuisse conqueritur. β nonnisi culmis 1-poll., capitulis solitariis, saepius minimis, differt.

In siccis arenosis Europae a Britannia ad Lusitaniam; in Volhynia, Bess.; in bor. Africa. ☉.

Obs. *Cls. Meyer* huc ducit *J. mutabilem* β *Lam.*; sed ex allatis a *Lamarck* synonymis *Hairi* et *Morison* a *Smith* ad *uliginosum* ductis dubius et potius ad *J. uliginosum* spectare videtur. Confer *J. pygmaeum*.

68. *J. pygmaeus Thuill.*; cespitosus; foliis lineari-setaceis; capitulis pedunculatis: primario sessili; flosculis linearibus, obtusis. *Thuill. Fl. par.* 1. p. 178. *J. annuus*; scapo foliisque planis subsetaceis; anthelam capitulis subcompositam; perianthii laciniis subaequalibus, acutiusculis, capsulam pyramidatam subunilocularem superantibus; staminibus 3. *Meyer Synops.* p. 57. n. 56. *J. culmo foliisque erectis, compressis, setaceis; paniculam simplici subdistachyam; spicis 4-8-floris; perig. foliolis aequalibus, lanceolatis, acutiusculis, capsulam oblongam attenuatam obsolete trigonam longioribus.* *Laharpe l. c.* p. 142. (excl. syn. *J. fasciculati Meyer*). *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 168. *J. pygmaeus (pallens) Pers. Syn.* 1. p. 584. *J. mutabilis* α *Lam. Enc.* III. p. 270. *J. nanus Dub. Orl.* 297. *J. foliatus minimus Bauh. Hist.* II. 255. (*a Smith ad capitatum*).

Distincta videtur species clo. *Lamarck* l. c. habitu et floribus longioribus pallidis. Radix fibrosa. Culmi 2-2 $\frac{1}{2}$ poll., graciles, filiformes, cespitosi et saepe etiam simplices, nudi, capitulo solitario. In culmis apice divisus capitula in ramis terminalia et aliud in dichotomia sessile: bracteam setaceam sub quavis dichotomia. Capitula 4-flora et ultra, basi squamis brevibus, obtusis, scariosis. *Lam.*, qui sec. *Laharpe* sub *J. mutabili* α *capitatum* et *pygmaeum* confudit. „Folia in speciminibus majoribus semper semiteretia, valde compressa, diaphragmatibus distinctis; stamina 6, quamvis in minoribus semper 3. Culmus unifolius, folio unico ad basin. Panicula e bifurcatione culmorum oriens, plerumque spica terminalis solitaria. Flores magni. Differt a *J. uliginoso* culmis semper erectis simplicibusque, perigonio capsulam superante. Vix cum *J. capitato* confundendus, cujus perigonii foliola inaequalia et capsula turbinata: *Laharpe*, qui *J. fasciculatum* tantum specimen majus *J. pygmaei* dicit, quod nobis haud ita. *In pratis siccis montosis et in paludosis prope Lutetias, Monspe- lium; in Hispania.* ☉.

Obs. „*J. mutabilis* (humilis, cespitosus; culmis subfoliosis; foliis eanaliculatis; floribus congestis, sessilibus), *Cavan. ic.* III. p. 49. t. 296. f. 2. non est *Lamarck* species, quod contendit *Willdenow Enum. h. berol.* sub *J. capitato*.

An vero ad *capitatum*; an potius ad *pygmaeum* pertineat, difficile dictum est. Capsula enim 1-locularis *pygmaeum*, habitus, perianthium inaequale et patria *capitatum* esse suadent. Meyer. Cls. *Laharpe* eundem sine dubio laudat ad *J. capitatum*; sic etiam *Sprengel*; *Poiret* non nisi *excl. synonymis*, uti etiam *Lam.* et *Dæc. Fl. fr.* III: p. 164, sub *J. ericetorum*. *Cel. Smith* in *Engl. Fl.* II. p. 172, *J. mutabilem Cav. capitato* valde similem, sed ob stamina 6 et calycem diversum dicit. Sic etiam nobis videtur, ita ut eundem potius *J. pygmaeo* accensendum esse credamus. *Cavanilles* (qui *J. mutabilem Lam.* et *J. foliat.* minimum *Bauh.* instar synonymorum laudat) plantam suam sequentibus describit: „rad. capillaris, brevis. Culmi numerosi, 2 poll., basi folio uno vel altero, apice florum capitulo terminati. Folia fere omnia radicalia, poll., sensim graciliora, apice acutissima; culmea similia, quidquam vaginantia. Flores capitati, sessiles, 4-6 in singulis capitulis, horum basis foliolo setaceo suffulta et squamulis 2 pellucidis. Cal. foliola oblonga, carinata, acutissima. Filamenta 6, brevia, inter calycis foliola et germen inserta, antherae erectae. Stylus brevis. Stigmata 3, longiora, filiformia. Caps. ovato-triquetra, trivalvis, 1-locularis. Sem. minuta, obovata. In agris arenosis inter Valentiam et Saguntum.“ ☉. *Villars* in *Cat. meth. Strasb.* p. 81. *J. pygmaeum Fl. fr.* ad suum *J. triandrum* (qui *uliginosus β*) duxit.

69. *J. bicephalus Viv.*; caule folioso, abbreviato; foliis lineari-filiformibus; floribus capitatis, capitulo sessili pedunculatisque; perigonio cylindraceo, stricto; sepalis multinerviis, aequalibus, acutis, capsulâ acuminatâ longioribus. *Bertol. in litt.* *J. culmo adscendente, folioso; foliis lineari-filiformibus; capitulo terminali alioque laterali; foliis calycinis omnibus lineari-lanceolatis, nervosis, aequalibus, cylindricis, conniventibus. Viviani Fl. Cors. Diagn. p. 5. Laharpe l. c. p. 70.*

Caulis 1-poll.. Folia caulina basi dilatata, vaginantia, reliquâ parte lineari-filiformia. Capitula nunc 2 tantum: sessili pedunculatoque, nunc 3, uno sessili, 2 pedunculatis. Flores numerosi in quovis capitulo, virentes, demum pallentes cum aliqua rubedine. Perigonium strictissimum, cylindriforme, 3 circiter lin.. Sepala lanceolata, longitudinaliter multistriata, capsulam trigonam acutam superantia. *Bertoloni in litt.* Forte ad *J. pygmaeum* pertinet. *Laharpe. In Corsica, prope Bonifacio.* ☉.

70. *J. repens Mich.*; culmo repente, radicante, foliato, geniculato; foliis canaliculatis; paniculâ 3-5-stachyâ; spicis 8-10-floris; perigonii foliolis inaequalibus, linearibus, acutissimis, interioribus multo longioribus capsulam trilocularem lineari-oblongam muticam paulo superantibus; staminibus 3. *Laharpe l. c. p. 145. Mich. Fl. bor. Am. 1. p. 191. Pursh Fl. Sept. Am. 1. p. 238. CEPHALOXIS flabellata Desv. Journ. d. Bot. 1. p. 524. t. 11. Reliqua in Mantissa in Vol. II. Syst. Veg. ed. nostr. p. 44.*

Obs. Genus *CEPHALOXIS Desvaur* et *Meyer*, quod columellae centrali, cui semina affixa, innititur, non esse separandum a *Juncis*; cum columella haecce nil aliud nisi placentae 3 in dissepimentis a basi ad medium fere usque capsulae coalitae: supra medium vero liberae. Madefactâ capsulâ solvuntur placentae, et columella disparet. *Laharpe l. c.*

71. *J. cyperoides Laharpe*; culmo erecto, compresso; foliis planis, subnervosis; culmis 3-5; paniculâ compositâ, erectâ, sublaxâ; spicis 5-10-floris; perigonii foliolis aequalibus, lineari-lanceolatis, acutis, capsulâ pyramidatâ triquetra brevioribus; staminibus 3. *de Laharpe Monogr. in Mem. d. l. Soc. d'Hist. nat. T. III. p. 145.*

J. repenti, *bufonio* et *sinensi* affinis. Rhizoma verisimiliter nullum. Culmus 3-6-nodis, 4-6 poll.. Folia flaccida, acuta, internodio longiora. Panicula folio florali sublongior; spicis pallescentibus. Perigonii foliola substriata, virescentia. Stam. 3; filamentum antheram vix superante. Caps. pyramidata, basi subdilata, acuta, pallide fusca, perigonio triente fere longior. Semina ooidea. *Laharpe. In America meridionali. Herb. Decand. ☉.*

b. . . h e x a n d r i :

72. *J. graminifolius Meyer*; culmo ramoso, diffuso; foliis planis, flaccidis, enervibus; anthelâ decompositâ; perianthii laciniis subaequalibus, lanceolato-acuminatis, capsulâ triquetra - ellipticâ mucronatâ subuniloculari brevioribus. *Meyer in Reliqu. Haenkean. Fasc. II. p. 144.*

J. repenti Mich. (*Cephaloxi flabellatae Desv.*) adeo similis, ut pro eodem habuerim usquedum specimina plura perfectioraque vidisse contigit. Differt autem a *J. repente*: fol. enervibus nec manifeste 3-nervibus, anthelâ decompositâ supradecompositâque, nec simplici; perianthio multo minori subaequali, nec laciniis interioribus duplo fere longioribus; stam. 6, nec 3, praecipue vero capsulâ non prismaticâ perianthio brevior, 3-loculari, sed triquetra-ellipticâ, mucronatâ, perianthium excedente, sub 1-loculari; dissepimentis medio non cohaerentibus, sed ne contiguis quidem. *Meyer. In montanis Peruviae Huanoccensis. Haenke et Chamisso. ☉? 4.?*

73. *J. plebejus R. Brown*; culmo teretiusculo, simplici, basi folioso; foliis angustissime linearibus, carinatis; cymâ terminali, dichotomâ, involucrum diphyllum vix aequante; floribus binis ternisque subulatis. *R. Brown prodr. Fl. n. Holl. p. 259. Meyer Syn. p. 38. n. 38. Laharpe l. c. p. 149.*

Facies *J. bufonii*. Conf. etiam *J. bicornem Mich. Brown l. c.* In speciminibus a *Sieber* lectis, quae nobis omnino tam a *bufonio*, quam a *bicorni* differre videntur: culmus erectus, gracilis, teres, laevis, spithamaeus, pallidus. Folia ad basin culmorum 3-4, rarius unum vel alterum in culmo, subfiliformia, laxa, erectiuscula, acuta, canaliculata, carinata, striata, glabra, culmo duplo breviora eumque subaequantia, 5-8-poll.; vaginis arctis, pallidis, obsolete striatis, margine late membranaceo diaphano utrinque in ligulam brevem obtusam desinente. Cyma terminalis dichotoma vel ramis 3 cum floribus aliquot in dichotomia sessilibus, pauciflora: rami erecto-patentes, teretes, laeves, $\frac{1}{2}$ -1 poll.. Involucrum folia 2 inaequalia: longius e basi vaginante brevi foliiforme, canaliculatum, subfiliforme, cymâ duplo longius, erectum vel subinflexum; alterum simile, sed cymâ brevius; bractee sub floribus 2 ovatae, acuminatae, concavae, appressae, albidae, diaphanae, floribus triplo breviores. Flores plerumque terni, rarius bini; medius erectus, subsessilis; laterales horizontaliter patentes, pedicellati. Calycis foliola inaequalia: exteriora firmiora, longiora, capsulam superantia, lanceolata, subulato-acuminata, striato-nervosa, margine vix membranacea, pallida cum purpura levi suffusa, $2\frac{1}{2}$ lin. longa; interiora ejusdem formae, breviora, capsulam aequantia, tenuiora, pallidiora, margine membranacea, dorso nervosa. Capsulae ovatae, acutae, trigonae, flavescentes,

glaberrimae, longitudine foliorum internorum calycis, 2 fere lin. longae. Semina minuta, ovata, obtusa, subtrigona, striata, intense fusca. *Prope Port Jackson Novae Hollandiae.* ☉

74. *J. bufonius*; culmo folioso; foliis angulatis, canaliculatis; paniculâ dichotomâ, racemosâ, bracteis longiore; calycis foliolis lanceolatis, attenuato-acuminatis, membranaceis, binerviis, capsulâ oblongâ longioribus. *Smith Engl. Fl.* II. p. 158. *Fl. brit.* 381. *Engl. Bot.* t. 802. *Bichenov Trans. Linn. Soc.* XII. 311. (*Rostk. d. Junc.* p. 20. *J. culmo subramoso aut subsimplici, filiformi; foliis planiusculis, angustissimis; corymbo suprafastigiato, elongato, floribus distantibus composito; perigonii laciniis lanceolatis, acuminatis: exterioribus longioribus capsulam oblongam obtusam superantibus; staminibus plerumque 6. Meyer Syn.* p. 39. et in *Reliq. Haenkean. Fasc.* II. p. 144. *J. culmis diffusis, subunifoliatis; foliis compresso-canaliculatis; paniculâ irregulari, subcymosâ, laxâ; floribus secundis; perig. foliolis lineari-lanceolatis, acutissimis, inaequalibus: exterioribus longioribus, capsulam retusam superantibus; stam. 6. Laharpe l. c. p. 152.) *Linn. Spec.* 466. *Willd. Spec.* II. p. 214. *Leers herb.* 89. t. 15. f. 8. *Ehrh. Calam.* 96. (*Gmel. Sib.* 1. p. 67. n. 30. *Roth Germ.* II. 408. *Enum. pl. germ.* I. 2. p. 86. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 583. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 216. *Desf. Fl. atl.* 1. p. 314. *All. Fl. pedem.* n. 2079. *Savi Bot. Etr.* 1. p. 115. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 167. *Gaud. Agr. helv.* II. p. 229. *Sebast. et Maur. Prodr. Fl. rom.* p. 132. *Pursh Fl. sept. Am.* 1. p. 238. *Torrey Fl. n. et m. U. St.* 1. p. 365). *Fl. Dan.* t. 1089. *Rose's Bot.* 452. t. 2. f. 5. (*Host Gram.* III. t. 90. *Sturm Deutsch. Fl.* 36. H. n. 12.) *Hall. Helv.* n. 1519. *Moris. S.* VIII. t. 9. f. 14. *Gr. junceum Ger. Em.* 4. f. *G. bufonium Barrel. ic.* t. 263. 264. *Hol. Matthioli Lob. ic.* 18. f. β *Gr. junceum minimum, Holost. Matth. congener Park. Theat.* 1270. f. (Smith). γ *G. holost. min. alpin. Bauh. pin.* 7. *prodr.* 64. *theat.* 101. *J. bufonius* ϵ *Linn. Spec.* l. c. δ *flor. fasciculatis. J. mutabilis Savi Fl. pis.* 1. p. 364. (fid. specim. apud Bertol.; Meyer l. c. ad *J. bufonium* γ suum: nanum robustiorem, anthelâ abbreviatâ, ducit cum?, sine dubio vero eidem subjungitur ab illo: *J. hybridus Brot. Fl. lusit.* 1. p. 513. et *J. congestus Schousb. in Herb. Agardh.*) *J. bufonius* γ *Laharpe. J. pygmaeus Savi Bot. Etr.* II. p. 69. n. 354. (excl. syn. *Moris.*) *J. bufonius* β *fasciculatus Jan Elench.* *Gr. buf. glomeratis articulis Barrel. ic.* 94. (male, Bertoloni). ϵ *viviparus; floribus in fasciculos foliorum excrescentibus. Brot. Fl. lus.* p. 514. ζ *anthelâ longissimâ procumbente. J. buf. β Gmel. bad. Roth. Enum.* I. 2. p. 87. η *radice tuberosâ,**

pendulâ. *van Hall. App. n. 13. Fl. Belg. Sept. p. 290.* (cultura persistens). η *congestus*; floribus plerumque ternis. *Wahlberg Fl. Gothob. p. 38. J. bufonius Liljebl.* ι . *grandiflorus*, major; floribus solitariis geminisque duplo fere majoribus. *J. bufonius Thunb. Fl. cap. ed. Schult. p. 337.*

Rad. fibrosa, fibris tenuissimis. Herba pallide virens, in β rufescens. Culmi plurimi, cespitosi, erecti vel patentes, 3-12 poll., „(subinde pollicares)“ teretes, glabri, apice ramosi, subpaniculati, basi praecipue foliosi. Folia linearia, angusta, nervosa, acuta, basi dilatata. Bracteae valde graciles, erectae. Paniculae ramis multis, laxis, elongatis. Flores subsessiles, plerumque solitarii, erecti, pallidi et quasi argentei, basi bracteis 2-3 albis, pellucidis. Calycis foliola nervis 2, plus minus distantibus, subinde carinâ intermediâ, dorso virentia, margine lato, membranaceo, splendente. Caps. elliptico-oblonga, triangularis, rubrofusca, obtusa. „(Stigmata 3 albicantia.)“ In γ e monte St. Bernardi capsula calycis fere longitudine. Germinando semina e solo levantur, et speciem Musci cum capsulis sistunt (confer Rose); pro cryptogamo etiam *Weigel Obs. 36. t. 2. f. 7.* (Isoëre lacustri, monente *Meyer*) descripsit. *Smith Engl. Fl. p. 215.* Anne huc etiam ille *Pinheaded Cobweb Mushroom Pet. gaz. 51. f. 7.?* — Confer elegantissimam iconem apud *Mirbel Annal. d. Mus. XVI. t. 16.* Longitudo calycis foliolorum valde variat; foliola plerumque capsulâ $\frac{1}{3}$ longiora, in solo fertiliori subinde duplo longiora; in steriliore capsulam aequantia eâque breviora. *M. et Koch et nos.* δ . distincta a *J. pygmaeo Thuill.*, quia omnibus partibus major, et praecipue floribus, quibus foliola calycis alterne longiora, 3 exteriora acuminata, interiora tantum acuta; nec omnia aequalia, acuta. *Bertol. in litt.* Nobis δ majore fors jure, quam aliae Junci species, species videtur propria; capsula oblonga, obtusa cum mucronulo brevissimo, basi attenuata, triangularis, calyce brevior, pallide fusca. In ϵ habitus speciminum majorum; culmus 8-poll.; panicula 4 fere poll.; flores solitarii vel gemini, breviter pedicellati; cal. foliola pallide viridia, capsulam duplo fere superantia; exteriora multo longiora 3-5 lin., longissime acuminata; interiora late diaphano-membranacea, $2\frac{1}{2}$ -3 lin.. Reliqua ut in planta europaea. Ad specim. capense in herb. cli *Steudel.* An huc forte *J. bufonius?* *Burchell?* In aquis, inundatis sabulosis totius Europae, Tauriae, Sibiriae, Americae septentrionalis, in montanis Peruviae *Haenke*; δ in Italia, Sicilia, Hispania et Africa boreali; β in Belgio; η in Suecia; ι in Prom. b. spei. ☉.

Obs. J. hybridus Brotero; culmis subdichotomis, erectis; folio infimo subulato, culmum excedente; capitulis axillaribus et terminalibus; floribus subsessilibus. *Brotero Fl. lusit. p. 513.* sequentibus describitur l. c.: „Habitum nimis similis *bufonio*, cujus hybrida proles et forte varietas: minor, minus ramosus; culmo semel aut bis bifurcato, floribus 6-10 glomeratis, aliis sessilibus, aliis pedicellatis; pedicellis inaequalibus, brevissimis, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ lin. longis, cymam s. fasciculum capituliformem efformantibus. Flores et capsula ut in sequente; sed paulo minores. Bracteae similes: una aliave major ad basin capituli, flores tamen non excedens.“ In udis circa Conimbricam et alibi in Beira. ☉. *Sprengel S. V. II. 109. J. parviflorum Poir., proliferum Kunth et plebejum R. Br.* cum *bufonio* conjungit. Quas *Linnaeus* statuit varietates: β *G. nemoros.*, calyculis paleaceis repens. *Scheuchz. Gram. 319.* γ *Gr. nem.* cal. pal. species altera procerior. δ *Gr. bufon.* erect. angustif. majus. *Barrel. ic. 244.*, nullius momenti sunt, cum diversae tantum culmi longitudini innitantur. *Bert. in litt.*

75. *J. insulanus Viv.*; caule folioso; foliis lineari-fili-

formibus; umbellâ decompositâ, pauciradiatâ; floribus terminalibus, fasciculato-subternis, axillari solitario; sepalis capsulâ obtusâ longioribus. *Bertol. in litt.* J. decumbens; fol. filiformibus, culmo folioso subaequalibus; paniculâ umbellatâ; floribus nonnullis sessilibus; pedunculis unifloris quadriflorisve; calycis foliolis 5 exterioribus mucronatis, tria interiora inermia capsulamque superantibus. *Viv. Fl. Cors. Diagn.* p. 5. *Gusson Prodr. Fl. sic.* 1. p. 436. *Pl. rar.* p. 149.

Caulis digitalis - spithamaeus. Umbella terminalis, 2 - 3 radiata, rarius ultra; uno alterove radio iterum bifido. Flos solitarius subsessilis in centro umbellae et in divisione radiorum, at in eorum apice semper flores 2 - 3 fasciculati, subinde alter flos solitarius subsessilisque infra apicem. Sepala lanceolata, uninervia, albivirentia; exteriora 3 paulo longiora acutiora. Caps. oblonga, obtusa cum mucronulo, sepalis brevior. Accedit ad *J. bufonium*, sed diversus floribus terminalibus semper congestis. *Bertol. in litt.* Forte *J. bufonii* varietas. *Laharpe.* In Italia, Sicilia, Corsica. ☉.

76. *J. prolifer* *Hamb. et Bonpl.*; culmo foliato, compresso?, erecto; foliis linearibus, subplanis, glabris; corymbo terminali, diffuso, involucrato; floribus solitariis, sessilibus, distantibus; laciniis calycinis acuminatis, exterioribus duplo longioribus; capsulâ obovatâ, triquetrâ, acutâ. *Hamb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth* III. p. 256. *Meyer Syn.* p. 41. n. 40. *J. bufonius* β paniculâ patentissimâ, diffusâ, foliosâ. *Laharpe l. c.* p. 153. (partim.) *J. inaequalis* *Herb. Willd. MS.* (fide *de Schlechtend. fil.*).

Pedalis, habitu *J. bufonii*. Rad. fibrosa. Culmus glaber, fuscescens. Folia filiformi-linearia, culmum subaequantia, striata et glabra, uti vaginae virides, margine diaphanae, $\frac{1}{2}$ - 1 poll. Corymbus dichotomus, valde diffusus. Involucrum diphyllum, foliolis inaequalibus, similibus foliis, corymbo longioribus. Flores terminales, laterales et alares, basi bractea ovatâ, obtusiusculâ, concavâ, tenuissime membranaceâ, fuscescente, glabrâ. Bractee sub calyce 2, oppositae, calyce quadruplo breviores, subrotundae, acutae, concavae, glabrae, subdiaphanae, fuscescentes. Cal. laciniis lineari-lanceolatis, virentibus, margine diaphanis, albidis, glabris. Stam. 6, uno alterove abortivo. Caps. fusca, glabra, lacinias interiores longitudine subaequans. Semina minuta, oblonga, fusca. *Kunth l. c.* Synonymon esse *J. bufonii* *Meyer Syn. Luz.* p. 33. *Cls. Laharpe* (qui specimen in *Herb. Kunth* vidit) varietatem β inde constituit, ad quam etiam *J. foliosum* *Desf.* ducit; sed in *prolifero* capsula acuta, cum in *bufonio* obtusa vel retusa. In temperatis Andium *Quinduensium* prope el *Passo de Machin.* ☉.

77. *J. foliosus* *Desf.*; culmo nodoso, ramoso, folioso; foliis canaliculatis; paniculâ terminali erectâ; laciniis calycinis aciformibus. *Desfont. Fl. atl.* p. 513. t. 92. *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 157. *Meyer Syn.* p. 44. n. 45. *J. bufonius* β *Laharpe l. c.* p. 153. (partim).

Culmi subinde simplices, plerumque ramosi, erecti, striati, 2 ped.
Folia mollia, glabra, laevia, subulata, basi vaginantia. Panicula decomposita. Pedunculi filiformes, inaequales, saepe dichotomi, vaginis parvis, acutis, lanceolatis, interioribus brevioribus. Flores *J. bufonii* fere: centrales sessiles aut brevius pedunculati; terminales solitarii geminive. Involucrum universale e foliolis duobus inaequalibus, subulatis, non pungentibus: minus longitudine ad minimum paniculae. Squamae ovatae 2 membranaceae ad basin calycis.
Desf. In paludibus Algeriae.

78. *J. Tenageja Ehrh.*; culmo folioso, subramoso; foliis linearibus, canaliculatis; paniculae ramis bifidis, multifloris; petalis acutis, longitudine capsulae subrotundae, obtusae. *Rostk. d. Junc. p. 22. n. 16.* *J. culmo subramoso aut simplici; foliis planis, angustissimis; corymbo suprafastigiato, elongato; floribus distantibus; calycis foliolis ovatis, acutis, mucronatis, capsulam subglobosam parum superantibus. Meyer Syn. p. 41. n. 41.* *J. culmo erecto, tereti-compresso, tenui, foliato; foliis setaceis, canaliculatis; paniculâ compositâ, laxâ, umbellatâ; floribus remotiusculis, parvis; perigonii foliolis aequalibus, lanceolato-oblongis: exterioribus mucronatis, interioribus obtusis, capsulam ovoideam retusam aequantibus; staminibus 6. Laharpe l. c. p. 152. Willd. Spec. II. p. 213. Ehrh. Phytoph. n. 63. Linn. Suppl. 208. Roth Germ. II. p. 409. Enum. pl. germ. I. 2. p. 88. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 582. Wallr. Sched. crit. p. 145. Gaud. Agr. helv. II. p. 230. Decand. Fl. Fr. III. p. 167. Host Gram. III. t. 91. Fl. Dan. t. 1160. Sturm Deutsch. Fl. 10. H. Drev. et Hayne t. 25. Vaill. Paris. t. 50. f. 1. Savi Bot. Etr. 1. p. 116. n. 139. (fid. specim. apud Bertol.) Balb. Misc. bot. 1. p. 19. (fid. specim. ap. Bertol.) J. Vaillanti Thuil. Fl. paris. 1. p. 177. J. gracilis Lejeune Spa. p. 166. (fid. Dec.) β perianthio luxuriante Meyer l. c. J. sphaerocarpus Nees ab Esenb. Bot. Zeit. 1818. p. 521. Heller Wirceb. Suppl. Bluff et Fingerh. Comp. Fl. Germ. 1. p. 438. *γ sardous; floribus numerosioribus; cal. foliolis capsulâ vix longioribus, latius membranaceis: interioribus subobtusis.**

Totus fuscescens. Rad. fibrosa. Culmi 2-12 poll., graciles, plures, erecti, simplices vel parum ramosi; rami filiformes, inferiores longiores. Folia pauca, glabra, canaliculata, acuta, erecta; vaginae laxiusculae, fuscescens, margine membranaceo albido, apice in ligulas 2 obtusas producta. Corymbus compositus et supra decompositus 1-4 poll.; rami filiformes erecto-patentes; flores sessiles et subsessiles, remoti, plerumque unilaterales, fusciscentes, solitarii, multo minores quam in *J. bufonio*. Bractea sub floribus ovatae, concavae, obtusae, albidae, rarius acutiusculae. Cal. foliola subaequalia vel interiora paulo breviora, erecta, planiuscula, vix carinata, acuta, praesertim exteriora, $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{4}$ lin., dorso fusca vel in junioribus viridia, nervo medio pallidiore margine membranaceo albida. Capsulae subtruncato-obtusae cum

mucrone brevissimo, obsolete triangulares, fuscae, nitidae. — β nonnisi paniculâ laxiore et perianthii laciniis, praesertim exterioribus, longius mucronato-acuminatis, capsulam magis superantibus differt. In γ culmi 1-12 poll., habitus omnino ut in α ; sed flores numerosiores, minus remoti; cal. foliola longitudine capsulae, margine late membranaceo, magis ovata; interiora paulo breviora obtusa; exteriora acuta. Reliqua exacte conveniunt. — *J. Tenageja* Host revo *Gaud.* varietas videtur compressi, et distinctus floribus magis elongatis; calycis foliolis inaequalibus, albo virentibus; capsulis minus globosis; ramis denique minus divaricatis. In *Germaniae, Galliae, Hispaniae, Italiae paludibus exsiccatis; \gamma* in *Sardinia et in Corsica.* ☉.

79. *J. ambiguus* *Gusson.*; culmo folioso, gracili; foliis filiformibus; umbellâ decompositâ pauciradiatâ; floribus alternis, terminalibus approximatis, axillari solitario; sepalis externis acutis, capsulae aequalibus: interioribus brevioribus obtusis. *Gusson. Prodr. Fl. sic. 1. p. 435. et Bertol. in litt.,* quo teste cum? *J. attenuatus*; culmo erecto, folioso foliisque filiformibus sulcatis, striatis; paniculâ terminali subdecompositâ, depauperatâ; bracteis lanceolato-acuminatis, scariosis; calycis foliolis exterioribus ovato-acutis. *Viviani Fl. Cors. Diagn. p. 5.*

Caulis firmior, quam in *J. Tenageja*, ad quem accedit licet flores duplo majores, umbella brevior, quamvis sat longa. Flores alterni, secundi, plus minus approximati in apice radiorum, subinde hic quoque solitarii. Capsula oblonga, apice convexe acuminatula, sepalis externis longioribus aequalis, matura purpurascens. *Bertoloni in litt.. J. attenuatus Viv. clo. Laharpe ad J. bulbosum v. bottnicum pertinere videtur. In Sicilia Guss., in insula de' Cavalli prope Corsicam Viv..* ☉.

80. *J. parviflorus* *Poir.*; culmo ramoso, filiformi, compresso, folioso; foliis planis, angustissimis; paniculis axillaribus terminalibusque diffusis; calycibus acutis; capsulis rugosis. *Poiret Enc. Suppl. III. p. 160. Meyer Syn. p. 42. n. 42.*

Tenuitate omnium partium conspicuus. Culmi cespitosi, pedales, glaucescentes, uti tota planta. Folia glabra, alterna, internodiis multo longiora, e quibus rami breves aut paniculae tenuissimae, foliis breviores, singulo ramo plerumque flore terminali unico, minimo, involuero setaceo fulto. Lacinae calycis subovatae. Capsulae albidae, subglobosae, fere tuberculatae. *Poiret. In Porto Ricco. Ledru.*

81. *J. gracilis* *R. Br.*; culmo repente; ramis filiformibus, basi foliatis; foliis subsetaceis; umbellâ terminali simplici et semicompositâ, involucrum unifolium superante; floribus capitatis, hexandris. *R. Brown prodr. p. 259. Meyer Syn. p. 43. n. 43. Laharpe l. c. p. 150.*
In ora meridionali *N. Hollandiae.* 4.

82. *J. revolutus* *R. Brown*; radice repente; culmo com-

pressiusculo, basi foliato; foliis angustissime linearibus, margine recurvis; corymbo terminali paucifloro; floribus hexandris; capsulis ovali-oblongis, apice depresso, perianthium acutum aequantibus. *R. Brown prodr.* p. 259. *Meyer Syn.* p. 43. n. 44. *Laharpe l. c.* p. 150.

In insula van Diemen.

83. *J. tenuis Willd.*; scapo culmoque compressiusculo; foliis canaliculatis; anthelâ patente; floribus subsecundis; calycis laciniis ovato-lanceolatis, acuminatis, subaequalibus, capsulam ovato-ellipticam triquetram obtusam superantibus. *Meyer Syn.* n. 46. p. 44. et hoc teste: *J. tenuis Willd. Spec.* II. p. 214. (*Enum. h. berol.* p. 392. *Pers. Syn.* p. 385.) *Elliott Carol.* 1. p. 406. *J. bicornis*; culmo erecto, tereti-compresso, nudo; foliis canaliculatis, filiformibus; paniculâ subcompositâ, cymosâ, laxâ; floribus secundis; perig. foliolis lineari-lanceolatis, acutissimis, aequalibus, capsulam sphaericam subaequantibus; stam. 6. *Laharpe l. c.* p. 148. (α culmo strictiori; floribus approximatis cymosis; bracteis 2-3 paniculam subaequantibus.) *Mich. Amer.* 1. p. 191. *Pursh Fl. sept. Amer.* 1. p. 236., quib. testt: *Moris. Hist.* III. S. 8. t. 9. f. 15. *Pluk. Phyt.* t. 92. f. 9. (a *Pursh* ad *J. polycephalum* ducta). β laxior majorque, floribus remotioribus, spathâ bracteisque pluribus foliaceis, elongatis. *Meyer l. c.* quo teste: *J. dichotomus Elliott Carol.* p. 406. *J. fol. subteretibus, canaliculatis; paniculâ dichotomâ; floribus sessilibus. Darlington Florul. cestr.* p. 43. (uterque vero excl. syn. *J. bufonio Mich.* monente *Torrey Flor. north. et mid. united St.* 1. p. 363., qui eundem ad *bulbosum Engl. Bot.*, nunc compressum) *J. aristatus Link Enum. H. Berol.* n. 2948. (*J. tenuis Pursh Fl. sept. Amer.* 1. p. 238. *Mühlenb. descr. uber.* p. 200. (fid. specim in *Herb. Schreb.*) *van Hall. Fl. Belg. sept.* p. 290. (excl. *J. gracili Smith*, etiam in *Meyer* excludendo.)) *Rostk. Junc.* t. 1. f. 3. (a *Willd. Enum.* ad α ducitur). *J. bicornis* β , culmo debili; floribus paucis, irregulariter sparsis; bracteis longissimis. *Laharpe l. c.* (excl. syn. *J. Gesneri Smith*). γ *unicornis*, bracteâ foliaceâ unicâ. *Meyer in Reliqua. Haenk. Fasc.* II. p. 143. δ . parvus, bracteis foliaceis nullis. *Darlington Florul. cestr.* p. 42.

„Cultura formam originariam in varietatem β transmutare solet. *Rostkovi* icon, forsan ex culto specimine sumta, inter utramque formam ambigit „(laudatur a *Pursh* quoque ad *bicornem* et ad *tenuem*).“ *Cls. Elliott Junco* suo *tenui* capsulam nimis longam, *dichotomo* suo nimis brevem tribuit. Quod attinet ad *J. gracilem Smith*, nec icon nec descriptio ullum relinquunt dubium, quin huc pertineat.“ *Meyer.* At ill. *Smith Engl. Fl.* p. 167. aperte dicit: „differt *tenuis* a simili *J. Gesneri* „(qui olim *gracilis Smith* fuit)“ paniculâ cymosâ, nec racemosâ; calycis foliolis latioribus,

dilute fuscis, nervis 2, carinâ viridi maximam partem planâ. "Culmus dodrantalis, simplex, teretiusculus, subcompressus, basi foliosus. Folia canaliculata, *J. bulbosi* et etiam flores in corymbo terminali dichotomo, foliis floralibus brevioribus; rami laterales corymbi magis elongati. Foliola calycina lanceolata, acuminata, capsulâ triquetrâ truncato-obtusâ paulo longiora." *Willd.* In α , *J. bicorni Mich.*, fid. specim in *Herb. Schreb.*: radix fibrosa; culmi teretiusculi, stricti, basi tantum foliosi, obsolete sulcati, 5-8 poll. Folia subradicalia, erecta et erecto-patentia, plana et subcanaliculata, acuta, culmis duplo breviora, basi vaginis brevibus laxis, striatis, margine submembranaceis, ligulâ abbreviatâ. Involucrum paniculâ duplo longius eamque subaequans. Panicula stricta, pauper, $\frac{1}{2}$ -1 poll.; floribus in ramulis subsecundis. Bracteae sub floribus ovatae, acutae, concavae, calycibus triplo breviores, pallidae. Calycis foliola lanceolata, acuminata, carinata, binervia, capsulam superantia, pallida vel purpurâ suffusa, interiora paululum breviora, tenuiora et magis membranacea. Caps. ovato-triquetrae, obtusae, pallide fuscescentes. Semina oblongo-subtrigona, fusca. — In β , ad quod fid. specim. in *Herb. Schreb.* pertinet et *J. tenuis Mühlenb.*, et *J. bulbosus Herb. Amer.* et *J. bufonius var. Herb. Amer.*: rad. magis fibrosa; culmi altiores, minus rigidi, 1-2-ped., subsulcati, subfoliosi; folia longiora, canaliculata planaque, striata, minus stricta, 5-7 poll.; vaginae arciores, magis striatae, multo magis membranaceae, diaphanae, apice ligulis ovatis, obtusis, lin. longis; paniculae cymosae, magis compositae et patentes, 1-3 poll.; involucri foliola 2-3 magis elongata; alteram paniculam duplo superans, striatum, canaliculatum; bracteae sub calycibus ovatae, acutae vel alterâ obtusiusculâ, carinatae, pallidae; calycis foliola longiora, firmiora, binervia, magis acuminata: exteriora paululum longiora, $1\frac{1}{2}$ -2 lin.; capsulae trigonae, obtusae cum mucronulo brevi, pallidae, calyce breviores. In varietate hac culta, quae etiam nomine *J. chinensis* in hortis occurrit: culmi 2-ped., basi subtrigoni, sulcati. Folia fere ped., laxa. Involucrum e bracteis pluribus foliaceis corymbum aequantibus et duplo superantibus; bracteae sub floribus ovato-lanceolatae, acuminatae, floribus duplo breviores. Corymbus 2-5 poli., strictus, satis densus. Cal. foliola binervia, pallide viridia vel purpurâ suffusa, margine albido membranaceo, capsulis longiora. In *Georgia et Carolina*, β in *America boreali ad Mexico usque*, in *Belgio*; γ in *Mexico*. *Haenke.* 24.

Obs. Poir. Enc. III p. 159. se Morisoni t. 9. f. 15. (quam cum? adducit), non nisi auctoritate Rostk. et Mich. laudare ad tenuem, cum Lam. eandem ad pallescentem laudasset: folia tamen in speciminibus suis multo tenuiora esse, quam in icone Morisoni. — Conf. J. secundum.

84. *J. Gesneri Smith*; culmo simplici, nudo; foliis obsolete canaliculatis; paniculâ dichotomâ, racemosâ, bracteam non excedente; calycis foliolis lanceolatis, attenuato-acuminatis, trinerviis, capsulâ ovatâ longioribus. *Smith Engl. Fl. p. 167.* *Junc. gracilis Engl. Bot. t. 2174. Comp. 65.* *Bichenov Trans. Linn. Soc. XII. 515.* *Junc. tenuis Hook. Scot. 108. (nec Pursh).* *Junci genus aliud. Gesn. Fasc. 12. t. 5. f. 13.*

Rad. fibrosa, sublanata. Culmus valde gracilis, erectus, pedalis et ultra, apice subtriangularis. Folia pauca, radicalia, culmo breviora, erecta, anguste linearia, acuta, subtus convexa, nervosa,

sicca involuta, basi dilatata, membranacea. Bracteae 2-3, foliaceae, erectae: principalis paniculam superans, reliquae eadem multo breviores. Panicula e ramis 3-4 maxime inaequalibus, subpatentibus. Flores subsessiles, pallidi. Calycis foliola viridia, trinervia, striata, margine angusto, albo, membranaceo. Caps. pallide fusca, polita, ovata s. subovata, mucrone exiguo, calyce omnino brevior, valvulis subemarginatis. Semina numerosa, minuta, pellucida, fulva. *Smith Engl. Fl.* In pascuis subalpinis *Scotiae et Helvetiae.* 4.

Obs. Male a *Haller* ad compressum fuisse laudatum, et abunde distinctum esse a simili licet tenui *Willd.* et *Pursh*, *Smith l. c.* *Laharpe l. c.* p. 148. vero citat *J. Gesneri Smith* ad *J. bicornem* β , et synonymon *Gesneri Smith* ad *J. Gesneri* laudatum, manifeste ad *J. bufonium* spectare dicit. Etiam *Torrey* in *Fl. n. et m. U. St.* 1. p. 361. *J. gracilem Smith*, fid. speciminis a *Haworth* communicati, varietatem luxuriantem *J. tenuis Willd.* dicit. *Clo. Bichenon* specimina *J. gracilis* ex Hort. Cambrig. ad *J. pygmaei* varietatem pertinere videntur.

85. *J. secundus Poir.*; caule striato, filiformi; foliis angustissimis; paniculâ terminali; floribus solitariis, secundis, sessilibus. *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 160.

A *clo. Meyer Syn.* p. 45. cum? ad *J. tenuem* β ducitur, a quo tamen nimis abluere videtur. „Habitu similis *bulboso*, inflorescentiâ *bufonio*. Radices graciles, fibrosae, albidae. Culmi erecti, pedales et ultra, subangulati, basi foliis angustissimis, planis, margine subreflexis, culmo ad minimum duplo brevioribus. Panicula laxa, ramis mediocriter divisis. Flores alterni, ovato-lanceolati, basi squamis 2 parvis, concavis, acutis. Calycis lacinae subinaequales, lanceolatae, acutissimae. Caps.?” *Poiret l. c.* In *Herb. Schreb.* sub *J. tenui* prostant etiam specimina ex Am. hor., quae certe plantam *Poireti* exprimunt, et quae nobis propriam speciem, vel insignem *J. tenuis* varietatem, sistere videntur. Rad. fibrosa. Culmi gracillimi, stricti, nudi, sulcato-striati, fere ped. Folia plana et subcanaliculata, 2-5 poll., $\frac{1}{4}$ lin. lata ad basin culmorum, caulina nulla: vaginae dilatatae, laxae, striatae, breves, margine vix membranaceae; ligulâ brevissimâ. Panicula 1-1 $\frac{1}{2}$ poll.; ramis filiformibus, strictis, plerumque dichotomis. Involucrum e foliolis 2 strictis foliiformibus paniculam superantibus eâque brevioribus; bracteae sub floribus ovatae, acutae, diaphanae, albidae, floribus duplo breviores. Cal. foliola lanceolata, subulato-acuminata, carinata, pallide viridia, margine albido membranaceo, angusta, 1 $\frac{1}{2}$ lin., capsulam superantia; interiora paulo breviora et magis membranacea. Stam. 6, calyce plus duplo breviora; antherae longitudine filamentorum. Caps. ovato-trigonae, obtusae, pallide virides, lin. longiores, Sem. oblonga, fusca. *Cls. Laharpe J. secundum Poir.* in *herb. mus. Paris* cum? ad *J. imbricatum*; *J. secundum Poir.* in *herb. Palisot.* vero ad *J. bicornem* laudat. Planta nostra differt a *J. imbricato Lah.*: radice fibrosâ tenui; culmis sulcato-striatis; panic. ramis erectis, vix arcuatis; flor. pallide virentibus; perig. laciniis subulato-acuminatis; caps. pallide viridi nec fusca, perigonio brevior nec longiore. In *Virginia. Pal. d. Beauv.* 4.

86. *J. imbricatus Laharpe*; culmo erecto, stricto, tereti-compresso; foliis canaliculatis, strictis; paniculâ subsimplici; floribus secundis, imbricatis; perigonii foliolis aequalibus, lanceolatis, acutis, capsulâ ellipsoideâ trigonâ brevioribus; staminibus 6. *De Laharpe Monogr.* in *Mem. d. l. Soc.*

d'hist. natur. T. III. p. 149. quo teste cum? *J. secundus* Poir. *Suppl.* III. p. 160. (ex herb. Mus. paris.)

Florum dispositione *J. bicorni*, habitu *J. squarroso* affinis. Rhizoma crassum, breve, culmos frequentes pectinatim emittens. Culmus nudus, subrigidus, glaucus, 6-8 poll. Folia radicalia subtus convexa, supra canaliculata, acuta, setacea, glaucescentia, culmo multo breviora. Panicula cymosa, pauciflora, folio florali sublongior; ramis rigidulis, dichotomis, arcuatis, brevibus; floribus pallide fusciscentibus. Perig. foliola subcartilaginea, nitida, line fere longa. Stam. 6, perigonio circiter dimidio breviora; filamentis antheras subaequantibus. Caps. obsolete trigona, 3-locularis, subretusa, fusca, nitida: valvis cartilagineis; stylo brevi. Sem. ooidea, nitida, numerosa. *Laharpe.* In *Buenos Ayres, Commers., in Chili Lesson.* 4.

87. *J. capillaceus* Lam.; culmo folioque radicali subsingulo canaliculato setaceis striatis; anthelâ brevi, subsimplici; perianthii laciniis ovatis, acutis, exterioribus vix longioribus capsulâ ellipticâ obtusâ brevioribus. *Meyer* in *Reliq. Haenk.* II. p. 144. *Syn.* p. 18. n. 11. c. ic. ined. *J.* culmo foliisque capillaceis; paniculâ simplici, pauciflorâ, glomeratâ; perig. foliolis aequalibus, lanceolatis, acutis, capsulâ ellipsoideâ retusâ brevioribus; staminibus 6. *Laharpe l. c. p.* 120. *J.* culmo nudo capillaceo; paniculâ laterali brevissimâ; capsulis calyce majoribus. *Lam. Enc.* III. p. 255. *Willd. Spec.* II. p. 266.

„Folium radicale non teres, ut antea in Herb. *Vahliani* specimenibus mihi visum est, sed canaliculatum. Affinis *J. tenui* et *platycauli.*“ *E. Meyer*, qui specimen ex Herb. *Lam.* vidit. Culmi re verâ capillacei, ut in *Scirpo aciculari*, sed multo longiores fasciculati, omnino nudi, debiles, 6-10-poll. Altero tertiove ab apice pollice panicula minima, sessilis, dichotoma, 5-6 lin.; flosculis 7-10 sessilibus per binos paniculae ramos. Caps. ovata, obtusissima, calyce parum longior. *Lam.* *J. pallido* quidquam affinis. Folia capillaria culmique cespites densos formant, cespites *NARDI strictae* simulant. Flores pallidi, 4-5 in ramis 2-3 brevibus, quidquam imbricati. Caps. semitriocularis, perigonio $\frac{2}{3}$ longior. Stylus subnullus. *Laharpe.* Circa *Monte Video et Buenos Ayres, Commers.; copiose in Chili Chamisso.*

87. **J. compressus* Jacq.; culmo simplici, compresso, basi folioso; foliis linearibus, margine incurvis; paniculâ terminali, cymosâ, bracteam non excedente; capsulâ rotundato-obovatâ, calycem obtusum superante. *Smith Engl. Fl.* p. 165. *Jacq. Enum.* 60. 255. *Bicheno Trans. Linn. Soc.* XII. p. 307. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 581. *J. bulbosus* *Linn. Spec.* p. 466. *Willd. Spec.* II. p. 213. (excl. pl. syn.). (*Enum. h. berol.* p. 392. *Rostk. d. Junc.* p. 23. n. 17.) *Smith Fl. brit.* 381. *Engl. Bot.* t. 934. et, teste *Smith: Leers Herb.* 89. t. 13. f. 7. *J.* culmo subsimplici, compresso; fol. canaliculatis; corymbo suprafastigiato, suberecto; calycis laciniis ob-

tusis: interioribus subbrevioribus, dimidiam capsulam subgloboseam vix superantibus; stylo brevi. *Meyer Syn.* p. 46. n. 47. *J. culm. erecto, tereti-compresso, foliato; foliis canaliculatis; paniculâ compositâ, plus minusve laxâ, coarctatâ v. elongatâ; floribus sparsis v. congestis; perig. foliolis aequalibus, oblongis, subobtusis, capsulâ ovoideâ brevioribus; staminibus 6. Laharpe l. c. p. 150. Lam. et Decand. Fl. fr. III. p. 167. Gaud. Agrost. helv. II. p. 228. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 88. Fl. Dan. 431. Host. Gram. III. t. 89. Hall. Helv. n. 1318. Bauh. Hist. II. 522. f. (descriptio potius ad squarrosum. Linnaeus Mant. p. 568. excludit Bauh. et Scheuchz.). Barrel. ic. t. 747. f. 1. t. 114 f. 1. *J. bottnicus* *Wahlenb. Lapp. 82. t. 5.?* (fide *Smith*, clo. *Meyer* potius ad *bottnicum* spectare videtur. Huc spectant adhuc certe: *J. bulbosus* *All. Fl. pedem. II. p. 215. n. 2078. Savi Bot. Etr. 1. p. 117. Sebast. et Maur. prodr. Fl. rom. p. 132. n. 424. Sturm Deutsch. Fl. 56. H. n. 13.)* — β *J. bulbosus* β *humilior*; folio supremo paniculâ brevior. *Lam. Enc. III. p. 269.* γ . *scapigerus*; anthelâ supradecompositâ, elongatâ, laxâ. *J. bulbosus* β *Meyer l. c. J. bulbosus* γ *lychnocarpus* *Wallr. Sched. crit. p. 146.?* δ . *pallidus*; culmis, foliis paniculisque pallidioribus. *Rochel Herb.* (qui cum? hûc citat *J. Gerardi Loisel.*) *J. bulbosus* β *phaeocarpus*; perigonii foliolis margine diaphanis, dorso viridibus, demum capsulisque stramineo-fuscis, patentibus. *Wallr. Sched. crit. p. 146.**

„Rad. repens, densa. Culmi filiformes, subcompressi. Folia linearia, laevia, subtus convexa et striata, supra canaliculata. Folium-florale longitudine corymbi. Corymbus communis et partiales inaequales. Capsulae ovatae, fuscae, nitidae.“ *Linn. Spec. l. c.* Rad. horizontalis, repens, fibris numerosis, nunquam bulbosa. Culmi erecti, 6-12 poll., glabri, basi teretes, superne compressi. Folia acuta, parum patentia, basi dilatata membranaceâ vaginantia. Panicula e ramis pluribus corymbosis, gracilibus, angulatis striatisve, glabris. Bracteae foliaceae, canaliculatae; principalis erecta, paniculam plus minus superans. Flores numerosi, parvi, pallide virentes. Calycis foliola concava, obtusa, carinâ obsoletâ nervisque 2 lateralibus fuscis: interiora breviora, latiora. Caps. vix globosa, mucrone obsoleto, splendide fuscae. *Smith Engl. Fl.* Stigmata rubra. Semen oblongum, fuscescens, costatum. *Hoppe apud Sturm l. c.* *Cls. Laharpe* distinguit *J. bulbosum* a *bottnico*: rhizomate brevi; culmis pluribus; paniculâ magis multiflorâ; floribus paulo majoribus, capsulâ perigonium superante semitriloculari styloque brevi. Idem 3 enumerat varietates: α culmo foliato; paniculâ compositâ laxâ. β culmo foliato; paniculâ compositâ densâ interruptâ. γ culmo nudo; paniculâ supradecompositâ. *In pascuis et pratis humidis et ad vias totius Europae ad Wolgam usque, in America boreali; δ in Hungaria.* 4.

Obs. 1. III. *Smith* sibi gratulatur, quod *Bischoff* nomen „absurdum“ bul-

bosi, „e synonymis male subscriptis ortum“ proscriptisset. *Linnaeum*, *Dicksonium*, *Hallerum* et vix non omnes Botanicos hunc commutasse cum *coenoso* monet; figuram *Gmel. sib. t. 17. f. 2.* nimis malam esse, licet *Wahlenberg* laudasset ad *bottnicum*, quam ut aliquid certi statui possit, nec e specimine unico Panzeriano, quod possidet de *bottnico*, erui aliquid posse. *Smith l. c.*

Obs. 2. J. bulbosum Florar. Am bor. ad biflorum spectare Meyer monet in *Syn. Junc.* In *Syn. Luzul. p. 32.* vero *J. bulbosum Mühlenb.* in *J. bifloro* excludi jubet, utpote, fide specim. in *Herb. Willd.* ab ipso *Mühlenb.* ad *bulbosum* L. spectantem. *Mühlenb. descr. ub. p. 201.* *J. bulbosum* suum, ad quem *J. tenuem Swartz* (nobis ignotum) laudat, describit: „culmo compresso, indiviso; fol. linearibus, canaliculatis, subradicalibus; vaginâ latâ, ligulâ abbreviatâ; corymbo terminali, erecto, involucre sive bractea brevior; bracteis 2 ovatis obtusis sub flore; calycis foliolis obtusis et acutis; capsulâ obtusâ, apice trivalvi, triloculari, calycem excedente et eidem aequali; seminibus pluribus, parvis, acutis.“ Descriptio haec quadrat et in *J. compressum* et in *coenosum* et in *biflorum*. *Torrey in Fl. n. et m. U. St. 1. p. 363.* ad *J. bulbosum* laudat: *Willdenow, Bicheno, Engl. Bot. 934, Pursh, Mühlenberg* et *J. dichotomum Elliott Sketch 1. p. 406* (excl. syn. *Mich.*) a *Meyer* ad *J. tenuem* ductum. Descriptio a *Torrey* data magis in *J. coenosum* quam in *compressum* quadrare videtur. In herb. *Schreber.* numerosissima sub *J. bulboso* prostant specimina ex America boreali, sub quibus *J. compressum* et *J. coenosum*, et ni fallimur etiam *J. biflorum* invenimus, licet sit hexandrus. Culmi in hoc teretiusculi, apice tantum subcompressi, $\frac{1}{2}$ ped.; folia linearia, canaliculata, dorso striata, inferiora culmos subaequantia; vaginis laxis, dilatatis, margine membranaceis, ligulis abbreviatis; paniculae compositae, strictae, omnino ut in *bulboso*, 1-2 poll., involucre longiores idque aequantes; flores in dichotomiis solitarii, in apicibus ramulorum semper fere duo congesti; bractee sub floribus ovatae, concavae, carinatae, acutae et obtusiusculae, diaphanae; calycis foliola lanceolata, obtusiuscula, dorso viridia striataque, margine membranaceo fusca, capsulam paululum superantia: interiora quidquam breviora longitudine capsularum obovatarum, obtuse triangularium, obtusarum cum mucrone brevissimo, fuscaram; stamina 6 calyce duplo fere breviora; antherae filamentis triplo longiores; stylus brevis potius quam elongatus.

Obs. 3. Juncum Gmel. sib. t. 17 f. 2. „certe nec ad *compressum*, nec ad *coenosum* spectare“ *Meyer* monet *Syn. p. 59.* „Ad hunc“ (*Gmelinianum*) „forte spectat in palustribus mari nigro vicinis observata a me haud procul ab Odessa species facie *bulosi*, sed elatior, paniculâque minus ramosâ totâ atrospadiceâ praedita, cujus capsulam non vidi“ *M. a Bieb. taur. cauc. Suppl. p. 275.* *Gmelin l. c. I. p. 68. n. 31.* describit hanc speciem sequentibus: „Rad. nigra, fibrosa. Culmi tenues, cubitales, prope radicem et paniculam foliosi, medio nudi. Folia sub panicula ut plurimum exigua. Panicula interdum talis, qualis in Juncoide angustif. glabro sparsâ paniculâ *Scheuchz. Agr. p. 320* „(a *Smith* ad *compressum* laudato),“ interdum palmaris et $\frac{1}{2}$ ped., praesertim in fructiferis. Pericarpia interdum oblonga et stricta, interdum ventricosiora et breviora, perpetuo tamen triquetra, ex atro spadicea. Petala 6 angusta, acuta, ex atro spadicea. Antherae flavae. *Gmel.* In palustribus a *Jenisea* fluvio Occidentem versus.“ *Gmelin* huc ducit instar synonym.: „*Junc. fol. mollioribus carinatis, paniculâ multiplici et ramosâ. Hall. herb. 254.*; *J. parvum cum pericarpis rotundis. Bauh. Hist. II. 522.* quod attinet ad icon „(a *Smith* ad *compressum* ductum)“ *Gram. junceum, Junci sparsâ paniculâ Moris. hist. II. p. 227.* „(a *Smith* ad *J. coenosum* laudatum)“ *Gram. junceum pericarpis rotundis vulgare Park. Ej. S. 8. t. 9.* Diu „addit“ hunc *Juncum* volutavi, donec speciem me definisse credidi. Iconibus allegatis bene cum illo convenit. Sed vascula *Morison* dicit rotunda, *Haller* subrotunda, *Scheuchzer* e triquetra rotundata. Consulni praeterea *Linnaeum*, qui habuit pro *J. parvo* repente, capsulis triangularibus *Vaill. Par. 110*, cui synonymon dicit *J. foliis angulatis, culmo subnudo, paniculâ terminatrice prolifera, caps. ovatis. Roy. p. 43.* et *J. fol. linearibus, canaliculato-concavis, caps. obtusis. Fl. succ. 284*“ (qui *J. bulbosus* L.). Id in ipsa ejus Flora vidi. At re *Morisoni*, quam *Vaillant* allegit, nimium a nostra planta recedit, et descriptio *Raji* tam in *Hist.* quam in *Syn.* exhibita, admodum parvam faciunt plantam, qualem ego nunquam vidi. Quare iconem fieri curavi, ne quis forte pertinaciae meae poenas luat. Icon autem nostra plantam sistit paniculâ valde parvâ, quae certe nonnunquam triplo major est.“

89. *J. coenosus Bicheno*; culmo simplici, folioso; foliis linearibus, canaliculatis; paniculâ terminali cymosâ, bracteam excedente; capsulâ obovatâ, longitudine calycis obtusiusculi. *Smith Engl. Fl. II. p. 166.* *Bicheno Trans. Linn. Soc. XII. p. 309.* et his testt.: *J. bulbosus Ehrh. Calam. 18. Fl. Dan.*

t. 431. (a plerisque ad *compressum* laudata). *J. bulbosus* β Hook. Scot. 107. *Moris*. III. 227. sect. 8. t. 9. f. 11. *Barrel*. Ic. t. 747. f. 2. β pygmaeus, 3 poll.. *Forster* apud *Smith* l. c. γ ? *J. bottnicus*; culmo scapove teretiusculo; fol. canaliculatis; anthelâ erectâ; perianthii laciniis obtusis: interioribus sublongioribus, capsulam ovatam obtusam fere aequantibus; stylo elongato. *Meyer* Syn. p. 46. n. 48. *J. culmo erecto, tereti-compresso, foliato; fol. canal.; panic. compositâ strictâ; flor. paucis remotis; perig. foliolis aequalibus, oblongis, obtusis, capsulam ovoideam subaequantibus; stam. 6. Laharpe* l. c. p. 151. *Hoppe* Dec. Gram. 57. *Mert. et Koch* D. Fl. II. p. 582. *Roth* Enum. pl. germ. I. 2. p. 89. *Bönnigh.* Fl. monast. n. 446. *J. consanguineus* Koch et *Ziz* palat. p. 8. et 19. *J. Gerardi* Loisel. Gall. not. 60. Dec. Fl. fr. Suppl. p. 308. *J. setaceus* Gerard Ms. (fid. Loisel.) δ . capsulâ acutâ calycem superante. *J. bottnicus*; culmo tereti; fol. linearib., canalic.; cymâ terminali; capsulis oblongis, acutis, calyce longioribus; radice repente. *Wahlenb.* Lapp. p. 82. t. 5. (excl. syn. *Gmel. Sib.*) *J. bulbosus* β caps. magis acuminatâ in stylum longiorem persistentem; radice magis repente. *Wahlenb.* Fl. suec. p. 215.

„Rad. repens, fibrosa. Culmi 2-12 poll., erecti, foliosi, simplices, glabri. Folia setacea, canaliculata, leviter striata. Panicula corymbum terminalem, erectum, pauciflorum bracteâ longiorem referens. Bractea ad basin paniculae setacea. Cal. foliola obtusa, coloris succulatae intensioris, longitudine capsulae: 3 interiora margine scariosa. Caps. quidquam unilaterales, obovatae, obtusissimae. Rigidior, obscurior quam *compressus*.“ *Bicheno*. Differt a *compresso* colore totius plantae magis obscuro, praeter characteres datos; culmo magis folioso, apice triangulari potius, quam *compresso*; foliis rigidioribus, extus striatis; paniculâ minus compositâ. Bracteae 2 sub flore singulo fuscae, splendentes, nec virides aut albescentes. Calycis foliola omnia oblonga, apice obtusa, concava, aut incurva, atro-fusca, carinâ latâ tumidâ virente, striata, tricostata, capsulae appressa. Caps. fusca, obovato-triangularis, mucrone exiguo, minus quam in *compresso* turgens. *Smith* l. c. Cls. *Laharpe* *J. bottnicum* a *bulboso* (*compresso*) differre dicit: „rhizomate elongato, culmis paucis; paniculâ tenuiore, pauciflorâ; floribus remotis minoribus; capsulâ perigonium vix superante, fere exacte triangulari; stylo $\frac{1}{2}$ lin. circiter longo;“ quibus adhuc addendum: culmis teretiusculis potius quam compressis, colore totius plantae magis obscuro; cal. foliolis interioribus paululum longioribus; stylo longitudine germinis; stigmatibus intensius carneis; capsulâ obovato-oblongâ, obtusâ cum mucronulo brevissimo, subtrigonâ. Cls. *Meyer* spathae longitudinem in *J. bottnico* et *bulboso* mire variare dicit, et inde dubitat de *J. Gerardi*, a se non viso. — *Wahlenberg* Fl. lapp. sequentia notat de *J. bottnico*: „tum habitu ac dispositione florum *J. bulboso* valde affinis, a quo abunde differt: radice caudice elongato, repente, perenni; culmo stricto prorsus tereti; foliis latioribus et brevioribus,

corymbo magis paucifloro et effuso; floribus oblongis, majoribus, nigrofuscis et capsulis ut in *sylvatico*. A *J. tenui Willd.* magis diversus dispositione florum, brevitate calycis obtusiusculi etc. Figura *J. bulbosi Engl. Bot.* t. 934. nostrae plantae satis convenit, sed capsula rotundata obovata dicitur. In *Flor. suec.* idem *J. bottnicum* varietatem β dicit *J. bulbosi* et addit: „quo magis repens et valida eo angustiores et magis acuminatae capsulae, unde β .“ Specimina suecica *J. bottnici* differunt a westphalicis, bavaricis, hungaricis etc.: habitu stricto rigido; paniculis rarioribus; floribus intensius fuscis magisque nitentibus; capsulis calyces superantibus, magis trigonis, acutis, intensius fuscis. In coenosis, salsis, maritimis *Europae borealis*; in paludosis salsis *Westphaliae, Palatinatus, Hungariae*; in *Galloprovincia*; prope *Tergestum*; etiam in *America boreali*. 4.

Obs. Huc nobis spectare videtur: *Juncus nitidiflorus*; radice horizontaliter repente, fibris filiformibus subparallelis stipatâ; foliis inarticulatis, canaliculatis, basi membranaceis vaginantibus; paniculâ pauciflorâ, subterminali, subrigidâ; floribus hexandris; petalis margine sanguineo-fuscis, nitidissimis, capsulâ longioribus. *Dufour in Ann. d. sciences natur.* T. V. p. 86., qui sequentem addit descriptionem: „Habitu radiceque valde affinis *J. alpino*, sed differt foliis non nodulosis. Radices saepe pedales; fibris numerosis perpendicularibus, basi saepius villosiusculis. Culmi erecti, simplices, $\frac{1}{2}$ -1 ped., rigidi, vix compressi. Folia radicalia 3-4, erecta, acuta; basi vaginis imbricantibus; folium caulinum unicum. Panicula minima, inaequaliter ramosa, involucro paulo brevior. Bracteae sub pedunculis quidquam striatae, acuminatae; sub floribus 2 oppositae, vaginantes, ovatae, obtusae vel apice rotundatae. Calycis foliola ovato-oblonga, obtusa, nitida, badia cum stria dorsali viridi; marginibus quidquam involuta. Capsula fusca, calyce brevior. In *Gallia, Corsica, Suecia*.“ Descriptio haec satis bene convenit cum *J. coenoso*, praeter longitudinem involucri nimis variabilem. Specimina nostra, quae *J. bulbosi* nomine clo. *Dufour* communicavimus, et quae ab illo ad suum *J. nitidiflorum* citantur, ad *J. compressum* pertinent, si in agro landishutano lecta sunt; specimina hungarica vero ad *coenosum* spectant. — Plantae suae similem, sed diversum, dicit *pls. Dufour J. repentem apocarpum minorem botryoidem Barrel.* ic. 114. *Cls. Laharpe J. nitidiflorum* citat ad *J. bulbosum*; *coenosum Bicheno* vero tantum cum? ad *bottnicum*. — In *J. Gerardi* folia linearia, canaliculata; panicula terminalis; capsulae oblongae; folium terminale paniculam longe superans. *Gerard* apud *Loisel.* l. c. ad plantam suam, quem culmo elatiore; paniculâ longiore; umbellis rigidioribus; floribus minoribus; capsulis longioribus angustioribusque, folio floralis paniculam multo superante a *J. bulboso* differre dicit, laudat *Gr. junc. milii paniculâ Barrel.* ic. 747. f. 2. Clo. *Bicheno J. Gerardi* ad *J. compressum*; *J. bulbosus Lam.* et *Dec.* vero ad *J. coenosum* spectare videtur. *Cls. Steudel J. Gerardi* tanquam speciem propriam exhibet eidemque adjungit *J. bulbosum var. Hoppe*; *coenosum* vero ad *J. Tenagejam* trahit.

90. *J. Loureiroanus*; culmo folioso, erecto, subancipiti; foliis subulato-linearibus, trigono-concavis; spicis secundis, fasciculatis; calycis foliolis distiche imbricatis. *J. bulbosus Lour. Fl. Coch.* p. 265. (excl. syn. *Linn.*)

Radix repens, densa, tenacissima. Culmus 2-ped., geniculatus. Folia amplexicaulia, striata, glabra. Spicae tenues, longae, ad apicem culmi fasciculatae. Cal. 6-phyllus. Cor. o. Stamina 6 calyce longiora. Semen 1 longiusculum, scabrum. De capsula nihil adnotavi, nec modo memini. *Lour.* Non esse Linnaeanum s. *compressum Smith*, ex descriptione patet: sed an generis, cum caps. monosperma? *Meyer Syn.* p. 59. Ad vias *Cochinchinae*. 4.

91. *J. platycaulos Humb. et Bonpl.*; culmo foliato, compresso, erecto; foliis linearibus, planis, glabris; cymâ terminali, congestâ, involucratâ; floribus solitariis, (sub-) sessi-

libus; capsulâ obovatâ, trigonâ, obtusâ, laciniis calycinis subulatis brevioribus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. III. p. 236. Meyer Syn. p. 47. n. 46.* J. culmo erecto, nudo, teretibus compresso; fol. filiformibus, canaliculatis; paniculâ subcompositâ cymosâ; floribus approximatis, hexandris; perigonii foliolis lanceolatis acutis; exterioribus sublongioribus, capsulam ellipsoideam trigonam subaequantibus. *Laharpe l. c. p. 147.* J. *coarctatus*; culmo nudo, inflexo; corymbo laterali, coarctato, subcapitato; petalis aristatis. *Reliqu. Willd. Mss. fide de Schlechtend. fil.*

Rad. fibrosa. Culmi cespitosi, simplices, $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ped., striati, glabri. Folia anguste linearia, culmo duplo breviora, striata. Vaginae striatae, glabrae, flavescentes, 2-3 poll. Cyma solitaria. Bractea sub floribus ovata, acuta, glabra, flavescentis; sub calyce bractee 2 ovatae, acutae, membranaceo-diaphanae, concavae, uninerves, pallidae, calyce duplo breviores. Involucrum diphyllum, foliolis linearibus, glabris, inaequalibus: longiore 1-2-poll. Cal. laciniis lanceolatis, acuminato-subulatis, flavescentibus, concavis, margine diaphanis, basi obsolete trinerviis, 3 exterioribus paulo longioribus. Caps. fusca, glabra, nitida. In monte Quindiu lecta culmo minus compresso. *Kunth l. c.* In specimine Humboldtiano, fide *de Schlechtendal* patris, culmus palmaris, teres, striatus, apice parum incurvatus. Corymbus nudus distantia pollicis infra apicem. Folia culmi fere longitudine, plana, vaginis pollicaribus basi involuta, uti tota planta glabra. *Cls. Laharpe* notat ad specimen in *Herb. Kunth.* e monte Quindiu: „J. *squarrosus* valde affinis, sed culmi compressi; folia erecta, intense viridia; flores in cymis 1-2 densis; perigon. fuscens: foliolis acutis non coriaceis; capsula plerumque trigona. Habitus fere J. *Jacquini*. Foliolum florale plerumque paniculam superat.“ *In ripa Orinoci prope Atures et Carichana; in monte Quindiu inter Ibage et Palmilla. 4.*

92. J. *falcatus Meyer*; caule compresso, stricto; foliis planis, nervosis, subfalcatis; capitulo subsolitario; perianthii laciniis ovatis, acutis: exterioribus mucronatis capsulâ trigono-pyriformi brevioribus. *Meyer in Reliqu. Haenk. Fasc. II. p. 144. Syn. Luzul. p. 34. c. ic. ined. Laharpe l. c. p. 148.*

Habitus fere J. *castanei* minoris. Rhizoma subhorizontale. Caules striati, erecti, rarius paulisper adscendentes, ancipites, palmares vel spithamaei. Folia adversa erecta, ad latus subfalcata, linearia; vaginis diaphano-marginatis, obtuse auriculatis. Bractea spathacea, saepius foliacea, stricta, capitulum ad latus reflectens, nonnunquam capitulo brevior et reflexa, ut reliquae bractee membranaceae. Capitulum solitarium, rarissime unum supra alterum, vix semiglobosum. Per. lacinae ejusdem longitudinis ut in J. *castaneo*, dorso eleganter virides, inter fascias laterales purpureo-nigricantes, margine diaphanae, exteriores longius mucronatae, interiores muticae. Stam. 6, perianthio $\frac{1}{2}$ breviora; antheris oblongis filamenta latiuscula aequantibus. Caps. (in specim. a *Chamisso* lectis) perianthio paulo longior,

5-locularis. Seminum testa laxior albicans, sed non scobiformis. Transitum facit ad MARSIPPOSERMATA. *Meyer.* *Propo Monte Real. Haenke, Chamisso.* 4.

93. *J. chloroticus*; culmo nudo, apice incurvo; corymbo paucifloro, laterali, involucrio subulato suffulto; petalis cuspidatis. *J. pallidus Reliqu. Willd. MS.*

Nomen mutandum, ob *pallidum R. Br.* *In America merid. De Humb.* 4.

94. **J. squarrosus*; culmo nudo; foliis radicalibus numerosis, canaliculatis; paniculâ terminali, compositâ: ramis cymosis. *Smith Engl. Fl. II. p. 164. Fl. brit. 378. Engl. Bot. t. 935. Linn. Spec. 465. Mant. p. 368. Willd. Spec. II. p. 209. Bicheno Trans. Linn. Soc. XII. p. 306. (Rostk. d. Junc. p. 17. n. 29. J. scapo anguloso, stricto; fol. duris, canaliculatis; corymbo suprafastigiato, composito; cal. laciniis ovato-lanceolatis, acutis, capsulam obovatam obtusam aequantibus. Meyer Syn. p. 48. n. 50. J. culm. erecto, strict. nud.; fol. supra sulcatis, glaucis; panic. compositâ, erectâ, interruptâ, subspicatâ; perig. foliolis aequal., oblongis, obtusiusculis, caps. ooideam aequantibus; stam. 6. Laharpe l. c. p. 147.) Ehrh. Calam. 39. (Roth Germ. II. p. 402. Enum. pl. germ. I. 2 p. 90. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 580. Wahlenb. Fl. suec. p. 214. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 165. Balbis Fl. lyon. 1. p. 739. Gaud. Agr. helv. II. p. 218. et hoc teste: Krock. Siles. t. 47. Mühlenb. Cat. p. 36.? Torrey Fl. n. et m. U. St. 1. p. 360.?) Flor. Dan. t. 430. (Sturm D. Fl. H. 56. n. 11. J. Sprengelii Willd. prodr. n. 394. t. 4. f. 8. Röm. et Usteri Bot. Mag. St. V. S. 12.) Hall. Helv. n. 1317. Gr. junc. marit. Ger. emac. 21. f.? Lob. ic. 18. f. Bauh. Theatr. 75. f. Moris. sect. 8. t. 8. f. 13. Lösel Pruss. 115. t. 29. Junco affinis, panic. laxâ etc. Scheuchz. Agr. 350.*

Planta tota rigida foliis patentibus. *Linn. Mant.* Rad. cespitosa, sublignosa, fibris longis, (fuscis), crassis. Culmi solitarii (v. plures) erecti, circiter pedales, ($\frac{1}{2}$ -1 ped.), laeves, obtuse trigoni, (striati), glaucescentes. Folia omnia radicalia (cespitem densum formantia), quidquam patentia, 3-4 poll., rigida, linearia, angustissima, acuta, canaliculata, glabra, basi dilatata vaginantia, (glaucescenti-viridia. Vaginae fuscescentes, striatae, laxae, absque ligula.) Panicula e ramis (2-) 3-4 alternis, cymosis, bracteatis, erectis, ($\frac{1}{2}$ -3 poll.); singulo apice floribus raris magnis. Bractee membranaceae, vaginantes: inferior acuminata brevi, foliaceo; (florales ovatae, obtusae, calyce duplo breviores, pallide fuscescentes). Cal. foliola lanceolata, fusca, nitentia, margine membranaceo (albido, medio testacea), carinata; (interiora quidquam breviora obtusioraque). Antherae longae, lineares. (Stigmata purpurea). Caps. longitudine calycis, nitens, obovata, mucrone exiguo, (semitrilocularis, fuscescens. Sem. gibba, uno latere concava, rugulosa, striata). *Smith.*

Smith. Petala atro-livida, acuminata. *Gaud.* In *Euro-pae borealis pascuis turfosis et sylvaticis; in meridionali rarior et humilior; in Nova Caesarea, Mühlenberg.* 4.

95. *J. Cephalotes Thunb.*; culmo erecto, nudo; foliis filiformibus, canaliculatis; paniculâ decompositâ, laxâ; spicis 8-10 floris; perigonii foliolis subaequalibus: interioribus obtusis fere brevioribus; exterioribus aristatis, capsulam globo-so-triuetram rostratam vix superantibus; staminibus 6. *Laharpe l. c. p. 142.* *J. culmo nudo, tereti; foliis canaliculatis; capitulis subumbellatis. Thunb. Prodr. p. 66. Fl. cap. ed. Schult. p. 557. Willd. Spec. II. p. 215. J. cymosus; culmo nudo; foliis planis; panic. terminali, cymosâ; involuero bivalvi. Lam. Enc. III. p. 267. (fid. Laharpe). Spreng. n. Entd. II. p. 105. J. capensis Spreng. S. Veg. II. 106. J. capensis β angustifolius: scapo teretiusculo; anthelâ capitulis paucifloris compositâ. Meyer Syn. Junc. p. 48. quo teste: J. multiflorus Retz Scand. (sec. Agardh). β scapo foliisque elongatis anthelâque flaccidis. J. capensis Spreng. n. Entd. II. p. 106. J. capensis γ Meyer Syn. Luz. p. 54.*

Totus glaucescens. Folia angusta canaliculata. Panicula longa, attenuata, decomposita, flaccida. Perigonii foliola pallida, exteriora interiora vix superantia. Filamenta antheris vix breviora. Caps. globulosa, minima, longe rostrata, perigonio semper brevior, trilocularis, 4-8-sperma. *Laharpe. Cls. Steudel ad specimina numerosa a Ludwig in Prom. b. spei lecta et nomine J. capensis communicata 2 distinguit formas huc spectantes. In forma prima: culmi 1-1½ ped., compressiusculi, graciles, erecti. Folia filiformia, canaliculata, erectiuscula, culmo dimidio fere breviora, vix ½ lin. lata, basi dilatata planiuscula laxaque vaginantia, margine ibidem albide membranaceo, apice in ligulas lanceolatas acutas producto. Corymbus compositus, quidquam effusus, 1½ poll.. Involucrum universale diphyllum; valvulis basi vaginantibus, apice foliaceis: alterâ corymbum aequante, alterâ brevior. Capitula numerosa, 3-multiflora. Cal. foliola pallide fusca, anguste lanceolata, exteriora aristato-acuminata interioribus obtusiusculis longiora. Stamina calyce plus duplo breviora. Stigmata purpurascencia. In forma secunda: culmus compressiusculus, vix ped., magis strictus. Corymbus pauperior magis contractus, vix ultra poll.. Folia stricta, canaliculata, dorso convexa, 4-5 poll., vix ½ lin. lata, basi in vaginam laxam margine minus membranaceam dilatata. Involucrum minus foliaceum, corymbum vix aequans. Cal. foliola magis purpurascenti-viridia: exterioribus acuminatis interiora obtusiuscula margine membranacea aequantibus. β sec. Sprengel: subbraehialis. Folia simillima *J. cymoso*, sed omnia flaccida, plerumque culmum aequantia, angustiora vel latiora, basi vaginantia, glaberrima, apice haudquaquam subulata. Culmus subangulatus, glaberrimus, crassitie fili emporetici, erectus. Panicula terminalis, cernua. Involucrum univ. foliaceum 2-4-phyllum, paniculam subaequans; partialia scariosa, aristata, glomerulos florum aequantia. Flores pallidi. In *Prom. b. spei; in Nova Hollandia. Gaudichaud.* 4.*

Obs. Addimus hic adhuc descriptiones *J. Cephalotis* a *Thunberg* et *J. cymosi* a *Lamarck* datae, quamvis nihil fere ex iisdem liqueat. Apud *Thunberg*: „rad. fibrosa. Folia radicalia 3-4, erecta, linearia, glabra, culmo breviora, palmaria. Culmi solitarii vel 3, inaequales, glabri, erecti, aphylli, palmares et subpedales. Capitula florum plura. Bracteae setaceae: communis nunc longior, nunc brevior. Glumae lanceolatae, acuminatae.“ Apud *Lamarck*: Culmus 8-9 poll., nudus, subangulosus. Panicula terminalis, ramosa, fere umbellata, basi squamis valvulae 2 lanceolatis, acutis, inaequalibus, ramis paniculae multo brevioribus. Rami hi apice 2-3-flori, fasciculati; sub singulo fasciculo atque flore squamae 2 oppositae, membranaceae, mucronatae, semivaginant. Folia radicalia graminea, plana, substriata, longitudine culmi et ultra, 2 lin. lata.“ An *Lamarck* potius ad *J. capensem*? *Sprengel* *N. Entd.* II. p. 105. distinxit: *J. cymosum* (culmo teretiusculo, aphylo; fol. radicalibus, linearibus, strictis, subulatis; paniculae subumbellatae floribus glomeratis; involucri inaequalibus, lanceolatis; petalis aristatis), a *J. capensi* (culmo compresso, aphylo; fol. radicalibus, linearibus, flaccidis, culmum subaequantibus; paniculae ramis patentibus, proliferis; floribus glomeratis; involucri petalisque exterioribus aristatis; interioribus obtusiusculis); in *S. Veg.* II. p. 106. vero utrumque sub *J. capensi* conjunxit.

96. *J. capensis* *Thunb.*; culmo erecto, nudo; foliis planis, latis, (diaphano-marginatis); paniculâ subsimplici, corymbosâ; spicis 10-15-floris; perigonii foliolis inaequalibus, lanceolatis: exterioribus brevioribus aristatis, interioribus obtusiusculis capsulâ ellipsoideâ mucronatâ vix longioribus; staminibus 6. *Laharpe* l. c. p. 145. α major. *J. capensis*, culmo nudo, compresso; capitulis sessilibus pedunculatisque *Thunb. Prodr.* 66. *Fl. cap.* ed. *Schult.* p. 357. *Willd. Spec.* II. p. 210. (excl. syn. *Lam.*) *J. capensis* α *Meyer Syn. Junc.* p. 48. *J. lomatoxyllus* *Spreng. n. Entd.* II. p. 108. *J. Cephalotes* *Spreng. S. Veg.* II. p. 106. *J. luzuloides* *Herb. Steudel.* β minor *J. Cephalotes* *Spreng. n. Entd.* II. p. 107. γ minimus; pollicaris; *J. cap.* β *Laharpe.*

Differt a *J. Cephalote* praeter characteres datos: rhizomate saepius extra terram repente, folia vera emittente; foliis in rosulam expansis, pelliculâ membranaceâ integerrimâ cinctis; spicis fuscis vel rubescentibus, nunquam pallidis; staminibus perigonii dimidium superantibus; filamentis brevissimis nec antheras subaequantibus ut in *Cephalote*; capsula uniloculari, polysperma; habitu rigidior. *Laharpe.* In α apud nos: radix repens, horizontalis, fusca, fibris numerosis et apice foliorum basibus persistentibus. Folia omnia radicalia, erecto-patentia, basi se invicem amplexantia, ensiformia, acuminata, acumine fusco subpungente, basi complicata, dein plana, ecarinata, vix striata, lucida, margine pallide fuscescente membranaceo diaphano, 4-6 poll., 4-6 lin. lata. Culmus aphyllus, strictus, subcompressus, pallide viridis, crassitie pennae corvi et ultra, 8-10 poll. Corymbus primum strictus, serius erecto-patens, compositus, 2 poll. et ultra. Involuerum universale e valvis 2 ovatis, concavis, striatis, glabris, margine membranaceis, in acumen vix foliaceum productis, pallide fuscis, corymbo multoties brevioribus, 5-7 lin.; inferiore paulo brevioribus; bracteis subramissimilibus sed minoribus, pallidioribus minus striatis; bracteis sub capitulis 2 ovato-lanceolatis, aristato-acuminatis, concavis, pallide fuscis, nervo medio apiceque intensioribus, capitulum aequantibus vel paululum superantibus. Capitula late ovata, magnitudine pisi, 3-8-flora, solitaria in ramulis sat crassis, vel unum supra alterum. Cal. foliola lanceolata, concava, cari-

nata; exteriora aristato-acuminata, fuscescentia, dorso intensiora, apice nigricantia, $1\frac{1}{2}$ lin.; interiora plana obtusiuscula, margine late membranaceo albido, dorso purpurascenti-fusca, vix ultra lin.. Stam. 6., calyce duplo breviora; antherae pallide flavae, filamenta superantia. Folia et habitus LUZULAE. Varietas haec, certe huc spectans, tamen calycis foliolis exterioribus, nec interioribus, longioribus a caractere a clo. *Laharpe* dato recedit. In β secus *Sprengel*: rad. bulbosa, fibrillosa; culmus spitham. vel unc., strictus, simplex, glaber; folia omnia radicalia imbricata, basi latiora ratione longitudinis, 2 fere lin. lata, digit. v. poll. longa, glaberrima, striato-nervosa, culmo breviora; culmus apice trifidus; florum glomeruli in quovis ramulo, quarto e media divisione, pisi vel Avellanae magnitudinis, atropurpurei, basi involucris scariosis pallide atropurpureis aristatis glomerulos subaequantibus; corollae 6-10, atropurpureae, aristatae, erectae, glaberrimae. *J. capitato Weig.* similis. In var. γ , quae in herb. cli. *Steudel* forma tertia *J. capensis* dicitur: culmi 1-3 poll., capitulo solitario vel uno supra alterum posito magnitudine Pisi terminati: folia plana, erecta, obsolete 3-nervia, basi purpurascencia, 1- $1\frac{1}{2}$ poll., $\frac{1}{2}$ lin. lata; cal. foliola lanceolata, atropurpurea, exterioribus acuminatis interiora latiora acutiuscula late albido-marginata vix aequantibus. *In Prom. b. spei.* 4.

Obs. Secuti sumus hic potius elm. *Laharpe*, quam eelm. *Meyer*, qui sub *J. capensi* nimium conjunxit, cum in *Syn. Junc.* p. 48. n. 51. et in *Syn. Luzul.* p. 34. sequentem dedisset expositionem: *J. capensis Thunb.*, scapo anguloso; foliis canaliculatis planisve; anthelâ suberectâ; perianthii laciniis exterioribus acuminatis, interioribus brevioribus acutis, capsulam ovatam mucronatam longe superantibus. α . *J. capensis Thunb.*, *Willd.*, *J. Cephalotes Spreng. N. Entd.*, *J. lomtophyllus Spreng. N. Entd.* β angustifolius: scapo teretiusculo; anthelâ capitulis paucifloris compositâ. *J. cephalotes Thunb.*, *Willd.*, *J. cymosus Lam.*, *Spreng. N. Entd.*, *J. multiflorus Retz.* γ scapo foliisque elongatis anthelâque flaccidis. *J. capensis Spreng. N. Entd.* „30 circiter plantae hujus polymorphae specimina, ait, quorum plura ipsorum *Thunbergii* atque *Lamarckii*, me docuerunt, formas illas 4 a clo. *Sprengel* nuper descriptas unius ejusdemque esse speciei, quod iconibus et descriptionibus in posterum probare conabor. *J. multifloro Agardh in litt.* adscripsit: species singularis, foliis pilosi, floribus articulati, et magis singulare, quod *Retzius Prodr. Fl. Scand.* ed. 2 inserisisset, licet madëirensis sit planta.“ *Thunberg* describit in *J. capensi* „culmum striatum, glabrum, erectum, spithamaeum; florum capitula trichotome paniculata, in trichotomia sessilia; pedunculos capillares, unguiculares.“ *Sprengel* in *N. Entd.* *J. Cephalotem* (culmo tereti, aphylo; fol. subensiformibus, planis, acutis; floribus capitatis involucrisque coloratis aristatis) distinxit a *J. lomtophylo* (culmo teretiusculo, aphylo; fol. radicalibus, ensiformibus, integerrimis, diaphano-marginatis; capitulis terminalibus pedunculatis; petalis exterioribus acuminatis: interioribus obtusiusculis), utrumque vero in *S. Veg.* iterum sub *J. Cephalote* conjunxit. *Observ.* a clo. *H. Brown* in *Prodr.* p. 581. facta („*Juncus capensis Linn. Suppl.* p. 268., qui planifolius et serratus, non hujus generis „(LUZULAE nempe)“ nec forsitan *Junci* legitima species, etsi ovarii loculi polyspermi et capsula 3-locularis“) non huc, sed ad *J. serratum* pertinet, cum in *Linn. Suppl.* non existât *J. capensis*.

97. *J. magellanicus Lam.*; culmo nudo, 1-floro; foliis planiusculis, angustissimis, culmo longioribus; flore laterali. *Lam. Enc.* III. p. 266. *Willd. Spec.* II. p. 208. *Meyer Syn.* I. p. 50. n. 52. *J.* culm. nudo, compresso, stricto; foliis canaliculato-planis; flore solitario, magno, pseudo-laterali; perig. foliolis subaequalibus, linearibus, acutis, capsulam globosam aequantibus; stam. 6. *Laharpe l. c.* p. 155. *ROSTROVIA sphaerocarpus Desv. Journ. d. Bot.* I. p. 527. t. 12. f. 2.

Rad. non repens. Culmus solitarius (vel plures,) gracilis, fere filiformis, quasi ensiformis aut angulatus, 6-8-12 poll.. Folia radicalia plana, parum carinata, glabra, culmo plerumque longiora eundemque basi vaginantia. Pollicem vel ultra ab apice flos lateralis, sessilis; in axilla squamae parvae, lineari-subulatae, 4 lin. longae. Calycis foliola 6 linearia, acuta, $5\frac{1}{2}$ lin. longa, nigricantia, margine alba. Filamenta 6, brevia: antherae lineares calyce parum breviores. Germen sphaericum, nigricans, totum florem explens. Stylus longiusculus. Stigmata 3 lineari-setacea. *Lam.* (sic, nec uti *Willdenow* male interpretatur). Totus fuscescens, 6 poll. circiter. Culmi subinde torti. Folia filiformia, rigida, compressa, quidquam canaliculata, acuta, basi vaginâ nitidâ fuscâ. Folium florale florem lateralem superans. Perig. foliola angusta, arcuata, capsulae appressa. Stylus brevis. Caps. sphaerica, glaberrima, intense fusca, mucrone brevi; valvis crassis coriaceis; dissepimentis parum prominentibus. Sem. ooidea, opaca, numerosa; integumento exteriori crassiusculo et fere suberoso. *J. trifido* proximus. *Laharpe*. Folia linearia, subcarinata. Bractee ad basin floris 2 acutae, rigidae, alterâ longiore. Stam. calyce paulo breviora. Antherae filamentis paulo longiores. *Desv.* *Ad fretum magellanicum Commers.*, in *ins. Maluinis Gaudich.* 4.

e. *Foliis ensiformibus.*

98. *J. xiphioides Meyer*; foliis culmeis ensiformibus, enodulosis; anthelâ supradecompositâ; perianthii laciniis lanceolatis, acuminatis, subaequalibus, capsulam trigono-oblongam acutiusculam subaequantibus. *Meyer* in *Reliqu. Haenkean. Fasc. II.* p. 143. *Syn.* p. 50. (ic. ined.) *Laharpe l. c.* p. 153.

Similis NARTHECIO. Rhizoma flexuosum, fibris validis. Caules ascendentes, subflexuosi, basi teretes, mox ancipites ut in *Sisyrynchiis*, 2-3 lin. lati, sulcato-striati, $1\frac{1}{2}$ -2 ped.. Folia palmaria v. spithamaea, lineari-lanceolata, basi 3-4 lin. lata, leviter nodulosa; vaginis equitantibus exauriculatis, margine tenui in folium desinente. Anthela flexuoso-crecta, saepius spithamaea. Bractea spathacea ensiformis anthelâ 3-4-plo brevior; bractee reliquae planae membranaceae, pallide fuscescentes, lanceolato-acuminatae v. ovatae obtusiusculae. Capitula pauciflora, vix semiglobosa. Per. lacinae margine diaphanae, dorso fusco-rubentes, praesertim exteriores parum longiores. Stam. perianthio dimidio breviora; antheris sublinearibus, filamentorum basi dilatatorum fere longitudine. Caps. mucronulata, perianthio demum parum longior, exacte 3-ocularis. Sem. apiculata. A *J. ensifolio Wikst.*, quocum jungitur in *Spreng. Syst. Veg.* 2. p. 109. longe differt tum partium floralium structurâ, tum fol. enodulosis, tum toto habitu nostro omnino peculiari. *Meyer.* In *Nova Hispania prope Mont Real. Haenke.* 4.

99. *J. ensifolius Wikström*; caule complanato; foliis ensiformibus, sursum (obsolete) nodulosis; paniculâ densiflorâ; foliolis calycis lanceolatis, acuminatis. *Wikstroem Act. Acad. holm.* 1825. p. 1.

Culmus subadscendens, flexuose curvatus, glaber, striatus, vaginat

tus, simplicissimus, articulatus, internodiis pollicaribus, circiter dodrantalis. Folia sparsa, suberecta l. curvata, longe vaginantia, integerrima, striata, glabra, margine inferne membranacea, complanata, 3-4-poll., medio 2 lin. lata, suprema paniculam superantia. Bractea spathacea lanceolata, attenuata, extus curvata, apicem versus connata, inferne margine membranacea, glabra, unguicularis: bractee interiores lanceolatae, acuminatae, integerrimae; intimae ovatae, minores, fuscae, 1-2 lin.. Panicula parva, densiflora, (capitulum fere 3 lin., bractea dimidio brevius), pedunculis glabris, brevissimis. Calycis foliola lanceolata, attenuata, integerrima, glabra, aequalia, fusca, lineae. Stamina minuta „(quot?).“ Germen oblongum, glabrum. Stigma trifidum, subsessile. *In Unalasccha. 4.*

Obs. Huc spectare videtur *J. iridifolius*, fol. lineari-ensiformibus, distichis; capitulis geminatis terminalibus; involuero monophyllo; petalis aristatis. *Reliq. Willd. Ms.*, quem *Fischer* ex Unalasccha tulit, et quem *Sprengel S. Veg.* cum *J. xiphioides* conjungit.

100. *J. serratus Thunb.*; culmo folioso; foliis ensiformibus, planis, serratis, subtus canis; paniculae vaginis subulatis, perfoliatis. *Linn. Suppl. 208. Willd. Spec. II. p. 219. Thunb. Prodr. 66. Fl. cap. ed. Schult. p. 557. Spreng. n. Entd. 2. p. 104. ACORUS Palmita Herb. antiqu. (fid. Herb. Schreb.).*

Culmi foliosi, teretes (trigoni potius), crassitie digiti minoris, 4-6 ped.. Folia alterna, graminea, duriora, laevia, subnervosa, vix culmi longitudine. Panicula conglomerata, minus patula, floribus sparsis, conglomeratis. Affinitas *J. pilosi*; sed *J. acuto* longe major. *Linn. fil. l. c.* — Rad. teres, descendens, inanis, sublignosa, lacero-subvillosa, longa, supra terram saepe denudata, crassitie brachii. Folia radicalia plura, apice valde attenuata, supra canaliculata, subtus carinata, carina scabra, glabra, erecta, 2 ped. et ultra (basi pollicem lata). Panicula florum terminalis, supradecomposita, amplissima, pedalis et ultra. Vaginae ramis et ramulis paniculae subjectae, basi vaginantes, inde lanceolatae, acuminatae, serratae, glabrae, paniculis breviores, sensim minores. *Thunb.* Non hujus generis esse monet *Meyer.* *In aquosis, paludibus, rivulis minoribus Prom. b. spei. 4.*

Obs. In specimine Thunbergiano in *Herb. Schreb.* panicula fere ped., stricta, densa; florum glomerulis 4-6-floris. Bractee sub ramis erectae, basi ochream amplam, laxam, 4-6 lin. formantes, dein lanceolatae, acuminatae, carinatae, striatae, nervosae, glabrae, basi 1 $\frac{1}{2}$ poll., superne sensim minores; bractee sub ramulis similes, sed multoties breviores. Calycis foliola subaequalia; exteriora lanceolata, acuta, concava, carinata, enervia; interiora tenuiora, plana, ovato-lanceolata, acuta, margine membranacea, unico reliquis minore; omnia fusca, nitentia, capsulam paulo superantia. Stamina 6, calycibus longiora. Filamenta cum calycis laciniis alternantia, erecta, filiformia, calyce breviora. Antherae erectae, exsertae, lineares, obtusae, flavae. Stylus, ex *Laharpe*, subnullus, stigmate subcapitato, ex *Burchell* stigmata 3 sessilia. Capsula subglohosa, breviter mucronata, calyce brevior, glabra, fusca, 3-locularis, 3-valvis: valvulis ovatis, concavis, dorso sulco longitudinali, intus dissepimento firmo. Sem., ex *Laharpe*, 4-8 in quovis loculo, centro valvularum marginibus affixa. Habitus CLADII potius vel RESTIONIS, quam JUSCI. *Cl. Laharpe* in *Mem. d. l. Soc. d'Hist. nat. III. p. 92.*, uti *Meyer*, hanc speciem a Juncis sejunxit et *Restiaceis* inseruit, neuter tamen novum inde constituit genus.

B. *Testa seminis utrinque in sacculum relaxata:*

101. **J. acutus*; culmo nudo, mucronato; panicula sub apice aggregata; bractea spinosa; capsula calyce duplo longiore,

rotundatâ, obtuse mucronatâ. *Smith Engl. Fl.* II. p. 158. *Fl. brit.* p. 574. *Engl. Bot.* t. 1614. *Bicheno Trans. Linn. Soc.* XII. p. 297. (corr. syn. *Lam.*) (*Rostk. Monog.* 14. J. culmo foliisque teretibus; spathâ pungente; anthelâ supradecompositâ; perianthio dimidiam capsulam subglobosam aequante. *Meyer Syn.* p. 52. n. 54. J. fol. pung.; panic. supradecompositâ, saepius coarctatâ, rarius laxâ; spicis 2-4-floris; perig. foliolis aequalibus, interioribus apice late membranaceo-dilatatis, mucronatis, capsulâ turbinatâ brevioribus. *Laharpe l. c.* p. 122.) *Linn. Spec.* p. 465. (excl. β). *Willd. Spec.* II. p. 204. (excl. syn. *Lam. et β*). *Lam. Enc.* III. p. 264. (*Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 165. (excl. syn. *Linn.*) *Syn.* p. 151. (excl. syn. *Smith*). *Desf. Fl. Atl.* 1. p. 511. *Schousb. Maroc.* 1. p. 177. (excl. β). *Scop. Carn.* n. 450. *Savi bot. etr.* 1. p. 112. n. 155. *Seb. et Mauri prodr. Fl. rom.* p. 151. n. 421. *Bertolon. Amön. it.* p. 241. *Brotero Fl. Lusit.* p. 509. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 571. *Hbst Gram.* IV. t. 97. J. *subulatus Forsk. Aeg.* p. 75. (fid. *Meyer*). J. *maritimus Moricand Ven.* 1. p. 172. [fid. *Poll. Fl. Veron.* 1. p. 469.]) *Bauh. Pin.* 11. *Prodr.* 21. c. fig. *Theatr.* 173. c. fig. *Bauh. Hist.* II. 520. c. fig. mala. *Moris. Hist. Sect.* VIII. t. 10. f. 15. (bona). *Barrel. ic.* t. 203. f. 2. — β paniculâ elongatâ. *Laharpe l. c.*

Rad. fibrosa, dense cespitosa, profunde in arenam penetrans. Culmi 2-4 ped. (in Hybernia 7-8 ped.), erecti, stricti, teretes, simplices, rigidi, tenaces, mucrone acuto rigido, a panicula ad alterum latus presso eandemque quidquam superante. Folia nulla, licet culmi steriles, apice mucronato-pungentes, folia olim dicta. Panicula composita, repetito-subdivisa, corymbosa (compacta), e fissura laterali vaginante: ramis glabris, obsolete compressis. Bractea similis apici culmi paniculam basi cingens, eodem minor, magisque patens: interiores bractee plures, adhuc minores, attenuatae, apice membranaceae. Flores subcapitati. Calycis foliola 3 interiora obtusa. Stamina lata, brevia. Stylus vix ullus. Caps. late ovata, dura, fusca, mucronato-acuminata, angulis 3 obtusis, apice totidem sulcis impressis, basi calyce emarcido cincta. Semina ovata, pellucida, tunicâ unilateralis, utrinque elongatâ. *Smith Engl. Flor.* Differt a J. *maritimo* foliis magis pungentibus, paniculâ minus amplâ, foliis floralibus 2-3 brevioribus minus inaequalibus; praesertim vero perig. foliolis interioribus latissimis, obovatis et capsulâ turbinatâ perigonium superante. Bractee maculis fuscis nitidis, in J. *maritimo* rarioribus. *Laharpe.* Calycis foliola viridia, dorso fusca, albo marginata: exteriora valde carinata, lanceolata, obtusiuscula; interiora ovalia, obtusissima, emarginata. *M. et Koch.* In speciminibus pluribus tamen cal. foliola exteriora etiam acuta; interiora latius marginata, obtusa, rarius emarginata vel mucronulata. Rhizoma horizontale repens, crassum fuscum. Vaginae ad culmorum basin pallide fuscae, striatae, superiores mucrone foliaceo brevi aristatae. *In arena profundiore ad littora maris a Britannia ad Mediterraneum.* 4.

102. *J. maritimus* Lam.; culmo nudo, mucronato; paniculâ sub apice proliferâ prope mucronem erectum; bracteâ spinosâ; capsulâ oblongâ longitudine calycis. *Smith Engl. Fl.* p. 159. *Fl. Brit.* 375. *Engl. Bot.* t. 1725. *Bichenov Trans. L. Soc.* XII. 299. (excl. syn. Lam.) (*Rostk. d. Junc.* p. 16. *J. scapo foliisque teretibus; spathâ elongatâ, pungente; anthelâ supradecompositâ; calyce capsulam ellipticam obtusam mucronatam aequante. Meyer Syn.* n. 55. p. 53. *J. fol. subpungentibus; paniculâ supradecompositâ, plus minusve diffusâ v. erectâ; spicis 4-8 floris; perig. foliolis aequalibus lanceolatis, acutis, capsulâ ellipsoideo-ovoideâ mucronatâ paulo brevioribus. Laharpe l. c.* p. 121. *Lam. Enc.* III. p. 264. n. 2. *Lam. et Decand. Fl. fr.* III. p. 162. (excl. syn. Linn.) *Syn.* p. 151. (excl. syn. Smith). *M. a Bieb. Taur. Cauc. Suppl.* p. 275. *Savi Bot. Etr.* II. p. 66. *Bertol. Amön.* p. 256. 241. *Willd. Enum. H. Berol.* p. 390. *Roth n. Beytr.* 1. p. 194. *Enum. pl. germ.* I. 2. p. 91. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 572. *Host Gram.* III. t. 80.) *J. acutus* β Linn. *Spec.* p. 464. *Willd. Spec.* II. p. 205. (excl. syn. Lam.). (*J. spinosus, involucris paniculae infimae pungentibus, superioris setiferis. Forsk. Aeg.* p. 75. *J. acutus Mühlenb. Desc. uber.* p. 205. *Pursh Fl. sept. Am.* 1. p. 235. (excl. syn. Smith et Willd.) *Torrey Fl. n. et m. U. St.* 1. p. 550. (excl. syn. aliqu.) *Moricand. Ven.* 1. p. 175. (fid. *Pollin. Fl. ver.* 1. p. 469.) *J. auctus Retz Scand.* ed. 2. n. 417. (sphalmate). *J. effusus Herb. Amer. sept.* apud Bosc, Delessert, Desfont. etc. (fid. Laharpe). *Schönus coarctatus Seenus iter.* p. 74. *S. Veg. ed. nost.* II. p. 63. [uterque fide Meyer]). *Moris. Hist.* III. 252. Sect. 8. t. 10. f. 14. — β *Juncus rigidus*; culmo nudo, superne incurvo, pungente; paniculâ laterali elongatâ; pedunculis compressis, nodosis; calyce mucronato. *Desf. Fl. Atl.* 1. p. 512. *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 155. *J. maritimus*; paniculâ sublaterali, laxâ, longâ, bracteis 2 inaequalibus pungentibus involucreatâ; capsulis triangularibus, acutis, corollae longitudine aut levissime longioribus. *Brot. Fl. Lusit.* p. 510.?

Acuto humilior (vix), tenuior, magis glaucus. Panicula, bractea et apex culmi magis erecta; bractea multo brevior (quod in nostr. specim. mediterraneis haud ita) ramique principales paniculae magis inaequales. Calycis foliola acuta, margine membranacea, undulata apicem versus saepe lacera. Capsula multo minor quam in *acuto*, oblonge prismatica nec ovata aut subrotunda, nec calycem superans. *Smith Engl. Fl.* Cal. foliola lanceolata; exteriora acuta; interiora obtusa integra. *Mert. et Koch.* In speciminibus nostris in floribus junioribus foliola calycis fere omnia acuta; in fructiferis vero exteriora acuta, interiora obtusata saepe lacera. In *rigido Desf.* (quem Meyer in *Syn. Junc.* ad *J. glaucum* γ cum? posuit, in *Syn. Luzul.* p. 34. vero synonymon

J. maritimi dicit): Culmi recti, glabri, rigidi, 2-3 ped., apice subcompressi. Paniculae culmo subinde breviores, coarctatae, rectae, rigidae, subinde incurvae, 27-54 lin.. Rami compressi, ramosi: floribus erectis, pedicellatis sessilibusve: pedicellis exterioribus brevioribus, 2-5-floris, hinc compressis, nodulis rufescentibus. Calycis lacinae coriaceae, lanceolatae, mucronatae. Vaginae plures e nodo singulo: exteriores majores, basi fusco maculatae, lanceolatae, acutae. Caps? *Desf.* Ad hanc varietatem nobis pertinere videtur *J. maritimus Brotero*, qui sequentia monet: „culmus foliaque altiora et graciliora quam in acuto „(qui exacte cum acuto L. convenit),“ panicula longior, ramosior, laxior, saepius prolifera; ex involucri bracteis una longissima; capsula minor, non subglobosa sed triangularis, nigra, corollâ persistente vix longior.“ *In palustribus maritimis Europae, in Africa, in Canariis, Prom. b. spei, in America septentrionali (J. acutus Bott. amer.), in nova Hollandia et in insula van Diemen, fide Brown. Prodr. p. 258; β in Barbaria Desf., in Lusitania ad Costa da Trafaria. Brot. 4.*

Obs. Specimen possidemus ex Hispania ab amiciss. *Dufour* nomine *J. maritimi* communicatum, in quod satis bene quadrat descriptio *J. maritimi Brot.* Habitus fere *J. paniculati Hoppe*, sed multoties major validiorque; culmus 5 ped., crassitie pennae anserinae, laevis; panicula fere ped., laxa, suberecta, bractea pungente duplo longior, ramosissima: ramis valde inaequalibus, compressis; bractee sub ramis lanceolatae, acuminatae, carinatae, stramineae, basi haddae; flores in apicibus pedunculorum 2-3 congesti, inexpandi bractee vix aequantes; cal. foliola flavescenti-viridia, ovato-lanceolata: exteriora carinata, acuta, longiora; interiora planiuscula, obtusa, margine albide membranacea; stam. calyce duplo breviora; antherae filamentis longiores; capsulae desunt. *Laharpe J. maritimum* valde variare dicit quoad magnitudinem paniculae, florum fasciculorum aggregationem, colorem capsulae e pallide fusco in nigricantem transeuntem et quoad longitudinem foliorum floralium mox erectorum, mox recurvorum.

103. **J. grandiflorus*; culmo nudo, unifloro; foliis teretibus; foliolis calycinis lineari-subulatis, longissimis, inaequalibus. *Lam. Enc. III. p. 266. Linn. Suppl. p. 209. Willd. Spec. II. p. 207. Forst. in Comm. gott. IX. p. 27. t. 5. J. culmo unifloro folioque teretibus; perianthio maximo, inaequali, capsulam ovatam acuminatam superante. Meyer Syn. p. 54. n. 56. J. culmo erecto, tereti, nudo; fol. teretibus; flore solitario, maximo, tribracteato; perig. foliolis linearibus, inaequalibus, capsulam triquetram turbinato-lanceolatam superantibus; stam. 6.; antheris bicuspidatis. *Laharpe l. c. p. 154. J. uniglumis Forst. in Herb. Schreb.. SCHEUCHZERIA uncapsularis Commers. Herb.. MARSIPPOSPERMUM calyculatum Desv. Journ. d. Bot. 1. p. 550. t. 12. f. 1.**

Gramen vix pedale, glaberrimum. Culmus teres, basi vaginatus. Folium unicum, teres, subulatum, rectum, culmo longius. Flos terminalis, magnus, erectus. Valvulae calycinae erectae, acutae; alternae breviores, pollicares. Stam. et Pistill. valvulis calycinis breviora. *Linn. fil. Rad. repens, squamis laevibus, ferrugineis. Culmi erecti, nudi, vix pedales, basi squamis vaginati, vel saepe folio supra descripto; culmi steriles plures, floriferis longiores. Squamae sub flore 2, brevissimae, rotundatae. Calycis foliola angustissima, lineari-subulata, acutissima, erecta, subcarinata, margine membranacea, alterna longiora, 1-1½ poll., minora ½ poll., persistentia. Filamenta 6, bre-*

vissima: antherae lineares, calyce dimidio breviores. Germen oblongum, trigonum, staminibus brevius. Stigmata 5 longa, acuta. Capsula prismatica, apice trifarie dehiscens, 5-locularis. Semina numerosa. *Lam.* Culmi plures, ped., rigidi, crassitie pennae gallinae. Folium culmo crassius, superne subcanaliculatum. Squamae sub flore membranaceae, subdiaphanae, 2 fere lin., nec brevissimae. Antherae 4-6 lin. longae, crassae, stigmatibus breviores. Stigmata patentia, $\frac{1}{4}$ poll. Folia, vaginae, culmusque sub flore compressus torta, flavescentia. *In freto magellanico, in insula Tierra del fuego; in insulis Maluinis ad rivulos stagnaque.* 4.

104. * *J. trifidus*; culmo nudo; foliis radicalibus paucissimis; bracteis 3 foliaceis, canaliculatis; floribus terminalibus 1-3. *Smith Engl. Fl.* II. p. 163. *Fl. brit.* 578. *Engl. Bot.* t. 1482. *Linn. Spec.* 465. *Willd. Spec.* II. p. 208. *Bichenov Trans. Linn. Soc.* XII. p. 514. (*Rostk. Monogr.* 54. *J. culmo paucifloro foliisque canaliculatis setaceis; vaginis ciliatofissis; perianthio subaequali, capsulam ovatam acuminatam non aequante.* *Meyer Syn.* p. 54. n. 57. *J. culm. erecto, 1-foliato foliisque setaceis; floribus 1-3 terminalibus; perig. foliolis aequalibus, lanceolatis, acutis, capsulam ovoideam mucronatam vix aequantibus; stam. 6., antheris mucronulatis.* *Laharpe l. c.* p. 154.) *Lightf.* 185. t. 9. f. 1. (*Lam. Enc.* III. p. 271. (excl. syn. *Hall.*) *Scop. Carn.* n. 452. *Krock. Siles.* p. 557. t. 48. *Roth Germ.* 159. II. 401. *Enum. pl. germ.* I. 2. p. 92. *Mert. et Koch Deutsch. Fl.* II. p. 579. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 214. *Gaud. Agr. helv.* II. p. 216. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 165. *Vill. Delph.* II. p. 231. 242. *Savi Bot. etr.* II. p. 68. n. 552. *Hoppe Anl. Graes. z. trochn.* n. 12. *Bot. Zeit.* 1825. p. 430. *Torrey Fl. n. et m. U. St.* I. p. 562.) *Fl. Dan.* 107. (*Host Gram.* III. t. 85.) *Dicks. H. Sicc. Fasc.* 1. 6. *Hall. helv.* n. 1515. *Bauh. Hist.* II. 521. f. 522. *Theatr.* 185. f. *Gesn. Fasc.* 14. t. 4. f. 16. β *monanthos.* *Laharpe, Mert. et Koch, Roth* II. cc. *J. monanthos* *Jacq. Enum.* 61. *Obs.* p. 226. t. 4. f. 1. *Bot. Zeit.* 1825. *Fl. Dan.* 1691. *J. trifidus a monanthos* *Meyer l. c.* Rad. repens, nigra, (nodosa, horizontalis), fibris copiosis (flexuosis, sublignosis). Culmi conferti, erecti, graciles, filiformes, striati, spithamei, (5-10 poll.), excepta basi apiceque nudi. Folium radicale unum alterumve, basi vaginans, angustissimum, canaliculatum, acutum, suberectum, culmo multo brevius (absque vagina 1-5 poll.), saepius nullum; basi squamis membranaceis iubricatis fusciscentibus, nitidis, (striatis, infimis sensim minoribus) vaginatum. Vaginae foliiferae arctae, pallide fusciscentes vel purpurascens, 1-1 $\frac{1}{2}$ poll., apice fasciculo setarum albidarum terminatae). Bractea 3, raro 2 ad apicem culmi, similes folio radicali, sed plerumque longiores, suberectae, basi dilatatae, membranaceae, saepe abruptae auriculataeve. Flores terminales, (plerumque terni, subinde 1 et 4) sessiles aut pedunculati, erecti, bracteis 2 membranaceis, fus-

cis. Cal. foliola fusca, (ovato-lanceolata), acuta, obsolete nervosa; (exteriora paulo longiora longius acuminata). Filamenta brevissima. Antherae lineares, oblongae. (Stylus demum calyce multo longior.) Caps. elliptica, acuta, (potius ovata, mucronato-acuminata, obsolete trigona, fusca), calyce quidquam longior. *Smith.* β , qui pluribus species propria, differt culmis plerumque 1-floris; foliis caulinis 3 (bracteis aliorum) non in apice culmi approximatis, sed remotis et per totum culmum sparsis, flaccidioribus. *In Alpibus a Lapponia ad Apenninos; in Terre Neuve La Pylaie, in Amer. sept. prope New-Hampshire. Bigelow.* 4.

105.* *J. stygius*; culmo foliisque canaliculatis setaceis; capitulo erecto; perianthii laciniis exterioribus acuminatis: interioribus brevioribus, obtusis, dimidiam capsulam trigono-oblongam acutam subunilocularem oligospermam vix superantibus. *Meyer Syn.* p. 55. n. 58. *J. culm. erect., filiformi, unifoliato v. nudo; fol. setac. subteretibus; florib. in capitula subbina triflora remotiuscula dispositis; perig. fol. aequalibus, lanceolatis, acutis, capsulam ovoideam subaequantibus (?); stam. 6., antheris muticis minutis. Laharpe l. c. p. 156. J. fol. setac., depressiusculis; pedunc. geminis terminalibus; glumis solitariis, subbifloris. Linn. Spec. 467. Willd. Spec. II. p. 215. Wahlenb. lapp. p. 83. Fl. suec. p. 213. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 591. Roth Enum. pl. germ. 1. 2. p. 93. Bot. Zeit. 1820. p. 80. Svensk Bot. t. 497. f. 1. β culmo nudo; capitulo terminali solitario. Laharpe l. c.*

„Culmi spithamaei, simplices. Folia lineari-subulata, altitudine culmi, erecta, depressa, laevia, tria, α . ad radicem, β . in medio culmi, γ . culmum instar spathae terminans. Pedunculi 2 terminales. Gluma biflora flosculis 2 sessilibus, glumâ longioribus. Petala exteriora angustiora, acutiora, concava, extus purpurascens, interiora pallida. Stamina filiformia. Antherae flavae. Germen majusculum. Stylus albus. Stigmata 3, reflexa.“ *Linn. Råd. fibrosa (pallida). Herba tota, praecipue ad vaginas et apices foliorum purpurascens, capsulis aurantiacis. Folia compressiuscula, isthmis intercepta (1½-3 poll.). Vaginae arctiusculae, margine membranaceo apice in ligulas breves obtusas productae. Culmi filiformes, erecti (3-7 poll., teretes, graciles). Flores subinde etiam 3 (1-3 in capitulum congesti; subinde capitulum unum supra alterum, infimo breviter pedunculato. Cal. foliola exteriora acuminata, interiora obtusiuscula paululum breviora, vix 1½ lin., sub 3-nervia). Caps. acuta, magnitudine hordei (2½ lin.), calyce acuminato duplo longior. Sem. utrinque arillo acuminata (pallida, lin. fere longa). Wahlenb. In Sueciae paludibus cespitosis sylvaticis profundis; in Lithuania, in turfosis Algoviae in Bavaria D. Frölich; in alpibus tyrolensibus; β in Terre-Neuve. La Pylaie. 4.*

106.* *J. biglumis*; culmo erecto, simplici, basi folioso; foliis planis; capitulo bifloro, solitario, secundo, terminali, basi bracteato. *Smith Engl. Fl.* p. 172. *Fl Brit.* 382. *Engl. Bot.* 899. *Linn. Spec.* 467. *Fl. lapp.* ed. 2. §8. *Montin*

Amön. acad. II. 266. t. 3. f. 5. *Willd. Spec.* II. p. 216.
Bicheno Trans. Linn. Soc. XII. p. 520. (*Rostk. Monogr.*
 53. J. culmo setaceo; fol. compresso-semiteretibus, canali-
 culatis, crassioribus; capitulo subsecundo, paucifloro; perianth.
 laciniis obtusis: interioribus brevioribus, angustioribus, dimi-
 diam capsulam subtrilato-pyriformem obtusam vix superanti-
 bus. *Meyer Syn.* p. 56. n. 59. J. culm. erecto, subtereti,
 nudo; fol. basi canalic., apice teretibus; flor. subbinis, latera-
 libus; perig. foliolis aequalibus, lanceolatis, capsulâ oblongâ
 retusâ brevioribus; stam. 6; anther. minutis, muticis. *La-
 harpe l. c.* p. 57.) *Lightf.* 1100. *Höök. Scot.* 106. (*Wah-
 lenb. Lapp.* p. 84. *Fl. suec.* p. 213). *Fl. Dan.* 120. (a clo.
Roth ad J. triglumem simul cum t. 132. laudata. *Svensk
 Bot.* t. 497. f. 2.)

Rad. fibrosa. Culmi solitarii, 2-4 poll.. teretes vel subquadrangu-
 lares, striati (saltem sicci). Folia radicalia plura erecta (v. re-
 curva), subulata, subcanaliculata, culmo dimidio breviora, basi
 vaginantia, sed haud multum dilatata, extus sine omni dissep-
 imento nodove. Flos alter supra alterum: ambo semper secundi,
 quâ notâ facile a bifloro *triglumi* distinguitur. Bractee 2 latae,
 membranaceae: superior apice foliaceo, erecto, flores multo su-
 perante; inferior brevior, deflexa, obtusa. Calycis foliola aequa-
 lia, elliptico-oblonga, margine membranacea (fusca). Filamenta
 6 capillaria, calyce longiora. Antherae breves, tortae. Caps.
 calyce longior (1½ lin.), abrupta, valvulis (pallide) fuscis, mar-
 gine nigris. Semina ovata, fusca, pellucida, tunicâ laterali, mem-
 branaceâ, albidâ, utrinque acuminatâ. *Smith E. Fl. l. c.* „Planta
 faciem gerit *SCHOENI ferruginei.*“ *Linn.* Differt tantum a *J.
 triglumi* bracteis floralibus 2 inaequalibus: exteriore flores exce-
 dente et capsulâ retusâ. *In alpibus lapponicis, islandi-
 cis, rarius in scoticis; in Melville Island. Parry.* 4.

107. **J. triglumis*; culmo erecto, simplici, inferne fo-
 lioso; foliis planis; capitulo solitario terminali, subtrifloro,
 erecto; bracteis ellipticis. *Smith Engl. Fl.* II. p. 175. *Fl.
 Brit.* 382. *Engl. Bot.* t. 899. *Rel. Rudb.* 24. f. *Linn. Spec.*
 467. *Fl. Lapp. ed.* II. 88. t. 10. f. 5. *Willd. Spec.* II. p. 216.
Bicheno Trans. Linn. Soc. XII. p. 519. (J. culmo filiformi;
 fol. compresso-semiteretibus, canaliculatis; capitulo erecto,
 paucifloro; perianthii laciniis obtusiusculis, capsulam trigono-
 oblongam acutam non aequantibus. *Meyer Syn.* p. 56. n. 60.
Rostk. Junc. n. 42. J. culmo erecto, subtereti, nudo; foliis
 basi compresso-canaliculatis, apice teretibus; floribus termi-
 nalibus 3; perig. foliolis aequalibus, lanceolatis, capsulâ ob-
 longâ subattenuatâ paulo brevioribus; stam. 6.; antheris minu-
 tis, muticis. *Laharpe l. c.* p. 157.) *Lightf.* 186. t. 9. f. 2.
Fl. Dan. t. 132. (*Wulf. in Jacq. Coll.* III. p. 41. (excl.
 quibusd. synonym.) *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 166. *Gaud.
 Agrost. helv.* II. p. 232. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 595.
Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 94. *Wahlenb. Fl. suec.* p.

214. *Svensk Bot.* 497. f. 3. *Host. Gram.* III. t. 92. *Sturm Deutsch. Fl.* 28. H. *Hoppe Anl. Gr. z. trock. n.* 11.) *Dicks. Herb. sic. Fasc.* 2. 3. *J. biglumis idem l. c.* 2. (*Krock. Siles. n.* 554.) *Hall. Helv. n.* 1314. *Rudb. Elys.* I. 105. f. 8. *Gmel. Sib.* 1. p. 67. n. 29. *SCHÖNUS ferrugineus* *Huds. ed.* 1. 14. *Moris. hist.* III. S. 8. t. 12. f. 40.

Biglumi similis, sed duplo major. Rad. subrepens (vel cespitosa). Culmi solitarii, 3-6 (-10) poll., teretes (stricti), glabri, nudi, praeter folium unum alterumve vaginans ad basin: reliqua radicalia, fere *biglumis*, extus sine omni articulatione (1-1½ poll., fusco-viridia, apice saepe sphacelata). Capitulum raro 2- aut 4-florum, subtus bracteis 2 subaequalibus, ellipticis ovatisve, patentibus, fuscis, membranaceis: alterâ raro apice in acumen foliaceum desinente; saepius bractea interior minor. Calycis foliola aequalia, elliptico-oblonga, carinata, margine membranacea. Stam. calyce longiora. Cap. castanea, calyce longior, apice rotundata „(cum acumine brevi)“. Semina ovata, tunica membranacea laterali, utrinque acuminatâ. *Smith E. Fl. l. c.* Filamenta longitudine calycis, antheris multo longiora. Stylus brevis. *In alpibus lapponicis, scoticis, noricis, rhaeticis, pyrenaicis; in Sibiria, fide Gmelin; in America boreali, fide Wikström., in America arctica Richardson.* 4.

108. *J. castaneus* *Smith*; culmo simplici, folioso; foliis planis, carinatis, basi vaginantibus; capitulis terminalibus, plerumque geminis, multifloris; bracteis foliaceis; capsulâ calyce duplo longiore. *Smith Engl. Fl.* p. 145. *Fl. brit.* 385. *Engl. Bot.* t. 900. *Bichenov Trans. Linn. Soc.* XII. 321. *Hook. Scot.* 106. (*Rostk. Mon.* 49. *J. scapo culmoque tereti; foliis planiusculis; capitulo subsolitario, suberecto; perlaciniis subaequalibus, acutis, capsulam oblongam obtusam non aequantibus; stam. perianthii longitudine.* *Meyer Syn.* p. 57. n. 61. *J. culm. erect., subcompresso, 1-foliato; fol. basi compresso-canaliculatis, apice teretibus; flor. fasciculatis: fasciculis 2-5, 4-8-floris, aliis super alios positis; perig. foliol. aequal., lanceolatis, caps. oblongâ subtruncatâ mucronatâ brevioribus; stam. 6; anther. apiculatis.* *Laharpe l. c.* p. 156. *Hartm. Act. Holm.* 1818. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 212. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 592. *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 95. *Hoppe Dec. Gram.* n. 36.) *Fl. Dan.* t. 1532. *J. Jacquini* *Sym. Syn.* 87. *Hull.* 76. *J. triceps* *Rostk.* n. 45. t. 1. f. 4. fide *Meyer Syn. Luzul.* p. 34.

Rad. repens, laxe sarmentosa (fusca). Culmi solitarii, erecti, 8-12 poll. (et ultra), teretes, glabri, basi medioque foliosi. Folia, praecipue in culmo, erecta, 2-4 poll. (radicalia etiam 6 poll.); glabra, sicca involuta, interne cellulosa, dissepimentis transversis numerosis, nec tamen articulatis, convolutis aut vaginantibus. Capitulum unum supra alterum, rarius solitarium (vel 3), singulum in pedunculo brevi, crasso, basi bractea foliaceâ erectâ (1-1½ poll.) vaginato. Bractee interiores membranaceae (intense fuscae), lanceolatae, brevissimae. Flores 3-8 in singulo capitulo,

erecti. Cal. foliola elliptico-oblonga, trinervia, intense fusca; 3 interiora pallidiora (quod vix in nostris), apice membranacea (obtusiora et paululum breviora, 2 lin.). Filamenta iisdem breviora, antheris linearibus, flavis (subexsertis duplo longiora). Stylus crassus, supra basin articulatus ibique secedens. Stigmata 3, fusca, acuta, plumosa. Caps. elliptico-oblonga, obscure fusca, triangularis, apice rotundata, mucronata (3-3½ lin.). Sem. minuta, ovata, tunicâ pallidâ utrinque elongatâ acutâ involuta (cum hac tunica 2 fere lin. longa). *Smith.* In alpibus *Scotiae in solo micaceo inque boreali Britannia ac in Norvegia et Suecia; in alpibus Carinthiae et Helvetiae; in Sibiria; in America arctica Richardson; in Eschscholzbay, Eschscholz.* 2.

Obs. Utrum *J. triceps*, fol. canaliculatis, basi ventricosus; capitulis 3, multifloris, involucre, terminalibus, *Rostk. Junc. p. 48. t. 1. f. 4.* recte jungatur, sibirica planta cum norvegica, et scotica, ex eo dubitamus, quod in sibirica *Rostkovi* folia pedalia et ultra, basi ventricosa (in scotica non vaginantia); capitula 3, pedunculo medio lateralibus brevioribus; bractee duae membranaceae, lanceolato-acuminatae, pedunculis triplo longiores (nec brevissimae). At specimen sibiricum in *Herb. cli Gay* sec. *Laharpe* omnino idem.

109. **J. Jacquini*; culmo compressiusculo; foliis radicalibus nullis; capitulo erecto; perianthii laciniis exterioribus acuminatis: interioribus brevioribus, acutis; capsulâ subulatâ, pyriformi, obtusâ; staminibus brevibus. *Meyer Syn. p. 57. n. 62.* *J. culm. erecto, filiformi, plerumque nudo; fol. teretibus, filiformibus, subcanaliculatis; flor. 8-12 terminalibus, subcapitatis; perig. foliol. subinaequalibus, lanceolatis, acutis, capsulam oblongam retusam aequantibus; stam. 6.; antheris muticis. Laharpe l. c. p. 155. (α culmo filiformi, nudo v. foliato, gracili, 4-5 poll.) J. fol. subulato; capitulo subquadrifloro terminali. Linn. Mant. 65. Jacq. Fl. Aust. t. 221. Willd. Spec. II. p. 215. (corr. syn. Lam.) Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 166. Gaud. Agr. helv. II. p. 255. Hoppe Anl. Graes. z. trock. n. 15. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 592. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 95. Host Gram. III. t. 95. J. biglumis Jacq. Vind. 257. t. 4. f. 2. J. atratus Lam. III. p. 271. (nec, ut Willd. l. c. nigricans, qui nullibi in Lam.) Hall. Helv. n. 1516. J. alp. capit. glomerato et nigro splendente. Scheuchz. it. p. 40. t. 5. f. 2. J. alp. flosc. junc. glomeratis atrofuscis. Scheuchz. Gram. 325. t. 7. f. 9. β. aphyllus Meyer l. c. β culmo duriore crassiore, plerumque nudo, 6-12 poll. Laharpe l. c.*

„Caulis folio unico, saepius elongato. Flores in capitulo fusco-purpurei, 4-7, glumis communibus propriisque fuscis excepti, sextuplo majores quam in *J. biglumi*, a quo diversissimus.“ *Linn.* Cespitosus, glaberrimus. Rad. fusca, horizontalis, (repens) nodosa, fibris praelongis. Culmi plures, simplicissimi, teretes, erecti, 3-6 (2-12) unc., basi vaginis paucis, (arctiusculis, truncatis, aristulatis, striatis, pallide fuscis.) Folium in culmo unicum, subulatum, teres, sulco levissimo, apice acuminato sphaelatoque, suberectum, basi vaginans culmumque amplectens, (2-3 poll.) pro varia ortus sui in culmi altitudine va-

rie eundem excedens; (vaginâ arctâ superne margine membranaceâ), folia alia sine culmo mere radicalia, ceterum similia. In apice culmi gluma bi-aut unifolia, lanceolato-aristata, tenuis, membranacea, ex fusco pallens. Pedunculus ramosus, brevis; floribus 3-7 (etiam 10 *Haller*); pedunculis propriis brevissimis. Flores clausi acuminati, triangulares. Glumae propriae bivalvis foliola subrotunda, concava, obtusa, parva, ex fusco purpurascens. Perianthii foliola lanceolata, concava, mucronata, rigida, ex spadiceo nigra, nitida. Filamenta brevissima; antherae lineares, longae, flavae, florem subaequantes. Germen virens. Stigmata spiraliter torta, rubro-villosa, flore duplo longiora. Caps. sulcata; semina pauca, ovata, acuminata. *Jacq.* In alpibus noricis, rhaeticis, *Delphinatus*, *Sabaudiae*; β in *Apenninis*. 4.

J.? *zeylanicus*; culmo sesquipedali; paniculis e foliorum canaliculorum axillis; semine globoso. *JUNCUS ex Zeylania Houtt. Pfl. Syst. XII. p. 612. t. 59. f. 1.*

Nulli speciei notae similis. *Meyer Syn. p. 39. Houttuyn nec verbulum amplius adjecit. Vix generis. In Zeylona.*

Junci indescripti: 3 in *Burchell Voy.*; 3 in *R. Brown App. to Denham et Clapperton.*

Quid *Juncus annuus Mill. apud Krock.?*

australis Desf.?

purpureus Buch in Abhandl. Acad. Berlin. 1816-17.?

L U Z U L A. *)

a. Testâ seminis nucleo conformi. **)

1. *L. sylvatica Bich.*; paniculâ cymosâ decompositâ, floribus bracteisque aggregatis; capsulâ acutâ cristâ seminum obsoletâ. *Smith Engl. Fl. p. 180. Bicheno Trans. Linn. Soc. XII. p. 331. t. 9. f. 3. Forst. Tonbr. 44. (Gand. Agr. helv. II. p. 241.) LUZULA maxima Willd. Enum. h. berol. p. 393. (L. bracteis ciliatis, integris; calycis laciniis acutis, mucronatis: interioribus longioribus capsulam triquetro-ellipticam obtusam mucronatam aequantibus. Meyer Syn. Luzul. 1. L. foliis plerumque pilosis, latis; paniculâ decompositâ, laxiusculâ; fasciculis 3-5-floris, majusculis; perigonii foliolis acuminatis: interioribus longioribus capsulam ovoideam triquetram apice attenuatam subretusam aequantibus. Laharpe in Mem. d. l. Soc. d'hist. nat. d. Paris. T. III. p. 172. Desv. Journ.*

*) Ill. *Smith* nomen *LUZULAE* in *Luciolam* mutavit; at existit jam antiquissima *LUCIOLA Juss.*; nomen ergo pristinum, barbarum licet, retinendum.

**) *Conspectus dispositionis specierum Luzulae apud Laharpe Essai d'une Monographie des vraies Joncées in Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris T. III. p. 159: Sect. I. Flores solitarii: semina appendice falciformi, basi absque liliis: L. flavescens, vernalis, Forsteri, gigantea. Sect. II. Flores in fasciculis 2-6-floris; sem. inappendiculata, basi filamentosa: L. melanocarpa, spadicea, arcuata, hyperborea, maxima. Sect. III. Flores in cymas parvas 5-20-floras aggregati; semina apice inflato obtuso, basi lanatâ: L. lactea, nivea, albida, canariensis, lutea. Sect. IV. Flores in spicas aggregati: semina basi appendiculata lanataque: L. campestris, pediformis, Alopecurus, racemosa, spicata, comosa.*

d. Bot. 1. p. 148. *Poiret Enc. Suppl.* III. p. 531. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 596. *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 97. *Hoppe apud Sturm Deutsch. Fl. H.* 56. n. 14.) *JUNCUS sylvaticus* *Huds.* 151. *Smith brit.* 385. *Engl. Bot.* t. 737. *Curt. Lond. Fasc.* V. t. 26. *Hoffm. germ. ed.* 2. p. 169. *Dicks. H. sicc. Fasc.* 14. n. 17. *JUNCUS maximus* *Retz. Prodr. Fl. Scand.* ed. 2. n. 454. *Ehrh. Beytr.* p. 159. (*Rostk. Monogr.* 28. *Roth Germ.* 1. 157. II. p. 411. (excl. β). *Willd. Spec.* II. p. 217. *Savi bot. etr.* II. p. 70. n. 356. *Balbis Misc. bot.* 1. p. 19.) *Fl. Dan.* 441. (*Host Gram.* III. t. 98.) *JUNCUS latifolius* *Wulf.* in *Jacq. Coll.* III. p. 59. (*J. montanus* α *Lam. Enc.* III. p. 275. *J. pilosus* *Vill. Delph.* II. p. 254.) *J. pilosus* δ *Linn. Spec.* 468. (*J. pilosus* α *fascicularis* *Schrank bayr. Fl.* 1. p. 621. *J. nemorosus* *Mönch Hass.* n. 298. *fid. Wenderoth Beytr. Fl. Hess.* p. 36. *J. nemorosus* β *Poll. Pal.* 1. p. 352.) *Hall. Helv.* n. 1324. *Bauh. Prodr.* 15. f. *Theatr.* 102. f. (non descriptio). *Moris.* III. p. 225. s. VIII. t. 9. f. 2. *Bauh. Hist.* II. p. 493. ff. *Segu. Veron.* 1. p. 148. *Scheuchz. Agr.* n. 6. p. 317. β fol. plan. pilosis, paniculâ coarctatâ nutante. *Ger. Prov.* 141. n. 13. γ *J. dein* fol. subglabris. (Utraque fide *Lam. Enc.* l. c.)

Radix sublignosa, (crassa), repens, fibris plurimis. Culmi 1-1½ (-3) ped.; foliosi, (teretes, striati.) Folia pallidius, quam in *pilosa* aut *Forsteri*, virentia, nervosa, margine pilosa; radicalia numerosa, multo latiora, (ensifor-mi-lanceolata), spithamæa, (subinde pedalia, 3-6 lin. lata), cespites formantia elasticos laevissimos: culmea (multo) minora: vaginis longissimis, tubulosis, (glabris, ore barbato-ciliatis). Panicula magna, horizontaliter patens, (2-3 poll., 2-4½ poll. in diam., junior cernua, subcongesta); ramis glabris, gracilibus, subdivisis, corymbosis. Bracteae albae (dorso saepius purpurascens v. fuscæscens, ovatae, acuminatae), floccosae, ad subdivisiones paniculae vaginantes, sub floribus subimbricatae, (fimbriato-ciliatae). Flores 2-3, minores quam in *L. pilosa* aut *Forsteri*, (sessiles), fusco alboque varii, (rarius omnino intense spadicei). Cal. foliola lanceolata, acuta, concava, margine tenuia et membranacea, (interiora paululum longiora. Antherae magnae, calyce paulo breviores, flavae, filamentis multoties longiores. Stylus longe exsertus.) Caps. ovata, trigona, acuta (vel obtusa cum mucrone parvo, fere) duplo minor quam in *pilosa* et *Forsteri*, (viridifusca.) Sem. elliptica, parva, fusca. *Smith Engl. Fl.*, qui varietatem panicula densiore, hac culturâ perstante, (an β *Lam.*?) notat. *In montosis sylvaticis totius Europae ad Siciliam usque et in Sibiria.* 24.

Obs. *Juncus maximus Brottero Fl. lusit* p. 515. fide synonymi *Linnaei* δ . huc spectat; sed discrepat nonnullis descriptio: „Culmi 1-1½ pedales et altiores, toti vaginis foliorum tecti, simplices, teretes, striati, nodis 4-5, demum fistulosi. Folia radicalia in cespitem congesta, ½ poll. lata, pedem fere longa, nervosa, margine pilosa; culmea valde minora, angustiora, vaginâ longâ, nonnulla ad basin paniculae istâ duplo triplove breviora. Pedunculi paniculae ramosi, saepius penduli, fasciculis 3-5 floris, terminalibus aut lateralibus quibusdam sessilibus. Petala superne fusca, leviter mucronata. Capsula trisperma.“ Specimina a clo. *Jan* in Sicilia lecta omnino cum planta nostra conveniunt; folia tantum angustiora, vix 2 lin. lata, magisque pilosa;

panicula minus composita. *Junc. maximus* Retz. *Scand. ed. 2. p. 21. et Fries halländ. p. 62. clo. Wahlenberg in Fl. suec. p. 1081. Luzula pilosae var. multiflora est.*

2. *L. spadicea* Desv.; foliis planis, glabris; vaginis pilosis; corymbo decomposito, divaricato; pedunculis sub 4-floris; calycis foliolis (ovatis) mucronatis, capsulâ acutâ brevioribus (subinde etiam longioribus). *Willd. Spec. II. p. 218. (sub Juncus spadiceo corr. syn. Linn.) L.; glaucescens; foliis nudiusculis; perianthii laciniis ovato-acuminatis: interioribus subbrevioribus, capsulâ trigono-ovata acutiusculâ mucronulata brevioribus. α Meyer Syn. Luzul. n. 2. L. fol. saepius nudis; paniculâ compositâ; fasciculis 2-4-floris; perig. foliolis parvis, subaequalibus, mucronulatis, caps. ovoideâ triquetra mucronatâ vix brevioribus. α fol. hinc inde pilosis; paniculâ corymbosâ vix laxâ. Laharpe l. c. p. 170. Desv. Journ. d. Bot. 1. p. 146. Poiret Enc. Suppl. III. p. 551. Decand. Fl. fr. III. p. 159. Gaud. Agr. helv. II. p. 242. (excl. syn. Lam.) Mert. et Koch D. Fl. II. p. 597. (excl. var.) Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 98. (excl. β). Hoppe Dec. gram. n. 66. Juncus spadiceus Allion Ped. II. p. 216. n. 2085. Vill. Delph. II. t. 6. b. Host gram. III. n. 96. Sturm Deutsch. Fl. 1. A. 28. H. Junc. pilosus β Linn. Spec. 468. lapp. n. 126. J. nigrescens Schranck (fid. specim.) Hall. Helv. n. 1326. Gr. hirs. nemor. angustif. alpin.; paniculis obscure rufescentibus. Scheuchz. Gram. 312. t. 6. (sec. Linn. ad J. pilosum γ). Gr. hirsut. angustif. perenne, lini utriculi Barrel. 1740. (a Willd. huc cum? adductum, Linnaei J. pilosi β est). — β obtusata. L. spadicea γ obtusata Herb. G. F. W. Meyeri in Meyer Syn. Luz. n. 2. L. spadicea δ Laharpe l. c. — γ laxiflora; flor. breviter pedicellatis, sparsis; bracteis villosis. Desvauz l. c. J. alpino-pilosus Vill. Delph. 1. p. 318. δ? spiciformis; floribus in spicas ovatas longe pedunculatas congestis, pallide fuscis.*

Pedunculi 5-4-flori, sed flores brevissime pedicellati, nec sessiles in pedunculo communi, ut in *sylvatica* Willd. l. c. Rad. repens, flexuosa, sublignosa, fusca. Culmus strictus vel apice subincurvus, glaber, 5-15 poll., glaucescens, rarius viridis. Folia lineari-lanceolata, acuminata, erecta, rarius subcanaliculata, glaucescentia, praesertim subtus, rarius viridia, glabra vel margine pilis rarissimis longis deciduis, 4-8 poll., 1½-3 lin. lata. Vaginae ad faucem pilis albis, subinde raris. Corymbus divaricatus vel subcontractus, erectus vel subcernuus; rami infimi longiores graciles ½-2 poll., interiores breves; ramuli graciles, variae longitudinis, plerumque divergentes, 2-4-flori; floribus breviter pedicellatis congestis, 2-4, vel longius pedicellatis 1-5. Involuerum monophyllum corymbo brevius. Bracteae ad ramos lanceolatae; subulato-acuminatae, basi vaginantes et ciliatae, fuscae, inferiores longiores apice subfoliaceo; sub floribus ovatae, acutae, concavae, subcarinatae, floribus multo bre-

breviores, nitidae, intense badiae, ciliatae. Cal. foliola ovata et ovato-lanceolata cum acumine brevi, nitida, atro-fusca, margine submembranaceo; in specimin. e Carpathis capsulam superantia; in specim. ex alp. banaticis et lapponicis capsulam aequantia; in speciminibus ex alp. noricis capsulâ paulo breviora; in specim. e Mont Genis capsulae aequalia simul et breviora. Stam. calyce breviora; antherae magnae, luteae. Stylus exertus. Caps. ovato-trigona mucrone parvo, nigricans, nitida. Sem. oblonga, utrinque subattenuata, fusca. — β occurrit passim nomine *glabratae* et nonnisi capsulis obtusioribus distincta. — In δ , quod forte specie differt: habitus fere *L. erectae*; caulis fere $1\frac{1}{2}$ ped., minus foliosus; folia cespitem densum formantia, rigidiora, vaginis vix pilosis; flores medio tantum corymbosi, in ramis (1- $1\frac{1}{2}$ poll., apice subnutantibus) in spicas ovato-oblongas 4-5 lin. congesti; bractee sub floribus minus ciliatae, pallide fuscae; calycis foliola minus acuminata, pallide fusca, longitudine capsulae pallide fuscae minoris quam in vera *L. spadicea*. In alpibus noricis, rhaeticis, pedemontanis et vicentinis, in Carpathis, in Lapponia, Sibiria; γ in Gallia; δ in Eschscholz bay, Eschscholz in Herb. cli. Martius. 4.

3. *L. parviflora* Desv.; culmo elato; foliis latis glaberrimis; vaginis fauce pilosis; corymbo decomposito, erecto; floribus solitariis, breviter pedicellatis; capsulis oblongis calyce acuto brevioribus. *Desvauz Journ.* 1. p. 144. *Poir. Enc.* III. p. 531. *Lam. et Dec. Fl. fr.* V. p. 305. *L. parviflora* a *Wahlenb. Fl. suec.* 1. p. 217. *L. spadicea* β *laxiflora* *Meyer Syn. Luz.* n. 2. *L. spad.* β fol. glabris; paniculâ amplâ, multiflorâ, sublaxâ. *Laharpe l. c.* p. 170. *L. spad.* β *parviflora* *Mert. et Koch Deutsch. Fl.* II. p. 598. *Juncus parviflorus* *Retz Prodr. Fl. Scand.* ed. 2. n. 434. (excl. syn. *Scheuchz.*) *Ehrh. Beytr.* 6. p. 139. (excl. syn.) *J. fol. planis, glabris vaginisque nudis; corymbo decomposito, erecto; pedunculis unifloris; calycinis foliolis acutis, muticis.* *Willd. Spec.* II. p. 219. *Wahlenb. Lapp.* n. 162. *Loisel. Not.* p. 61. *Rostk. d. Junc.* p. 26. t. 1. f. 1. *J. pilosus* γ *Linn. Spec.* 468. (excl. syn. *Scheuchz.*) *J. fol. plan.; culmo paniculato; flor. sparsis.* *Linn. Fl. lapp.* 124. *J. pilosus* β *Linn. Fl. suec.* ed. 2. n. 308.

A *Linne, Retzius* et *Ehrhart* cum *spadicea* confusa, a qua distinctissima: foliis latioribus, vaginis glabris, corymbo non divaricato; floribus minoribus pedunculatis; calycibus acutis nec mucronatis totoque habitu. *Willd. Glabrata* plerumque altior, sed gracilior. Rad. sublignosa, fusca, fibris numerosis, stolonibus brevibus. Culmus solitarius, erectus, gracilis, glaber, striatus, $\frac{1}{2}$ -2 ped.. Folia radicalia cespitosa, reflexa, tenuia, acuminata, glaberrima, subtus striata, 3 poll. - $\frac{1}{2}$ ped., medio 3-4 lin. lata; caulina erecta, lanceolata, acuta, glaberrima, obsolete striata, pallide viridia vel glaucescentia, 1- $2\frac{1}{2}$ poll., 2-3 lin. lata. Vaginae longae, glaberrimae, vel rarius ore pilo uno alterove. Corymbus $1\frac{1}{2}$ poll., ramis gracillimis, adscendentibus vel laxis, teretibus, glaberrimis, inferioribus longioribus; ramulis varie fle-

xis, capillaribus, 1-rarissime 2-floris. Bracteae ad basin ramorum lanceolatae, vaginantes, acuminatae, purpurascens, glabrae, infimâ $\frac{1}{2}$ poll., dein sensim minores; ad basin ramulorum minutae, ovatae, acutiusculae, fuscae, margine albido membranaceae; sub calycibus 2 ovatae, acuminatae, concavae, fuscae, calycibus multo breviores. Calycis foliola ovato-lanceolata, acuta, concavuscula, subearinata, lucide fusca, basi viridia, vix $\frac{1}{2}$ lin. superantia; interiora paulo longiora. Stamina calyce duplo fere breviora. Antherae flavae. Capsula ovata, trigona, acuta, calyce paulo brevior. *In alpihus Lapponiae, Russiae, Helvetiae; in Pyrenaeis; in Norfolkisound Eschscholz fid. Herb. Mart.; in Grönlandia et in America arctica.* 4.

4. *L. glabrata Desv.*; foliis subcanaliculatis, (sub) ciliatis; paniculâ compositâ: ramis inferioribus nutantibus; calycis foliolis longe acuminatis (capsulam superantibus). *Hoppe in Sturm Deutsch. Fl.* 28. *H. Dec. Gram.* n. 38. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 143. t. 5. f. 3. *L. glaberrima*; paniculâ divaricatâ, ramosâ; pedicellis 2-4-floris; floribus breviter pedicellatis; capsulis inclusis, fuscis. *Poiret Enc. Suppl.* III. p. 530. *Lam. et Dec. Fl. fr.* V. p. 304. *L. spadicea* δ *glabrata Meyer Syn. Luz.* n. 2. *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 98. *L. spadicea* γ *glabra* culmo altiori; fol. latioribus; paniculâ corymbosâ amplâ. *Laharpe l. c.* p. 173. *L. spad.* γ *glabrata Mert. et Koch Deutsch. Fl.* II. p. 598. *L. parviflora* β *intermedia Wahlenb. Fl. suec.* p. 217. *L. intermedia Balb. et Nocc. ticin.* 1. p. 168. *Juncus glabratus Rostkov d. Junc.* p. 28. *Loisel. Not.* p. 61. *Junc. spadiceus* β *glabratus Wahlenb. Carp.* p. 102. *J. spadiceus Wahlenb. lopp.* p. 86. (se teste). *J. pilosus* β *Linn. Suec.* n. 308. (teste *Wahlenb.*) *J. intermedius Host Fl. austr.* 1. p. 542. *Gram.* t. 99. *J. montanus* γ *Lam. Enc.* III. p. 273. *J. pilosus glabrescens Schrank Bayr. Fl.* 1622. (excl. syn. *Haller*).

Radix repens, sublignosa, fusca; stolones vaginis tecti. Culmus erectus, 8-14 poll., teretiusculus, glaber. Folia radicalia spithamea pedaliave, lanceolato-ensiformia, acutissima, 2-5 lin. lata, striata, glabra; caulina fere lanceolata, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., margine subundulata, glabra vel margine pilis rarissimis deciduis. Vaginae minus arctae quam in *spadicea*, glabrae, margine pilis paucis. Panicula magna, laxa; rami erecti, patentes vel nutantes, $\frac{1}{2}$ -3 poll.; ramuli plerumque 1-flori, inferiores subinde 4-et multiflori, basi bracteis lanceolatis, acuminatis, margine membranaceo parce ciliatis, dorso fusco-purpurascens. Bracteae sub calyce 2 oppositae, ovatae, obtusae, calyce breviores, concavae, glaberrimae, apice sublacerae, colore calycis. Flores paulo minores quam in *L. sylvatica*. Cal. foliola ovato-lanceolata, acuta, fusca, nitida, interiora quidquam breviora, staminibus longiora. Capsulae acutae, nigricantes, calyce parum breviores, subrotundotrigonae. *L. spadicea* semper major, magis glabra, viridis, vix glaucescens; paniculae amplioris ramis elongatis plerumque nutantibus; calyc. foliolis valde acuminatis, capsulâ semper longioribus distinguenda. Culturâ per plures annos perstat; quamvis cli

Mertens et Koch eandem in *L. parvifloram* et *spadiceam* transire dicant. *In alpibus noricis, helveticis et gallicis.* 4.

5. *L. melanocarpa Desv.*; culmo elongato; foliis latis, glabris; corymbo decomposito; pedunculis longissimis; pedicellis 3-5-floris; calycis foliolis ovatis, tenuissimis, albo-pellucidis; capsulis obtusis, atris, nitidis. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 142. t. 5. f. 2. *Poiret Enc. meth.* III. p. 552. *L. glabra*; perianthii laciniis aequalibus, ovatis, acutis: exterioribus mucronatis, capsulâ triquetro-ovatâ, acutâ paulo brevioribus. *Meyer in Reliqu. Haenk. Fasc. II.* p. 145. *Syn. Luzul.* n. 6. *L. fol. latiusculis, nudis*; paniculâ compositâ supradecompositâve, capillaceâ, laxissimâ; fasciculis 1-5-floris, sparsis, minutis; perig. foliolis subaequalibus, acuminatis, pellucidis, capsulâ oblongâ mucronatâ paulo brevioribus. *Laharpe l. c.* p. 169. *Juncus melanocarpus*, culmo folioso; fol. sublanceolatis, glabris; paniculâ capillari, laxâ; flor. pedicellatis. *Mich. Fl. bor. Am.* 1. p. 190. *Pursh Fl. sept. Am.* 1. p. 258. *Torrey Fl. n. et m. U. St.* 1. p. 566. β anthelâ subfastigiata *Meyer in Reliq. Haenk.*, et se teste: *L. fastigiata*; fol. nudis; perianth. laciniis aequalibus, lanceolatis, acutis, mucronatis; caps.? *Meyer Syn. Luzul.* p. 9. n. 5.

Culmi erecti, 1-2 ped. Folia alterna, dilatata, lanceolata, acuta. Corymbus terminalis; pedicellis elongatis, capillaribus. Caps. ovata, lucida, obtusa, nigricans, calyce parum longior. *Poiret.* Species parum varians; foliis latis semper glabris; culmo debili, 10-18 poll.; paniculâ amplissimâ: ramis elongatis, nutantibus; floribus minimis; perigonis bracteisque albidis, scariosis; capsulâ parvâ fere ooideâ, trigonâ, nigrâ. Proxima *L. spadiceae*, sed differt: paniculâ et capsulâ perigonio longiore. *Laharpe.* β differt non nisi anthelâ subfastigiata; pedunculis pedicellisque tenuioribus, unde habitus egregie immutatur. Similis *L. spadiceae Meyer.* *A Carolina ad sinum Hudsonis, in Unalaschka, in Kamtschatka Fischer; β aut ad sinum Nutkaensem aut in insulis Mulgravianis. Haenke.* 4.

6. *L. gigantea Desv.*; foliis margine scabris, vaginis bracteisque subciliatis; paniculâ terminali, secundâ; ramis dichotomis, nutantibus; laciniis calycinis acuminato-cuspidatis, capsulâ ovato-triquetrâ apicatâ longioribus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth* III. p. 259. t. 697. *Meyer Syn. Luz.* n. 4. *L. fol. margine subciliatis*; vaginis bracteisque ciliatis; paniculâ supradecompositâ, nutante; perig. foliolis lanceolato-acuminatis, capsulam oblongam triquetram mucronatam subaequantibus; floribus parvis numerosissimis. *Laharpe l. c.* p. 169. *L. culmo longissimo*; fol. latis, subglabris; paniculâ maximâ interruptâ; floribus numerosissimis, nutantibus; pedunculis dichotomis; caps. inclusis; cal. foliolis acutissimis. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 145. *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 550. Rad. fibrosa. Culmus erectus, 3-ped., teres, glaber, striatus. Fo-

lia radicalia conferta culmeaque graminea, acuminata, subulata, plana, striata, utrinque glabra, vix ciliata, 6-8 poll. et ultra. Vaginae glabrae, striatae, virides, ciliatae. Panicula subpedalis, ramosissima, foliata, ramis subquaternis, distantibus, nutantibus, laxis, bracteatis, ramulis capillaceis, glabris. Flores solitarii, pedicellati. Bracteae oblongae, acuminato-subulatae, diaphanae, uninerves, ciliatae, unica ad basin dichotomiae cujuslibet. Bracteae 2 ejusdem structurae sub calyce, oppositae, eoque breviores. Cal 6-partitus, laciniis lanceolatis, glabris, purpureo-ferrugineis, aequalibus. Caps. glabra, nigrescens, purpureo-punctata. Semina oblonga. *Kunth*. Culmus $1\frac{1}{2}$ -2 ped.. Folia pilis sparsis ciliata. Vaginae barba pilorum albidorum. Panicula 6-8 poll. Bracteae ad ramos fusciscentes, elongatae, in setas longas fissae. Flores in apicibus ramorum approximati. Habitus fere speciminum majorum *L. melanocarpae*; sed flores nunquam in fasciculos parvos collecti, et bracteae non pilis rufis terminatae. *Laharpe*, ad spec. in *Herb. Kunth*.. In humidis *Quindiu rivum Toche inter et la Seja*. 4.

7. *L. Alopecurus Desv.*; foliis hirsutissimis, latis, acutis: capitulo compacto, piloso, pyramidato; capsulis parvulis, oblongis, inclusis; bracteis hirsutissimis; perianthii lanati foliolis subulatis, capsulâ duplo majoribus. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 159. *L.* foliis planiusculis; racemo spiculis composito; bracteis perianthioque ciliatis; per. laciniis lanceolatis, acuminato-subulatis, subaequalibus, capsulam trigono-subglobosam acutam superantibus. *E. Meyer in Reliqu. Haenk. Fasc.* II. p. 145. *Luzul. Syn.* n. 5. *L.* fol. subcanaliculatis, margine tomentosus; paniculâ pyramidalis, densâ, villosissimâ; spiculis multifloris, confusis; perig. foliolis aequalibus, subplumosis, capsulam ellipsoideam triquetram acutam superantibus. *Laharpe l. c.* p. 177. β major. *L. Alopecurus* fol. vaginisque margine albo lanatis; spicis conglomeratis, alternis, magis minusve distantibus; laciniis calycinis acuminato-cuspidatis, ciliatis, capsulâ longioribus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. et Spec. red. Kunth* III. p. 258. *L. peruviana*; fol. subrigidis, tomentosus, angustis; capitulo compacto, nigricante; cal. foliolis mucronatis; capsulâ inclusâ, atrâ. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 160. *Meyer Syn. Luz.* n. 21.

Omnibus partibus pilis vestita. Culmus 8-10 poll.. *Desv.* Habitus *L. spicatae*, sed omnia robustiora. Caulis $\frac{1}{2}$, in β $1\frac{1}{2}$ ped., striatus. Folia inferiora plana, media subcanaliculata, summa vere carinata. Vaginae fere ad medium fissae, lanâ albâ connexae. Inflorescentia modo compactior, modo elongata flaccidior, plus minusve interrupta. Bracteae primariae foliaceae, carinatae, florales solitariae florem superantes. Seminum testabasi leviter in saeculum dilutioris coloris relaxata. *E. Meyer*. Huc varietas e scopulis Antisanac in *Humb. et Bonpl.* adducta, quae differt a β : statura vix ped., magis contractâ; spicis valde approximatis, in spicam majorem oblongam fere poll. congestis; bracteis calycibusque fere duplo majoribus. In β : rad. fibrosa. Culmi cespitosi, erecti, $1\frac{1}{2}$ ped., simplices, glabri, teretes striati. Fo-

lia radicalia numerosa culmeaque linearia, plana, striata, rigida, 2 poll.. Vaginae striatae, margine membranaceae, virides. Spicae e glomerulis pluribus, densifloris, subglobosis, oblongo-cylindratae, 8-9 lin., saepissime 5 in apice culmi, alternae, pedunculatae, erectiusculae, spicam majorem 2 poll. basi interruptam referentes. Flores sessiles, suffulti bractea ovato-lanceolata, acuminato-subulata, albo-ciliata, florem superante. Cal. laciniis lanceolatis, purpureo-fuscis, margine tenuissime membranaceis et albidis. Caps. subrotunda, triangularis, obtusa, apice nigro-ferruginea, nitida, calycem subaequans. Sem. 5, ovato-oblonga, apice et basi obtusa, fusca, nitida, sublaevia. *Humb. et Bonpl.* *Desvauz* L. *peruvianam* a L. *Alopecuro* differre dicit: „foliis calycinis non subulatis, tantum acutis; bracteis calycibusque minus villosis, subinde vix pilosis. Folia similia Juncis. Capitulum raro basi interruptum.“ Huc etiam spectare videtur: L. *Alopecurus*; fol. linearibus, canaliculatis, supra vaginarumque marginibus lanuginosis; spicâ glomeratâ, racemosâ, oblonga, erectâ; petalis capsulâ longioribus. *Reliqu. Willd. Ms.* *Ad fretum magellanicum, Desv.*, in insulis Maluinis, *Gaudich.*, in *Peruvia Haenke*, ad scopulos *Antisanæ, Toluco, Pucumba, Humb. et Bonpl.*, & in *Playas de Torullo.* 4-

8. L. *racemosa Desv.*; culmo elato; foliis angustis, longissimis; spicâ basi divisâ; floribus parvulis, fusco-atris; capitulis oblongis; calycis foliolis ovato-acuminatis. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 162. t. 6. f. 3. *Meyer Syn.* n. 20. L. fol. angustis, planis, pilosis; paniculâ racemoso-spicatâ, nutante; spicis plus minus distantibus, oblongis; perigonii foliolis aequalibus, acuminatis; capsulâ? *Laharpe l. c.* p. 177. (qui L. *interruptam Desv.* et *Junc. spicatum Walt. Fl. Carol.* p. 124. cum? huc citat.)

Similis quodammodo L. *spicatae*; sed culmi magis elevati, 1½ ped. et ultra. Folia multo angustiora, acuta, pilosissima. Spicae longae: rami capitulis divaricatis. Calycis parvi foliola fusca. *Desv.* Culmus gracilis, elongatus, subnutans; spica nutans, interrupta, praesertim basi, 2-3 poll.; spiculae oblongae; flores numerosi approximati; bracteae ciliatae. *Laharpe.* In *America meridionali.* 4.

9. L. *interrupta Desv.*; culmo folioso; foliis latiusculis; spicâ racemosâ, rectâ; ramulis florum distantibus. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 165. t. 6. f. 4. *Meyer Luz.* n. 22.

Culmi recti. Folia inferiora praecipue acuta, pilosa: superiora spicam stipant rectam, in racemos inaequales divisam. Flores fusci. Bracteae albae, ciliatae. *Desv.* Clo. *Laharpe* varietas tantum L. *racemosae.* In *America meridionali.* 4.

Obs. Specimen, imperfectum licet, vidimus in Herb. cli *de Martius* in Chili prope *Concepcion* lectum, in quod satis bene quadrat definitio et brevis adumbratio, quam *Desvauz* descriptionis loco subiecit. Specimen hoc apex culmi foliosus; foliis erectiusculis, 1-1½ lin. latis, acutis, nervosis, marginibus et ad vaginae os pilis longis, albis dense ciliatis. Racemus e spiculis densis erectus terminalis, et alter minor ex axilla folii supremi, ultra poll.; involucrem vel folium supremum racemum subaequans ciliatum; bracteae subspiculis pedicellatis, approximatis: interioribus remotioribus, lanceolatae, acuminatae, ciliatae, fuscae; bracteae sub floribus subsessilibus ovatae, acuminatae, concavae, membranaceae, albae, ad basin dorsi fuscescentes, fimbriato-ciliatae,

floribus paulo breviores. Calycis foliola $\frac{3}{4}$ lin., nitida, intense fusca: exteriora longiora ovata, in acumen aristiforme protensa, margine apicem versus membranacea: interiora breviora, ovata, apice membranaceo albido obtusiusculo. Stam. calyce duplo breviora; antherae oblongae longitudine filamentorum. Stylus exertus profunde trifidus. Caps. immatura calyce multo brevior, ovata, trigona, obtusiuscula.

b. *Testâ seminis in processum falcatum desinente.*

10. * *L. pilosa Willd.*; paniculâ cymosâ, divaricatâ, reflexâ; floribus solitariis; capsulâ obtusâ; cristâ seminum hamosâ. *Smith Engl. Fl.* II. p. 178. (*Willd. Enum.* p. 593.) *Bicheno Trans. Linn. Soc.* XII. 529. t. 9. f. 1. *Hook. Scot.* 110. *Forst. Tonbr.* 44. (*Gaud. Agröst. helv.* II. p. 256. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 217. *L. vernalis Poir. Enc. meth. Suppl.* III. p. 529. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 158. *Decand. Fl. fr.* III. p. 160. *L. calycis laciniis aequalibus, acutis, capsulâ trigono-ovata obtusâ mucronatâ brevioribus. Meyer Diss. n. 7. L. fol. pilosiusculis, latis; panic. simplici, rarius compositâ; perig. foliolis vix aequalibus; exterioribus mucronulatis, interioribus acutis, capsulâ triquetrâ basi dilatatâ subretusâ mucronulatâ paulo brevioribus. Laharpe l. c. p. 168. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 594. Roth Enum. pl. germ. I. 2. p. 99. Svensk. Bot. t. 444. L. Forsteri Lejeune Rev. Fl. d. Spa. p. 72.) *Juncus pilosus Linn. Spec.* 468. (excl. pl. variet.) *Willd. Spec.* II. p. 216. (excl. syn. Vill.) *Smith Fl. Brit.* p. 584. *Engl. Bot.* t. 736. (*Rostk. Mon.* 25. *Fl. Bat.* 125.) *Curt. Fl. Lond.* V. t. 25. *Leers herb.* 90. t. 13. f. 10. (*Host.* III. t. 100. *J. pilosus B. cymosus Schrank b. Fl.* n. 566. *J. pilosus β vernalis Pers. Syn.* p. 585.) *J. vernalis Ehrh. Calam.* 109. *Hoffm. Germ.* 1800. 168. (*Brot. Fl. lusit.* p. 515. *J. Luzula Krock. Siles.* n. 556. t. 49. (excl. syn.) *J. nemorosus Lam. Enc.* III. p. 272.) *Hall. Helv. n.* 1525. *Scheuchz. Gram.* 517. *Bauh. Theatr.* 101. *Moris. Hist.* III. p. 225. S. VIII. t. 9. f. 1. *Ger. Emac.* 19. f. *Lob. Icon.* 16. f. cum? (monente, ob similitudinem cum *L. Forsteri*, *Smith*.) (*J. pilosus Fl. Dan.* t. 441. adeo absimilis cuius speciei, ut ad nullam laudandus.) *β americana; bracteis 2 albis, calycis foliolis apice fuscis. J. pilosus Mühlenb. Descr. uber.* p. 200. *Luz. pilosa Torrey Fl. north. et mid. sect. un. stat.* 1. p. 565.*

Rad. fibrosa, stolonibus aucta. Culmi 6-14 poll., erecti „(vel ascendentes)“, teretes, graciles, nitentes, foliosi. Folia linearilanceolata, integerrima, basi vaginantia, laete viridia, nervosa, margine pilis albis, laxis, exsiccatione torto-fasciculatis ciliata: radicalia numerosa „(sub florescentia, 3-5 poll., dein $\frac{1}{2}$ -1 ped., 2-5 lin. lata; caulina $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ poll., 1-3 lin. lata)“. Panicula terminalis, ramis numerosis, inaequalibus, capillaribus, divaricatis varieque reflexis, nunc subdiotomis, nunc subracemosis. Flores terminales, laterales et axillares, semper solitarii et, praeter terminales, sessiles. Bractee 2 sub singulo flore inaequales,

ovatae, fuscae, margine albido membranaceae. Calycis foliola ovata, acuta, carinata, dorso fusca striataque, margine alba et membranacea: 3 interiora minora. Caps. ovata, 3-angularis, obtusa (cum mucrone brevi), pallide virens, vix calycis longitudine „(apud nos tamen semper calyce longior)“. Semina „(2-3, nigricantia,)“ elliptico-oblonga, magna, cristâ ad apicem hamosâ longitudine fere seminis „(albidâ, membranaceâ)“ *Smith Engl. Fl.* Petala acuminata, quasi breviter aristata. Caps. disperma. *Brot.* (apud nos semper trisperma). In β omnino simili: panicula 8-10-flora; pedicelli $\frac{1}{2}$ poll.; cal. foliola lanceolata, acuminata, fusca. *Torrey.* In nemorosis et dumosis Europae, mediae praecipue; Africae borealis, Tauriae, Sibiriae et Americae borealis. 4.

Obs. A clo. *Steudel* huc ducuntur instar varietatum: β *J. cymosus Schrank.*, γ *J. fascicularis Schrk.*, δ *J. glabrescens Schrk.*, quos vide suo loco. — Cujus loci *J. pilosus Thunb. Fl. Jap. p. 145?*

11. *L. flavescens Gaud.*; perianthii laciniis acuminatis: interioribus (?) brevioribus, capsulâ trigono-ovata acutâ brevioribus. *Meyer Syn. Luz. n. 8.* L. fol. pilosiusculis; paniculâ simplici; perigon. foliolis interioribus acutis, paulo longioribus; exterioribus mucronatis, capsulâ ovoideâ triquetra subretusâ mucronatâ brevioribus. *Laharpe l. c. p. 167. Gaud. Agr. helv. II. p. 230. Mert. et Koch Deutsch. Fl. II. p. 595. Roth Enum. pl. germ. I. 2. p. 100. Hoppe Dec. gram. 27.* L. *Hosti*; fol. ciliatis; vaginis apice pilosis; paniculâ erectâ; flor. solitariis; foliolis calycis ciliatis, patentibus. *Desv. Journ. d. Bot. I. p. 140. t. 6. f. 1.* L. fol. angustissimis; cal. foliolis sublanceolato-acutis, capsulam elongato-acutam subaequantibus. *Poir. Enc. Suppl. III. p. 529. L. pubescens Bot. Zeit. 1819. p. 446. Juncus flavescens Host Gram. III. t. 94. Loisel. Not. p. 60. J. pallescens, fol. plan., parce pilos.; culmo simpl.; pedunculis 1-floris, erectis; perig. foliolis lanceolatis, elongato-acutissimis, capsulam subexcedentibus. Bot. Zeit. 1819. p. 445. et p. 185. J. lazulinus Vill. Delph. II. p. 235. (fid. spec. in herb. Desfont, sec. Laharpe; a Willd., Meyer etc. vero ad *L. pilosam* ducitur.) *Gmel. S. Veg. p. 572.**

Differt a *L. Forsteri* perigonio inaequali, a *L. vernali* fol. angustioribus brevioribusque; ab utraque floribus pallidis, caule basi stolonifero. *Laharpe.* Radix stolonifera, fuscescens. Culmi glabri, 2-12 poll., erecti v. adscendentes, graciliores quam in *L. pilosa*, striati. Folia pallidiora, angustiora brevioraque quam in *L. pilosa*, margine pilosa, 3-5-nervia, 1-3 $\frac{1}{2}$ poll., 1-2 lin. lata: caulina radicalibus paulo breviora latioraque. Panicula pauciflora, subumbellata; rami 4-8, breviores quam in *L. pilosa*, $\frac{1}{2}$ -1 poll., plerumque 1-flori, rarius flore altero supraposito, patentes, non refracti. Involucrum ramis paulo brevius. Bractee sub flore calyce duplo breviores, basi late ovatae, acutae, albidae v. pallide fuscae, subinde apice lacerae, vix ciliatae. Cal. foliola flavicantia, dorso fusciscentia, glabra, acutiora quam in *pilosa*; 3 exteriora (nec interiora uti sphalmate apud *Meyer*) paulo breviora. Caps. fusciscenti-virides, acuminatae, 2 lin. et paulo ul-

tra. Sem. ovata, fusca, appendiculata; cristâ semina fere superante, rectâ, ovato-lanceolatâ acutiusculâ. *In alpidibus carinthiacis, salisburgensibus, helveticis; in Pyrenaeis.* 4.

Obs. Cls. *Wenderoth* in *Beitr. Flor. Hess.* p. 37. *Junc. pedatum* *Jaeg.* (ubi?) in *Herb. Mönchii* exstantem cum? ad *L. pallescentem* (in *Bot. Zeit.* 1819. p. 185. descriptam) ducit, et sequentia adnotat: media quasi *L. maximam* inter et *vernalem*; radix fibrosa; culmus 1', ped., striatus, foliosus; folia radicalia plura formâ varietatis angustifoliae *L. maximae*; caulina striata, sensim minora et in vaginas abeuntia, fauce latereque interiore ciliis albis obsitas. Flores corymbosi, 1-3 in pedunculis flexuosis; bracteae 2 ovatae, acutae, margine membranaceae, ciliatae, dorso carinatae, stramineae. Calycis foliola oblonga, nervo medio viridi apice membranaceo in aristam brevem fuscâ desinente, stramineo-fuscescentia. A *L. angustifolia* (albida) *rubella* et *vernali* praesertim differt calycis foliolis aristatis, a proxima *L. maxima* habitu et inflorescentia? Attamen vix hujus esse loci videtur.

12. *L. Forsteri* *Desv.*; paniculâ cymosâ, erectâ; floribus solitariis; capsulâ acutâ; cristâ seminum rectâ, obtusâ. *Smith Engl. Fl.* p. 179. (*Desv. Journ. Bot.* 1. p. 141.) *Decand. Syn.* p. 150. *Fl. fr. V.* p. 304. *ic. pl. gall.* 1. t. 2. *Bichenov. Trans. Linn. Soc.* XII. 531. t. 9. f. 2. (*L. perianthii* laciniis acuminatis, interioribus angustioribus longioribus capsulam triquetro-ovata acutam mucronatam aequantibus. *Meyer Syn. Luz.* n. 9. *L. fol.* pilosiusculis, angustis; paniculâ plerumque compositâ; perigonii foliolis subaequalibus, mucronato-aristatis, capsulam subgloboso-triquetram vix retusam mucronatam aequantibus. *Laharpe* l. c. p. 168. *L. fol.* etc.; pedunculis subquadrifloris, erectis; pedicellis elongatis; etc. *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 529.) *Hook. Scot.* 110. *Fl. Lond.* t. 68. *Forst. Tonbr.* 44. (*Balb. Fl. Lyon.* 1. 2. p. 735.) *JUNCUS Forsteri* *Smith Fl. brit.* p. 1395. *Engl. Bot.* t. 1293. (*Gaud. Agrost. helv.* 2 p. 238.) *Savi Bot. etrusc.* 2. p. 70. n. 355. *JUNCUS pilosus* *Bott. ital.* (fid. *Bertol.*) *Gesn. Fasc.* 12. t. 6. f. 14. (excl. syn. et fig. A.) *JUNC. nemorosus* *Lam. Enc.* III. p. 272. (excl. syn. fid. *Decand.*) *J. luzuloides* *Lam. Dict.* III. p. 272. (cum? sec. *Laharpe*, qui vidit specimen cli *Lamarck*)).

Radix fibrosa. Herba pilosae, sed gracilior; folia angustiora brevioraque: superiora latiora. Crista seminum brevior. Panicula ramis erectis, saepe corymbosis. Capsulae valvulae acutae, margine quidquam incrassatae *Smith*. *L. vernali* tardior. Cespitosa, non stolonifera; fibris radicalibus nigricantibus. Folia imae vaginae foliaceae breves purpureae; radicalia 3-6 poll., 1-2 lin. lata, erecta vel erecto-patentia, basi purpurascens; caulina 1-2 poll., 1-2 lin. lata, omnia margine pilis longis albis. Culmi erecti, graciles, teretes, glabri, 4-12 poll., filo emporetico tenuiores. Paniculae rami 1-4-flori, 3-18 lin. longi, erecti vel suberecti, vix unquam divaricati. Bracteae sub floribus calyce duplo breviores, albidae, dorso fuscae, acutae. Cal. foliola badia margine pallidiore, nitida, longe acuminata, praesertim exteriora capsulam virescentem mucronatam aequantia vel paulo superantia, 1½-2 lin., ½-¾ lin. lata. Sem. virescenti-fusca, cristâ duplo longiora. *L. pilosa* *Kitbl.* fide specim. certe huc spectat. *Poiret* etiam *J. pilosum* *Host* cum? huc posuit, quod vix. *In sylvis*

et collibus siccioribus totius Italiae, Siciliae, Galliae, Helvetiae, Britanniae; in Hungaria et etiam in Germania bor.; in Africa boreali Salzm. 4.

Obs. An hujus loci J. Forsteri? Buch in *Abhandl. d. Acad. Berl.* 1816-17. p. 361?

c. Testâ seminis in sacculum obtusum desinente.

13. *L. albida* Desv.; perianthii laciniis acutis: exterioribus mucronulatis, interioribus longioribus muticis capsulam triquetro-ellipticam superantibus. *Meyer Syn. Luz.* p. 14. n. 10. *L. fol. pilosis*; panic. compositâ; cymis 4-10-floris, approximatis; floribus albis; perig. foliolis inaequalibus: interioribus longioribus capsulam ovoideam triquetram mucronatam paulo superantibus. *Laharpe l. c.* p. 174. *L. fol. pilos.*, angustis; corymbo paniculato, patulo, folio terminali brevioribus; pedunculis subquadrifloris; foliolis calycinis mucronatis: interioribus paulo longioribus; capsulis nigrescentibus inclusis; (radice fibrosâ). *Desv. Journ.* I. p. 149. *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 552. *Willd. Enum.* p. 393. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 159. *Gaud. Agr. helv.* II. p. 243. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 599. *Roth Enum. pl. Germ.* I. 2. p. 100. *Hoppe ap. Sturm. Deutsch. Fl.* 1. A. 36. H. n. 15. *JUNCUS albidus* *Willd. Spec.* II. p. 219. *Hoffm. Germ.* t. 6. *Host Gram.* III. t. 95. *JUNC. niveus* *Leers Herb.* n. 269. t. 13. f. 6. *Mönch. Hass.* n. 299. *Geners. Elench.* n. 319. *Scop. Carn.* I. p. 259. *Roth Germ.* I. 157. II. 413. *Host Syn.* p. 200. *JUNC. leucophobus* *Ehrh. Beytr.* 6. p. 141. *J. maximus* β *angustifolius* *Roth Fl. Germ.* II. 1. p. 411. (se teste). *J. luzuloides* *Lam. Enc.* III. p. 272. *JUNC. angustifolius* *Wulf. in Jacq. Collect.* III. p. 56. *JUNC. nemorosus* α *Poll. Pal.* n. 352. *J. pilosus* ϵ *Linn. Spec.* 468. *Hall. Helv.* n. 1327. *Gr. hirsutum angustifol. majus* *Bauh. Theatr.* 105. *Moris. Hist.* III. p. 225. S. 8. t. 9. f. 3. *Scheuchz. Agr.* n. 7. p. 318. β *L. cuprina* *Rochel. Herb.* n. 103. *L. albida* β *rubella* *Hoppe Dec.* n. 67. *L. albida* β *erythranthema* *Wallr. Sched. crit.* p. 150. *JUNC. rubellus* *Hoppe.*

Radix cespitosa, horizontalis, fusca; fibris copiosis. Folia radicalia $\frac{1}{2}$ -1 ped., angusta, striatâ; caulina longitudine digiti longioraque, supremum paniculâ longius; pilis longis albidis, deciduis. Vaginae apice valde pilosae, pollic. et ultra, striatae, glabrae. Bractee sub floribus 2-4 aggregatis albicantes, membranaceae. Calycis foliola albicantia vel pallide fusciscentia. Stigmata 3 rubra. Semina dorso convexa, facie compressa. β varietas inconstans, floribus rubellis, corymbis densioribus tantum diversa, culturâ iterum in albicantem redeuns. In montosis nemorosis Germaniae, Helvetiae, Galliae, Russiae. 4.

Obs. *Wenderoth Beytr. Fl. Hess.* p. 37. *L. angustifoliam* restituit, et hujus α *albidam*: floribus albis; corymbis laxis; culmo elato; et β *rubellam*, floribus rubellis; corymbis contractis; culmo humiliore distinguit.

14. *L. nivea* Desv.; perianthii laciniis acutis, muticis:

interioribus longioribus capsulam triquetro-subglobosam rostratam longe superantibus. *Meyer Syn. Luz.* n. 11. L. fol. pilos.; paniculâ compositâ; cymis 8-20-floris, laxiusculis; flor. albis; perig. foliolis interioribus exteriora multo superantibus, capsulâ sphaeroideâ triquetrâ subrostratâ brevissimâ multo longioribus. *Laharpe l. c.* p. 175. L. fol. angustis, longissimis; corymbo paniculato, coarctato; pedunculis sub-5-floris; foliolis calycinis acutis, albicantibus: interioribus duplo longioribus; caps. inclusâ, atrâ; radice repente. *Desv. Journ.* 1. p. 151. *Poiret Enc. Suppl.* III. p. 532. *Willd. Enum.* p. 593. *Decand. Fl. fr.* III. p. 158. *Gaud. Agr. helv.* II. p. 245. *Balbis Fl. Lyon.* 1. p. 734. *Bertol. Amön. ital.* p. 354. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 599. *Roth Enum. pl. germ.* 1. 2. p. 101. *Hoppe in Sturm Deutsch. Fl.* 1. A. 36. H. n. 16. *Juncus niveus Linn. Spec.* p. 468. *Willd. Spec. Pl.* II. p. 220. *Wulf. in Jacq. Collect.* 3. p. 54. *Allion. Fl. pedem.* II. p. 216. n. 2084. *Savi Bot. Etr.* I. p. 113. *Host Gram.* IV. t. 98. *Boiss. Fl. Eur.* t. 262. *Hall. Helv.* n. 1528. *Bauh. Hist.* 492. *Moris. Hist.* 3. S. 8. t. 9. f. 39. *Scheuchz. Gram.* p. 320. t. 7. f. 7. *Segu. Veron.* 1. 128. β L. *nivea livida Desv. l. c.* L. *nivea* β *rubella Mert. et Koch?*

Radix sublignosa, fuscescens, subhorizontalis, vix magis repens quam in *L. albida*. Culmi cespitosi solitariiive, $1\frac{1}{2}$ -3 ped., glabri. Folia radicalia fasciculata, linearia, acuminata, laete viridia, marginibus pilis longis albis ciliata, in vaginas purpurascetes laxas abeuntia, 1- $1\frac{1}{2}$ ped., 2- $2\frac{1}{2}$ lin. lata; caulina longe acuminata, $\frac{1}{2}$ -1 ped., vaginis arctis, striatis, ore purpurascete barbatis; summum paniculam paulo superans. Pedunculi glabri, filiformes, 7-8, erecto-patentes, juniores cernui; basi vaginis albidis, lanceolatis, longe acuminatis, fimbriatis, nervo medio carinatis; pedicelli 4-5, 5-6-flori: floribus glomeratis; bracteis 2-4, albidis, ovatis, obtusis, concavis, arcte appressis, calycibus multo brevioribus. Calycis foliola nivea, enervia; exteriora oblongo-ovata, acuta, $1\frac{1}{2}$ lin.; interiora tenuiora, 2 lin.. Stamina longitudine fere calycis foliolorum externorum. Antherae alidae, effetae pallide cinnamomeae. Stigma 3-fidum, albidum, serius rubellum. Capsula triquetra calyce brevior. Semina rotunda, nigricantia. In β omnia eadem, sed flores rubelli, cuprei vel lividi. *In alpihus sudeticis, noricis, rhaeticis, apenninis, maritimis.* 4.

15. *L. lactea Meyer*; foliis planis, subpilosus; corymbo composito, brevi, foliis involucri longiore; bracteis floribusque omnibus albis congestis. *Juncus stöchadanthos Brot. Fl. Lusit.* p. 516. *L. lactea Meyer Luz. n.* 12. L. fol. subpilosus; paniculâ vix compositâ, corymbosâ, pauciflorâ; cymis 4-6-floris; floribus albis; perigonii foliolis interioribus vix longioribus, capsulam acutam triquetram subturbinatam paulo superantibus. *Laharpe l. c.* p. 173. *Junc. lacteus*; culmo

folioso; fol. pl. pilosis; paniculâ contractâ; calycis foliolis aequalibus, bracteas ternas duplo longitudine superantibus. *Link* in *Schrad. Journ.* 1799. IV. p. 316. *Junc. brevifolius*; fol. linearibus, canaliculatis, pilosis; corymbo composito, glomerato, foliis subaequali; capitulis sub-10-floris; calycis foliolis obtusis, interioribus duplo longioribus. *Rostk. d. Junc. p.* 55. (fid. *Link.*) *LUZULA brevifolia*; fol. linearibus, canaliculatis, pilosis; corymbo glomerato: glomerulis sub-10-floris; foliolis calycinis obtusiusculis. *Desv. Journ. d. Bot.* l. p. 152. *JUNCUS niveus brevifolius Pers. Syn.* 1. p. 386.

Corymbus primo intuitu quasi GNAPHALII STOECHADIS. Folia radicalia in cespitem congesta, marginibus subpilosa, 5 lin. lata, 3 poll. longa; culmea subfiliformia, pollicaria aut paulo ultra, vaginâ longiusculâ, pilis loco ligulae instructa, ad corymbum duo alterna, basi latâ, acuminata, corymbo tamen breviora. Culmus tenuis, erectus, solitarius, teres, striatus, 4-5-nodis, 1½ pedalis, internodiis ad ⅓ vaginatis. Flores in corymbo pollicari aut 1½ poll., ramis simplicibus, inaequalibus, congesti, 15-20 et ultra, subsessiles. Bracteae 5-4 ovatae, acutae, albidae, colore florum istisque dimidio breviores. Petala 6, aequalia, rarius subaequalia, sublanceolata, acutiuscula, penitus albicantia, demum ex albis pallida. Stam. 6. Caps? — Cor. aequalis et folia involucri corymbo breviora plantam distinguunt a *niveo* vel *albido*. *Brotero.* „Descriptio data a *Rostkov* adeo differt, ut vix a genuino hujus speciei specimine.“ *Meyer.* Sic etiam *Laharpe*, qui descriptionem a *Rostkov* datam ad specimen *L. niveae* factam esse putat et sequentia notat; habitus *L. albidae*, sed gracilior et folia minus numerosa. Rhizoma extra terram repens; folia angusta, glabra praeter vaginarum os; bracteae panicularum valde inaequales: interior exteriore duplo brevior; spathellae florales 3; perigonii foliola subaequalia. *In summis montanis Gerez, ad riv. Stomem; in Corsica et in Apenninis. Thomas.* 4.

16. *L. canariensis Poir.*; foliis maximis, longis; vaginis ore subpilosis; corymbo glomerato, albido; caule alto, subcompresso, striato. *Poir. Suppl.* III. p. 552. *Meyer Syn. Luz.* p. 24. n. 24. *L.* fol. pilosis, latis; paniculâ decompositâ; cymis 10-20-floris, densis; floribus albis; perigonii foliolis aequalibus, capsulam sphaeroideam triquetram longe superantibus. *Laharpe l. c. p.* 175. *Buch Abh. Acad. Berl.* 1816. 17. p. 362.

Radicibus et habitu similis *pediformi*, corymbo vero *niveae*. Culmi 2-ped. et ultra, recti, glabri, subcompressi, striati. Folia pedalia, plana, 6-8 lin. lata, lanceolata, longe acuminata, glabra, ad vaginas harumque praecipue ora pilis aliquot albis: radicalia vaginis in petiolum longum attenuatis. Flores parvi, albi, nitentes: calycis foliola subaequalia, angusta, acuta. *Poir.* 3-4 ped. Folia 4-10 lin., ciliis paucis longis, nervis prominentibus. Flores numerosi, magnitudine tantum et foliolis aequalibus a *L. nivea* diversi. Capsula minutissima. *Laharpe.* *Ad rivulos insularum canariensium. Broussonet.* 4.

17. *L. lutea* Desv.; perianthii laciniis aequalibus, obtusis, mucronatis, luteo-splendentibus, capsulam trigono-ovata acutam mucronatam aequantibus. *Meyer Syn. Luzul. n. 13.* *L. fol. glabris; panic. simplici; cymis 10-20-floris, densis; floribus luteis; perig. foliolis aequalibus, capsulam globosam triquetram mucronatam aequantibus. Laharpe l. c. p. 175.* *L. fol. vaginisque glabris; corymbo paniculato, conferto; glomerulis 6-multifloris; foliolis calycinis splendentibus, acutiusculis: interioribus longioribus. Poir. Enc. Suppl. III. p. 532. Desv. Journ. d. Bot. 1. p. 153. Willd. Enum. h. berol. II. p. 218. Decand. Fl. fr. III. p. 159. Gaud. Agr. helv. II. p. 250. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 600. Roth Enum. pl. germ. I. 2. p. 102. JUNCUS luteus; glaber; foliis planis; paniculâ terminali, glomeratâ, nitente; floribus obtusiusculis. Lam. Enc. III. p. 271. Vill. Delph. II. p. 255. t. 6. Allion. Pedem. II. p. 216. n. 2085. Savi Bot. etr. II. p. 71. n. 557. Rostk. d. Junc. p. 31. t. II. f. 1. JUNC. campestris ε Linn. Spec. 469. Hall. Helv. n. 1329. Gerard Prov. 140. n. 11. Juncoides latif. alpin. glabr.; paniculâ luteâ splendente. Scheuchz. Gram. 314. β corymbo laxiore; stigmatibus exsertis. JUNCUS pistillaris Jan Catal. Herb. 533. n. 39 $\frac{1}{2}$.*

Radix repens, flavescens. Culmi glabri, erecti, pallide virides, 4-12 poll.. Folia lanceolata, acuta, plana, obsolete striata; caulina erecta, pallide viridia, 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll., 2-3 lin. lata. Panicula brevis, densa, rarius laxiuscula et 1 $\frac{1}{2}$ poll., omnibus partibus flava; ramis inferioribus saepius cernuis. Flores breviter pedunculati, breviores, latiores quam in *nivea*, bracteis fulti ovatis, vix acutis, calyce duplo brevioribus, glaberrimis, subinde apice laceris. Calycis foliola oblonga, acutiuscula vel obtusa cum mucronulo, interiora vix longiora. Stamina longitudine fere calycis, antheris duplo breviora. Stylus ad $\frac{1}{3}$ tantum trifidus. Capsula parva, subrotunda, trigona, apice fusca, vix longitudine calycis, plerumque brevior. In β panicula $\frac{1}{2}$ -2 poll.; rami longiores, graciles, erectiusculi et subcernui; glomeruli 3-multiflori, minores; flores minus laete lutei; cal. foliola oblongo-lanceolata, obtusa, vix mucronulata; interiora multo longiora, lin.; stam. longitudine calycis foliolorum externorum; antherae magnae; stylus vix ad $\frac{1}{3}$ tripartitus; stigma exsertum, lobis crassiusculis patentibus; caps. ovatae, trigonae, acutae, calyce breviores, fuscae. *In alpi-bus Delphinatus, Helvetiae, Sabaudiae, Tyrolis; β in Apenninis parmensisibus. Jan. 4.*

d. Testâ seminis inferne (circa funiculum) relaxatâ.

18. *L. campestris* Desv.; paniculâ e racemis 3-4, ovatis, densis, sessilibus pedunculatisque; capsulâ obovatâ, obtusâ, mucrone exiguo, calyce brevioris; seminibus pedunculatis, non cristatis; foliis planis. *Smith Engl. Fl. II. p. 181. Bicheno Trans. Linn. Soc. XII. p. 354. t. 9. f. 4. R. Brown*

Prodr. 591. (L. corymbo suprafastigiato, simplici: ramis spicigeris dein patentibus: perigonii laciniis ovato-lanceolatis, acuminatis: interioribus longioribus; radice stoloniferâ, repente. *De Schlechtend. Fl. berol.* 1. p. 203. L. fol. plan.; anthelâ spiculis compositâ; bracteis superioribus non ciliatis; calycis laciniis ovatis: exterioribus in mucronem attenuatis, interioribus acutis, mucronatis, capsulam obovato-subglobosam obtusam mucronatam superantibus. *Meyer Diss.* n. 14. (excl. var.) L. fol. saepius pilosiusculis; paniculâ subsimplici, inaequaliter umbellatâ; spicis 6-10-20-floris, approximatis remotisve; perigonii foliolis aequalibus, capsulam globosam obsolete triquetram subretusam aequantibus. α paniculâ vix umbellatâ; spicis irregulariter approximatis. *Laharpe l. c.* p. 176.) *Hook. Scot.* 110. *Forst. Tonbr.* 44. (L. fol. angustis; capitulis subumbellatis (2-4) nutantibus, intermedio sessili; foliolis calycinis mucronatis, capsulâ obtusâ longioribus; radice repente. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 155. *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 161. *Decand. Fl. fr.* 1827. *Gaud. Agr. helv.* II. p. 246. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 601. (excl. variet. ut in) *Roth Enum. pl. Germ.* I. 2. p. 103. *Mich. Fl. bor. Am.* 1. p. 190. *Pursh Fl. Sept. Am.* 1. p. 238. *Ell. Sketch.* 1. p. 410. *Torrey Fl. n. et m. U. St.* 1. p. 365.) *Juncus campestris* Linn. *Spec.* 468. α . *Willd. Spec.* II. p. 221. α . *Smith Fl. Brit.* 385. *Engl. Bot.* t. 672. *Rostk. Mon.* 44. *Curt. Fl. lond. Fasc.* II. t. 19. (*All. Ped.* II. p. 216. n. 2086. *Savi Bot. etr.* 1. p. 114. n. 137. (uterque fid. *Bertol. Amön.* p. 354.) *Kniph. Cent.* XII. n. 66.) *Leers Herb.* 91. t. 13. f. 5. *Ehrh. Calam.* 67. (*Junc. nemorosus* Spreng. *Fl. hal.* *Host Gram.* t. 97. f. 1.) *Hall. helv.* n. 1330. (*Gmel. Sib.* 1. p. 64.?) *Gram. exile hirsutum* Ger. *Emac.* 17. f. *Bauh. Prodr.* 15. f. *Theatr.* 103. f. *Moris.* III. S. 8. t. 9. f. 4. *Lob. Ic.* 15. f. *Bauh. hist.* II. 493. f. 494. — α *pumila*; culmo 1-4 poll.; corymbo depauperato; spicis 1-3. *de Schlecht d.* l. c. *J. campestris* δ *ericetorum* van Hall. *Fl. Belg. Sept.* 1. p. 296. β . *elata*, culmo $\frac{1}{2}$ -1 ped.; corymbo ditato; spicis 3-5. *de Schlecht d.* l. c.

Radix tenax, repens et (vix?) cespitosa, squamosa. Culmi solitarii, 3-4-10 poll., recti, teretes. Folia caulina plerumque 2, quae, uti radicalia numerosa, multinervia, obscure viridia, margine pilosissima, praecipue ad apicem vaginae. Racemi in pedunculis laxis (vel rigidis, subinde cernuis), simplicibus, patentibus (praeter unum sessilem) paniculam sistentes, ovati aut globulosi; floribus 4, 6, 8 et ultra congestis, subsessilibus, basi bracteis membranaceis, partim fuscescentibus (vel albidis), vaginantibus, rugosis, ciliatis. Calycis foliola lanceolata „(interiora parum longiora)“, acuta, obscure fusca, carinâ crassâ, margine membranaceo pallido. Capsula late obovata, calyce multo brevior, pallide fusca, apice obtusa et rotundata, mucrone exiguo e styli basi.

Seminum pedicelli crassi, altero latere adscendentes. *Smith Engl. Fl. l. c.* Bractea infima corymbi hunc nunquam superat (et rarius aequat). *De Schlechtendal.* In pascuis sterilibus siccis totius *Europae* (etiam in *Spitzbergen*), *Americae borealis* et *arcticae*; in *Japonia Thunb.*; in *Nova Hollandia R. Brown*; in insulis *Societatis Forst. Prodr. n. 154.* 2.

Obs. Sub *Luzula campestri* Americanorum, quam *Desvauz* ad *L. erectam* spectare dicit, fide speciminum in *Herb. Schreb.*, tam *L. campestris*, quam *L. erecta* latere videtur. Hoc patet etiam e sequente descriptione *J. campestris* a *Mühlenberg* data: „rad. bulbosa; culmus ped.; folia lanceolata, plana, alterna, undique pilosa; spicae terminales sessiles, pedunculataeque, erectae, multiflorae, umbellatae; involucrum diphyllum, setaceum, umbellâ brevius. Cal. exterior albus, obtusus, diphyllus; foliola calycis lanceolata acuminata, mucronata; antherae 6 luteae; capsula trigona, calyce minor, obtusa, fusca, punctata; semina 3 nigra, apice alba. Duarum meminit cospecierum; alterius primo vere, alterius aestate florentis, floribus albis.“

19. *L. erecta Desv.*; corymbo suprafastigiato, subcomposito: ramis spicigeris erectis; perigonii laciniis ovato-lanceolatis: exterioribus acuminatis, longioribus: interioribus obtusiusculis, mucronatis, brevioribus; radice fibrosâ. *De Schlechtend. Fl. berol. p. 204.* *L. culmo erecto, elato; capitulis ovatis, strictis, inaequaliter pedunculatis; capsulis ovatis, perianthio longiore; radice cespitosâ. Desv. Journ. d. Bot. I. p. 156.* *L. multiflora Decand. Fl. fr. V. p. 306.* *Lejeune Fl. d. Spa. p. 169.* *Wallr. Sched. crit. p. 151.* *Hopp. Dec. Gram. n. 95.* *L. fol. planis; anthelâ compositâ spiculis omnibus pedunculatis, erectis; perianth. laciniis lanceolatis, subulatis, aequalibus, capsulâ obovatâ mucronatâ subbrevioribus. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 105.* *L. campestris Kunth berol. p. 98. (ex parte).* *L. camp. β nemorosa: elatior, spicis erectis. Meyer Syn. n. 14.* *L. camp. β panic. elatâ; spicis erectis longe pedicellatis. Laharpe l. c.* *L. camp. multiflora Mert. et Koch D. Fl. II. p. 601.* *L. pallescens Weihe Gram. exs. n. 220.* *L. nemorosa Presl. Juncus multiflorus; fol. planis, subpilosus; spicis omnibus pedunculatis erectis. Ehrh. Gram. n. 127. Hoff. Fl. Germ. ed. 2. p. 169. (excl. syn. Linn.) J. erectus Pers. Syn. p. 386. quo teste: J. intermedius Thuill. Paris., ed. 2. p. 178. J. campestris var. Roth Germ. II. 1. p. 415. J. campestris Willd. Prodr. n. 398. (ex parte). Fl. Dan. t. 1333. J. campestris γ Dec. Fl. fr. III. p. 171. J. nemorosus Host Gram. III. t. 97. f. 2. Bauh. Hist. 2. 468. c. ic. Scheuchz. Agr. p. 312. n. 2. α pallescens; altior, validior; spicis varie pedunculatis, mediâ sessili; floribus majoribus. De Schlechtend. l. c. Hott plur. synonym. supra laudata. β conferta; altior, validior; spicis in capitulum coarctatis, unâ alterâve longius pedunculatâ; flor. majoribus. De Schl. l. c. L. erecta β congesta Desv. Journ. d. Bot. I. p. 156. Poir. Enc. Suppl. III. p. 533. L. erecta β Bast. Ess. 136. L. congesta; fol. linear., pilos.; spicis glomerato-capitatis; petalis cuspidatis, capsulam obtusam*

superantibus. *Lam. et Dec. Fl. fr. V. p. 305. Lejeune Fl. Spa. 168.* L. paniculâ e racemis numerosis, rotundato-ovatis, densis, passim pedunculatis; capsulâ obovatâ, obtusâ, mucrone exiguo, longitudine calycis; seminibus pedunculatis, non cristatis; fol. planis, margine scabris. *Smith Engl. Fl. II. p. 181. Forst. Tonbr. 44. Balbis Fl. Lyon. I. p. 736. Fl. Dan. 1692. L. campestris β Hook. Scot. 110. L. camp. β congesta, Bichenov Trans. Linn. S c. XII. p. 534. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 104. L. camp. γ congesta Meyer l. c. L. camp. γ; panic. densâ capitatâ; spicis multifloris, capitatis. Laharpe l. c. p. 176. L. camp. ε congesta Mert. et Koch D. Fl. II. p. 602. Juncus campestris β Smith Fl. brit. p. 386. Roth Fl. Germ. II. p. 414. (se teste). J. campestris γ Linn. Spec. 469. (fid. Smith). Willd. Spec. II. p. 221. J. liniger Pursh. Suppl. 352. t. 9. (opt. sec. Smith). J. congestus Thuil. Par. ed. 2. I. p. 179. Pers. Syn. 1. p. 386. Gr. hirs. elatius; panic. juncea compactâ. Rayi Syn. 416. (fid. Smith, ergo etiam J. camp. ζ Linn. Spec. p. 469. et J. camp. ε Willd. Spec. II. p. 221.) Gr. hirs. capitul. globoso. Bauh. Theat. 104. f. Moris. S. VIII. t. 9. f. 1. ad sin. (fid. Smith, ergo J. cam. β Lam. Enc. III. p. 273.) G. Luzulae minus. Bauh. Hist. II. 495. f. Gr. capitulis globosis. Ger. Em. 18 f. γ micrantha; minor, tenerior; spicis varie pedunculatis, minoribus: mediâ sessili; floribus fere duplo minoribus. de Schlechtend. l. c.*

„Praeter diagnosis notas a *L. campestri* distincta: corymbo multifloro (spicis 5-20) saepe composito, culmo plerumque altiori, ad minimum $\frac{1}{2}$ ped., foliis margine evidenter serrulato-scabris; floribus parum, in γ multo minoribus, minus coloratis pallidioribus. Forma γ species forsitan, omnibus partibus tenerior, gracilior, corymbis valde multifloris, floribus duplo minoribus; perig. laciniis interioribus brevioribus quam in ceteris, magis obtusis, evidentius mucronatis, capsulam tamen superantibus, quae in reliquis formis perigonio subaequalis.“ *De Schlechtendal* l. c. Plerumque dense-cespitosa, nunquam repens. Culmi erecti, $\frac{1}{2}$ -2 ped., teretes, striati. Folia radicalia numerosa, caulina 2-3 erecto-patentia, multinervia, nervis 3 plerumque fortioribus, margine pilis longis albis, ad vaginae faucem fasciculo pilorum longissimorum. Folium supremum vel involucrem corymbum subaequans, vel longius. Corymbus e spicis 4-20, plerumque 5-7, variae magnitudinis, ovatis, mediâ subsessili, lateralibus in pedunculis $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ poll., gracilibus, erectis et suberectis, glabris, rarius unâ supra alteram. Bractae ad basin pedunculorum inferne dilatatae, vaginantes, submembranaceae, superne subulato-acuminatae, virides vel fusciscentes vel pallidae, undique ciliatae; bractae sub floribus ovatae, acuminatae, concavae, membranaceae, carinatae, albidae, dorso fusciscentes, plerumque fimbriato-ciliatae, calyce breviores. Cal. foliola pallidius vel intensius fusca, margine pallidiora, nitida, subcarinata: exteriora subulato-acuminata, 1 $\frac{1}{2}$ lin.; interiora obtusiuscula cum mu-

crone, vix ultra lin.. Stam. calyce duplo breviora; antherae filamentis duplo longiores. Caps. obovato-trigona, obtusa, calyce multo brevior, pallide fuscescenti-viridis; valvulis medio impressis. Semina oblonga, pedicello crasso, fusca. — In β apud *Smith*: „culmi erecti, $1\frac{1}{2}$ ped.. Folia angustiora, margine calloso-aspera, plus minus, uti *campestris*, pilosa. Panicula plerumque e racemis spicisve 7 v. 8, ovatis v. subglobosis, densis, obtusis: primâ sessili, reliquis in pedunculis longis patentibus. Cal. pallidior quam in *campestri*, magis acuminatus, vix capsulâ longior, quae tenuior. *Teesdale* primus culturâ evicit hanc speciem esse constantem.“ An haec forte potius ad α ? In β apud nos: rad. minus fibrosa et potius quidquam repens; culmi rigidiores, $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ ped.; folia paulo angustiora et rigidiora, minus pilosa; capitula paulo majora, dense conferta vel 2-5 in pedunculis rigidis, crassioribus; flores intensius colorati, fusci, bracteis albis; cal. foliola minus acuminata; capsulae magis nitidae, intensiores, saepius atrofuscae. Quoad habitum media quasi *L. campestris* inter et *erectam* α . γ *L. pallescenti* proxima, quam confer. In montosis sylvaticis totius fere *Europae*, etiam in *America boreali*; β in sterilibus, et editioribus; etiam in *Sibiria* et, fid. *Herb. Mart.*, in *Eschscholz* bay. *Eschscholz*. 2.

Obs. Cls. *Decandolle* in *Fl. fr.* sequentes distinguit varietates *L. congestae*: α fol. pilosis, vaginalum ore fasciculo pilorum; β subglabra; fol. margine fere glabris, ad vaginae os tantum pilosulis; γ glabra: fol. omnino glabris. — Ad *L. erectae* β confertam, i. e. *L. congestam* nobis spectare videtur. *Gmelin Sib.* t. 17. f. 1., a *Desvauz* ad *L. erectam* laudatus. A clis. *Meyer* et *Laharpe* ad *L. campestris* γ *congestam* ducitur et nequidem tanquam subvarietas distinguitur: *L. tristachya* (fol. brevibus; spicis subtribus, congestis; involucre monophyllo, capitulum subaequante; foliolis perianthii lanceolatis, acutis; capsulis obtusis, gibbosis). *Desv. Journ. d. Bot.* t. p. 159. t. 6. f. 2., quae multum affinis *campestri*, sed bractee angustiores; culmi 7-8 poll., erecti, foliis acutis pilosis; flores valde approximati, bractea angustâ ad basin spicae singulae. In *America meridionali*. Conf. *Obs.* ad *L. campestris* et ad *L. pallescentem*.

20. *L. pallescens* *Wahlenb.*; foliis planis; culmo compresso; spicis umbellatis, oblongis, pedunculatis, patentibus; bractea foliacea. *J. pallescens* *Wahlenb. Fl. lapp.* 165. *J. fol. planis, culmo paniculato, spicis ovatis. Linn. Fl. lapp. t. 10. f. 2. J. campestris* β *Linn. Spec. p. 127. Willd. Spec. II. p. 221. J. campestris* γ *Lam. Enc. III. p. 273. L. campestris* $\beta\beta$ *pallescens Meyer Syn. n. 14. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 602. L. campestris* β *pallescens Wahlenb. Fl. suec. p. 218.*

Fide speciminis Linnaeani in *Herb. Linn.* spiculae pallidiores quam in *campestri*, minores, et racemi potius; calyx magis acuminatus; folia angustiora, minus pilosa, licet margine scabra. *Smith Engl. Fl. p. 182.* Ob culmum compressum valde debilis et fere decumbens, tota pallescens et facie fere *CARICIS pallescentis*. Folia culmea pauca; angustiora quam in *campestri*. Culmus plerumque ultra ped.. Sub umbella spicarum semper bractea 1-2, foliacea, erecta, spicas fere superans, amplexicaulis nec vaginans. Spicae omnes magis pedunculatae et fere unilaterales, numerosiores, quam in *L. campestri*. Flores minores. Foliola calycina acuminata, vix capsulas superantia. *Wahlenb. In lucis et fructu- cetis siccis Lapponiae.* 2.

Obs. Retinuimus hanc speciem, quae clis *Meyer* et *Laharpe* tantum subvarietas *L. campestris* β auctoritate cel. *Bichenov* et *Smith*, qui eandem ad specimen in *Herb. Linn.*, specie differre dicunt. Specimina plura *L. pal-* 100

lescentis, quae vidimus et quae etiam nomine *L. flavescens* accepimus, non differunt a varietate *γ erectae*; an vero haec vera Linnaei planta, quae saepius ad *L. erectam* citatur? *Smith* in *Engl. Fl.* II. p. 182. alius meminit plantas e Virginia *L. pallescenti* similis, in qua folia fere longitudine culmorum, margine minute remoteque serrata, nec vere scabra.

21. *L. sudetica* *Dec.*; foliis planis, glabris; vaginis pilosis; spicis pedunculatis, umbellatis: intermediâ sessili; calycinis foliolis mucronatis, longitudine capsulae. *Willd. Spec.* II. p. 221. (sub *Juncus sudetico* excl. syn. *Krocker*) *Enum.* p. 394. *L. fol.* linearibus margine pilosiusculis; glomerulis racemoso-spicatis, nutantibus; bracteis elongatis; petalis mucronatis, capsulam aequantibus. *Decand. Fl. fr.* V. p. 306. *Balb. Fl. Lyon.* 1. 2. p. 637. (excl. syn. *Krock*). *L. nigricans*; fol. subbrevibus, pilosis; capitulis nutantibus, subspiciformibus, breviter pedicellatis, nigricantibus; foliolis calycinis mucronato-acutis, capsulam atram aequantibus. *Desv. Journ. d. Bot.* 1. p. 58. (a clo. *Meyer* cum? ad *L. spicatum* α, a clo. *Laharpe* tam huc, quam ad *L. spicatum*, laudata). *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 553.? *L. campestris* δ alpina, minor; anthelâ compactâ. *Meyer Syn. Luz.* p. 18. *L. camp.* δ paniculâ capitatâ; spicis atratis paucifloris. *Laharpe l. c.* p. 176. *L. camp.* δ *nigricans* *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 602. *L. camp.* γ alpina *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 104. *Juncus sudeticus* *Host Fl. austr.* 1. p. 453. *Gram.* IV. t. 99. *J. campestris* η *Linn. Spec.* 469. *J. camp.* β *sudeticus* *Wahlenb. Lapp.* p. 87. *J. rigidus* *Wulf. Fl. nor.* (fid. herb. *Vest apud Martius*). *Juncoides bohemicum* *Michel. gen.* 42. β minor; fol. magis pilosis; floribus magis congestis. *L. camp.* β alpina *Gaud. Agr.* II. p. 47. *Hoppe Dec. Gram.* n. 108. *L. camp.* ζ *nivalis*, capitulis congestis; culmo 3-6 poll. *Mert. et Koch l. c.* et his testt: *L. camp.* γ *nivalis* *Wahlenb. Fl. suec.* 1. p. 218.

Affinis *campestri*, sed diversa. *Willd.* Radix fibrosa, vix repens, (repens *Dec.*). Culmi teretes, erecti, 6-12 poll.. Folia margine scabra, supra quidquam canaliculata, glabriuscula, vaginis apice pilosis. Panicula erecta, glomerata, involuero fere semper brevior; rarius rami quidquam elongati. Cal. foliola oblonga, acuminata, quidquam ciliata, apice purpurascens paulo reflexa, margine membranaceo pallido, capsulâ quidquam longiora. Capsula obsolete trigona, subrotunda, acumine brevissimo, nigricans. Hic a plerisque laudatur *J. spicatus* *Krocker Siles.* p. 572 t. 52., qui sec. *Meyer* certe varietas *L. spicatae*. In β: rad. cespitosa, fibrosa, fusca; culmi 3-6 poll., stricti, teretes; folia caulina 2-3, erecta, linearia, acuta, plana, longe vaginantia, margine pilosa et subcartilagineo-scabrida, nervosa, nervis 3 evidentioribus, 1½-3 poll., 1-2 lin. lata; vaginae ore fasciculo pilorum; panicula densa, e spicis 3-6 ovatis subsessilibus vel aliquibus pedunculatis congesta, involuero vel folio terminali brevior; bractee ovatae, acuminatae, albidae, fimbriato-ciliatae; cal. foliola atro-fusca margine paulo pallidiora, nitida, lanceolata, mucronato-acuminata, apice saepius reflexa, interiora paululum breviora; capsula

nigricans, nitida, trigono-ovata, obtusiuscula cum mucrone brevi, calycem subaequans; sem. oblonga, pallide fusca, funiculo crasso, dilatato. *In Silesiae Sudetis, in Carpathis, in alpiibus noricis, in Pyrenaeis; β in summis alpiibus.* 4.

22. *L. hyperborea* R. Brown; foliis nudis, planis; paniculâ simplici, plerumque spicatâ; fasciculis 3-5-floris, nunc approximatis subspicatis, nunc pedunculatis subumbellatis; perigonii foliolis subaequalibus, acutis, capsulam ovoideo-sphaeroideam triquetram obtusiusculam vix superantibus. *Laharpe* l. c. p. 83. et hoc teste: α fasciculis subumbellatis. *L. hyperborea*; spicis multifloris, subumbellatis, pedunculatis sessilibusque (nunc omnino sessilibus); bractea umbellae foliaceae partialibus omnibus fimbriatis; capsulis obtusis, perianthia acuta subaequantibus; carunculâ basilari seminis obsoletâ; foliis planis. *R. Brown Suppl. App. Parry's Voy.* p. 285. *Chlor. Melville* p. 25. et hoc teste: *L. campestris* Br. *Spitzb. Pl. in Scoresb. arct. reg.* I. app. p. 75. *Juncus arcuatus* Hook. in *Scoresb. Greenl.* p. 410. *J. campestris* Soland. in *Phipps* p. 201. β fasciculis approximatis spicatis *Laharpe* l. c. *L. nivalis*; capitulis multifloris; floribus exiguis; calycibus obtusis capsulâ retusâ subglobosâ brevioribus; culmo rigido, stricto; fol. lanceolatis, acuminatis, brevibus; radice cespitosâ. *Lae-stadius* in *Act. Holm.* 1822. p. 534. *L. campestris γ nivalis* capitulis conglomeratis. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 218.

Speciminibus minimis *L. campestris sudeticae* similis, attamen differt: floribus in fasciculos parvos, nec in spicas congestis, perig. foliolis lanceolatis, acutis, paulo longioribus capsulâ semper ovoidea, obtusiusculâ, trigonâ nec retusâ, seminibus basi non appendiculatis. *L. arcuata*, cui proxima, facile distinguitur: foliis canaliculatis et recurvis; paniculae ramis capillaribus nutantibus, capsulâ brevior minus rotundatâ. Bractearum incisurae in eodem specimine valde variae. *Laharpe*, cui huc spectare videtur *Junc. arcuatus* β *Wahlenb.* et *L. arcuata Meyer.* Cls. *R. Brown* notat de *L. hyperborea*: „Vix distincta species, et potius ad *L. campestris* mire variantem, quam ad *L. arcuatam* referenda, praesertim ob bracteam umbellae saepissime, non vero semper, foliaceam, et folia plana. *L. arcuatae* β (*Wahlenb. Lapp.* p. 88., cuius fig. in *Flor. Dan.* 1586, sed excl. synonym. *Villars*) tamen accedit inflorescentiâ; spicis multifloris, longius pedunculatis, quandoque etiam arcuato-recurvis; bractea umbellae nunc, quamvis rarissime, squamaceâ, partialibus omnibus fimbriatis et carunculâ seminis obsoletâ. Haec autem forsitan distincta a *L. arcuata* α *Wahlenb. lapp.* p. 87. t. 4. *Hook. Fl. lond. n. ser.* t. 151., cui spicae longius pedunculatae, pauciflorae, et semina, ni fallor, absque caruncula.“ β, spithamaea. Rad. magna. Folia radicalia, uti in *spadicea*, maculata, foliis *campestris* latiora, complanata; culmea lanceolata, brevia, vaginâ purpurascente. Bractea spicarum foliaceae, convoluta: bracteolae integrae. Differt a *L. campestris* inflorescentiâ capitatâ floribusque minutis; a *sudetica* foliis latioribus, brevibus, maculatis, ore vaginarum minime piloso, culmo stricto, rigido; ab *arcuata* foliis radicalibus semper complanatis.

culmeis brevioribus, bracteolis non fimbriatis. *Laest.* α in *Melville Island*; β in rupibus occultis alpium lapponicarum (*Jegnaapo*) rarissime, in *Grönlandia*. 4.

23. *L. arcuata* *Smith*; paniculâ subumbellatâ, subcompositâ; ramis nutantibus, capitulis globosis, paucifloris; bracteis membranaceis, fimbriatis; capsulâ ellipticâ; foliis canaliculatis. *Smith Engl. Fl.* II. p. 183. *Wahlenb. Fl. Suec.* p. 218. *L. fol. canaliculatis*; anthelâ capitulis compositâ; bracteis nudis; perianthii laciniis subaequalibus, lanceolatis, acutissimis, capsulam ovato-subglobosam obtusiusculam superantibus. *Meyer Syn. Luzul.* n. 16. *L. fol. glabris, canaliculatis*; paniculâ simplici, laxâ; fasciculis 3-6-floris, pendulis; perig. foliolis aequalibus, acutis, capsulâ ovoideâ triquetrâ obtusiusculâ 3-4-valvi paulo longioribus. *Laharpe l. c. p. 171.* *Juncus arcuatus* *Wahlenb. Lapp.* p. 87. t. 4. (excl. syn. *Vill.*) *Hook Lond.* t. 151.

Rad. sublignosa, cespitosa, apice ramosa, vaginis pluribus squamosis, nervosis. Culmus 3-4 poll., erectus, teres, striatus, folio uno alterove. Folia radicalia numerosa, cespitosa, incurva, linearia, canaliculata, obsolete pilosa; caulina magis plana, vaginis longis, rufescentibus. Flores circiter terni in capitulis parvis, globosis, plus minus pedunculatis, in paniculam collectis ramis numero et longitudine variis, interdum subdivisis, basi bracteâ plus minus tenui membranaceâ profunde fimbriatâ vaginatis, quales etiam bracteae sub singulo flore ovatae et magis diaphanae. Calycis foliola lanceolata, acuta, fusca, margine membranacea. Caps. calyce brevior, pallida, elliptica potius quam ovata, obtusa, mucrone parvo, deciduo, e basi calycis. Semina fere sine crista. *Smith Engl. Fl.* l. c. *L. spicatae* maxime affinis, quamquam, quoad dispositionem spicarum, praecedentibus similior. Cespitosa; ad radicem insigniter fusco-rubens. Folia stolonum radicalium angustissima, fere subulata; culmea latiora, canaliculato-subulata. Culmus laevissimus, paulum curvus. Bractea sub umbella vaginans, aphylla; ore hyalino fimbriato. Umbella composita ita, ut pedunculus infimus cymam partialem proferat. Pedunculi inaequales, recurvati. Spicae pauciflorae, ex albo fuscoque variegatae. Folia *L. spadiceae* etiam in durissimis alpibus plana, nec convoluta, ut in hac. *Wahlenb.* Habitus *CARICIS capillaris*. Capsulâ, floribus irregulariter fasciculatis nec spicatis, seminibus integumento externo undique interno arcte appresso *L. spadiceae* valde affinis, sed foliis canaliculatis, paniculâ subsimplici, ramis nutantibus, perigonio capsulam paulo superante satis diversa tam ab hac, quam a *L. hyperborea*, cujus fasciculi densiores 6-8-flori, et bracteae albiae magis elongatae. Capsula saepius 4-valvis et 4-sperma. *Laharpe*, cui *L. arcuata* *Meyer* potius ad *L. hyperboream* spectare videtur, et qui *J. arcuatum* β spicis majoribus multifloris *Wahlenb. lapp.*, ad quem *Fl. Dan.* t. 1386 citatur, *L. hyperboreae* et *campestri* propiorem dicit, quam *arcuatae*. In lapidosis sterilissimis summitatum montium *Crampionum Scotiae*, et in *Lapponia* et forte in *Sibiria*. 4.

24. *L. villosa* *Wikstr.*; foliis planis, (glabris) margine

villosis; spicâ racemosâ, densiflorâ, erectâ, villosâ; spiculis subsessilibus bracteatis. *Wikstr. Act. Holm. 1825. p. 5.*

Rad. cespitosa, fibrosa. Culmus suberectus, subangulatus, foliis 2-5, striatus, glaber, simplicissimus, dodrantalis. Folia radicalia plurima; caulina sparsa, suberecta, sublinearia, acuminata, apice callosa, integerrima, striata, 1-4-poll., medio 2-3 lin. lata, suprema minora, bracteiformia, spicam amplectentia. Spica villosa, bracteis lanceolatis, acuminatis, integerrimis, extus villosis, medio fuscis, margine albidis, 1-2 lin.. Spiculae approximatae, pedicellis brevissimis, glabris. Calycis foliola lanceolata, attenuata, aequalia, apice margineque villosa, fusca, lineâ parum majora. Stamina inclusa. Germen glabrum, obtusiusculum: stigmata exserta, longitudine calycis. Differt a *L. spicata*, cui proxima, staturâ omnium partium majore, foliis planis, multoties latioribus, margine spicisque eximie villosis; bracteis floribusque villosis. *Wikstr.. In terra del Fuego et Falklands Islands. 4.*

25. *L. spicata Desv.*; paniculâ densâ compositâ, oblongâ, lobatâ, nutante; capsulâ ellipticâ, mucrone parvo; cristâ seminum obsoletâ; foliis caulinis canaliculatis. *Smith Engl. Fl. II. p. 182. Bicheno Trans. Linn. Soc. XII. p. 556. Hook. Scot. 111.* (*L. fol. (planiusculis) linearibus, brevibus, subglabris; spicâ glomerato-racemosâ: glomerulis approximatis, atris; calycibus acutis longitudine capsularum. Desv. Journ. 1. p. 163. Poir. Enc. Suppl. III. p. 535. Decand. Fl. fr. 3. p. 161.* *L. fol. subcanaliculatis; racemo spiculis composito; bracteis omnibus ciliatis; perianthii laciniis lanceolatis, acuminatis, subaequalibus, capsulam ovato-subglobosam obtusiusculam superantibus. Meyer Luzul. n. 15.* *L. fol. nudis; spicâ densâ, nutante, multiflorâ; spiculis intertextis; floribus paucis; perig. foliolis subaequalibus, aristatis, capsulam globosam triquetram submuticam aequantibus. Laharpe l. c. p. 178. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 602. Roth Enum. pl. germ. I. 2. p. 106. Wahlenb. Fl. suec. p. 218. Torrey Fl. north et mid. sect. unit. stat. 1. p. 566.) *Juncus spicatus Linn. Spec. 469. Willd. Spec. II. p. 222. (excl. obs. de J. pediformi Vill.) Linn. Fl. lapp. 125. t. 10. f. 4. (qui J. spicati β Lam. Enc. III. p. 274.) Rostk. Monog. 46. Smith Fl. brit. 386. Engl. Bot. t. 1176. Dicks. Exsicc. Fasc. XV. 11. Fl. Dan. 270. Wahlenb. Lapp. 88. (All. Ped. II. p. 217. n. 2087. Gaud. Agr. helv. II. p. 248. Sturm Deutsch. Fl. Fasc. 28. Host Gram. IV. t. 100.) Hall. Helv. n. 1530. γ (sphalmate β). Juncoides Michel. gen. 42. (a *Poirét* ad *pediformem* ductus). Segu. Veron. 3. 88. β *compacta* Meyer l. c. *J. spicatus* Krock. Siles. n. 559. *Luz. nigricans* Hopp. et Hornsch. Desv. Journ. 1^o p. 158. (sec. Meyer, sed vix). γ *laxa*; spicâ basi interruptâ; bracteis 2-3 majoribus. *L. spicata gracilis***

Hoppe Dec. Gram. Mert. et Koch l. c. L. spic. elongata
Hoppe. Junc. thyrsiflorus Vest (fid. specim. in Herb.
Martius.)

Radix fibrosa, cespitosa. Culmi solitarii, spithamaci (2 - 12 poll.), erecti, teretes (glabri), striati, graciles, foliis 2-3 (raro 4). Folia radicalia plura, cespitosa, breviuscula ($\frac{1}{2}$ -4 poll., $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata) lineari-lanceolata, fere plana (vel subcanaliculata, 5-nervia) pilis aliquot sparsis; caulina erecta, angusta, longe vaginantis; vaginis ($\frac{1}{2}$ -2 poll.) ore barbatis. Panicula pollic. et ultra ($\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$ poll.), bractea unâ alterâve, foliaceâ, obscure fusca, obtusa, multiflora, densa, composita, basi praecipue lobata, interspersis bracteis (ovato-) lanceolatis, acutis, membranaceis, fimbriatis lacerisve, fuscis, longitudine variis. Flores subsessiles, erecti, aggregati. Cal. foliola lanceolata, obscure fusca (margine pallidiora), obsolete acuta (apud nos semper acuminata, interiora paululum breviora), capsulâ quidquam longiora. Capsula obscure fusca, splendens, valvulis margine incrassatis. Sem. elliptica, subsessilia, vestigio lineae lateralis instar cristae. *Smith Engl. Fl.* β plerumque minor, spicâ brevi ovatâ vix lobatâ. γ major et *L. pediformi* affinis; bractea 2-3 saepius spicâ longiores. Ill. *de Vest* distinxit suum *J. thyrsiflorum*: „foliis carinatis, planis, basi pilosis, culmeis subternis vaginâ vix brevioribus: spicâ lobato-paniculatâ, confertâ, nutante; petalis lanceolatis, mucronatis“ in litt. ad *clm. de Martius. Wulfen*, teste *de Vest*, hanc pro *spicata* habuit; differt a *pediformi* calycis foliolis duplo minoribus, spicâ magis compositâ; a *spicata* longitudine foliorum culmi et figurâ laciniarum. In alpebus totius *Europae a Lapponia ad Italiam usque; in Labradoria* (fid. *Herb. Schreb.*); in *Eschschozsbay, Eschschoz.* 4.

Obs. „Planta nostra, ut jam summus *Haller* suspicatus est, a septentrionali Linnaeana utique capsulis obtusissimis, nec, ut perhibet *clm. Smith*, acutis vere differre videtur; nec cum *pediformi Vill.*, neque cum *sudetica*, ut vult amiciss. *Suter*, confundi debet.“ *Gaudin.* Specimina vero nostra lapponica cum alpinis carpathicis, austriacis, bavariis, pedemontanis etc. optime conveniunt; in omnibus capsula obtusiuscula cum mucrone, rarius acutiuscula.

26. *L. pediformis Dec.*; foliis planis; racemo spiculis composito; bracteis omnibus ciliatis; perianthii laciniis oblongo-lanceolatis, exterioribus acuminatis, interioribus brevioribus, obtusis, mucronatis, capsulâ triquetro-ovatâ, acutâ, longe mucronatâ brevioribus. *Meyer Syn. Luz.* p. 469. *L. foliis pilosiusculis; paniculâ spicatâ, nutante; spiculis 10-30-floris, approximatis; perig. foliolis aequalibus, acuminatis, capsulam subturbinatam triquetram aequantibus. Laharpe l. c. p. 176. Decand. Fl. fr. III. p. 16. L. culmo elato; radice fibrosâ; spicâ racemosâ, flexuoso-cernuâ, basi divisâ; petalis majusculis, acutis, capsulâ acuminatâ majoribus; bracteis membranaceis, acutis, fere magnitudine florum. Desv. Journ. Bot. 1. p. 161. Poir. Enc. Suppl. III. p. 534. J. pediformis Vill. Delph. II. p. 838. t. 6. Allion. Auct. p. 37. n. 2087. J. montanus β Lam. Enc. III. p. 273. J. campestris δ Linn. Spec. p. 469. Willd. Spec. II. p. 221. Juncoides montan. nemoros. villos. Mich. gen. p. 42. n. 7.*

„Affinis *spicatae*, sed multo (2-3-plo) major, pallidior; folia latiora, panicula magis laxa. Caps. ovata, in acumen acutum attenuata.“ *Smith Engl. Fl.* II. p. 183. Differt a *L. spicata* magnitudine et inflorescentiâ; radice repente. Culmus erectus e radice rectangulus, 1-1½ ped.. Folia brevia, 1-1½ poll., 2-3 lin. lata, lineari-lanceolata, acuta, nervosa, margine pilis longis albidis densis ciliata; caulina 3-4, erecto-patentia, angustiora. Racemus 1-2 poll. erectiusculus vel nutans, subflexuosus, inferne lobatus; spicis ovatis, obtusis. Bracteae inferiores capitulis longiores, basi membranaceae, superne foliaceae, acutae, angustae; interiores late ovatae, acuminatae, concavae, scariosae, dorso fuscae, margine albido fimbriato pilis albis ciliato. Cal. foliola 2-2½ lin., lanceolata, acuminata, badia, margine pallidiora; interiora pallidiora, breviora, obtusiuscula cum mucrone aristaeformi. Stamina calyce duplo fere breviora; antherae flavae, lineares, lin., filamentis brevissimis multoties longiores. Caps. acuminata, calyce brevior. *In montibus Delphinatus prov. gallicae, Alverniae, in Pyrenaeis, in Sabaudia.* 4.

27. *L. comosa Meyer*; foliis planis; anthelâ foliosâ spiculis superne racemosis compositâ; perianthii laciniis lanceolatis, acuminato-subulatis, interioribus (sub) brevioribus, capsulam triquetro-ellipticam acutiusculam vix aequantibus. *Meyer in Reliqu. Haenk. Fasc. II. p. 145. Syn. Luzul. p. 21. c. ic. ined. Laharpe l. c. p. 178.*

Caules, ut videtur, cespitosi, parum adscendentes, 1½ ped., tenues, angulosi, striati. Folia fere *L. vernalis*, sed paullo flaccidiora, ad caulis basin plurima, solitarium in medio cauli, lineari-lanceolatum, utrinque attenuata, margine, praesertim ad vaginas, pilosa. Spiculae oblongae: infima saepe longissime pedicellata, reliquis in racemum subpyramidalem conglobatis. Bracteae spicularum foliaceae, inferiores foliis caulinis simillimae, reliquae minores, plures tamen conglobatam anthelae partem superantes. Flores in singula spicula 10-20, pallescentes, stipati bracteis floralibus binis, parvis, pellucidis, piloso-laceris. Stamina 6, dimidio perianthio breviora, antheris subsagittatis, mucronulata. Semina apice obtusa, basi parum strophiolata. Nulli propior quam *pediformi Vill.*; ob spiculam infimam longe pedicellatam accedens ad *arcuatam Wahlenb.*, pedunculo licet non arcuato. *Meyer, In Nootka-Sund v. Portu Mulgrave.* 4.

Species non rite cognitae.

28. *L. paniculata Desv.*; foliis latissimis; floribus parvulis; paniculâ ramosâ, elongatâ: glomerulis 3-5-floris. *Desv. Journ. d. Bot. I. p. 147. t. 5. f. 4. Meyer Luz. n. 19.*

Culmi glabri, uti folia lanceolata, acuta. Panicula stricta, angusta, ramis cauli approximatis, floribus pedicellatis subsessilibusque. Calyces et capsulae plus minus fuscae. *Desv. L. glabratae et spadicæe proxima. Secus Laharpe l. c. p. 170. synonymon L. melanocarpæ. In America meridionali.*

29. *L. angustifolia Poir.*; foliis glaberrimis, angustis; corymbo simplici; floribus subtribus, sessilibus, agglomeratis; calycis foliolis obtusis, capsulam vix aequantibus. *Poir. Enc. Suppl. III. p. 530. Meyer Luz. n. 23.*

Affinis *melanocarpae*; sed folia multo angustiora, glaberrima, uti tota planta. Culmi gracillimi, 6-8-poll.. Rami corymbi terminales, valde inaequales, simplices aut apice dichotomi fasciculis 2-3 plerumque 3-floris, longitudinaliter per eosdem dispositis. Bracteae filiformes, pedunculis breviores. Foliola calycina fuscescentia. Stam. 3. *Poir.*. An a *melanocarpa* satis distincta? An hujus generis cum stamina 3? Cls. *Laharpe*, secus *Herb. Desfont.*, *angustifoliam* eandem dicit cum *campestri*; at ex descriptione nimis ab eadem recedit. Idem p. 146. *L. angustifoliam Poir.* cum? ad *J. aristulatum* β (*J. marginatum Rostk.*) citat. In *Carolina. Bosc.* 4.

Quid *Luzula compacta Desf. Cat. h. Par. ed. 2. p. 25?*

1330. N A R T H E C I U M.

1. *N. ossifragum Huds.*; pedunculis basi medioque bracteatis; racemo spicato, continuo; antheris rubris. *Smith Engl. Fl. II. p. 151. Fl. brit. 1. p. 368. Engl. Bot. t. 555. Wahlenb. Fl. suec. p. 203. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 559. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 51. Hook. Lond. t. 139. Svensk Bot. t. 489. N. anthericoides Hoppe Pl. exs. Möhring E. N. C. 1742. p. 389. t. 5. f. 1. ANTHERICUM ossifragum Linn. Spec. 446. (excl. syn. Gmel.) Willd. Spec. II. p. 147. Mill. Dict. n. 9. Lam. Enc. 1. p. 199. Roth Germ. II. p. 392. Fl. Dan. t. 42. Plenck Off. t. 270. ABAMA ossifragum Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 171. Poir. Enc. Suppl. I. p. 1. A. fol. ensiformibus; capsulâ fusi-formi. *Laharpe Mon. Junc. in Mem. d. l. Soc. hist. nat. Par. T. III. p. 181. (excl. syn. N. americani Her.) Redout. Lil. IV. t. 218. Trattin. Tabul. t. 97. Pseudo-Asph. pal. angl. Bauh. Pin. 29. Lob. ic. t. 92. f. 1. Asph. Lancastriae Ger. Em. 95.**

Rad. tuberosa (subarticulata), repens: herba glabra, subrigida. Caulis adscendens, teres, foliosus, 3-8 poll. (et ultra). Folia radicalia cespitosa, bifaria, ensiformia, nervosa, oblique acuta, scapo dimidio breviora (1-1½ lin. lata); caulina multo breviora, sparsa, vaginantia, in bracteas fere desinentia. Racemus spicatus 1½-2 poll.. Pedunculi alterni, simplices, angulati, basi bractea longitudine (fere) pedunculi, minore circa eorundem medium. Flores laete flavi (vel virescentes), patentis, carinâ viridi (nervis 2 lateralibus). Caps. a petalis semitecta. Sem. fusca tunicâ albidâ. *Smith.* Filamenta 3 basi laciniis perigonii, 3 has inter inserta, antheris flavis duplo longiora, tomentosa, albida. Germen pyramidale, triangulare; stylo brevissimo; stigmatibus capitato, subtrilobo. Caps. pyramidalis, sulcis 6 obsoletis, subrostrata, (fulvescens). *Laharpe.* In *Europae totius uliginosis ad Corsicam usque.* 4.

Obs. Antherae apud nos semper flavae, nec miniatae vel rubrae; an ergo nostrum ab anglico diversum? *Brotero Fl. lusit. p. 534. de AntHERICO ossifrago* notat: „variare ferunt floribus luteo-caeruleis, quod forte species distincta.“

2. *N. americanum Gawl.*; racemo interdum interrupte spicato, laxo; bractea alterâ caulina pedicellum amplexante, alterâ inferne pedicellari paleaceo-setacea; lanâ filamentorum

brevissimâ. *Gawl. Bot. Mag.* t. 1505. *Pursh Fl. sept. Am.* 1. p. 227. *Nutt. gen.* 1. p. 220. *Torrey Fl. N. et M. U. St.* 1. p. 347. *N. glutinosum Mich.* apud *Gawl. Bot. Mag.* (nec *Mich.*) PHALANGIUM *ossifragum Mühlenb. Cat.* p. 55. (fid. *Torr.*)

Folia in fasciculo fertili 7-8, brevia, apicem versus in bracteas decrecentia; in sterili pauciora, longiora. Caulis teres, strictus, simplex, glaucescens. Cor. intus pallide flava. Affine *ossifrago*, a quo praecipue diversum, praeter e characteres datos: statura minore, colore herbae magis flavicante, corollâ pallidiore, antheris flavis, nec miniatis. *Gawl.* Rad. repens, fibrosa. Folia numerosa, omnia radicalia, anguste ensiformia, striata, glaberrima, viridi-flavescentia. Scapus adscendens, circiter ped., simplex, teres, bracteis 2-3 remotis, subulatis. Spica 3 poll., recta; pedicellis subinde geminis ternis. Pet. intus flava, extus virentia, persistentia, lineari-oblonga, staminibus paulo longiora. Antherae flavae. Germen oblongum, apice attenuatum; stigmatibus parvo subsessili. Caps. corollâ duplo longior, obtusangula, flavescens, rigida, dehiscens in valvulas 3. Sem. numerosa, longitudine capsulae, utrinque processu subulato. *Torrey*, qui bracteis tantum differre ab *ossifrago*. In palustribus a Quebec ad lacum *Mistassins* et in *New Jersey*. 4.

Obs. Cls. *Laharpe* *N. americanum* fid. specim. in *Herb. Gay* synonymon *N. ossifragi* dicit. Specimen in herb. cli *Steudel* etiam paucis tantum a planta europaea recedit: caulis fere 1½ ped.; folia radicalia in sterili 5 poll., 1 lin. lata, striata, glabra, glauca; racemus non interruptus; lana filamentorum parum tantum brevior; bractea pedicellaris in tertia circiter pedicelli parte.

3. *N.?* *scabrum Raf.*; scapo pedicellisque scabris; foliis ensiformibus, glabris, angustis; spicâ laxâ; floribus ternatis, albis; capsulis globosis longitudine corollae. *Raf. Schmalz Journ. Bot.* 4. p. 273.

Anne potius TOFIELDIA? In *Virginia*. 4.

1331. DASYPOGON.

1. *D. bromeliifolius R. Brown*; caule folioso; calyce extus pilis longis strictis; foliolis interioribus ciliatis. — *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl.* p. 263. [*Ejusd. Remarks to Flinders' Voy.* II. p. 608. t. 8.

Suffrutex 1½ ped., habitu fere *Xerotis*. Caulis simplicissimus, teres, foliosus, pilis strictis, denticulatis, reversis. Folia graminea: radicalia conferta; caulina sparsa, breviora, sessilia: omnia mucronata, glabra, marginibus denticulato-asperis. Capitulum terminale, solitarium, globosum, magnitudine nucis Juglandis; bracteis subulatis, patulis involucreto. Flores sessiles, conferti, paleis lanceolatis basi dilatatis distincti intermistisque angustioribus. Calyx exterior extus pilis longis strictis: unguibus in tubum subovatum leviter cohaerentibus: laminis ovatis, inferne pallidis, superne nigricantibus; interior longitudine exterioris, glaber: unguibus distinctis, approximatis, hyalinis, glabris; laminis ungue paulo latioribus, subellipticis, ciliatis, hyalinis: carinâ nigricante apice pubescente. Stamina perianthio duplo fere longiora: filamenta aequalia, alba, glabra, apice cum apiculo brevi, setaceo, antherifero. Antherae oblongae, pallidae

flavae, incumbentes, infra medium affixae; loculis 2. Germen subovatum, trigonum, glabrum, albicans: ovulis oblongis. Stylus strictus, glaber, albus, inferne obsolete trigonus, superne teres. Utriculus membranaceus, tubo perianthii exterioris incrassato nucamentaceo nitide-fusco, glabrato. Semen subglobosum, integumento simplicissimo, connato. *R. Brown. Ad littora King-George's Sound. h.*

2. *D. glaber Laharpe*; caule basi tantum folioso; calyce crasso, suberoso, extus glabro: foliolis internis integerrimis. *Laharpe in Mem. d. l. Soc. d'Hist. T. III. p. 101. Habitus D. bromelifolii. In nova Hollandia. h. Herb. Mus. Paris.*

1532. K I N G I A.

1. *K. australis R. Brown in Linn. Transact. 1825. Tab. C. et in. Pilos. Mag. et Journ. 1826. May. p. 353.*

Caudex arborescens, erectus, simplicissimus, cylindraceus, 6-8 pedl., crassitie femoris. Folia caudicem terminantia, numerosissima, patula, apicibus arcuato-recurvis, lorea, solida, ancipitia, apice teretiusculo; novella undique pilis appressis, strictis, acutis, lateribus; angulis lateralibus et ventrali retrorsum scabris. Pedunculi numerosi teretes, 8-12 poll., crassitie digiti, vaginis integris brevibus, imbricatis, hinc in foliolum subulatum productis. Capitulum globosum, floridum magnitudine Pruni minoris, fructiferum pomum parvum aequans. Flores undique dense imbricati, tribracteati, sessiles. Bractea exterior lanceolata, breve acuminata, planiuscula, erecta, extus villosa, intus glabra, post lapsum fructus persistens; 2 laterales anguste naviculares, acutissimae, carinam lateribusque villosis, longitudine fere exterioris, simul cum perianthio fructifero, separatim tamen, dilabentibus. Perianthium subaequale; foliola lanceolata, acutissima, disco nervoso nervis immersis simplicissimis: antica et postica plana; lateralia complicata, lateribus inaequalibus; omnia basi subangustata, extus longitudinaliter, sed extra medium praecipue, villosa, intus glaberrima, aestivatione imbricata. Stamina subaequalia. Filamenta ipsis basibus foliorum perianthii, quibus opposita, leviter adhaerentia, filiformia, glabra, teretia. Antherae stantes, ante dehiscentiam lineares, obtusae, defloratae subulatae, vix crassitie filamentum, loculis parallelo-contiguis connectivo dorsali angusto adnatis, longitudinaliter dehiscentibus. Pollen simplex, ovale, laeve. Ovarium sessile, disco nullo squamulisve cinctum, lanceolatum, trigono-anceps, villosum. Stylus trigonus, strictus, infra villosus dimidio superiore glabro, altitudine staminum, exsertus dum illa adhuc inclusa. Stigmata 3, brevissima, acuta, denticuliformia. Pericarpium villosum, basi styli aristatum, abortione monocarpum. Semen turgidum, obovatum, retusum, integumento simplici, membranaceo, aereo-pallido, hinc fere a basi acutiusculam raphi fuscam verticem retusum attingente, ibique in chalazam parvam concolorem ampliata. *R. Br. In littore King Georg III. Sound. h.*

1535. C A L E C T A S I A.

1. *C. cyanea R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 263. Ejusd. Remarks to Flinders' Voy. II. p. 609. t. IX.*

Fruticulus ramosissimus, erectus, cespitosus, 1-1 $\frac{1}{2}$ ped., glaber; caule inferne tereti, foliorum basibus squamoso. Folia e basibus semivaginantibus patula, acerosa, ancipitia, rigida, $\frac{1}{2}$ unc., mucrone brevi, pungente, glabra, ramea patula, ramulorum confertiora. Flores solitarii, sessiles, ramulos ultimos terminantes, basi foliis floralibus minoribus confertissimis, intimis albicantibus. Perianth. tubus angusto-infundibuliformis, subcarnosus, viridistriatus, extus villosiusculus, intus glaber; limbus stellatim patulus: laciniis lanceolatis, brevissime mucronulatis, immerse nervosis, parum concavis, viride-caeruleis, disco extus villosiusculo. Filamenta limbi laciniis opposita, conniventia, curvata, caerulea, glabra. Antherae oblongo-lineares, obtusae, basi emarginatâ, inferne 4-, superne 2-loculares, apice poro duplici dehiscentes. Germen subcylindraceutum, utrinque attenuatum, dilute viride, glabrum, longitudine tubi. Stylus glaber, caeruleus, basi pallidior crassiorque, staminibus paulo longior et cum iisdem curvatus. Stigma acutum. Utriculus tenuis. Semen 1, maturescens elongato-pyriforme, teres, tenuiter striatum, basi caudatâ funiculo capillari affixum. Integumentum apice arcâ fuscâ. *R. Brown.*
In collibus sterilibus ad King George's Sound. h.

1334. M I E R S I A.

1. *M. chilensis* Lindl. *Bot. Reg.* ad 992. et in *Miers's trav.* II. p. 529. *Annal. Sc. nat.* T. IX.

Bulbus sphaericus, tunicatus, nucis castaneae magnitudine. Folia linearia, erecta, obtusa, glabra. Scapi nudi, spithamaei, foliis longiores. Umbella 4-flora, abbreviata. Spatha (?) diphylla, erecta, subventricosa, persistens. Flores virides, inconspicui. Bractee exteriores in phalangibus 2: inferiore superioreque: in utraque tres, ovatae, acuminatae, intermediâ interiore. Bractee depauperatae coccineae, bipartitae, superioribus? perfectioribus, sub perianthio insertae, sec. schedas D. *Miers* bracteis exterioribus alternas. Perianthium leviter obliquum, striis 6 purpurascens. *Lindl. ll. cc.* *In Chili. 4.*

1335. L O P H I O L A.

1. *L. aurea* Gawl. *Bot. Mag.* 1596. *CONOSTYLIS americana* Pursh *Fl. sept. Am.* 1. p. 224. *Nutt. gen.* 1. p. 217. *Elliott Sketch.* p. 403. *Torrey Fl. N. M. U. St.* 1. p. 643. *ARGOLASIA aurea* Pursh *Catal.* *HELONIAS tomentosa* *Mühlb. Catal.*

Rad. fibrosa, repens. Folia radicalia (2-4) scapo breviora, equitantia, angusto-ensiformia, acuta, glabra, laevigata, glaucescentia (in cauli 4-6 poll., pilis raris adpersa, striatula, firmula, 2 lin. lata, basi rubescentia. *Gawl.*). Scapus erectus, teres, lanato-tomentosus, folio uno alterove brevi instructus (1 $\frac{1}{2}$ ped., crassitie pennae corvi. *G.*). Corymbus dense multiflorus, lanato-tomentosus (ramuli erecto-patentes; pedunculi subsecundi. Bracteola sphacelata ad divisuras. *G.*). Flores extus albo-lanati, intus flavi, inodori. Pedicelli longitudine florum. Cor. 6-fida (parva), aureo-flava: laciniis oblongis, acutis, 3 interioribus vix angustioribus, superne glabris, fusco-luteis, inferne densissime lanatis: pilis plumosis, aureis. Filamenta filiformia, glabra, corollâ vix

breviora. Antherae ovatae, erectae, aurantiacae. Germen subrotundum, glabrum. Stylus subulatus. *Pursh.* Stylus longitudine staminum. Caps. ovata, obtuse triangularis, corollâ basi adhaerente tecta, acuminata. Sem. 10-15 in singulo loculo, oblonga, alba, longitudinaliter striata. *Torrey.* Affinis LACHNANTHI *Elliott.* In uliginosis pinetorum Novae Caesariae et Carolinae. 4.

1336. ANIGOSANTHOS.

1. *A. rufa* *Labill.*; caule longitudinaliter tomento persistente tecto; antheris apice muticis. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 301.* A. fol. linearibus, striatis; floribus paniculato-corymbosis; pilis rufis. *Labill. Voy. 1. p. 411. t. 22. Nov. Holl. II. p. 119.* *Redouté Lil. p. 76.* SCHWAEGRICHENIA *rufa* *Spreng. S. V. II. p. 26. Pug. II. p. 59.*

Caules pedales et ultra, teretiusculi, vix ramosi, superne praecipue tomentosi. Folia acuta, angusta. Cor. tubulosa, basi germini adhaerens; tubo recurvo, extus hirsuto pilis rufis, ramosis; limbi laciniis lanceolatis, inaequalibus, recurvis: inferioribus profundioribus. Filamenta superiora longiora. Stylus corollâ longior, fere trigonus. Caps. globosa, rufo-tomentosa, seminibus numerosis, angulatis. *Labill.* In novae Hollandiae ora meridionali.

2. *A. flavida* *Red.*; caule foliisque glaberrimis; ramorum tomento deciduo; antheris apiculo reflexo. *R. Brown Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 301.* A. fol. ensiformibus; caule subglabro; corymbo laxo, tomento ochroleuco. *Redout. Lil. 176. Bot. Mag. 1151. Trattin. Tabul. 241.* *A. flavescens* *Dec. ind. monsp. 6.* *A. grandiflora* *Salisb. Parad. 97.* ANIGOSIA *flavida* *Salisb. Ms.* SCHWAEGRICHENIA *flavida* *Spreng. S. V. II. p. 26. Pug. II. p. 58.*

„Rhizoma crassum, basi fibris subsimplicibus. Folia plura, erecta vel quidquam arcuata, ensiformia, acuta, 15-19 poll., 9 lin. lata. Caulis foliis aliquot brevibus, acutis, amplexantibus, concavis, erectus, 23-26 poll., teres, apice tomentosus, bis vel ter divisus in ramos 2 divergentes; ramuli ultimi 3-4-flori. Folia caulina infima glabra, superiora extus lanata. Bractee sub floribus lineares, fuscescentes, scariosae, extus tomentosae, pedicellis propriis longiores. Perigonium 18-22 lin., extus pilis densis flavescens, praesertim basi; lacinae breves, erectae, inaequales, acutae, crassiusculae, intus glabrae, albidae et membranâ petaloideâ obductae. Filamenta brevissima, inaequalia, compressa. Antherae ovato-oblongae, flavescens. Germen subglobosum, ad $\frac{2}{3}$ perigonio adhaerens. Stylus longitudine perigonii; stigmatibus crasso. Differt ab *A. rufa*: foliis omnino ensiformibus, 4-plo latioribus; caule apice tantum tomentoso; tomento flavido, nec rufo; corymbo laxiori; ramis magis divergentibus; floribus rarioribus, $\frac{1}{3}$ longioribus.“ *Redouté.* Flores in *Redouté* minores, quam in *Bot. Mag.*, ubi „caulis 3-4-ped., fusco-purpureus, basi nudus, ramis subcorymbose fastigiatis, divaricatis. Folia caule breviora, pollicem fere lata, acuminata. Bractee lineari-lanceolatae, acuminatae, ramis paniculae breviores, fus-

cescentes. Ramuli superne et pedicelli $1\frac{1}{2}$ poll. rufo pubescentes. Cor. $1\frac{1}{2}$ poll., tubo superne dilatato, viridi, rufo pubescente, basi ventricosâ, flavidâ; laciniis extus viridibus, pubescentibus, intus sordide violaceis, acuminatis, patentibus. Filamenta viridia, antheris aurantiacis. Stylus triquetro-capillaris. Caps. ovato-oblonga, corollâ persistente coronata." *In novae Hollandiae ora meridionali.* 4.

1337. B A R B A C E N I A.

1. *B. exscapa Mart.*; foliis lanceolatis, recurvatis, subulato-acuminatis, ciliato-serratis; floribus exscapis, pubescentibus; filamentis latissimis, bipartitis. *Mart. et Zucc. nov. gen. et spec. I. p. 21. t. 14. f. 2.*

Radix fibrosa, perennis, descendens. Caudex subnullus s. brevissimus, foliorum basibus laceratis tectus. Folia cartilagineo-serrulata, serraturis pilis albis ciliatis, subtus carinata, carinâ apicem versus serrulata, ceterum glabra, striatula, dura, juniora glaucescentia, 2 poll., medio 4-6-lin. lata, saepe complicata. Flores terminales inter folia 2-3 erecta, navicularia, subvaginantia, in carina evidentius serrulato-ciliata, vix poll., provenientes, subsessiles, solitarii. Perianthii flavi tubus cylindricus, pubescens, vix poll.; lacinae erecto-patentes, obovatae vel obovato-lanceolatae, acutae, integerrimae, extus ad nervum medium pubescentes, intus glabrae. Filamenta infra basin laciniarum inserta, compresso-plana, tenera, ad basin usque bipartita; laciniis linearibus, acutis, acute serrulatis, utrinque glandulis discoloribus punctatis. Antherae flavae longitudine filamenti. Germen breve, oblongo-cylindricum. Stylus erectus, trigonus, glaber, longitudine staminum. Stigma incrassatum, oblongo-trigonum, trisulcatum, apice tripartibile. Caps? *Mart. et Zucc.* *In summo cacumine montis Itambé da Villa do Principe, districtus adamantum Brasiliae.*

2. *B. tricolor Mart.*; foliis linearibus, acuminatis, hirsutis; scapo foliis brevioris; perianthii tubo cylindrico, glanduloso-pubescente, germine (duplo) longiore: laciniis glabriusculis; filamentorum antheras aequantium cruribus brevissimis. *Mart. et Zuccar. nov. gen. et spec. T. I. p. 18. t. 10.*

Caudex brevis, vix poll., subsimplex vel imâ basi divisus, adscendens, basibus foliorum dense vestitus (ut in omnibus), digitum fere crassus, fuscus, aridus, radículas fibrosas hinc inde emittens. Folia terminalia, pauciora quam in plurimis speciebus, 5-6, angusto-linearibus, integerrima, subearinata, pilis glandulosis ferrugineo-hirsuta, rigidiuscula, 3-6 poll., $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata. Scapus erectus, 2-3 poll., solitarius, obsolete trigonus, glanduloso-hirsutus. Perianthii tubus elongatus, $1\frac{1}{2}$ poll., cylindricus, apicem versus parum dilatatus, basi viridis, sursum coccineus; limbi lacinae lanceolatae, basin versus attenuatae, glabrae, vel 3 exteriores pubescentes, patentés, tubo breviores, flavescenti-miniatæ, 8-9 lin., $1\frac{1}{2}$ -2 lin. latae. Filamenta imo limbo adnata, compresso-plana, basi dilatata, nervo medio percursa, apice brevissime bifida in dentes lanceolatos, acutos, glabra, flava, coccineo-marginata. Antherae violaceae, polline flavo. Germen oblongum, tubo duplo brevius. Stylus erectus filiformis, glaber,

obsolete trigonus, stamina aequans. Stigma trigono-capitatum, glabrum. Capsula? *Mart. et Zuccar.* In montosis ferrugineosis micaceis Provinciae Minas Geraës Brasiliae. 4.

3. *B. tomentosa Mart.*; foliis lineari-lanceolatis, acutis, tomentoso-incanis, scapo longioribus; perianthii pubescentis tubo cylindrico, germine triplo longiore: laciniis erectis; filamentis brevissimis. *Mart. et Zuccar. nov. gen. et spec. T. I. p. 18. t. 11.*

Radix perennis, fibris flexuosis, villosis, cinereis. Caudex erectus, simplex vel ramosus, foliorum basibus dense vestitus, $\frac{1}{2}$ -1 ped., crassitie circiter digiti minimi. Folia terminalia, spiraliter disposita, subrosulata, basi amplexicauli longitudinaliter striata, adpressa, inde patentia, rigidiuscula, subpungentia, utrinque tenuissime plicato-striata, tomento molli canescente, ad medium usque pilis longis ciliata, 3-6 poll., 2-3 lin. lata. Scapus $1\frac{1}{2}$ -2 poll., erectus, tenuis, subtrigonus, villosus, incanus. Perianthium longe tubulosum, coccineum; tubo recto, tenuiter striato, 12-14 lin. longo; limbo erecto, patente: laciniis ovato-lanceolatis, acutiusculis, integerrimis, 5-6 lin., $1\frac{1}{2}$ lin. latis. Filamenta imo limbo inserta, plana, glabra, apice bifida: laciniis lanceolatis, acutis, antheris breviora. Germen tubo triplo circiter brevius, ovatum, vertice planiusculum. Styl. erectus, filiformis, glaber, perianthium aequans. Stigm. capitato-trigonum. Caps.? *Mart. et Zuccar.* In rupibus inter Villam St. Joam del Rey et Villam Riccam, in districtu adamantum Provinciae Minas Geraës Brasiliae. 4.

4. *B. luzulaefolia de Martius*; foliis lineari-lanceolatis, acuminatis, glabris, dense ciliatis; scapo foliis breviori corollaeque tubo germine triplo longiori ferrugineo-hirsutis; filamentis antheras aequantibus. *De Martius Fl. brasil. ined.*

Radix fibris fuscis. Caudex erectus, subsimplex, $1\frac{1}{2}$ -5 poll., crassitie fere digiti minimi. Folia basi amplexicauli adpressa, inde patentia et subreflexa, rigidiuscula, striata, subcarinata, pilis longis fuscis apice rarioribus ciliata, $1\frac{1}{2}$ -4 poll., $1\frac{1}{2}$ -4 lin. lata. Scapi 1-2, erecti, teretiusculi, pilis longis, densis, eglandulosis fusco-hirsuti, 1- $1\frac{1}{2}$ poll., crassitie fili emporetici. Perianthium coccineum; tubus cylindricus, 13-14 lin., 2 lin. in diametro; limbi lacinae lineari-lanceolatae, acutae, tenuiter striatae, 6-7 lin., $1-1\frac{1}{2}$ lin. latae; exteriores extus ferrugineo-hirsutae, interiores glabrae. Filamenta 3-4 lin.; laciniis 2 lanceolatis, acutis, $\frac{1}{2}$ lin. longis. Antherae dorso paulo supra basin affixae, obtusae, violaceae, 3-4 lin.. Stylus glaber, filiformis, stamina superans, perianthium aequans. Stigma trigono-capitatum. *In rupibus ad aurifodinas Villa Ricca Brasiliae. De Martius. 4.*

5. *B. ignea de Martius*; foliis lineari-lanceolatis, subulato-acuminatis, utrinque hispidis; scapo folia aequante vel superante perianthiique tubo abbreviato glanduloso-hirsutis; laciniis erectis; antheris filamenta duplo superantibus. *Martius Fl. brasil. ined.*

Radix fibris cinereis, villosis. Caudex 1-2 poll., subsimplex, crassitie digiti. Folia interiora erecta, exteriora erecto-patentia, basi subamplexicauli striata adpressa, rigida, acumine triquetro

subpungente, carinata, utrinque et ad margines pilis longis patentibus, 3-5 poll., 2-3 $\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapi 1-2, erecti, obsolete triquetri, inferne pallide virentes, superne flavescentes, pilis densis, brevibus, patentibus, glandulosis, 5-6 poll.. Perianthii tubus glandulis pedicellatis subclavatis, igneo-ruber, 6-8 poll., 2-3 lin. in diametro; laciniis oblongo-linearibus, obtusis cum mucronulo, 5-6 lin., 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. latis: exterioribus igneo-rubris, glandulis pedicellatis; interioribus igneo-flavis, glabris. Filamenta 3 $\frac{1}{2}$ lin.: laciniis lanceolatis, acutis, $\frac{3}{4}$ lin.. Antherae flavae, 6 lin., $\frac{1}{2}$ lin. latae, perianthium subaequantes. Stylus vix dimidium limbum superans, obsolete trigonus. Stigma obsolete trigonum. *In alpestribus prov. Minas Geraës Brasiliae.*
De Martius. 4.

6. *B. flava de Martius*; foliis lineari-lanceolatis, subulato-acuminatis, glabris, ciliatis; scapo folia subaequante vel superante perianthiique tubo abbreviato glanduloso-viscosis; laciniis erectis; antheris filamenta superantibus. *Martius Fl. brasil. ined.*

Caudex erectus, subsimplex, crassitie digiti. Folia erecta et erecto-patentia, acumine triquetro, basi subamplexicauli appressâ pallidiora margineque membranacea, striata, ciliis longis, serraturas terminantibus; carinis basi glabris, apice ciliatis; 5-8 poll., 4-6 lin. lata. Scapi 1-3, stricti, obsolete angulati, inferne virides, superne flavo-virentes, glandulis pedicellatis viscoso-scabri, 5-8 poll., crassitie pennae corvi. Perianthium flavum; tubus 8 lin., 2 lin. in diam.; glandulis pedicellatis densis, parte liberâ brevior illâ, quae germini adnata; laciniis oblongo-lanceolatis, acutiusculis, 5-6 lin., 2 lin. latis: exterioribus crassioribus, extus glanduloso-verrucosis, interioribus tenuioribus, glabris, vel basi glandulis parvis. Filamenta antheris $\frac{1}{3}$ breviora, 2 $\frac{1}{2}$ lin.; laciniis lanceolatis, acutis, $\frac{1}{2}$ lin.. Antherae flavae, 4-5 lin.. Stylus vix dimidium limbi attingens, trigonus. Stigma oblongo-triquetrum. Simillima *B. igneae*; sed fol. glabris, margine carinaeque tantum ciliatis, corollâ flavâ, antherisque brevioribus abunde diversa. *In declivibus summi montis Itambe Brasiliae, altitudine 6000 ped.. De Martius. 4.*

7. *B. coccinea de Martius*; foliis lineari-lanceolatis, subulato-acuminatis, utrinque hispidis; scapo folia aequante perianthiique tubo germine duplo longiore glanduloso-hirtis; laciniis erecto-patentibus; antheris filamenta paulo superantibus. *Martius Fl. brasil. ined.*

Caudex erectus, crassitie pollicis. Folia erecto-patentia, et patentia, basi appressâ subamplexicauli margine membranaceâ, acumine subulato-triquetro, striata, utrinque glaucescenti-viridia, ad margines carinamque pilis longis, subulatis, rigidiusculis; 6-8 poll., 3-3 $\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapi 2-3 medio curvati, teretiusculi, glandulis breviter pedicellatis viscoso-scabri, 7 poll.. Perianthii tubus glandulis densissimis, subsessilibus, pulchre coccineus, fere poll., 3 lin. in diametro; laciniis lanceolatis, obtusiusculis, 8-9 lin., 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. latis: exterioribus glanduloso-viscosis, pulchre coccineis, interioribus glabris miniatis. Filamenta 4-4 $\frac{1}{2}$ lin.; laciniis lanceolatis, longe acuminatis, 1 $\frac{1}{2}$ lin.. Antherae 5 lin., perianthio breviores, flavae. Stylus tubum 1 $\frac{1}{2}$ lin. superans, trigonus. Si-

millima *B. igneae*, sed diversa flor. longioribus coccineis; antheris brevioribus; foliis magis glaucescentibus. *In alpestribus prov. Minas Geraës Brasiliae cum B. ignea. De Martius. 4.*

8. *B. longiflora Mart.*; foliis lineari-lanceolatis, acuminatis, basi ciliatis; scapo foliis brevioris perianthiique tubo germine quadruplo longiore glanduloso-hirtis; antheris filamenta duplo superantibus. *Mart. et Zucc. nov. gen. et spec. T. I. p. 19. t. 12.*

Radix fibrosa, perennis. Caudex 2-4-poll., simplex, basibus foliorum resinâ conglutinatis tectus, apice floriger. Folia terminalia, erecto-patentia, subensiformia, integerrima, basi subamplexicaulia, rigida, glabra, 6-poll., 3½-4 lin. lata. Scapus terminalis, obsolete trigonus, basi glaber, apice glanduloso-pubescens, 4 poll. Perianthium longe tubulosum, basi viride, deinde flavum; tubo cylindrico, recto, vel parum incurvo, 2 poll., glandulis pedicellatis; laciniis erecto-patentibus, lanceolatis, acutis, intus glabris, 9 lin., 1½-2 lin. latis. Filamenta plana, glabra (flava), laciniis linearibus, acutis, divergentibus, ⅓ filamenti superantibus. Styl. perianthium parum excedens, staminibus longior, filiformis, glaber, uti stigma incrassatum, ovato-trigonum trisulcatum, roseo-miniatus. *Mart. et Zucc. In graminosis rupestribus prope Tejuco in districtu adamantum Brasiliae. 4.*

9. *B. ensifolia de Martius*; foliis ensiformibus, subulato-acuminatis, glabris, ciliatis serrulatisque; scapo foliis longiore, apice glandulis sessilibus verrucoso; tubo germine triplo longiore, glanduloso-viscoso; antheris stamina aequantibus. *Martius Fl. brasil. ined.*

Caudex erectus, brevis, crassitie digiti. Folia stricta patentiaque, basi subamplexicauli appressa, acumine triquetro, striata, pilis longis ciliata serrulataque, carinis basi laevibus, apice obsolete serrulatis, glaucescenti-viridia, 5-6½ poll., 3-4 lin. lata. Scapi 1-2, stricti, obsolete triquetri, supra medium glandulis densis sessilibus, 5-7 poll. Perianth. coccineum; tubus glandulis sessilibus, 1½-2 fere poll., 2½ lin. in diam.; laciniis oblongo-linearibus, acutiusculis: exterioribus glanduloso-scabris; interioribus glabris, 6 lin., 1½-2 lin. latis. Filamenta 3 lin., basi lin. fere lata; laciniis lanceolatis, acutis, ⅓ filamenti aequantibus. Antherae flavae, 2½-3 lin., limbo duplo fere breviores. Stylus perianthium aequans, subtrigonus. *In editis montis da Lape prov. Minas Geraes Brasiliae. de Martius. 4.*

10. *B. rubrovirens Mart.*; foliis linearibus, subulato-acuminatis; scapo folia aequante, apice aequae ac perianthium longissimum tomentoso-hirto; limbi laciniis reflexis dependentibus; germine tubo brevioris; antheris filamenta duplo superantibus. *Mart. et Zucc. nov. gen. et spec. T. I. p. 20. t. 14. 1.*

Radix perennis fibrosa. Caudex erectus, 1-2 ped., crassitie pugni, simplex vel ramo uno alterove, foliorum basibus resinoso-conglutinatis tectus. Folia in apice caudicis ramorumque subspiraliter congesta, numerosa, erecto-patentia, subcarinata, acumine longissimo, subulato, subtriquetro, serrulato, integerrima, gla-

bra, basi ciliata, tenuissime striata, 12-15. poll., medio 4-6 poll. lata. Scapi terminales e medio fasciculi foliorum, 1-4, erecti, teretiusculi, basi glabri, sursum pilis densis e basi glandulosa subulatis. Perianthium coriaceum, 3-poll.; tubo $2\frac{1}{2}$ fere poll. sursum ampliato, pilis densioribus quam in scapo, viridibus vel rubentibus; laciniis longissimis, linearibus, acutiusculis, basi erecto-patentibus, superne reflexis, extus hirtis, intus glabris et pallide rubro-virentibus, 9-12 lin., $2\frac{1}{2}$ lin. latis. Filamenta limbi laciniarum basibus adnata, tubo exserta, compresso-plana, dentibus erecto-patentibus, $\frac{1}{5}$ filamenti aequantibus. Antherae longissimae, pallide flavae. Germen oblongum, apice parum constrictum. Stylus erectus, subtrigonus, glaber, filamentis parum longior. Stigma incrassatum, oblongum, subtrigonum, trisulcatum, acutiusculum. Caps.? *Mart. et Zuccar.* In altis petrosis Provinciae Minas Geraës Brasiliae. 4.

11. *B. bicolor Mart.*; foliis linearibus, acuminatis, ciliato-serrulatis; scapo folia aequante, apice glanduloso-hirto; perianthio, praeter lacinias limbi interiores, glandulis clavatis glutinosis dense vestito; tubo germinis longitudine; antheris stamina aequantibus. *Mart. et Zuccar. nov. gen. et spec. T. I. p. 19. t. 13.*

Radix perennis, fibrosa. Caudex erectus, 2-3 ped., crassitie pugni, foliorum basibus aridis resinoso-conglutinatis. Folia in apice caudicis ramorumque subspiraliter congesta, numerosa, erecto-patentia, subtus carinata, earinâ apicem versus serrulata, ceterum glabra, striata; juniora glaucescentia, ped., medio 6 lin. lata, basi latiora. Scapi terminales inter folia provenientes, teretiusculi, basi glabri, apice glandulis pedicellatis, clavatis, viridibus, mucum sudantibus. Perianthium coriaceum; tubo cylindraco-oblongo, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., viridi, laciniisque exterioribus glandulis crassioribus, capitatis densius vestito; limbi laciniis erectis, ovato-oblongis, acutis, 9-12 lin.: interioribus aequae ac exteriorum paginâ interiore flavis. Filam. compressa, crassiuscula; dentibus linearibus, acutis, erectis, $\frac{1}{3}$ totius filamenti aequantibus. Antherae lineares, flavae, polline elliptico. Germen oblongum. Stylus rectus, subtrigonus, stamina parum excedens. Stigma incrassatum, oblongum, trigonum, trisulcatum, apice tripartibile. *Mart. et Zuccar.* In alpestribus petrosis graminosis plus quam 3000 ped. alt. in districtu adamantum Brasiliae.

12. *B. glauca de Martius*; foliis lineari-lanceolatis, acuminatis, glabris, ciliatis, utrinque glaucis; scapo folia superante, apice glanduloso-hirto; perianthio (praeter limbi lacinias interiores) glandulis capitatis, glutinosis vestito; tubo clavato; fauce subcampanulatâ; antheris filamenta superantibus. *Martius Fl. brasil. ined.*

Caudex 1- $1\frac{1}{2}$ ped., erectus. Folia erecta et erecto-patentia, acumine subulato triquetro, basi subamplexicauli, margine quidquam membranaceâ appressa, striata, carinata et subcomplicata, margine et ad carinam pilis longis fusciscentibus, 1- $1\frac{1}{2}$ ped., medio 6-8 lin. lata. Scapi plures, trigoni, erecti, apice crassiores,

siores, basi glaberrimi, medio pilis fuscis, glandulâ parvâ terminatis, apice glandulis virescentibus capitatis viscosi. Perianth. tubus clavatus, virescens, glandulis densis crassis, 12-14 lin., in faucem subcampanulatam 6 lin. ampliatus; lacinae patentes vel subrecurvae, ovato-oblongae, obtusiusculae, flavae: exteriores dense glandulosae 7 lin., 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. latae; interiores glabrae, 3 lin. latae. Filamenta 5 lin.; laciniis lanceolatis, acutis. Antherae 6 lin., flavae. Stylus trigonus, stamina paulo excedens. Stigma trigonum, oblongum. Simillima *B. bicolori*: sed diversa fol. utrinque glaucis, ciliatis, nec serrulatis; tubo clavato, fauce campanulatâ; antheris longioribus. In summo monte Itambe Brasiliae. 4.

13. *B.?* *brasiliensis Willd.*; perianthii laciniis ovatis, obtusis. *Willd. Spec. Pl. II. p. 227.* BARBACENIA *Vandelli* in *Römer script. hisp. etc. p. 98. t. 6. f. 9.*
In Brasilia. *Vellozo.*

Obs. BARBACENIA haec, quam *Stuedel* VISKEAM secus *Sprengel* dicit, licet omnibus partibus BARBACENIAE similis, differt tamen eo, quod adsit calyx, ut ex caractere generico auctoris patet: „Perianth. 6-fidum, monophyllum, ventricosum, maximum, persistens, 6-7-dentatum, totum adpersum glandulis pedunculatis, humorem viscosum ejicientibus. Petala 6, ovata, obtusa, patentia, aequalia. Filam. 6 petaliformia, apicibus dentata. Anth. filamentis lateraliter adhaerentes, didymae, longitudine filamentorum, acuminatae, erectae. Germ. obovatum. Styl. cylindraceus, staminibus longior. Stigma crassiusculum, ovato-acuminatum, lineâ longitudinali exaratum. Caps. oblonga, pedunculata, coronata, glandulosa, 3-valvis. Sem. plurima; parva, subrotunda.“

1338. XEROPHYTA.

1. *X. pinifolia Lam.*; ramis glabris; foliis acerosis, acutis, integris, basi fasciculo pilorum; pedunculis terminalibus, 1-3-floris, glabris, teretibus, folio longioribus. (Diagn. ex *Descr. in Poir.*) *X.* fol. linearibus, rigidis, pungentibus; flor. terminalibus. *Poir. Enc. meth. VIII. p. 804.* *Willd. Spec. II. p. 15.* *X. madagascariensis Raeuschel.*

Frutex parvus, squamis striatis vaginantibus ramos obtegentibus. Rami alterni, teretes, molles, fere suberosi, vaginis reflexis, brevibus, rigidis, persistentibus a lapsu foliorum. Folia sparsa, sessilia, valde approximata, in apice ramorum fasciculata, linearia, 2 poll. et ultra, 1-2 lin. lata, utrinque glabra, rigida, integerrima, saepe basi fasciculo pilorum. Flores in ramis terminales in pedunculis folia superantibus, glabris, teretibus, simplicibus, solitarii vel 2-3 alterni pedicellati. Cor. tubus brevis; limbus patens: laciniis regularibus lanceolatis, acutis, exterioribus angustioribus, acuminatis. Filam. erecta, corollâ breviora. Antherae erectae, parvae, ovatae, obtusae. Germen ovato-oblongum, pilis brevibus hispidum. Stylus erectus, staminibus vix longior. Stigma elongatum, erectum, clavatum. Caps. hispidula, ovata. *Poir.* ad specim. in *Herb. Juss.*
In Madagascar. *Commerçon. 4.*

2. *X. neglecta*; ramis glabris; foliis e basi ovata vaginante pilorum fasciculo vestitâ acerosis, acutis, pungentibus, carinato-triquetris, aculeolato-serrulatis; pedunculis terminalibus, 1-floris, glanduloso-muricatis, folio brevioribus.
Caudex erectus vel inferne adscendens, basibus foliorum persi-

stentibus imbricatis, vaginantibus, truncatis, glabris, striatis, cinerascens, inferne fuscis nitentibus tectus, 4 poll., crassitie pennae anatinae. Rami alterni, erecti, simplices, poll. et paulo ultra, caudici similes, vaginis similibus, sed apice revolutis, laceris (a foliorum lapsu) tecti. Folia sessilia, approximata, aceroso-lineararia, profunde carinata et inde subtriquetra, subtus sulcato-striata, rigida, acumine pungente; interiora erecta, serius reflexa, viridi-fuscescentia, nitentia, glabra, margine, praesertim apicem versus, aculeolis appressis, antrosum spectantibus; imâ basi margine pilis subfasciculatis longis setaceis, albidis: 10-15 lin., basi paulo ultra lin. lata. Pedunculi in apicibus ramorum vel e summis axillis solitarii, uniflori, reflexi (an semper?), angulosi, glandulis brevibus apice subcapitatis, patentibus muricati, 4-5 lin.. Flores nimis incompleti, quam ut aliquid certi inde dicendum. Germen dense glanduloso-muricatum. Ad specimen in Herb. cli de Martius a cel. *Adr. d. Jussieu* communicatum. *In Isle de France.*
Commerçon. h.

Obs. Cum *Poirot* descripsisset specimen ex *Herb. Juss.*, cl. *Martius* verò suum specimen supra descriptum ex eodem herbario tulisset, et in eodem ergo herbario latitare species distinctae videntur eo magis, cum adumbratio XEROPHYTAE a *Commerçon* lectae in *Juss. gen. plant.* p. 57. in utramque quadret. Differentia inter utramque speciem cuivis ex descriptione et diagnosi obvia.

3. *X. abietina* *Spreng.*; caudice erecto; ramis subfastigiatis, pubescentibus; foliis e basi ovata amplexicauli villosa acerosis, acutis, pungentibus, carinato-subtrigonis, ciliatis; floribus terminalibus vel in ramorum innovatione sessilibus. *de Martius et Zuccarini nov. gen. et spec.* T. I. p. 14. t. 6. (sub *VELLOSIA abietina*). *Spreng. Cur. post.* p. 137.

Radix fibrosa, spadiceo-fusca. Caudex perennis, jam a basi ramosus, teretiusculus, basibus foliorum imbricatis acutiusculis apice pilis albidis villosis duriusculis tectus, sursum incrassatus, 6-8 poll., vix crassitie pennae anserinae; rami similes, erecto-patentes, simplices. Folia aceroso-lineararia, sessilia, supra concava glabra, subtus convexa sulcata, margine pilis raris, longiusculis, albidis, rigida, pungentia, erecta, (6-9 lin., $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lin. lata.). Flores solitarii, erecti. Perianthium petalis geminis dentibus insertis, patentibus, obovato-oblongis, basi attenuatis, integerrimis, violaceis, (5-6 lin., 2 lin. latis.) Filamenta petalorum basi inserta, simplicia, erecta, teretia, glabra, basi squamulâ cordato-quinquelobâ, deflexâ. Antherae longitudine filamentorum, petalorum dimidium subaequantes, lineares, erectae, biloculares; polline flavo, globoso. Germen obconico-subtrigonum, glabrum, nitidum, plerumque lineis 6 elevatis, vertice concavum. Stylus e centro, erectus, subulatus, subtrigonus, glaber, petala subaequans. Stigma peltato-trilobum. Caps. vertice dehiscens, obconica, $2\frac{1}{2}$ lin., valvulis medio septiferis; placentâ dissepimento affixâ, seminibus plurimis, e quibus 2-3 forsan maturescunt. XEROPHYTA *Commerçon.* huic affinis; attamen floribus pedunculatis, (foliorum longitudine, gemmine muricato), distincta. *Mart. et Zuccar.* *In Brasiliae summis alpestribus montis Itambé do Matto et in districta adamantum.* 4.

4. *X. tragacantha* *Martius*; caudice erecto; ramis sub-

fastigiatis, glabris; foliis e basi ovata amplexicauli glabra acicularibus, obtusis, teretiusculis, marginibus involutis serrulatis; floribus terminalibus vel in ramorum innovatione subsessilibus.
de Martius Fl. brasil. ined.

Radix fibris pallide fuscis. Caudex 4-6-poll., crassitie pennae anserinae, foliorum basibus striatis, glaberrimis, fuscis, nitentibus; rami 3-4 simul erumpentes. Folia multifaria, rigida, basi nitida, badiâ amplexicentia, apice subtruncata, glaberrima, spinuloso-serrulata, 5-7 lin.. Flores subsessiles, vel pedicello brevissimo trigono intra folia abscondito, solitarii, erecti, folia vix superantes. Petala erecto-patentia, obovato-oblonga, obtusa cum acumine minuto, violacea, $3\frac{1}{2}$ lin., $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Filamenta $\frac{1}{2}$ lin.. Antherae filamentis duplo longiores, petalis dimidio breviores, 1 lin., luteae. Stylus stamina superans, trigonus. Stigma trigono-capitatum. Capsula obovato-obconica, truncata, apice concava, glaberrima, nitida, pallide fusca, 2 lin.. Simillima *abietinae*, sed differt: ramis glabris; fol. angustioribus strictioribus, intensius viridibus, margine spinuloso-serratis nec ciliatis, basi nitidis, glabris; floribus paulo minoribus; filamentis brevioribus. *In Villa da Rio das Contas Brasiliae.* 4.

5. *X. taxifolia Martius*; caudice erecto; ramis fastigiatis, glabris; foliis linearibus, carinatis, truncatis, emarginatis, glabris, marginibus carinâque serrulatis; floribus terminalibus, subsessilibus. *De Martius Fl. brasil. ined.*

Radix fibris fuscis. Caudex 6-7 poll., foliorum basibus truncatis glabris albidis tectus; rami dichotomi vel plures ex eodem puncto. Folia in apicibus ramorum imbricata, stricta, sessilia, supra sulco profundo, sulcato-striata, minutissime denticulato-serrulata, pallide viridia, $\frac{1}{2}$ -1 fere poll., lin. lata, basi amplexicaulia. Flores folia vix superantes, petiolo brevissimo trigono glabriusculo, intra folia abscondito. Petala basi tubum mentientia, apice patentia, obovato-oblonga, obtusa, integerrima, violacea, $3\frac{1}{2}$ lin., lin. lata. Filamenta erecta, lin.. Antherae flavae, filamenta aequantes, lin. longae. Stylus trigonus, antheras superans, petalis paulo brevior. Stigma capitatum, trigono-lobatum. Caps. obconica, subtrigona, denticulis 6 coronata, fuscescens, nitida, sub lente verruculosa, 3 fere lin.. *In Brasilia. De Martius.* 5.

6. *X. plicata Spreng.*; caudice erecto, ramoso; foliis lineari-lanceolatis, acutis, utrinque plicatis, margine et plicarum carinis serrulato-scabris; germine longissimo, clavato, nudo, glabro, striatulo. *Mart. et Zuccar. nov. gen. et spec. T. I. p. 16. t. 9. (sub VELLOSLA plicata). Spreng. Cur. post. p. 137.*

Caudex erectus vel adscendens, dichotomus; ramis erectis, trigonis, foliorum basibus emarcidis aridis atque fibris transversim connexis et Lichenibus etc. dense obsitus, digiti majoris crassitie. Folia in apice ramorum approximata, trifaria, equitantia, erecta, basi attenuata concava striata purpurascencia, antice lanceolata pungentia, utrinque longitudinaliter plicata; margine et carinis plicarum pilis albidis rigidis brevibus; 5-6 poll. longa, medio

6-8 lin. lata. Scapi 1-flori, 3-4 terminales inter folia, foliis 2 parvis linearibus subvaginantibus cincti, triquetri, glabri, 1-2-poll.. Petala lanceolata, erecto-patentia, subrevoluta, glabra, tenera, alba, 1½ poll.. Stamina inclusa; filamenta ex ore ovarii simplicia, glabra; antherae lineares, filamentis multoties longiores, flavae. Germen clavato-trigonum, longissimum, 2 poll. et longius, crassitie pennae scriptoriae, apice truncatum, striatum. Stylus crassus, trigonus, glaber, petalis brevior. Stigma capitato-trilobum, glabrum. Caps. vertice dehiscens; valvulis brevissimis convexis. *Mart. et Zuccar.* In campis montis Serra de Monte santo in Provincia Bahiensi. 4.

7. *X. cinerascens Martius*; caudice erecto, ramoso, cinereo; foliis linearibus, acutis, obsolete striatis; floribus hexandris; germine subgloboso, dense muricato. *Martius Fl. brasil. ined.*

Caudex dichotomus, teres, crassitie digiti, vestitus foliorum basibus trifariis, carinatis, sulcato-striatis cinereis; rami stricti, subtrigoni, similes. Folia terminalia, trifaria, pungentia, carinata, supra sulco ad margines glabro, intense viridia, 2½-4 poll., 2½-4 lin. lata; vetustiora utrinque glabra, juniora squamulis appressis, plumoso-laceris, albidis; marginibus carinâque squamulis similibus, hisque delapsis obtuse serrulata; basibus fuscis, superne squamulosis. Scapi 1-2, foliis breviores, trigoni, glabri, 1½-2½ poll.. Petala erecto-patentia, lanceolata, acuta, nervosa, 1½-2 poll., 3-4 lin. lata. Filamenta ex ore germinis, filiformia, 5 lin.. Antherae filamentis breviores, flavae. Germen magnitudine pisi. Stylus crassus, rigidus, trigonus, tortus, stamina superans. Stigma capitato-trigonum. Caps. subglobosa, magnitudine Cerasi, fuscescens, densissime echinata glochidibus longis, rigidis, e basi papulosa multangula subulatis, apice denticulato-partitis. *In Brasilia. De Martius. h.*

Obs. Cum *VELLOZIAE* adeo affines *XEROPHYTIS*, subjungimus hic species ab ill. *de Martius* in Brasilia detectas, ne temere confundantur ab aliis, donec ill. auctor easdem communicaverit.

1. *Capsulis muricatis;*
a. *foliis angustioribus.*

1. *VELLOZIA candida Mikan*; caudice ultra ped.; foliis arcuato-patentibus, linearilanceolatis, subulato-acuminatis, carinatis, glabris, margine squamoso-serrulatis, basi squamulosis, scapo trigono, superne glanduloso longioribus; staminibus 15-18, sex phalangum; capsulâ subglobosâ densissime glochidatâ. *V. capsulâ scapique summitate hispidis; flore candido. Mikan Del. Fl. et Faun. bras. Fasc. II. t. 1. Spreng. S. Veg. III. p. 338. Cur. post. p. 296. (excl. syn. V. aloifoliae) V. tertia Spreng. n. Entd. II. Vix VELLOZIA tubiflora Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. VII. p. 155. (RADIA tubiflora Rich., CAMPERIA Rich.).*
2. *VELLOZIA squalida de Martius*; caudice brevi; foliis reflexo-patentibus, anguste linearilanceolatis, subulato-acuminatis, carinatis, glabris, aculeolato-serrulatis, basi glaberrimis, resinosis, scapo trigono, glanduloso paululum longioribus; capsulâ subgloboso-trigonâ, glochidibus brevibus remotiusculis. Praecedente minor et gracilior.
3. *VELLOZIA crassicaulis de Martius*; caudice brevissimo; foliis linearibus, acuminatis, rigidis, valde carinatis, tenuiter serrulatis; scapo folia aequante, trigono, glaberrimo; capsulâ ovatâ, hamato-echinatâ.
4. *VELLOZIA asperula de Martius*; vix caudescens; foliis linearibus, obtusiusculis, rigidis, margine et medio serrulato-scabris; germine ovato-subtrigono, scabro; staminibus 18, sex phalangum. *Mart. et Zucc. nov. gen. et spec. T. I. p. 15. t. 8.*
5. *VELLOZIA epidendroides de Martius*; caudice elongato, ramoso; foliis linearibus, truncatis, glabris, margine carinâque serrulatis; scapis trigonis germinisque glanduloso-scabris; staminibus 18, sex phalangum; petalis oblongis, basi angustatis.

b. foliis latioribus.

6. *VELLOZIA aloifolia* de Martius; caudice erecto, ramoso; foliis lineari-lanceolatis, acuminatis, margine carinâque integerrimis, subtus pubescentibus, scapo subtrigono germinaeque pilis glanduliferis tomentosus; staminibus 18, sex phalangum; petalis lanceolatis, acutis. *Mart. et Zucc. l. c. t. 7.*
7. *VELLOZIA breviscapa* de Martius; caudice erecto, spithamæo; foliis ensiformibus, subulato-acuminatis, aculeolato-serrulatis, basi glutinosis; scapis lateralibus, brevibus, apice glandulosis; staminibus circiter 66, sex phalangum; germine subgloboso, glanduloso-echinato.
8. *VELLOZIA resinosa* de Martius; caudice brevissimo; foliis lineari-lanceolatis, obtusiusculis, ciliato-serrulatis aculeolatisque, resinosis; scapis terminalibus, obtuse angulosis, glanduloso-scabris; germine ovato-globoso, globidato.
9. *VELLOZIA flavicans* de Martius; caudice frutescente; foliis longissimis, linearibus, longe acuminatis, basi canaliculatis, margine carinâque aculeato-serrulatis, utrinque luteis; capsulis ovato-oblongis, echinatis.

2. Capsulis ad angulos tantum muricatis.

10. *VELLOZIA variabilis* de Martius; caudice brevi; foliis ensiformibus, acuminatis, patentibus, supra scabris, margine carinâque serrulatis; staminibus 31-52, irregulariter in sex phalanges connatis; germine obovato-trigono, glabro: angulis glanduloso-verrucosis. β major; foliis longioribus, magis serrulatis, minus scabris; floribus majoribus.
11. *VELLOZIA verruculosa* de Martius; caudice brevi; foliis ensiformibus, acuminatis, patentibus, glabris, margine carinâque serrulatis, glaucis; staminibus 21-22, sex phalangum; germine obconico, trigono, glabro: angulis verrucosis.
12. *VELLOZIA compacta* de Martius; caudice crasso; foliis ensiformibus, erectis, rigidis, truncato-obtusis, margine carinâque acuta serrulatis; germine obovato, angulis 3, basi apiceque verruculoso.

3. Capsulis glabris.

13. *VELLOZIA ornata* de Martius; caudice brevi; foliis linearibus, obtusiusculis, rigidis, margine carinâque serrulatis; staminibus 18-21, sex phalangum; germine oblongo-subtrigono, punctulis minutissimis, elevatis, hyalinis.
14. *VELLOZIA incurvata* de Martius; caudice elongato, erecto; foliis ensiformibus, obtusis, strictis, subtus glaucis, margine carinâque serrulatis; scapo trigono foliis brevioris, reflexo, germinaeque obovato obsolete trigono glaberrimis.
16. *VELLOZIA tenella* de Martius; acaulis; foliis linearibus, truncatis, curvato-patentibus, margine carinâque serrulatis; scapis folia superantibus capsulisque glaberrimis, urceolatis, subtrigonis.
- VELLOZIA glabra* Mikán; capsulâ scapoque glabris. *Spreng. S. Veg. III. p. 338;* quae *V. capsulis scapisque glabris Vandelli* in *Röm. script. hisp. p. 114.* tam ad *V. ornata*, quam ad *incurvatam* vel ad *tenellam* spectare potest. Nescimus quid sit: *VELLOZIA*, capsulis glabris, scapis hispidis. *Vandelli l. c. in Sprengel Syst. Veg. VELL. scabra* dicta.

1359. CONOSTYLIS. *)

1. *C. aculeata* R. Br.; perianthiis intus glabris; scapis corymbisve divisis; foliis glabris, margine aculeatis: aculeis interstitio brevioribus. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 300.*
In *Nov. Hollandiae ora meridionali*. 4.
2. *C. serrulata* R. Br.; perianthiis intus glabris; scapis indivisis, bracteatis, corymbo simplici vix longioribus; foliis nervoso-striatis, margine scabris, denticulis setuliferis. *R. Brown l. c.*
In *ora meridionali Nov. Hollandiae* R. Br.; in *insula van Diemen Menzies*. 4.
3. *C. setigera* R. Br.; perianthiis intus lanatis; scapis

*) Rad. fasciculato-fibrosa. Caules brevissimi. Folia disticha, aversa, ensiformia, basi vaginantia, equitantia R. Br.

indivisis capitulo 4-6ies longioribus; foliis margine setiferis; filamentis alternis longioribus. *R. Brown l. c.*

In ora meridionali Nov. Hollandiae. 4.

4. *C. breviscapa R. Br.*; perianthiis intus tomentosus; scapis indivisis capitulo vix longioribus; filamentis aequalibus; foliis margine scabris, tomentosus. *R. Brown l. c. p. 501.*

*In altero exemplari Herbarii Nov. Holl. a Sieber divulgato etiam hanc invenimus nomine BURCHARDIAE umbellatae insignitam. Caulis ramosus, ut videtur brevis, erectus (?), sublignosus, foliis omnino tectus; rami breves, alterni vel approximati, erecti, rigidi. Folia rigida, disticha, basibus dilatatis, fuscis, nitidis, margine saepe laceris caulem amplexantia et subequitantia, valde approximata, aversa, erecta, linearia, acuminata, subpungentia, sulcato-striata, 3-6 poll., lin. vel paulo ultra lata, fuscescenti-viridia; juniora margine villis albidis, vetustiora glabra. Scapi axillares, teretiuseuli, crassitie pennae corvi, erecti, foliorum vaginas vix superantes, 9-12 lin.. Corymbus subcapitatus, multiflorus, densus, ramosus. Bracteae ovato-lanceolatae, longe acuminatae, concavae, apice convolutae, intus glabriusculae fuscae, extus tomento densissimo albido; inferiores majores 4 fere lin., basi lin. latae. Pedunculi brevissimi, omnino tomento absconditi. Perianthium longissime persistens, ante anthesin conicum, expansum vix campanulatum, extus pilis densissimis, plumosis, sordide albidis, intus pilis brevioribus rarioribus magisque fuscis; lacinae erecto-patentes vel patentes, serius subreflexae, quidquam concavae, firmae, lanceolatae, acutae, 2-2½ lin., vix lin. latae. Stam. perianthio pistilloque breviora, ad basin laciniarum inserta; ante anthesin circa stylum convergentia, serius erecto-patentia, persistentia; filamenta brevissima, basi dilatata; antherae ovato-oblongae, obtusae, loculis 2 intus longitudinaliter dehiscens, pallide flavae, ¾ lin.. Germen obovatum, obsolete trigonum, totum tomento densissimo tectum. Stylus strictus, perianthio paulo brevior, fuscescens, glaber, conicus, cavus, subtrigonus, facile in partes 3 partibilis, 1½ lin.; stigmatibus obsolete, ut videtur 3. Capsula obovata, obtuse trigona, perianthio persistente stylique partibus 3 fuscis strictis basi dilatatis coronata, extus tomento densissimo sordide alba, intus glabra, fusca, imperfecte trilocularis; loculis apice dehiscens. *In novae Hollandiae ora meridionali. 4.**

1540. LANARIA.

1. *L. plumosa Thunb. Prodr. 63. Fl. cap. ed. Schult. p. 524. Hort. Kew. 1. p. 452. ed. 2. II. p. 289. Willd. Spec. II. p. 181. HYACINTHUS lanatus Linn. Spec. 455. Swartz Obs. p. 127. ARGOLASIA plumosa Juss. gen. ed. Uster. 67. ARGOLASIA lanata Lam. Ill. t. 34. ARGOLASIA capensis Gmel. Syst. Veg. p. 560. AUGEA Retz. Obs. Fasc. V. p. 3.*

Caulis simplex vel superne in corymbos plures divisus, (1-2½) ped. et ultra, trigonus, inferne villosus (crassitie pennae anserinae, obsolete striatus), superne (dense albideque) plumoso-lanatus (erectus). Folia radicalia ensiformia, canaliculata, carinata

(valde) nervoso-striata, serrato-scabra, glabra, longitudine fere caulis (acuta, rigida, 2-2½ lin. lata, basi in vaginam fuscā striatā dilatata, viridia); caulina alterna, sessilia, lanceolata, acuta; conniventia, glabra, serrato-scabra, internodiis breviora, pollic. (et 1-3 poll.); superiora magis approximata et breviora, (spathacea, fusco-viridia, ad medium usque dorso albide plumoso-lanata). Flores patentiati. Panicula composita, densa, pilis albis plumosis (longis) densissime tecta; (ramis alternis, erecto-patentibus, poll., apice corymbo subcapitato; bracteis lineari-subulatis, canaliculatis, dense plumosis, 5-6 lin.). Pedicelli lin., uniflori, plumoso-lanati. Cor. extus tota dense albide lanato-plumosa, intus purpurea, tubulosa (apice subcampanulata, 5-6 lin. longa); tubo brevi (3 lin.); limbo 6-partito; laciniis lineari-lanceolatis, concavis, obtusis, (apice) patentibus, ultra lin. (2-3 lin.) longis, (angustis). Filamenta laciniarum medio affixa, laciniis breviora (subulata), alba. Antherae cordato-ovatae, flavae. Stylus longitudine staminum (gracilis, albidus, glaber); stigmate bifido. *Thunb. et specim. spontanea. In Promont. b. spei collibus trans Swellendam, in lange Kloof, Hottentotskloof, Hemel en Aarde etc. 4.*

Obs. Clo. *Poiret Enc. Suppl. II. p. 449. Dilatris hexandra Lam. Enc. II. p. 282. eadem planta videtur. Convenit sane plurimis descriptio; at cl. Lamarck inflorescentiam cymam subpaniculatam e glomerulis florum ad apicem pedunculorum, petala acuta, filamenta vix longitudine petalorum iisdemque basi inserta, et stigma trigonum dicit. E prom. b. spei attulit Sonnerat. In Enc. meth. suppl. II. p. 482. ad LANARIAM Poiret quoque refert Dilatr. carolinianam Lam. s. Dilatr. Heritieram Pers. s. Heritieram Gmelini Mich.*

1341. P H L E B O C A R Y A.

1. *Ph. ciliata R. Brown Prodr. Fl. nov. Holland. p. 301.*

Subcaulis. Folia disticha, equitantia, anguste ensiformia, ciliata. Panicula subsessilis, foliis brevior. Flores parvi, unibracteati. *R. Brown. In ora merid. Nov. Hollandiae. 4.*

1342. C O N V A L L A R I A.

a. *Lilium convallium Tourn.: corollis campanulatis.*

1. **C. majalis*; scapo nudo. *Linn. Spec. 451. Willd. Spec. II. p. 160. Mill. Dict. n. 1. Desf. Ann. d. Mus. IX. p. 47. C. scapo nudo, semicylindrico; racemo simplici; floribus nutantibus, campanulatis; laciniis remotiusculis. Smith Engl. Fl. II. p. 154. Fl. Brit. p. 370. Engl. Bot. t. 1035. Gmel. Fl. bad. II. p. 51. Roth Germ. II. 386. Enum. pl. Germ. I. 2. p. 56. Mert. et Koch D. Fl. II. 565. Wahlenb. Fl. succ. p. 205. Lam. et Decand. Fl. fr. III. p. 177. Hall. Helv. n. 1241. Fl. Dan. t. 854. Curt. Fl. Lond. t. 303. Svensk Bot. t. 9. Bull. Herb. t. 219. Redouté Lil. IV. t. 227. Jaume St. Hil. 42. t. 7. Hayne Term. bot. t. 37. f. 4. Off. Gew. III. t. 18. Plenck Off. Gew. t. 265. Sturm Deutsch. Fl. 1. A. 14. H. Knorr Del. 2. t. C. 3. Kniph. Cent. X. n. 23. Ludw. Ecl. t. 87. Blackw. t. 70. Gmel. Sib. 1. p. 34. n. 1. LILIUM CONVALLIUM ma-*

jale Mönch. Method. p. 636. β fol. majoribus latioribus
Mapp. Alsat. 175. Lil. Conv. latif. Bauh. Prodr. p. 136.
Conv. latifolia Mill. Dict. n. 2. γ flore purpureo. *Mor-*
dant Delaunay III. t. 5. — δ flore basi purpureo. *Bes-*
ser. — ϵ fl. pleno. *Mord. Del. t. 6.* ζ flore pleno,
 intus roseo. — η grandiflora *Com. a Hoffmanns. Ver-*
zeich. 2ter Nachtr. p. 95. — θ fol. variegatis. — ι pe-
 dunculis basi longe bracteatis. *C. Mappii*; scapis nudis; pe-
 dunculis basi longe bracteatis. *Gmel. Fl. bad. II. p. 55. Poi-*
ret Enc. meth. Suppl. IV. p. 29. Lil. conv. floribus e follicu-
lis prodeuntibus Mappi. Tournef. inst. p. 77. Mapp. Fl.
als. p. 174. κ . Lil. conv. floribus e folliculis prodeuntibus;
 fol. luteo et viridi variegatis. *Mapp. l. c. p. 175.*

Radices filiformes, repentes, intricatae. Folia 2 radicalia (rarius 1),
 elliptica, 3-5 poll., acuta, glabra. Petioli foliis longiores, cana-
 liculati, vaginantes. Cor. albae (in racemo secundo solitariae).
 Bractea lanceolata, acuta, membranacea, solitaria ad basin pedi-
 celli singuli (1-1½ lin., pedicello duplo triplove brevior). Tu-
 bus corollae hemisphaericus; laciniis latis, recurvis. Bacca cocci-
 nea, magnitudine *RIBESII nigri. Smith.* β monente divo
Miller, culturâ omnino persistens, quare propriam sistere spe-
 ciem sedulo monuit. In γ flores minores; scapi rubescentes;
 folia intensius viridia. η differt scapo crassiore; floribus duplo
 fere majoribus; stylo ante apicem rubente; bracteis in floribus
 inferioribus pedicellos superantibus. *Com. a Hoffmannsegg.*
 ι differt sec. *Gmelin*: scapis demissioribus; foliis brevioribus;
 racemo magis laxo; pedunculis longioribus, 1-1½ unc., basi
 bractea lineari, angustâ, glabrâ, acutâ, albicante, inferne rubente,
 unc. 2 circiter longâ, erectâ. Insignem aberrationem observa-
 vit *Mentzel*, flore solitario, praeter ordinarios in scapo, e ra-
 dice juxta terram propullulante. *De Schlechtend. Fl. berol. 1.*
p. 189. Variat etiam corollis 5-8-fidis; staminibus 5-8. In
dumetis, nemoribus, ad sepes per omnem Europam (exceptâ Lu-
sitania?), in Tauria, Sibiria et America; β in alpibus;
 δ in *Podolia*; ι in *Alsatia prope Zabern.* 4.

b. *Polygonatum Tourn.*: corollis infundibuliformibus,
 tubulosis.

2. **C. verticillata*; erecta; foliis lineari-lanceolatis, pla-
 nis. *Linn. Spec. 451. Willd. Spec. II. p. 161. Mill. Dict.*
n. 7. Lam. Enc. IV. p. 368. Smith Engl. Fl. II. p. 154.
Fl. brit. 371. Engl. Bot t. 128. Wahlenb. Lapp. 77. succ.
p. 205. Roth germ. II. p. 387. Enum. I. 2. p. 56. Mert.
et Koch D. Fl. II. p. 564. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 175.
Savi Bot. Etrusc. II. p. 221. n. 645. Pall. it. 3. p. 266.
Hall. Helv. n. 1244. Fl. Dan. t. 86. POLYGONATUM verti-
cillatam Allion. pedem. p. 131. Mönch meth. p. 637.
Desfont. Ann. Mus. IX. p. 49. Red. Lil. t. 244. Trat-
tinn. Fl. austr. t. 183. Bauh. pin. 103. Clus. hist. 1. p. 277.
f. 1. Moris. hist. II, p. 538. S. 16. t. 4. f. 14. β . Poly-

gon. angustifol. ramos. *Bauh. pin.* 104. *Moris. l. c. f.* 15.
y. caucasica. Fisch. Gorenk.

Rad. repens (nodosa). Caulis erectus, fere 2-(3) ped., simplex, angulatus, glaber, inferne nudus. Folia sessilia, erecto-patentia, 3-4, superiora saepius 5-7, subtus glauca (et ad nervos puberula), 3-4 poll. (internodiis longiora, 2-3 lin. circiter lata). Pedunculi axillares, solitarii (verticillati), ramosi, nutantes, vix poll., 2-4 flori. Cor. albida, apice viridi-variegata, cylindrica; laciniis parallelis, approximatis, intus sub apice barbatis. Stam. brevia in fauce tubi. Stylus brevis. Bacca globosa, profunde caerulea (aliis rubra). *Smith.* Variat pedunculis erectis, brevibus, paucifloris, et pendulis, ultra poll., 3-6-floris. *In totius Europae saltibus, praeruptis; in Tauria.* 4.

Obs. Cox. *verticillatam* Mill. *Dict.* ex Philadelphia non hujus esse loci, notat *Poiret l. c.* quia *Miller* describit spicas terminales, ramosas, e floribus stellatis ochroleucis: forte *stellatam* esse suspicatur; nobis *umbellata* videtur. *POLYGONATA AXILLARIAS* dixit *Rafinesque.*

3. *C. leptophylla* Don; foliis quaternis, longissimis, linearibus, attenuatis; pedunculis elongatis, subquaternis, bifloris, pendulis. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 47. *C. verticillata Wallich in litt. Karkur incol.*

Caulis 2-3 ped., teretes, glabri. Folia 5-6-poll. Pedunculi 1½ poll., filiformes, graciles. Proxima *C. verticillata* discrepat: foliis duplo fere brevioribus latioribusque, minus attenuatis, pedunculis triplo brevioribus. *Don. In Sirinagur. Kamroop.* 4.

4. *C. sibirica*; foliis linearibus, verticillatis, apice recurvis; pedunculis bifloris; bracteis oppositis, pedicellos superantibus. *POLYGONATUM sibiricum Redout. Lil.* 315.

C. verticillatae affinis; sed folia angustiora, apice recurva, bracteae oppositae ad pedunculorum bifurcationem, flores minores. Caulis gracilis, 12-16 poll., angulosus, striatus, viridis, glaber, basi nudus. Folia lineari-lanceolata, acuta, erecta, apice hamato-recurva, glabra, integra, longitudinaliter nervosa, nervo medio fortiori, 30-56 lin., 2½ lin. lata; inferiora opposita ternaque, superiora quaterna. Sub verticillo primo foliolum solitarium membranaceum, lineare, amplexicaule, concavum, acutum, cauli appressum, foliorum longitudine. Ex axillis verticillorum intermediorum pedunculi 2-3, 4½ lin., primum erecti, post florescentiam recurvi, apice divisi in pedicellos 2, 1½ lin.; ad bifurcationem bracteae 2 membranaceae, lanceolatae, acutae, pedicellis duplo longiores. Flores virescenti-albidi, erecti, similes illis *C. verticillatae*, sed multo minores. Cor. tubulosa, angulosa, 2 fere lin., ad medium fere divisa in lacinias ovatas, concavas, obtusas, approximatas, praesertim exteriores pilorum glandulosorum fasciculo terminatas, exteriores breviores. Stamina corollae paulo breviora, tubo inserta; filamenta filiformia; antherae oblongae, erectae. Germin ovato-rotundatum. Stylus filiformis, longitudine fere staminum. *Decand. ad specim. sicc. In Sibiria.* 4.

5. *C. cirrhifolia* Wallich; scandens; foliis verticillatis, linearibus, revolutis, apice subcirrhiferis; pedunculis axillaribus, trifloris. *Wallich Asiat. research.* 15. p. 382. c. *icone.*

C. fol. senis, linearibus, apice cirrhosis, revolutis; pedunc. nutantibus, trifl.; perianthiis tubulosis, fauce villosis: ore 6-fido; caule scandente. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 47. *Goobasa incol.*

Caules 4-ped., debiles, simplicissimi, maculis purpureis notati. Flores albi. *Don.* Similis *Polygonato sibirico Redout.* In *Nepal.* 4.

6. *C. oppositifolia Wallich*; caule tereti; foliis oppositis, oblongis, acutis, glabris, petiolatis; pedunculis axillaribus, multifloris, nutantibus. *Wallich in Asiat. Res.* 13. p. 380. c. *icone.* *C. fol. suboppositis*, ellipticis, obtusis, petiolatis; pedunculis subternis, brevibus, erectis, bifloris; perianthiis ovalibus: ore contracto, 6-dentato. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 47. *Loddig. Bot. Cab.* t. 640. *C. c. t.*; f. o. o. acuminatis, nitidis, breviter petiolatis; pedunculis umbellatis 3-5-floris; perianthiis oblongis. *Hooker Exot. Fl.* n. et t. 125.

Habitu omnino *C. Polygonato* similis. Caules erecti, palmares. Flores albo-virentes. Folia 1½-2-poll., ½-1 fere unc. lata. *Don.* Caulis fere pedalis, curvatus, nitens, squamis paucis deciduis, distantibus, oblongis, membranaceis. Folia 3-4 poll., subsecunda, per paria distantia, longe acuminata, subundulata, supra laete et intense viridia, subtus pallidiora. Flores verticillati, nutantes. Pedunculi axillares breves; pedicellis 2-3, subfloribus articulatis, super articulum tumidis. Cor. ¾ poll. longitudine, cylindrica, vel basi quidquam tumidula, alba, crassiuscula, subcoriacea, lineis obsolete rubro punctatis, dentibus subpatentibus brevibus virentibus. Stamina 6 cum dentibus alternantia, medio inserta. Filamenta alba, incurva, pubescentia. Antherae sagittatae, flavae. Germen ovatum, obtuse trigonum. Stylus corollae brevior. Stigma 3-fidum, villosum. *Hook.* In *Nepal.* *Wall.* 4.

7. **C. Polygonatum*; foliis alternis, amplexicaulibus, glabris; caule (sub) ancipite; pedunculis axillaribus, subunifloris; (staminibus glabris *Smith*). *Linn. Spec.* 451. *Willd. Spec.* II. p. 161. *Mill. Dict.* n. 5. *Smith Engl. Fl.* II. p. 155. *Fl. Brit.* 371. *Engl. Bot.* t. 280. *Roth Germ.* II. 388. *Enum. pl. Germ.* I. 2. p. 57. *Mert et Koch D. Fl.* II. p. 554. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 205. *Lam. et Decand. Fl. fr.* III. p. 176. *Hall. Helv.* n. 1242. *Fl. Dan.* t. 377. *Woodw. med. bot.* t. 44. *Hook. Fl. Lond.* t. 38. *Hayne getr. Darst.* III. t. 19. *Regnault Bot. Plenck off. Gew.* t. 264. *Jaume St. Hil.* 41. t. 3. *Svensk Bot.* 41. *Knorr Del.* 2. t. P. 4. *Kniph Cent.* III. n. 32. *C. angulosa Lam. Fl. fr.* 5. p. 258. *Conv. odorata Mill. Dict.* ed. 8. n. 4. *Polygonatum anceps Mönch Meth.* p. 637. *Pol. vulgare Red. Lil.* t. 258. *Desf. Ann. d. Mus.* IX. p. 49. *Link Enum.* p. 342. *Polygonatum officinale Allion Ped.* 1. p. 131. *Pol. uniflorum St. Hil. Fl. Gall.* 4. t. 346. *Pol. po-*

lygonatum Jiraseck. β *C. Polygonatum*: majus, pedunculis 3-5-floris. *Brotero Fl. Lus.* p. 558. POLYG. ambiguum *Link.* γ *C. Polygonatum* β *Smith* l. c. P. Hellebori albi folio, caule purpurascente. *Ray Syn.* 263. δ *C. Polygonatum* β *Gmel.* l. c. P. latifolium minus, flore majore. *Bauh. Prodr.* 136. *Mapp. Fl. alsat.* p. 245. ϵ flore pleno. ζ foliis floribusque minoribus. *Poiret* in *Lam. Enc.* IV. p. 368. η *C. obtusifolia* *Günth. Cent.*. An *C. obtusifolia* *Hölle* et POLYGONATUM *obtusifolium* *Weinm. hort. Pawlowsk.* p. 175.?

Rad. carnea, alba, repens. Caulis 1-2 ped., angulatus vel subanceps (saepissime tortus), foliosus, apice parum curvatus. Folia late elliptica, acuta (apud nos obtusa), nervoso-plicata, basi plus minus attenuata. Pedunculi axillares, nutantes, 1-raro 2-flori. Cor. alba, viridi-variegata; laciniis incumbentibus, apice (obtusis) barbatis. Stylus rectus. Bacca profunde caerulea. *Smith.* β *Brotero Fl. lusit.* l. c. monet *C. Polygonatum* in Lusitania variare foliis majoribus, caule 1 $\frac{1}{2}$ ped. aut paulo longiore, inferne vel subtereti, vel acute anguloso, exacte ut in *C. Polygonato* communi, floribus tamen 3-5 in singulo pedunculo, quae pro *C. multiflora* *Linn.* aut *latifolia* habetur; sed cum vix solum majori numero florum a *C. Polygonato* communi differat, et hoc ex natura soli et expositione pendeat, ideo istius varietatem opinatur. ζ e Canada, foliis subtilus glaucis minoribus, pedunculis floribusque duplo minoribus, corollis medio non constrictis, sed potius conicis, non nisi varietas videtur clo. *Poiret* l. c. In totius Europae montosis sylvaticis, lapidosis, praeruptis; etiam in Tauria, Sibiria, Japonia; ζ in Canada. 4.

Obs. *Miller* in *Dict.* n. 8. *C. odoratam* suam (foliis alternis semi-amplexicaulibus; floribus majoribus, axillaribus), differre dicit a *Polygonato latifolio*, flore majore odore *Bauh. Pin.* 303, quod instar synonymi citat, et quod a *Linnaeo* et *Smith* ad *C. Polygonatum* laudatur: caulibus multo brevioribus: foliis latioribus margine inflexis, quae signa culturâ perstare asserit. In Britannia, ut videtur. — Unicum varietatis ζ specimen vidimus etiam in *Herb. Schreberiano* nomine *C. Polygonati* e Lancaster insignitum; species videtur esse propria, ex unico tamen specimine vix statuenda; caulis ped., crassitie pennae gallinae, inter folia valde angulosus et tortus; folia elliptico-lanceolata, acuta, utrinque glabra, valde nervosa, 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll., 6-8 lin. lata; pedunculi 1-flori, nutantes, $\frac{1}{2}$ poll.; flores fere ut in *C. Polygonato*, sed multo tenuiores, $\frac{1}{2}$ poll., 1 $\frac{1}{2}$ lin. in diametro; lacinae apice calloso-barbatae, angustiores, acutiusculae; filamenta minus glabra, nec tamen hirsuta. Alterum specimen magis adhuc incompletum sub eodem folio prostat in *Herb. Schreb.*, huic affine; sed foliis subtilus minus glaucis et ad nervos tenuiter pubescentibus; pedunculis plerumque bifloris; floribus minoribus; filamentis magis puberulis. An hoc forte alia varietas *C. pubescentis*? Judicent illi, quibus plura melioraque specimina videre licet.

8. *C. parviflora* *Poir.*; foliis subsessilibus, ovato-oblongis, glabris; pedunculis axillaribus, bi-raro-3-floris, minimis. *Poiret Enc. meth. Suppl.* IV. p. 29.

Differt a *C. Polygonato*, pro cuius varietate forte habenda, patriâ et florum parvitate. Radices crassae, repentes. Caules glabri, erecti, subangulosi, ped. et ultra. Folia alterna, sessilia, basi quidquam attenuata, acuta, nervosa, utrinque glabra. Pedunculi solitarii, quidquam inclinati. Flores albi, duplo minores quam in *C. Polygonato*. *Poiret.* In America septentrionali. 4. *Herb. Desf.*

9. *C. pubescens* *Willd.*; foliis alternis, amplexicaulibus,

ovatis, subtus pubescentibus; caule teretiusculo, sulco exarato; pedunculis axillaribus, subbifloris. *Willd. hort. berol. t. 45. Enum. p. 377. Torrey Fl. N. M. U. St. p. 356. POLYGONATUM pubescens Pursh Fl. Sept. Am. 1. p. 234. Elliott. Sk. 1. p. 394.* — β fol. angustioribus, elliptico-lanceolatis. *C. Polygonatum* fol. pubescentibus. *Herbarior.*

„Radix alba, horizontalis, crassiuscula, nodulosa, fibris sparsis; „(repens, tuberosa).“ Caulis ped. „(et ultra)“ erectus, „(glaber, apice subangulosus et quidquam tortus).“ Folia secunda, acuminata, nervis 5-7 (majoribus, supra saturate viridia glabra, subtus albicantia et ad nervos pilis albidis, „(2-3 $\frac{1}{2}$ poll., 1-2 poll. lata).“ Pedunculi 1-2 (-3) flori, secundi, nutantes, axillares „(cum pedicellis 6-8 lin. filiformes, apice bifurci).“ Bractee 2 lineares membranaceae, diaphanae, caducae ad pedunculorum divisionem, „(in siccis fere semper nullae. Pedicelli longitudine florum).“ Cor. tubuloso-campanulatae „(basi subventricosae, 4-4 $\frac{1}{2}$ lin.)“ albido flavescentes „(basi et apice virentes),“ dentibus 6 oblongis, obtusis „(vel acutiusculis),“ rectis, apice interne callosis „(et subbarbatis).“ Filamenta filiformia, „(puberula).“ Antherae lineares, basi sagittatae, erectae. Stylus filiformis, staminibus longior. Stigma capitatum. Media *C. Polygonatum* inter et *multifloram*; sed differt pubescentiâ formâque foliorum; flores *C. multiflorae*, sed magis campanulati.“ *Willd.* In β caulis apice parum arcuatus, tenuior, flores inter magis angulosus, tortus, 1-1 $\frac{1}{2}$ ped.. Folia minus amplexicaulia, ovato-lanceolata, utrinque attenuata, acuta vel obtusiuscula nervis 7, subinde tantum 3-5 fortioribus, subtus glauca pilisque densioribus, margine glabra, 2-4 poll., 8-12 lin. lata. Pedunculi filiformes, glabri, 6-8 lin.. Bractee nullae vel deciduae. Cor. paulo angustiores. 4-5 lin., longitudine pedicellorum, basi ventricosae, fauce paulo constrictae, glabrae, virescenti-albidae; lacinae lin., ovatae, obtusiusculae, virides, vix barbatae. Filamenta sub lente puberula. Antherae 1 $\frac{1}{2}$ lin.. Stylus staminibus paulo brevior. Ad specimina spontanea in *Herb. Schreb.* Speciem esse dubiam monet *Nuttall nov. gen. p. 223. C. multiflorae* affinior quam *Polygonato.* In rupibus ad aquas a Nova Anglia ad Carolinam. 4.

10. *C. canaliculata Mühlenb.*; foliis alternis, amplexicaulibus, oblongis, margine pubescentibus; caule canaliculato; pedunculis bifloris, axillaribus. *Willdenow hort. berol. l. p. 45. Torrey Fl. N. M. U. St. p. 357. C. multiflora Mich. Fl. bor. amer. 1. p. 202. POLYGONATUM canaliculatum Pursh Fl. sept amer. 1. p. 234.*

Differt a *C. pubescente*: foliis oblongis, glabris, margine tantum tenuissime pubescentibus; corollâ magnitudine et facie *C. Polygonati.* In sylvis umbrosis a Pennsylvania ad Virginiam. 4.

11. *C. hirta Bosc*; caule angulato, hispido; foliis alternis, subamplexicaulibus, ovatis, obtuse acuminatis; pedunculis axillaribus trifloris. *Bosc Act. Soc. h. nat. Paris. Poir. in Lamarck Enc. IV. p. 369. POLYGONATUM hirtum Pursh Fl. sept. Amer. 1. p. 234.*

Rad. repens. Caulis pedalis, tortus. Folia sessilia, subtus ad nervos pilosa. Flores penduli, secundi. Pedunculi pollicares, hirsuti. *In America septentrionali. Bosc. 4.*

12. *C. angustifolia*; caule tereti; foliis alternis, sessilibus, elliptico-lanceolatis, sensim acutis, subtrinervibus, glabris; pedunculis axillaribus, elongatis, subbifloris. *Pursh Fl. sept. Amer. I. p. 234. (sub POLYGONATO angustifolio, uti) Elliott Sketch. I. p. 393. CONVALL. biflora Walt. Carol. 122. Gmel. S. Veg. p. 559. Torrey Fl. N. M. U. St. 1. p. 356. POLYGONATUM biflorum Darlingt. Florul. cestr. p. 42. Flores flavescenti-albi, apiculis virentibus. Pursh. Clo. Torrey forte multiflorae varietas videtur. In rupestribus a Pennsylvania ad Virginiam. 4.*

13. **C. multiflora*; foliis alternis, (oblongo-ovalibus), amplexicaulibus; caule tereti; pedunculis axillaribus, multifloris; (staminibus pubescentibus *Smith*; pedicellis flore brevioribus *M. a Bieb.*) *Linn. Spec. 452. Mant. p. 366. Willd. Spec. II. p. 162. Mill. Dict. n. 3. Smith Engl. Fl. II. 156. Fl. brit. p. 372. Engl. Bot. t. 279. Gmel. Fl. bad. II. p. 57. Roth Germ. II. p. 388. Enum. pl. Germ. I. 2. p. 58. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 565. Wahlenb. Fl. suec. p. 207. Decand. Fl. fr. III. p. 176. M. a Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl. p. 272. quo teste: Gmel. Sib. 1. p. 34. n. 2. var. II. Savi Bot. etr. II. p. 222. n. 647. Sebast. et Mauri Prodr. Fl. rom. p. 130. Gusson. Prod. Fl. sic. 1. p. 425. Torrey Fl. N. M. U. St. p. 356. Hall. Helv. n. 1245. Fl. Dan. t. 152. Hook. Fl. lond. t. 37. Svensk Bot. t. 392. Drev. et Hayne Bild. t. 52. Hayne term. bot. t. 4. f. 6. Getr. Darst. III. t. 20. Plenck Off. Gew. t. 265. Schkuhr Handb. t. 97. Mill. Ic. 67. t. 101. f. 1. Blackw. t. 251. POLYGONATUM multiflorum Allion. pedem. 1. p. 131. Mönch Meth. p. 657. Red. Lil. t. 229. Desf. Ann. mus. IX. p. 50. Pursh Fl. Am. sept. 1. p. 234. β *latifolia*; foliis latioribus *Lam. et Dec. Fl. fr. V. p. 309. et hoc teste: C. latifolia Fl. fr. III. p. 176. (excl. tamen syn. Jacq. et Hoffm.) C. multiflora Bull. Herb. t. 307. γ . Polygonatum humile anglicum. Rayi Syn. 263. δ flore pleno. Caulis 1-3 ped., glaber. Folia lactius viridia, quam in *C. Polygonato*. Flores 2-5 in pedunculo singulo, magis cylindrici et elongati, quam in *Polygonato*, laciniis minoribus vix sibi incumbentibus. Baccae atro-caeruleae (in *Trago rubrae*). *Smith*. Baccae rubrae etiam apud *Dec. Hoffm. etc.*, 3-4-spermae, odore nauseoso, magnitudine Pisi majoris: at in nostra spontanea, subinde orgyali, omnino atro-caeruleae; quales etiam in americana notat *Torrey*. *In totius Europae, Sibiriae et Americae septentr. rupibus, praeruptis; in Japonia? Thunb. 4.* Obs. *C. dichotoma Thib.*; fol. cordatis, amplexicaulibus; caule ramoso, dichotomo *Pers. Syn. 1. p. 373. Lam. et Dec. Fl. fr. V. p. 309, quam Thibaud in mont. Gebennicis ex uno specimine sine flore, hujus vel C. Polygo-***

'nati forte monstrositas; caulis laevis, parum angulosus, saepe flexuosus; rami alterni, axillares; folia glabra, cordata, acuta, tenuia.

14. *C. bracteata* Thom.; foliis alternis, amplexicaulibus; caule tereti; pedunculis axillaribus, bracteatis, multifloris. Schüz Diss. inaug. praes. Schübler p. 14.

Caulis glaber, simplex, apice nutans, 1-2 ped. (crassitie pennae anserinae, teretiusculus, quidquam tortus), basi vaginâ membranaceâ, scariosâ, lineari-lanceolatâ, obtusâ. Folia secunda, ovato-acuminata (acumine obtuso, basi attenuata, glabra, nervosa (5-nervia), subtus glauca (2¹/₂-3 poll., 1-1¹/₂ poll. lata). Flores secundi, cernui. Pedunculi 2-3 flori, superiores 1-flori (pedicelli floribus breviores); bracteis ovato-lanceolatis, subbinis, integerrimis, apice pedunculi basi corollae affixis (foliaceis 1-1¹/₂ poll., 5-8 lin. latis). Cor. alba (8 lin., infra medium contracta); limbo reflexo virescente (laciniis ovatis, nervo medio subcarinatis, apice puberulis. Filamenta pubescentia). Antherae lineares. Stylus staminibus (vix) brevior, filiformis. Stigma (capitato-) obtusum. Bacca ovata. Similis *C. multiflorae*, sed differt pedunculis bracteatis. Culturâ persistit. Schüz et ad specim. spont. Aliis mera *C. multiflorae* varietas esse videtur. In Helvetia, Canton de Vaud, prope Bex, ubi monente rev. Gaudin in herb. cli Steudel jam per plures annos immutata sese propagat. 4.

15. *C. polyanthema* M. a Bieb.; foliis alternis, amplexicaulibus, elliptico-lanceolatis, acutis, subtus pubescentibus; caule tereti; pedunculis axillaribus, multifloris; pedicellis longitudine floris. M. a Bieb. Suppl. taur. cauc. p. 272. *C. polyantha* Steven in hortis?

Maxime affinis *multiflorae*; differt foliis angustioribus, apice magis attenuatis, subtus ad nervos praecipue pube exili obsitis; pedunculis pedicellisque longioribus; floribus tertiâ parte minoribus, supra germen magis constrictis; filamentis ratione antherarum quidquam longioribus. Corollae lacinulae apice et filamenta, ut in *multiflora*, pubescentia. M. a Bieb.. In Caucasi septentrionalis nemorosis circa Stauropolin. 4.

16. *C. latifolia* Jacq.; foliis alternis, amplexicaulibus, ovatis, acuminatis, (subtus puberulis); caule angulato; pedunculis axillaribus, bi-multifloris; (staminibus glabris). Murr. Syst. Veg. 334. Jacq. Austr. III. t. 232. Host Syn. 194. Flor. austr. p. 441. Gmel. Fl. bad. II. p. 59. Poir. in Lam. Enc. IV. p. 340. Savi Bot. etr. II. p. 222. M. a Bieb. Fl. Taur. Cauc. 1. p. 282. Suppl. p. 242. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 565. Roth En. pl. Germ. I. 2. p. 59. Torr. Fl. N. M. U. St. p. 357. POLYGONATUM latifolium Red. Lil. t. 243. Desf. Ann. Mus. IX. p. 50. Pursh Fl. sept. Am. 1. p. 235. *C. multiflora* β Poir. in Lam. Enc. IV. p. 369. Polyg. III. latiore folio. Clus. hist. 1. p. 276. Bauh. Pin. 303.?

„Cum *C. Polygonato* et *multiflora*, quibuscum crescit, radice habituque conveniens, ut facile confundatur; sed diversa. Rad. paulo tenuior, dulcis, postea subacris. Caulis ¹/₂-2 ped., basi teres,

ceterum angulatus, anguli notabiliores infra medium folii dorsum ortum ducentes, superne brevissime villosulus. Folia ovata, in acumen angustata, sessilia, multinervia, subtus ad nervulos minutissime et ad lentem tantum villosa, integerrima, utrinque nitida, dorso pallidiora, sed nullatenus incana. Pedunculi hirsutuli, in eadem planta unicum, 2 et 3, etiam quaternos, ipsos quoque propriis pedicellis munitos, sustinent flores pendulos, suave olentes. Cor. triplo majores quam in *C. multiflora*, tubulosi, albi, lineis obsoletis viridi-flavescentibus; limbo virente, patulo, obtuso, nec infundibuliformi. Stam. infra medium tubi inserta. Stylus ultra limbi originem elevatus. Bacca globosa, ex caeruleo-nigra; in quovis loculo semina primo virescentia, tandem fusciscentia 3-4, vel 5. Habitus *multiflorae*, flores *Polygonati*, folia *majalis*.⁶⁶ *Jacq.* Caulis foliaque pilis exilibus prostratis. Folia subpetiolata, acuminata. Pedunculi subbiflori. Flores ampliusculi, paulo breviores, quam in *C. Polygonato*. *M. a Bieb. Fl. t. c.* Pedunculi, pedicelli et etiam filamenta pubescentia; folia supra glabra, non latiora, quam in affinis. *M. a Bieb. Suppl.* In specim. nostris austriacis caulis, pedunculi, foliorum pagina inferior omnino pubescentia; filamenta vero glabra; folia vix latiora, sed magis acuminata quam in *C. Polygonato*; flores duplo ampliores, sed vix longiores quam in *C. multiflora*. — In planta americana, quae instar *Asparagi* coquitur, caulis 4-5 ped.; fol. $\frac{1}{2}$ ped., ultra 2 poll. lata; pedunculi 3-6-flori; *Torr. et Nutt. nov. gen. p. 225.* An hujus loci? In *Austria, Germania, Pannonia, Italia, Tauria, America boreali.* 4.

17. *C. orientalis*; caule subarcuato; foliis ovato-lanceolatis, acutis, breviter petiolatis; pedunculis axillaribus, multifloris. *Desfont. Ann. Mus. 9. p. 50. t. 7.* (sub *Polygonato orientali*, uti) *Poiret Enc. meth. Suppl. IV. p. 30.* *Polygonatum orientale, latifolium, flore parvo. Tournef. Corol. 1.*

Caules simplices, erecti vel quidquam arcuati, 8-10 poll.. Folia glabra, alterna, 3 circiter poll., $1\frac{1}{2}$ poll. lata. Flores penduli. Pedunculus gracilis, apice in pedicellos plures 1-floros divisus. Corolla cylindrica, alba, lineis viridibus; duplo minor quam in *C. multiflora*; limbi lacinae ovaes, obtusae, patentes. Stamina flore breviora. *Desf.. In Oriente.* 4.

Quid: *CONVALLARIA australis* in *Hort. Nymphenburg* (ed. 1. tanquam dubia, in ed. 2. ommissa.)?

1343. SMILACINA.

a. SMILACINAE genuinae. *)

1. **Sm. racemosa Desf.*; caule alterne folioso; foliis sessilibus, oblongo-ovalibus, acuminatis, nervosis, pubescentibus; floribus terminalibus, racemoso-paniculatis. *Desfont. Annal. Mus. IX. p. 51.* *Pursh Fl. Am. sept. 1. p. 234.* *Nutt. nov. gen. p. 225.* *Elliott Sk. 1. p. 395.* *Redout. Lil. IV. t. 250.* *CONVALLARIA racemosa Linn. Spec. 452.* *Willd. Spec. II. p. 162.* *Mich. Fl. bor. Amer. 1. p. 202.*

*) *SMILACINAE sigillaria* dixit *Rafinesque*.

Torr. Fl. N. M. U. St. p. 355. Gawl. Bot. Mag. 899.
MAJANTHEMUM racemosum *Link Enum. p. 343. POLYGONA-*
STRUM racemosum *Mönch meth. p. 637. Cornut. Canad.*
36. t. 37. Moris. Hist. III. p. 537. S. 13. t. 4. f. 9. Pluk.
Alm. t. 311. f. 2. Parkins. Theatr. 697. f. 8. β. pumila,
hispido-pubescens. Herb. Banks.

Rad. crassa, alba, geniculata, subtuberosa. Caulis rigidus, duriusculus, simplex v. rarius bifurcatus, subflexuosus, pubescens vel glabriusculus (quod praecipue inferne), compresso - angulosus, sulcatus, saepe altero latere rufescens, 1-3-ped.. Folia 3-6 poll., 1-2 poll. lata, basi in petiolum brevem contracta indeque subamplexicaulia, tenuia, utrinque viridia, nervis subtus praesertim prominentibus pubescentia, breviter ciliata. Racemus terminalis erectus, compositus, valde varius quoad magnitudinem: rhachi angulosâ, pubescente, ramis brevibus, subhorizontalibus, alternis. Pedicelli breves, puberuli, bracteâ minimâ. Cor. parva, albo-flavicans v. viridi-alba, patens, ad basin usque divisa in lacinias oblongas (perangustas dicit *Gawler* de culta), staminibus subaequales, subinde breviores. Antherae crassae, flavae. Germen subrotundum, acuminatum, stylo brevi, crasso. Bacca parva, globosa, rubra, pellucida, punctata; semina plerumque 2 ossea, hemisphaerica. Variat culta foliis longioribus, angustioribus; caule magis herbaceo; paniculâ minus ramosâ, magis spicatâ. Ad spec. sicca et *Torr. Nutt.. In montosis sylvaticis a Canada ad Carolinam. 4.*

2. *S. Forskaliana*; scapo squamato, racemoso; bracteis lanceolatis; pedicellis confertis, patentibus. **CONVALLARIA racemosa** *Forsk. Descr. aeg. p. 73.*

Scapus fasciculatim racemosus; bracteâ sub quovis fasciculo. Flores sine calyce et spatha. Cor. 6-fida, infera. Stam. corollae inserta. Stylus longus. Stigma capitatum. Bacca 1-5-cocca, coccis monospermis, magnitudine pisi. *Forsk. Laudatur quidem a Poiret in Lam. Enc. IV. p. 370. ad C. racemosam americanam; attamen vix ejusdem synonymon videtur. In Arabia. Forsk. 4.*

3. *S. ciliata* *Desf.*; caule alterne folioso, arcuato; foliis sessilibus, ovatis, ciliatis; paniculâ terminali, confertâ. *Desfont. Annal. Mus. IX. p. 55. t. 9. Pursh Fl. sept. Amer. I. p. 235. Nuttall nov. gen. p. 226. (cui dubia.) CONVALLARIA ciliata* *Poir. Enc. meth. Suppl. IV. p. 30.*

Radices albae, crassae, carnosae, articulatae, repentes. Caules simplices, 8-9 poll., inferne nudi, superne foliosi. Folia disticha, longitudinaliter nervosa, pilis brevibus. Flores numerosi, minimi, albi. Corollae lacinae profundae, acutae, ovaes, patentes. Stamina florem superantia. Antherae breves, crassae, tetragonae. Germen pyriforme, stylo brevi terminatum. *Desf. A Virginia ad Canadam. 4.*

4. *Sm. stellata* *Desf.*; caule alterne folioso; foliis amplexicaulibus, lanceolatis s. ovali-lanceolatis; racemo simplici, terminali. *Desf. Ann. Mus. IX. p. 52. Pursh Fl. Am. sept. I. p. 233. Redout. Lil. IV. t. 185. CONVALLARIA stellata* *Linn. Spec.*

Willd. Spec. II. p. 163. Mill. Dict. n. 6. Lam. Enc. meth. 4. p. 370. Mich. Fl. bor. Amer. 1. p. 202. Torr. Fl. N. M. U. St. p. 354. Kniph. Cent. II. n. 18. Bot. Mag. t. 1045. MAJANTHEMUM stellatum Link Enum. 1. p. 345. Morris Hist. III. p. 536. s. 15. t. 4. f. 7. P. spicatum fertile Cornut. Canad. 33. t. 34. β ? uniflora; fol. subfalcato-lanceolatis, glabriusculis; caule unifloro. Pursh Fl. sept. Am. II. p. 733.

Flores saepius etiam tetrandri. *Willd.* Radix subtuberosa, alba, repens. Caulis 1-2-ped., crassus, teres, fere cavus (simplex, striatus, glaber). Folia apicem caulis versus valde approximata, disticha, nunc obtusa, elliptica, nunc magis oblonga acuminata, glabra (vel subtus puberula, striata), utrinque viridia, subciliata. Racemus spicatus, floribus 3-9 confertis. Cor. magna, alba, stellata, laciniis linearibus ad basin usque partitis, obtusis, reflexis. Filamenta corollâ duplo breviora. Antherae parvae, globosae, flavae. Stylus longitudine staminum, trigonus; stigma subtrilobum. Baccæ rubrae (globosae, primum albae, lineis purpureis circularibus, maturae rubrae, sine lineis). *Poiret et Spec. sicc. Gawler* in specimine culto describit caules subgeniculatos, flexuosos, apice villosos; folia recurvo-patentia, subtus nervoso-striata, villosa; superiora obsolete plicata, 2 terminalia fere involucrentia racemum erectum, ovato-oblongum, compactum, pedicellis longitudine diametri corollae; basi bractea parvâ obtusâ albidâ pedicellis multo breviora; coroll. parvam, flavescenti-albam, laciniis ovali-oblongis. β unicum tantum specimen vidit *Pursh* in *Herb. Sherard*; an distincta species? *A Canada ad Virginiam in montibus ad flumina; in America arctica Richardson; β in Hudsons-Bay. 4.*

5. * *Sm. trifolia Desf.*; caule alterne (sub) trifoliato pubescente; foliis oblongo-lanceolatis, (amplexicaulibus); racemo terminali, laxo. *Desf. Ann. Mus. IX. p. 52. Pursh Fl. sept. Am. 1. p. 255. CONVALLARIA trifolia Linn. Spec. 452. Willd. Spec. II. p. 165. Mich. bor. Am. 1. p. 202. Torr. Fl. N. M. U. St. p. 354. Gmel. Sib. 1. p. 56. t. 6.* Rad. longa (repens), geniculata, ad articulos fibrosa. Caulis gracilis, tortuosus, 3-4 poll.. Folia 2-4, plerumque tamen 3, caulina (saepe ovata, nec raro lanceolata, et tunc circiter palmaria), glabra, acutiusecula, utrinque laete viridia. Flores exigui, albi, in pedunculis $\frac{1}{3}$ unc., plerumque 5-9. Cor. ad basin usque partita in lacinias 6, ovatas, acutas. Stamina brevissima, fundo floris adnata. Bacca globosa, rubra, 2-3 sperma: seminibus flavicantibus, rotundatis, compressis, apiculatis. *Gmel.* Herba tota glaberrima, caule stricto et non ad insertiones foliorum flexuoso, ut in *Sm. bifolia*. Antherae nigrae. *Richards. App. Frank. Journ. p. 11.* Caulis etiam 5-6 poll., inferne puberulus, superne glaber, vix flexuosus. Folia superiora amplexicaulia, infimum in petiolum brevissimum subvaginantem attenuatum, nervosa; obtusum acumine brevi, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata. Racemus erectus magis flexuosus, $1\frac{1}{2}$ poll. Pedunculi 1-flori, teretes, glabri, suberecti, remoti, $1-\frac{1}{2}$ -3 lin.; basi bractea minutâ, ovatâ, acutâ, membranaceâ. Cor. lacinae lin., $\frac{1}{2}$ lin. latae. Stamina $\frac{1}{3}$ breviora; antherae ovatae, obtusae. Pistillum stamina supe-

rans; stylus rectus, subulatus; stigma subcapitatum; germen ovatum, longitudine styli. *H. Schreberian.* Baccae rubrae. *Torr.* In Sibiria, et in paludosis profundis altissimorum montium *Allegh.* a Pennsylvania ad Canadam; in America arctica. *Richardson.*

6. *Sm. umbellata Desf.*; foliis radicalibus oblongo-ovalibus, margine carinâque ciliatis; scapo pubescente, basi monophyllo; umbellâ terminali; pedicellis bracteatis. *Desfont. Annal. Mus. IX. p. 55. t. 8. Pursh Fl. sept. Amer. 1. p. 232. Elliott Sk. p. 355. Gawl. Bot. Mag. Nota ad 1403. Trattin. Tabul. 376. S. borealis* α fol. subtrinis; scapo admodum pubescente; corollâ albidâ; laciniis ovali-oblongis, supra areolâ glandulosâ viridi. *Gawl. Bot. Mag. 1155. CONVALLARIA umbellulata Mich. Fl. Am. bor. 1. p. 202. Torr. N. M. U. St. p. 355. C. umbellata Poir. Enc. meth. Suppl. IV. p. 30. CLINTONIA* *) *ciliata* β *Rafinesq. Prodr. nov. gen. in Journ. d. Phys. T. 89. p. 102. MAJANTHEMUM umbellatum Link Enum. p. 343.*

Rad. repens, subtuberosa. Folia plerumque 3, approximata in caule brevissimo, subinde obovata, 4-6 poll., 2 poll. lata, abrupte acuminata, tenuiter membranacea nervosaque. Scapus 6-8 poll., angulatus; corymbo terminali, umbellato, sub-4-floro. Pedicelli pubescentes, 1½ poll., nudi bracteisque ad basin minutis. Cor. magnitudine fere *UVULARIAE sessilifoliae*, e viridi flava, fere ad basin usque 6-partita, laciniis oblongo-lanceolatis, obtusis, subpatentibus. Stam. longitudine corollae. Filamenta gracilia, glabra, basi laciniarum inserta. Antherae albae. Germen oblongum, stylus triangularis, crassus, longitudine fere staminum; stigma 3-lobum. Bacca amethystina, bilocularis, loculis 3-4 spermis. Semina angulosa. *Torr.* In culta apud *Gawler*: „Radix carnosâ, crassitie calami, horizontalis. Folia 3-4-radicalia, vel unicum subcaulinum, profunde viridia, basi attenuata, erecto-patentia, scapo duplo breviora, subtus pallidiora, 4-5 poll., 2-3 poll. lata. Scapus simplex, subaphyllus, teres, pedalis, in corymbum laxiflorum subumbellatum, subinde proliferum (qualis etiam in spontaneis canadensibus passim) terminatus. Pedicelli subverticillati, bracteis minutissimis, caducis. Cor. albida (fuscomaculata *Nutt.*) interdum intus purpurascens, fragrans, stellata, laciniis deciduis, subaequalibus, ovali-oblongis, basi attenuatis, intus areolâ viridi glandulosâ. Filamenta corollâ quidquam longiora, basi germinis inserta, antheris ovato-sagittatis. Germen minutum, ovatum, laeve, pallide virens. Stylus strictus, albidus, germine triplo longior, stigmate pubescente. Bacca sphaerica, loculis dispermis.“ *In montibus Alleghanis a Pennsylvania ad Carolinam. 4.*

Obs. *CLINTONIAE* character genericus apud *Rafinesque l. c.* „Cor. campanulata, 6-phylla, aequalis, colorata, caduca. Stam. 6 fere hypogyna, 3 alternis brevioribus. Germ. globosum, stylo longo, compresso: stigmate compresso, bilobo. Bacca bilocularis, polysperma, seminibus dissepimento insertis.“

7. *S. borealis Gawl.*; subcaulescens; foliis elliptico-obovatis, margine ciliatis; scapo pubescente; umbellâ corymbosâ interdum proliferâ; pedicellis nudis, nutantibus. *Pursh Fl.*

Sept. Am. 1. p. 233. Nutt. nov. gen. p. 225. Bot. Mag.^o 1403. *S. borealis* β fol. subquaternis; scapo subpubescente; corollâ chloroleucâ; laciniis oblongo-lanceolatis, recurvulis, basi aliquantulum conniventibus. Bot. Mag. 1155. DRACAENA *borealis* Ait. Kew. 1. p. 454. t. 5. prolif. Ed. II. 2. p. 278. (excl. syn. Bot. Mag. 1155. α). Willd. Spec. II. p. 158. Dalmann Diss. d. Dracaena 3. 7. Bot. Rep. prolif. t. 206. Torrey in Sillim. Amer. Journ. vol. IV. n. 1. p. 61. CLINTONIA *ciliata* α Rafin. Prodr. nov. gen. in Journ. d. Phys. T. 89. p. 102. CONVALLARIA *borealis* Poir. Suppl. V. p. 737. β uniflora. Menzies.

Radix stolonifera (caulis herbaceus). Folia ad basin caulis 3-4, dense striatula, basi sanguinea, attenuata, complicata, vaginantia, laete viridia, subtus glauca, rotundata cum acumine, $\frac{1}{2}$ ped., 2-3 poll. lata. Scapus (6-8 poll. vel) pedalis, crassitie fili emporetici, glaucus, tereti-angulatus. Pedicelli 4-5, pollicares, inaequales, glauci, apice rubelli, umbellam laxam constituentem, saepe proliferam, vel aliâ laterali sessili ad basin. Cor. turbinate-patens, laciniis oblongo-lanceolatis, basi remotis, ciliatis, extus villosis, revolutis, intus foveolâ elongatâ, 9 lin., 3 lin. latis, glaucis, late flavo-marginatis. Filamenta hypogyna, linearilanceolata, longitudine corollae, basi villosa, antheris subsagittato-oblongis, magnis, flavis. Germen viride, globoso-trigonum. Stylus (staminibus triplo brevior) subclavato trigonus, stigmatem triquetrum, bi-trilobum. Gawler. Bacca azurea. Nutt. Circa Teram novam (Newfoundland) et Sin. Hudsonis, prope Halifax in Nova Scotia. β in ora occidentali Americae borealis. 4.

b. MAJANTHEMA: *tetrandra*.

8. Sm. *bifolia*; foliis ovato-cordatis, petiolatis. CONVALLARIA *bifolia* Linn. Spec. p. 452. Mant. p. 366. Willd. Spec. II. p. 164. Gmel. Fl. bad. II. p. 158. Wahlenb. Fl. Suec. p. 207. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 60. Fl. Dan. t. 291. Mill. ic. t. 105. Kniph Cent. VII. n. 12. Bot. Mag. t. 510. Sturm Deutsch. Fl. 15. H. Svensk Bot. t. 454. CONVALL. *quadrifida* Lam. Fl. fr. III. p. 269. MAJANTHEMUM *cordifolium* Mönch Meth. p. 658. MAJANTHEM. *bifolium* Roth Fl. Germ. II. p. 196. MAJANTHEM. *bifolium* Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 277. Presl in Reliq. Haenk. Fasc. II. p. 132. Balb. Fl. Lyon. 1. p. 715. Desfont. Ann. Mus. IX. p. 53. Rêdout. Lil. IV. t. 216. f. 2. STYRANDRA *bifolia* Rafin. SCIOPHYLLA *convallarioides* Heller Fl. Wirceb. 1. p. 185. BIFOLIUM *cordatum* Fl. Wetter. 1. p. 209. UNIFOLIUM Hall. Helv. n. 1240. UNIFOLIUM *quadrifidum* Allion pedem. 1. p. 124. EVALLARIA Neck. Lil. Convallium min. Bauh. pin. 304. β caulibus rubris; fol. brevius mucronatis, latioribus. Gmel. sib. 1. p. 56. Caulis 3-4 poll. simplex, superne flexuosus. Folia 2, alterna (subtus

petiolisque pilosula); subinde unicum. Racemus terminalis, ovatus. Pedicelli breves, saepe geminati. Cor. parvae, albae, profunde 4-5 fidae. Stigma bifidum: saepe nullum. Baccae rubrae, immaturae nigro-punctatae, biloculares, saepius stylo coronatae. *Conf. Mant.* III. β . caulibus subinde etiam rubro et lutescente variegatis, pilis raris per venas, foliis brevius mucronatis latioribus. — Planta a *Haenke* ad *Nutka-Sound* lecta omnino similis, sed duplo major robustiorque, et folia glabrata vel pilis rarissimis in speciminibus jam defloratis. Variat ceterum, uti nostra, foliis 2-3. *Presl.* In totius Continentis europaei pratis depressis, nemorosis, sylvaticis, inque *Sibiria* (e *Britannia* exul): ad sinum *Nootka* et in portu *Mulgrave*, β in *Kamtshatka*. 4.

Obs. *Cls. Richardson* in *App. Frankl. Journ.* p. vi. adnotat caulem foliisque ciliata, et hinc de *Sm. canadensi Pursh* dubitat. — *Sm. bifoliae* varietas esse videtur *CONVALLARIA trifoliata Kluk* in *Besser Prim. Fl. Gal.* II. p. 357. cum definitione *C. trifoliae Mich.*

9. *S. canadensis Pursh*; caule bi-rarius 3-folio; foliis cordato-oblongis, subsessilibus, utrinque glaberrimis; racemo simplici, terminali; floribus 4-andris. *Pursh Fl. Sept. Am.* I. p. 253. *Nutt. nov. gen.* p. 225. *Barton Fl. Am. sept.* II. t. 70. *Darlington Florul. cestr.* p. 41. (excl. syn. *Willd.*) *CONVALLARIA bifolia Mich. Fl. bor. Amer.* I. p. 201. *Bigel. Fl. Boston.* p. 80. *Torr. Fl. N. M. U. St.* p. 353. (excl. syn. *Willd.*) *C. canadensis Poir. Enc. meth. Suppl.* IV. p. 50. *MAJANTHEMUM canadense Desfont. Annal. Mus.* IX. p. 54. *Redout. Lil.* IV. t. 216. f. 1. *Pluk. Alm.* t. 454. t. 4. β . fol. ovatis, basi vix cordatis. γ . caule trifoliato; fol. lato-cordatis. (Utrumque apud *Pursh.*)

Sm. bifoliae proxima, et forte varietas. Folia ovalia vel oblonga, cordata, subamplexicaulia, nervis tenuibus prominentibus. Flores albi parvi in racemo erecto. *Poir.* Bacca rubra, punctata, pellucida. *Nutt.* Specimina nostra differunt a *Sm. bifolia*, caule humiliore, 2-6 poll., glaberrimo, et foliis subsessilibus, glaberrimis, paulo minoribus, obtusioribus, nervis magis aequalibus, nec 3-5 subtus fortioribus, 12-16 lin., 6-10 lin. latis. Racemus 6-8 lin.; pedicelli $1\frac{1}{2}$ -2 lin., plerumque geminati; bractae parvae, ovatae, concavae. Cor. ut in *bifolia*, sed paulo minor. Filamenta 4, erecto-patentia, basi dilatata; antherae magnae ovatae, concavae. Stylus crassus, filamentis brevior. Stigma bilobum. („Baccae parvae, globosae, immaturae rubro punctatae, pellucidae“ *Torrey*, cui non distincta videtur ab europaea, quod tamen est.) Hujus loci est *C. bifolia var. canadensis* apud *Poir. Enc.* IV. p. 371. In sylvis umbrosis ad arborum radices et in uliginosis montium *Americae septentrionalis*. 4.

1344. F L Ü G G E A.

1. *Fr. japonica Rich.*; foliis linearibus, acutis, recurvatis, basi membranaceo-vaginatibus; scapo nudo, ancipiti, foliis duplo brevioribus; racemis secundis, paucifloris; bracteolis lanceolatis, flore longioribus; stylo perianthiis brevioribus. *Rich.* in *Schrad. n. Journ.* II. B. 1. St. p. 1 — 9. *CONVALLARIA ja-*

ponica Linn. *Suppl.* p. 204. *Willd. Spec.* II. p. 160. *Thunb. Fl. Japon.* p. 139. *Desf. Ann. d. Mus.* IX. p. 47. *a major* fol. 2-pedalibus; scapo spithamaeo. *Thunb. l. c.* *Willd. l. c.* β *minor*; fol. palmaribus, scapo duplo longioribus. *Thunb. et Willd. l. c.* *Mondo Kaempf. Amön.* 825. c. icone MS. f. 44. *C. japonica* Red. *Lil.* II. t. 80. *Trattin. Tabul.* t. 205. *Desf. Ann. Mus.* V. Ann. 1. Cah. p. 45. SLATERIA *japonica* Desv. *Journ. d. Bot.* 1. p. 244. OPHIOPOGON *japonicus* Hort. *Kew.* II. 2. p. 281. *Bot. Mag.* 1063. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 48. POLYGONASTRUM *compressum* Mönch *Meth. Suppl.* p. 268.

In α (quae forte, monente jam olim div. Richard, species diversa), Folia radicalia, 10 vel ultra, linearia, inferne attenuata, trigona, inde plana, striata, recurva, 2-ped. et ultra. Scapus anceps, tenuissime striatus, glaber, apice floriferus, tetragonus, cernuus. Pedunculi aggregati, 2-6, plerumque uniflori, raro 2-4-flori, a basi ad medium filiformes, dein incrassati, glabri, cernui, unguiculares, albi, aetate virescentes. Bractea lanceolata, alba, pedunculo brevior. Cor. alba, laciniis lanceolatis, patulis, lin. longis. Filamenta fere nulla. Antherae lineares, acutae, erectae, fuscae, corollâ breviores. Stylus filiformis, erectus, longitudine corollae, albus. Stigma simplex, obtusum. Bacca ovata, obtusa, glabra, calyce persistente ornata, caerulea, magnitudine pisi. Semen 1, album, totam haccam replens. *Thunb.* In β spontanea: radix fibrosa, tuberculata, alba. Folia inferne membranâ tenuissimâ involuta, linearia, acuta, striata, integra, incurvata, secunda, glabra, palmaria vel ultra, $\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapus anceps, glaber, foliis duplo brevior. Flores ut in α . Bacca ut in α , caerulea, intus albida, carne tenui. Semen ut in α , duriusculum, diaphanum, odore alliaceo. *Thunb.* Culta cespitosa, subspithamaea. Rad. repens, fibris tuberoso-nodosis. Folia radicalia perennia, fasciculata, 4-6-poll., $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, basi erecta, dein recurva, obtusiuscula, intus subconcava, basi crassiora et utrinque membranâ albidâ vel fusciscente. Scapus foliis brevior. Flores spicato-racemosi, racemulis 1-6-floris. Bracteae sub pedicellis 1-floris acuminatae, carinatae, 2-3 lin.. Cor. rubello-albicans, patens, diametro 6 lin., laciniis oblongiusculis, obtusis. Antherae sagittato-subulatae, flavae, uti stylus trigonus. Bacca subviolacea, magnitudine pisi majoris, pellucida, splendens. Prope Nagasaki in Japonia, et in Chinae dumetis. 4.

2. Fl. spicata; scapo nudo; racemo spicato; floribus aggregatis. *Thunb. jap.* p. 141. (sub CONVALLARIA *spicata*, uti *Willd. Spec.* II. p. 161. et *Desf. Ann. d. Mus.* IX. p. 48.) OPHIOPOGON *spicatus* Ker.; fol. lineari-ensiformibus, erectis, nervosis, basi imbricato-vaginatibus; scapo triquetro, stricto, foliis longiore; racemo erecto, multifloro; bracteolis lanceolatis, flore brevioribus; stylo perianthiis longiore. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 47. *Bot. Mag.* 1065. *Bot. Reg.* 593. *Bot. Cab.* 694. LIRIOPE *spicata* Lour. *Cochin.* 1. p. 200. (fid. R. Brown.) Rad. fibrosa. Folia radicalia, linearia, inferne attenuata, obtusiuscula, multistriata, glabra, scapo longiora. Scapus striato-angu-

latus, simplex, erectus, glaber, palmaris usque pedalis. Racemus digitalis, flosculis sparsim aggregatis. Pedunculi teretes, patentes, glabri, uniflori, lineam longi. Cor. 6-petala, subglobosa, glabra, violacea: petala ovata, obtusa, concava. Filamenta 6 germi inserta, brevissima, erecta. Antherae ovatae, didymae, erectae. Germen sexstriatum, glabrum. Stylus erectus, albus, staminibus brevior. Stigma simplex. Fructus obscurus; sed bacca videtur globosa. In alio specimine videbatur capsula 3-locularis, seminibus in singulo loculamento 2. *Thunb.* In culta: Folia inaequalia, longiora nunc ped., 8 lin. fere lata, extima brevia, dura, vaginas aemulanti. Scapus tereti-angulatus, rigidus, violaceo-virescens, vix crassitie pennae corvi. Fasciculi 2-4-flori, pedicelli raro solitarii, floribus parum longiores, erecti, 1-flori, cum flore articulati. Bractee partiales squamae breves, oblongae, obtusae, subsquarroso-imbricatae fuscae; communes subherbaceae, acuminatae, infimae longiores. Flores 3 lin. fere in diam., dilutius violacei, nitidi, inodori; laciniis oblongis, basi pallentibus, interioribus latioribus, ovatis. Stam. corollâ $\frac{2}{3}$ breviora; filamenta antheris fere aequalia, firma, distanti-incurvescentia; antherae luteae, erecto-conniventes, demisso polline vibratiles. Germ. supra depresso-orbiculatum, trigibbum: ovulis parallelis, imo angulo annexis, ovato-oblongis. Stylus obsolete violaceus, longitudine staminum, puncto stigmatoso, pallido, glanduloso, triangulari. Fructus in specim. sicco spontaneo intense violaceus videtur, et sec. *R. Brown* ejusdem naturae ut in *PELIOSANTHE Teta, Bot. Reg.* In *Japonia, China, Cochinchina et in Nepal.* 4.

Obs. *LIRIOPE spicata* *Lour.* (quae a *clis. Willd. et Poir.* ad *SANSUVIERAM zeylanicam*, a *clo. Haw.* ad *SANS. spicatam* ducitur); „planta acaulis, perennis, bulbo oblongo, solido, fusco, subtus radiculis serpentibus. Folia plurima, congesta, ensiformia, stricta, glabra, suberecta, ped.. Scapus nudus, teres, tenuis, rectus, foliis subaequalis. Spica solitaria, longa, teres, simplex, terminalis, erecta. Flos minusculus, albo-caeruleus, inodorus. Cal. spatha 1-valvis, ovata, incurva, 1-flora, parva, persistens. Cor. campanulata, infera, 6-partita, patens; laciniis oblongis, reflexis, carnosis, aequalibus. Filamenta 6 subulata, erecta, aequalia, corollâ breviora, receptaculo insidentia. Antherae oblongae, stantes. Germen subrotundum, superum. Stylus crassus, sulcatus, staminibus aequalis. Stigma simplex. Bacca ovata, glabra, carnosa 1-sperma. Semen ovatum.“ *Frequenter in China et Cochinchina.*

5. *Fl. intermedia*; foliis linearibus, obtusis, strictis, basi distinctis, margine serrulatis; scapo triquetro, foliis duplo brevioribus; racemo paucifloro; bracteolis linearibus, margine scabris, flore brevioribus; stylo perianthium aequante. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 48. (sub *OPHIPOGONE intermedio.*)

Folia palmaria, angusta, vix lin. lata. *Don.* In *Nepal.*
Wallich. 4.

1545. STREPTOPUS.

1. *STR. amplexifolius* *Dec.*; foliis amplexicaulis, utrinque glabris; pedunculis solitariis, medio genu deflexis. *Dec. Fl. fr.* III. p. 174. *Annal. Mus.* XI. p. 88. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 558. *Red. Lil. t.* 259. *Tratt. Tabular. t.* 574. *STR. amplexicaulis* *Poir. Enc. meth.* VII. p. 467. *Pohl Tent. Fl. boh.* II. p. 15. *Roth Enum.* II. p. 71. *Sturm Deutsch. Fl. fasc.* 41. *STR. distortus* *Bess. Gal. n.* 399. *Uvc.*

LABIA amplexifolia Linn. Spec. 436. Mant. p. 564. Willd. Spec. II. p. 93. Mattuschk Siles. n. 237. Wulf. in Jacq. Coll. IV. p. 314. Savi Bot. etrusc. II. 223. Schkuhr Handb. 1. t. 93. Waldst. et Kit. t. 167. Hayne term. bot. t. 32. f. 5. UVULARIA *amplexicaulis* Mill. Dict. n. 1. De- larbr. Fl. Auv. 213. UVULARIA *distorta* Hortul. Hall. helv. n. 1237. Barrel. t. 719. 720. Moris. Hist. 3. S. 13. t. 4. f. 11. Clus. Hist. 1. p. 276. β . *americanus*. STREPTOPUS *distortus*; glaber; foliis amplexicaulibus, margine glabris; pe- dunculis distortis, medio geniculatis; antheris sagittatis, acu- minatis, filamenta multoties superantibus. Torrey Fl. N. M. U. St. p. 553. Mich. Fl. bor. Amer. 1. p. 200. Pursh Fl. sept. Amer. 1. p. 233.

„Pedunculus geniculo flexo. Corollae MEDEOLAE *asparagoidis*.“
 Linn. Mant. Rad. horizontalis, fusca: fibris contortuplicatis. Caulis erectus, ramosus vel simplex, 1-2-ped., teres, fistulosus, subflexuosus, glaber vel basi pilis sparsis, setosis, fuscis. Folia fere CONVALL. *Polygonati*, ovali-oblonga e basi cordata, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll., $1\frac{1}{2}$ poll. lata, acuminata, viridia, nervosa, subtus glaucescentia. Pedicelli geniculati, solitarii, sub folio, filiformes, poll. et ultra, primum recurvato-patentes, a geniculo refracti. Flores flavo-virentes. Cor. campanulata; laciniis recurvis, lanceolatis, acutis, 4 lin., $\frac{1}{2}$ -1 lin. latis. Filamenta subulata, brevissima; antherae basi sagittatae, longe acuminatae. Stylus crassus, fila- menta superans: stigmata simplicia, reflexa. Bacca globosa, ru- bra. β . clo Torrey distinctus videtur ab europaeo. „Caulis „(in americano)“ 2 ped., glaberrimus, ramis plurimis dichotomis. Folia 2-4 poll., ovato-lanceolata, multinervia, acuminata. Flo- res parvi, viridi-flavi, solitarii, in pedunculis filiformibus, axilla- ribus, $1\frac{1}{2}$ pollicaribus. Petala lineari-lanceolata, reflexa. Fi- lammenta brevissima, plana. Antherae sagittatae, in acumina longe subulata attenuata. Germen ovatum, sessile. Stylus crassissimus. Stigmata fere integra.“ Torr.. In montosis sylvaticis a Su- detis ad Italiam usque; β in America boreali et Groen- landia. 2.

2. STR. *lanuginosus* Mich.; subcandicanti-lanuginosus; foliis sessilibus, basi subcordatis, acuminatis; pedicellis in bre- vissimo stipite geminatis; floribus majusculis virescentibus. Mich. Fl. bor. Amer. 1. p. 201. Pursh Fl. sept. Am. 1. p. 232. Ell. Sk. 1. p. 393. Torrey Fl. N. M. U. St. 1. p. 553. Poir. Enc. VII. p. 468. Tratt. Tabul. 665. UVULA- RIA *lanuginosa* Pers. Syn. 1. p. 560. Cawl. Bot. Mag. 1490. Flores fere triplo majores quam in roseo Mich.. Rad. generis. Caulis ped., apice ramis 2-4 divergentibus, viridi-fuscus. Folia ovato-lanceolata, 3-nervia, reticulato-venosa, supra nuda, sub- tus lanuginosa, (alterna, subundulata, 2 poll., poll. et ultra lata. Pedunculi dichotomi, 2-flori, brevissimi; pedicelli flavescenti- virides, 4-5 lin., penduli. Corollae lacinae superne patentes, lineari-lanceolatae, acutiusculae, apice incurvae, virescenti-fla- vae, 10 lin.. Antherae flavae, cum filamentis corollâ triplo bre-

viores. Stylus longitudine fere corollae, superne 3-fidus, flavo-virens.) Caps. baccata, rubra, trigibba, subinde oblonga, loculo 1 fertili. *Gawl.* In montibus altis Carolinae borealis. 4.

5. *STR. roseus Mich.*; glaber, lucidus; foliis amplexicaulibus, serrulato-ciliolatis; antheris brevibus, bicornibus. *Mich. Fl. bor. Am.* 1. p. 201. t. 8. *Pursh Fl. Sept. Am.* 1. p. 252. *Nutt. gen. am.* 1. p. 224. *Elliott Sk.* 1. p. 392. *Torr. Fl. N. M. U. St.* p. 352. *Poir. Enc.* VII. p. 468. *Trattin. Tabul.* 666. *UVULARIA rosea Pers. Syn.* 1. p. 360. *Gawl. Bot. Mag.* 1489. *HEXORIMA dichotoma Rafin. Neog.* 1814. *Med. Rep. New York. T. V.* p. 350.

Caulis erectus, subflexuosus, teres, glaber (dichotomus, 18 poll.). Folia ovato-lanceolata, nitentia, utrinque glabra, acute acuminata (multinervia, membranacea). Flores solitarii, axillares. (Flores axillares terminalesque, solitarii vel gemini in pedunculo horizontaliter patente *Nutt.*) Pedunculus filiformis, pendulus, poll. et ultra (pedicellis medio geniculatis). Cor. lacinae profundae (roseae), angustissimae, lanceolatae, fere acuminatae. Stam. corollâ duplo breviora. (Germen sessile, turbinatum, subtriangulare. Stylus longitudine staminum. Stigmata 3 minuta. *Torr.*) *Mich.* et *Torr.* In culta: caulis inferne glaber, remote foliosus, teretiusculus vel anguloso-striatus; superne dichotomus, flexuosus, densius villosus; rami saepius compressi, pubescentes. Folia subbifaria, ovata, ciliata, immerse sub 7-costata (inferiora 2-2½ poll., 2 poll. lata), superiora sensim minora, numerosiora et internodiis duplo longiora, omnia serius margine subrevoluta (laete viridia, subtus pallidiora). Pedunculi hirtelli, solitarii sub foliis, quibus pluries breviores, uno versu extrorsum distorti, recurvati, subuniflori: inferiores medio saepius rudimento pedicelli cum flore abortivo. Cor. campanulata, subrecurva, ⅓ poll., rosea (extus ad laciniarum dorsum intensior). *Gawl.* In montibus altis a Canada ad Carolinam borealem. 4.

4. *St. simplex Don*; glaber; caule erecto, simplicissimo; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, basi amplexicaulibus; floribus axillaribus, longe pedunculatis; perianthii foliolis ovalibus. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 48.

Caulis 1-2 ped. Folia 3 poll., unc. lata. Pedunculi filiformes, 2-poll. Filam. basi dilatata; antheris apice mucronatis. *Don.* In Nepal. *Wallich.* 4.

1546. DRAPIEZIA.

1. *DR. multiflora Blume Enum. pl. jav.* 1. p. 8. *LETHEAE spec. Noronka fig. ined.* *UVULARIA multiflora Reinw. ined. Enum. Hort. Buitenz.* p. 62.

Herba perennis. Rad. fibrosa. Caulis ramosus, ramis dichotomis. Folia alterna, nervosa. Pedunculi oppositi, medio folio conformi bracteati. Pedicelli subumbellati, uniflori. Flores purpurascetes. *Blume. Tamia et Kitamian incol.* In sylvis montanis insulae Javae. 4.

1347. DRYMOPHILA.

1. *D. cyanocarpa* R. Brown prodr. Fl. nov. Holl. p. 292.

Rad. repens, nodulosa. Caulis infra simplex, erectus, aphyllus, stipulis semivaginantibus, distantibus, supra foliatus, porrectus, nunc divisus. Folia disticha, sessilia, e torsione baseos coarctatae resupinata. Pedunculi axillares et terminales, solitarii, uniflori, ebracteati, inarticulati. Flores albi. Baccae pendulae, caeruleae. Seminum testa membranacea. R. Brown. In insula van Diemen. 2.

1348. RIPOGONUM *)

1. *R. parviflorum* R. Br.; caule inermi, (radicante); foliis oppositis, (ovato-lanceolatis); racemis divisis; perianthio antheris 5-6ies brevior. R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 239. *R. scandens* Forst. Gen. p. 25. t. 25. Poiret Enc. meth. VI. p. 212. SMILAX *Ripogonum*; caule inermi, tereti, radicante; fol. ovato-lanceolatis, acuminatis, 5-nervi- bus; floribus hermaphroditis. Forst. Prodr. n. 572. Willd. Spec. IV. p. 784.

Caules sublignosi, saepius ad summos arbores scandentes, tenacissimi, ad articulos nodosi, radican-tes; nodi distantia ped.; rami pauci, laeves, teretes, fusco-virides; ramuli simplicissimi, diffusi, basi squamis 2 vaginalibus, oppositis. Folia integerrima, laevia, 3 poll., reticulata. Petioli semiteretes, $\frac{1}{2}$ poll. Racemi erecti compositi, pedales; ramis oppositis, patentibus. Pedicelli breves, uniflori, basi glandulâ axillari. Calyces minutissimi, laciniis acutis. Cor. o. Stamina subsessilia. Antherae longae, virides. Baccae parvae, rubrae, globulosae, biloculares, 2-spermae. Semina alba, uno latere convexa, altero plana. Poiret ad Forst. Mss. — In nova Zeelandia. h.

2. *R. album* R. Br.; caule aculeato; ramulis inermibus; foliis alternis s. oppositis ternisve; racemis indivisis; perianthio antheris parum longiore. R. Brown prodr. Fl. nov. Holl. p. 293.

Circa P. Jackson. h.

Obs. SMILAX *purpurata* Forst., quae clo Poiret ad RIPOGONUM spectare videtur, nobis SMILAX erit.

1349. ONCUS.

1. *O. esculentus* Lour. Fl. Coch. 1. p. 240. *O. Onorrhiza* Pers. Syn. 1. p. 374.

Frutex scandens, teres, ramosus, inermis, acirrui. Radix tuber maximum, ovatum, inaequale, farinosum, edule. Folia cordata, subrotunda, acuminata, alterna. Spicae laxae, tenues, longae, subterminales. Flores pallidi. Cal. diphyllus (bracteae?); fo-

*) Frutices volubiles, caule quandoque aculeato, ramulis inermibus. Folia quandoque verticillata vel alterna, triplinervia, reticulato-venosa, petioliis tortis non cirriferis. Racemi axillares et terminales, pedicellis, basi obracteatis. R. Brown.

liola acuta, erecta, parva, basin corollae amplectentia. Cor. pilosa, tubo oblongo, sursum dilatato: limbo parvo: laciniis subulatis. Filamenta basi laciniarum corollae inserta. Germen oblongum, superum. Stylus brevis, 3-partitus. Stigmata oblonga. Bacca corallina. Semina subrotunda. Differt a *Dioscoreis* fructu, calyce, corollâ floribusque hermaphroditis. *Lour.* In sylvis *Cochinchinae*. h.

1350. LAPAGERIA.

1. *L. rosea Ruiz et Pav.*; foliis ovato-lanceolatis, 5-nervibus; corollis intus maculatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 65. t. 297. Poir. Enc. Suppl. III. p. 299.*

Fruticosa, biorgyalis et ultra. Radix fasciculata, filiformis, longissima, *SMILACIS Sarsaparillae* instar. Caulis volubilis, ramosissimus, subteres, granulis minimis exasperatus, inferne defoliatus, nodosus, petiolis marcidis fuscis squamatus; rami diffusi, longissimi, flexuosi, similes; juniores foliosi. Folia alterna, remota, petiolata, ovato-lanceolata ovataque, acuta, integerrima, supra nitida, coriacea, venosissima, utrinque 5-nervia; nervis lateralibus margine appropinquatis, 2-3 poll., (1-1½) poll. fere lata. Petioli 2-5 lin., contorti, supra canaliculati, subtus striati, ad basin latiores, semiamplexicaules, post foliorum delapsum dilatati, marcescentes, fusci, profundius striati. Pedunculi axillares terminalesque, breves, plerumque poll., solitarii, 4-flori, squamis 10 rubicundis ovato-lanceolatis, acutis, concavis, semiamplexantibus, membranaceis, (carinatis, nervosis), sparsis, inferioribus imbricatis, superioribus remotis, nitidis, deciduis. Flores penduli formosissimi. Cor. sub 2-poll., (3 poll. in specim. in Herb. *cli Martius* ab *Eschscholz* lecto), rosea, aliquando roseo-punicea, glabra, intus punctis albis maculata, campanulata. Petala conniventia, superne patienti-reflexa, oblongo-cuneiformia, (obtusata potius cum acumine parvo, nervis longitudinalibus, flexuosis), decidua: 3 exteriora, (7 lin. lata) sessilia, basi purpureo-violaceâ intus concava; (interiora oblongo-obovata, paulo longiora, 10 lin. lata). Filamenta subulata, latiuscula, plana, rosea. Antherae lineari-lanceolatae, basi vix excavatae, quadrisulcae, biloculares, stylo breviores, lateribus longitudinaliter dehiscentes, luteae. Germen oblongum, acutum. Stylus filiformis, erectus, petalis brevior. Stigma obsolete 3-striatum, simplex. Bacca oblongo-ovata ovalisque, acuminata, obtuse trigona, pendula, laevis, albido-lutescens, parvi ovi gallinacei magnitudine. Sem. obovata, plerumque truncata, laevia, nuda, cornea, receptaculo triplici per parietes decurrente affixa, luteo-fulvescentia, acinorum uvarum magnitudinis, in pulpa alba dulci nidulantia. *Ruiz et Pav.* In sylvis provinciae *Rere et Itatae Chili* per arborea scandens. h.

1351. PHILESIA.

1. *Ph. buxifolia Lam. illustr. t. 248. Poir. Enc. V. p. 269. Willd. Spec. II. p. 231. Ph. magellanica Raensch. Nom.*

Frutex parvus, ramis flexuosis, erectis, alternis, basi stipulis? axillaribus, spathaceis. Folia alterna, petiolata, glabra, revoluta,

ovato-elliptica, integerrima, vix $\frac{1}{2}$ poll., utrinque acuta. Petioli brevissimi, basi dilatata caulem semiamplexantes. Flores solitarii, axillares terminalesque. Pedunculi brevissimi, squamis distiche imbricatis. Cor. magna, campanulata; petala 3 interiora $1\frac{1}{2}$ poll., ovata, obtusa, rotundata, apice mucronata, basi angustata; 3 exteriora duplo breviora, basi vix attenuata. *Poir et. Ad fretum magellanicum. Commerson. h.*

Obs. Ad PHILESIAM forte spectare plantam a *Dombey* in Peruvia lectam, CAPIA dictam, quae familiae ASPARAGINEARUM, habitu foliisque SMILACIS, sine cirris vero ad latera foliorum. Floris character fere PHILESIAE, a qua laciniis tantum calycis differt omnibus aequalibus. Fructus bacca edulis. Amplificando characterem generis PHILESIAE hanc intraret, nisi malles genus distinctum, sed affine PHILESIAE, CAPIA dicendum. *Jussieu apud Poir et.*

1352. CALLIXENE.

1. *C. marginata* *Juss. gen. ed. Usteri* p. 47. *Poir. Enc. meth. Suppl.* 1. p. 56. *Pers. Syn.* 1. p. 373. *C. magellanica* *Raenschel. ENARGEIA marginata Gaertn. fruct.* 1. p. 283. t. 59. f. 3. *Willd. Spec.* II. p. 230.

Frutex PHILESIAE facie. Caules graciles, parum elevati, ramosi, angulosi, nodosi, articulati, inferne foliis exiguis, remotis, squamiformibus, superne foliis alternis, sessilibus, duris, coriaceis, integerrimis, ellipticis, nervosis, margine crassiusculis, semiamplexicaulibus, acutis, integerrimis. Flores solitarii, terminales, folio supremo stipati, vix pedicellati, squamis 2-4 parvis. Cor. magnitudine *Hyperici*, petalis ovato-oblongis, concavis, acutis, aequalibus. Stamina petalis duplo breviora. Bacca parva. Semina 3-5 in locello singulo, rufescentia. *Poir. In Madagascar, Commerson, ad fretum Magellanicum et in insulis Maluinis. h.*

1353. LUZURIA GA.

1. *L. radicans* *Ruiz et Pav.*; caule radicante; foliis lanceolatis, obliquis; pedunculis 2-4-floris; floribus variegatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv.* III. p. 66. t. 298. *L. umbellis axillaribus, pedunculatis; foliis oblongo-lanceolatis, obliquis; caule radicante; ramis tetraquetris. Reliqu. Haenkean. Fasc.* II. p. 150.

Suffruticosa, glabra, 2-3-org. et ultra. Caulis teres, gracilis, flexuosus, per truncos arborum reptans, geniculatus, ramosissimus, ad genicula vaginatus et radicans; vaginis brevibus, rufescentibus; radiculis solitariis, flexuosis, simplicibus, longis. Rami divergentes, acute tetragoni, parum flexuosi, tenues, basi biarticulati, bivaginati, ultra basin squamam amplexicauli; juniores solummodo foliosi. Folia alterna, sessilia, acuminata, utrinque 9-13-nervia, nervis alterne prominentioribus, integerrima, venoso-reticulata, margine obsolete scabra, basi leviter contorta, subtus albicantia, plerumque poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata. Pedunculi axillares, solitarii, 2-3-4-fidi, 2-3-4-flori, articulati, vaginati, foliis breviores, in flore cernui, in fructu erecti. Petala lanceolata, acuta, interiora latiora obsolete venosa, filamenta stylusque albedo-lutescentia, punctis et lineis rubris variegata. Filamenta linearia, plana, crassiuscula, brevia, erecta. Antherae tetragonae, longae, corollam breviores, biloculares, luteae, magnae, punctis

rubris maculatae. Germen superum, ovatum, antherarum longitudine. Baccaglobosa, parum carnososa, trilocularis, dissepimento membranaceo tenuissimo, rubra, ciceris magnitudine. Semina 2 in singulo loculo, subreniformia, hinc convexa, inde angulata, cornea, angulis dissepimenti alternis affixa. Semen unum alterumve saepe abortit. *Ruiz et Pav.* In sylvis regni Chilensis ad Coliumo praedium et in Palomares nemoribus; in Peruvia. *Haenke.* 4,

2. *L. montana* *R. Br.*; umbellis axillaribus, pedunculatis; ramis striatis ramulisque scabris. *R. Brown Prodr. Fl. Nov. Holland. p. 282.*

*Circa P. Jackson. h. *).*

3. *L. cymosa* *R. Br.*; cymis terminalibus, bipartitis; ramis teretibus; ramulis striatis, laevibus. *R. Brown Prodr. Flor. nov. Holland. p. 282.*

Circa P. Jackson et in Nova Hollandia tropica. h.

1354. E U S T R E P H U S. **)

1. *E. angustifolius* *R. Br.*; foliis linearibus v. lineari-lanceolatis; pedicellis geminis solitariisve; filamentis distinctis; antheris defloratis, apice strictis. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 281. Link Enum. 1. p. 340. LUZURIAGA angustifolia Poir. Suppl. III. p. 535.*

Folia poll. et 5 lin. longa, 2 lin. lata. Corolla 4 lin., alba, extus virens. *Link. In nova Hollandia intra tropicum. h.*

2. *E. latifolius* *R. Br.*; foliis ovatis vel elliptico-lanceolatis; pedicellis aggregatis; filamentis basi connatis; antheris defloratis apice tortilibus. *R. Brown Prodr. Nov. Holl. p. 281. Ait. H. Kew. ed. 2. II. p. 273. Link Enum. p. 340. Sims. Bot. Mag. 1245. LUZURIAGA latifolia Poir. l. c. MEDEOLA angustifolia Hortul.*

Caulis lacte viridis, flexuosus, ramosus; rami basi stipulâ carneâ. Folia alterna, brevissime petiolata, integerrima, acuminata, laete viridia, 2-3 poll., vix poll. lata. Pedunculi axillares, solitarii vel geminati, terminales aggregati, tenuissimi, capillares, penduli, 1/2 poll. Corollae tubus filiformis, lilacinus, 1/2 poll.; limbus diametro 2/3 poll.: lacinae oblongae, obtusae, lilacinae, stellato-patentes; interiores margine ciliis longis fimbriatae. Antherae subsessiles, luteae, erecto-conniventes, laciniis vix breviores. Stylus antheras paulo superans, albus. *Ex icone. Variat foliis duplo et triplo latioribus. Sims. Circa P. Jackson et in Nova Hollandia tropica. h.*

*) Utrique (Brownianae) „pedicelli cum perianthii basi subattenuatâ articulati. Bacca nigra, quandoque monosperma. Forsan a planta peruviana genere diversae.“ *R. Brown. Poir. Enc. meth. Suppl. III. p. 535. non tantum species Brownianas cum peruviana, sed etiam EUSTREPHUS cum peruviana LUZURIAGA conjunxit.*

**) Suffrutices facie MEDEOLAE asparagoidis, volubiles. Folia nervosa. Pedicelli axillares et terminales, aggregati, medio articulati. Flores dilute purpurascens. Caps. subglobosa, flava. Semina majuscula, atra. *R. Brown. Conf. Obs. ad LUZURIAGAM.*

1355. RHUACOPHILA. *)

1. Rh. *javanica* Blum.; pedunculis bifidis, paucifloris. *Blume Enum. Pl. jav. 1. p. 14.*

In summo montis Gede, faucibus ignivomis vicino; in Java. h.

2. Rh. *celebica* Blum.; pedunculis omnibus dichotomis, multifloris. *Blume Enum. pl. jav. 1. p. 14.*

In Celebes montibus vulcanicis. h.

1356. ASPARAGUS.

a. *Inermes.*

1. * *A. officinalis*; caule herbaceo, tereti, erecto, paniculato; foliis setaceis; stipulis caudatis, membranaceis, acutis; floribus dioicis. *Brotero Fl. lusit. p. 523. A. c. h. t. e;*

foliis setaceis, fasciculatis; stipulis subinde paribus, basi mucronatis. *Willd. Enum. H. berol. p. 373. et, hoc teste: A.*

officinalis γ *atilis. Willd. Spec. II. p. 150. Linn. Spec. 448.*

(excl. β). *Smith Engl. Fl. II. p. 152. Fl. brit. 569. Engl. Bot. t. 339. A. caule herbaceo, erecto, paniculato; floribus*

dioicis; pedunculis in medio articulatis. *Lam. Enc. 1. p. 294. Gmel. Fl. bad. II. p. 49. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 173.*

Mert. et Koch D. Fl. II. p. 560. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 54. Wahlenb. Fl. suec. p. 204. Bresler Asp.

Diss. n. 31. Guss. Pr. Fl. 1. p. 420. Fl. Dan. t. 805. Svensk Bot. 213. Mill. ic. 57. t. 55. f. 1. Plenck off.

Gew. t. 276. Hayne off. Gew. VIII. 29. Regnault Bot. Schkuhr Handb. t. 96. Ludw. Ectyp. t. 78. A. sativus

Mill. Dict. Hall. Helv. n. 1259. β . A. off. α maritimus;

crassiore folio *Linn. Spec. 448. Willd. Spec. II. p. 150. A. off. β maritimus*

Smith Engl. Fl. II. p. 155. van Hall. Spec. bot. p. 142. Fl. Belg. sept. 1. p. 278. Roth l. c. A.

maritimus Mill. Dict. n. 2. A. marit. crassifol. Bauh. Pin. 490. γ strictus

Dethard. apud Mert. et Koch l. c. δ . serotinus; caule triquetro, obtusangulo, herbaceo; aculeis stipularibus, setaceis; fol. capillaribus, fasciculatis. Wender.

Cat. H. Marb. 1807! „Caules herbacei, erecti, paniculati. Stipulae solitariae, exteriores et binae interiores minores, quas inter folia terna, raro 4 s.

5 linearia; sed in summis ramis, ubi nulli flores; at in infimis ramulus. Pedunculi gemini, laxi, uniflori, penduli, geniculo articulato. Cor. campanulata, petalis interioribus longioribus.“

Linn.. Stipulae basi spinam recumbente molli, ut in A. declinato, unde affinitas. Linn. Mant. p. 366. Rad. subrepens, fibris longis, crassis, carnosis, apice vix squamosa. Caules annui, ramosi,

*) Suffrutices ramosae. Radix fibrosa. Folia graminea, lineari-elongata, subcarinata, disticha, basi vaginantia, nervoso-striata. Pedunculi axillares et terminales, divisi. Pedicelli subsfasciculati, basin versus unibracteolati, cum perianthio articulati. Flores caerulei.

foliosi, pedales, in cultis 5-pedales. Folia parva, laete viridia, acuta, glabra. Stipula solitaria, membranacea, lanceolata, subinde 2 interioribus minoribus stipata; supremâ brevi, lacera. Flores axillares pedunculati, 2-3, virentes, inodori. Stylus brevissimus. Stigmata maturo fructu ad basin usque divisa. Bacca coccinea, magnitudine Ribis. *Smith.* Stipulae basi retrorsum acutae et demum subpungentes: *Brotero*; inermes, basi vix deorsum appendiculatae: *Bertol.* In β caulis procumbens. *Smith.* Caulis decumbens, pedunculi articulati, nodulo flori approximato: *van Hall*, qui plantam suam caule tereti, sulcato, inferne nudo; pedunculis corollâ longioribus; corollae limbo post florescentiam non reflexo; floribus hermaphroditis; stylo nullo differre dicit ab *A. maritimo* *Pall.* *Lam.* *A. officinali* β *maritimo* L. adjecit: *officinalem* γ *altilem* ex hoc sibi videri ortum, pariter dioico pedicellisque medio nodosis, et non nisi staturâ humiliore magis foliosâ, pedunculis flore brevioribus distincto. Mirum, nec *Smith* notasse plantam hanc, et cultam et spontaneam, renuente licet divo Linnaeo in *Mant. alt.* p. 366. (scribente: „Hanc speciem dioicam esse *Ger. prov.* 134; certe *hortensis* non est dioica“) *Reichard*, plerumque esse dioicam. In *Europae arenosis, maritimis, et in insulis fluviorum, in Tauria, Sibiria, Japonia, America, forte ex Europa.* 4.

Obs. Confer *Hellenius* diss. de Asparago; resp. *Pruss.* Abo. *Bresler* Diss. de Asparago. 8. Berol. 1816. *Vothmann*, von Anlegung und Wartung d. Spargels. 8. Flensburg 1784. *C. F. Seidel*, kurze Anweisung Spargel mit wenigen Kosten und zugleich vorzüglich schön zu bauen. 3. Aufl. Erlangen 1786. *Engelthaler*, neuer Spargelkalender. 8. Prag u. Wien 1793. Gründliche Anweisung, den Spargel schön und zugleich dauerhaft anzulegen. 3. Aufl. 8. Budiss. 1802. *F. F. von Lamsdorf*, das Spargelbuch etc. 8. Linz 1819. *Der Ulmer Spargelgärtner.* 8. Ulm 1721. In *Allg. Garten-Magazin* J. 1806. p. 183. *Ibid.* *Wundram* 426. *Ibid.* *Idem* 1809. p. 93. *Ibid.* p. 151 *T. T.* 1810. p. 14. *Neu. Allg. Gart. Mag.* I. p. 221. *Macculloch.* p. 223. *Smith.* p. 224. *D. Judd.* II. p. 235. *A. Dickson.* Confer etiam *Dingler Polyt. Journ.* De germinatione Asparagi vide *Mirbel Annal. Mus.* XIII. p. 156. t. 14. f. 27-38.

2. *A. scaber* *Brign.*; caule herbaceo, tereti, erecto, striato, scabro; foliis plerumque 8, internodio longioribus, setaceis, crassis, scabris; (stipulis basi dilatatis, deorsum mucronatis); pedunculis folio brevioribus, (supra medium articulatis incrassatisque); floribus hermaphroditis. *Brign. Fasc. pl. Forojul.* p. 22. *A. amarus*; c. h. t. e., subscabro; fol. set., fasciculatis; stipul. spinescentibus, patulis, subuncinatis; flor. abortu diclinis; pedunc. medio articulatis. *Dec. Cat. monosp.* 1812. p. 81. *Fl. fr.* V. p. 309. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 561. *Host. Fl. austr.* 1. p. 439. *Red. Lil.* 446. *A. officinalis* α *maritimus* *Moric. ven.* 1. p. 168. et *A. amarus ejusd.* (fid. *Poll. Fl. Ver.* p. 356. sub *A. off. α maritimo*; prior forte rectius ad β *A. officinalis.* *A. officinalis* *Ruchinger lid. ven.* p. 22. *Moretti Osserv. all. Fl. ven. del. Moricand* p. 3. *Asp. marinus* *Clus. hist.* 2. p. 179. (fide *Dec. et Host*, a *Smith* ad *officinalem* ducitur). *Magnol. bot. monosp.* 30. *Sauv. monsp.* 45. n. 152. *Zannich. ist.* p. 24 t. 74.

„Differt ab *A. officinali* (cujus varietas maritima etiam in nostro littore frequens): fructibus duplo majoribus; stipulis vere spine.

scentibus; turionibus intense amaris; magnitudine et rigiditate omnium partium; caule interdum subscabro; foliis cujusvis fasciculi numerosioribus." *Decand.* Turiones vix unquam calamo scriptorio crassiores. Caules rigidi, ramosissimi, ramos inter obtuse angulati, scabridi, pallidi, basi crassitie digiti minimi; rami alterni, paniculati, erecti, superne angulati et magis scabri; basi stipulâ ovato-triangulari, acutâ, carinatâ, striatâ, glabrâ, 2-3 lin., basi appendice brevi retrorsum spinescente. Folia 3-8, plerumque 3-5, in fasciculo, subulata, subtetragona, marginibus carinatâque cartilagineo-scabrida, breviter mucronata, erecta et erecto-patentia, 3-10 lin.; basi stipulâ ovatâ, acutâ, carinatâ, membranaceâ, diaphanâ, glabrâ, erectâ reflexâque, vix ultra $\frac{1}{2}$ lin.. Pedunculi in caule, ramis et foliorum axillis inferioribus gemini, rarius plures, reflexi, subangulati, medio vel supra medium articulati, infra articulum scabri, supra glabri et incrassati, 4-5 circiter lin.. Flores apud nos dioici, hermaphroditi sec. *Bertoloni*, subcampanulati, profunde 6-fidi, flavescenti-virides, glabri, 3 lin.; tubus limbo duplo brevior; limbus post florescentiam non revolutus, vix patens; lacinae lineari-lanceolatae, obtusae vel acutiusculae, margine submembranaceae, dorso intensius coloratae, $\frac{1}{2}$ -1 lin. latae. Stamina corollâ duplo fere breviora; filamenta capillaria, longitudine antherarum oblongarum obtusarum flavarum, $\frac{3}{4}$ lin.. Germen subglobosum, basi quidquam attenuatum. *In arenis maritimis Occitaniae, prope Magalonam et ad ostia Rhodani, ad littus maris adriatici, in Foro Julio, prope Tergestum; Parmam etc.* 4.

3. *A. maritimus* *Pall.*; caule ramosissimo ramisque patentissimis flexuosis; foliis setaceis, subpungentibus; floribus campanulatis, dioicis; pedunculis geminis, reflexis, longitudine floris, (sub eodem geniculatis). *M. a Bieb. Fl. taur. cauc. Suppl. p. 270. Pall. it. 2. p. 329. Link Enum. p. 340. Bresler Asp. diss. n. 30. (excl. syn. ad amarum spectantibus).* *A. officinalis* varietas humilis brevifolia. *M. a Bieberst. Fl. taur. cauc. 1. p. 281. A. Tauscheri Fisch. in litt. ad Bieb..*

Rad. transversalis fibris carnosis, ut in *A. officinali*. Caulis humilior, obtusangulus, brevibus intervallis valde flexuosus, indeque a basi ramosissimus: ramis ramulisque elongatis, patentissimis, fere horizontalibus, caulique similibus. Stipulae basi vix mucronatae. Folia multo breviora, quam in *A. officinali*, rigidioraque, patentissima; infima sena, mox quaterna, plerumque terna, ad apicem bina et solitaria. Pedunculi in caule et ramis primariis axillares: nodulo flori approximato. Flores subcampanulati, profundius, quam in *officinali*, partiti: limbo post florescentiam reflexo, patulo. Staminum rudimentum in femineis, pistilli in masculis. Stylus longitudine germinis globosi. Stigma minutum. Bacea *A. officinalis*. *M. a Bieb. In campis vastis salsugineis et arenosis maris Caspii et in transwolgensibus ad lacum nderiensem.* 4.

Obs. *A. Bresler* hanc speciem cum *scabro* conjunxit; sed distincta videtur ex diagnosi et descriptione. Anno huc potius, quam ad *officinalem* β . *maritimum*: „*Asparagus* I caule duriore et magis tortuoso, foliis brevioribus et succulentioribus, *Gmel. sib. 1. p. 38.* „cui“ caulis 2-3 cubitor., teres v. angulosus, ab imo ad medium fruticosus, nec superius omnino mollis, basi leviter rubens, hinc albidus, squamis ad quartam usque partem primo rubentibus,

demum albescentibus, et in locis squamarum tumens. Folia brevia, post anthesin longius excrecentia, angusta, carnosa, acutissima, 5-6 simul, cauli non appressa, sed exstantia. Flores paullo oblongiores et angustiores, quam in officinali, ultra dimidium secti, extus fundum versus spadicei et virides, limbum versus albescentes, striis viridibus varii, interne albescentes. In regione munimenti *Ubensis Barabensium*. Varietatem floribus penitus rubentibus notat 6 leucis septentrionem versus a munimento Itkulensi Isetonis provinciae.

4. *A. tenuifolius* Lam.; humilis; caule herbaceo, erecto, tereti, ramosissimo, folioso; floribus hermaphroditis (vel abortu monoicis); pedunculis longis, sub flore nodosis. *Lam. Enc. I. p. 294. Lam. et Dec. Fl. fr. III. 173. V. p. 309. Syn. p. 155. Lois. Fl. gall. p. 204. Seb. et Maur. prodr. fl. rom. p. 130. Bresler diss. d. Asp. n. 33. Mert. et Koch Deutsch. Fl. II. p. 562. Redout. Lil. 434. A. sylvaticus; caule herbaceo, erecto, tereti; foliis setaceis, semiverticillatis verticillatisque; stipulis solitariis inermibus; floribus dioicis. *Waldst. et Kit. pl. rar. Hung. t. 201. Willd. Enum. I. p. 373. Host. Fl. austr. I. p. 459. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 55. Asp. officinalis β Linn. Spec. 448. A. officinalis δ Linn. Mant. 366. Asp. officinalis β sylvestris Willd. Spec. II. p. 150. Vill. Delph. II. p. 275. A. sylvestris tenuissimo folio Bauh. Pin. 490. Tournef. Inst. 300. Matth. 478. c. ic. β Asp. collinus Jan., nodulo magno suborbiculari sub flore. γ pedunculo sub flore incrassato-articulato, vix noduloso. Asp. tenuifolius Müller in Herb. Reise-Verein.**

Radices fasciculatae, plures, crassitie pennae anserinae, 2-4 poll., pallide fuscae; radiculis brevibus fibrosis. Caules plures 1¹/₂-2 ped., erecti, crassitie culmi triticei, teretes, laeves, ad medium usque indivisi et aphylli, dein paniculato-ramosi. Folia setacea, acuta (7-8 lin.), 40 et plura in fasciculis 2 ad ramorum ramulorumque basin; summa 7-10 omnino verticillata. Stipulae solitariae, membranaceae, fuscescentes, lanceolatae, inferiores interiores integerrimae, summae dentatae. Aculei nulli. Flores dioici, axillares e singulo foliorum verticillo, propendentes; pedunculis folia subaequantibus, laxis, filiformibus, purpurascens, sub flore incrassatis (articulatisque). Cor. cylindraco-campanulata, viridis; petala obtusa margine submembranacea, apice incurva, longitudine aequalia (dorso, praesertim apice intensiora), exteriora apicem versus concavam latescentia, interiora linearia, planiuscula. Stam. cor. medium parum excedentia, 3 breviora; filamenta filiformia; antherae subrotundo-ovatae, pallide flavescens. In masculis loco pistilli rudimentum subglobosum angulis 6 obtusis. In femineis: germen subrotundo-ovatum, vix sulcatum; stylus erectus, brevis; stigmatibus 3-fido. Baccae pendulae, globosae, magnitudine Cerasi, laeves, nitidae, coccineae, styli basi persistente mucronatae; loculis 2-spermis; medulla alba, subcarnosa, dulci. Sem. magna, glabra, nigra, latere unico planiuscula, ceterum convexa, hilo albo. Differt ab affini officinali: fol. longioribus, tenuioribus, ad basin ramorum sessilibus; floribus axillaribus supra fasciculos foliorum; pedunculis sub flore nodosis; laciniis corollae apice reflexis; baccis triplo majoribus, cerasi fere magnitudine, inflorescentia praecociore. *Waldst. et Kit.*

Kit. Diff. ab *officinali* et *amaro*: tubo corollae brevissimo; antheris minutis, subrotundis, staminibus multo brevioribus. *Mert.* et *Koch.* Turiones edules, sed tenuiores durioresque quam in *altii* et quidquam amari. *Bertolon.* Occurrit etiam in hortis nomine *A. maritimi*. In *sylvaticis Banatus, Hungariae, Croatiae, Podoliae, Galliae australis et Italiae; β prope Parmam; γ in agro fluminensi.* 4.

Obs. Etiam nobis, uti elis *Bresler, Mertens* et *Koch, Asr. tenuifolius Lam.* vix ab *Asr. sylvatico Kibl.* differre videtur, cum uterque ex descriptione non nisi floribus hermaphroditis vel dioicis distinctus videatur, et ipse *Rédouté* in *Asr. tenuifolio Lam.*, (qui hermaphroditus dicitur) saepe flores abortu monoicos vel germina stylo destituta observasset. Specimina omnia, quae nomine *Asr. tenuifolii* et *sylvatici* accepimus, non differunt, et in omnibus flores masculos cum germine sine stylo, vel flores femineos cum staminum vestigiis invenimus, nunquam vero flores hermaphroditos staminibus pistillisque completis. Clo *Jan* specimina debemus nomine *A. collini Jan* insignita, quae illi forte ad *Asr. tenuifolium Lam.* pertinere, certe vero ab *A. sylvatico Kibl.*, in quo flores dioici, diversa videntur. Nos, qui *A. collinum Jan* cum speciminibus *A. sylvatici* ab ipso *Kitaiabel* acceptis, comparavimus, utrumque vix distinguere possumus; nam etiam *Asr. collino Jan* flores dioici, cum in floribus omnibus, quos dissecuimus, germen incompletum absque stylo invenimus. *Asr. collinus* vix ergo distinguendus, nisi foliis paulo brevioribus crassioribusque, stipulis sub ramis foliisque paulo majoribus, pedunculis quidquam longioribus, nodulo sub flore multo fortiori, orbiculari; floribus paulo majoribus minus virescentibus sed flavescens; perianthii laciniis apice minus reflexo-patentibus, sed erectiusculis, obtusioribus; filamentis paulo longioribus. Reliqua exacte ut in *Asr. sylvatico Kibl.* In *γ* etiam germen absque stylo.

5. * *A. declinatus*; caule inermi, tereti; ramis declinatibus; foliis setaceis. *Linn. Spec.* 449. *Roy. lugd.* 29. *Lam. l. p.* 294. *Mill. Dict.* n. 7. *Thunb. Fl. cap.* ed. *Schult.* p. 333. *H. Hew.* ed. 2. II. p. 273. *A. fol. fasciculatis, capillaribus; stipulis solitariis, muticis, acutis; pedunculis geminis, foliis brevioribus, medio geniculatis.* *Bresl. Asp. diss.* n. 32. *β caule minore, ramis surrectis.* *Lam. A. mauritanus H. Paris.*

Similis *A. officinali*; sed altior, foliis pluribus, duploque longioribus. Caulis annuus, (teres.) Stipulae solitariae, lanceolato-sulcatae, basi deorsum mucrone membranaceo. Folia 7-10, filiformia, patentia. Planta mea mas est e *C. b. spei.* *Willd.* Caulis gracilis, debilis, ramosus, 5-4-ped.. Folia fasciculata, 3-9-na. Ad ortum rami singuli et sub axilla cujusvis fasciculi foliorum stipula parva, membranacea, basi in mucronem spinosum terminata, et utrinque acuta, amplexicaulis. Flores minores, quam in *A. officinali*, plures in ramis ex eodem puncto. Pedunculi 2-3 lin. *Lam.* *Thunberg* caulem glabrum dicit, uti folia et ramos divaricatos, *Bresler* notat perianthium infundibuliforme, cujus medio stamina inclusa inserta, antheras oblongas, germen globosum, flores declinos. *β foliis copiosioribus in fasciculo.* In *Prom. b. spei, Royen; in ile de France.* *Lam.* 4.

6. *A. dauricus Fisch.*; caule herbaceo, erecto; ramis rectis; foliis fasciculatis, setaceis, elongatis; pedunculis solitariis, nutantibus. *Link Enum.* 1. p. 340. *Spreng. Syst. Veg.* II. p. 95. *Bresler Asp. Diss.* n. 29. Caulis 2-3-ped.. Folia pauca in fasciculo, poll. et 6 lin. longa. Pedunculi 3 lin.. Corolla parva. *Link. Intermedius mariti.* *Syst. Vegetabil.* Vol. VII.

mum inter et *officinalem*; forte hujus alteriusve varietas. *Bresler*. In *Davuria*. 4.

7. *A. caspius Hort. Vindob.*; caule herbaceo, erecto; ramis patentibus; foliis fasciculatis, setaceis; floribus campanulatis, dioicis; pedunculis axillaribus, geminis, reflexis, infra medium geniculatis.

Rami horizontaliter fere patentes, ramulosi, non flexuosi, angulosi, striati et sub lente ad strias obsolete scabriusculi, glaucescenti-virides, parum elongati. Stipulae triangulari-ovatae, acuminatae, membranaceae, dorso carinatae, basi mucronulo obsolete subpungente, $1\frac{1}{2}$ - 2 lin., superiores minores. Folia plerumque 5 in fasciculis alternis, rarius 3-4, undique patentia, rigidula, acuta, glaucescenti-viridia, sub lente tenuissime cartilagineo-serulata, 6-10 lin. longa; stipula parva ovata acuta membranacea sub singulo fasciculo. Pedunculi gemini, 1 ex utroque latere axillae, teretiusculi, glabri, floribus longiores, 4 lin., superne paulo incrassati; geniculo basi propiore. Cor. profundius 6-fida quam in *A. officinali*, quo paulo minor, longe persistens, 2 lin. longa; lacinae oblongae, obtusae, virescenti-albidae dorso striâ intensiore, apice campanulato-patentes, sed non reflexae. In feminis germen ovatum, in stylum erectum corollam subaequantem, apice trifidum desinens. Staminum rudimenta membranacea. Baccae globosae cum acumine parvo e stylo persistente, basi corollâ persistente diaphanâ cinctae, rubrae, minores quam in *Asp. officinali*. Proximus *A. davurico*, ut videtur; sed rami patentes, folia duplo fere breviora, pedunculi gemini. Affinis etiam *A. maritimo Pall.*; sed rami nec elongati nec valde flexuosi, folia longiora, pedunculi infra medium, nec sub flore geniculati; horum limbus non reflexus, etc. Ad specimen in Herb. cli. *Panzer* a *Zeyher* communicatum. Ad mare caspium, 4.

8. *A. tricarinatus Dec.*; subaculeatus, scandens; ramis divaricatis; foliis canaliculatis, triquetris, subverticillatis; floribus pusillis. *Redout. Lil.* 451. *A.* caule inermi; fol. fasciculatis, triquetris, canaliculatis; floribus solitariis geminisque. *Bresler diss.* n. 28.

Radix dura, lignosa; fibris teretibus, fuscis; cortice carnosâ, intus albis, sapore dulciusculo. Caules novelli squamis imbricatis, triangularibus, oblongis, acutis; vetustiores basi $1\frac{1}{2}$ - 5 lin. crassi, teretes, fusciscentes, squamis remotis, quidquam tuberculis retrorsum spiniscentibus, sarmentosi, 5-ped., 1-2 ped. supra terram ramosi; rami patentes ex axilla fasciculi foliorum 6-7 subverticillatorum, inferiores saepius in spinam brevem abortientes; ramuli divaricati vel penduli, scandentes. Ramorum apices, uti folia, triquetri, tricarinati, sub apice foliis crassiores, magis canaliculati striatique, basin versus sensim subcylindrici. Folia 6-7, inaequalia, 4-12 lin. longioraque, subfalcata, implicata. Stipulae breves, molles, sub foliorum fasciculis; in ramis fortioribus subspinescentes. Flores parvi, $1\frac{1}{2}$ lin., solitarii in axillis foliorum solitariorum in ramulis brevibus, terminalibus. Pedunculi filiformes longitudine florum. *A. verticillato Linn.*, saltem iconi in *Buxb.*, affinis; sed flores multo minores. *Redout.* Habitat? In frigidariis horti parisini. 4.

9. *A. verticillatus*; caule subscandente, ramis divaricatis;

foliis setaceis, arcuatis; floribus subquaternis, patulis, dioicis; corollis globosis. *Marsch. a Bieberst. Fl. Taur. cauc.* 1. p. 281. *casp.* p. 80. *Willd. Enum. h. berol.* p. 373. *Spec. pl.* II. p. 155. *Linn. Spec.* 450. *Smith Prodr. Fl. gr.* p. 235. *A. caule inermi*; foliis fasciculatis, linearibus, (senis); floribus 4-5. *Bresler Asp. diss. n.* 27. *A. officinalis volubilis* *Pall. ind. in Nov. Act. Petrop. X.* p. 309. *Buxb. Cent. V.* app. 47. t. 37. β *caucasicus.* γ *sibiricus* *Fisch. H. Gorenk.*

Folia fasciculata undique patentia, nec verticillata. Turiones sapidissimi. *M. a Bieb.* Scribitur passim, sphalmate, *verticillaris.* Caulis scandens, herbaceus, fere volubilis, (in cultis ad 8 ped. usque), basi crassitie pennae gallinae vel digiti minimi, junior totus purpurascens - fuscus, squamis remotis; vetustior profunde viridis, teres, sulcatus vel striatus, ad ramos et superne compressiusculus, glaber; rami numerosissimi, angulati, striati, torti, glabri. Folia in fasciculis semiverticillata (8-10), ad ramificationes numerosa, in ramulis plerumque 3-6, apicem versus solitaria; anguste linearia, acuta, nunc reflexa, nunc patentia vel erecta, falcata (in cultis tamen minus), intense viridia, lucida; in maribus breviora angustioraque, 3-4 lin., vix $\frac{1}{3}$ lin. lata; in feminis 1-1 $\frac{1}{2}$ poll. (in cultis saepe 2 poll.), $\frac{1}{2}$ lin. lata. Stipulae basi dilatatae, subtriangulares, acuminatae, reflexae, saepius deciduae, fuscae, glabrae vel dorso pilis sparsis brevibus, in caulibus plerumque induratae, reflexae, triangulares, fuscae, pungentes; in ramulis ovatae, longe acuminatae, membranaceae, foliis multoties breviores. Flores e foliorum fasciculis, plerumque 4, rarius 2 vel 3, (in culta tamen saepius 2 vel 1). Pedicelli divergentes vel erectiusculi, teretes, fusci, glabri, medio articulati, 1-2 $\frac{1}{2}$ lin.. Corolla parva, subglobosa, in masculis mox decidua, in femineis (saepe abortivis) longius persistens; lacinae ovatae, acutiusculae, concavae, flavescenti-virides, lin., $\frac{1}{2}$ lin. latae. Filamenta brevissima, flavescentia; antherae oblongae, flavae. Baccae rubrae, magnitudine Pisi majoris. Semen globosum, nigrum. *In Tauria, circa Derbent; Smyrnam inter et Bursam; in Podolia Besser; circa Odessam. Lang.*

10. *A. Breslerianus*; caule inermi, flexuoso, erecto; foliis lineari-subulatis, rectis, subpungentibus, ternis; floribus geminis, dioicis; corollis infundibuliformibus. *A. verticillatus* *Herb. Schreb.* *A. verticillatus a triphyllus* *Bresl. Diss. d. Asp. n.* 27.

Speciem hanc certe distinctam in memoriam diximus cli *Bresler*, qui primus ejusdem meminit in *Diss. de Aspar.* In specim. in *herb. Schreb.* asservato: caulis 1 $\frac{1}{2}$ ped., valde flexuosus, sed vix scandens, erectus ut videtur, basi teres et sub lente puberulus, ramos inter glaber et subangulatus; inferne squamis albidis diaphanis acutiusculis, infimis subvaginantibus, 5-lin.; rami alterni, fere horizontaliter patentem, basi teretiuseculi, apice angulati, glabri, 2-3 $\frac{1}{2}$ poll.. Stipulae ad basin ramorum ovato-lanceolatae, acuminatae, carinatae, membranaceae, subdiaphanae, glabrae, minime spinescentes, ramis appressae vel apice reflexae, 2 fere lin.. Folia semper fere 3, rarius 2 vel 4, horizontaliter

patentia, inaequalia, 2 lateralia medio plerumque $\frac{1}{3}$ breviora, recta, minime arcuata, acumine subpungente, glabra, nitida, intense viridia, minora 2, majora 6 lin. longa; basi stipulâ parvâ ovatâ acutâ membranaceâ diaphanâ $\frac{1}{2}$ lin.. Flores gemini in axillis ramorum et foliorum inferiorum, in nostro spec. masculi, breviter pedicellati, recti, duplo triploque majores, quam in *A. verticillato*, magnitudine *A. officinalis*. Pedicelli teretes, fuscescentes, glabri, sub corollae basin articulati, lin.. Corolla ad basin fere usque 6-partita, subinfundibuliformis, 2 fere lin.; lacinae lineari-oblongae, obtusiusculae, carinatae, basi erectae, superne quidquam patentis, raro subreflexae, $\frac{3}{4}$ lin. latae. Filamenta filiformia, corollâ duplo fere breviora, longitudine antherarum; antherae lineari-oblongae, obtusae, flavae, $\frac{1}{4}$ lin.. Stylus? Germen incompletum ovato-globosum, glabrum. Bacca? *Hab.?*

11. *A. filicinus* *Hamilt.*; caule erecto, ramosissimo; foliis inaequalibus, quinis, linearibus, falcatis, mucronatis, uninerviis; pedunculis unifloris, axillaribus, solitariis, geminis, pedicellatis, folio brevioribus, fructiferis longioribus. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 49. *A. Curillus* *Roxb. Hort. Beng.* p. 24. *Ad Suembu Nepalensium* *Hamilton, in Sirinagur Kamroop.* 4.

12. *A. umbellatus* *Bresler*; caule inermi tereti; foliis fasciculatis, capillaribus; floribus terminalibus, umbellatis. *Bresler Aspar. diss. n.* 25.

Caulis herbaceus, glaber, crassitie pennae corvinae. Rami erecti, subfastigiati, alterni simplices. Folia alterna, 6-8, approximata, alaria, acuta, vix unguicularia. Stipulae solitariae, extrafoliaceae alaresque membranaceae, ovatae, acutae, minutissimae. Flores umbellati, rarissime verticillati, 16-20. Involucrum polyphyllum; foliola plurima, membranacea, ovata. Pedunculi foliis paullo longiores, infra medium geniculati, 1-flori. Perianthium campanulatum, laciniis erectis. Stamina basi perianthii inserta, inclusa. Antherae oblongae. Germen globosum. Stylus erectus, trifidus. Stigmata reflexa. Flores abortu (?) diclini. *Bresler. In Canariis. De Buch.* 4.

13. *A. umbellulatus* *Bresler*; caule inermi, tereti; foliis fasciculatis, capillaribus, recurvis; floribus axillaribus umbellatis. *Bresler Asp. Diss. n.* 24.

Caulis glaber. Rami alterni. Folia setacea, subpollicaria. Flores 8-10. Bractee plurimae, involucrum simulantes. Pedunculi brevissimi, medio geniculati. Perianthium campanulatum. Lacinae lanceolatae, erectae. Stamina medio perianthii inserta, lacinas aequantia. Filamenta subulata. Antherae oblongae. Germen globosum. Stylus trifidus. *Bresler. In insul. Mauritii. Hilsenberg, Sieberi* assistens. 4.

Obs. Specimina a *Sieber* in *Herb. Fl. maurit.* nomine *A. declinati* divulgata, quae in *Herb. eli Panzer* etiam nomine *A. umbellati* *Reichenb.* vidimus, aliquibus recedunt ab *A. umbellulato* *Bresler*, ut ex eorum descriptione patebit. Caules inermes, inferne teretes, superne angulosi, glabri, saepius torti, vix erecti, sed potius declinati vel subscaudentes; rami alterni angulosi, glabri, striati, reflexi, 2-4-poll.. Folia 3-6 fasciculata, triquetrosulcata, acuta, subpungentia, sulcata, erectiuscula, subinde subarcuata, sieca

fuscescenti-viridia, 1-1½, poll. Stipulae ad basin ramorum reversae, triangulares, cinerascens, vix ultra lin., siccae subspinescentes. Flores axillares terminalesque, 4-10 subumbellati, erecto-patentes, hermaphroditi, ut videtur. Bracteae plures, parvae, ovatae, acutae, marcescentes, vix involucrum simulant. Pedicelli subtrigoni, glabri, foliis multoties breviores, paulo infra medium geniculati, 1½-2 lin. Perianthium campanulatum, 2 fere lin; lacinae flavescenti-albidae, dorso magis tinctae, oblongae, obtusae, basi paulo angustatae, erecto-patentes. Stamina basi laciniarum inserta iisque paulo breviora; filamenta subulata, antheris longiora; antherae ovatae, obtusae, basi dilatatae, flavae. Germen ovatum. Stylus erectus, apice saepe flexus, stamina aequans, obsolete trifidus.

14. *A. grandiflorus Willd.*; caule scandente; foliis linearibus, inermibus, fasciculatis. *Reliq. Willd. Ms.* *A. caule inermi, anguloso; foliis fasciculatis, capillaribus; floribus axillaribus umbellatis. Bresler Asp. Diss. n. 23.*

Caulis hinc inde tortus, striatus, inermis, valde ramosus, pubescens; ramis reflexis aut patentibus, angulosis. Folia 1½ poll., obtuse trigona, obsolete scabriuscula, uti caulis, 8-12, acutissima, angulosa. Stipulae alares, ovatae, acutae. Bracteae plurimae, membranaceae. Florum fasciculi in apicibus ramulorum una cum foliis, 12-15. Pedunculi geniculati, foliis dimidio breviores. Cor. parum major, quam in *Asp. officinali*, fere *Convall. majalis*; laciniis corollae ovalibus, obtusis. Filamenta basi dilatata, inclusa, perianthii basi inserta. Antherae subsagittatae. Germen globosum. *De Schlechtendal fil. et Bresler. In Teneriffa. Broussonet. h.*

15. *A. scandens Thunb.*; herbaceus, inermis, volubilis; foliis lanceolatis, falcatis. *Thunb. Fl. cap. ed. Schult. p. 335. Willd. Spec. II. p. 152. H. Kew. ed. 2. II. p. 273.* *A. fol. ternis, linearibus. Bresler Asp. diss. n. 3., et hoc teste: A. pectinatus; caule scandente, inermi; foliis lanceolatis, distichis, ternatis; floribus axillaribus. Redout. Lil. t. 407.*

Cls. Thunberg cum? huc adduxit *A. aethiopicum*; *Sprengel* sine dubio junxit, licet inermem. „Caulis filiformis, glaber, ramosus. Rami solitarii, alterni vel terni, subcompressi, divaricati, subsimplices. Folia terna, sessilia, acuminata, integra, glabra, patentia, inaequalia, vix unguicularia. Stipulae sub ramis et foliis scariosae, partitae.“ *Thunb.* Caulis scandens, gracilis, angulosus, striatus; rami breves, angulo recto patentes. Folia plerumque 3, disticha, ita ut 1 alterum, 2 alterum latus spectent, lineari-lanceolata, acuminata, subfalcata, glabra, 6 lin., 1½ lin. lata; folia sub floribus plerumque solitaria vel gemina breviora; ad basin fasciculi singuli stipula membranacea, profunde fissa. Flores pauci, penduli, solitarii. Pedicelli axillares, foliorum longitudine vel paulo longiores, graciles, supra medium geniculati, supra geniculum incrassati, rufescentes. Perianthium ad basin usque divisum in lacinias concavas, acutas, albidas, basi violaceas, praesertim dorso, sub fecundatione rotato-patentes; 3 exteriores ovatae, 1½ lin.; interiores breviores angustioresque. Stamina longitudine perianthii; filamenta alba, subulata; antherae subrotundae, flavae. Germen viride, pyriforme, 4-sulcatum. Stylus filiformis, albus, longitudine staminum. Stigmata 3 arcuata, divergentia. Bacca globosa, magnitudine Pisi, aurantiaca. Semen 1, nigrum. *Redouté*, qui de *A. scandente* dubitat. *Sti-*

pulae ramorum ternae, ovatae; foliorum solitariae, fimbriatae, foliis duplo breviores. Pedunculi solitarii geminique, foliis longiores. Perianth. subglobosum. Stam. inclusa. Antherae oblongae, longitudine filamentorum. *Bresler*. Specimina culta *A. scandentis* satis bene conveniunt cum descriptione *A. pectinati Red.* In *Prom. b. spei, sylvis Houtniquas.* 4.

16. *A. crispus Lam.*; caule herbaceo, debili, tortuoso; ramis recurvis, flexuosis, subcrispis; floribus solitariis; pedunculo nudo. *Lam. Enc. 1. p. 295. Poir. Suppl. Enc. 1. p. 482. (excl. syn. Jacq.) Bresler Asp. Diss. n. 22.*

Glaucus, *Fumariae* quodammodo similis. Caulis 2 ped., tenuis, subscandens. Rami ad caulem arcuati, dein adscendentes, crispi, foliosi. Folia parva, linearia, acuta, plerumque gemina, subinde terna, 2-3 lin., subinde patenti-opposita. Flores solitarii, capite aciculae haud majores, in pedunculo 3 lin. non articulado, sub flore parum incrassato. *Lam.* qui flores apertos non vidit. In *Isle de France. Commerson.* 4.

17. *A. decumbens Jacq.*; herbaceus, inermis, decumbens, ramosissimus: ramis flexuosis (subreflexis); foliis subsetaceis; pedunculis terminalibus solitariis. *Jacq. H. Schönbr. 1. p. 71. t. 97. Willd. Spec. II. p. 151. Enum. p. 373. H. Kew. ed. 2. II. p. 273. Bresler Asp. Diss. n. 21.*

Radices fasciculatae, tuberosae, albidae, unciales, (crassitie digiti minimi, utrinque acutae, carnosae, striatae. *Jacq.*). Caulis 2 ped.), angulosus, glaber, debilis (viridis), ramis alternis ramulosis. Folia sessilia, terna, capillaria, trigona, acuminata, 2 fere lin.. Stipulae extrafoliaceae, solitariae, membranaceae, ovatae, acutae, integerrimae. Pedunculi axillares (filiformes), uniflori, foliis duplo longiores, $\frac{1}{2}$ unc., infra perianthium geniculati. Perianthii lacinae lanceolatae, obtusae, reflexae (albidae), longitudine staminum harum basi insertorum. Filamenta subulata. Antherae oblongae (aurantiatae). Germen ovatum, subtrilocum. Stylus brevis, trifidus. Stigmata obtusa, (patentia). Bacca stylo terminata, subtrigona. *Bresler. Poir. Enc. Suppl. I. p. 482 junxit cum crispo. Ad Promont b. spei.*

18. *A. subulatus Thunb.*; frutescens, inermis; ramis retrollexis; foliis tereti-subulatis. *Thunb. prodr. p. 63. Fl. cap. ed. Schult. p. 333. Willd. Spec. II. p. 154.*

Caulis teres, glaber, flexuoso-erectus, virescens, pedalis et ultra. Rami alterni, breves, ramulosi: ramulis similibus flexuosis. Folia fasciculata, terna, sessilia, acuta, striata, glabra, unguicularia. Flores axillares, sessiles. *Thunb. In Prom. b. spei.*

19. *A. flexuosus Thunb.*; herbaceus, inermis; caule flexuoso; foliis lanceolatis. *Thunb. prodr. p. 66. Fl. cap. ed. Schult. p. 333. Willd. Spec. II. p. 151.*

Caulis laxus, filiformi-subangulatus, striatus, glaber, scandens, ramosus. Rami alterni, retroflexi, ramulosi, breves. Folia fasciculata, tria vel pauca, acuta, glabra, vix unguicularia. *Thunb. In prom. b. spei; in sylvis Houtniquas.*

20. * *A. acutifolius*; caule angulato, fruticoso; spinulis fasciculatis, aciformibus, brevissimis, subaequalibus (peren-

nantibus). *Brotero Fl. lusit* p. 525. *Linn. Spec.* p. 449. *Mant.* p. 366. *Willd. Spec.* II. p. 153. *Mill. Dict.* n. 3. *Lam. Enc.* I. p. 296. *Desf. Fl. Atl.* 1. p. 306. *Decand. et Lam. Fl. fr.* III. p. 175. *Bertol. Amön. it.* p. 145. n. 111. *Sebast. et Mauri Prodr. Fl. rom.* p. 150. n. 414. *Guss. Prodr. Fl. sic.* 1. p. 421. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 562. A. caule tomentoso; foliis fasciculatis, rigidis. *Bresler Asp. diss.* n. 16. *Duham. Arb.* t. 31. *Sibth. Fl. graec.* t. 337. A. *Corruda Scop. Carn.* 1. p. 248. *Bauh. Hist.* 3. 726. *Hort. Rom.* 5. t. 52. *Zannich. Ven.* t. 179. *Clus. Hist.* 2. p. 178. f. 1. *Moris. s.* 1. t. 1. f. 1.

Similis *A. aphylo*, sed folia septena saepius, filo vix crassiora, at illi saepius terna, triplo crassiora, valdeque subulata. Baccae albedo-cinereae. *Murr.* Caules plures, valde ramosi, e viridi albi, 1½-5 ped.; spinulae instar foliorum 5-12, virides, 1½-4 lin.. Folia nulla, illorum loco spinulae, e quarum vegetiore ramus alias spinulas ramosque proferens, quod nunquam e foliis. *Brotero*, cui forte *A. aphylli* varietas. Caules subscandentes vel erecti, scabri, teretes, superne angulosi, sulcati, striati; rami numerosissimi, horizontaliter patentes, sulcati, angulosi, scabri. Folia 4-12 in fasciculo, exstipulacea, ubique patentia, teretia, subulata, mucronata, pungentia, glabra, pallide viridia, 1-2 lin.; fasciculi valde approximati. Flores plerumque solitarii, saepius gemini, cernui erectique, odori, flavicantes, saepius declini. Pedunculi plerumque folia superantes, rarius eorum longitudine, teretes, glabri, filiformes, medio articulati. Cor. campanulata, ad basin fere 6-partita; lacinae patentes, lineari-lanceolatae, obtusiusculae, margine membranaceae, glabrae, 1½-2 lin., ½ lin. latae. Stamina corollâ breviora, filamenta subulata, albida; antherae oblongae, obtusae, flavae. Germen ovatum, basi quidquam angustatum. Stylus longitudine germinis, rectus, trifidus. Baccae globosae, 1-3-spermae. Variat foliis gracilioribus, minus rigidis; sic etiam cultus. *In sterilibus saxosis Galliae, Italiae, Hispaniae, Lusitaniae, Siciliae, Peloponnesi, in insulis Balearicis.* h.

b. armati.

21. **aphyllus*; caule inermi, (subspinescenti), angulato, fruticoso; foliis subulatis, striatis, inaequalibus, divergentibus. *Linn. Spec.* p. 450. *Willd. Spec.* II. p. 154. *Smith prodr. Fl. graec.* p. 235. *Sibth. Fl. graec.* t. 338. *Mill. Dict.* n. 6. *Desf. Atl.* 1. p. 306. *A. aphyllus* β: spinis brevibus valde inaequalibus, 1½-6 lin.. *Brotero Fl. lusit.* p. 525. *A. horridus* B. fol. minoribus. *Red. Lil.* fol. 288. *A. phyl-lacanthus*; c. f. a. (glabro); fol. fasciculatis, subulatis, rigidis, inaequalibus, pungentibus. *Lam. Enc.* I. p. 296. *Bresl. Asp. Diss.* n. 17. *A. aculeat.* alter, 3 aut 4 spinis ad eorumdem exortum. *Bauh. Pin.* 490. *Tournef. Inst.* 300. *Moris sect.* 1. t. 1. f. 2. *Corruda alt.* *Clus. Hist.* 2. p. 178. β. *A. cret.* frutic. crassioribus et brevioribus aculeis, magno

fructu. *Tournef. Cor.* 21. *Linn. l. c.* *Smith l. c.* (*Lamarck horridi* β esse jubet). *Tournef. Reis. Nürnb.* 1776. 1. p. 352. c. ic.

Non est aphylla, sed foliosa species aculeisque genuinis caret. Folia subulata, viridia, recta, tenuia, rigida, pungentia, 3-4 (6) in fasciculo, valde inaequalia, plerumque pollicaria. Caules ramique flexiles, virides. Forte cum *horrido* conjungenda. *Lam.* Caulis ramosus. Stipulae membranaceae, deciduae, plurimae, extra- et intrafoliaceae, pedunculos cingentes, bracteiformes. Flores axillares, pedunculati, cernui. Perianthium campanulatum, ejus basi stamina inclusa inserta. Filamenta basi dilatata, pistillo longiora. Germen subglobosum. Flores dielini. Differt a simillimo *acutifolio* caule glabro; fol. rigidioribus, minus confertis. *Bresler.* Differt ab *acutifolio*: foliis crassioribus et longioribus; petalis 3 interioribus incurvis. *Bertol. in litt.* In *Hispania, Lusitania, Sardinia, Sicilia, Creta, et ins. Peloponnesi; in Africa boreali.* \dagger .

Obs. Brotero, qui *A. horridum* et *aphyllum* jungit sub suo *A. aphylo*, „caule angulato, fruticoso; spinulis fasciculatis, aciformibus subulatisve, rigidis, longis, inaequalibus“, et priorem α , secundum β esse jubet, sequentibus descripsit: „Caules plures, ramosi, 1½-3 ped., debiles; spinae striatae, 3-4, ad ramorum basin et in caule copiosiores, 6-12, valde inaequales, 1-1½, poll., (in β 1½-6 lin.). Stipulae membranaceae, ovatae, acuminatae, postice caudâ subspinescente, solitariae sub ramis, sed aliae minimae ecaudatae intra spinulas adhuc teneras. Baccae 3-rarius apice 6-striatae, 2-4-spermae, seminibus hinc convexis inde angulatis, aut interdum 1-spermae, semine globoso. Polygama dioica aut dioica videtur.“

22. **A. horridus*; aphyllus, fruticosus, pentagonus; aculeis tetragonis, compressis, striatis. *Linn. Suppl.* 205. *Willd. Spec. II.* p. 154. *A.* caule fruticoso, angulato (glabro); foliis subulatis, crassis, rigidis, tetragonis, apice pungentibus. *Lam. Enc. I.* p. 296. (excl. β .) *Desf. Fl. atl. I.* p. 307. *Bivona Bernard. sicul. C. II.* p. 12. *Gusson. Prod. Fl. sic. I.* p. 422. *Smith Prodr. Fl. gr.* p. 256. *Sibth. Fl. gr. I.* 259. *Bresler Asp. diss. n.* 18. *Cav. ic. II.* p. 50. t. 136. *A. horridus* *A.* fol. majoribus. *Red. Lil. V.* t. 288. *A. aphyllus* α *Brot. Fl. Lusit.* p. 525. *A. hisp. aculeis crassioribus horridus.* *Tournef. Inst.* 300. *Cup. Panph. 2.* t. 160.

Aculei alterni, solitarii, remoti, lignosi, robusti, interstitiis longiores s. longitudine digiti. Folia vix ulla. *Linn.* Caulis obtuse angulatus, ramosissimus, paniculatus, 1-1½ (3) ped. Aculei (foliorum loco) recti, crassi, rigidi, acutissimi, solitarii, bini ternique, 2 poll., et ultra. Ad ortum ramorum stipulae minimae, basi in aculeum parvum deorsum prominentem productae. *Lam.* Rad. e tuberibus ovato-oblongis. Caulis glaber, striatus, obsolete 5-gonus. Aculei poll., flavicantes, basi stipulâ albidâ. Flores 2 ad utrumque aculei latus. Petala, vel melius lacinae, patentes, ovatae, supra flavae, dorso lineâ rufescenti, alternae breviores angustioresque. Filam. subulata, crassa. Antherae ovatae, luteae. *Cav.* Folia crassissima alterna, elongata, patentia, mucronata, striata, raro fasciculata. Flores axillares fasciculati, brevissime pedunculati; pedunculis infra medium articulatis, supra articulum incrassatis. Totus glaucus; turiones edules. *Bertolon. in litt.* Clo *Bresler acutifolius, aphyllus, horridus* forte merae varietates ejusdem speciei, quam *A. rigidum* salutare pro-

ponit. Etiam nobis *horridus* tantum staturâ magis compactâ rigidior, foliis plerumque longioribus diversus videtur ab *aphyllo*, qui nobis specie differt ab *acutifolio*. In Hispania, Sicilia, in Cypro, in Balearibus, in Barbaria et in Aegypto. h.

23. *A. Broussoneti Spreng.*; caule tereti, striato, fruticoso; foliis (infimis) ternatis, aciformibus, rigidis, perennantibus, mucronatis, remotis; stipulis (basi) retrorsum spinosis. *Spreng. Cat. Hort. Hal.* 1804. *Link Enum.* p. 541. *Jacq. fil. Eclog.* t. 40.

Rad. tuberibus oblongis, albis fasciculata. Caules plures, crassitie pennae columbinae, flexiles, procumbentes, protuberantiis pulverem albidum simulantibus asperuli, glaucescentes. Stipulae sessiles, alternae, remotae, triangulares, acuminatae. Folia alterna, stipulis minimis scariosis: infima solitaria, pollicem longa, subulata, arcuata, angulata, superne depressa, glaucescentia, scabra. Flores subaxillares, pedunculis plerumque binis, corollâ longioribus, strictis. Cor. patens, laciniis obovatis, glabris: 5 exterioribus paulo minoribus. Germen globosum, glabrum. Bacca glabra, nitida, 2-3 sperma, magnitudine baccarum Juniperi. Semina 2-3, nigra. Differt ab *Asp. stipulari Forsk.*: fol. remotis, non fasciculatis; caulibus teretibus striatis, non gonioidibus. *Jacq.*. *Sprengel in S. V.* II. p. 95. sine dubio junxit cum *stipulari Forsk.*; dubitans jungit *Bresler*. In Africa boreali. h.

24. *A. stipularis Forsk.*; foliis simplicibus, subulatis stipularumque basi mucronatis. *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. 72. *Gmel. S. V.* p. 557. *A. aculeis solitariis, rectis, reflexis; floribus axillaribus, solitariis, rigidis.* *Bresler Asp. Diss.* n. 11. An *A. stipularis H. Paris?*

Caulis diffusus, ramosus, uti rami patentes, angulosus. Folia angulata, patentia, poll., conferta, rigida, solitaria, raro ternata, mucrone flavo, pellucido, acuto. Stipulae sub alis ramorum foliorumque membranaceo-pallidae, lanceolatae, amplexicaules, aculeo subtus deorsum spectante rigido. Flores campanulati, flavicantes, brevissime pedunculati, 2-5 ad utrumque latus axillae. Baccae caeruleae, globosae, baccis juniperinis simillimae, piso minores. *A. aphylo* non convenit fructu, qui major et tricoccus; discrepat quoque foliis non spinosis, stipulatis, raro fasciculatis. *Forsk.*. Circa Alexandriam. 4.

Obs. Specimen *A. stipularis Forsk.* ex Alexandria, quod vidimus, differt a descriptione *A. Broussoneti* a *Jacq.* data: caulibus sulcato-angulatis; foliis confertioribus; vix unquam arcuatis; corollae laciniis exterioribus paulo angustioribus, vix vero minoribus quam interiores. Descriptio a *Forsk.* data omnino quadrat, nisi quod folia apud nos saepius ternata. Ad specimen in *Herb. cli Martius.*

25. *A. tetragonus Bresler*; aculeis solitariis, rectis, reflexis; floribus racemosis; foliis fasciculatis, setaceis, tetragonis. *Bresler Asp. diss.* n. 15.

Caulis teres, striatus, glaber, ramosus, divaricatus. Folia sessilia, bina, quaterna, mucronata, unguicularia. Aculei alares, longitudine foliorum. Racemi axillares, pollicares. Pedicelli foliis breviores, medio geniculati, bracteis membranaceis ovatis acutis. Perianthium patens, campanulatum. Lacinae lanceolatae, obtu-

sae, longitudine staminum. Filamenta dilatata. Antherae sagittatae. Germe globosum. Stylus brevissimus, trifidus. *Bresl. ex Herb. Mundt et Maire qui. in Promont. b. spei. 4.*

26. *A. fasciculatus R. Br.*; aculeis solitariis, divaricatis; foliis fasciculatis, filiformibus; floribus racemosis; caule decumbente, ramosissimo. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holland. p. 281.*

In nova Hollandia intra Tropicum.

27. *A. racemosus Willd.*; aculeis solitariis, (reflexis); ramis striatis; foliis fasciculatis, lineari-subulatis, falcatis; racemis multifloris, axillaribus. *Willd. Spec. II. p. 152. Bresler Asp. diss. n. 15. H. Kew. ed. 2. II. p. 274.*

A. falcato distinctissimus: foliis decies brevioribus, quadruplo angustioribus; racemis $1\frac{1}{2}$ uncialibus. Flores parvi. Pedunculi bracteis oblongis minutissimis suffulti. *Willd.* Caulis teres, fruticosus, glaber. Rami solitarii, alterni. Folia sena pluraque, unguicularia. Stipulae minutissimae, deciduae. Aculei axillares, longitudine foliorum. Pedicelli foliis duplo breviores, medio geniculati. Bractee membranaceae, ovatae, concavae, minutae sub pedicellis singulis. Perianth. magnitudine capitis aciculae. Lacinae erectae. Stamina basi inserta. Antherae sagittatae. Germe ovatum. Stylus trifidus. *Bresl. ad spec. Willd.* *In India orientali, Zeylona. t.*

Obs. Specimen *Asp. racemosi* in Herb. cli *de Martius* ab illo *Lambert* communicatum et in horto Calcuttensi cultum differt a descriptione a *Bresler* data: caule scandente, pallide cinerascens-fuscescente, lignoso, crassitie pennae gallinae; ramis horizontaliter patentibus, brevibus, tenuibus, glabris, viridibus, profunde sulcatis, angulosis; aculeis strictis, subrecurvis, conico-subulatis, pallide fuscis, 2-2½ lin.; stipulis sub foliis minutissimis membranaceis; foliis 3-10 in fasciculo, linearibus, dorso convexulis, acutis, falcatis, in siccis fuscescenti-viridibus, glabris, 5-8 lin., ½ lin. latis; racemis cum ramo ex axillis spinarum, 2-4, rarius solitariis, e centro bractearum ovatarum, concavarum, membranacearum, subimbricatarum, horizontalibus vel erecto-patientibus, gracilibus, multifloris, 1-2 poll.; rachis communi angulatâ glabrâ; pedicellis solitariis-rarius geminis, patentibus, capillaribus, 1½ lin., paulo supra medium articulatis; bractea ad basin singuli pedicelli ovata, acuminata, nervo medio subcarinata, membranacea, albidâ, pedicellorum nodulum attingente vel superante, lin.; cor. laciniis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, patentibus, nec erectis, lin., vix ½ lin. latioribus; cor. expansis 2 lin. in diametro; filamentis basi lacinarum insertis, crassiusculis, subulatis, corollis brevioribus; antheris ovatis medio dorsi affixis, fuscis, filamentis triplo brevioribus; germine obovato-glabro; stylo brevi, crasso, erecto, subinde etiam nullo; stigmate trilobo. An species propria?

28. * *A. retrofractus*; aculeis solitariis; ramis reflexis retrofractisque; foliis fasciculatis. *Linn. Spec. p. 449. Willd. Spec. II. p. 152. Mill. Dict. n. 5. Forsk. Aeg. ar. p. 75. Lam. Enc. 1. p. 295. H. Kew. ed. II. p. 274.* *A. aculeis rectis; foliis terminalibus stellatis. Bresler Asp. Diss. n. 10. Pluk. Amalth. 40. t. 375. f. 3.*

Rami teretes, dichotomi, dichotomiis verrucosis aculeo minuto nutante. *Willd.* Caules lignosi, cinerei, nodosi, superne ramosi, 5-8 ped.. Rami tortuosi, flexuosi, graciles, lineâ decurrente subancipites, ramulis alternis, patentibus et reflexis. Ad ortum rami singuli nodus in spinas tres partitus, intermediâ acutâ deorsum versâ, lateralibus brevibus, callosis. Folia setacea, (poll., angusta) viridia, subcurvata, fasciculis patentibus, pedunculatis, semperque fere terminalibus. *Lamarck. Spinae*

stipulares, solitariae, deflexae, ortae ex stipulis pendulis, demum induratis in aculeos fragiles. *Forsk. In Africa. t.*

Obs. In Herb. Sieber. capensi n. 84 occurrunt specimina, (omnia, quae vidimus, male conservata!) nomine *A. declinati*, a quo caule lignoso, crassitie 2 lin., floribusque hermaphroditis vel solis abunde differunt, magis cum descriptione *retrofracti* a *Lamarck* data, convenientia, ut utrumque interambigant. Caules, rami, folia ut in *retrofracto Lam.*; folia fere pollicaria, crassitie crini equini, mucrone subpellucido, incurva. Flores ad apices ramulorum secundariorum in ramulis 2-8. Pedunculi capillares foliis dimidio breviores nodulo sub medio pedunculi. Flores nimis corrupti, quam ut describi possint, campanulati videntur, hermaphroditi certe sunt, lineam vix excedentes. Species forte distincta, at e talibus speciminibus in hocce genere minime statuenda, nec eruenda, si prius nota.

29. * *A. asiaticus*; aculeis solitariis (recurvis); caule erecto; ramis filiformibus; foliis fasciculatis, (setaceis; pedunculis solitariis). *Linn. Spec. p. 449. Mant. p. 366. Mill. Dict. n. 8. Willd. Spec. II. p. 155. Lam. Enc. 1. p. 295. Ait. h. Kew. ed. 2. II. p. 274. Link Enum. p. 341. Bresler Asp. diss. n. 12. Pluk. Alm. 54. t. 14. f. 4.*

Caulis tenuis, lignosus, (flexuosus), subangulosus, 2 ped., ramis alternis, simplicibus, filiformibus, foliosis. Ad ortum rami singuli et sub stipulâ eundem ambiente spina acuta, horizontalis aut retrorsum inclinata, subrecurva. Folia tenuissima, 10-20 in fasciculo, 4-5 lin.. *Lam.* Caulis teres, glaber. Aculei alares 2-3 lin.. Folia capillaria mucronata, glabra, 1-2 lin.. Stipulae ad exortum ramorum ternae, ad folia solitariae, concavae, membranaceae, lanceolatae. Pedunculi 1-flori, medio geniculati, foliis breviores. Perianthium laciniis reflexis, longitudine staminum illarum basi insertorum. Filamenta dilatata. Antherae oblongae. Germen ovatum, longitudine styli trifidi. *Bresler. In Asia; in India orient.. Lam.*

30. *A. africanus Lam.*; aculeis solitariis; caule erecto, anguloso; ramis patentibus, subramosis; foliis fasciculatis, setaceis, arcuatis. *Lam. Enc. I. p. 295. A. acul. solit. rectis, reflexis; pedunculis aggregatis; fol. capillaribus arcuatis. Bresler Asp. diss. n. 9. An Asp. africanus lariceis foliis. Pluk. Amalth. t. 374. f. 4.*

Affinis *asiatico*, et similis quoque *retrofracto*. Caulis tenuis, lignosus, 2 ped., maximam partem ramosus. Folia plerumque arcuata, 10-20 in eodem fasciculo. Ad ortum rami cujusvis et fasciculi aculeus acutus, rufescens, reversus. *Lam.* Caulis glaber. Folia pollicaria. Aculei fere 2 lin.. Stipulae deciduae. Pedunculi axillares, gemini aggregatique bracteati, infra medium articulati, foliis triplo breviores. Perianth. campanulatum, stamina ejusdem basi inserta. Filamenta subulata, antheris oblongis. Germen globosum. Stylus 3-fidus. *Bresler. In prom. b. spei. Sonnerat. t.*

31. *A. Nivenianus*; fruticosus; aculeis solitariis, patentibus recurvis; ramis patentibus, teretiusculis; ramulis solitariis; stipulis ad ramos foliaque scariosis, persistentibus; foliis fasciculatis, setaceis, subarcuatis; pedunculis solitariis, infra medium geniculatis, longitudine foliorum.

Rami 1-1½ ped., ut videtur horizontaliter patentibus, quidquam flexuosi, teretes vel sub ramulis obtuse angulosi, glabri, lignosi,

crassitie pennae gallinaceae, purpurascens; ramuli semper solitarii, alterni, subsecundi, filiformes, glabri, pallide virides, 1-2 poll., patentes, foliosi, vel, foliis deciduis, stipulis tantum et pedunculorum basibus obsiti. Ad basin cujusvis rami ramulique aculei et stipulae 2-3. Aculei conico-subulati, patentes, quidquam arcuati, fuscescentes, 2-3 lin.. Stipula ad basin ramorum ramulorumque exterior ovato-lanceolata, longe acuminata, concava, integra, erecta, glabra, dorso subcarinata, fuscescens, marginibus membranaceis pallidis, $2\frac{1}{2}$ -4 lin longa; interior ramulum ambiens duplo brevior, bifida vel potius e stipulis 2 formata, ceterum consistentia coloreque exteriori similis. Folia 5-16 in fasciculis alternis internodiis longioribus, approximatis, glabra, pallide viridia, acumine brevi, subtrigona, plerumque quidquam arcuata, facile decidua, $2\frac{1}{2}$ -4 lin.. Stipulae sub fasciculis solitariae, persistentes, ovatae, acuminatae, concavae, membranaceae, albae, erectae, rarius reflexae, integrae vel fimbriato-ciliatae, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lin.. Pedunculi 1-flori, solitarii in fasciculorum axillis, erectiusculi vel nutantes, graciles, glabri, 3-4 lin., lin. supra basin nodulosi. Cor. primum campanulata, serius patens; lacinae obovato-oblongae, basi angustatae, apice obtuso inflexae, lin., siccae pallide fuscescentes, dorso intensiores. Stam. basi cor. laciniarum inserta iisque duplo fere breviora: filamenta crassa, brevia; antherae ovatae, obtusae, flavae, filamentis paulo breviora. Germen ovato-subtrilocum, angulis obtusis, glabrum, virescens, stylo longius, $\frac{1}{2}$ lin.. Stylus brevissimus, crassus, trigonus. Stigma parvum trilobum. Ad specimen innominatum in herb. cli de Martius; ab ill. Lambert communicatum. Alterum specimen vidimus in Herb. Panzer nomine *A. capensis* insignitum. Proximus *A. asiatico* et *africano*, sed ab utroque satis distinctus. *In Prom. b. spei. Niven. h.*

32. **A. albus*; spinis subhorizontalibus, solitariis; caule ramisque candidis, striatis, flexuosis; foliis fasciculatis, filiformibus, subglaucis, deciduis. *Brotero Fl. lusit.* p. 522. *A. spinis retroflexis; ramis flexuosis; fol. fasciculatis, angulatis, muticis, deciduis. Linn. spec.* 449. *Mill. Dict.* n. 4. *Willd. Spec.* II. p. 153. *Lam. Enc.* 1. p. 296. *Ait. hort. Kew.* ed. 2. II. p. 275. *Desf. Fl. Atl.* 1. p. 305. *Gusson Prod. Fl. sic.* 1. p. 421. *Bresl. Asp. diss.* n. 8. *Parkins Theat.* 455. f. 5. *Corruda tertia Clus. hist.* 2. p. 178. *Bauh. Pin.* 490. *Moris. s. 1. t. 1. f. 3.*

Folia subtetraquetra, mucronata, basi valde attenuata; flores plurimi abortivi; bacca striis 3, monosperma, loculis 2 vacuis, semen globosum, nigrum, 2 saepius abortiva. *Brot.* Turiones edules. *Bertol. in litt.* Caulis erectus, teres, glaber, ramosissimus, 3-ped.; rami alterni, horizontaliter patentes, rigidi, tortuosi, teretiusculi, albi; spinae ad basin ramorum subreflexae, in ramis horizontales, conico-subulatae, rigidae, validae, glabrae, basi albae, apice flavicantes, 3-6 lin.. Folia 3-12 in fasciculo, infermia, mollia, subcarnosa, glabra, glaucescentia, obtusiuscula vel mucronulo parvo, 4-6 lin.. Pedunculi 5-12 aggregati, erecti et patentes uti folia, 1-flori, teretes, capillares, glabri, folia subaequant, lin. a basi articulati. Cor. campanulata, albida,

odora, 1-1½ lin.; lacinae patentes, ovato-oblongae, basi quidquam attenuatae, obtusae, carinatae, subdiaphanae, ½ lin. latae. Stamina corollâ breviora: filamenta plana alba; antherae ovatae, obtusae, atropurpureae, filamentis duplo breviores. Stylus brevis, germine brevior, stigmate trifido, lobis reflexis. Germen ovatum, glabrum. Ad specimina spontanea. *In collibus calcareis Lusitaniae, Hispaniae, Calabriae, Sardiniae, Siciliae, Africae borealis et in Canariis.* †.

33. *A. Thunbergianus*; frutescens, aculeatus; ramis angulatis, flexuosis; aculeis recurvis; foliis fasciculatis, trigonis, muticis. *A. albus* *Thunb. Fl. cap. ed. Schult. p. 355.*

Caulis angulatus, sulcatus, glaber, 2 ped. et ultra, Rami alterni, compresso-angulati, divaricato-patentes, breves. Aculei solitarii, recurvi. Folia plurima, acuta, glabra, lineam longa. Stipulae scariosae, ovatae. Flores axillares, pedunculati. *Thunb. Bresler* hunc cum praecedente conjungit; sed distinctus. *In collibus prom. b. spei.* †.

34. *A. dependens* *Thunb.*; fruticosus, aculeatus; ramis reflexis; foliis subulatis. *Thunb. prodr. 66. Fl. cap. ed. Schult. p. 133. Willd. Spec. II. p. 154. Bresler Asp. diss. n. 7.*, quo teste: *A. rubicundus* *Berg. cap. p. 88.*

Caulis subangulosus, flexuosus, glaber. Rami alterni, subsecundi, divaricati, reflexo-dependentes, elongati, filiformes, aculeati, ramulosi, spithamaei et ultra: ramuli alterni, foliiferi floriferi aculeati, breves, unguiculares. Aculei caulis ramorum ramulorumque solitarii, recti, breves. Folia fasciculata, plurima, teretia, acuta, glabra, lineam longa. Flores inter foliâ pedunculati. *Thunb.* Caulis tetragonus, sulcatus. Folia 20 et ultra, capillaria, 4 fere lin.. Stipulae plurimae, acutae, ovatae. Aculei alares et axillares, reflexi, folia aequantes. Pedunculi solitarii geminique axillares, cernui, longitudine foliorum, medio articulati. Perianth. campanulatum: laciniis lanceolatis, concavis, subpatentibus. Stamina inclusa. Antherae erectae, sagittatae. Germ. obovatum. Stylus longitudine germinis, trifidus. Baccae globosae, nigricantes, magnitudine pisi. Subinde abortu (?) dioicus. *Bresler. In Promont. b. spei.* †.

35. *A. stipulaceus* *Lam.*; caulibus fruticosis, spinosis, indivisis, virgatis; ramulis brevibus, aggregatis; stipulis squamosis, scariosis, apice sublaceris. *Lam. Enc. 1. p. 296.* (qui an *A. rubicundus* *Berg. cap. 88.*? (a *Bresler* ad dependentem, a *Linne* et *Willdenow* *Spec. II. p. 155.* una cum *Pluk. alm. t. 78. f. 3. ad capensem* ductus.)) *A. aculeis* ternis, rectis, patentibus: medio elongato; floribus solitariis geminisque terminalibus; caulibus virgatis, ramosis: ramis simplicibus, fasciculatis. *Bresler Asp. diss. n. 5.*

Caulis 1½-ped., teretes, hispidiusculi, ramis 3-4 nis fasciculatis, vix pollicaribus. Rami singuli fasciculis 2-3 foliorum setaceorum, striatorum vel angulosorum, hispidorum, viridum, acuminatorum, vix pollicarium. Ad basin fasciculi singuli ramorum aculeus rectus, rigidus, striatus, patens, longitudine fere ramorum, saepius aculeis 2 aliis minoribus stipatus, Stipulae ibidem de-

scriptae, persistentes. *Lam.* Forte *capensis* varietas. *Bresler*, cui etiam *triacanthus* *Licht.* hujus videtur loci. *In Promont. b. spei. Thunb. h.*

36. *A. triacanthos Willd.*; spinis ternis; foliis verticillato-fasciculatis, teretibus, scabriusculis, pedunculo duplo brevioribus. *Reliqu. Willd. MS.*

Caulis rectus, sublignosus, obtuse angulatus, inter angulos, praesertim parte inferiori, profunde sulcatus, superne ramosus. Spinae mediae $\frac{1}{3}$ poll., laterales dimidio breviores. E spinarum axillis ramuli spinis lateralibus plerumque breviores, interdum iisdem vix longiores, fasciculos foliorum floresque ferentes. Folia lineam circiter longa, curvula, trigona, mucronata, marginibus serrulatis, quae inter flores pedunculati, plerumque solitarii. Lacinae corollae ovaes, extus striâ mediâ viridi. *De Schlechtendal fil. In Prom. b. spei. Lichtenstein. h.*

37. *A. spinescens Steudel*; fruticulosus; caule tereti, ramosissimo; ramis patentibus, ramulosis; aculeis ternis, patentibus: medio elongato; foliis subfasciculatis, subtriquetro-subulatis, acutis, glaucis; pedunculis terminalibus, folia aequantibus. *Steudel Herb.*

Habitu *A. albo* quodammodo similis; cum *A. triacantho Willd.* plurimis convenit, sed pedunculorum longitudine aliisque notis abunde diversus. Caulis lignosus teres, vel sub ramis sulco obsoleto, flexuosus, glaber, pallide cinereus, epidermide facile secedente; rami alterni, numerosi, subhorizontales, flexuosi, teretiusculi, rigidi, 2-3 poll., cinerei; ramuli ad ramorum ortum et in ramis ipsis alternatim fasciculati, numerosi, striato-angulosi, patentes, 2-5 lin.. Aculei ad ramorum ramulorumque ortum terni (laterales multo minores, in siccis saepissime desunt) patentes; medius conico-subulatus, medio cicatricibus 2 alternis, apice fuscescens, $2\frac{1}{2}$ -4 lin.. Folia 2-3 in fasciculo, erecta, subulata, supra canaliculata, dorso quidquam striato, mucronata, glabra, $1\frac{1}{2}$ -3 lin., internodiis longiora. Stipulae parvae, ovatae, obtusiusculae, membranaceae, albidae, fusciscentes, subinde sublacerae. Pedunculi in apicibus ramulorum 1-3, teretiusculi, superne paulo crassiores, $1\frac{1}{2}$ -2 lin., glabri, glauci, paulo supra basin nodulosi; ad eorum basin bractae parvae, ovatae, pallide fusciscentes. Flores hermaphroditi, viridi-flavescentes, subcampanulati, $1\frac{1}{2}$ lin. fere in diametro. Petala subaequalia, ovata, obtusa, erecto-patula, margine revoluta, dorso subcarinato intensius colorato, vix lin. longa. Stamina erecta, corollâ paulo breviora; filamenta plana, superne subulata, albida; antherae ovato-oblongae, flavae. Germen ovatum, glabrum. Stylus stamina vix aequans, erectus, trigonus. Stigmata 3 reflexo-patentia. Ad specimen in herb. *Staudel. In Prom. b. spei. Ludwig. h.*

38. **A. capensis*; spinis quaternis; ramis aggregatis, teretibus; foliis setaceis. *Linn. Spec. 450. Mant. p. 366.* (ubi *A. rubicundus Berg.* laudatur.) *Willd. Spec. II. p. 155. Mill. Dict. n. 9. Thunb. Fl. cap. ed. Schult. p. 134.* *A. spinis ternis; ramis aggregatis; foliis minimis, setaceis. Lam. Enc. 1. p. 296. H. Kew. ed. 2. II. p. 275. Jacq. H. Schönbr.*

3. p. 8. t. 266. *A. aculeis* 3, rectis, patentibus: medio elongato; floribus solitariis geminisque, terminalibus, sessilibus; caule ramoso: ramis divaricatis, ramulosis. *Bresler Asp. Diss.* p. 21. *A. aculeatus*, triplici spinâ surrectus. *Pluk. Alm.* 54. t. 15. f. 4. (fid. *Linn.*) *Phytog.* t. 87. f. 3. (fid. *Willd. et Bresler*).

Fruticulus (vix pedalis *Lam.*) copiosissime tectus floribus albis instar pruinae spinisque horridis ambulantis taediosissimus. Rami flexuosi, glabri, cinerei, nudi, ramulosi, spinosi: ramuli fasciculati, circa spinam alternatim positi, filiformes, patentés, simplices, foliis tecti, virides, floriferi, unguiculares, a 12 ad 16. Aculei terni, alternatim cauli insidentes, patentés, recti, apice parum recurvi, inaequales, intermedio longiore unguiculari, lateralibus duplo brevioribus. Folia fasciculata, ramulis alternatim insidentia, sena, (8-10) sessilia, acuta, supra lineam longitudinali, vix lineam longa, imbricata, internodiis longiora. Stipulae ovatae, cinerae (ciliatae), brevissimae, basin ramulorum et foliorum cingentes. Flores in ramulis terminales, rarius solitarii, saepissime bini, sessiles. Bractea membranacea sub flore. Petala aequalia, ovata, obtusa, basi infimâ coalita, erecto-patula, alba, extus carinâ rufescente, lineam longa. Filamenta linearia, alba, petalis breviora. Antherae minutae, virentes. Stylus triquetus, filamentis brevior, albus. Stigmata 3 patentia, revoluta, alba, obtusa, brevissima. Bacca ovata, triquetra, trisulca, angulis obtusis, striâ longitudinali, viridis, glabra. *Thunb.* In cultu folia 2 fere lin., tenuiora, minus rigida, erecto-patentia, vix imbricata; spinae multo debiliores. Specimina culta occurrunt etiam nomine *Asp. verticillaris*. Nescimus quorsum certe spectet *A. rubicundus*, cum a *Linnaeo* huc, a *Lam.* ad stipulaceum et a *Bresler* ad dependentem citetur. In *Promont. b. spei fruticetis et sylvis ad radices montium ubique*. h.

39. *A. lanceus* *Thunb.*; aculeis solitariis; foliis lanceolatis, subfalcatis; pedunculis axillaribus, solitariis. *Thunb. Fl. cap. ed. Schult.* p. 354. *A. aculeis* minutis; fol. elliptico-lanceolatis, solitariis ternisque. *Bresler Asp. diss. n. 4.*

Caulis suffrutescens, teres, superne angulatus, flexuosus, scandens, glaber. Rami alterni divaricati. Folia fasciculata, elliptico-lanceolata, acuta, integra, glabra, patentia, unguicularia. Flores in pedunculis unguicularibus. *Thunb.* Folia sessilia, in ultimis ramis terna, nervosa, lineam lata. Stipulae ternae, rigidae, altera extrafoliacea major basi in aculeum minutissimum, rectum, reflexum desinens: laterales minores. Pedunculi terminales solitarii geminique ternique, 4-flori, foliis triplo breviores, infra medium geniculati. Perianthii lacinae erectae. Stamina medio perianthio inserta, inclusa. Filamenta lanceolata. Antherae oblongae. Germen ovatum. Stylus erectus, trifidus. Haud raro diclinus. *Bresler. Cls. Sprengel* sine dubio junxit cum aethiopico; aequè male ac scandentem. In *Prom. b. spei*. h.

40. **A. aethiopicus*; culmeis solitariis, reversis; ramis angulatis; foliis lanceolato-linearibus. *Linn. Mant.* 65. *Willd. Spec. II.* p. 135. *Link Enum.* p. 341. *Raii Suppl.* 359. n. 3. 2.

Similis *A. falcato*; sed folia minora, 7 circiter, nec 3. Stipulae emittunt spinam retro spectantem. Rami flexuosi, angulati, quasi fruticosi, virides. *Linn. II. V.* In specimine nostro incompleto ex *Horto Chelseano* omnia conveniunt; folia tamquam solitaria, nec fasciculata. Species clo *Bresler* nimis obscura, cum affinis commutata. *In Promont b. spei. 4.*

41. * *A. falcatus*; aculeis solitariis, reversis; ramis teretibus; foliis fasciculatis, linearibus, (ensiformibus *Linn.*), falcatis; pedunculis axillaribus, unifloris, aggregatis. *Willd. Spec. II. p. 152. Linn. Spec. 449. Fl. zeyl. 125. Thunb. Fl. jap. p. 159. H. Kew. ed. 2. II. p. 274. Link Enum. p. 341. Bresler 'Asp. Diss n. 2. Burm. Zeyl. 36. t. 13. f. 2.*

Caules lignosi, ramis teretibus, foliosis. Folia acuta, basi attenuata, glabra. Flores parvi, axillares, 4-6 in pedunculis brevibus simplicibus. *Burm.* (Rami patentes et subrecurvi, glabri, fuscescentes.) Folia 9-10, acuta, $1\frac{1}{2}$ poll., (in specim. nostris $\frac{1}{2}$ -1 poll.) Spinae conico-subulatae, basi supra planae, fuscae, recurvae et patentes, 3 circiter lin.) Stipulae 3-4, minutae. Pedunculi 5-7, foliis triplo breviores. *Bresler. In Zeylona; in Japonia. Thunb. t.*

42. * *A. sarmentosus*; foliis solitariis, lineari-lanceolatis; caule flexuoso (v. volubili); aculeis recurvis; (floribus racemosis). *Linn. Spec. 450. Zeyl. n. 124. Willd. Spec. II. p. 155. Lam. Enc. 1. p. 297. Mill. Dict. n. 10. H. Kew. ed. 2. II. p. 275. Link Enum. p. 341. Bresler Diss. p. 18. Redout. Lil. 460. Herm. lugdb. 62. t. 650. Schadavelli-Helangu. Rheede Malab. X. p. 19. t. 10.*

Maxime affinis *MEDEOLAE asparagoidi*. Rad. tuberosa. *Linn.* Radix rhizoma lignosum fibris sordide albis; tuberibus oblongis, carnosus, fragilibus, intus albis. Turiones novelli teretes, fusci, squamis tecti basi spinam gracili calcaratis. Caules sarmentosi, teretes, scandentes, volubiles, subinde tantum flexuosi, plerumque 4 ped., subinde parum elevati, vel 6 ped., $2\frac{1}{2}$ lin. crassi, fere a basi ramosi, ramis simplicibus, gracilibus, brevibus, rarius ped., sulcatis, viridibus; ex axilla aculei virescenti-fusci, (foliis breviores, recti vel recurvi), acutissimi. Folia in caulibus nulla, in ramis fere semper solitaria, ex axilla stipulae setaceae basi crassiusculae, rarius 2-3, (secus *Rheede* etiam 4, sed tunc pro singulo bractea) tenuiter punctata, sub lente cartilagineo-denticulata, (plana) subfalcata, utrinque attenuata, apice setacea, (viridia). Flores albi in racemulis 2-3 poll., raris, cylindricis, basi squamis parvis imbricatis, apice saepius foliis aliquot. Pedicelli subhorizontales, lin. paulo longiores, ($2\frac{1}{2}$ lin. *Lam.*), filiformes, violacei, persistentes, basi squamam eorum longitudine, (medio geniculati). Perianthium (campanulatum, patens, lentis fere magnitudine *Bresl.*); laciniis aequalibus, ovatis, supra concavis, subtus convexis. Stamina perianthii laciniis opposita eorumque longitudine; filamenta alba, subulata; antherae rotundatae (globosae, sagittatae *Bresl.*), rubescenti-flavae. Stylus longitudine staminum, subulatus. Stigmata 3 brevia. *Redout.* Baccae tricoccae, semina solitaria. *Bresl.* Flores foetidi. Baccae

Baccæ maturæ rubræ. Semen rotundum, nigrum. In Zeylona et in Malabar.

43. *A. arborescens Willd.*; aculeis solitariis; foliis linearibus; ramis fasciculatis. *Reliqu. Willd. MS.*

Caulis arboreus, teres, cortice fusco-griseo, glabro. Fasciculi ramulorum alterni, ramulis striatis, angulatis. Folia alterna et aggregata, longissima. Flores desiderantur. *De Schlechtend. pat. In Teneriffa. Broussonet. h.*

44. *A. laricinus Burchell*; fruticosus; ramis ramulisque albidis; aculeo brevi, subrecurvo; foliis subulatis floribusque solitariis quinisque fasciculatis. *Burchell Reis. Bresler Diss. Asp. p. 40.*

4-5 ped.. Folia fere pollicaria. *In Prom. b. spei. h.*

45. *A. exuvialis Burchell*; caule subvolubili; ramis ramulisque inermibus, divaricatissimis, epidermide albâ, secedente; foliis setaceis; floribus axillaribus binis. *Burchell Reis. Bresler l. c.*

In Prom. b. spei. h.

Quid ASPARAGUS *Agul* sine stipulis ad exitum ramorum. *Forsk. Fl. aeg. ar. p. LXV?*

acerosus Tunb. Herb. Mus. Ups.

exaltatus Smith et Buch in Abh. Berl. Acad. 1816-17. p. 362.

nanus Loddiges Cat. 1823.

orientalis Besser Cat. H. Crem. 1814.

rivalis Burchell

tuberosus Cat. H. Dorp. 1810. ?

1357. DRACAENA.

a. arborea.

1. *DR. Draco*; foliis capitulo-confertis, erecto-effusis, anguste ensiformibus, apice spinosis; caudice firmo, erecto, carnosio, incrassato, arboreo. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 30. Syn. p. 67. Linn. S. Veg. 275. Willd. Sp. pl. II. p. 155.*

ASPARAGUS *Draco Linn. Spec. p. 451. Mant. p. 366. DR.*

Draco; fol. ensiformibus, acutis, planis, confertis, terminalibus; floribus parvis, longitudine pedicellorum. *Lam. Enc. meth. II. p. 323. D. fol. ensiformibus, apice spinosis; caule*

arboreo. Dalm. Diss. praes. Thunberg. p. 5. Sabin Berthelot Observ. sur le DR. Draco; etiam in Nov. Act. Ac.

Caes Leop. Car. XV. p. 775. t. 35 — 39. DR. arborea: fol. subcarnosio, obtuse-involuto. Hayne getr. Darst. IX. t. 2.

et hoc teste: *a strictifolia*; fol. substrictis. *Clus. Hist. I. p. 1. c. ic. Bauh. Pin. p. 505. Blackw. t. 358. Arbor*

Draconis, Draco Yucciformis vel Dracaena. Vandell. Monogr. Ulyssip. 1768. et in Röm. script. d. plant. Hisp. Lus. Bras. p. 37. t. 2. a. b. YUCCA Draconis Hoyer Linn. Am.

III. p. 407. β. laxifolia; fol. laxis patentibus et deflexo-

pendulis. DR. Draco; caul. arboreo, nudo; fol. in apice sessilibus, imbricatis, longissimis, lanceolatis, integerrimis, pa-

tenti-pendulis; spadice nudo, ramosissimo. *Gleditsch* in *Act. Ac. Berol. Verm. Bem.* I. 180. *Behrens Diss. Gott.* 1779. p. 36. f. 1. 2. 3. *Meyer* in *Nouv. Mem. Acad. Berl.* 1796. p. 29. t. 1. 2. *Störkia Draco Crantz Diss.* p. 25. f. 1. 2. **CORDYLINAE**, fol. inermibus, integerrimis, flaccidis. *Royen Lugd.* 22. (a *Vandelli* ad *a*). *γ pendulifolia*; fol. pendulis. **OEDERA** *dragonalis Crantz. Diss.* p. 30. f. 3. Palma fol. longissimis pendulis absque ullo pedunculo ex caudice glabro. *Boerh. ind. alt. Lugd.* II, p. 543. (a *Vandelli* ad *a* ducta). **PALMA** *Draco Mill. n. 11. Dr. Boerhaavii Tenore Fl. neap. prodr. App. IV.* *δ. angustifolia. Jacq. Fragm.* 2. p. 4. t. 2. f. 4. *In India orientali inque ins. Canar. b.*

Obs. Linne Mant. Asp. Draconi addidit: „*Dracaena* nunc proprii generis species cum *Asp. graminifolio* et *terminali*. Pedicelli hujus infra flores articulati,“ et *Crantzium* perperam *Oederam* a *Störkia* specie distinguimonet. Cum varietates supra adductae clo *Hayne* aliisque et nobis forte species diversae videantur, operae pretium est cujusvis harum varietatum descriptionem uberiores exhibere. *α*. apud *Vandelli l. c.* „Caulis 8 ped., circumferentiâ 3 ped. 7¹/₂ poll.“ (altit. raro ultra 12 ped., peripheria subinde 45 ped. *Lam.*) arboreus, scaber, subcinereus, rimosus, e cortice fundens humorem rubram lacrymam densatam, (*Sanguinem Draconis*). Rami prope summitatem 1-2 ped., nudi, dependentes, extremitate digitati. In summitate caulis rami 6, divaricati, nudi, laeves, cum aliquibus lateralibus dependentibus. Inferam quavis in ramos 2-3 (dependentibus pariter ornatos et subdivisos in 2-3 minores, moniliformes, 2-ped. et ultra, crassitie brachii) desinit, striis s. scissuris linearibus circularibus rubrâ lacrymâ turgidis ornatus. Ab eorum extremitate exeunt folia pedalia, ensiformia, mucronata apice, semiinvoluta, subcarnosa, lucide virentia, longitudinaliter striata, intus extusque carinata, imbricata, basi dilatata, rubra, globulis aspersa subrotundis, complanatis, rubescentibus, lacrymis nempe e foliorum vasis excretoriis separatis ibique concretis. E centro apicis rami foliis circumdato surgit racemus 2 ped., suberectus, compositus, subfoliatus, albo virescens, apice racemoso simplici, ramis alternis horizontalibus, basi 2 aliis minoribus, patentibus, oppositis: omnibus racemosis. In ramorum extremitate stipularum flocci. Flores breviter pedunculati e pedunculo facile decedentes ob articulationem, plerumque 4 ex eodem centro, stipulis 4 lanceolatis circumdato, 4 lin. dista clausi, aperti (vespere) laciniis revolutis, externe basi spadiceae, ceterum albo-virescentes, interne albi. Cal. 0. Cor. 6-partita, unguibus cohaerens: lacinae ovatae, apice acuto incurvato, pubescente, dorso carinatae, revolutae. Filamenta 6, erecta, corollam aequantia, unguibus inserta, inferne membranacea, medio ovato-compressa, incrassata, superius subolata. Antherae oblongae, incumbentes. Germen ovatum, sulcis 6. Stylus longitudine staminum, subangulatus. Stigma 3-fidum, obtusum. Hacca ovata, 6-sulca, 3-locularis, flavescens. Sem. 3-ovato-oblonga, apice incurvato, acuto. In *β* apud *Behrens* ex culta: „Radix rhizomate brevi, fibris numerosis, carnosis, crassitie calami et multo ultra colore terreo. Truncus erectus, apicem versus decrescens, ante florescentiam plerumque simplex, nisi putredine vel temporis impetu fractus ramosus sit; post florescentiam apice ramosus et foliorum coronâ 4-pedali coronatus, 24 circiter ped., cortice ex albido terreo, basi magis scabrâ, callosâ rimosâque. Folia numerosa, lineari-lanceolata, simplicissima, integerrima, glabra, crassa, apice canaliculata, sessilia, decurrentia, basi imbricatâ flavâ, margine rubicundo, modo angustiora, modo latiora, primo subviridia, deinde quodammodo glauca; inferiora pendula 3¹/₂ ped., media patentia, suprema erecta, viridiglauca 3¹/₂ - 2 ped. Spadix e centro coronae foliosae absque spatha universali nudus, ramosissimus, racemosus, sulcatus, glaber, quasi corneus, albido-virescens, leviter inclinatus, 5 ped., basi 2 poll. in diam., longe post fructificationem persistens; rami ordine inaequali, longissimi, penduli, majores 2-2¹/₂ ped. ramulosi: ramulis splendidibus, tenuioribus, ejusdem fere longitudinis, subdivisis, propendentibus, multifloris. Florum fasciculi numerosi, erecti, situ alterno inaequali. Flores ex parte deorsum spectantes, sub florescentia sese erigentes, parvi, pedunculati, cum abortivis minoribus semper sese aperientes, vespertini. Pedunculi persistentes, incurvati vel horizontales, articulati et ad articulos facile decidui. Spathulae partiales rameae lanceolatae, singulae ad ramorum ramulorumque ortum, ad majores ramos propendentes (albido-rubrae. *Meyer*). Stipulae plures, subulato-setaceae, exiguae, marcescentes, basin tuberculosam floralium fasciculorum in modum involuelli cingentes. Cal. proprius nullus. Cor. regularis, ex albo virescens, liliacea, hypocarpia, imper-

forata, patentissima, ferme ut in *AMERICANO revoluta* et *LILIO Martagone*: fundo mellifero; laciniis lanceolatis, aequalibus, tandem revolutis; odore balsamico, debili, ut in *Philadelpho*. Cor. inapertae angulosae; lacinae exteriores primum patentis, interiores ad vesperam conniventes, dein patentissimae. Filamenta erecta, aequalia, patula, subulato-compressa, corollae concoloria, ejusdemque laciniis basi inserta. Antherae concolores, oblongae, incumbentes. Germen magnum, luteo-virens, glabrum, 3-sulcatum, receptaculo styloideo articulari impositum. Stylus subulatus, rectus, leviter inclinatus, longitudine staminum. Stigma parvum, obtuse trigonum et trilobum. (Stigmata 3, *Meyer*.) Drupa vel capsula carnosastylifera, subglobosa, glauca, virore glauco, tandem flava, magnitudine Cerasi, 3-locularis, saturis longitudinalibus 3-6, acidulo-austera; loculo uno vel altero saepe abortiente. Sem. ovata, solitaria in singulo loculamento, candida, subdulcia, tenacitate suberinâ, serius cornea. Character *Störckiae* apud *Crantz* e planta fere deflorata, cum corollae basis subventricosa et superne coangustata dicitur etc. Descriptio a *Meyer l. c.* data cum illa a *Behrends* convenit. In γ apud *Crantz l. c.* caudex 8 ped., corona 2 ped., magis quam in β , nitidus glaberque. Folia magis angusta, minus carnosâ, Iridis magis, quam Aloës (uti in β), quare etiam hortulanis *angustifolia* dicta: vaginâ flavicante, purpurâ perfusa. Folia subinde flavo marginata, purpurâ maculata. Spadix terminalis, centralis, 2 1/2 ped., ramosissimus. Cor. campanulata, profunde 6-partita, longe major quam in β , obsolete albida; staminibus longis, exsertis. Fructus drupa?, formâ fere Asparagi. Semen magnitudine pisi, durissimum, cinereo-albens, politum. *Dr. Boerhavi Te-nore* differt a *Dr. Dracone*: foliis longissimis non erectis, nec apice spinosis; a *Dr. umbraculifera*: foliis longissimis, nec basi angustioribus; floribus omnino albis, nec duplo minoribus; hujus ergo loci esse videtur. In δ apud *Jacquin*: „truncus simplex, 18-ped. Spadix paniculatus, amplissimus, oblique erectus. Pedicelli uniflori, aggregati, geniculati. Baccæ aurantiae, 1-loculares, Semen 1 globosum: locula enim 2 abortiva.“

2. *D. ensifolia* *Haw.*; arborea; foliis subcarnosis, lanceolato-ensiformibus. *Haw. Syn. pl. succul. p. 67.*

Folia duplo latiora, quam in *D. Dracone*. *Haw. Habitat?*

Obs. Confer *Obs. ad CORDILINEM parvifloram*.

3. *D. indivisa* *Forst.*; arborea; foliis ensiformibus, acutis; racemo laterali, composito. *Forst. escul. n. 55. prodr. n. 150. Willd. Spec. II. p. 156. Dr. fol. ensif., sessilibus, acutis; rac. comp. lat. Dalm. diss. l. c. et p. 5.*

„Caulis arboreus, 2-5 org.. Folia terminalia, sessilia, semiamplexicaulia, basi imbricata, late ensiformia, membranacea, integerrima, patentia, 2 ped., palmum lata. Racemus lateralis compositus ex alis foliorum (sed forsâ folia jam seniora s. secundi anni prodierant) ovatus, nutans: racemis partialibus in formam cylindricam congestis.“ *Forst. l. c. Ad portum obscurum Nov. Zeelandiae.*

4. *Dr. australis* *Forst.*; arborea; foliis ensiformibus, acutis; racemo terminali, erecto, supradecomposito. *Forst. Prodr. n. 151. Willd. Spec. II. p. 156. Dalm. diss. l. c.*

In speciminibus junioribus cultis folia minus recurvo margine glabra, pallidiora, quam in *Dr. stricta*. *Sims ad strictam. In nova Zeelandia ad aestuarium Reginae Carolinae. t.*

5. *Dr. stricta* *Sims.*; caule fruticoso, stricto; foliis confertis, lineari-lanceolatis, mucronatis, margine scabris; racemo laterali, cernuo, composito. *Bot. Mag. 2575. Bot. Reg. t. 956.*

Caulis (simplex, 6-7 ped.), cicatrisatus a foliorum lapsu. Folia amplexicaulia, recurva, utrinque glabra, intense viridia (margine scabriuscula *B. R.*). Pedunculus in apice caulis lateralis, horizontalis vel quidquam cernuus, fere 2 ped.; articulis 2-5 distantibus, bractea foliaceâ munitis. Racemus compositus, paniculatus, multiflorus; ramis alternis, horizontaliter patentibus, basi bracteolâ lanceo-

lato-mucronatâ. Flores lilacini. Pedicelli floribus 3-4 plo breviores, lilacini: basi bracteâ parvâ spathacéâ pedicello brevior. (Flores basi bracteis 3 parvis suboppositis, cito deciduis. *B. R.*) Cor. lacinae 3 exteriores primum erectae; interiores latiores et revolutae, serius omnes revolutae et demum iterum erectae et conniventes. Stamina longitudine corollae; filamenta basi lacinarum inserta; antherae longitudine filamentorum, oblongae, versatiles, flavae. Germen globosum, 3-loculare. Stylus stamina superans; stigma simplex. Differt a *Dr. australi*: racemo laterali composito, nec terminali supradecomposito, foliis minus rigidis, intensius viridibus, margine scabris, nec glabris; a *Dr. indivisa* abunde diversa. *Sims.* In *Nova Hollandia* vel *nova Zeelandia*. *h.*

6. *Dr. oblecta* *Grah*; arborea; foliis lanceolatis, acutis, muticis, basi (attenuatis et deinde) dilatatis, confertis, planis; paniculâ terminali, compositâ, folia superiora aequanti, congestâ: ramis elongatis, adscendentibus; floribus sparsis; bracteis integerrimis, superioribus minoribus. *Graham* in *Edinb. Philos. Journ.* 1827. *April-June*. p. 175.

Caulis teres, a foliorum lapsu cicatrisatus, 12 ped.. Folia in apice trunci, amplexicaulia, medio incrassata; nervis numerosis, tenuibus, parallelis; in foliorum axillis gemmae formantur magnae, abortivae praeter terminalem. Panicula magna, vix folia suprema superans. Bractee foliis similes, apicem versus sensim minores; ad inferiores paniculae ramos 2, altera major sub ramo, altera minor supra ramum. Flores sessiles, numerosi, fragrantissimi. Corolla revoluta, serius apice connivens, marcescens. Filamenta subulata, revoluta; antherae parvae, virides, polline flavo. Germen ovatum, viride, 3-loculare. Stylus apicem versus quidquam attenuatus. Stigma 3-fidum. Flores praeter germen antherasque nivei. *Graham.* In *Nova Hollandia*. *h.*

7. *D. marginata* *Lam.*; foliis angustis, planis, acutis, confertis, terminalibus, marginibus purpureis. *Lam. Enc.* II. p. 325. *D. angustifolia* *H. paris.* *D. tessellata*; arborea; foliis linearibus, cuspidato-mucronatis, patentibus, rubro-marginatis. *Willd. Enum. H. berol.* p. 374.

Truncus gracilior *D. Draconis*, cinereus; folia minus longa lataque, viridia, punctis albis obsolete variegata, et, licet margine purpurea, vaginâ brevissimâ tamen albâ. *Lam.* An huc *D. marginata*; foliis dentato-spinosis, caule fruticoso. *Dalm. diss. l. c.* ex ins. *Bourbon* et *Maurit?* *E Madagascar.* *Aublet.* *h.*

8. *Dr. reflexa* *Lam.*; foliis ensiformibus, supra basin angustatis: inferioribus reflexis; floribus pedicellis longioribus. *Lam. Enc.* II. p. 324. *D. reflexa* *A. Rêdout. Lil. t. 92. Poir. Suppl.* II. p. 523. **CORDYLINÉ** fol. ensiformibus, rigidis, dilatato-sessilibus, inferioribus ad caudicem reflexis. *Commerç Herb.* *β.* foliis ovato-oblongis, mucronatis, nervosisioribus.

Truncus fragilis, nudus, cicatrisatus, plerumque simplex (in culta vix orgyalis). Folia numerosa, congesta, acuminata, plana, stri-

ata, 3 7 poll., longissima vix $\frac{1}{2}$ poll. lata: superiora rigidiora, erecta, media horizontalia. Flores numerosi, odori, viridi-flaviscantes in racemo terminali ramoso. Pedicelli uniflori, floribus multo breviores, basi squamâ membranaceâ. Cor. $\frac{1}{2}$ poll., ad basin usque partita in lacinias oblongas: exterioribus rectis, carinatis, purpurascens. Stam. longitudine corollae, basi laciniarum inserta. Stylus staminibus parum longior. Bacca aurantiaca, 3-sperma. *Lam.*. Descriptio a *Rédouté* data plantam *Lamarckianam* cum *Jacquiniana* conjungit. *Terminalis angustifolia Rumph amb.* IV. p. 81. t. 35. cum? huc ducta excludenda; spectat enim ad *SANSEVIERIAM fruticosam Blum.*. In *insula Mauritiï, Helenae et Madagascar.* h .

9. *D. cernua Jacq.*; arborea; foliis lanceolatis, acutis, mucronatis, oblique flexis, basi angustatis; paniculâ divaricatâ, nutante. *Willd. Enum. H. berol.* p. 374. *Willd. Spec.* II. p. 157. *Jacq. Hort. Schönbr.* 1. p. 59. t. 96. Dr. fol. lanceolatis, subobliquis; caule arboreo; paniculâ cernuâ. *Dalm. diss.* 1. c. *Dr. reflexa B. Red. Lil.* fol. 92. *Dr. Candelaria Hort.*

Poiret in Enc. Suppl. II. p. 523. Dr. cernuam *Jacq.* omnino eandem dicit cum *reflexa Lam.*; videtur tamen diversa ex descriptione, suadente etiam ill. *Colla Hort. Ripul.* p. 48. Spontanea 20-ped., culta 10-ped., tota glabra; truncus 2 unc. in diametro, simplicissimus, vel superne ramosus, teres, cinereus, ad folia purpurascens, erectus, à foliorum lapsu cicatrisatus. Folia linearilanceolata, integerrima, basi veluti in petiolum latiore et amplexicaulem angustata, supra nitidissima, virentia, oris sordide purpureis, coriacea, firma, obsolete nervosa, $\frac{1}{2}$ ped., $\frac{1}{2}$ -1 unc. lata, patentissima, nec ulla unquam reflexa, sparsa, in superiore trunci parte approximata. Panicula terminalis, fere ped., rigidula et rigide cernua. Flores numerosissimi, suaveolentes. Pedunculi teretes, ad divisuras bracteolâ acuminatâ, fuscâ; pedicelli vix $\frac{1}{2}$ unc., solitarii geminique, saepius basi concreti. Cor. unc., ex flavescenti-albida, apicibus purpurascens; tubus brevis, cylindricus, 6-sulcatus; lacinae lineares, obtusae, inferne erectae, dein reflexo-patentissimae. Filamenta filiformia, erecta, petalis paulo breviora. Antherae lineares, incumbentes, pallide flavae. Germen ovatum, triquetrum. Stylus filiformis, erectus, staminibus paulo longior. Stigma obtusum, subtrifidum. Bacca subrotunda, miniata, piso major. Semina hinc convexa, inde angulata, solitaria, magna. *Jacq.* In *insula Mauritiï.* h .

10. *Dr. umbraculifera Jacq.*; arborea; foliis lanceolatis, utrinque attenuatis; corymbo brevissimo, terminali, multifloro. *Willd. Spec.* II. p. 156. *Jacq. H. Schönbr.* 1. p. 50. t. 85. Dr. fol. elliptico-lanceolatis, acuminatis; caule arboreo; paniculâ terminali. *Dalman diss.* p. 5. *Loddig. Bot. Cab.* 289. *Dr. pumila Hort.* fid. *Link Enum.* 1. p. 541. Tota glabra. Caulis arboreus, teres, humanae altitudinis, simplicissimus, fusco-cinereus, cicatricibus transversis latis; diametro 2-unc. Folia in apice caulis numerosa, valde approximata, sessilia, basi unc. lata, mox angustata et canaliculata, dein ensiformia, acuta, integerrima, nitida, coriacea, subtilissime lineata,

medio obscure plicata; nervo medio subtus prominente valido firmissimo, quo sese horizontaliter in umbellam expansa sustentent cum finibus solis parumper reclinatis, longiora plus quam 3 ped., $1\frac{1}{2}$ unc. lata, ut foliorum orbis 18 ped. in ambitu enascatur, in cuius centro pulvillus florum densissimus, convexulus, $\frac{1}{2}$ ped. in diametro. Flores videntur sessiles, sed oriuntur ex panicula brevissima coaretata, cuius rami primarii digitum crassi; pedicelli proprii crassi; flores inodori, erecti, 5 unc. et ultra, vesperini. Bracteae ad divisiones pedicellosque lanceolatae, acutae, fuscae, erectae, in ramis $\frac{1}{2}$ unc., in pedicellis brevissimae. Cor. crassa, rigidula, alba; tubus longissimus, obtuse triangularis, incurvulus; limbus tubo triplo brevior; laciniis oblongis, obtusulis, parumper concavis, patentissimis, foris purpurascens; 5 alternis exterioribus apicé fornicatis. Filamenta filiformia, erectiuscula, corollam aequantia, summo tubo inserta, albida. Antherae lineares, flavae. Germen ovatum, pallide virens. Stylus filiformis, erectus, staminibus longior. Stigma capitatum, trifidum. *Jacq.* Colitur in insula Mauritii. In Java. *Dalman.* h.

11. DR. *arborea* *Link*; foliis lanceolatis, patentibus. *Link Enum.* 1. p. 541. *Spreng. S. V.* II. p. 92. ALETRIS *arborea* *Willd. Enum. h. berol.* p. 381.

Affinis *D. fragranti*; altissima. *Link.* In Africa. h.

12. DR. *fragrans* *Gawl.*; arborea; foliis lanceolatis, reflexis; paniculae ramis divaricatis, capitulo florum terminatis. *Hort. Kew.* 1. p. 410. ed. 2. II. p. 277. *Bot. Mag.* 1081. ALETRIS *fragrans* *Linn. Spec.* 456. *Willd. Spec.* II. 185. *Mill. Dict.* ed. 8. n. 5. *Lam. Enc.* I. p. 79. *Andr. Repos.* t. 506. *Redout. Lil.* t. 117. *Trattin. Tabul.* 734. ALOE *fragrantissima* *Jacq. Enum. Stirp. vind. App.* 599. *Commel. Hort.* I. p. 95. t. 49. f. 4. n. 1. f. 5. n. 2. SANSEVIERIA *fragrans* *Jacq. Fragm.* p. 5. t. 2. f. 6. et t. 55. f. 1. *Hern. h. semperv.* t. 121.

Frutex habitu palmarum, 2 - 10 - ped. et ultra. Rad. fibrosa, (rufescens), ramosa, carnosa: rhizoma elongatum in caudicem (plerumque simplicem,) perpendicularem, cylindricum, cicatricibus semicircularibus e foliis delapsis. Coma foliorum terminalis: folia seriatim alterna, imbricato-conferta, basi horizontaliter divergentia, dein recurva, integerrima, glabra, avenia, tenacia, plicatilia, obsolete canaliculato-depressa, basin versus convoluto-concava, tenuiter nervosa, subtus pallidiora (2 - 5 ped., 2 - 3 poll. lata). Caulis e centro foliorum caudice tenuior, erectus, geniculato-flexuosus, paniculato-ramosus: rami divaricato-patentes, alterni, distantes: inferiores subcompositi, superiores breviores, magisque simplices: omnes foliolo membranaceo, convoluto-concavo, acuminato. Flores fragrantissimi in umbellas dense conglomerati vel in capitula terminalia racemosa, bracteis brevibus paleaceis intermixti: ad inferiorem paniculae partem ut plurimum fasciculi axillares. Pedicelli corollam multo breviores, filiformes, albi. Cor. albida, (7 - 9 lin. cum rubore suffusa), urceolato-hypocrateriformis; tubus angulatus basi ventricosus; lacinae limbi revolutae, subaequales, oblongae vel subcuneatae, canaliculatae, intus nitidae, extus striâ rubrâ: corolla deflorata spiraliter torta germen involvens. Filamenta medio crassiora flexurâ geniculatâ collo tubi inserta, (alba; antherae pallide flavae,

oblongae, lin. paulo longiores). Stylus longitudine filamentorum, (v. paulo longior) albus, stigmatе trilobo (subcapitato), flavicanti-viridi. Germen parvum, ovato-oblongum, trigonum. Caps. baccata, globosa. *Gawl.* Bacca subrotunda, glabra, magnitudine Pisi, sordide flavescens, mollis; in origine 3-locularis, sed semina 1-2 tantum perfecta. *Jacq.* In Guinea et Sierra Leone. *h.*

13. **DR. terminalis*; caule fruticoso vel arborescente: foliis petiolatis, lanceolatis, utrinque attenuatis; paniculae ramis divaricatis simplicibus ramosisque; floribus subsessilibus. *Blume Enum. Plant. jav.* p. 10: quo teste: *Willd. Spec.* II. p. 157. n. 7.; *DR. ferrea Spreng. S. V.* II. p. 95. 10. (excl. syn. *DR. terminalis Jacq.*); *Rumph Amb.* IV. p. 79. t. 34. *DR. arborea*; foliis lanceolatis, petiolatis; ramis paniculae patentissimis. *Lam. Enc.* II. p. 325., et, se teste: *ALETRIS chinensis Enc.* I. p. 79. *DR. terminalis*; fol. ovato-ensiformibus; caule arboreo. *Dalm diss.* p. 3. *Gandich. Voy. d. l'Uran.* I. p. 91. *ASPARAGUS terminalis*; inermis; fol. alternis, lanceolatis, petiolatis; racemo terminali, composito. *Linn. Spec.* 450. β . *DR. terminalis variegata Jard. de From.* 1827.

„Folia fere Cannae. Racemus terminalis e racemis aliquot ramosis. Pedicelli alterni, solitarii, flore breviores, basi cincti glumâ obtusâ. Arbor dura.“ *Linn.* „Folia petiolata, ovato-ensiformia, integra, glabra, multinervia, erecta, spithamaea, usque sesquipedalia, 1-1 poll. lata. Petioli complicati, compressi. Panicula patens, ampla. Bractee oblongae, setaceo-cuspidatae, partiales sensim minores. Pedunculi s. rami paniculae angulati, striati. Pedicelli filiformes, brevissimi. Cor. cylindrico-subcampanulata, alba. Petioli complicati, compressi.“ *Dalm.* „Truncus 8-10 ped., comâ saepe purpureâ. Folia magna, petiolata, oblique striata, glabra, basi fere equitantia, 2-ped., 3 $\frac{1}{2}$ poll. lata. Panicula e racemis laxis patentibus. Flores 5 fere lin., alterni, in pedicello 1-2 lin., basi squamis spathaceis 2-3. Cor. profunde divisa in lacinias 6 lineares v. oblongas, 3 interioribus extus reflexis, longitudine fere staminum et styli stigmatе trifido. Stamina basi laciniarum inserta. *Lam.* In China et in Ind. orient. *Lam.* *h.*

Obs. *Rumph* sub *Terminali* IV. p. 76. distinguit *T. albam* et *rubram*. Haec forte *ferrea*. *Albam* dividit iterum in *domesticam* et *sylvestrem*. In *T. alba domestica* rami pauci, recti; folia plerumque erecta, vetusta dependentia, longa, angusta, cum petiolis 1 $\frac{1}{2}$ ped., 4 digitos lata, utrinque acuminata, glabra, firma, per longitudinem oblique et tenuiter dentata, oris deorsum inflexis, supra glauca, subtus viridi purpureoque variegata; folia tenera rubentia. Petioli convoluti. Racemi terminales, ultra ped., striati, albi. Flores albi; petala angusta plerumque reflexa. Stamina alba. Antherae luteae. Bacca magnitudine semicompletarum Uvarum, sphaericae vel ad latus compressae, umbilicatae, diu virentes, demum rubentes. Semina 2-3, tetragona, dura, nigra, insipida, semilunaria, vel ut in *Polygono Fagopyro*; pulpâ obducta primum dulcescente, dein vellicante. In *T. alba sylvestri* folia glauca, vel aliquando ad oras purpurascens; radix mollior, longior et albissima. In *T. rubra* forma partium fere eadem; sed folia paulo angustiora, eleganter lasteque rubentia. Corymbus ut in *T. alba*; petioli per bina paria cruciatim opposita; flosculi constant ex petalis 4 externis extus lacte rubentibus; 4 aliis internis albidorubentibus. Stamina 8, alba; antherae albae. Baccae ejusdem formae, demum rubentes, supra ipsorum coronulas radii 6 sese erigunt, ac si baccas in 6 partes dividerent; medulla dulcis. Semina 2-4, nigra, splendidia, semilunaria,

amara. DRACAENA *terminalis* Forst. *pl. esc.* p. 33. huc certe spectat: ejusdem vero DRACAENA *terminalis* Prodr. p. 24. e loco natali (societatis insulis) et diagnosi in *Linnaei S. V.* ed. *Murray* petita ad DIANELLAM *ensifoliam* spectare videtur. Quid vero ALBTRIS *cochinchinensis*; caulescens; foliis lanceolato-linearibus, reflexis; flore paniculato. *Lour. Fl. cochin.* I. p. 153, quam *Poir.* in *Enc. meth. Suppl.* I. p. 289. cum? ad *A. chinensem* Lam. s. DRACAENAM *terminalem*, *Spreng.* in *S. V.* 3. p. 93. vero sine dubio ad SANSEVIERIAM *laete virentem* Haw., plantam acaulem, 3 foliis donatam citat? Descriptio in *Loureiro* sequens: caulis fruticosus, 6-ped., simplicissimus, erectus. Folia integerrima, nitida, alterna, amplexicaulia. Flos terminalis, viridi-luteus, racemo laxo. Cor. infera, rugosa; tubo cylindrico; limbo reflexo; laciniis linearibus. Stamina 6. corollae inserta. Caps. trigono-rotunda, 3-locularis, 1-sperma. *In hortis Cochinchinae.*

14. * *Dr. ferrea*; arborea; foliis lanceolatis, acutis. *Linn. S. V.* 275., (quo teste CONVALLARIA *fruticosa* *Syst. Nat.* ed. 10. p. 984.; Arbor *ferrea* *Osbeck iter.* 251.) *Dr. ferrea* *Willd. Spec.* II. p. 157. (quo teste: *Houtt. Pl. S.* I. p. 417.) *Dalm. diss.* p. 3. *H. Kew. ed.* II. p. 277. *Sims Bot. Mag.* 2055. *Dr. terminalis* *Jacq. Collect.* II. p. 354. *Icon. rar.* II. t. 448. *Tratt. tabular.* t. 242. *Rédout. Lil.* II. t. 90.

Rad. crassa, cinerascens, fibris albis, crassis, longis. Caules plures 6 ped. et ultra, fruticosi, teretes, cinerei, tuberculis inaequales, erecti, crassitie brachii. Rami superne tantum foliosi, inferne a lapsu foliorum cicatrisati. Folia longe lanceolata, acuta, glabra, lucida, integerrima, 1½-ped. cum pedunculo ½ ped. canaliculato et amplexicauli, in apicibus ramorum approximata. Racemus terminalis erectus, e racemulis patentibus cylindricis, 2-4 unc., purpureis, glabris, rectis, sulcatulis; pedicelli uniflori, crassi, brevissimi, rigiduli, patentissimi, basi bracteolis minutissimis, fusciscentibus. Flores inodori, purpurei; petala lanceolato-linearibus, obtusa, inferne in tubum erecta, superne patentia. Filamenta late compressa, acuta, erecta, petalis paulo breviora, alba; antherae sagittatae, flavae; germen subrotundo-ovatum. Stylus filiformis, erectus, longitudine staminum, albus, purpura suffusus; stigma subbifidum, inflexum, obtusiusculum. Folia, momente *Sims*, sanguinea et sanguineo maculata, basin versus flavescenti-viridia. Pedunculi et pedicelli teretes, purpureo-sanguinei maculatique; racemuli divaricati 3-4-6 poll; bracteae ad basin ramulorum geminatae, lanceolatae, fuscae, ½ poll; ad basin pedicellorum 2 subulatae, 2 lin., fuscae. Cor. diametri (vix) pollicis, laciniis rotundatis, alba, externe sordide et dilute sanguinea. Filamenta alba antheris luteis, corollâ duplo breviora, stylo longiora. Stigmata 3 patentia, acuta, sanguinea. Germen triloculare, polyspermum. *In China, India orient.* b.

Obs. Species etiamnum dubia, uti jam olim oculatissimo *Lamarck Enc.* I. p. 325. In *Hort. Kew.* I. c. jungitur cum *ferrea* *Dr. terminalis* *Jacq.* At, qua ratione, „*Dr. terminalis*: herbacea, caulescens, foliis lanceolatis *Linn. S. V.* 275.“ a *Willdenow* jungi potuisset cum ASPARAGO *terminali* *Linn. Spec.* 450, et quam *Jacquin* ad *terminalem* traxit, videant, qui ita citaverunt. Ipse *Murray*, *Linnaei* discipulus, in sua *S. V.* editione et *Rédout* synonyma haec utebant. DRACAENA *terminalis* *Forst. prodr.* p. 24. forte planta *Murrayi*, seu DIANELLA *ensifolia*, cum hanc nomine *Dr. ferreae* vidissemus in *Herb. Schreb.* asservatam. *Loureiro*, qui in *Fl. Cochin.* p. 242. ad *Dr. ferream* suam definitionem *Dr. ferreae* L. laudat, iconem, non vero descriptionem, in *Rumph Amb.* VI. c. 39. t. 34. f. 1. cum planta sua quadrare dicit, quam eandem cum illa *Osbeckii* putat, et quam sequentibus describit: „Caulis fruticosus, simplicissimus, 8 ped., poll. crassus, erectus, teres, nodis approximatis, ex foliorum casu protuberantibus. Folia lanceolata, integerrima, 1½ ped., erecta, glabra, petiolis amplexicaulibus, fusco-rubra. Flos rubro-purpureus, subterminalis; spadice diffuso: spathâ longâ, subulatâ, persistente. Perianthium proprium 3-fidum, cyathiforme, parvum, persistens. Cor. campanulata, 6-partita, infera; laciniis oblongis, obtusis, patentibus. Filamenta 6, subulata, co-

rollae laciniis inhaerentia; antheris sagittatis, apice acuto, bifido. Germen ovatum. Stylus subulatus, crassus, 3-fidus, staminibus aequalis: stigmatibus simplicibus. Bacca ovata, rubra, parva, 3-locularis, 1-sperma, plerumque abortiens.

15. *D. ovata* *Gawl.*; foliis terminalibus, confertis, oblongis, recurvato-patentibus, margine reflexis, subtus argenteis, transverse rugoso-venosis; racemo terminali composito, conglomerato. *Gawl. Bot. Mag.* 1179. *ALETRIS pumila* *Don Hort. Cant.* ed. 4. (nec prior).

Palman exiguam refert. Caudex adscendens, frutescens 6-8 poll., $\frac{1}{2}$ poll. in diametro; junior foliis spathaceis convoluto-vaginantibus vestitus, his delapsis cicatrisatus, apice ramum fructiferum latere emittens, indeque flexuosus. Folia terminalia numerosa, sparsa, in comam conferta, supra nervis prominulis et obsolētis striata et reticulata, intense viridia, 3-4 poll., 2 poll. lata. Petioli 1-2 poll.. Racemi e medio foliorum terminalium absque caule v. pedunculo interjecto. Pedunculi brevissimi, bracteolati, in fasciculos paucifloros approximatos congesti; foliolum ad basin ejusvis fasciculi minutum, saepius sphacelatum: rhachis ad ortum fasciculorum nodosa. Cor. pallide rosea, breviter hypocrateriformis: tubo striato, tereti, basi ventricoso, sursum coarctato; laciniis patentibus, linearibus, convoluto-concavis, carinato-gibbis, longitudine tubi. Filamenta laciniis breviora, antheris flavis. Stylus viridis, filamentis parum longior; stigmatibus capitato-trilobo, albo. *Gawl.* In *Sierra Leone.* *Afzelius.* h.

16. *DR. elliptica* *Thunb.*; foliis elliptico-ovatis; caule curvato-erecto. *Dalm. diss.* p. 3.

Caulis decumbens, teres, cinereus, glaber. Folia alterna, petiolata, acuminata, integra, tenuissime multinervosa, glabra, patentia, palmaria, pollicem lata. Flores paniculati terminales. Cor. cylindrica, tubulosa, alba, unguicularis. Similis quidem *Terminali Rumph. Amb.* IV. t. 34., cujus petioli longiores, corollae breviores. *Dalm.*. An forte eadem cum *SANSEVIERIA javanica* *Blume?* In *Java et Ceylona.* h.

b. *fruticosae vel herbaceae.*

17. *D. lancea* *Thunb.*; foliis elliptico-ensiformibus; caule fruticoso; racemo terminali ramoso. *Dalm. diss.* p. 5. 5.

Caulis teres, erectus, apice ramosus, foliis inferne tectus. Folia alterna, sessilia, semiamplexicaulia, acuminata, integra, tenuissime multinervosa, glabra, erecto-patentia, spithamaea. Panicula patens. Pedunculi angulati, divaricati, digitales. Flores e gemmis alternis 3 pluresve glomerati, breviter pedicellati. Corollae albae, tubulosae, unguiculares. *Dalm.*. Non videtur *Asparagus lanceus*, cum etiam patria diversa. An *CORDYLINAE*, cum post *hemichrysam* eandem posuisset? In *Java.*

18. *Dn. acuminata* *Thunb.*; foliis ensiformibus, acuminatis, nervosis; racemis ramosis. *Dalm. Diss.* p. 3. 5.

Folia sessilia, longe acuminata, acumine setaceo, integra, glabra, multinervia, bipedalia et ultra, 2 poll. lata. Panicula patens. Pedicelli breves, lineae. Corollae albae, tubo filiformi brevi.

Dalm. qui post lanceam posuit. *In insulis Bourbon et Mauriti.*

19. **D. stricta*; frutescens, caulescens, erecta; foliis lanceolatis, oblique falcatis, striatis; caule flexuoso. *Linn. Suppl.* 204. *Willd. Spec.* II. p. 157. *ASPARAGUS striatus*; caulescens, erectus; foliis lanceolato-linearibus, subfalcatis, obtusis. *Thunb. prodr.* p. 65. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 552.

Caulis teretiusculus, striatus, flexuosus, superne ramosus, spithameus. Rami alterni, similes. Stipula sub ramis lanceolata, subtrigona, acuta, adpressa, vix lineam longa. Folia sparsa, sessilia, lanceolata, acuta „(supra obtusa)“ integra, striata, glabra, unguicularia. *Thunb. In Prom. b. spei.* 3.

20. **D. erecta*; herbacea, caulescens, erecta; foliis lanceolatis, subulatis, subsessilibus. *Linn. Suppl.* p. 158. *Willd. Spéc.* II. p. 158. *ASPARAGUS erectus*; caulescens, erectus; foliis lanceolatis, acuminatis, sessilibus; floribus lateralibus. *Thunb. Prodr.* 65. *Fl. Cap. ed. Schult.* p. 552.

Caulis compressus, ramosus, glaber, ped. et ultra. Rami alterni, compressi, erecto-patuli, ramulosi. Folia alterna, integra (in nostro specim. basin versus tenuiter remote denticulata), glabra, striata, (nervo medio subtus valde prominente), patula, unguicularia, (1½ lin. lata). Stipula membranacea sub foliis, (late ovata, acuta, laevis), brevissima. Flores 1, rarius 2, axillares, cernui (vel primum erectiusculi). Pedunculi capillares, 1-flori, folio breviores, (2-5 lin.). Filamenta lanceolata. Stigma trifidum. *Thunb. In Prom. b. spei.* 4.

21. **D. undulata*; herbacea, caulescens, erecta; foliis ovatis, acutis, multinerviis, (undulatis); floribus axillaribus, pedunculatis. *Linn. Suppl.* 205. *Willd. Spec.* II. p. 158. *ASPARAGUS undulatus* *Thunb. prodr.* p. 66. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 552.

Caulis angulatus, striatus, glaber, flexuosus, erectiusculus, ramosus. Rami alterni, compressi, flexuosi, patuli. Folia alterna, sessilia, integra, undulata, multistriata, glabra, patentia, unguicularia. Stipulae sub foliis ovatae, scariosae, brevissimae. Flores bini vel 5, cernui. Pedunculi capillares, uniflori, foliis dimidio breviores. Cor. 6-petala, basi connata, aequalis, apicibus inflexis. Filamenta compressa, basi lata, membranacea, medio a latere altero parum dilatata, apice subulata. Antherae incumbentes, ovatae. Styli 3, stigmatibus 3. *Thunb. In Prom. b. spei.* 4.

22. **D. graminifolia*; herbacea, acaulis; foliis linearibus. *Linn. Syst.* 275. *Lam. Enc.* II. p. 524. *Willd. Spec.* II. p. 158. *D. graminifolia*; fol. lin.; scapo filiformi. *Dalm. diss.* p. 5. *ASPARAGUS graminifolius* *Linn. Spec.* 450.

„Statura *ANTHERICI Phalangii*. Folia graminea, valde striata, spithamea. Scapus vix foliis longior. Flores ad singulos dentes racemi 4 s. 5, pedicellis flore ipso brevioribus, quasi e gluma obtusa prodeuntibus.“ *Linn.* Folia radicalia, fortiter striata, 9-19 poll. Scapus gracilis, subangulosus, racemo terminali, 4-6 poll. Flores parvi, albidi, fere stellati, 5-8 in fasciculis

alternis. Pedicelli 2 lin. longi; corollae $1\frac{1}{2}$ lin. Stamina petalis parum breviora. *Lam.* Folia lineari-ensiformia, integra, nervosa, glabra, erecta, scapo paulo breviora. Scapus solitarius, simplex, striatus, glaber, erectus, pedalis. Flores e gemmis lateralibus alternis plures, fasciculati, pedicellati, albi. Pedicelli filiformes, longitudine tubi corollae, lin. longi. Cor. infundibuliformis. Facies ANTHERICI; sed fructus baccatus, seminibus pluribus. *Dalman.* In *Asia.* *Sonnerat.* 4.

25. *D. ensata Thunb.*; foliis ensiformibus, canaliculatis, vaginantibus, nervosis, glabris. *Dalm. diss.* p. 5. 4.

„Folia radicalia, canaliculata, petiolis vaginantibus, integra, tenuissime nervosa, carinata, glabra, pedalia vel paulo ultra; caulina sessili-equantia, similia, digitalia; suprema spathaeformia, breviora. Caulis herbaceus, inferne foliis vaginatus, compressus, superne ramosus, erectus, glaber, longitudine foliorum. Flores paniculati. Panicula patens. Semina nitida, atra. Minime *ensifolia Rumph. amb. V. t. 75.* cujus petala acuta et folia alternatim vaginantia, quaeque forsitan ANTHERICUM *adenanthora.*“ *Dalm.* An forte DIANELLA? Post Dr. *graminifoliam* posuit *els. Dalman.* In *insulis Bourbon et Mauriti.* 4?

24. * Dr. *volubilis*; foliis lanceolatis. *Linn. Suppl.* p.

204. *Thunb. Fl. cap. ed. Schult.* p. 552.

Caulis filiformis, glaber, ramosus; ramis alternis similibus, brevibus. Folia alterna, sessilia, acuta, integra, striata, glabra, patentia, unguicularia. Flores axillares, solitarii, pedunculati, cernui. Pedunculi brevissimi. *Thunb.* An DRACAENA, cum *Dalman* in *diss.* sua praeside *Thunberg* hanc neglexisset? An MEDEOLA? In *campis Prom. b. spei.*

Obs. Ad DRACAENAS referenda: ALIIS *dracaenoides Roxb. Corom. ic. pict. ined. fid. Gawl.*, DRACAENA *obliqua Thunb.* apud *Dalman* est XEROTES *flexifolia R. Br.*; DRACAENA *filiformis ejusd. ibid.* est XEROTES *filiformis*; DRACAENA *hirsuta ejusd. ibid.* DIANELLA *triandra.* Quid DRACAENA *flexuosa Jard. d. Fromont. 1827.*? *frutescens et interrupta Hort. angl. in Link Enum. 1. p. 341.*; *spicata Loddig. Catal. 1823.*?

1558. C O R D Y L I N E.

1. *C. cannaefolia R. Br.*; fruticosa; foliis lanceolatis, petiolatis, subacuminatis; racemis divisis; bracteis exterioribus acutis, interiore pedicellum vix aequante duplo majoribus. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holland. p. 280.* SANSEVIERA *cannaefolia Spreng. S. V. II. p. 95.*

Folia elongato-lanceolata, nervoso-striata. Panicula terminalis, e spicis alternis multifloris. Pedicelli, dum adsunt, cum perianthio articulati. *R. Br.* In *nova Hollandia tropica.* 4.

2. *Eschscholziانا Martius*; foliis lanceolatis, acuminatis, petiolatis, utrinque glabris; racemis paniculatis; floribus sessilibus; bracteis exterioribus ovatis, acutis, interiora duplo fere superantibus.

Fruticosa ut videtur. Folia foliis CANNAE similia, $1\frac{1}{2}$ ped., medio $5\frac{1}{2}$ poll. lata, plana, tenuia, margine submembranaceo integerrima, nervosa, apice acumine brevi fere subulato, basi angustata et in petiolum decurrentia, tenuiter oblique nervosa, siccata fuscescenti-viridia, nervo medio subtus valde prominente

convexo, supra ad nervum medium leviter canaliculata. Petioli $2\frac{1}{2}$ poll., 5-lin. lati, supra profunde canaliculati, dorso nervo medio crasso, tenuiter striati, margine submembranacei. Panicula ped., ped. fere diametr., ut videtur erecta, composita e spicis numerosis alternis sparsisque, approximatis, erecto-patentibus, multifloris, 5-6-poll. Rhachis communis e ramis decurrentibus acute angulata, sulcata, stricta, glaberrima, basi crassitie calami scriptorii; partiales similes, sed tenuiores. Bracteae ad spicarum ortum patentem, lanceolatae, acutae, glabrae, integerrimae, submembranaceae, virescentes, tenuiter nervosae, 6-9 lin., $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. latae. Flores sessiles vel subsessiles, solitarii, rarissime gemini, alterni, sparsi, rarius suboppositi, patentem. Bracteae sub floribus ternae, ovatae, acutae, concavae, margine submembranaceae, glabrae, siccae fusciscentes, recentes, ut videtur, violaceae: inferior vel exterior cor. tubum vix attingens, 1- $1\frac{1}{2}$ lin.; interiores $\frac{1}{2}$ -1 lin.. Corollae subinfundibuliformes, basi tubulosae, 5-6 lin., siccae, pallide fusciscentes, recentes forte carneae; tubus brevis, cylindricus; lacinae lineari-lanceolatae, acutae, medio striato-nervosae, glabrae, vix 1 lin. latae, basi erectae et in tubum conniventes, dein revolute-reflexae; interiores tenuiores, erectae dum exteriores jam revolutae, serius omnes revolutae. Stam. basi lacinarum inserta, corollâ paulo breviora; filamenta erecto-patentia, basi plana, superne subulata, glabra; antherae oblongae, basi ad medium usque bifidae, lobis quidquam divergentibus, dorso ad sinus apicem affixae, flavae, lin.. Germen ovatum in stylum attenuatum, glabrum. Stylus erectus, trigonus, glaber, corollam fere superans. Stigma parvum, truncato-capitatum. Ad specimen in Herb. cli. de Martius. Tea-Root Anglor. Radicis infusum pro potione Theae adhibetur. Eschscholz qui in insulis Sandwich. h.

3. *C. parviflora* H. et B.; arborescens; foliis lanceolato-ensiformibus; paniculâ terminali, ramosissimâ; floribus pedicellatis; bracteis ramorum longissimis, acuminato-subulatis, margine aculeato-scabris. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 326. t. 674. DRACAENA parviflora; arborea; foliis lanceolato-ensiformibus, mucronatis; paniculâ erectâ, coarctatâ; pedicellis racemosis. Reliqu. Willd. MS. (fide de Schlechtend. (fil.)

Caulis 6-12 ped., erectus, apice foliosus. Panicula bracteata, 1-2 ped., ramis glabris. Flores bracteolati, magnitudine MAJANTHEMI bifolii. Bracteae ad basin ramorum lanceolatae, planae, striatae, glabrae, apicem versus margine aculeato-scabrae, 6-8-poll., basi fere pollicem latae: ad basin ramulorum minores, tenuiter membranaceae. Bracteolae lanceolatae, longe acuminatae, diaphanae, glabrae, floribus longiores. Cal. glaber, albidus; laciniis ovatis, acutis, aequalibus, patulis. Stam. basi calycis inserta, eundem subaequantia. Filamenta subulata, glabra. Antherae erectae, ovatae, polline saffraeo. Germen trigonum. An vere hujus generis? Kunth. Crescit in alta planitie Mexicana, inter Hauhitlan et Tanepantla. h.

Obs. Synonymon DRACAENAE ensifoliae Haw. Syn. Succ. p. 67. nimis dubium, quam ut hic cum clo. Sprengel S. V. II. idem subscribere possim, cum Hawthorth patriam non adscripsisset.

4. *C. hemichrysa* *Commers.*; foliis ensiformibus, nervosis, subtus lanugine aureâ; racemis alternis, compactis, terminalibus. *Lam.* (sub *DIANELLA hemichrysa*.) *Enc.* II. p. 276. *DRACAENA hemichrysa*; fol. ensiformibus, hirsutis. *Dalm. Diss. D. Dracaen.* p. 3.

Affinis *DIANELLAE nemorosae* habitu: flores non visi. Folia radicalia sesquipedalia et ultra, ensiformia, acuta, nervis parallelis fortiter striata, supra glabra. Scapus nudus, trigonus, supra lanugine rufescente, racemis 3-4, $1\frac{1}{2}$ poll., singulo bractea eodem longiore. Capsula ovato-conica, 1-locularis, polysperma. *Lam.* „Folia equitantia, integra, multinervosa, nervis exstantibus, subtus ferruginea et imprimis basi hirsuta. Panicula terminalis. Pedunculus communis compressus, squamosus, cinereus, erectus: partiales alterni floribus subspicatis, brevissime pedicellatis, cylindricis. *Dalman* l. c. *Sprengel* sine dubio iunxit cum *SANSEVIERIA lanuginosa*. In insula Mauritii. *Commerçon.* 4.

1559. DIANELLA.

1. **D. ensifolia*; foliis caulinis numerosis, elongatis, ensiformibus, ($\frac{3}{4}$ unc. latis), marginibus aculeato-serrulatis, carinâ apice basique scabrâ; paniculae ramis ramulisque arcuato-patentibus; pedicellis confertis, nutantibus, flore fere longioribus. *D. ensifolia* *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 276. (excl. syn. *Mill.*) *Reliqu. Haenk. Fasc.* II. p. 132. *Red. Lil.* 1. t. 1. *Gawl. Bot. Mag.* t. 1404. *D. nemorosa* *Jacq. H. Schönbr.* 1. p. 49. t. 94. *DRACAENA ensifolia* *Hort. Kew.* ed. 1. p. 454. *DR.* fol. lineari-lanceolatis, margine subaculeato-serrulatis; carinâ glabrâ. *Willd. Enum. h. berol.* p. 275. *Gaertn. fruct.* 1. 57. t. 16. f. 4. *Kerner h. semperv.* t. 24. *DR. ferrea* *Herb. Schreb.* *DRAC. ensifolia* *Linn. Mant.* 63. *S. V.* ed. 13. p. 274. ed. 14. p. 334.? *Willd. Spec.* II. p. 158. (excl. syn. *Rumph* t. 73.)

In culta: caulis teres, annulatim cicatrisatus, erectiusculus vel varie flexus, crassitie digiti minimi, ped.. Folia disticha, erecta, late ensiformia, acuminata, striata, utrinque fusciscenti-viridia, margine quidquam revoluta spinulis brevissimis valde remotis; carinâ medio saepius laevi, basi apiceque tamen semper serrulata, pedalia et ultra, 9-12 lin. lata, basi angustata in vaginam compressam, equitantem, carinâ acutâ magis serrulatam. Pedunculus communis vel scapus $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ped., erectus, compresso-teres, glaber, viridis, crassitie pennae gallinae, apice paniculatus et ramos inter subflexuosus, foliis spathaceis 2 alternis carinatis $1-1\frac{1}{2}$ poll.; rami alterni, solitarii geminive, basi erecti, apice subnutantes, saepius ramulosi. Pedunculi in apicibus ramorum racemosi approximati, subnutantes, 5-5 lin., glabri, basi bractea ovata, setaceo-acuminata, vix lin. longâ, appressâ. Cor. substellato-patens vel serius quidquam reflexa, virescenti-albida, 8 lin. diam.; lacinae oblongo-lanceolatae, acutiusculae, striatae, interiores margine late membranaceae, $1-1\frac{1}{2}$ lin. latae. Stam. corollâ breviora, erecta; filamenta albida, apice in mas-

sam ovatam flavam incrassata; antherae fulvae lineares, basi emarginatae, filamenta subaequant. Stylus albus, subulatus, staminibus paulo longior. Bacca subglobosa, magnitudine Pisi majoris, violacea; loculis 5-4-spermis. Sem. plura abortiva, ovato-rotundata, nigra. *Linnaeus* in *Mant.* petit: „folia ensiformi-lanceolata, enervia, subtus carinata, petiolata. Scapus s. caulis ramosus, paniculatus, ad exortum ramorum foliolis 2 parvis, coloratis.“ *In sylvis insular. Mascaren. Sonnerat et Commers., in China fid. Herb. Banks. 4.*

Obs. ANTHEMICUM *Adenantha* Forst. (PHALANGIUM *Adenantha* Pers.), a *Gawler* aliisque huc ductum, fide *Sprengel S. V. p. 91.* CONANTHERAE species est. *Willdenow* in *Schrad. Journ. 1. p. 188.* jussit expungi in suis *Spec. Pl. II. p. 140.* et ad suam DRACAENAM ensifoliam adscribere tanquam eandem plantam.

2. *D. odorata* Blum.; foliis caulinis confertis, lineari-lanceolatis, caule brevioribus, marginibus revolutis carinâque laevibus; paniculae ramis simplicibus bifidisve brevibus; pedicellis fasciculato-racemosis, perianthio longioribus. *Blume Enum. pl. jav. I. p. 15.* quo teste: *DR. ensifolia* Lour. *Coch. 1. p. 245.* Gladiolus odoratus *Rumph Amb. V. p. 185.* (nec 145., ut in *Linn. et Willd.*) t. 73.

„Rad. oblique repens, nodosa, lignosa, vix pennam crassa, rugosa, nigricans, odora cum carbonibus imponitur pro suffumigio. Caules pauci, teretes, ulnares. Folia radicalia Caricis vel Schoenanthi, sed multo breviora, glabriora, spithamaea vel pedalia, digitum lata, firma, recta, longitudinaliter striata, glauca, nervo subtus prominente. Ad genicula caulis folium solitarium, brevius, basi convolutum. Apex caulis cernuus. Flores stellati, coerulei instar Hyacinthi: petala 5 exteriora majora, striata. Filamenta flava. Bacca Oxyacanthâ minor, ex rotundo obliqua, compressa, punctulis notata, caerulea ex violaceo purpureoque nitens instar optimi Sapphiri, dulcis, violaceo-nitens, ossiculis 8-9 glabris, nigris, splendidibus, angulosis instar seminum sesami.“ *Rumph l. c.* quocum *Loureiro* exactissime quadrat. — *Dr. nemorosa* Lam. *Enc. II. p. 276.* hujus potius loci videtur ex descriptione et synonymia; forte etiam *Linn. Mant. 63.* huc rectius transferenda. *In hortis Indiae orientalis frequenter culta. 4.*

5. *D. montana* Blum.; foliis caulinis alternis, lineari-lanceolatis, elongatis, margine carinâque denticulato-asperis; carina baseos subdecurrente; paniculae strictae ramis divisis; pedicellis subfasciculato-racemosis perianthio parum longioribus; filamentis imberbibus. *Blume Enum. pl. jav. I. p. 12.* β. fol. latioribus, carinâ vix decurrente, pedicellis laxeracemosis. *Blume l. c.*

Media *D. nemorosam* inter et congestam *R. Br.* *In sylvis montanis Javae. β in montosis Teribu Provinc. Buitenzorg. Jav. occident. h.*

4. *D. caerulea* Curt.; caule adscendente, geniculato; foliis distichis, lineari-lanceolatis, carinatis, margine (carinâque) spinulosis; pedunculis rectis, divaricatis. *Curt. Bot.*

Mag. t. 505. *D.* foliis caulinis numerosis, elongatis, ensiformibus, ($\frac{1}{2}$ unc. latis), marginibus carinâque asperis; paniculae ramis brevibus, parum divisis, strictis; pedicellis confertis corollâ brevioribus. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p.* 279. *Hort. Kew. ed. 2. II. p.* 276. *Redouté t.* 79. *Willd. En. H. berol. p.* 575.

Caulis subherbaceus, tortuosus, simplex, 5-7 poll., crassitie peninae anserinae, cicatrisatus. Folia basi quidquam vaginantia, carinata, equitantia, linearia, acuta, (1-1 $\frac{1}{2}$ ped.) utrinque glabra, margine spinulis minutis. Pedunculus communis erectus, gracilis, subnudus, foliolis abortivis 3-4, 3 ped., laxè paniculatus; apice ramis brevibus, alternis; pedicellis divergentibus unifloris. Flores cernui similes illis *D. ensifoliae*, sed minores, azurei. Cor. rotata; lacinae profundae, patentes vel reflexae, oblongae, obtusae, medio lineis parallelis. Filamenta erecta, alba, brevia, quidquam curvata, apice in globulum callosum inflata. Antherae lineares, longitudine fere filamentorum stylique, flavae. Germen virescens, subrotundum, sexsulcum. Stylus erectus, caeruleus. Stigma album, minutissimum, integrum, sub lente leviter limbriatum. *Redouté..* Differt a simili *ensifolia*, praeter characteres datos, caule subinde magis elongato, foliis angustioribus, vix $\frac{1}{2}$ poll. latis, subtus magis glaucescentibus, margine magis spinulosus; paniculâ subinde magis elongatâ; floribus violaceo-caeruleis. *D. laevis Herb. Sieb. nov. Holl. n.* 199. nil nisi *caerulea*, in nostro saltem specimine, in quo scapus 7 tantum poll.; panicula brevis, pauciflora; reliqua omnino eadem. *In portu Jackson. 4.*

5. *D. congesta R. Br.*; foliis caulinis numerosis, alternis, ensiformibus (semunciam latis): marginibus laevibus, carinâ baseos complicatae scabrâ; vaginâ alatâ subdecurrente, floribus alternatim congestis. *R. Brown Prodr. nov. Holland. p.* 280.

In nova Hollandia tropica. 4.

6. *D. longifolia R. Brown*; foliis radicalibus ensiformibus, elongatis, ($\frac{1}{2}$ unc. latis), margine carinâque laevibus; paniculae ramis strictis parum divisis; pedicellis racemosis, corollâ brevioribus, bractea scariosâ duplo longioribus. *R. Brown Prodr. Fl. Nov. Holl. p.* 280. *Bot. Reg. t.* 754.

Folia bifaria, basi semivaginantia et purpurascencia, longe acuminata, acuta, glabra, carinata, lacte viridia. Scapus erectus, ramosus, subflexuosus, teres, glaber; ramis (in icone) cernuis, plerumque dichotome ramulosis. Racemi laxi, 4-7-flori. Bractea ovatae, acuminatae, fuscescentes. Flores caerulei. Petala exteriora minora oblonga, acutiuscula, interiora ovata, omnia patentia, striata. Stamina petalis breviora. Filamenta alba, gibbosa, flexa, antheris oblongis, viridibus breviora. Stylus staminibus longior, albus. Germen ovatum, obtusum, viride. *Ad icon. in Bot. Reg. Circa P. Jackson. 4.*

7. *D. laevis R. Br.*; foliis radicalibus ensiformibus, planis, caule brevioribus; marginibus carinâque vix elevatae lae-

vibus: caulinis paucis distantibus; paniculâ subsimplici; pedicellis racemosis. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holland. p. 280.*

Circa P. Jackson. 4.

8. *D. revoluta R. Brown*; foliis radicalibus linearibus, strictis: marginibus revolutis carinâque laevibus; caulinis paucis articulo brevioribus; paniculae ramis brevibus, vix divisis, paucifloris pedicellisque arcuatis. *R. Brown Prodr. nov. Holl. p. 280.*

Caulis brevis, tenuis, fuscus, inferne procumbens radículasque emittens. Folia disticha: infima vaginae aphyllae, acutae, fuscae, striatae, carinâ margineque glabrae; reliqua basi vaginis equitantibus, 2-5 poll., glabris, margine fuscescenti saepe lacris; rigida, 1-1½ ped., 2-3 lin. lata, obsolete striata, utrinque glaberrima, supra canaliculata, subtus carinâ acutâ valde prominente, marginibus ad carinam usque revolutis; caulina 1-2, spathis similia, glaucescenti-viridia, 1-1½ poll., acuta, pedunculo communi appressa. Pedunculus communis vel scapus e foliorum centro rigidus, folia subaequans, quidquam flexuosus, compressiusculus, laevis, glaber, basi rubore paucosuffusus, crassitie pennae gallinae, superne ad ⅓ florifer et ibi magis flexuosus. Pedunculi plerumque 3 ex axillis bractearum alternarum, simplices vel dichotomi, filiformes, glabri, basi erecto-patentes, apice arcuati, 6-10 lin.; bractea ad eorum basin lanceolata, longe subulato-acuminata, basi spathacea, apice marcescente, 3-6 lin.; pedicelli 1-flori pedunculis omnino similes, sed magis cernui, 3-lin., basi bracteâ minutâ. Flores cernui, caerulei, inexpansi ovato-conici, acutiusculi, 2-3 lin., deflorati 4-5 lin., supra basin quidquam constricti; expansos non vidimus; lacinae exteriores lanceolatae, acutae, 5-striatae, medio obscure caeruleae, vix lin. latae; interiores tenuiores, paulo latiores, dilutius coloratae. Filamenta brevia, apice incrassata; antherae filamentis duplo longiores, caeruleae, 1½ lin. Stylus staminibus paulo brevior, erectus, albidus. Stigma parvum, truncatum. Germen subrotundum, glabrum. Ad specimen in Herb. Sieber. *In nova Hollandia tropica et circa P. Jackson. 4.*

9. *D. angustifolia*; foliis lineari-ensiformibus, strictis, subplanis, margine spinulosis, (2 lin. latis); paniculae ramis dichotomis, arcuatis; pedicellis flore paulo brevioribus.

Caulis, ut videtur, brevis, flexuosus, fuscescens. Folia alterna, vix distiche equitantia, rigida, basi laxè vaginantia, inferne quidquam complicata, mox vero plana, striata, carinata, margine vix revoluta, glabra, viridia, subtus pallidiora, carinâ glabriuscula, margine spinulis brevibus, obtusiusculis, subreversis; longitudine fere pedunculi communis, 1½-2 lin. lata; caulina 2-3 similia, sed multo minora, magis canaliculata carinataque, internodia subaequantia. Pedunculus communis erectus, strictus, 1½ ped., crassitie pennae corvi, compressiusculus, glaber, viridis. Panicula 3-4 poll., composita, subdivaricata; rami fere semper 2 ex axilla bracteae, erecti et erecto-patentes, arcuati, glabri, obsolete angulosi, dichotome 2-3-flori, poll. circiter; bracteae lanceolatae, longe acuminatae, carinatae, dorso intensiore, margine membranaceo pallido, 3-4 lin.; pedicelli pedunculis similes, arcuato-nu-

tantes, 2-4 lin., basi bracteis parvis. Cor. nutantes, inexpanse conico-ovatae, obtusae, expansae stellato-patentes, 7 lin. in diametro, ut videtur, caeruleae; lacinae lanceolatae, acutiusculae, glabrae, integrae, margine diaphanae, 4 lin.; exteriores medio parallele 5-striatae, lin. latae; interiores margine latiore membranaceo, medio striis 5, paulo latiores. Stamina aequalia, corollâ breviora; filamenta basi filiformia, flexuosa, glabra, apice in massulam clavatam flavam puberulam incrassata; antherae filamentorum fere longitudine, erectae, lineari-oblongae, basi emarginatae, flavae, lin.. Stylus staminibus paulo longior, erectus, glaber. Stigma obsoletum, truncatum. Germen subglobosum. Ad specimen in Herb. cli de Martius. In insula van Diemen. 4.

10. *D. divaricata* R. Br.; foliis radicalibus, lineari-ensiformibus: carinâ marginibusque laevibus; paniculâ decompositâ ramis ramulisque divaricatis: ultimis flexuosis; pedicellis laxe racemosis, perianthio longioribus; bracteis minutissimis. R. Brown prodr. 280. Hort. Kew. ed. 2. II. p. 276.

In Nov. Wallisia meridionali. 4.

11. *D. rara* R. Br.; foliis radicalibus linearibus, planis, caule brevioribus, carinâ margineque laevibus; paniculâ erectâ, effusâ; ramis simplicibus bifidisve patentibus, strictiusculis; pedicellis laxe racemosis; perianthio longioribus. R. Brown prodr. Fl. nov. Holl. p. 280.

In nova Hollandia tropica. 4.

12. *D. strumosa* Bot. Reg.; foliis laete viridibus, omnibus laevibus, (unc. fere latis); paniculâ laxâ, numerosâ, decompositâ; corollae pendulo-cernuae laciniis reflexis, alterne saturatius 3-5-lineatis; filamentis cum struma obesa saturatius colorata antherifera apice articulatis; pedicellis flore paulo brevioribus. Bot. Reg. 751.

Folia gramineo-ensata, carinata, caule longiora, ubi latiora poll. fere lata; caulina vaginata. Caulis 1 $\frac{1}{2}$ ped. vel ultra, viridis, teres, solidus, flexuosus, elastice rigens, culmo Tritici vix robustior, remote articulatus, internodiis foliolo lanceolato vaginatus. Panicula distanter ramosa. Pedunculi communes graciles, patentes, basi bractea foliacea multoties brevior acuminata amplexante; inferiores decompositi longiores, superiores semel dichotomi v. simplices. Flores laxe racemosi, caulescentes: pedicelli filiformes, solitarii, stricti, distantes, erecto-patentes, sparsi, bractea ovato-acuminata pluries breviori, sphaecelatum marginata, cum flore articulati. Cor. emarcescente-persistens, cernua, extus virore aliquo: laciniis omnino reflexis, oblongis, obtusis, planis, aequalibus, interioribus lineâ saturatâ triplici; exterioribus pallidioribus lineâ quintuplici. Stamina paulo breviora, erecta; filamenta flava, apice flexa, antheram mediante corpusculo tumido oblongo, aurantiaco, pruinoso gerentia. Antherae erectae, stramineae, sagittato-lineares. Stylus stamina superans, filiformis, albus; stigma apex simplex puberulus. Germen pallidum, globosum, stylo brevius: loculis 3 hiseriatum-polypermis, Bot. Reg. In New South Wales. 4.

13. *D. mauritiana Blum.*; foliis caulinis confertis, rubro-marginatis, lineari-lanceolatis, margine carinâque denticulato-asperis; paniculae sarmentosae ramis parum divisis; pedicellis racemoso-confertis, perianthio parum longioribus; filamentis imberbibus. *Blume Enum. pl. jav. 1. p. 12.* DRACAENA *mauritiana*; suffruticosa; foliis ensiformibus; scapo sarmentoso alterne paniculato; floribus pedicellos vix aequantibus. *Lam. Enc. II. p. 325.*

Folia recta, 15-18 poll., 10 lin. lata, basi equitantia. Scapus foliis duplo triplove longior, serpens, sarmentosus, subangulatus, glaber, paniculis alternis axillaribus in folio iisdem brevioribus. Paniculae e racemis compositis: flores numerosi, parvi, alterni, pedicellati, 1½ lin., pedicello squamis 2-5 spathaceis vestito parum breviores. Stamina vix longitudine corollae, basi lacinarum affixa. Stylus crassus, breviusculus, stigmate obtuso. *Lam. In insula Mauriti, unde in Moluccas. h.*

14.? *D. dubia Humb. et Bonpl.*; foliis caulinis lanceolato-oblongis, glabris; floribus paniculatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 270. t. 675.* EXCREMIS *) *ramosa. Rel. Willd. MS. (fid. de Schlechtend. fil.)*

An generis distincti? Caulis 1-2 ped., 4-angularis, glaber. Folia acuta, striata, 3 fere poll. Panicula terminalis, patula, bracteata, ramis alternis, distantibus. Flores longe pedicellati, cernui? Pedicelli glabri, apice articulati, vix pollicares. Bractee foliis similes, sed multo minores et latiores, cuspidatae. Cal. saturate caeruleus, 6-partitus, laciniis oblongis, acutis, striatis, concavis: 3 interioribus latioribus et tenuioribus. Stam. 6 calyce duplo breviora. Filamenta incrassata. Germen ovato-triquetrum. Stylus staminibus longior. Caps. baccata, non dehiscentes, ovata, triangularis, calyce persistente cineta, loculis polyspermis. Sem. oblonga, compressiuscula, nigra, nitida. *Kunth. In temperatis Silla de Caracas. 4.*

15. *D.? triandra Afzel.*; caule erecto; foliis dilatato-lanceolatis, integerrimis; floribus confertis. *Afzel. Remed. guin. p. 6.* DRACAENA *hirsuta*; foliis obovato-oblongis, acuminatis, hirsutis. *Thunb. in Dalm. Diss. Dracaena p. 3.* Caulis brevis, simplex, angulatus, scaber, plus quam ped.. Folia plura, centralia 7-12 poll., 2-3 poll. lata, basi squamis magnis, imbricatis, striatis, acutis, margine basique rufo fuscove hirsutissimis, vaginantia, conferto-alterna, erecta, acuminata, striis raris, lineis plurimis, subtus etiam transversis; initio utrinque pilosa, dein supra glabra, subtus pilis raris, nervo medio margineque rufo-hirsuta. Panicula terminalis inter bases foliorum, erecta, ped. et ultra. Pedunculus communis striatus, hirtus, basi squamâ unâ alterâve lanceolatâ. Pedunculi partiales numerosi, longi, adscendentes, hirti; bractee lanceolatâ, caducâ; inferne ut plurimum aggregati, immo verticillati, superne sparsi remoti;

*) EXCREMIS character apud *Willd. Reliqu. Ms.*: „Cor. 6-petala, petalis 3 exterioribus, 3 interioribus. Stam. 9. Germen ovatum, superum. Stylus 1. Stigma simplex. Fructus 3-ocularis, polyspermus.

omnes apice 5-flori. Flores oblongi. Calycis foliola tenuissime membranacea, pellucida, albida; 3 exteriora lanceolata, imâ basi coalita, dein erecta; 3 interiora oblonga, basi separata, apice incurvo-conniventia, purpureo-violacea, cum exterioribus alternantia illisque multo longiora. Filamenta 3, albida, foliolis calycis 3 interioribus basi inserta, 2 brevia compressa, subulata, tertium exterius longius, subsetaceum, basi villis longis articulatis, albis cinctum. Antherae erectae, filamentorum breviorum magnae, oblongae, tetragonae, luteae; filamentum longi minor, ovalis, intra gibba, albida, extra planiuscula, violacea. Pollen stramineum. Germen superum, ovato-trigonum, niveum, nitidum. Stylus longitudine staminis longi, filiformi-attenuatus, subincurvus, colore sordido. Stigma rotundato-depressum, papulosum, hyalinum. Bacca oblongo-sphaeroidea, pistillo remanente coronata, 3-ocularis; cute tenui, glabrâ, atrâ, nitidiusculâ; pulpâ thalassinâ, insipidâ. Semina plura columellae affixa, nidulantia, oblongo-diformia, compressa, fusca, subnitida; tunicâ membranaceâ testaceâ; corculo lineari. *Afzel.* Ipsi clo auctori generis dubii et forte novi. *In sylvis montium Sierrae Leonae, terrae Bullomensis et flumen Camarancas adjacentibus.*

Quid DIANELLA *humilis* } *Loddiges Catal. 1823?*
scabra }

1360. S A N S E V I E R I A.

1. *S. guineensis Willd.*; foliis lanceolatis, uniformibus; stylo staminibus duplo longiore; bracteis tubo corollae triplo brevioribus; floribus sessilibus. *Willd. Spec. II. 159.* (excl. syn. *Thunb.* monente *Gawl.* in) *Bot. Mag. t. 1180.* (ubi vero iterum excludendus *Cavanill.*, monente *Haworth*). *H. Kew. ed. II. 2. p. 278.* S. foliis subtribus, suberectis, late lanceolato-ensiformibus, viridibus, valde fasciatis. *Haw. Succ. p. 66.* ALOË *guineensis Jacq. Enum. stirp. vind. app. p. 308.* ALETRIS *guineensis Hort. vind. 1. p. 56. t. 84. Lam. Enc. 1. p. 79.* ALETRIS *hyacinthoides β. guineensis Linn. Spec. p. 456.* *Hort. Kew. ed. I. p. 464.* ALETRIS *hyacinthoides Mill. Dict. 8. n. 3.* ALOË fol. latis, undulatis, maculosis; floribus spicatis, infundibuliformibus: limbo revoluto. *Mill. dict. ed. 7. n. 22.* ACYNTHA *guineensis Medic. Theod. palat. p. 76.* *Commel. hort. 11. p. 59. t. 21. prael. 84. t. 35.* β. *S. guineensis*; foliis lanceolatis, planiusculis, paucis, scapo altioribus; floribus conjugatis; stylo staminibus duplo longiore; bracteis pedicellos multum superantibus. *Rédout. Lil. t. 330.*, et, hoc teste: *SANSEV. thyrsiflora*; acaulis; foliis canaliculatis carnosiss; floribus geminatis. *Thunb. prodr. 651. (Fl. cap. ed. nostr. p. 329. Diss. nov. gen. p. 121.)* (SALMIA *guineensis Cav. III. p. 24. in nota.*) γ. *S. pumila De Spin. Jard. St. Sebast. p. 28.*

Rhizoma carnosum, crassum, articulatum, horizontale; folia radicalia plurima, fasciculata, erecto-patentia, involuto-concava, coriacea, obtusa, rigida, nitida, epidermide subrugulosâ, fasciis transversis undatis dilutioribus cum intensioribus alternantibus,

in vetustioribus subconcoloribus, mucrone cartilagineo, (rubro marginata) $1\frac{1}{2}$ -2 ped., 2-3 poll. lata. Caulis s. scapus $1\frac{1}{2}$ ped. Racemus compositus, spicatum elongatus. Flores divergenti-erectiusculi, breviter pedicellati, bracteolis acuminatis interstincti, et in fasciculos paucifloros, sessiles, sparsos, parum remotos, segregati, virescenti-albi, $1\frac{1}{2}$ poll., vespere et noctu expansi, fragrantissimi. Corollae lacinae ligulatae, obtusiusculae, subaequales, revolutae, tubi sulcato-teretis basi tumidiusculi longitudine. Stamina subaequalia, tubo adnata, limbo breviora. Antherae albae. Stylus filiformis, filamentis duplo crassior, staminibus corollae longior. Germen ovato-oblongum, obtuse trigonum, trisulcum. Bacca aurantiaco-rubra, depresso-globosa, monosperma, loculis reliquis adortivis. *Gawl.* In β . rhizoma idem, fuscum, crassitie pollicis. Folia 2-3, erecta, basi subcarnosa, ibique canaliculata, supra plana, 22-58 poll., $2\frac{1}{2}$ -4 poll. lata, atroviridia, fasciis dilutioribus. Scapus viridis, 8-16 poll., crassitie digiti minoris, squamis membranaceis, ovato-lanceolatis. Racemus terminalis, floribus geminatis. Pedicelli suberecti, 1- $1\frac{1}{2}$ lin.; par singulum bractea lineari-lanceolata, acuta, medio viridi margine albida suffultum. Cor. basi tubulosa, laciniis apice patentibus: tubus gracilis, albidus, fere pollicis; lacinae lineares, angustae, albae, molles, vix pollicares. Stamina fauci tubi inserta, longitudine laciniarum. Antherae citrinae. Germen viride, ovatum, sexsulcum. Stigma bilobum. *Rédouté*. γ . radice nodosa, foliis brevibus, crassis, recurvis, carinatis, maculis obscure viridibus, ut in *guineensi*, cujus forte varietas, apud *exc.* *Com. d. Spin* per 15 annos sine floribus. *In Guinea et Prom. b. spei.* 4.

Obs. *Gawler*, qui in *Recensione Liliac. Rédouté* (*Journ. of Science* II. p. 181. *S. guineensem* *Red.* eandem dicit cum *S. guineensi* *H. Kew.*, ubi laudatur icon sua in *Bot. Mag.* 1179, excludit synonymon *S. thyrsiflorae* *Thunb.*, quod *Rédouté* (cum *Poir. Enc.* VI. p. 501.) laudat. *Thunberg* porro *Fl. cap.* l. c. ad suam *thyrsifloram* citat *ALTRA. hyacinthoidem* *Lin.* β . *guineensem*, atque diagnosi suae nec verbum addit praeter: „se florentem non vidisse plantam in interioribus *Kantous* inter et *Soendags-Hivier* in solo argilloso sterili obviam.“ *Rédouté* porro, praeter *thyrsifloram* *Thunb.*, synonyma supra adducta laudat omnia; *Willdenow* *Spec.* tamen non nisi cum? adducit, *Persoon* vero, qui *Willdenowii* diagnosi utitur, sine omni dubio, et silet de *horto Kew.* *Cavanilles* demum, (penes quem *Character. gener. SALVIAR.*: „*Cal. o. Cor. 1-petala, tubulosa, semi-6-fida, laciniis linearibus, obtusis, revolutis. Filamenta 6, linearia, erecta, laciniarum corollae basi inserta. Antherae oblongae, versatiles. Germen superum, ovatum, trisulcum. Stylus filiformis, staminibus paulo longior. Stigma peltatum. Drupae 3 (una alterave saepius abortiens) subglobosae, centro coalitae. Semen solitaria, ossea, ovata.*“) monet: div. „*Jacquin* in *h. vind.* t. 84. sub *ALTRA guineensi* plantam dedit nostrae simillimam, sed diversam: scapo violaceo punctis albicantibus maculato; stylo filamentis duplo longiore; seminibus mollibus. In hac bacca mollis, subrotunda, lutea, monosperma; in nostra fructus o drupis 3, nisi abortu patiatur. Rectius meâ sententiâ drupam dixisset.“ *Jacquin* nempo *H. vind.* l. c. ait: „Bacca mollis, subrotunda, succulenta, lutea cum pulpa concoloris, magnitudine pisi, tubo corollae emarcescens, limbo inclusis. Semen unicum, molle, depressum glabrumque, arillo membranaceo, basi cortici haecae adnato inclusum.“

2. *S. laetevirens* *Haw.*; foliis subtribus, patulis, flaccidis, lanceolato-ensiformibus, pallide viridibus, fasciis saepius omnino oblitteratis. *Haworth Syn. pl. succ.* p. 66. *Link Enum.* p. 342.

Folia *S. guineensis*, at tota viridia immaculata. *Link.* *Hab.?* 4.

Obs. Huc ducitur a *Sprengel S. F.* II. p. 93. *ALTRA cochinchinensis* *Lour.!*

3. *S. longiflora* *Bot. Mag.*; spicâ thyrsiformi; tubo corollae bracteis multoties longiore; foliis lato-lanceolatis, acuminatis, trinerviis. *Bot. Mag.* 2654.

S. guineensi valde affinis, sed tam ab hac quam a reliquis corollae tubo longissimo diversa. *Bot. Mag.* Hab.? In horto *Lady Banks.* 4.

4. *S. zeylanica* *Willd.*; foliis glabris, oblongis, acutis, planis et lineari-lanceolatis, canaliculatis, (glaucis, scapo brevioribus); stylo longitudine staminum; bracteis longitudine pedunculi. *Willd. Spec.* II. p. 159. (excl. syn. *Thunb.*, *Cav.* et *Lour.* (etiam in *Enum.* repetito) monente *Gawler Bot. Reg. t.* 160.) *S.* foliis sub-8-fasciatis: infimis suboblongis, planis; sequentibus lineari-ensiformibus, alte canaliculatis. *Haw. pl. succ.* p. 66. *H. Kew. ed.* 2. II. p. 278. (excl. syn. *Roxb. Corom.*, monente *Gawl. l. c.*) *Redout. Lil. V. t.* 290. (excl. syn. *Thunb.* et *Cav.*) *Bot. Reg. t.* 160.: *ALETRIS zeylanica* *Mill. dict.* 8. n. 4. *Lam. Enc.* 1. p. 78. *Gleditsch Mém. d. l'Ac. Berl.* 1769. p. 65. *ALETRIS hyacinthoides*, α . *zeylanica*, *Linn. Spec.* 2. ed. p. 321. *Mant.* p. 567. *H. Kew. ed.* 1. p. 464. *ALOE hyacinthoides*, α , *zeylanica*. *Linn. Spec. ed.* I. p. 456. *A. zeylanica* *Jacq. Vind.* 310. *Commel. hort.* II. 41. t. 21. *Pluk. Alm.* 19. t. 256. f. 5.

Folia prima lanceolata, plana, erecta, breviora; reliqua subulata, semicylindrica, canaliculata, longiora; *guineensis* folia omnia lanceolata, plana, erecta; utriusque folia pallide viridia, fasciis viridibus. *Linn. Mant.* „Folia variegata, uti in *guineensi*; at dorso lineis s. costis longitudinalibus: interiora angusta, longe acuminata, canaliculata; exteriora breviora, magis plana, minus crassa.“ *Lam.* — Folia plurima, fasciculata, erecto-patentia, rigida, crassa, 9 fere poll. (et ultra), lanceolato-subulata, basi poll. lata, involuto-canaliculata, maculis transversis, alternis atrovirentibus, latis, cartilagineo marginatis (margine subinde rufescentibus); exteriora breviora. Caulis teres, basi foliolis nonnullis vagis, bracteiformibus, (glaucescens, 16-20 poll.). Racemus compositus, multiflorus, foliis multo altior: fasciculi florum (4-5) subsessile v. breviter pedunculatum bracteati. (Pedicelli $1\frac{1}{2}$ -2 lin., basi bracteis 2, exteriori pedicellis duplo longiore lanceolata, interiori brevissima emarginata.) Cor. $1\frac{1}{2}$ poll., e viridi alba, angustius tubulosa, semisextida, infra 6-striata, attenuata, cum pedicello circumscisse articulata. Limbi lacinae ligulatae, aequales, subcarinatae, obtusae, infra utrinque crispatae, apice incurvae, mucrone brevi. Filamenta limbo $\frac{1}{3}$ breviora, alba, patentia, alterne breviora. Antherae incumbentes, flavae. Germina loculis 1-spermis. Stylus corollae aequalis, inclinatus, filamentis crassior, tristriato-filiformis: stigmatibus brevissime trilobis, obtusiusculo. *Bot. Reg.* Rad. crassa, sublignosa, fusca, ramosa. In *Zeylonâ.* 4.

5. *S. Roxburghiana*; foliis lineari-ensiformibus, canaliculatis, carinatis, apice subulatis, viridibus, scapo longiori-

bus; stylo longitudine staminum; bracteis minutis. *S. zeylanica* Roxb. *Corom.* II. p. 43. *Asiat. research.* IV. p. 264.

Gawler plantam a *Roxburgh* descriptam, in *H. Kew.* l. c. sub *zeylanica* instar synonymi laudatam, excludit a *zeylanica*, propriamque esse, at distinctam speciem monet. An forte *grandicuspis* vel *ensifolia* Haw.? non addit. In *Roxburghiana* „radix fibrosa, fulva, obsolete geniculata, stolonifera. Scapus longus, columnaris, vaginatus, superne vaginis aliquot sparsis. Folia carnosae (supra descripta) 3-4-ped.: interiora longiora, plerumque arcuata, fasciis transversis, undulatis, intense viridibus. Racemus erectus, longissimus. Flores 3-7 in fasciculo, brevissime pedicellati, nocturni. Bractee lineares, minutae. Cor. pallide viridis, fragrantissima, hexagona, infundibuliformis; tubus brevis cum germine continuus, ventricosus. Limbi lacinae lanceolatae: 3 reflexae, 3 alterne deflexae, acutae. Filamenta subulata, longitudine corollae, divergentes, basibus corollae laciniarum inserta. Antherae oblongae. Germen obovatum, obsolete trigonum. Stylus subulatus, sulcatus. Stigma clavatum.“ *Roxb.* A.B. *In India orientali.* 4.

6. *S. aethiopica* Thunb.; acaulis; foliis linguiformibus, convolutis, carnosis; racemo oblongo; floribus erectis. *Thunb. prodr.* 65. *Fl. cap.* ed. *Schult.* p. 329. *Diss. nov. gen.* p. 121.

Folia radicalia acuminata, integra, erecta, scapo breviora, spithamea. Scapus striatus, flexuoso-erectus, glaber, spithameus, usque pedalis. Stipulae in summitate scapi racemosi, erecti. Racemus palmaris, pedunculis brevibus. Bractee stipulis similes, sed minores. Corollae cylindricae, albae, partitae. *Thunb. In interioribus Promont. b. spei.* 4.

Obs. Div. *Willdenow* duxit ad *zeylanicam*, a qua ex descriptione abunde distincta. Confer *Obs.* ad *spicatam*.

7. *S. lanuginosa* Willd.; foliis nervosis, nervis lanuginosis: inferioribus oblongis, reliquis linearibus; stylo staminum longitudine; pedunculis ebracteatis. *Willd. Spec.* II. p. 456. *ALETRIS zeylanica* β *Lam. Enc.* 1. p. 79. n. 4. *Katu-Kapel* *Rheed. Malab.* XI. p. 85. t. 42. et ergo: *SALMIA ebracteata* *Cavan. Ic.* III. p. 24. in nota. *SANS. ensifolia*; foliis sub 15, erectis, ensiformibus, obtuse carinatis, lineatis. *Haw. Syn. pl. succ.* p. 71.?

„Distinxi hanc ex descriptione et icone *Rheedi*, quum multis notis diversa videatur.“ *Willd.* Hanc *Katu-Kapel* divus *Linn.* cum? ad *ALETRIS hyacinthoidem* retulit, *Lamarck* β fecit *zeylanicae*. Descriptio in *Rheede* sequens: „radix fibrosa, intus albicans, cortice rufo. Folia ex radice oblonga, 2-cubitalia, inferiora minor, extus convexa, intus cava, viridia, rigida, venis lanuginosis longitudinaliter striata, valde crassa carnosaque, intus alba, aquea. Scapi teretes. Flores 2-3 in singulo pedunculo, oblongo-rotundi, angusti, nitentes, in medio vena striati; tubus oblongus-candidus; lacinae oblongae, tenues, extus aqueo-rubescens, intus aqueo-virides. Stamina oblonga, candida; antherae oblongae, flavae, nutantes. Stylus oblongus, candidus. Germen subglobosum, albicans. Fructus rotundi, simplices vel bini juncti, dilute virides. Sem. 1-2 tenera, saporis fabacei.“ *Sprengel S. V.* II. p. 93. huc ducit *CORDYLINEM hemichrysam* (*DIANELLAM*

Lam.) cum tamen *Lamarck* ipse abunde descripsisset *S. lanuginosam* e *Rheede* sub *ALETR. zeylanica* β . *Enc. I. p. 79. n. 4.* In *arenosis Malabaricae.* 4.

8. *S. spicata* *Haw*; angustior; foliis subundecim, suberectis, praerigidis, fragilibus, lanceolato-ensiformibus; fasciis valde obsoletis. *Haw. Syn. pl. succul. p. 66.* *Link Enum. p. 342.* *SALMIA spicata*; foliis rigidis, canaliculatis, maculatis; floribus spicatis. *Cavan ic. 3. t. 246.* (a *Willdenow* perperam ad *zeylanicam* ducta).

Rad. crassa, fibrosa. Folia ped. et ultra, lineari-acuta, interiora breviora, scapum amplexantia. Scapus teres, foliis subaequalis, floribus tectus. Flores plerumque 4 in fasciculo; ad fasciuli basin squama brevis, acuta, inferne latior. Cor. initio virides, postea pallidae, tandem albicantes; tubus gracilis, teres, $\frac{1}{2}$ poll.; lacinae tubo longiores, plerumque revolutae. Filamenta alba. Antherae lutescentes. Germe viride, glabrum. Stylus staminibus crassior; stigma breve, pellucidum, peltatum. Fructus primum viridis, tandem luteus. Semen pulpâ tectum. *Cav.* Folia basi valde attenuata, antice 10 lin. lata, fasciata. *Link. Hab.?*

Obs. Poiret Enc. VI. p. 501. SALMIAM spicatam Cav. cum LAMIOFF spicata LOUR. et SANSEVIERIA aethiopica ad SANSEVIERIA zeylanicam ducit; sic etiam Smith in Rees Cyclop. et Willd. et Redout; Gawler ad guineensem traxit.

9. *S. glauca* *Haw.*; foliis subundecim, patulis, subflaccidis, late lanceolato-ensiformibus, glaucis, obsolete fasciatis. *Haworth Synops. pl. succul. p. 65.*

Hab.?

10. *S. polyphylla* *Haw.*; foliis sub 19, suberectis, rigidis, subfragilibus, late lanceolato-ensiformibus, glaucis, obsolete fasciatis. *Haworth Syn. pl. succul. p. 65.*

Hab.?

11. *S. grandicuspis* *Haw.*; foliis subduodecim, suberectis, lanceolato-ensiformibus, praefasciatis, subulâ magnâ terminatis, subtus lineis 4-6 longitudinalibus, validis, saepe interruptis. *Haworth Syn. pl. succul. p. 67.*

Hab.?

12. *S. stenophylla* *Link*; foliis subtus convexis, lineatis, supra laeviter canaliculatis, non fasciatis. *Link Enum. p. 342.*

Folia longissima, basi non attenuata, viridia, supra lineis 5; marginibus arcuatis, subtus lin. 2, mediis profundioribus, 2 lateralibus levissimis. Nondum floruit. An *S. ensifolia* *Haw.* (qui *S. lanuginosam* *Wild.* cum? pro synonymo habet): an *S. grandicuspis* *Haw.*? *Hab.?*

13. *S. pumila* *Haw.*; foliis subviginti, patulis, lanceolato-ensiformibus, praefasciatis, subtus lineis 4-6 longitudinalibus, validissimis, saepe interruptis. *Haw. Syn. pl. succul. p. 67.* *Link Enum. p. 342.*

Folia breviora, quam in *grandicuspide*. *Haw.* An huc *S. pumila* *Spin?* In *Promont. b. spei.*?

14. *S. fulvocincta* Haw.; foliis sublanceolatis, revolutorecurvis, luride viridibus, obsolete inamoeneque maculatis, fulvo tenuiter marginatis. *Haw. succul. pl. Suppl. p. 30. Link Enum. p. 342.*

Folia subquinque, semipedalia in planta juniore. *Haw. l. c.* Folia lanceolata, poll. et 5 lin. lata, planiuscula, vix maculata, tenui fulvo limbata. *Link. In Brasilia. 4.*

15. *S. carnea* Andr.; foliis distichis, lanceolato-ensiformibus, carinatis; floribus solitariis, sessilibus. *Andrews' Repos. 361. Hort. Kew. ed. II. p. 361. Willd. Enum. H. Berol. p. 575. Rédout. Lil. t. 525. S. rosea* Dietr. *Gaert. Lex. VIII. p. 504. S. sarmentosa* Jacq. *Fragm. p. 68. t. 102. p. 83. t. 132. f. 4. S. sessiliflora*; foliis subgramineis, canaliculato-convolutis, rigidis et lanceolato-explicatis; floribus sessilibus, suberectis, subadpressis, in spica solitariis; limbo tubum fere subaequante. *Gawl. Bot. Mag. 739. et in nota ad 1431. ALETRIS chinensis* Hort. *Angl.*

Sobolifera, fasciculis partim distantibus. Radix crassa, carnosa, horizontalis, repens. Folia 8 circiter in fasciculo, (membranacea, nec crassa, trinervia, 9-15 poll.) extima breviora, acuta, lucida, glabra, interne obscuriora, adulta scapo fere triplo altiora. Scapus 4-6 poll., a terra ad rhachim $1\frac{1}{2}$ poll., (glaber, basi teretiusculus) superne interrupte angulatus, et coloratus. Spica teretiuscula, e floribus 14-17, suâ longitudine a se invicem distantibus. Flores sessiles, irregulariter sparsi, fragrantés, sordide carnei intus pallidiores, bractea late-ovatâ, (auctâ, purpurascente, florem subaequante) membranaceâ suffulti. Cor. persistens, erecta, adpressa; limbo tubum aequante, recurvo: tubus obscure angulatus, basi tumidiusculus (2 circiter lin.); lacinae lineari-oblongae, planae, subacuminatae; exteriores paulum longiores obtusioresque. Filamenta ex ore tubi, erecta, longitudine limbi, pallide carnea. Antherae ovatae, flavae. Germen ovatum, obsolete trigonum, rubrum *Gawl.*, viride *Jacq.*; stylus subpersistens, (longitudine staminum), acute triqueter, filamentis crassior, sanguineus, superne clavato-dilatatus in stigma trilobato-trilobum, albidum. Flores odore fere *Hyacinthi*, polygami, superiores masculi. *Gawl.* Baccae ovatae, monospermae, rubellae cum semine subrotundo. *Jacq. et Gawl. In China. 4.*

Obs. „*Liriodé spicata* Lour. congener, „(ab aliis CONVALLARIAN adscriptâ,)“ a reliquis distincta speciebus.“ *Gawl. l. c.*

16. *S. javanica* Blume; foliis petiolatis, lanceolatis, acuminatis, membranaceis, nervosis, glabris; racemo terminali composito; bracteis 1-2-floris pedicellis brevioribus; stylo stamina subaequante. *Blume Enum. pl. jav. 1. p. 11. In montanis Seribu insulae Javae. h.*

17. *S. flexuosa* Blum.; caule arborescente; foliis confertis, sessilibus, lineari-lanceolatis, planis, rigidis, nutantibus, glabris; racemo terminali, simplici, densifloro, foliis brevioribus; bracteis exiguis 2-3-floris; stylo staminibus sublongiore. *Blume Enum. pl. jav. 1. p. 11.*

Affinis *spicatae* Haw.. *In hortis Javae. h.*

18. *S. fruticosa Blume*; foliis sessilibus, elongato-linearibus, acuminatissimis, planiusculis, rigidis, glabris; paniculâ terminali elongatâ; bracteis pedicellis brevioribus, bifloris. *Blum. Enum. Pl. Jav. 1. p. 11. Enum. Hort. Brit. p. 61.*

TERMINALIS angustifolia Med. Rumph Amb. IV. p. 81. t. 55.

„Truncus crassitie pedis, non firmus, at magnâ ex parte cariosus; cortex exterior cinereus et fissus; rami rari, recti, poll. crassi, ad articulos s. nodos divisi, foliorum rudimentis vestiti. Folia in apice ramorum plura, deorsum inflexa, sessilia, longa, angusta, crassiuscula, flaccida, subtiliter longitudinaliter striata, 17-20 poll., trita succum viridem fundentia. Corymbi longi (paniculae). Flores tubulosi, albi, externe parum virentes et angulosi, longiores quam in *Terminali*. Petala 6 angusta, quorum 5 retroflexa. Baccae majores quam in *Terminali*, fere instar cerasorum nigrorum, rotundae vel parum compressae, 2 sibi adcumbentes, extus virides ac diu flavescentes, dein rubentes. Ossiculum durum, solitarium, in baccis geminis 2 opposita, dimidio spans referentia, fusca, splendentia.“ *Rumph. In Moluccis et in Javae montanis. h.*

Quid *SANSEVIERIA stricta Don H. Cantab.?* *venosa Don l. c.?*

1561. L O M A T O P H Y L L U M.

1. *L. borbonicum Willd. Mag. naturf. Freund. 5. p. 166.* *ALOE purpurea Lam. Enc. meth. 1. p. 85.* *A. marginalis*; caudice arboreo; fol. dentato-spinosis; germinibus ovato-globosis, trisulcis. *Decand. Pl. gr. 51.* *A. marginata*; caulescens; fol. lineari-lanceolatis, nutantibus, spinoso-serratis, rubro-marginatis; racemis subpaniculatis; floribus campanulato-cylindræis; capsulis baccatis. *Willd. Enum. h. borol. p. 382.* *DRACAENA marginata*; frut.; fol. dentato-spinosis; racemis axillaribus; baccis polyspermis. *Ait. H. Kew. 1. p. 454. ed. 2. II. p. 277.* *Willd. Sp. Pl. II. p. 157.* *DR. dentata Pers. Syn. p. 571.* *PHYLLOMA aloiflorum Bot. Mag. 1585.* *PH. borbonicum Haw. Suppl. pl. succ. p. 45.*

Palmoideo-arborescens. Caudex simplex, lignosus, 8-ped. vel minor, crassitie brachii vel cruris, (nudus, cinereus.) Folia terminalia, numerosa, conferta, fasciculato-divergentia: inferiora recurva, imbricato-amplexicaulia, lorato-elongata, lanceolato-attenuata, convoluto concava, coriaceo-incerassata, glabra, 3-ped., basi 2-3 poll. lata, lucide viridia, margine rubro, cartilagineo, spinuloso-serrato, 2 lin. lato elegantissime cincta. Caules axillares plures, foliis breviores, complanato-ancipites, racemoso-paniculati, ($\frac{1}{2}$ poll. fere lati, flavescenti-virides, roseo-marginati; rami circiter 5 divaricato-patentes, rubri, basi bracteolâ sordide carneâ, $\frac{1}{2}$ poll.). Racemuli pauci (plerumque 3), multiflori, assurgenti-divergentes, foliolo arido ad divisionem. Pedicelli filiformes, assurgentes, flore sublongiores (poll. breviores, flavescentes, basi rubri). Bracteolae aridae, ovato-acuminatae, (2 lin., flavescentes, dorso longitudinaliter corallinae). Cor. $\frac{3}{4}$ poll. crassitie calami, flava, (purpurea *Lam.*, viridans *Dec.*) extus fusciorubro-fasciata, (laciniis obtusiusculis, intus apiceque viridulis). Filamenta flava, corollâ breviora, 3 longiora; anthe-

rae fulvae, (flavae. Germen virescens, ovato-rotundatum. Stylus rectus, viridi-flavescens, cylindricus. Stigma obtusum). Bacca magnitudine Cerasi, oblato-sphaerica; loculis biseriatae polyspermis. Sem. horizontalia, testâ crustaceo-cartilagineâ nigro-splendente, (saepe abortiva). *Gawl.* In insula Bourbon. *h.*
Obs. Confer *Aloë macram*, quae hujus generis videtur.

1362. PELIOSANTHE S.

1. *P. Teta* *Andr.*; foliis lanceolatis, utrinque acutis, nervoso-plicatis, scapo racemoso brevioribus; corollae laciniis ovato-rotundatis, marginatis. *Andr. Repos.* 605. *Bot. Mag.* 1502. *Redout. Lil.* t. 415. *R. Brown Trans. Linn. Soc.* 1817. VIII. *Reichenb. Ic. et Desc. pl. cult.* t. 14. *TETA viridiflora* *Roxb. Ms. apud Lambert.*

Planta herbacea, vix ped., caesio-viridis. Radix e rhizomate centrali, bulboso, crassius simpliciterque fibrosa, cinerea. Folia plura, radicalia, ambientia, erecto-divergentia, basi in petiolum canaliculatum angustata, oblongo-lanceolata, acuminata, dense transverse-venosa, glabra, 8-10 poll. et ultra, 2-4 poll. lata. Scapus (saepe plures) e foliorum centro, strictus, simplex, vel teretiusculus, subtortus, glaber, ped. et ultra, (saepe tamen folia adaequans), violaceo-viridis, crassitie fili emporetici; deorsum foliolis nonnullis bracteaeformibus, viridibus, albo-marginatis, 4 lin., 3 lin. latis. Racemus oblongus e fasciculis plurimis 2-5 floris, sessilibus. Pedicelli teretes, glabri, longitudine germinis, cum quo continui. Bractee parvae, ovatae, caeruleo-virescentes, margine membranaceae, corollam subaequantes. Flores erecti, diametro $\frac{1}{3}$ unc., violaceo-virescentes, inodori; tubus late patens, obconicus; discus atropurpureus circulo lilacino antroque viridi; lacinae aequales, explanatae, carnosae, fauce fornicatae, longitudine fere germinis, 3 interiores paulo majores. Antherae sessiles, didymae, margine interiori faucis adnatae, polline flavo, (liquido, nec polline repletae *Redout.*). Germen ooideum, 3 locale: loculis 2-spermis; (mox tamen post fecundationem ovula 1-3 se magis evolvunt, et pericarpium rumpunt, quod ad basin seminum 1-3 nudorum remanet. *R. Brown*). Stylus brevis, crassus; stigmatibus trilobis, lobis excisis. Fructus capsula 3-partita, per faucem corollae excrescens, ita ut speciem 3 exhibeat baccarum nudarum. Semina fere obovata. *Gawl. et Reichenb.* Prope Chittagong in Bengaliam. 4.

2. *P. humilis* *Andr.*; foliis elliptico-lanceolatis, subseptemnervibus, scapo longioribus; bracteis florem aequantibus; racemo subovato; (corollae laciniis ovato-lanceolatis, margine hyalinis). *Andr. Bot. Repos.* t. 634. *Bot. Mag.* t. 1552.

Scapus viridis, striatus, simplex, erectus, 2 poll.. Folia subgemina plurave, utrinque longius attenuata, scapo longiora, intense viridia, subtus flavicantia, glabra, plana, acuminata, 3 poll., ultra pollicem lata. Bractee lineari-lanceolatae, geminae, pallide virides, albido-marginatae, $\frac{1}{2}$ poll., 2 lin. latae. Pedicelli vix 4 lin.. Cor. rotato-patens, minor, puriusque viridis quam in *Teta*, diametro 3 lin., papulis rugulisve extus scabra; lacinae acutae, vel obtusiusculae, emarginatae, virides, albo marginatae; dis-

cus concolor, circulo saturate viridi, punctis 6 flavis. Coronula staminea brevissime prominens, cupulato aperta. Germen disco corollae totum immissum, nec postice exstans. *Gawl.* In insula *Prince Wales*. 4.

Quid PELIOSANTHES altissima *Donn h. Cantab. ed. 7.*

1373. BULBOSPERMUM.

1. *B. javanicum Blume Enum. pl. jav. 1. p. 15.*

Acaule, habitu ad EUCOMIUM et PELIOSANTHEM aliquatenus accedens. Rad. fibrosa. Folia longe petiolata, lanceolata, membranacea, nervosa. Scapus erectus, simplex, superne bracteis subimbricatis, unifloris. Flores virides, pedicellati. *Tontier (Sund).* In sylvis montanis *Javæ*. ☉.

1364. LINDERA.

1. *L. umbellata Thunb. Jap. 145. t. 21. Diss. nov. gen. p. 64. Willd. Spec. II. p. 231. Lam. Enc. III. p. 527. Kuro Nosji Kaempf. Amön. 908.*

Caulis fruticosus, laxis; rami ramulique alterni, flexuosi, glabri, patentissimi. Folia in apicibus ramulorum aggregata, petiolata, oblonga, acuta, integra, supra viridia, glabra, subtus pallida, villosa, poll. Petioli vix lin., supra villosi. Umbella terminalis, simplex, multiflora. Pedunculi parum pilosi, unguiculares. Pedicelli tomentosi, duplo fere breviores. Petala flavescentia, $\frac{1}{2}$ lin. *Thunb.* In *Japonia* monte *Fakona*. h.

Obs. LINDERA *Adans MYRRIS odorata est.*

1465. HERRERIA.

1. *H. stellata Ruiz et Pav.; caule volubili, aculeato; foliis radiatis, lineari-ensiformibus; racemis folio longioribus; calycis foliolis acutis. Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 70. t. 305. f. a. Salsa fol. radiatis, flor. subluteis. Feuill. II. p. 716. t. 7.*

Planta frutescens, arundinacea, glabra. Radix fibrosa, longissima. Caulis teres, ramosissimus; rami juniores inermes, teretes, contorti. Aculei recurvi. Folia 6-9 fasciculata, inaequalia, utrinque striata, obliqua, mucronata, palmaria et ultra, $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Squama parva, orbiculata, undique mucronata ad basin singuli fasciculi, castanea. Pedunculi e centro foliorum solitarii, aliquando 2-3, longissimi, racemosi. Racemi simplices, rarius divisi, inferne foliosi. Pedicelli 3-4 ni, 1-flori, bracteolâ trifidâ cartilagineâ, tenues. Cor. lutescens, odora. Caps. pendula, valvulis medio septiferis. Semina atra, plana, nitida, septis intermediis affixa. *Ruiz et Pav.* In sylvis regni *chinensis*, prope *Concepcion; Rere, Itatae* etc. h.

2. *H. Salsaparilha Mart.; caulibus teretibus, aculeatis; foliis lanceolatis vel lanceolato-oblongis, acuminatis, stellato-fasciculatis; racemis erectis, foliis brevioribus; calycis foliolis lineari-lanceolatis, obtusiusculis. De Martius in Buchn. Repertor.*

Frutex scandens rhizomate tuberoso SMILACI *Chinae* simili, oblongo

vel subgloboso, 3-4 poll., epidermide tenui cinerascete, intus lignoso albido; fibris varie tortis. Caules plures, basi albidi, superne virides, 6-15 ped.; ramis sparsis, scandentibus, lignosis, nodosis, apice flexuosis; aculeis acutis, rectis. Folia in ramulis brevibus lateralibus substellata, sessilia, basi attenuata, glabra, costa dorsali et nervis longitudinalibus parallelis subtus prominentibus, nitida, pulchre viridia, spithamea. *De Mart.* In *Provincia Minas Geraës Brasiliae*. †

5. *H. parviflora* *Bot. Reg.*; (caule glabro); foliis lanceolatis; (racemis pendulis, folia superantibus); perianthii laciniis ovatis, obtusis. *Bot. Reg.* 1042.

Caulis suffruticosus, sarmentosus, volubilis, teres, durus, glaber, atroviridis. Folia fasciculata, basi attenuata, canaliculata, lineata, glabra, laete viridia, (in ic. 3¹/₂ poll., 3/4 poll. lata). Racemi e foliorum axillis multiflori. Flores binati, a pedicello decidui, luteo-virides, mel spirantes, (5-4 lin. diametr.). Petala reflexa, subaequalia, basi imbricata. Stamina basi petalorum inserta. Filamenta subulata. Antherae ovatae, anticae, versatiles. Germen ovatum, trigonum, triloculare, polyspermum. Stylus cum germine continuus, triqueter, glaber. Stigma trilobum, papillosum, lobis decurrentibus. *Lindl.* In *Brasilia circa Rio Janeiro*. †

1566. S C H E L H A M M E R A. *)

1. *Sch. undulata* *R. Br.*; foliis amplexicaulibus, ovatis, undulatis; floribus subsolitariis; caule diviso; petalorum unguibus foveolatis. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holland.* p. 274. *Circa P. Jackson.* †

2. *Sch. multiflora* *R. Br.*; foliis brevissime petiolatis, aversis, ellipticis, acuminatis, planis; pedunculis aggregatis, fructiferis recurvis; caule simplici flexuoso. *R. Br. l. c.* In *ora nov. Holland. intra Tropicum. Herb. Banks.* †

1367. B U R C H A R D I A.

1. *B. umbellata* *R. Brown Prodr. nov. Holl.* p. 272. Radix e fibris crassis fasciculatis. Caulis simplex. Folia linearia, vaginam integram, supra semivaginantia. Umbella simplex, pedicellis inarticulatis, basi unibracteatis. Flores albi, antheris purpureis. *R. Brown.* In specimine nostro: radix fasciculata e fibris carnosissimis pluribus albidis. Caulis erectus, inferne anceps, superne teretiuseculus, glaber, basi purpurascens, punctatus, superne viridis, 3 poll.-spithameus, primum foliis inferioribus brevior, serius eorum longitudine. Folia inferiora plura vaginantia, vaginis emarcidis hactenus, junioribus fuscis purpureo-punctatis, linearia, apice subulato-acuminata, glabra, longitudinaliter nervosa, viridia, basi et ad nervum medium obsolete purpureo-punctata, 6-8-poll., inferne 3 fere lin. lata; caulina 2-3, similia,

*) Rad. fibrosa. Caulis basi suffruticosus, angulatus, foliosus. Folia latiuscula, nervosa, amplexicaulia v. subpetiolata. Flores terminales, erecti, purpurei vel albi. Pedunculi 1-flori, ebracteati, cum flore inarticulati. Antheras purpureas. *R. Br.*

vaginantia; supremum spatha lanceolata, acuta, glabra, viridis, purpureo-punctata, 2½ poll. sub umbella. Umbella 4-5 flora: pedicelli erecti, glabri, basi apiceque quidquam crassiores, teretes, 5-6 lin., virides, singulus basi bractea lineari-lanceolata, acuta, glabra, nervosa, pedicellis duplo brevior, subinde tamen etiam longior. Petala subaequalia, patentia, obovato-spathulata cum mucronulo, glabra, nervis obsolete, albida, carina vel nervo medio intensiore, 2-2½ lin., lin. lata, unguibus brevibus basi foveola nectarifera. Filamenta petalis breviora, plana, basi lata, apice subulata, glabra. Antherae medio dorsi affixae, versatiles, vix peltatae. Stylus brevissimus; stigmatibus 3 acutis, glabris, subreflexis. Germen ovatum, trigenum, glabrum, stamina subaequans. Circa Port Jackson. 4.

1568. L E D E B O U R I A.

1. *L. hyacinthoides* Roth nov. Spec. p. 195. Spreng. S. V. II. p. 97. MELANTHIUM *hyacinthinum* Heyne MS. ANTHERICUM *hyacinthoides* Willd. MS. ERYTHRONIUM *indicum* Rottler fide Sprengel l. c.

Bulbus ovatus, magnitudine NARCISSI *poetici*, squamis membranaceis, fusciscentibus. Folia 4-5 glabra, flaccida, digiti longitudine et ultra, basi in petiolum membranaceum attenuata, oblonga, lanceolato-acuminata, saepius incurva et conduplicata. Scapus filiformis, pubescens, nudus, oblique ascendens, foliis nonnunquam longior. Racemus terminalis, oblongus, uncialis aut biuncialis, densus, habitu et magnitudine COXY. *bifoliae*. Flores hyacinthini, subnutantes, pedicellati. Bractea sub quovis pedicello membranacea, nivea, nitida, lanceolato-subulata. Pedicelli capillares, nudi, bractea 3-4 plo longiores. Petala oblonga, linearia, sessilia, apice incurva, subcucullata, erecto-patula, persistentia. Stamina longitudine pistilli. Filamenta violacea, erecta, basi petalis inserta. Antherae subrotundae. Germen breviter pedicellatum. Stylus centralis, erectus, violaceus, stigmatibus acuto. Utriculi obovati, uno alterove saepius abortivo. Semina fusca. Roth. In India orientali. Heyne.

Obs. Existat in Herb. Willd. MELANTHIUM *hyacinthoides* König (Nariwajam Tamul) nomine ANTHERICI *hyacinthoidis*, ejus sequentem diagnosin dedit ill. de Schlechtendal pater: „foliis lineari-lanceolatis, scapo simplici longioribus; floribus racemosis, nutantibus.“ Folia describit „bipedalia, obtusiuscula; pedicellos flore longiores, basi bractea squamiformi, scariosa, brevior. Petala lineari-lanceolata, acuta, basi incumbentia, apice patentia; exteriora basi latiora. Stamina longitudine corollae. Germen globosum, hexagonum.“ Reliqua exacte quadrant. An species distincta?

1569. G L O R I O S A.

1. * *Gl. superba*; foliis cirriferis (inferioribus oblongo-superioribus ovato-lanceolatis; petalis lanceolatis, undique undulatis). Linn. Spec. 1. p. 457. Mant. p. 364. Zeyl. p. 51. Willd. Spec. II. p. 95. Mill. Dict. n. 1. Schneerogt ic. 35. Andrews Repos. t. 129. Kerner H. semp. l. 29. Bot. Reg. 77. Gart. Mag. VI. 57. t. 1. Gaertn. fruct. 1. t. 18. f. 1. METHONICA *superba* Lam. Enc. IV. p. 133. (excl. β) ill. t. 247. f. 1. Desf. Ann. Mus. I. 127. Réduit. Lil. t. 26. Burm. zeyl. 158. Herm. lugdb. t. 689.

Pluk. Alm. 249. t. 116. f. 3. *Commel. Hort.* 1. p. 69. t. 35.
Rudb. Elys. II. p. 178. f. 7. *Mendonii Rheed. Malab.*
 VII. t. 57.

Caulis orgyalis, teres; ramis 2 oppositis, lateralibus; caulis, postquam ramos emisit, pedunculum e singulis foliorum axillis exserit. Folia alterna, at sub ramis terna. Flos cernuus, figurâ flammæ supra crateres, spectatissimus, coccineus, basi flavus, demum totus coccineus. Petala flava, lanceolata, longa, lateribus undulata, coccinea, prope basin reflexa. Radix rectangula, decumbens, venenata. *Linn.* Rad. carnosâ, fragilis, crassitie poll., superne curvata, e ramis 2 perpendicularibus. Caulis ex angulo radicis, laevis, fere sarmentosus, prostratus vel adscendens, crassitie pennæ anserinae, 6 - 10 ped.; medio plerumque ramis 2 - 4 pendulis. Folia sparsa, sub ramis opposita ternave, lanceolata, sessilia, glabra, longitudinaliter striata, 4 - 8 poll., 1 - 2 poll. lata, suprema angustiora et complicata, apicè cirro simplici, revoluta. Pedunculi solitarii, teretes, nudi, horizontales vel recurvi, foliis longiores, ex axillis foliorum superiorum. Flores ante anthesin nutantes et hexagoni, 2 - 3 - poll. Calycis foliola vel petala acuta, undulato-crispa, apice incurva, canaliculata, basi attenuatâ protuberantiâ parvâ longitudinali, ante anthesin virescentia, medio ad apicem sanguinea, a medio ad basin primum flava, serius sanguinea. Stamina corollâ paulo breviora. Filamenta cylindrica, acuta, horizontalia, primum virescenti-flava, serius rubra. Antherae versatiles, lineares, compressae, truncatae, medio dorsi affixae, 5 lin., polline flavo. Stylus rectus, filiformis, stamina aequans, primum horizontalis, serius oblique adscendens. Stigmata 3 gracilia, patentia. Caps. ovato-oblonga, trigona, trisulca, glabra, 2 poll.; valvulis 3 interne nitentibus, fulvis. Sem. rubra, globosa, umbilico prominulo, biseriata. *Desf. Lam.* *In Malabar, Zeylona; etiam in Nepalia, (fide specim. in herb. cli Martius ab ill. Lambert communicatum, in quo folia tantum paulo angustiora, et quod omnino diversum a Gl. Doniana.)* 4.

2. *Gl. virescens Lindl.*; foliis cirriferis, pedunculis reflexis; petalis subovatis, unguiculatis, apice tantum undulatis, reflexis. *Lindl. Bot. Mag.* 2630. *Trans. Hort. Soc.* VI. p. 277. *Gl. superba* β petalis subovatis, vix undulatis *Lam. Enc.* IV. p. 135.

Cirri minores; flores $\frac{2}{3}$ minores quam in *Gl. superba*; obscure luteo-virescentes; ungues lutei; pars anterior rubra, margine luteo. *Lindley.* In planta *Lamarckiana*: flores triplo minores; petala ovata vel subovata, mucronata, integerrima, vix undulata, 2 poll., 9 lin. lata; pedunculi foliis breviores. *In Senegambia.* 4.

Obs. An huc *GLORIOSAM* species caule ancipiti a *Gl. superba* diversa, quam *div. C. Smith* in Guinea legit; *Hornem. d. ind. pl. guin.* p. 12?

3. *Gl. Doniana*; foliis confertis, lineari-lanceolatis, cuspidatis cirrosisque; flore terminali, solitario. *Gl. simplex Don Prod. Fl. nep.* p. 51.

Caulis simplicissimus, foliosus. Flos pedunculatus, duplo minor quam in *Gl. superba*, atque folia angustiora. *Don. Clo Spreng. Cur. post.* p. 135. varietas angustifolia *Gl. superbae* esse videtur. *In Nepal. Wallich.* 4.

4. * *Gl. simplex*; foliis acuminatis. *Linn. Mant.* 62. *Lam. Enc.* IV. p. 134. *Willd. Spec.* II. p. 96. *Gl. caerulea* foliis ovato-lanceolatis, acutis. *Mill. Dict.* 2. *METHONICA gloriosa simplex Salisb. MSS.*

Folia non cirrosa. Flores coerulei. *Linn.* Caulis debilis, sarmentosus, foliosus. Folia laevia 3 poll. lata: trita graveolentia, caput obnubilantia. *Mill. In Senegal.* 4.

1370. U V U L A R I A.

1. * *U. perfoliata*; foliis perfoliatis, ellipticis, obtusis cum acumine brevi; corollâ campanulatâ, intus scabratâ; antheris cuspidatis. *Smith Exot. Bot.* 1. p. 97. t. 49. *Rees Cyclop.* *Linn. Spec.* 457. *Willd. Spec.* II. p. 94. *Mill. Dict.* n. 2. *H. Kew. ed.* 2. II. p. 247. *Pursh Fl. sept. Amer.* 1. p. 251. *Bigel. Bost.* p. 81. *Elliott Sk.* 1. p. 390. *Bart. Fl. Amer. sept.* 1. p. 32. *Torr. Fl. N. M. St.* p. 351. *Trattin. Tabular.* t. 663. *U. perfoliata* β . minor. *Mich. Fl. bor. Amer.* 1. p. 199. (fid. *Torr.*) *U. perfoliata* β . minor. *Réd. Lil.* t. 184. (excl. *Ait.* et *Willd.*) *Bot. Mag.* 955. *Gron. virg.* 37. *Cold. Noveb.* 74. *Moris. Hist.* III. S. 13. t. 4. f. 12.

Plantae Burseri (XVII. 61) ex Toupinambault Brasiliae à pharmacopaeo allatae et *C. Bauhin* (Polygonatum latif. perfol. brasil. *Pin.* 303 *Prodr.* 139) communicatae, videntur mihi omnes ex Canada fuisse. *Linn.* Radix e fibris pluribus patentibus, attenuatis, carnosis, pallidis. Caules solitarii, erecti, (8) 12-15 poll., teretes, glabri, foliosi, saepius quidquam ramosi vel subdivisi; ramis alternis. Folia fere $\frac{1}{2}$ poll. a basi perfoliata, plana nec undulata, 2 poll., utrinque glabra, subtus pallidiora et glaucescentia, (subcordata, nervosa). Flores terminales, solitarii, penduli; pedunculis brevibus. Petala $\frac{3}{4}$ -1 poll., pallide virescentiflavida, intus protuberantiis flavidis asperiuscula, (lineari-lanceolata). Sulci nectariferi lineares, minimi. Stamina petalis dimidio breviora. Antherae longitudine filamentorum, intus longitudinaliter dehiscentes, subulato-acuminatae. *Smith in Rees.* Germen obovatum. Stylus staminibus longior. Sem. subglobosa. *Torr.* Caps. turbinata, trigona, angulis sulcatis, *Darlingt.*; truncata, tricornis, *Bigel.* Anne Michaux potius ad *U. flavam*? *In umbrosis sylvaticis inter rupes a Canada ad Carolinam.* 4.

Obs. *Burseri* Brasiliae adscriptam plantam e Canada venisse videri; ex *Herbar. Linn.* manifestum esse, virum immortalem species et synonyma confudisse sub *U. perfoliata*; Polygonatum latif. perfol. brasil. *Bauh. prodr.* (quod 2 cubit., foliis perfoliatis, 2 poll. latis, 4 longis; flore magno, albo; petalis angustis 5, 2 poll. longis) forte ad *U. grandifloram* spectare: *Smith in Rees.*)

2. *U. flava* *Smith*; foliis perfoliatis, elliptico-oblongis, obtusis, basi undulatis; corollâ basi attenuatâ, intus scabratâ; antheris cuspidatis. *Smith Exot. Bot.* 1. p. 97. t. 50. *Rees Cyclop.* *Ait. Epit.* 576. *Pursh Fl. Sept. Amer.* 1. p. 231. *Elliott Sk.* 1. p. 390. *Torr. Fl. N. M. U. St.* p. 351. *U. perfoliata* *Gron. Virg.* 51. *U. perfoliata* α *Bot. Mag.*

955. (icon.) *Tratt. Tabul. 660. ANONYMOS pudica Walt. Fl. Carol. 125.*

Folia minus lata, quam in *perfoliata*, minus nervosa, magis oblonga revolutaque, basi angulata vel undulata. Flores majores, magis elongati, basi angustati, intensius flavi. Petala recta, linearia, angustiora, $1\frac{1}{4}$ poll., acutiora, basi attenuata, intus punctis aurantiacis exasperata. Antherarum cuspis longior, magis conspicuus. *Smith in Rees. Torrey non vidit. In sylvis umbrosis arenosis a Nova Caesarea ad Carolinam meridionalem. 4.*

5. *U. grandiflora Smith*; foliis perfoliatis, oblongis, acutis, basi undulatis; petalis utrinque laevibus; antheris obtusiusculis; nectariis subrotundis. *Smith exot. Bot. 1. p. 99. t. 51. Rees Cyclop. Pursh Fl. sept. Amer. 1. p. 251. Elliott Sk. 1. p. 391. Torr. Fl. N. M. U. St. p. 552. Gawler Bot. Mag. 1112. H. Kew. ed. 2. II. p. 247. Trattin. tabular. 662. U. lanceolata H. Kew. ed. 1. p. 454., ed. 2. II. p. 247. Willd. Spec. p. 94. U. perfoliata *a* major Mich. Fl. bor. Amer. 1. p. 199. U. perfoliata *A. major. Red. Lil. t. 184. (sive Smith excl. pl. syn. in Poir. sphalmate t. 181.) Cornut. Canad. t. 59. Barrel. ic. t. 725.**

U. flava duplo fere major; folia magis oblonga apiceque attenuata, magis undulata basi subplicata. Flores laete flavi. Petala $1\frac{1}{2}$ poll., magis conspicue nervosa, intus laevia, basi impressione nectariferâ rotundatâ, ut in FRITILLARIA, viridi. Antherae longiores et fere lineares, vestigio parvo, membranaceo cuspidis, haud semper discernendo. Flores mense praecocios. *Smith. Rad. repens. Caulis pedalis et ultra, teres, inferne vaginis pluribus radicalibus, membranaceis, striatis, flavescenti viridibus striisque purpureis variegatis vestitus, superne foliosus dichotome ramosus. Rami foliosi, laxi, flexuosi, nutantes. Folia alterna, lanceolato-ovata, heteromalla, supra nervoso-lineata, subtus pubescentiâ densâ, brevi, holosericeâ, 2-3 poll., pollicem lata, acuminata. Pedunculi filiformes, ramei, axillares, uniflori, recurvi, 1-4, medio bractea foliacea, nutantes, secundi. Cor. oblongo-campanulata, basi turbinatim angustata, flava, pendula, $1\frac{1}{2}$ poll.: lacinae basi levissime cohaerentes, oblongae, saepe quidquam tortae, intus obsolete tuberculatae et nervosae, basi foveolâ lineari-oblongâ, mucrone obsolete membranaceo: exteriores latiores, sublanceolatae, interiores magis lineares. Stamina corolla duplo breviora, erecta; filamentis basi germen inter et lacinas insertis, basi dilatatis: interiora breviora. Antherae filamentis triplo longiores, subsagittatae, mucrone minimo membranaceo. Germen viride, obovatum, obsolete trigonum, 6-sulcatum. Stylus germine longior, sulcato-trigonum. Stigmata linearia, stylo parum breviora, recurva. *Gawl. In collibus umbrosis inter rupes in humo fertili a Canada ad Carolinam. 4.**

Obs. Pursh l. c. sive speciminis in Herb. Lambertiano U. lanceolatae H. Kew. eandem dicit cum grandiflora Smith, uti Smith in Rees, et Gawler Bot. Mag. 1112. Cornuti tabulam 39, in H. Kew. ad U. lanceolatae laudatam, ad grandifloram trahit. Attamen in H. Kew. ed. II. lanceolata: "foliis perfoliatis, ovato-lanceolatis, acuminatis," (eandem diagnosi, uti in l. edit.) cum Cornuti tab. sub N. 2., et U. grandiflora (cum diagnosi Smithiana) sub N. 4. cum Bot. Mag. 1112. tanquam species diversae proferuntur. Poir. Enc. meth. III. p. 279. U. lanceolatae H. Kew. ad U. perfoliatam

tam β minorem Mich. trahit cum Redouté, cui folia angustiora, flores pallidiores, intus magis exasperatos, capsulam brevioram magis compressam tribuit.

4. **U. sessilifolia*; caule glabro, apice bifido; ramulo altero (plerumque) sterili, altero unifloro; foliis subsessilibus, lanceolato-ovalibus, subtus glaucescentibus; corollae laciniis planis, ovalibus (utrinque glabris); capsulâ ovoideâ, stipitatâ; (nectariis oblongis). *Mich. Fl. bor. Am.* 1. p. 199. *Pursh Fl. sept. Am.* 1. p. 231. *Big. Bost.* p. 81. *Elliott Sk.* 1. p. 392. *Bart. Fl. Am. Sept.* t. 54. f. 1. *Torr. Fl. N. M. U. St.* p. 352. *Poir. Enc.* VIII. p. 280. *Linn. Spec.* 457. *Willd. Spec.* II. p. 95. *Hort. Kew. ed. II.* p. 247. *Smith Exot. Bot.* 1. p. 101. t. 52. *Rees Cyclop.* *Cold. Novemb.* 75. β floribus majoribus. *U. sessilifolia Bot. Mag.* 1402. γ. ramulo utroque florifero; floribus majoribus; laciniis lineari-lanceolatis, acutis. *U. sessilifolia Trattin. Tabul.* 661.

„*Habitus perfoliatae.* Caulis bifidus, 1-florus. Folia lanceolato-ovata, alterna; at ubi flos ex altero ramo exit, folia bina adsunt. Pedunculus nudus. *Linn.* Caulis glaber, purpurascens. Folia subtus et margine saepius tenuiter pubescentia. Petala magis spatulata, nectario virescente. Antherae vix cuspidatae. *Smith in Rees Cycl.* Apud *Poiret*: radices fibrosae; caules 6-10 (et 12) poll., tenues, basi vaginis tenuissimis obtusis; folia utrinque glabra, fere obtusa; cor. lacinae lanceolato-oblongae, subacuminatae. „*Caps. ovata, triquetra, utrinque acuta; angulis prominentibus, acutis.*“ *Darlingt.* In specim. in Herb. *Schreber.* sine nomine asservatis, in Amer. bor. lectis: caules 5-7 poll., ad medium usque vaginis 2-3 tenuibus; supra medium rami 2 erecto-patentes, graciles; folia ovato-lanceolata, acuta, tenuiter nervosa, utrinque glabra, patentia, 9-18 lin., 3¹/₂-4¹/₂ lin. lata; pedunculi filiformes, subnutantes et varie flexi, glabri, 3-4 lin.; flores 6 lin.; cor. tubuloso-campanulatae; petala pallide flava, lanceolata, acutiuscula, aequalia, utrinque glabra, nervis tenuibus longitudinalibus, 1¹/₂ lin. latae; stamina corollâ ¹/₃ breviora, alterna paulo longiora; antherae filamentis triplo longiores, 2¹/₂-3 lin., obtusiusculae; stylus longitudine staminum; stigmata 3, lin. fere longa; germen ovatum in stipitem brevem attenuatum. In β, quod habitu varietati praecedenti, floribus γ simile: caulis 6-poll.; folia elliptico-lanceolata, subtus vix pubescentia, 4-4¹/₂ poll., 5-6 lin. lata; pedunculus crassior, nutans, 3-4 lin.; cor. pallide flava, 10 lin., laciniis lanceolatis, acutis, nervosis; nectaria oblonga. In γ, quod forte species propria: caulis duplo crassior, 7-poll., glaber vel pilis rarissimis, inferne vaginis aliquot longis tenuibus obtusis; superne dichotome ramosus; ramo altero 1 floro, altero bifloro. Folia lanceolata, acuminata, basi amplexicaulia, ut videtur, utrinque concoloria, tenuissime nervosa, utrinque glabra, margine sub lente glanduloso-ciliolata, 15-18 lin., 5 lin. lata. Pedunculi fere oppositifolii, erectiusculi et subnutantes, nudi, glabri vel pilis rarissimis, duplo crassiores quam in α, apice quidquam incrassati, 5 lin.. Cor. pallide flavae, subcampanulatae, 9-11 lin.; petala vel lacinae utrinque glabra, fere linearia, acuta, apice quidquam patentia, minus nervosa quam in α, 2 lin. fere lata. Stam. corollâ duplo fere breviora; filamenta breviter dilatata; antherae 5 lin., filamentis 4-plo

longiores, acumine brevissimo, obtuso. Stylus stamina paulo superans, trigonus: stigmata 3, subpatentia, $1\frac{1}{2}$ -2 lin.. Germen ovato-oblongum basi in stipitem brevem angustatum, 3 lin.. Ad specimen sine nomine in *Herb. Schreb.*, quocum exacte convenit icon in *Trattinick Tabul.* praeter petala ibidem magis dilatata. In sylvis umbrosis a Canada ad Carolinam. 4.

5. *U. puberula Mich.*; caule puberulo; foliis utrinque concoloribus, ovalibus, basi rotundatis, subamplexicaulibus; corollae laciniis acutis, intus laevibus (utrinque glabris); capsulâ sessili, ovata. *Mich. Fl. bor. Am. 1. p. 199. Pursh Fl. sept. Am. 1. p. 252. Smith in Rees Cycl. Richards. App. Frankl. Journ. p. 10.*

Affinis *sessilifoliae*: sed flores majores. Herba tenera, pedalis, subdichotomo-ramosa: ramis patentibus et cum caule pube brevi interdum vix conspicua indutis. Folia ovata vel cordato-acuminata, nervosa, saepe obliqua, sessilia, superiora semiamplexicaulia, nervis pilis paucis brevibus instructis. Pedunculi 4-3, terminales, flore breviores, nutantes. Corolla flavescenti-alba, tubuloso-campanulata, petalis 6 serie duplici, aequalibus, linearilanceolatis, basi fovea nectariferâ, subcarinatis. Stylus stamina et corollam subaequans, stigmatibus 5 brevissimis. Germen 5-quetrum, 5-loculare, loculis polyspermis. *Richards.* Folia utrinque viridia, partim amplexicaulia, notat *Smith l. c.*, addens in specimine a *Menzies* in *Amer. bor. occid.* lecto: folia ovata, acuta, nervis validis, venulis transversis conjunctis; caulem purascentem pilis sparsis; pedunculos stylumque hirsutos; antheras lineares sine cuspidate, ut in *grandiflora*; respondere foliis et inflorescentiâ *lanuginosae Curt.*: sed in hac pedunculos stylumque glabros esse depictos. In Carolinae montibus altis, in sylvis opacis Americae arcticae. *Richards. 4.*

6. *U. cirrosa Thunb.*; foliis sessilibus, cirrosis. *Thunb. jap. 136. tab. II. Willd. Spec. II. p. 136.*

Caulis teres, articulatus, striatus, glaber, simplex, erectus. Folia ex eadem gemma duo sessilia, linearia, apice cirrosa, integerrima, glabra, digitalia. Flores ex gemma foliorum, pedunculati, cernui. Pedunculus reflexus, uniflorus, unguicularis. Petala 6, oblonga, lutea, subpollicaria. Filamenta 6, germiini inserta, alba, corollâ duplo breviora. Antherae oblongae, didymae, inclusae. Stylus unicus, corolla paulo brevior, staminibus longior. Stigmata 5 reflexa. *Thunb. l. c. In Japonia. 4.*

Obs. Cls *Sprengel S. I. II. p. 63.* ad *FRUTULARIA verticillatam Willd.* ducit hanc plantam; ex utriusque descriptione distinctissimam. *U. hirta* plane neglexit.

7. *U. ? hirta Thunb.*; foliis amplexicaulibus, hirtis; caule villosa. *Thunb. Fl. jap. p. 157. n. 94.*

Caulis teres, pilis longis, densis valde hirsutus, erectus, crassitie calami, pedalis. Folia alterna, cordata, oblonga, acuminata, 7-nervia, patentia, pilis brevissimis, 2 poll.. Flores non vili. *Thunb. In Japonia juxta Jedo. 4.*

1371. DISPORUM.

1. *D. sessile Don*; foliis sessilibus, oblongis, (acutis, glabris; floribus subsolitariis, terminalibus). *UVULARIA sessilis Thunb. Fl. Jap. p. 135. (excl. syn.) Don Prodr. Fl. nep. p. 50.*

Radix fibrosa, fibris longis. Caulis striato-angulatus, erectus, glaber, ped., superne 2-5-fidus; ramis subfastigiatis divaricato-erectis. Folia alterna, integra, nervosa, poll. et ultra. Flores terminales, pedunculati, solitarii vel bini, cernui. Cor. campanulata, alba. *Thunb.*, qui *Uvul. sessilifoliam* *Liun.* citat. *In insula Nipon.* 4.

2. *D. pullum* *Salisb.*; caule angulato, ramoso; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis; racemis fasciculatim 2-4-floris: fasciculis singulis bracteatis; corollâ cyathiformi, campanulatâ, angulatâ, basi calcarato-nodosâ; filamentis antheris aliquoties longioribus. *UVULARIA chinensis* *Gawl. Bot. Mag.* 916. (a quo cum? huc ducitur *FRIFILLARIA cantoniensis* *Lour. Fl. coch.* 1. p. 206.). *H. New. ed. 2 II. p. 217. Tratt. Tabul.* 664. *Mart. Mill. Dict.* n. 5. *STREPTOPUS chinensis*; floribus umbellatis in petiolis florum sessilibus. *Smith in Rees Cyclop.*

Caulis herbaceus, 1½ ped., glaber, subgeniculato-flexuosus, superne ramis simplicibus patentibus, alternis, quidquam purpureo-striatus. Folia breviter petiolata, glabra, multinervia, nervis 3 validioribus; caulina latiora, distantia, elliptica, 2-5 poll., poll. lata, petiolo brevissimo purpurascente: ramea angustiora, magis acuminata, 2½-5 poll., ½-1 poll. lata, magis congesta. Umbella e floribus 5-4 nutantibus; pedicelli ½ poll., angulis pluribus asperulis. Bractea foliis reliquis similis. Cor. cernua, pedicello duplo longior, externe fuscescens, intus glabra: petala omnia elongata, gibbosa. Stamina corollae et pistillo aequalia. Filamenta subulata, linearia. Antherae luteae, 2-5-plo filamentis breviores. Germen turbinato-triquetrum, stylo (longitudinis staminum) pluries brevius. Stigmata patentia, revoluta-recurva. *Smith et Gawk. In China.* 4.

Obs. Genus proprium constituere videtur etiam clo *R. Brown. prodr. Fl. nov. Holland.* p. 74. medium *UVULARIAE* inter et *SCARLETTARIAE*, ob perianthii foliola calcarato-saccata, stamina eorum basibus inserta, simulque decidua, et germinis loculos dispermosi

5. *D. Pitsutum* *Don*; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, petiolatis; umbellis multi-(7)-floris; pedicellis flore brevioribus; foliolis perianthii oblongis, obtuse mucronulatis; filamentis antheris duplo longioribus; stigmatibus stamina aequantibus. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 50., et hoc teste: *UVULARIA Pitsutu* *Hamilt. Miss.*, et, cum? *UVULARIA umbellata*; fol. oblongis, acutis, subsessilibus; umbellis oppositifoliis, pedunculatis, bracteatis; pedicellis elongatis, divaricatis. *Wallich. Asiat. Research.* 15. p. 579. *STREPTOPUS peduncularis* *Smith in Rees Cycl.* n. 5.

Caulis 3-ped., ramosus. Folia 5-poll., 1-1½ unc. lata, in ramis angustiora ac longius acuminata. Flores flavi, magnitudine *Uvul. sessilifoliae*. Proximum *Disporum fulcum* (nobis ignotum) differt statura humiliore; umbellis 3-4-floris, brevissime pedunculatis; floribus fulvis, pedicellis duplo longioribus. *Don. Uv. chinensi* *Her* proximum; caulis foliaque omnino, ut in hac; sed umbellae e floribus 7-8 viridibus, pedunculatae, in foliorum petiolis. Pedunculus communis deflexus, longitudine pedicellorum, et, uti hi,

ad angulos scaber. Petala pedicellis duplo breviora, (7-9 lin.) gibbosa, basi plerumque tubulosa; exteriora paulo latiora brevioraque. Filamenta antheris triplo longiora; antherae lineares apice fissae. Stigmata 3, recurva, profunde partita. Bacca triloba, 3 locularis; seminibus solitariis. *Smith. Ad Chitlong Nepalensium. Hamilt. 4.*

4. *D. parviflorum Don*; foliis lanceolatis, cuspidatis, petiolatis; umbellis sub-5-floris; pedicellis perianthio duplo longioribus; perianthii foliolis lanceolatis, acutis; filamentis antheris brevioribus: stigmatibus antheras superantibus. *Don Prodr. Fl. nep. p. 50. UVULARIA parviflora*; fol. oblongo-lanceolatis, acuminatis, petiolatis; pedunculis oppositifoliis, elongatis, apice bracteatis; floribus umbellatis. *Wallich Asiatic Research. 13. p. 378.*

Caulis 3-4-ped.. Folia 5-6-poll., unc. lata. Flores flavi, duplo minores, quam in *D. Pitsuto. Don.* Caulis glaber, superne flexuosus et ramosus. Folia apicem versus margine tenuissime serrulata, nervis 5 fortioribus subtus prominentibus. Petioli vix ultra lin., ad angulos scabri, uti pedunculus communis 9-10 lin., paulo infra umbellam folium gerens. Pedicelli 5-6, scabri, 5-6 lin.. Cor. 4 lin.; lacinae acuminatae, carinatae, exteriores paulo longiores, lin. latae. Stam. corollâ duplo fere breviora; antherae obtusae, fere lin.. Stylus stamina paulo superans. *In Nepal. Wallich. 4.*

1372. C O M P S O A.

1. *C. maculata Don Prodr. Fl. nep. p. 51. COMPSANTHUS maculatus Spreng. Cur. post. p. 137.*

Herba tota hirsuta, radice fibrosâ, perenni. Caulis 3-ped., teres, strictus, foliosus, apice ramosus. Folia elliptica, acuminata, basi cordata, amplexicaulia, 4-5-poll., 1½-2 unc. lata. Pedunculi dense pubescentes, uniflori, in apice ramulorum gemini. Flores facie et magnitudine UVULARIAE, cernui, albi: intus maculis numerosis purpureis notati. Germen elongatum, triquetrum, staminibus longius, sensim in stylum brevem desinens. Stigmata longa, recurvato-patula, revoluta. Caps. immatura uncialis, fere siliquiformis. Semina fusca. *Don. In Nepal. Wallich. 4.*

1373. E R Y T H R O N I U M.

1. **E. Dens canis*; stylo filiformi; stigmate trifido; petalis lanceolatis, acuminatis; foliis ovato-oblongis. *Linn. Spec. II. 437. Willd. Spec. p. 96. (excl. γ.) Mill. dict. n. 1. Scop. carn. ed. 2. n. 406. Lam. et Decand. Fl. fr. III. p. 107. Bertol. Amoen. it. p. 143. n. 105. Pall. it. II. p. 523. III. p. 317. 349. Marsch. a Bieb. Fl. taur. cauc. Suppl. p. 263. Mert. et Koch Deutsch. Fl. II. p. 559. Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 66. Hall. Helv. n. 1234. Jacq. austr. t. 9. * Curt. Bot. Mag. t. 5. Rédouté Lil. t. 194. Hayne term. bot. t. 4. f. 5. Schkuhr Handb. t. 92. Sturm D. Fl. 1. Fasc. 34.*

Gmel. sib. 1. p. 39. t. 7. Kniphof Cent. VI. n. 39. Knorr del. t. H. 8. E. maculatum Lam. Fl. fr. III. p. 660. E. ovatifolium Poir. Enc. VIII. p. p. 660. α. flore purpureo l. α Gmel. l. c. c. fig. D. c. latiore rotundioreque folio, flore ex purpura rubente. C. Bauh. pin. 87. et Tournef. l. R. H. β. flore carneo. l. β. Gmel. l. c. D. c. l. r. f., flore e purpura candicante. Bauh. et Tournef. ll. cc. γ. flore candido. l. γ. Gmel. l. c. D. c. l. r. f., flore candido. Bauh. l. c. — B. E. longifolium; foliis lanceolatis. Mill. dict. n. 2. Poir. Enc. VIII. p. 660. α. flore purpureo. Gmel. l. c. II. α. Dens canis angustiore longioreque folio, flore suave rubente. H. R. paris. β. flore carneo. Gmel. l. c. II. β. D. c. a. l. f., flore ex albo purpurascete. C. Bauh. pin. 87. γ. flore candido. Gmel. l. c. II. γ. D. c. a. l. f.; flore lacteo. Bauh. l. c. C. fl. pleno. Gmel. l. c. spontaneum.

In spontaneo bulbus fere Tulipae, sed minor, albidus. Scapus nudus, teres, uniflorus, tenuis, debilis, purpurascens, 3-6 poll. et ultra. Folia plerumque 2 opposita, patentia, plana, plerumque ovato-oblonga, utrinque attenuata, rarius altero obtusiusculo, 3-5 poll., 1-2 poll. lata, petiolata, nunc viridia maculis fuscis, nunc fusca maculis viridibus. Corollae nutantis petala vel lacinae subcampanulata, lanceolata, rarius oblongo-lanceolata, utrinque attenuata, acumine obtusiusculo, 12-16 lin., 2½-5 lin. lata, plerumque pallide purpurea, basi foveâ nectariferâ: interiora apophysibus glandulosis transversim aucta, paulo latiora. Stam. corollâ duplo fere breviora; filamenta plana apice subulata purpurascencia; antherae oblongo-lineares, obtusae, fulvae. Stylus staminibus longior, trigono-filiformis; stigmatibus 3 erecto-patentibus, apice reflexis. In B folia longiora angustiora; petala breviora, obtusa, latiora, pallidiora. In pratis montosis Europae australioris; in Tauria atque Sibiria. 4.

Obs. In speciminibus tauricis „folia latiora, quam in communi sibirico“ notat M. a Bieberstein l. c. p. 264. In speciminibus altaicis cli Fischer petala albida, basi luteâ; tria infra medium dilatata, et fere rhomboidea, antica magis elongata. Caulis pedalis. Fischer in litt. ad Römer.

2. *E. americanum Smith; foliis lanceolatis, punctatis; petalis oblongo-lanceolatis, obtusis: interioribus basi bidentatis; stylo clavato; stigmatate integro. Smith Rees's Cyclop. XIV. Hort. Kew. ed. 2. II. p. 248. Nutt. gen. p. 225. Bart. Fl. Amer. sept. I. p. 33. Elliott. Sk. 1. p. 389. Bigelow Bost. p. 32. Med. Bot. III. p. 151. t. 58. Torr. Fl. N. M. U. St. p. 350. Her Bot. Mag. 1115. E. lanceolatum Pursh. Fl. sept. Amer. 1. p. 230. E. Dens canis Mich. Fl. bor. Amer. 113. Gron. virg. 151. Cold. Novbor. n. 72. E. Dens Canis γ. Willd. Spec. II. p. 96. E. Dens Canis C. flore luteo. Redout. Lil. 194. E. longifolium β. Poir. Enc. VIII. p. 660. E. aquatile Salisb. Tr. Hort. Soc. I. p. 351. E. angustatum Rafin. New York Med. Repos. T. V. β. petalis basi fusco maculatis. Pursh l. c.*

Bulbus ovatus, parvus, fuscus. Folia 2 radicalia, nitentia, elliptico-lanceolata, punctis callosis, acuminatis, viridi-fuscoque varia, uti in genere. Scapus 6-8 poll., flore solitario, cernuo. Petala basi punctata, flava, reflexa: interiora ovato-lanceolata, intus sulco longitudinali, basi cum cistula minuta nectarifera communicante, et utrinque denticulo crispo filamenta amplectente. Stamina petalis dimidio breviora: filamenta glabra. Stylus triangularis, staminibus longior. Stigma margine crenulatum. Capsula substipitata oblonga, acuminata, seminibus numerosis ovatis. *Nutt. et Torr.* Cultum describit *Gawler*: bulbo magnitudine avellanae; foliis coriaceis, distichis, sulco longitudinali, subtus carinato-costatis, glauco-viridibus, (apice involutis) 2-5-poll., 1-1½ poll. latis, petiolis vaginantibus, longis, angustis; corolla intense lutea, laciniis oblongo-linearibus, 2 poll.; ⅓ poll. latis, basin versus intus purpurea punctatis: exterioribus latioribus, magisque reflexis; filamentis submembranaceis; stylo germinaeque viridi; stigmate intus glandulose pubescente: germine stylo triplo brevior, angustis sulcatis: additque: lacinias corollae basi non esse nectariferas, et tres interiores appendice transverso esse destitutas. — „Semina acuminata, incurva, unde lunulata.“ *Darlingt.* In *America boreali a Canada ad Virginiam et ad ripas Missouri, in sylvis ad radices arborum et ad rivulos.* 2.

Obs. „Videtur alia species *Erythronii* floribus laevis cum *lanceolato* confusa occurrere, albido proximae affinis, petalis lanceolato-oblongis edentulis; at desunt nunc specimina.“ *Nutt. l. c. ad albidum.* Conf. *Lew. Beck in Sillim. Am. Journ. XI. p. 177.*

3. *E. albidum Nutt.*; stylo filiformi, basin versus attenuato: stigmate trilido, lobis reflexis, interne papillosis; foliis impunctatis, elliptico-lanceolatis; petalis lineari-lanceolatis, obtusis: interioribus subunguiculatis, edentulis. *Nutt. gen. p. 225. Torr. Fl. N. M. St. p. 550.*

Folia 6 poll., poll. lata. Scapus foliis parum longior. Flores semper albi, subinde tantum caeruleoscentes. Petala saepe 1½ poll., vix 2 lin. lata, reflexa. Germen ellipticum. *Nutt. et Torr. In regione occidentali Louisianae superioris, ad ripas Missouri; etiam circa Augustam?* 2.

4. *E. grandiflorum Pursh*; petalis lanceolatis, subunguiculatis, acutis; germine oblongo; foliis lineari-lanceolatis. *Pursh Fl. sept. Americae. I. p. 251.*

Flores duplo majores quam in *lanceolato*, pallide flavi. *Pursh. Speciem nondum satis distinctam esse. Nutt. nov. gen. p. 225. Ad ripas Kooskoosky. M. Lewis. 2.*

5. *E. carolinianum Walt.*; foliis alternis. *Walt. Fl. carol. p. 122. In Carolina.*

Quid *E. aureum Hort. Angl. in Link Enum. I. p. 323.*, ubi nondum floruisse et forte idem cum *E. lanceolato Pursh* dicitur.

1574. T U L I P A.

1. *T. suaveolens Roth*; foliis ovato-lanceolatis, supra pubescentibus, scapum unilorum pubescentem subaequantibus; flore erecto, campanulato-patulo; petalis obtusiusculis filamen-

tisque glabris. — *Roth Catal. Bot.* 1. p. 45. *Willd. Spec.* II. p. 97. *Smith in Rees Cyclop. Lam. et Dec. Fl. jr.* III. p. 199. *Réd. Lil. t.* 111. *Gawl. Bot. Mag.* 859. *Tratt. Tabular. t.* 56. *Kerner gen. select. t.* 15. *T. pumilio* *Lob. ic.* 127. *T. dubia pumilio* *Clus. hist.* 148. β . *T. pubescens*; scapo pubescente; petalis 5 exterioribus acutis, interioribus obtusis mucronatis; foliis oblongo-lanceolatis, flore longioribus. *Willd. Enum. pl. berol. Suppl.* p. 17. *Link Enum.* 1. p. 525. γ . *latifolia*. *T. suaveolens* β . *latifolia*; fol. remotis; caule altiori. *Bot. Mag.* 2588. *Rudb. Elys.* II. 109. f. 2.

Bulbus tunicâ atrofusâ, magnitudine Castaneae majoris et ultra.

Scapus 4-5 poll., glaucus uti folia obtusiuscula, subtus glabra, in α approximata, pollicem lata. Petala $1\frac{1}{2}$ -2 poll. ovata, subinde nervo in mucronem excurrente, coccinea, limbo flavo, stamina triplo superantia: exteriora paulo breviora. Antherae stigmata paululum superantes, flavae. Germen glabrum. Stigmata rotundata, compressa, superne sulcata. *Duc de Toll. Hortul. belg.* In β scapus spithamaeus, teres, erectus, pube tenui. Folia in scapo 4, scapo parum longiora, pube tenui, praesertim supra, tecta. Corolla flava, alba vel rubra vel etiam albo et rubro variegata. Petala 3 exteriora ovato-oblonga. Filamenta lanceolata, glabra. Stigma undulatum. Media quasi *T. suaveolentem* inter et *Gesnerianam*, ab utraque vero satis diversa; etiam ut *T. suaveolens* hyeme in olla loco calido culta floret, dum *T. Gesneriana* hoc modo tractata semper floribus careat. Differt a *T. suaveolenti* petalis alternis acutis et obtusis, florum colore variabili folisque scapo longioribus. Odor floris hujus valde debilis. *Willd. γ Claramond Hortul. In Europa meridionali.* 4.

2. *T. Bonarotiana Reboul*; caule pubescente, foliis longiore; corollâ campanulato-patulâ, discolore; petalis omnibus ovatis, acutis, apice barbatis, margine involutis: maculâ baseos rhombeâ, parvâ. *Bertolon. in litt. et Reboul Nonn. spec. Tul. not. p. 7. *)*

Caulis totus pubescens. Folia exquisite undulata, brevissime ciliolata, glauco-viridia. Corolla campanulato-patens, sub anthesi odore suavi, levi, intus vivide lateritia nec tamen nitens, extus pallide flavida cum aliquo rubore. Petala interiora medio lineâ longitudinali duplici flavâ. Macula baseos petalorum vivide caerulea: petalorum exteriorum angustior, limbo flavo latiori. Floret omnium ultima. *Bertol. in litt. In Etruria.* 4.

5. *T. strangulata Reboul*; caule foliis brevioris, scabro; corollâ campanulatâ, sub apice coarctatâ, petalis exterioribus acutis, infra apicem sinu excisis: interioribus obovato-acutis; maculâ baseos brevissimâ, latâ. *Bertol. in litt. Reboul Nonn. spec. Tulip. not. p. 6. n. 6.*

Folia ovato-lanceolata, exquisite undulata, glauca. Caulis glaucus, pilis raris, praecipue apice, scaber. Flos duplo minor quam in *T. Oculo solis* et in *T. praecoce*, coccineus, inodorus, extus glau-

*) Nonnullarum specierum Tuliparum in agro Florentino sponte nascentium propriae notae. Auct. *Eug. de Reboul. Florentiae* 1823.

cescens; petala apice retrorsa, exteriora infra apicem nunc utrinque, nunc uno tantum latere excavata sinu parvo; omnia acuta. Antherae appendiculatae. Statura totius plantae minor quam in *T. Oculo solis*. Floret, dum haec jam fructificat. *Bertol. in litt. In Etruria. 4.*

4. *T. maleolens Reboul*; caule foliis brevior, glabro; foliis lanceolatis, canaliculatis, margine undulatis, ciliatis; petalis exterioribus longioribus, ovatis v. ovato-oblongis, acuminatis; interioribus oblongo-ellipticis, obtusis; maculâ baseos late rhomboideâ, emarginatâ. *Bertol. in litt. et Reboul Nonn. sp. Tul. not. p. 9. in App.*

Folia lanceolata, elongata, acuminata, exquisite undulata, glauca. Flos ruber, saturatior quam in *T. Oculo solis* et in *praecoce*, intus rubro sanguineus, nitens, extus rubro-pallens, sub anthesi odorem ingratum sed levem exhalans; macula baseos brevis, apice truncata emarginata, purpurascens limbo flavo, petalorum exteriorum major. Filamenta atropurpurea, apice tantum pallide virentia. Floret cum *T. strangulata*. *Bertoloni in litt. In Etruria. 4.*

5. **T. Gesneriana*; caule unifloro foliis ovato-lanceolatis glaucis petalis obtusis filamentisque glabris; flore erecto; stigmatis profunde partiti lobis decurrentibus. *Smith in Rees Cycl. Linn. Spec. p. 458. Willd. Spec. II. p. 97. Mill. Dict. n. 2. Poir. Enc. VIII. p. 155. Pall. iter. III. p. 652. M. a Bieberst. Fl. taur cauc. 1. p. 271. Desf. Fl. atl. 1. p. 295. (in hortis spont., uti apud) Brotero Fl. lusit 1. p. 520. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 200. Redouté Lil. 111. Bot. Mag. 1135. Sowerby Fl. oxon. t. 5. 6. 11. 17. Bot. Reg. t. 580. Trattinn. Tabular. 51. Kniph. Cent. II. n. 95. 96. Knorr Del. 1. t. T. et T. 1, 2, 5. T. hortensis Gaertn. et Münch meth. p. 501. Clus. hist. III. 137-148. Bauh. pin. 57. Parkins. Parad. 45-65. Swerts Florileg. 8-10. Rudb. Elys. II. 102-108. α. foliosa. Tratt. Tabular. 52. Obs. bot. p. 51. β. polyantha. Id. ibid. t. 55. γ. monstrosa. Id. ibid. t. 54. T. Gesn. Dracontia; segmentis obovatis, marginē dentato-laciniatis. Red. Lil. 478. T. laciniata Fisch.? (sec. Dietr. Nachtr. IX. p. 529.). δ. luteo-rubra. Redout. Lil. 477. T. lutea lituris miniatis. Bauh. Pin. 61. ε. flore pleno. Schneevogt. Allg. Garten-Magaz. 1807. p. 588. t. 44. Confer de Schlechtendal Linnaeu I. 4. II. p. 595. II. 1. II. p. 82. (Röper).*

In spontanea petala kermesina, basi flavescencia, 4½ poll. In Cappadocia, unde in Europam, auctore Gesner. Linn. l. c. In desertis maris caspii Pallas et Bieberst.; in agro Florentino, Reboul; in Sabaudia et agro Nicacensi testibus Bellardi et Suffren. 4.

Obs. I. Planta spontanea, uti dicitur in herb. Schreb., e regno kirgisico et astrachanico, ut videtur a divo Pallas lecta, haud paucis differt a culta; bulbis ovatis, compressis ut videtur, poll. in diam.; tunicis ovatis, acuminatis, fuscis, nitidis, glabris, imâ basi pilis aetosis. Caulis pars subterranea, 5½ poll., tenuior; pars supra terram emergens 3½-5 poll., erecta vel quidquam

flexa, foliosa, teres, crassitie pennae coryi ad pennam anatinam, simplex, tenuiter pubescens. Folia 3, alterna, erecto-patentia, amplexicaulia, et subvaginantia, lanceolata, acuminata, subundulata, glabra, longitudinaliter striata, glaucescentia ut videtur, caulem aequantia vel paulo superantia, $2\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$ poll., 4-12 lin. lata. Cor. terminalis, solitaria, erecta vel suberecta, in siccis patens (an exsiccatione?) Petala kermesina, basi flavescencia, intus basi maculata, ut videtur, obovata fuscâ; exteriora ovato-oblonga, 14-18 lin., 5-7 lin. lata; interiora ovata vel fere obovata, 5-8 lin. lata; omnia omnino glabra, non obtusa, sed obtusiuscula cum mucrone lin. longo saepius recurvo. Stam. corollâ duplo breviora; filamenta subulata, basi dilatata, glabra, inferne nigricantia, apice flavescencia; antherae lineari-oblongae cum acumine brevi, erectae, flavae, filamentis paulo longiores, 5-6 lin.. Germen filamenta superans, antheris paulo brevius, glabrum, superne paulo attenuatum. Stigmata 3, crassa, revoluta, supra sulcata.

Obs. II. Historiam plantae hujus pretiosissimae (quarum varietates 5000 olim colebantur in horto Comitis *de Pappenheim*, et quarum rariores pretio 500 aureorum (*Semper Augustus* 3400 fl.) solvebantur; quam *Clusius* e Caffa et Carobe in Europam venisse dixit, *Gesner* ao 1559 Augustae Vindelicorum inter rarissimas novitates miratus est, et quae nunc seges annua Batavorum iisdem decies centies mille florenos et ultra quotannis reddens) dedit immortalis *Beckmann* in *Beitr. zur Geschichte d. Erfindungen* I. 223. II. 548. et *Bellermann* in *Bemerkungen über die Tulpe* in *Schrift. Ges. naturf. Freunde*. V. p. 57. De cultura plantae hujus vide: *Elsholz theatrum tuliparum ad mandatum S. Elect. Brandenb. Fred. Guil.* 1661. *J. F. Stapel*, Tulipanen Geheimniss. 12. Lübeck 1612. — *Lauremberg* (*Horticultura Laurembergiana*. 8. Norimb. 1671 — ubi 106 variet.). — *J. G. Schiele*, praktischer Blumengärtner etc. 12. Ulm 1678. — *Genae und aufrichtige Beschreibung der schönsten Hyacinthen und Tulpen des Nic. v. Kampen u. Sohn.* *Quedlinb.* 1771. *Buchoz collection colorée de plus belles variétés des Tulipes.* Paris 1781. — *Maddock of Walworth, Florist's Directory et Catal. of Flowers for 1792* (*Rees Cycl.* in quo 660 variet.), — *Rössig Versuch eines neuen Systemes die Varietäten und Sorten der Tulpen nach ihrer Zeichnung zu ordnen.* N. Ausg. 8. Leipzig 1807. *Desselb.* Die Tulpen nach ihren Varietäten und Sorten nach der Natur gezeichnet und ausgemahlt etc. gr. 4. Leipzig 1801. *Féburier* in *Recueil d. l. Société d'Agric. d. Versaill.* 1809. Nonnullarum specierum Tuliparum in agro florentino sponte nascentium propriae notae. Auctore *Eug. de Reboul.* 8. Florent. 1823. — Praeter auctores hic laudatos confer *Bennemann*, *Brocke*, *Courteis*, *La Chesne*, *Lalezari* (Scheich Muhammed), *Lieger*, *Menage*, *Meteran*, *Morin*, *Munting*, *Neuhaus*, *Schook*, *Stromer*, *Triewald*, *Valney*. In *Allgem. Garten Magaz.* J. 1805. p. 440-41. et 464-467. *Schneevoigt*; *ibid.* 1806. p. 139. *Schneevoigt*; p. 213-217. *Th. Theuss*; *ibid.* 1807. p. 275. *Schneevoigt*. Plura etiam, quae huc spectant simul et ad Hyacinthos, quos confer, invenies in: *Der holländische Zwiebelgärtner, od. deut. Unterricht, die Blumenzwiebeln am sichersten zu pflanzen.* 8. Nürnberg. 1729. *Der neu ankommende holländische Gärtner.* 12. Nürnberg. 1746. *Nic. v. Kampen* *Abh. v. Zwiebelgewächsen.* 8. Regensb. 1764-69. *Linne's* *Abh. v. Zwiebelgewächsen für Garten- und Blumenfreunde.* 8. Nürnberg. 1784. *C. C. Poscharsky* *Unterricht über die Cultur d. vorzüglichsten u. schönsten Blumenzwiebeln etc.* 8. Pirna 1815. *Die Blumenzwiebeln in deutschen Gärten, oder Anweisung Zwiebeln von Hyacinthen etc. eben so groß wie in Holland zu ziehen.* 8. Quedlinb. 1820. *T. Seidel* *d. die Cultur d. Blumenzwiebeln und einiger Knollengewächse.* 8. Dresd. 1822. 3. Aufl. — *The Florist's Guide et Cultivator's Directory.* By *R. Sweet.* 1827. et in *Allg. Gart. Mag.* 1804. p. 235-296. *von Essen.* 402-404. *Schröter.* p. 412. *E. S.* 1807. p. 329. 1810. p. 12. *Leischner.* 1811. p. 232. *Forts. allg. Gart. Mag.* v. VI. p. 68. *Drapiez.* *Neu. allg. Gart. Mag.* v. II. p. 103. *Sweet.*

6. *T. Oculus Solis* *St. Amand.*; caule unifloro, glabro, foliis brevioribus; flore erecto; petalis lanceolatis: 5 exterioribus obtusis cum acumine, 5 interioribus obtusiusculis, minoribus; (margine superiore revoluta, undulata; maculâ baseos elongatâ angustâ, *Bertol.*); foliis ovato-lanceolatis. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 200. n. 1906. *Schrud. N. Journ.* IV. p. 88. *St. Amand Soc. d'Agr. d'Agen* 1. p. 75. *Loisel. Fl. gall.* 1. p. 199. (excl. pl. e Galloprov. fid. specim.) *Reboul Tulip.* p. 3. n. 5. (fid. specim.) *Réd. Lil.* t. 219. *Trattinn. tabular.* 55. *T. acutiflora* *Poir.* in *Lam. Enc.* VIII. p. 154.

T. agenensis Dec. in *Red. Lil.* 1. in textu n. 60. *T. pyri-*
zana Merian. *Surinam* t. 5. f. 14. (sid. *Red.*)

Similis *T. Gesnerianae*, quaecum saepius confusa, sed petalis acutis facilis distinctu; a *Clusiana* differt magnitudine florum. Tota planta glabra, 8-12 poll. Scapus teres; flore solitario erecto. Folia pauca, scapo longiora, oblonga, semi-amplexantia, acuta, quidquam debilia, 9-12 lin. lata. Petala oblonga, patentia, utrinque attenuata, intense (aut et flavo-) rubra, intus ad basin maculâ longâ nigricante, margine tenui pallido cinctâ; exteriora sensim in acumen angustata, interiora obtusiuscula acumine aereo; omnia 31-36 lin., $\frac{3}{4}$ -1 poll. fere lata. Stamina erecta; filamenta brevia, plana, basi dilatata, apice subulata. Antherae 10 lin., flavae. Germen antheris brevius, pallidum. Stigma magnum, lobis crassis. *Red.* Differt a *sylvestri* et *suarcolente* glabritie caulis et floris; a *Gesneriana* petalis acutis; a *Clusiana* flore multo majori. *Decand.* In *Gallia*, *Helvetia*? *Italia*. 4.

Obs. Facile distinguitur a *T. praecoxe*: caule foliis perpetuo brevior, petalis maculâque baseos petalorum multo angustiore; florum colore vividior. *Bertol. in litt.*, qui specimen ipsius *St. Amand* possidet, et a Botanicis gallicis, fide speciminum ab eisdem communicatorum, uti ipsius *Loiseleur*, saepe cum *praecoxe* commutari monuit *in litt.*. Incipit florere, dum *T. praecox* desinit.

7. *T. praecox* Tenore; caule foliis longiore; petalis ovatis: exterioribus acuminatis; maculâ baseos amplâ rhomboideo-dilatata. *Bertol. in litt.* *Tenor. Fl. neap.* 1. p. 170. t. 52. *T. Raddii* Rebour Nonn. *spec. Tul.* p. 5. n. 4. *T. Oculis solis* Bot. *Reg.* 204. (ic. et desc.) *T.* caule 1-floro; petalis filamentisque glabris; floribus erectis; foliis ovato-lanceolatis, tenuiter fimbriatis. *Smith in Rees Cycl.* *T. bolognensis* Parkins. 51. t. 55. f. 17.

Folia inferiora ovato-lanceolata, ($\frac{1}{2}$ -1 ped., 2-4 poll. lata), superiora angustiora, omnia plus minus vire glauco detergendo et inde saepius nullo, subundulata, ciliata. Caulis, dum floret foliis vix, dein multo longior: (in nostris $1\frac{1}{2}$ -2 ped., inferne crassitie pennae anserinae vel cygnae, totus glaber). Flos vividissime coccineus, extus pallidior, (erectus). Petala omnia oris planis, basi intus maculâ nigro-purpurea aut caeruleo-vioacea, (4-6 lin.) lata, limbo flavo: in petalis exterioribus magis oblongâ; in interioribus rhomboidea, brevior, latior; (exteriora 2-3 poll., 1-1 $\frac{1}{4}$ poll. lata, planiora, acutiora, interiora breviora $1\frac{1}{2}$ poll. lata, obtusiora, omnia apice pilis brevibus paucis. Stamina fuscescentia, germine subaequalia. Filamenta glabra, antheris flavis 8 lin. longis breviora. Stigmata crassa, revoluta, sulcata, villosula). Prima omnium. *Bertol. in litt.* et ad spec. spont. *Copiose in Italia.* 4.

8. *T. turcica* Roth; caule unifloro, glabro; flore erecto; petalis lanceolato-acuminatis; apice barbatis; foliis lanceolato-linearibus. *Roth Catal.* 1. p. 45. *Schrad. N. J.* IV. p. 87. *T.* petalis oblongo-lanceolatis, acuminatis; interioribus angustioribus. *Willd. Enum. H. Berol. Suppl.* p. 17. *T. sylvestris* β *Willd. Sp. Pl.* II. p. 96. (excl. syn.). *T. acuminata* Vahl in *Hornem. Hort. Hafn.* 1. p. 528. *Spreng. S. V.*

2. p. 65. *T. cornuta*; caule eminente, 1-floro; foliis angustis; perigonio basi acuto, circa genitalia campanulato, apice cornuto; laciniis lineari-lanceolatis, involutis, acutis, post explanationem subrecurvis; staminibus $\frac{1}{3}$ perigonii vix aequantibus. *Rédout. t. 445.?* *Bot. Reg. 127.* *T. pumila Mönch Meth. p. 501.?* *T. pumila angustifolia Tournef. Herb. Ludw. et Hebenstr.?*

Folia hujus inferiora magis undulata, facie et formâ *T. Gesneriana*; superiora angustiora. Variat colore rubro et variegato. *Willd. l. c.* Bulbus ovatus, tunicis exterioribus fuscis. Scapus teres, laevis, 3 lin. crassus, $1\frac{1}{2}$ - 2 ped., quidquam flexuosus. Folia 5 alterna, anguste lanceolata, semiamplexicaulia, medio 8 lin. lata, ad $\frac{2}{3}$ inferiora undulata, apice marginibus involuta, acuta. Corolla ante expansionem obconica acumine longo, medio incrassato-fusifformis; lacinae (vel petala) 5 circiter poll., $5\frac{1}{2}$ lin. latae, quidquam undulatae, expansae saepius apice per paria convolutae, apice subreflexae. Filamenta pyramidalia, 6 lin. Antherae lineares, 6 lin. Pistillum staminibus $\frac{1}{3}$ longius, triquetrum, columnare. Stigma cristis sulcatis. Caps. ovata, trigona. Filamenta alba in floribus rubris albo maculatis; flava in floribus flavis rubro variegatis. *Red.* „Differt a *Gesneriana* bulbo ovato, magis oblongo, tunica saturatiore intus villis longis, fuscescentibus, sericeis dense obsessa, basi plerumque ad radicem exortum fasciculo villorum similium, nec tunica ferruginea, intus glabra; foliis mucrone tenui terminatis, longitudine plerumque scapi, nec ovato-lanceolatis; petalis digiti circiter longitudine, basi angustioribus, medio vix ultra $\frac{1}{2}$ poll., in apicem longum, acutum attenuatis. *Roth. In Persia. 4.*

9. *T. media Agardh*; caule unifloro, glabro; flore erecto; petalis apice glabris: tribus exterioribus acuminatis, interioribus obtusis cum mucrone; foliis ovatis, lanceolatis. *Agardh in litt. ad dir. Römer, quo teste: T. acuminata H. Lund.*

Scapus foliosus, longitudine foliorum inferiorum. Petala $1\frac{1}{2}$ unc., $\frac{1}{2}$ unc. lata, panicca, extus albo variegata, exteriora subpatentia. Filamenta alba, antheris fuscis triplo breviora. Stigma album, antheris parum brevius. A *T. acuminata Horn. (turcica Roth)* differt petalis puniceis, apice glabris. *Agardh. Habitat?*

10. *T. maculata Roth*; caule unifloro, glabro; flore nubili nutante; petalis exterioribus angustioribus, dorso maculatis, interioribus cum staminibus basi barbatis; filamentis alternis brevioribus; foliis lanceolato-linearibus. *Roth nov. plant. Spec. p. 196.* *T. narbonensis tertia seu hispanica. Clus. Hist. 2. p. 151.*

Nomine *T. Breyniana* ex horto Amstelodamensi accepi. Folia fructiferae plantae demum, praesertim subtus, maculis sanguineis adspersa. Capsula ovato-trigona. A proxima *T. sylvestri*, cui duplo saltem minor, differt: foliis fructiferae plantae demum maculatis; petalis apice glabris, 5 exterioribus extus viridulis, fusco maculatis; filamentis 5 brevioribus. A *T. Celsiana Willd.* differt: foliis demum maculatis; flore nubili nutante, nec erecto;

petalis 5 exterioribus extus viridulis, maculatis, nec utrinque flavis; 3 interioribus cum staminibus basi barbatis, nec glabris. *Roth.* In Hispania?

Obs. *T. maculata Roth* clo *Schrader* in litt. *T. sylvestris* β videtur, cum filamenta 3 breviora et petala 3 exteriora minora, characterem non sistant *sylvestris*: petala etiam apice subpubescentia. Attamen fors species propria, cum culturâ persistat. An hoc: *T. hispanica Willd.*; caule unifloro, glabro; petalis obtusis; foliis lineari-lanceolatis, glaucis. *Reliqu. Willd. Mss.*, quam *Hecht* in Hispania legit, et cujus exemplar haud integrum clo de *Schlechtend fil.* nil nisi *T. Gesnerianae* varietas corollae laciniis solito angustioribus videtur?

11. *T. Clusiana Vent.*; caule unifloro, glabro; flore erecto; petalis (oblongo-lanceolatis) foliisque oblongis (lineari-lanceolatis *Sm.*) glabris: infimo vaginante; (filamentis glabris). *Rédout. Lil. t. 37. Dec. Fl. Fr. VI. p. 314. Smith prodr. Fl. graec. II. p. 229. Sibth. Fl. graec. t. 529. Poir. Enc. VIII. p. 156. Lois. Fl. gall. II. p. 724. Gawler Bot. Mag. 1590. Trattinn. tabular. t. 58. T. praecox*; fol. lineari-acutis, canaliculatis, undulatis, caule longioribus; flore erecto; filamentis glabris. *Cav. descrip. p. 448. T. rubro-alba*; fol. sublanceolatis; flore sub anthesi erecto. *Brot. Fl. lusit. p. 520. T. Cypriani Hortul. T. pers. praecox. Clus. cur. post. 9. T. praecox angustifolia. Bauh. pin. 63. Tournef. inst. p. 575. T. pumilio alba altera lusit. J. Bauh. hist. II. p. 679. T. variegata persica. Rudb. Elys. T. III. f. 8. Park. parad. 52. t. 55. f. 6. Ger. Emac. 142. f. 20.*

In spontanea apud *Brotero*: radix bulboso-repens. Petala omnia intus basi purpurâ maculata, externa e rubro et albo variegata, nullatenus hirsuta. Apud *Cavanilles*: Caulis tenuis, teres, circiter pedalis. Folia erecta, 3-4 lin. lata. Petala lanceolata, incarnata, margine albo. Filamenta purpurea, subulata. Antherae magnae. — In culta apud *Rédouté*: Bulbus subrotundus, fuscus, magnitudine *Avellanac.* Caulis 7-11 poll., teres, superne nudus, basi foliis 3-(4) oblongis, acutis, glaucis, integris, glabris, per totam longitudinem canaliculatis (erectis, quidquam undulatis *Sm.*): infimo longitudine caulis basi omnino vaginante: medio caulem amplexante sine vagina, caulem aequante; supremo brevissimo semiamplexicauli. Flos albus, clausus violaceus; petala exteriora interioribus paulo longiora, dorso laete violaceo-rubra, margine alba; interiora alba, ad dorsi basin tantum rubescentia; omnia intus alba ungue violaceo. Filamenta subulata, basin versus compressa et quidquam dilatata, nigrescenti-fusca, apice flava, corollae unguem vix superantia. Antherae erectae, compressae, lineares, obtusae, ante fecundationem flavae, serius nigrae. Germen flavescens. Stigmata 3 crassa, divergentia, sulcata. *Rédouté. Smith* in *Rees Cyclop.* notat petala interiora obtusiuscula, exteriora acuta apice viridia; sed ludit spontanea petalis modo omnibus, modo interioribus tantum paulo obtusioribus. Corollam purpurascenti-flavam (qualis apud *Link*) nunquam vidimus; attamen laciniis interioribus extus eleganter coccineis, marginem versus albidis, striâ longitudinali viridi, intus albis, basi atropurpureis vidimus, quales a *Gawler* depinguntur. In *Gallia meridionali, Hispania, Lusitania, Italia, Sicilia et in Archipelago.* 4.

12. **T. sylvestris*; floribus solitariis, subnutantibus; foliis lanceolatis; petalis apice barbatis; stigmati triangulari, abrupto, subtrifido; staminibus basi pilosis. *Smith* in *Rees Cycl. Engl. Fl.* II. p. 140. *Fl. Brit.* p. 361. *Engl. Bot.* t. 63. *T. flore subnutante; foliis lanceolatis.* *Linn. Spec.* 438. *Willd. Spec.* p. 96. (excl. β). *Leers Fl. Herb.* p. 87. *Roth Germ.* II. p. 397. *Enum. pl. Germ.* I. 2. p. 63. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 559. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 199. *Desf. Fl. atl.* 1. p. 294. *Tenore Fl. neap.* 1. p. 170. n. 187. *Hall. helv.* 1256. *Fl. Dan.* t. 375. *Hook. Fl. lond.* t. 19. *Rédouté Lit.* t. 165. *Svensk Bot.* t. 202. *Römer Fl. Europ.* t. 7. *Sturm Deutsch. Fl.* 1. A. 29. H. *Trattinn. tabular.* t. 57. *Observ. bot.* p. 35. *Schkuhr* t. 95. *Kniphof Cent.* VIII. 96. *Gawl. Bot. Mag.* 1202. (excl. syn. *T. transtaganae*, cum? licet *allatae*, et *turcicae Roth*). *T. boloniensis Parkins. Parad.* 51. t. 52. f. 2. *T. minor lutea gallica. Rudb. Elys.* II. 110. f. 5. *T. narbonensis. Clus. hist.* I. 151. f. 1. (sive *Smith*; clo *Dufour* ad *celsianam* potius, et clo *Poiret Enc.* VIII. 155. *T. sylvestris* β cum I. *Bauh. hist.* 2. p. 677. et *Moris. hist.* 2. §. 4. t. 17. f. 9.) *Lob. ic.* 124. *Gerard hist.* 138. *Parkins. Theatr.* 1542.

„Distinguitur a *T. Gesneriana*: caule altiore; foliis angustioribus; scapo versus florem inflexo et ante inflorescentiam nutante; sed praeprimis staminum filamentis basi valde attenuatis, et supra basin hirsutis. Petala interiora hirsuta sunt, et flos odoratus.“ *Linn. l. c.* Bulbus ovatus, altero latere tumidus, (sorbolifer), fuscus, ($1\frac{1}{2}$ fere poll.). Scapus simplicissimus, (rarissime ramo uno vel altero), subpedalis (et altior) teres, glaber, medio (vel infra) foliosus, basi attenuatus. Folia 2-3, spithamea, (5-11 poll., 4-7 lin. lata), alterna, carinata, glaucescentia, basi attenuata, amplexicaulia. Flores odori, flavi, extus virentes. (Petala omnia acuminata, erecta, apice intus barbata; exteriora oblongo-lanceolata, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., 4-6 lin. lata; interiora ovata, basi attenuata ciliata, paulo longiora, 7-12 lin. lata, rarissime incisuris 2-3.) Filamenta flava, uti antherae longitudine staminum. Stigma acute triangulare, abruptum nec dilatatum, uti in *T. Gesneriana*. *Smith*. In culta apud *Ker.*: caulis 8 poll. - 2 ped., subinde 2-4-florus, pedunculis connexis; folia 3-4, glauca, interdum pruina rubrofusca, ped. $1\frac{1}{2}$ poll. lata, ovato-lanceolata; corollae 2-3 poll. lacinae subinde 8: exteriores duplo fere angustiores, interiores basi ciliatae; filamenta alternatim longiora, longitudine pistilli; germen corollae ter brevius. In β apud *Poiret*: folia multo angustiora scapique humiliores. *Per omnem Europam a Suecia ad mare mediterraneum.* 4.

Obs. *Gouan* in *Ill. bot.* p. 25. plures species conjungens, sequentes *T. sylvestris* L. (cum definitione Linnaeana) exponit varietates: a. *Tulipa minor lutea gallica et italica. Bauh Pin.* 63. b. *T. minor ex luteo-purpurascens Bauh. Pin.* 63. *Rudb. Elys.* t. 112 f. 6. c. *T. praecox oris candidis Tournef. inst.* d. *T. pumilio* 1. 2. 3. 4. 5. *Rudb. Elys.* t. 109. t. 1-5. e. Occurrit foliis caule longioribus vel scapo foliis longiore; flos duplo minor quam in narbonensi, vix unguem longus. Stam. 3 longiora ad plana latera germinis; breviora vero angulos germinis respiciunt. In omnibus staminibus omnia basi barbata.

15. *T. Biebersteiniana*; caule unifloro, glabro; flore nubilil nutante; petalis apice vix barbatis; interioribus staminibusque subulatis basi pubescentibus; stigmate trilobo. *T. sylvestris* *M. a Bieb. Fl. taur. Cauc.* 1. p. 270. (excl. syn. *Bot. Eur. occid.*)

Petala apice vix pubescunt: exteriora dorso viridula, interiora paulo latiora, lutea, nervo dorsali viridi. Variat raro caule bifloro. *M. Bieb.* Flos multo minor quam in occidentali et bulbis diversus videtur. *Besser in litt.* et in *Enum. pl. Töblyn.* p. 45., ubi cum ill. *Steven* hanc speciem distinctam dicit. In speciminibus e *Sarepta* et e *Sibiria*, quae nobis huc spectare videntur, et quae *T. Celsianae* propiora quam *T. sylvestri*: caulis ped., uniflorus, superne incurvus, infra medium foliosus, tenuis. Folia caulina 2 erectiuscula, eadem subaequantia, semiamplexicaulia, basi canaliculata, ceterum plana, linearia, apice acutiusculo subreflexo, glabra, 5-9 poll., 3-4 lin. lata. Flos suberectus, pallide flavus extus subinde purpurea suffusus, magnitudine *T. Celsianae*. Petala semipatentia; exteriora elliptico-lanceolata, acumine obtusiusculo, apice fere glabra, 10-15 lin., 2½-5 lin. lata; interiora ovata, utrinque acuminata, basi attenuata ciliata, 11-14 lin., 5-6 lin. lata, apice intus quidquam pilosa. Stamina corollam duplo fere breviora, alterna paulo longiora; filamenta plana, apice subulata, paulo supra basin dilatata ibique pilosa, pilis rarioribus quam in *T. sylvestri*; antherae in siccis fuseae, ovato-oblongae, 1½ lin. Germen stamina aequans vel paulo superans, trigonum. Stigmata 5 brevia, reflexo-patentia, crassa, medio sulcata. Differt a *T. sylvestri* habitu floribusque minoribus; petalis apice minus barbatis; filamentis minus pilosis; stigmate trilobo; a *T. Celsiana*: caule altiore; petalis interioribus apice pilosis; stigmate vix villosa. *In hortis et vineis ad fluvium Terek inter Mosdock et Kisljar; in Podolia australi, Sarepta inque Sibiria.* 4.

14. *T. Celsiana* *Red.*; floribus subsolitariis erectis; foliis lanceolatis; stigmate triangulari, lobis 5 brevibus, rotundatis, villosis; staminibus supra basin quidquam pilosis; petalis apice glabris. *Smith in Rees Cyclop.* α. foliis linearilanceolatis, canaliculatis; petalis extus aurantiacis. *T. Celsiana* *Réd. Lil.* t. 58. *Dec. Fl. jr.* VI. p. 515. *Lois. Not.* p. 57. *Trattinn. Obs. bot.* p. 57. *Tabular.* t. 59. TULIPA *Breyneriana* *Bot. Mag.* 717. (sphaemate correcto *ibid.* 1155. et 1790.) TULIPA *sylvestris* *Gouan II. monsp.* *T. australis*; fol. linearibus; flore ante anthesin nutante, dein erecto; petalis rectis. *Link in Schrad. Journ.* 1799. IV. St. p. 517. *T. transtagana*; fol. linearibus, apice subulatis; flore sub anthesi erecto. *Brotero Fl. lusit.* p. 519. *T. biflora* *Don Cantabr. ed.* 5. 75? (sid. *Smith in Rees.*) *T. hisp. rubra*, apeminae similis. *Clus. hist.* 151. 152? *T. minor lutea narbonensis.* *Tournef. inst.* 575. *Magn. bot.* 272. *Saur. Monsp.* 576. β foliis linearibus; petalis acutis, patentibus, utrinque flavis.

T. celsiana Willd. Enum. H. berol. p. 566. *T. sylvestris*, var. *campestris*. Herb. Pall. ap. Lambert. *T. sylvestris* β . Bieberst. Fl. cauc. 1. p. 270. *T. wolgensis* Auct. *T. persica minima* Rudb. Elys. t. 112. f. 8?

T. sylvestri affinis, sed constanter diversa habitu duplo minori, foliis angustioribus, magis canaliculatis, flore erecto, omnino glabro, et radicibus. Bulbus subrotundus, magnitudine Avelanae, tunicâ fuscâ, utrinque laevi, caulis basin includente, basi (nec latere ut in *T. sylvestri*) prolifer. Caulis simplex, teres, erectus, 4 poll., quidquam rufescens, apice nudus, basi foliis patentibus, acutis, canaliculatis, margine leviter rufescentibus, omnino glabris, caulem paulo superantibus. Flos flavus, semper erectus, subodorus, *T. sylvestri* minor. Petala oblonga, acuta, subpatentia, 15-18 lin., omnino glabra; exteriora dorso aurantiaco-rubentia, interiora apice tantum rubentia, omnia intus flava. Stamina erecta, 3 petalis exterioribus opposita paulo longiora; filamenta flava, subulata; antherae erectae, oblongae, flavae. Germen virescens trigonum. Stigmata 5 breviter, crassa, flavescencia, leviter sulcata. Redout. Roth sub sua *T. maculata* monuit *T. Celsianam* Willd. sibi distinctam videri a *T. Celsiana* Red.; varietates saltem characteribus datis distinctae videntur. — Folia maxima pedalia, pollicem lata, subinde scapo breviora. Petala interiora elliptico-, exteriora sublineari-lanceolata. β omnibus partibus minor, *T. biflorae* simillima, sed caule plerumque unifloro; foliis latioribus; petalis utrinque luteis diversa. Caulis 4-5 poll. Petala omnia acuta, apice glabra, vel interiora pilis raris; exteriora lanceolata 10-11 lin., 2 lin. lata; interiora ovata, 4-5 lin. lata. Stigmatis lobi obsoleti. In Europa australi; α in occidentali et in Africa boreali; β in orientali. Tulipe de Perse Hortul. Harlem. 4.

Obs. Dufour in genuina *celsiana* florem etiam nutantem vidit, suaveolentem, staminibus aequalibus. Huc spectare dicit *T. narborensis* Clus. II. p. 56. c. fig. Ad α certe spectat *T. sylvestris* var. *nana*, coroll. aureis etc. Gmel. Fl. bad. II. p. 56, qui eandem in Hispania legit.

15. *T. Sibthorpiana* Sm.; caule unifloro, glabro; flore nutante; petalis obtusis, stigmatibus clavatis; filamentis undique hirsutis. Smith Prodr. Fl. gr. 1. p. 229. et in Rees Cyclop. Sibth. Fl. graec. t. 550. (ined.)

Bulbus albus, rotundatus, depressus, vix 7 poll. in diametro; bulbis numerosis circumdatus. Caulis spithameus; foliis 2 alternis, erectis, glabris; inferiore majore magis ovato. Flos omnino luteus, 7 poll. Petala undique glabra. Stamina pistillumque albida. Antherae lineares, rostratae, longitudine fere filamentorum a basi ad apicem pube brevi densâ tectorum. Germen breve, obtuse triangulare, glabrum. Stigma germine 2-3 plo longius, triangulato-clavatum, obtusum, obsolete trilobum, undique pubescens. Smith. Prope Cressam, hodie Porto Cavalieri Asiae minoris; in monte humili saxoso prope Pilon Peloponnesi, hodie Navarin. 4.

16. **T. biflora* Pall.; caule bi-(1-4)-floro, glauco, glabro; floribus nubilibus nutantibus; petalis interioribus staminibusque basi pubescentibus; foliis linearibus. M. a Bieb. Fl. Taur. Cauc. 1. p. 270. *T.* caule 2-3-floro; foliis duobus,

lanceolatis, patentibus; stigmatibus triangulari, abrupto, villosis, vix emarginato; petalis late patentibus staminibusque supra basin pilosis, apice glabris. *Smith in Rees Cyclop. Willd. Enum. H. Berol.* p. 365. T. floribus erectis planiusculis; caule diphylo, 2-5 floro; foliis lineari-subulatis. *Linn. Suppl.* p. 196. *Willd. Spec.* II. p. 98. *Pall. Ic.* III. p. 727. *app.* n. 86. t. D. f. 5. *Falck. it.* II. p. 159. n. 400. t. 6. *Trattinn. tabul.* t. 60. *Bot. Reg.* 555. *Reichenb. Ic. rar.* t. 395. β fol. splendentibus; corollâ intus dilute carneâ; antheris nigricantibus. *Bot. Reg.* l. c. et hoc teste: T. byzantinae genus alterum. *Clus. hist.* 152. γ . uniflora. *Schrank in Denksch. bot. Ges.* II. p. 165.

Magnitudine *ORNITHOGALI lutei*. Caulis palmaris, glaberrimus. Folia 2, alterna, linearia, utrinque attenuata, recurva, canaliculata; inferius caulem vaginans. Pedunculi foliis breviores, 2-5 quasi in umbella. Flores *ORNITHOGALI lutei* aliquoties majores, patentes. Petala 3 exteriora lanceolata, dilute cyanea s. virescentia; 3 interiora alba, basi maculâ magnâ, fulvâ. Filamenta basi barbata. Bulbus quotannis post florescentiam exsucco succedens. *Linn.* Flos secundarius saepius abortiens, nunc tetrapetalus et tetrandrus. *Pall.* „Petala exteriora dorso viridia, subviolacea, interiora lactea, nervo dorsali viridi. Differt praecipue a T. *sylvestri* (*Biebersteiniana*) florum colore, variat enim saepius caule unifloro, quam trifloro.“ *M. a Bieb.* Specimina spontanea variant caule 3-7 poll., 1-4 floro; foliis plerumque 2, rarissime 3, alternis, lineari-lanceolatis linearibusque, 2-5 poll., 2-4 lin. latis; petalis 4-8 lin.; exterioribus $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin., interioribus 2-4 lin. latis, semper glabris, basi tantum quidquam ciliatis. In culta apud *Gawler*: „folia intus glauca, convoluto-linearia, scapo longiora, extus nitida. Caulis filiformis, palm.-spitham., simplex vel (pluribus confluentibus) ramosus; ramis 2-4-unifloris. Flores odore debili, candicantes, fundo flavo, $\frac{2}{3}$ unc. longi, sub anthesi erecti, campanulato-rotati; petala apice nuda, exteriora oblongo-lanceolata, sessilia, magis recurva, extus dilute violacea; interiora duplo latiora, lanceolato-elliptica, subunguiculata, barbâ parciore, striâ viridi externe prominulâ. Stam. petalis bis vel ultra breviora; filamenta postice paululum supra basin barbata; antherae erectae, flavae, sagittatae, filamento duplo breviores. Stigmata anguli loculorum continui, trini, terminales, replicati, intus obsolete canaliculati, margine pallido nec incrassato, nec undulato. Caps. mole fere *Cerasi minoris*.“ *Planta in Link Enum.* vix hujus loci, cum flores flavi dicantur. In *Herb. Schreber* specimina numerosa huc spectantia etiam nomine T. *sylvestris* insignita sunt. *Ad Wolgam in locis desertis, maxime argillosis; in Iberia.* 4.

17. T. *patens* *Agardh*; caule unifloro; flore nubili nutante; petalis interioribus staminibusque basi pubescentibus; foliis linearibus. *Agardh in litt. ad. div. Römer*, quo teste: T. *sylvestris* *Laxm.* (fide *Herb. Retz.*). T. *biflora* *H. Lund.* Scapus pedalis, subtriphylus, glaber, semper uniflorus. Folia canaliculata, scapo parum breviora. Petala lanceolata, acuta, me.

meridie patentissima, extus virescentia, intus alba, basi lutea.

Agardh. In Sibiria. 2.

Obs. Hujus loci nobis esse videntur specimina nomine *T. tricoloris* clo *Panzer* a Dre. *Gebler* e Barnaul communicata, et specimina sibirica in herb. cli *Zuccarini* nomine *ERYTHRONII Dentis Canis* β longioreque folio insignita, habitu et florum colore *T. biflorae* simillima, sed caule altiore, semper unifloro, floribus majoribus diversa. Bulbi ovato-oblongi, basi, nec latere, proliferi; tunicis fuscis glabris tenuiter striatis; magnitudine pruni minoris. Caulis erectus, glaber, teres, bifolius, 5-9 poll., crassitie pennae anatinae. Folia alterna, amplexicaulia, patentia, linearia, obtusiuscula, canaliculata vel superne plana, viridia, tenuiter striata, 3-4 poll., 2-4 lin. lata. Flos solitarius, erectus. Petala, ut videtur e siccis, patentia, glabra, apice tantum intus sub lente puberula; exteriora lanceolata, acuta, dorso virescentia, intus albida, 9-12 lin., 2-3 lin. lata; interiora ovata cum acumine brevi, basi angustata ciliata, 10-12 lin., 4-5 lin. lata, albida, intus basi flava. Stam. corollae duplo breviora; filamenta alterna breviora, plana, apice subulata, paulo supra basin angustatam pilosa; antherae oblongae, flavae, 1 $\frac{1}{2}$ lin. Germen filamenta paulo superans. Stigma subtruncatum, lobis 3 obsolete, supra sulcatis, quidquam villosis.

18. *T. saxatilis Sieber*; caule subbifloro, flexuoso, folioso; foliis oblongo-lanceolatis, acutis; petalis erectis, obtusis, apice subbarbatis; germine antheras superante. *Spreng. S. V. 2. p. 63. Reichenb. Ic. rar. t. 396.*

Diagnosis a clo. *Spreng.* data haud ita bene quadrat in specimen nostrum a clo. *Sieber* in *Creta* ad *Cap Maleca* lectum, in quo caulis uniflorus, erectus, tenuis, 5 poll., longitudine fere foliorum 2 fere radicalium. Folia subopposita lanceolata, acuta, basi vix attenuata, caulem vaginantia, viridia, glaberrima, planiuscula, suberecta, 4-5 poll., 6-8 lin. lata. Petala lanceolata, erecta, aequalia, acutiusecula, apice vix barbata, nervosa, flava ut videtur, 9 lin., 2 $\frac{1}{2}$ lin. lata; interiora obtusiora, 4 fere lin. lata. Stamina petalis duplo breviora, 5 breviora. Filamenta subulata, glabra, vel basi pilis paucis, 3 longiora basi magis dilatata. Antherae 1 $\frac{1}{2}$ lin., oblongae, obtusae cum acumine parvo, polline flavo. Germen antheras staminum breviorum aequans, staminibus longioribus vero brevius. Stigma truncatum, vix trilobum. *In Creta. 2.*

19. *T. altaica Pallas*; foliis caulinis oblongo-lanceolatis, undulatis, cartilagineo-marginatis, florem subaequantibus; pedunculo scabro; petalis glaberrimis: alternis lanceolatis, alternis spathulato-oblongis; germine antheris breviora filamenta superante. *Spreng. S. V. 2. p. 63.*

In monte Imaus. 2.

Obs. I. Specimen *Tul. altaicae* e Barnaul a Dre. *Gebler* clo *Panzer* communicatum nullo caractere distingui potest ab *Q. UNIFLORO* unifloro, cujus genuina a *Laxmann* lecta possidemus specimina. An vero etiam *T. altaica* a *Sprengel* definita ejusdem sit loci, dicere non audemus, cum folia cartilagineo-marginata et pedunculum scabrum petat, quod non in *Q. UNIFLORO*, quod confer.

Obs. II. *TULIPA Breyniana* est *KOLBIA (MELANTHIUM) breyniana*.

Quid *T. caucasica* *Horae berol.*

florentina *Loddig. Catal.*

persica *H. Belved.?*

1375. FRITILLARIA.

1. **Fr. imperialis*; racemo comoso, inferne nudo; foliis integerrimis. *Linn. Spec. 455. Willd. Spec. II. p. 90. Mill. dict. n. 8. Lam. Enc. II. p. 549. ill. t. 245. f. 2. Kniph. Cent. III. n. 39. Knorr del. 1. t. K. Regn. Bot. Syst. Vegetabil. Vol. VII.*

ic. *Rédout. Lil. t. 131. Gaertn. Fruct. 1. p. 63. t. 17. f. 1. PETILIMUM Linn. H. Cliff. 119. PETILIMUM imperiale St. Hil. Famill. 1. p. 120. IMPERIALIS comosa Mönch meth. p. 595. IMPERIALIS coronata Dumont-Cours. Bot. Cult. II. p. 196. Corona imperialis Trew Ehret Fl. imag. t. 40. 50. 66. 97. Besl. Eyst. V. t. 1. 2. 3. Moris. hist. II. p. 406. S. IV. t. 19. f. 2. 3. 4. Tournef. inst. t. 497. 498. Tusai Clus. hist. 1. p. 127. 128. α . corollâ fulvâ, striis pallidioribus. Curt. Bot. Mag. 194. β . flor. luteis patentioribus, interne non striatis. Lam. l. c. Cor. imp. fl. pulchro luteo. Tournef. inst. 572. γ . cor. sulphureâ. Bot. Mag. 1215.*

Bulbus magnus, flavescenti-albidus, subsquamosus, simplex, extus laminis majusculis, nec squamis imbricatis. Caulis 2-4-ped., basi apiceque foliosus. Folia numerosa, sparsa et subverticillata, lanceolato-oblonga, 4-6 poll., 8-20 lin. lata, quae inter sub caulis apice racemus verticillatus, foliis interstinctus in speciem comae, inferne longius nudus. Pedunculi fere pollicares, nutantes, fructiferi erecti. Cor. oblongo-campanulata, cernua, $1\frac{1}{2}$ -2 fere poll., crocea vel fulva, intus striata, et basi scrobiculis 6 rotundatis, candidis, violaceo cinctis, 2 lin. diametro; lacinae apice pubescentes: exteriores ovato-oblongae, angustiores, 7-8 lin. latae, subacuminatae; interiores rhombico-ovatae, 10-11 lin. latae. Stamina corollam subaequantia, erecta; filamenta plana, subulata, albida; antherae flavae, trisulcae. Germen stylo exserto, stigmatibus convolutis. Capsula prismatico-hexagona, angulis alatis. In β , culturâ perstante, pedunculi virides, flores laete flavi, intus non striati; corolla magis patens; folia latiora. Tota robustior. *Réd. In Persia? E Byzantio (ubi Tusai audit) in reliquam Europam venit. 4.*

2. *Fr. persica; racemo nudiusculo, (pyramidato); foliis obliquis, (lanceolato-oblongis, obtusiusculis, subverticillatis). *Linn. Spec. 436. Willd. Spec. II. p. 90. Mill. Dict. n. 6. H. Kew. ed. 2. II. p. 244. (excl. γ .) Red. Lil. t. 67. Bot. Mag. 1537. Tratt. Thes. t. 79. Rudb. Elys. 2. 183. f. 1. Swert. Floril. 44. f. 1. Moris. Hist. 2. S. 14. t. 19. f. 1. Trew. Seligm. t. 120. Lil. susian. Clus. Hist. 1. p. 130. β minor. Sims Bot. Mag. 962. (excl. syn. Fr. racemosae Mill. et ramosae Moris. Hort. Bles. ad obliquam spectantibus). Swerts Floril. 7. f. 2.*

„Folia infima sunt bina s. 3-4 verticillata.“ *Linn.* Bulbus simplex, globosus, squamosus. Caulis strictus, $1\frac{1}{2}$ ped., (teres). Folia numerosa, multifaria, lanceolato-oblonga, glauca, 3-3 $\frac{1}{2}$ poll. et ultra, fere poll. lata, obtusa (vel acutiuscula), sessilia, (obliqua vel subspiralia); superiora minora, angustiora. Pedicelli numerosi, (bractearum loco basi callo parvo), $1\frac{1}{2}$ poll., patentissimi, apice cernui in racemo multifloro semipedali, laxo, undique sparso. Corollae lacinae rectae, fere pollicares, extus sordide lilacinae, intus atro-purpureae, patulae, ellipticae, antice rotundatae: extimae angustiores. Foveolae parabolicae. Stamina longitudine fere corollae. Antherae ovato-oblongae, filamentis pluries breviores. Germen prismaticum vix longitu-

dine styli. Stigma simplex, puberulum. In β caulis $\frac{1}{2}$ -5 ped., crassus angulatus. Folia lineari-lanceolata, 2-4 poll., 4 lin. lata. Racemus 12-15-florus, pyramidalis, nudiusculus: pedunculis inferioribus $1\frac{1}{2}$ poll., erecto-patentibus, apice cernuis. Flores parvi, 6 lin. Cor. lacinae subrotundo-ovatae, obtusae, subaequales, extus dilute purpureae, viridi mixtae: exteriores intus concolores; interiores totae dilute purpureae, maculâ baseos triangulari viridi cinctâ. Filamenta corollâ breviora, viridia, antheris flavis, (ante nuptias rubro-fuscis). *Gawl.* In Persia? E Susa in Europam venit ao 1575. 4.

3. FR. *tulipifolia* M. Bieb.; caule basi nudo, sursum paucifolio, unifloro; foliis sparsis: inferioribus ovalibus, acutis; superioribus lanceolatis, acuminatis; flore nutante, concolore. *Wikstr. Act. Ac. holm.* II. p. 10. FR. fol. lanceolatis, alternis, remotis; caule superne nudo, unifloro; capsulâ obtusangulâ. *M. a Bieb. Fl. taur. cauc.* 1. p. 270. *Suppl.* p. 265. *EjUSD. Cent. pl. ross.* 1. t. 21. FR. *caucasica* *Adam* in *Web. et Mohr Beytr.* 1. 51. n. 15. FR. *pyrenaica* *Pall.* in *Herb. Lamb.* (fid. *Gawl.*, uti) *Georgi Besch. d. russ.* P. III. 4. p. 900. (nec alior.). $\beta?$ multiflora; fol. obliquis. FR. *obliqua* *Gawl. Bot. Mag.* 857. FR. *persica* β *Mill. dict. ed. Mart.* n. 2. *F. persica* γ *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 244. FR. *racemosa* *Mill. Dict. ed. 8.* n. 7. FR. *ramosa* s. *Lil. panic. minus* *Robert. ic. t.* 204. *Moris. h. bles.* 266. FR. fl. minore nigro *Reliqu. Rudb. ed. Smith App.* V. 55.

„Planta glauca. Flos paullo FR. *Meleagride* minor, spadiceo-purpureus, minime variegatus. Styl. obtuse trigonus, trisuleus, purpureo-violaceus, sulcis flavis. Stigma 3-fidum, papillosum, flavo-pulverulentum. Proponitur pro varietate uniflora FR. *obliquae* in *Botan. Mag.*, sed nostram nequidem vidi floribus uno pluribus instructam.“ *M. a Bieb. Fl. t. cauc. et Suppl.* „FR. *obliqua* *Gawl.* tantum FR. *tulipifolia* biflora, quod cultura efficit. In herb *Banks.* etiam specimen occurrit 4-florum a Jacquinio missum. Specimina spontanea semper uniflora sunt. Multo tamen rectius est FR. *obliquam* pro varietate *tulipifoliae* habere, quam contra.“ *Wikstr.* In specimine caucasico in herb. *Panzer*: caulis $7\frac{1}{2}$ poll., erectus, pennâ corvi paulo crassior, ad medium fere usque nudus. Folia tantum 3, infimum oblongo-lanceolatum, acutum, 2 fere poll., 5 lin. latum; reliqua lineari-lanceolata, acuminata, $1\frac{1}{2}$ poll., 1-2 lin. lata, omnia subamplexicaulia, striata, glauca, erectiuscula. Flos campanulatus, poll. in diametro, purpurascens, extus rore glaucescenti. Petala exteriora oblonga, 11 lin., $3\frac{1}{2}$ lin. lata; interiora obovato-oblonga, 10 lin., $4\frac{1}{2}$ lin. lata; omnia obtusiuscula, apice non reflexa, lineis longitudinalibus simplicibus. Stam. corollâ $\frac{1}{3}$ breviora, erecta; filamenta subulata; antherae oblongae, $2\frac{1}{2}$ lin.. Stylus stamina superans, petala interiora subaequans, crassus. Stigma lobis 3 erectis parum profundis. — In β culta, quae forte potius ad FR. *persicae* varietates pertinet, apud *Gawler*: folia glaucissima, confertius sparsa, obliquata, 4-5 poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata, obtusiuscula; racemus 2-4-florus; pedunculi cernui; corolla obovato-campanulata,

deorsum sensim angustata, purpureo violacea, poll.; laciniis obovato-oblongis, apice conflexo-incurvulis viridibus; antherae flavae. Fr. *racemosa* Mill. melius convenit cum hac, quam cum *a*. In *Caucaso frequens ad thermas constantino-montanas, in Tauriae desertis caspiis, ad ripas Volgae et in Sibiria*. 4.

4. Fr. *plantaginifolia* Lam.; foliis radicalibus ovalibus, nervosis, petiolatis: caulinis lanceolatis, sessilibus; caule unifloro. *Lam. Enc. II. p. 551.* Fr. *plantaginea* Pers. *Syn. p. 559.* Fr. *orientalis plantaginis folio etc.* *Tournef. Cor. 25. 26. Ic. Mss.*

Clo *Wikström l. c. p. 41.* forsan una eademque species cum *tupifolia*; at cum *Lamarck* citasset *Tourn. cor. 25. 26,* et 25 spectet ad *luteam*, huic, vel *latifoliae* propior, nisi forte eadem. Descriptio *Lamarckiana* nimis brevis sequens: „*Bulbus subglobosus. Caulis simplex, pedalis. Folia radicalia nervis parallelis, convergentibus, Plantaginis; caulina alterna, remotiuscula, sessilia s. semiamplexicaulia, nervosa, breviora quam in Meleagride. Flos terminalis, pendulus in pedunculo e foliis 2-3 approximatis.*“ *In Oriente*. 4.

5. Fr. *Fleischeriana* *Steudel et Hochst.*; caule 1-floro; foliis sparsis, lineari-lanceolatis, subcanaliculatis, obtusis, glaucis; corollis nutantibus, parvis; petalis ovato-lanceolatis, obtusis, striatis, non tessellatis: exterioribus basi gibbis; staminibus corollam subaequantibus; stigmate simplici. Fr. flore minore *Tournef. Inst. 577.*

Bulbus ovatus, v. rotundato-ovatus, parvus, albidus, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ poll.; squamis ovatis, acuminatis margine membranaceis. Caulis e vaginis 2 brevibus diaphanis albis subterraneis, erectus, 3-6 poll., crassitie pennae corvi, teres, glaber, inferne viridis purpurâ suffusus, medio rore glauco, ad $\frac{1}{3}$ usque nudus. Folia 5-6, alterna, infima subopposita, erecto-patentia, basi subamplexicaulia et subconvoluto-concava, apice planiuscula, supra omnino glauca, subtus convexa, viridia, punctis minutissimis glaucis, obtusa nec acuta, 9-13 lin.; inferiora $4\frac{1}{2}$ fere lin., superiora vix lin. lata. Pedunculus terminalis, nutans, teres, glaber, fere poll. Cor. campanulata, apice non reflexa, 8-10 lin. in diametro; petala extus rore glauco, dorso lutescentia, intus flava, utrinque margine purpureo, minime tessellata, sed striis longitudinalibus simplicibus valde conspicuis, ovato-oblonga, obtusa, apice puberula; exteriora basi dorso gibbo, 7-8 lin., $2\frac{1}{2}$ lin. lata; interiora ejusdem longitudinis, magis ovata, 5 lin. fere lata; foveae nectariferae in siccis non discernendae. Stam. petalis paulo tantum breviora, erecta; filamenta plana, apice subulata: antherae oblongae, obtusae, flavae, 2 fere lin. Stylus stamina vix superans, erectus, albidus, stigmate truncato, obtuso, sub lente granuloso. Germin stylo duplo brevius. Stigmate florumque formâ *F. persicae minori*, habitu *Fr. pyrenaicae* similis. Prope *Smyrnam* legit *D. Fleischer*, itinerator *wirtembergensis*. 4.

6. Fr. *lusitanica* *Wikstr.*; caule folioso, unifloro, basi nudo; foliis sparsis, lanceolatis, acutis acuminatisve, planis,

brevibus, erectis; flore nutante, discolore, non tessellato. *Wikstr. Act. Acad. r. holm.* 1821. II. St. p. 9. T. V. f. 1. FR. *Meleagris Brot. in Herb. Casström.*

Caulis circiter pedalis, substrictus, angulatus, prope florem incrassatus; nutans. Folia 5-8, subamplexicaulia, integerrima, glabra, striato-nervosa; inferiora majora 1-2 poll., 5 lin. lata, sursum versus sensim minora: summum flori approximatum. Flos dimidio minor, quam in FR. *Meleagride*. Cor. extus violacea, intus flavicans: petala subaequalia, ovalia, obtusa, nervosa, 9 circiter lin.. Stam. aequalia, corollâ dimidio breviora: filamentis subulatis, antheris oblongis pollineque luteis. Pistillum dimidium corollae paullo superans: germine oblongo, stylo longitudine staminum, stigmate 3-partito, stamina paullo superante. Caps.? Foliis planis affinior FR. *pyrenaicae* quam *Meleagridi*: ab illa differt, praeter characteres datos; caule tenuiore; foliis angustioribus, dimidio brevioribus, laete viridibus; floribus minoribus; ab hac: caule tenuiore, magis folioso; foliis subapproximatis dimidio brevioribus. A FR. *tenella* caule strictiore magis folioso, longius basin versus viridi; foliis dimidio brevioribus, pluribus; a *nervosa*, quae ulterius indaganda: foliis striato-nervosis, angustioribus. *Wikström. In Lusitania. 4.*

7. * FR. *pyrenaica*; caule multifloro; foliis infimis oppositis. *Linn. Spec.* p. 436., quo teste: *Hort. Cliff.* 81. (sphalmate pro *Hort. ups.*) Fr. flore minore *Bauh.* 64. FRITILL. *pyrenaea Clus. hist.* 2. p. 256. *posth.* 10.

Hab. in Pyrenaeis. 4. (Haec *Linnaeus*, praetereaue nihil).

Obs. Infausta species, multorum sphalmatum dubiorumque mater. Praeter sphalma supra in *Linn. Spec.* notatum, aliud commisit div. *Willdenow*, pristino repetito, adscribendo diagnosi, („foliis infimis oppositis, floribus nonnullis folio interjectis“) quam e S. V. petebat, „*Linn. Spec.* 436 „loco“ S. V. „et adjiciendo synonymis duobus tantum a *Linnaeo* allatis: „*Pall. it. I. p. 147*“, quod spectat ad *ruthenicam*. *Lamarck Enc. meth.* II. p. 550. Fritillariam flore minore *Bauh. pin.* 64 suae MELEAGRIDIS E dicit, et de FR. *pyrenaica Linn.* et *Clus.* plane silet. *Persoon* in sua editione S. V. p. 345. adjecit synonymon: „*Reliqu. Rudbeck. cura Smith, 33*“ de quibus *Smith, Gawler, Wikström* silent. *Hortus Kewensis ed. 2. II. p. 244* (ubi tantum FR. *racemosa Gawl. t. 95* (nunc ejusdem *pyrenaica* β . *major* in *B. M.* ad 1538) laudatur) excludi jubet in FR. *pyrenaica Willd.* synonymon *Clusii*, cui tamen species *Linnaeana* innititur, et hujus loco adducit: *Lob. advers. II. p. 496.*, patriamque ignotam esse asserit. *Poiret Enc. Suppl. II. p. 674.* FR. *pyrenaicam* meram esse varietatem MELEAGRIDIS cum *Lamarck Enc.* et *Lam. et Decand. Fl. fr. n. 1908* affirmat. *Lapeyrouse Hist. abr. d. Pyr. p. 184.* FR. *pyrenaicam* L. in *Willdenow*, sine omni correctione, laudat quidem cum synonymo *Clusii*, sed nunquam se eandem in *Pyrenaeis* legisse fatetur; adjicit tamen: „flores flavo-virentes, purpurâ tessellati.“ *Gawler* plantam *Clusii* in *Bot. Mag. t. 654*. dixit: „FR. *pyrenaicam* & *unifloram*; fol. raris dissite, sed subalternatim, sparsis: infimis binis subopposito-approximatis;“ atque haec ipsa ab illo nunc in emendatione in *Bot. Mag. 1538* (ubi pristinam suam *racemosam Bot. Mag. 95* et 1216 mutavit in *pyrenaicam*) FRITILLARIA *nigra* dicitur, et *Trew. Seligm. t. 7. H. Eyst Vern. III. f. 3.* laudantur instar synonymorum. Haec FRITILLARIA nunc *nigra*, (olim *pyrenaica B. M. t. 664*) laudatur ab ill. *Smith* in *Rees Cycl.* ad suam „FR. *pyrenaicam*, fol. sparsis planiusculis: supremis latioribus obtusioribusque; petalis apice recurvis, nectariis subrotundis;“ ubi simul laudatur ab illo FR. *pyrenaica Sibth. Fl. graec. t. 328.* F. flore minore *Tourn. inst. 377* et additur brevis nimis adumbratio: „spithamaea, uniflora. Folia 5-7, glauca, et crassa, coriacea. Petala fulvo purpurascencia, intus apiceque dilatato recurvo flavescencia: 3 exteriora basi gibba;“ quae potius in FRIT. *Fleischerianam*, quam in europaeam *pyrenaicam* quadrare videtur. *Wikström* porro in *Act. holm. 1821. II. p. 8.* sub sua „FR. *pyrenaica*; caule basi subnudo, sursum folioso, 1-2-multifloro; foliis sparsis, lanceolatis, planis, suberectis, obliquis, glaucis; floribus nutantibus, tessellatis, concoloribus; capsulâ obtusangulâ“

conjungit cum *Fr. pyrenaica* Linn. *FRIT. pyrenaicam et unifloram* Gawl. t. 664 (nunc *nigram*) et *Fr. pyrenaicam* β *multifloram* Bot. Mag. 952 (nunc *pyrenaicam*), monendo: „*Fr. uniflora et multiflora s. racemosa* certe una eademque species; nullas differentias constantes eas inter invenire potui; spontanea planta biflora est, uti contendunt Botanici; dum in hortis colitur multiflora saepe evadit“ et assignat patriam Pyrenaeos, cum *Gawler* Caucasum et Russiam novam pro patria habeat. *Mertens* et *Koch* *Deut. Fl. II.* p. 537, cum *Lam.* et *Dec. Fl. fr. III.* p. 725. *Fr. involucratam* *All. Auct.* p. 34 (quám *Loiseleur* varietatem *imperialis* dixit) varietatem *pyrenaicae* dicunt foliis superioribus irregulariter verticillatis, sub flore solitario involucrum formantibus, quod fide speciminis *Herb. Allion* apud *Jan* omnino est. — *Host* denique *Fl. austr.* 426 (ubi definitionem divi *Linnaei Spec. L. c.* vere adulteravit, cum redderet eandem: „caule bifloro, foliis inferioribus oppositis“ ad suam *pyrenaicam non pyrenaicam* Linn. et *Smith*, quae *Curt. Mag. t. 664*, sed *racemosam* *Curt. Bot. Mag. 952*, laudat. — *FRITILLARIA pyrenaica*, foliis sparsis, complanatis, subcoriaceis; intimis latioribus, lineari-oblongis, obtusiusculis; corollâ coriaceo-incrassatâ, campanulatâ, superne recurvato-patulâ; nectariis subrotundis, *Bot. Mag. 664* (quae nunc *nigra* *Bot. Mag. 1536*), describitur ibidem ex speciminibus cultis: „Caulis pedalis, teres, superne nutans. Folia circiter 7, crassiuscula, patentia, subalterna aut paribus suboppositis approximatis: duo inferiora 4 poll., subverticalia; superiora acuminata, sensim breviora, multo angustiora. Flos unicus ($\frac{1}{3}$ poll.) duplo minor quam in *Meleagride*, graveolens, subcylindrico-campanulatus, petalorum apicibus glanduloso-incrassatis: petala exteriora acute cuneata, duplo angustiora, interiora obovato-cuneata: omnia extus obscure et sordide plumbeo, subpurpurascens, glauco suffusa, intus nitide flavescens-viridia cum rugulis distinctis purpurascens circa medium. Nectaria viridia. Genitalia subaequalia, petalis duplo breviora. Antherae longitudine filamentorum. Stigmata vix stylo longiora; germen longitudine utriusque. Differt *Meleagris* flore majore, magis cylindrico, minus incurvo; nectariis oblongis, pistillo longiore, bulbo minore. In *Pyrenaeis, ad Wolgam et in desertis Kirgisorum*.“ *Fr. pyrenaica* *Roth Beytrâg. II.* p. 22 potius ad *Fr. racemosam* spectare videtur, quam ad *Fr. pyrenaicam*. Nobis *Fr. pyrenaica* est: *Fr.* caule 1-2-floro; foliis alternis oppositisve, linearibus, obtusiusculis, planis, glaucescentibus; petalis obtusis, exterioribus ellipticis, interioribus obovatis, intus basi tessellatis; nectariis subrotundis; (et ad hanc spectare certe videntur fide iconum descriptionum et speciminum: *Fr. pyrenaica* *Bot. Mag. 664*, *Mert. et Koch Deutsch. Fl. 2.* p. 537. *Host Fl. Aust. 1.* p. 426 [excl. synon.] β fol. longioribus, acutis; pedunculis basi foliis 2-3 flores superantibus involucratis. (*Fr. involucrata* *All.*) In speciminibus nostris *pyrenaicis* et *tergestinis*, quae omnino eadem: bulbus magnitudine *Cerasi*, depresso-subrotundus, flavescens-albidus. Caulis 11-12 poll., teres, glaber, erectus, vel subinde quidquam flexuosus, crassitie pennae gallinae ad pennam anserinam tenuiorem usque, inferne viridis, maculis parvis purpureis, superne glaucescens. Folia saepius alterna quam opposita, 5-7, crassiuscula, semiamplexicaulia, tenuiter nervosa, erecto-patentia; inferiora 11, 2 poll., 2 lin. lata, superiora 15-21 lin., 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata. Flores plerumque solitarii, nutantes, duplo fere minores quam in *Fr. Meleagride*. Cor. campanulata, limbo nec inflexo, nec reflexo, extus livide purpurascens cum rore glaucescente, intus sordide flavescens basin versus obsolete fusco-tessellata; petala omnia obtusa apice callo parvo puberulo, nervis simplicibus; exteriora 16-11 lin., 3-4 lin. lata; interiora 10 lin., 4-5 lin. lata. Stam. corollâ duplo breviora; filamenta plana, apice subulata; antherae oblongae, 2 fere lin. Stylus crassus stamina paulo superans; stigmatibus 3 recurvo-patentibus, lin. longis. Germen filamentis paulo brevius. — β differt caule robustiore, plerumque 2-floro; foliis saepius oppositis, acutioribus, 2 $\frac{1}{2}$ -3 poll., 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. latis; pedunculis basi foliis 2-3 erectiusculis, 2-2 $\frac{1}{2}$ poll.; floribus paulo majoribus, 13 lin. longis, minus tessellatis.

- $\frac{1}{2}$. *Fr. umbellata* *Mill.*; floribus umbellatis. *Mill. Dict.*
n. 5. *Fr. umbellifera* *C. Bauh. Pin.* 64.
1 $\frac{1}{2}$ ped. Folia breviora latioraque, quam in *Fr. Meleagride*, glaucescentia. Flores ut in *Fr. imperiali* circa caulem, intense purpurei, flavescens-viridi-tessellati. Floret cum *Fr. aquitana*. *Miller*. Anne haec forte *Fr. involucrata* *All.*? *Habitat?*

8. *Fr. messanensis* *Rafin.*; caule toto folioso; foliis striatis, radicalibus petiolatis lanceolatis, caulinis sessilibus linearibus; floribus involucratis; petalis obovato-cuneatis. *Bertolon. in litt.*

Fr. caule paucifloro (1-4); foliis glaucis: radicalibus petiolatis, ovatis, lanceolatis; floribus involucreatis. *Rafin. Schmalz* in *Desv. Journ.* IV. p. 272. Id. *Prec. d. decouv. semiol.* p. 44. *Guss. pl. rar.* p. 144. *Prodr. Fl. sic* I. p. 410.

Folia glauca. Flores 1-4, non tessellati. Petala utrinque purpurascentia zonâ longitudinali medianâ pallide luteâ et inde saepius marginata dicta. *Bertol. in litt.* *Sprengel S. V.* II. p. 60. cum? licet Fr. *plantaginifoliam* huc ducit; at distincta ab hac monente clo *Jan in litt.*, cui nisi bona species, insignis saltem *pyrenaicae* varietas, distinctissima potissimum petalis lanceolatis, acutis, non concoloribus, uti videtur clo *Sprengel*, sed basi saepius manifeste tessellatis. Situm foliorum in *Fritillariis* speciem non distinguere addit, cum in eadem specie nunc superiora, nunc inferiora opposita, mediis alternis. Folia suprema etiam in *messanensi* ut in Fr. *involucrata* *All.* (quae *pyrenaicae* varietas) terna, involucrum sistencia. Huc forte Fr. *Meleagris Biv. Bern. Pl. sic. Cent.* II. p. 26. n. 36. Fr. *messanensis* *Swartz* apud *Steudel* forte eadem, sphalmate. In *Sicilia prope Messinam.* 4.

9. Fr. *racemosa* *Smith*; foliis linearibus, acutis, planiusculis; racemo folioso, multifloro; petalis suberectis, omnibus basi gibbosis; nectariis oblongis. *Smith* in *Rees Cycl.*, quo teste *Bot. Mag.* 952. 1216. Fr. *pyrenaica*; 1-9-flora; foliis anguste lanceolato-ligulatis, convoluto-explicatis, glauciusculis, subtus nervose striatis, sparsis, in summo caule magis confertis; corollâ elliptico-campanulatâ: laciniis subaequalibus, intus scrobiculo rotundato-oblongo: exterioribus ellipticis, parum angustioribus, acumine brevi; interioribus obovato-oblongis, apice rotundatis, stamina duplo excedentibus; germine longitudine filamentorum; stigmatibus viridibus stylo aequalibus, tereti-linearibus, recurvato-divergentibus. *Gawl.* *Bot. Mag.* 1538. quo teste: Fr. e foliorum alis δ serotina atropurpurea. *Hort. Cliff.* 119. Fr. *nigra*, flor. adscendentibus. *Mill. Dict.* 8. n. 3. Fr. *Meleagris* *Pall. Herb., Georgi Besch. russ. Reich.* 3. 4. 900. α . Fr. *racemosa* α *minor*; 1-2-flora. *Bot. Mag.* 1216. Fr. *pyrenaica* α *minor*; 1-2-flora. *Bot. Mag.* 1538. Fr. *orientalis* *Adam* in *Mohr et Weber Beytr.* 1. p. 50. Fr. *tenella*; fol. linearibus: summis oppositis, flore terminali solitario longioribus. *M. a Bieb. Fl. taur. cauc.* 1. p. 269. *Suppl.* p. 263. Fr. *orientalis* *M. a Bieb.* in *Herb. Banks* (sive *Gawl.*) β . Fr. *racemosa* *Bot. Mag.* 952. (sive *Gawl.* in emend.) *Frit. racemosa* β *major*; floribus 4-9 in racemum productis, modo subverticillatim approximatis. *Bot. Mag.* 1216. Fr. *pyrenaica* β *Bot. Mag.* 664. (excl. syn. *Park. Swerts et Bauh.* se teste in *B. M.* 952.). Fr. *pyrenaica* β *major*; pluriflora, caule spadicco punctato. *Bot. Mag.* 1538. Fr. *pyrenaica* *H. Kew.* ed. 2. II. p. 244.

α spontanea a M. a *Bieberstein* in *Fl. t. c.* describitur „planta gracilis, caule basi longe nudo, florem versus foliis circiter 6 angustis. Flos duplo fere minor Fr. *Meleagridis*, tessellatus.“ In *Suppl. laudat Bot. Mag.* 1216. 1558. In culta apud *Gawler* *l. c.*: Bulbus duplex. Folia 5-10 et ultra: inferiora longiora, 1 poll., 4 lin. lata, glauca, acuminata. Cor. $1\frac{1}{2}$ poll., griseo-lucida, fusco-purpureo-striata et variegata. Differt a *Meleagrیده* praeter characteres datos: corollā minore, laciniis minus acuminatis. — β a Fr. *Meleagrیده* differre, monet *Bot. Mag.* 1216, corollā aliter coloratā et minore; laciniis minus acuminatis, germine filamenta aequante nec dimidio breviora; nectariis subrotundo-oblongis, nec sulcum longum angustum constituentibus. Corolla *pyrenaicae* (*nigrae* nempe) substantiā crassā coriaceā subcarnosā margine patulo, laciniis alternis duplo latioribus obovatis: characteres, qui in *pyrenaica* (*racemosa* nempe) non adsunt, cujus folia etiam numerosiora, angustiora, acutiora magisque sparsa. Lacinae corollae minus acutae et nectaria laciniarum basi propiora, quam in *Meleagrیده*. In specimenibus nostris Fr. *racemosae*, quae conveniunt cum icone 952. *Bot. Mag.*: caulis robustior quam in *Meleagrیده* et Fr. *pyrenaica* nostra; folia numerosiora, erecto-patentia, glaucescentia, inferiora saepius approximata obtusa, superiora alterna acuta, 2-5 poll., 1-4 lin. lata, crassiuscula, plana, tenuiter striata. Flores solitarii vel plures, nutantes, minores quam in *Meleagrیده*, majores quam in *pyrenaica* nostra, extus purpurascens cum virore glauco, intus flavo-purpureoque virētes fusco variegati. Petala striis apice furcatis, erecta; exteriora oblonga, obtusa, 12-14 lin., 4-5 lin. lata; interiora obovato-oblonga obtusa vel cum acumine brevissimo puberulo, vix breviora, 5-6 lin. lata. Stam. corollā duplo breviora, antherae oblongae, flavae, $2\frac{1}{2}$ -3 lin.. Germen filamenta subaequans. Stylus stamina superans; stigmatibus 5 erecto-patentibus, 2 lin. et ultra longis. *In Caucaso, Tauria, Russia nova.* 4.

Obs. Cls. *Wikström* in *Act. Acad. Holm.* II. p. 8. t. 5. f. 3. sub Fr. *tenella* plantam a Fr. *tenella* M. *Bieb.* diversam ad specimen sibiricum in *Herb. Berg.* exhibuisse videtur, cum eandem sequentibus definiat: „Fr. caule basi longissime nudo, sursum paucifolio unifloro; foliis sparsis, lineari-lanceolatis, longis, acuminatis; flore subnutante et tessellato concolore“, quae definitio non quadrat in plantam a M. *Bieberstein* descriptam. Praeterea icon a clo *Wikström* data non quadrat in definitionem *tenellae* suae, cum flores tessellatos depinxisset. Nobis Fr. *tenella* *Wikstr.* cum Fr. *Meleagrیده* δ *Linn. Spec.* 436, quae Fr. *serotina atropurpurea* *Bauh. Pin.* 64. speciem propriam, vel saltem insignem varietatem Fr. *pyrenaicae* potius quam Fr. *racemosae* sistere videtur. In specimenibus in *Herb. amic. Zuccarini* nomine Fr. *Mel. δ serotinae atropurpureae*, et in *Herb. Schreb.* nomine Fr. *pyrenaicae* (ut videtur e Russia) asservatis: bulbus parvus, ovatus, albidus. Caulis 8-13 poll., crassitie pennae gallinae, erectus vel parum flexus, 1-florus, ad 1/3 usque nudus. Folia 4, omnia alterna, anguste linearia, acuminata, basi subcanaliculata, subamplexicaulia, erectiuscula, vix glaucescentia, inferiora $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ poll., 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, superiora minora. Flores solitarii, nutantes. Cor. duplo minor quam in Fr. *Meleagrیده*, in siccis atropurpurea vix tessellata. Petala obtusa apice puberulo, nervis simplicibus; exteriora anguste elliptica, 9-10 lin., 3 lin. lata; interiora obovata, ejusdem longitudinis, 4-5 lin. lata. Stam. corollā duplo breviora; filamenta plana, subulata; antherae oblongae, 1 $\frac{1}{2}$ lin.. Stylus stamina paulo superans; stigmata 3 subpatentia. Germen 2 $\frac{1}{2}$ lin.. Nectaria e siccis non describenda.

10. Fr. *latifolia* *Willd.*; caule basi nudo, sursum folioso, unifloro; foliis sparsis, lato-lanceolatis, acutis acuminatisve, longis, crassis, glaucis; flore nutante, tessellato, concolore; petalis subellipticis. *Wikstr. Act. Acad. Holm.* II.

St. p. 10. FR. fol. alternis, oblongo-lanceolatis, planis: summis oppositis; caule unifloro. *Willd. Enum.* p. 364. *Spec.* II. p. 92. FR. fol. lanceolatis, approximatis: summis oppositis florem terminalem solitarium aequantibus; capsulâ obtusangulâ. *M. a Bieb. Fl. taur. cauc.* I. p. 269. *Suppl.* p. 262. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 244. *Red. Lil.* t. 51. *Gawl. Bot. Mag.* 1558. (excl. γ). FR. *esculenta Adam* in *Web. et Mohr Beytr.* I. p. 52. FR. *persica Herb. Pall.* (fid. *Gawl.*) FR. *orientalis Plantaginis folio*, fl. magno e viridi purpurascete. *Tournef. Cor.* p. 25. (fid. *M. a Bieb. Suppl.*) FR. *lusitana lutea Park. Parad.* t. 41. f. 2. 10. FR. *maxima purpurea s. rubra* Id. I. c. p. 42. FR. *lutea praestantissima* nedum descripta fl. luteo. *Swert. Floril.* t. 7. f. 6. FR. fl. pleno *Hort. Eyst. vern. ord.* III. fol. 8. f. 2. (omnes fide *Gawl.* I. c. 1558.) α . *major*: rore glauco nimbata; corollâ spadiceo tessellatâ. *Gawl.* 1558. FR. corollâ purpureo-fuscescente etc. *Gawl. Bot. Mag.* t. 1207. FR. IV. *Belinde. Trew Seligm.* t. 41. FR. *lutea maxima italica. Park. Parad.* t. 41. f. 8. *Meleagris fl. maximus italicus. H. Eyst. vern. ord.* 5. fol. 8. f. 1. FR. *italica Pers. Syn.* I. p. 359. β . *minor*, nitens; corollae tessellis confluentibus. *Gawl.* 1558. FR. corollâ *a concolore* etc. *Gawl. Bot. Mag.* 1207. FR. *latifolia* fol. virentibus etc. *Gawl. l. c. t.* 853. FR. V. *Festus. Trew* I. c. FR. *flore atrorubente. Park. Parad.* t. 41. f. 2.

„Distinguo hanc plantam in nostris hortis haud raram, quum facies a *Meleagri* aliena; folia viridia, nec glaucescentia, latiora, plana, nunquam canaliculata; corollae obscuriores; stigmata obtusa canaliculata, nunquam acuta. Nec faciem cultura mutat et praecocius floret.“ *Willd.* (qui ergo β videtur.) *M. a Bieberstein* describit spontaneam: „Planta florens vix dodrantalibus, caule infra medium aphylo, inde foliis approximatis 5-6, inferioribus lato-lanceolatis, summis lineari-lanceolatis. Flos variegatus, major quam in *F. Meleagride*. Planta hortensis foliis instruitur alternis remotiusculis per totum caulem sparsis, quod non in spontanea.“ *Gawler* describit plantam cultam: „caule subunifloro; foliis pluribus oblongo-lanceolatis, convolutis, concavis, sparsis, superioribus confertis florem stipantibus; corollâ ample elliptico-campanulatâ, in fundo ad flexuram scrobiculis 6, verticalibus, ovato-acuminatis, radiatim insculptis, summo ore incurvato-connivente; laciniis ellipticis acumine obsoleto: externis oblongis, internis ovatis duploque latioribus, filamenta duplo excedentibus; germine columnari, tereti-trigono; stylo trigono-clavato; stigmatibus pallidis, leviter divergentibus, introrsum rimulâ puberulâ. In α bulbis lateralis, duplex; folia 6-8, inferiora 5 poll., 2 poll. (10 lin. *Link.*) lata, sensim minorâ in caule pedali vel ultra, apice nutante. Cor. 2 poll., purpureo-fuscescens, profundius tessellata, lineâ dorsali et margine laciniarum virente. Nectaria quartâ parte longitudinis floris a basi filamentorum (corollâ duplo breviorum) remota, latiora quam in *Meleagride*, nec in canalem angustum elongata.

Filamenta externe convexa, basi connata. Germen viride longitudine styli cum stigmatibus. In β bulbus multo major, quam in *Meleagrīde*; folia virentia, apicem caulis versus fere comoso-approximata; cor. 2 poll., lacte viridi-flava, et fusco-purpureo adeo dense variegata, ut colorem primum vix dignoscas: laciniac oblongo-ovales, sursum incurvulae, obtusatae, versus apices totae purpureo-fuscae. *Rédouté* flore pallidior et foliis magis planis (et obtusis). Stylus germine duplo fere longior." *Gawl. l. c.* In *Rédouté* corolla extus flavescens, intus purpurea maculis virescentibus, petala ovata, nec oblonga ut in *Meleagrīde*, intus impressione notata, ex qua linea ortum ducit longitudinalis fusca, nec flava, ut in *Meleagrīde*. α in *Caucasi alpihus*; β in *Europa australi*. 4.

Obs. Ad β forte spectat Fr. *aquitanica* Mill. *Dict. ed. 8. n. 2*, foliis infimis oppositis. (Fr. *aquitanica* fl. luteo obscuro *Swerts Floril.*) in qua folia latiora et intensius viridia, quam in *Meleagrīde*, infima opposita, superiora alterna, caulem $1\frac{1}{2}$ ped., biflorum, florem obscure luteum, nutantem, magis expansum notat. MELEAGRIDE paulo tardius florere, et variare foliis virescentibus in Britannia spontaneam addit, cum *aquitanica* in Gallia. — Ad β etiam pertinere videtur: Fr. *Meleagris* β flore luteo, tessellato: *Bertoloni* in *litt.*, qui huc trahit Fr. *involutam* All. *Auct. n. 1888*, Fr. lut. maxim. italicam *Park. Par.*, p. 43 et cum? Fr. *luteam* *Spreng. S. Veg. II. p. 63*. In hac, quam post *Allionium* primus *Talbot* in *col di Tenda* reperit: fovea nectarifera petalorum lineari-cymbiformis, elongata, acuminata; folia paulo latiora quam in Fr. *Meleagrīde*, cui in reliquis omnino similis secus *Bertoloni*.

11. Fr. *lutea* M. a *Bieb.*; foliis lineari-lanceolatis, alternis: summis approximatis, flore terminali solitario brevioribus. *M. a Bieb. Fl. taur. cauc. 1. p. 269. Suppl. p. 265. Eiusd. Cent. pl. rar. ross. I. t. 41.* F. caule basi nudo, sursum paucifolio, unifloro; foliis lanceolatis, brevibus, acutis, planis, glaucis; flore nutante tessellato concolore. *Wikstr. Act. Acad. r. Holm. 1821. II. p. 9.*, et his testt: Fr. *latifolia* γ *lutea* *Bot. Mag. t. 1538.* (icon plantae ex cultura vegetioris). *Mill. dict. ed. 8. n. 4.* Fr. *collina* *Adam* in *Web. et Mohr Beytr. p. 50.* Fr. *Meleagris* γ *Lam. Enc. II. p. 550.* Fr. lut. punctata *Park. Parad. t. 41. f. 7.* Fr. fl. lat. *Swert Floril. t. 7. f. 6.* Fr. fl. flavo. *Clus. hist. 153.*

Habitus et fere magnitudo Fr. *latifoliae*. Folia angustiora, superiora breviora: omnia alterna. Flos magnitudine F. *Meleagris*, luteus, spadiceo-tessellatus. Capsulam maturam non vidi. *M. a Bieb.* Differt a *latifolia*, praeter characteres datos: caule paucifolio, multo graciliore et brevioris; foliis dimidio saepe brevioribus; flore minore, sulphureo, violaceo tessellato. A Fr. *pyrenica* differt: caule humiliore, magis saepe paucifolio, semper 1-floro; foliis dimidio fere brevioribus; flore descripto. *Wikstr.* Cultam describit *Gawler*: foliis lacte viridi-glaucis, acutis, sessilibus, 3-4 poll., $\frac{1}{2}$ -1 poll. latis; corollâ nutante, basi truncatâ, $1\frac{1}{2}$ poll.; laciniis late ellipticis, obtusis, flavis, spadiceo-reticulatis, extus striâ longitudinali viridi, maculis dilute purpureis seriatim longitudinaliter tessellatâ, intus maculis purpureis laetioribus; capsulâ oblongâ. In *Caucasi monte Kasbeck*; *Bieb.*; in *alpihus Ossetiae*. *Adam*. 4.

12. Fr. *nervosa* Willd.; foliis alternis, linearibus, nervosis planis; caule unifloro. *Willd. Enum. p. 364.* Link

Enum. 1. p. 322. FR. *Meleagris* δ . Willd. Spec. II. p. 91.
F. serotina atropurpurea Bauh. Pin. 64. FR. serotina Pers.
Syn. I. p. 359.

Caulis fere $1\frac{1}{2}$ ped.. Folia ramea alterna, saturate viridia, triplo
lata quam in F. *Meleagrīde*, (7-8 lin. lata Link). Flos
atro-purpureus, solitarius. Non est F. *obliqua* Curt., quae
caule bifloro, foliis glaucis, apice attenuatis, oblique flexis sa-
tis distincta, et florum formā F. *tulipifoliae* affinis est. Willd.
Valde affinis F. *latifoliae*. Link. Hab.? γ .

13. *FR. *Meleagris*; caule basi nudo, sursum folioso,
unifloro; foliis sparsis, sublinearibus, canaliculatis, longis,
subrecurvatis; flore nutante, tessellato, concolore. Wikstr.
Act. Acad. Holm. 1821. II. p. 9. s. 355. FR. fol. omnibus al-
ternis, lineari-lanceolatis, acutis; caule unifloro; nectario li-
neari; apicibus petalorum inflexis. Smith Engl. Fl. p. 159.
Fl. Brit. p. 360, Engl. Bot. 622. Linn. Spec. p. 456.
Willd. Spec. II. p. 91. Mill. Dict. n. 1. Lam. Enc. II.
p. 551. Desf. Fl. atl. 1. p. 293. Scop. Carn. ed. 2. n. 405.
Decand. et Lam. Fl. fr. III. p. 201. van Hall. Fl. Belg.
sept. 1. p. 274. Wahlenb. Fl. suec. p. 200. Mert. et Koch
D. Fl. II. p. 557. Roth Enum. pl. Germ. 1. 2. p. 67. Hall.
Helv. n. 1255. Curt. Fl. Lond. Fasc. 3. t. 20. Jacq. Austr.
App. 32. Fl. Dan. 972. Redout. Lil. 222. Hayne term.
bot. t. 31. f. 3. Sturm. Deutsch. Fl. 1. A. 18. II. Dict.
Sc. nat. I. Cah. Trattin. Tabul. 559. Oestr. Fl. t. 70. Sv.
Bot. t. 376. Boiss. Fl. Eur. t. 244. Schkuhr t. 92.
Knorr. Del. 1. t. F. 2. Huiph. Cent. VI. n. 40. Bauh.
Hist. 2. p. 681. Ic. Moris. s. 4. t. 18. f. 1. Hort. Eyst.
Vern. 3. p. 7. f. 1. Swert. t. 7. Park. Par. 40. t. 41.
Rudb. Elys. II. 113. f. 1. Renealm. Spec. 147. t. 146. —
 β F. alba variegata. Bauh. Pin. 64. — γ F. alba praecox.
Bauh. ibid. FR. praecox Pers. Syn. p. 359. F. *Meleagris*
B. fl. albo. Redout. Lil. 222.

Bulbi parvi, globoso-depressi, aggregati, lobati. Caulis ($\frac{1}{2}$ -1)
pedalis teres, simplicissimus, apice nutans. Folia remotiuscula,
erecta, (erecto-potentia, potentia et subrecurva), subglauescen-
tia. Flos pendulus, magnitudine nucis Juglandis, dilutius et in-
tensius purpurā tessellatus. (Petala subaequalia, elliptica, ob-
tusa, apice calloso inflexo puberula, $1-1\frac{1}{2}$ poll., exteriora 4-5
lin., interiora 5-6 lin. lata.) Caps. obovata, abrupta, 6-sul-
cata, erecta. Smith l. c. Nectarium longitudine fere petali.
Stigma 3-partitum. Roth Beytr. II. p. 21. Varietates ultra
50 coluntur in Belgio! Per omnem Europam mediam;
in Suecia, in Caucaso, in Africa boreali. γ .

14. FR. *meleagroides* Patrin; caule basi longe nudo,
sursum paucifolio, 1-floro; foliis sparsis lineari-lanceolatis,
inferne canaliculatis, acutiusculis, erecto-potentibus; flore nu-
tante, obscure tessellato; petalis ovato-oblongis obtusis.

Bulbus rotundato-ovatus, albus, vix magnitudine *Avellanae*. Caulis erectus, fere strictus, teres, glaber, pedalis, crassitie pennae anatinae, ultra medium nudus. Folia rara, circiter 4, remota, sparsa, erecto-patentia; nec recurvata, semiamplexicaulia, anguste linearilanceolata, apice callose obtusiuscula, glabra, obsolete striata, basi canaliculata, medio planiuscula, dorso glaucescentia, inferiora majora 5 $\frac{1}{2}$ poll., 2 - 2 $\frac{1}{2}$ lin. lata. Pedunculus vel summa caulis pars valde nutans, poll.. Corolla 14 lin. longa, 8 lin. diam., extus intense lurido-violacea tessellis obsolete, intus pallidior et magis conspicue tessellata; petala recta, elliptica, obtusa, apice sub lente puberula, subaequalia, interiora basi paulo magis attenuata, foveâ nectariferâ oblongâ, nervosa, 4 - 4 $\frac{1}{2}$ lin. lata. Stam. subaequalia, corollâ fere dimidio breviora; filamenta subulata, alba; antherae oblongae, flavae, 5 fere linear. Pistillum stamina superans. Germen oblongum, sexsulcum. Stylus germine paulo longior, albidus. Stigma tripartitum; lobi erecto-patentes, obtusi. Differt a *FR. Meleagride*: caule magis stricto; foliis minus canaliculatis recurvatisque; petalis minus patentibus, magis oblongis obtusioribusque; colore denique magis violaceo; a *FR. tenella*: caule altiore; foliis latioribus; floribus majoribus et valde nutantibus, magis tessellatis. Ad specimen in herb. cli *Martius*. *In montibus altaicis. Patr. 4.*

15. *FR. ruthenica Wikstr.*; caule folioso, uni-bi-multifloro; foliis verticillatis, oppositis sparsive, linearilanceolatis, attenuatis, cirrosis, planis, erectis; floribus nutantibus; capsulâ alatâ. *Wikstr. Act. Acad. Holm. II. St. 1821. p. 6. t. V. f. 2.* *FR. verticillata*; fol. linearibus, verticillatis, oppositis alternisque: senescentibus cirrosis; caule submultifloro; capsulâ alatâ. *M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 268.* (excl. syn. *Willd. sec. spec.* ab ill. *Steven*) *Suppl. 262. Cent. pl. rar. Ross. II. t. 83. et, hoc teste: FR. pyrenaica Pall. it. I. p. 147. Gûldenst. it. I. p. 35. 109. FR. persica Gmel. it. I. p. 65. Lepechin it. I. p. 570.*

Facies *F. Meleagridis*; sed rarius 1-flora, quam floribus 2-6, axillaribus terminalibusque. Folia plura longiora et exquisitius acuminata, senescentia varie flexa atque crispata. Flores formâ coloreque *FR. Meleagridis*. Caps. lata, obtusissima: angulis in alas 6 latiusculas producta. *Bieb. l. c.* Caulis pedalis et ultra, substrictus, subteres, ultimâ basi tantum nudus, sursum multifoliosus, simplicissimus. Folia semiamplexicaulia, integerrima, glabra, striato-nervosa, plana: inferiora latiora 3 lin. lata, 2 poll. et ultra longa, verticillata, terna; superiora sparsa, sensim minora, angustiora, attenuata, cirrosa; summa prope singulum florem 2-4 na, angustissima, linearia, cirrosa. Flores terminales minores quam in *FR. pyrenaica*. Cor. purpurea: petalis ovalibus, obtusis, nervosis, 9 circiter lin.. Stam. subaequalia, corollâ dimidio breviora: filamentis subulatis, antheris oblongis, polline luteo. Pistillum: germine oblongo, glabro. Styl. et Stigm.? A *pyrenaica* differt, praeter characteres datos: caule tenuiore; floribus purpureis; a *lusitanica*: caule magis folioso; floribus purpureis. *Wikstr. In sylvaticis promont. caucasici. M. a Bieb. 4.*

Obs. *FR. pyrenaica Pall.* in *Herb. Lamb.* (fide *Gawl.*) ad suam obliquam a. tulipifoliam spectat. Attamen specimen *FR. pyrenaicae* in regno Sjungo-

vik ad fluvium Ak-sfu lectum in Herb. Schreber etiam huc spectat, nec ad *F. obliquam* Gawl. Icon et descriptio a *Wikström* data bene quadrat in plantam sibiricam, in qua: bulbus subrotundus albidus, 7 lin. in diametro; caulis 11-15 poll., inferne sub lente scabriusculus, ad 4-7 poll. usque nudus, 2-florus, rarius 1-florus; folia infima opposita, dein terna, superiora sparsa summa sub floribus 2-3, linearia, acuminata, omnia praeter infima in cirrum involutum vel revolutum terminata, erecto-patentia, 2½-3 poll., 1-3 lin. lata; flores ut e siccis videtur purpurei, tessellati; petala exteriora elliptica, obtusa, apice puberulo, 9-10 lin., 3 fere lin. lata; interiora ovata, vix obovata, apice minus rotundata, quam in *F. verticillata*, 8 lin., 3½-4 lin. lata, omnia nervis ad apicem usque simplicibus; antherae 2½ lin.; stylus longitudine staminum; stigmata patienti-reflexa, subclavata, 1½ lin.; germen 2½ lin.

16. *Fr. verticillata* Willd.; caule basi longe nudo, sursum folioso, unifloro; foliis infimis oppositis, superioribus verticillatis 4-5nisve, lanceolatis, attenuatis, cirrosis; flore nutante, non tessellato, concolore. *Wikst. Act. Acad. Holm.* p. 11. T. V. f. 4. *Fr. fol. verticillatis, lineari-lanceolatis; caule unifloro. Willd. Spec. II. p. 91. Link Enum. 1. p. 522. Fr. altaica in Herb. Lamb. (fid. Bot. Mag. 1216. in Synthesi). Fr. scandens Fischer. Fr. leucantha Fisch.*

Ab omnibus speciebus abunde distincta; caule pedali, erecto; foliis 4-5 verticillatis, sessilibus, linearibus, apice valde attenuatis; flore solitario terminali „(in tot speciebus obvio!)“ Folia exsiccata apice crispantur, ac si cirro essent instructa. *Willd. l. c.* Caulis pedalis et ultra, subteres, basi longissime nudus, simplicissimus, apice nutans. Foliorum inferiorum par unicum oppositum; superiora verticillata, subinde sena, subpatentia, subamplexicaulia, integerrima, plana, striato-nervosa, 3 poll., 1-3 lin. lata; summa terna, angustissima. Flos magnitudine MELEAGRIDIS. Cor. utrinque alba, eximie nervosa venosaque; petalis alternis majoribus, ovalibus, obtusis, pollicaribus. Stamina aequalia, corollà dimidio breviora. Filamenta subulata, antheris oblongis, luteis, polline luteo. Pistillum dimidium corollae paullo superans; germine glabro, oblongo; stylo longitudine staminum; stigmatate trifido. Caps.? Similis quodammodo *imperiali*, at ab omnibus hucusque cognitis speciebus valde diversa. *Wikstr. l. c.* Perperam a clo *Sprengel S. V. II. p. 65.* huc ducitur *UVULARIA cirrosa* Thunb. In *Sibiria. 4.*

Obs. Cls. Fischer distinguit *Fr. scandentem* a *verticillata*; sed collatis specimenibus altaicis et wolgensibus cli auctoris non differunt nisi: 1. foliis infimis, in *scandente* obtusis, in *verticillata* acutis; 2. nervis petalorum, latiorum imprimis, qui in *altaica* fere omnes bifidi, in *wolgensis* plurimi simplices; 3. colore floris, in *scandente* ochroleuco, maculâ fuscâ ad foveam nectariferam (saltem in sicca), in altera purpureâ; 4. magnitudine florum, in *verticillata* quidquam minorum. Bulbos capsulasque non vidi. Caulis, folia, maximam partem apice, ut in *GLORIOSA superba*, cirrosa; inflorescentia, pedunculi, forma perigonii, structura genitalium omnino eadem. Flores in specimenibus *scandentis* 1-floris multo majores, quam in bifloris. *Besser in litt.*, qui sub *verticillata* *F. ruthenicam* *Wikst.* (*F. verticillata* *M. Bieb.*) intelligere videtur. In speciem *F. verticillatae* *Willd.*, in Herb. *Panzer* a *Dr. Gebler* in *Barnaul* lectum et nomine *F. scandentis* missum omnino quadrat descriptio et icon a *Wikström* data, cui sequentia tantum addimus: bulbus albidus, magnitudine Pruni minoris. Caulis 1½ ped., ad medium usque nudus, inferne purpurascens-maculatus et sub lente scabridus. Folia inferiora 4 in verticillo, quorum 2 latiora, superiora 4-7, suprema 4, omnia praeter infima in cirrum brevem revolutum terminata, 2½-3 poll., infima 3 lin., reliqua vix ultra lin. lata, subtus glaucescentia. Pedunculus 10 lin., nutans. Petala in siccis ochroleuca, non tessellata, sed nervis longitudinalibus obliquis apice furcatis; exteriora lanceolato-elliptica, obtusiuscula, apice parvo calloso puberulo, 15 lin., 4½-5 lin. lata; interiora obovata, obtusissima, 15 lin., apice 6 lin. lata. Antherae 3 lin. Stylus stamina vix superans.

17. *Fr. cirrosa* Don; caule simplici, unifloro; foliis

ternis quaternisve, linearibus, apice cirrosis, revolutis; perianthiis pedunculatis, cernuis: foliolis ovali-oblongis, genitalibus duplo longioribus. *Don Prodr. Fl. nep. p. 51.*

F. verticillatae Böt. *Mag. proxima.* Bulbus ovatus. Caulis 1½ ped., erectus, gracilis, teres, purpureus, albo-maculatus, glaber. Folia 3-4-poll., 1½-2 lin. lata, glabra, opaco-viridia, nitida, apicem versus attenuata. Flos solitarius, cernuus, magnitudine *F. Meleagridis*, atropurpureus, viridi-marmoratus. *Don. A Spreng. Cur. post. p. 135.* jungitur cum *F. verticillata.* In *Gosaingsthan Nepalensium. Wallich. 4.*

18. *Fr. barbata* Humb. et Bonpl.; caule paucifloro; foliis sparsis, linearibus, acuminatis; laciniis calycinis exterioribus oblongo-lanceolatis, cuspidatis: interioribus obovatis, acutis, crenulatis, barbatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 288. t. 677.*

Caulis 6-8-poll., simplex, teres, glaber, foliatus, apice 2-3-florus, rarius pluriflorus. Folia angustato-acuminata, canaliculata, striata, glabra, 3-4 poll., vix 2 lin. lata. Flores ½ poll., subcernui, longe pedunculati. Cal. luteus, glaber, profunde 6-partitus, laciniis 3 exterioribus striatis, integerrimis, interne basin versus tenuissime barbatis, 3 interioribus longioribus, basi angustatis, apicem versus crenulatis, striatis; interne a medio ad basin usque barbatis, omnibus basi foveâ nectariferâ oblongâ. Stam. erecta, corollâ duplo breviora, glabra. Antherae flavae. Stylus brevissimus, triqueter. Stigmata 3 patentia. Caps. triquetra, 3-valvis, polysperma.. Semina axi centrali affixa. An generis distincti? *Kunth. In montanis prope Guanaxuato et Valladolid mexican. 4.*

19. *Fr. purpurea* Humb. et Bonpl.; caule subunifloro; foliis sparsis, linearibus, acuminatis; laciniis calycinis exterioribus lanceolato-oblongis, acutis; interioribus oblongis, fimbriato-ciliatis. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 288.*

Rad. bulbosa. Caulis simplex, erectus, pedalis, foliatus, superne flexuosus, striatus, glaber, apice uni-aut biflorus. Folia canaliculata, striata, glabra, basi vaginantia, 6-7-pollicaria, superiora latiora, breviora; axillis bulbiferis. Flores pollicares, nutantes; cal. 6-partitus: lacinae externe saturate violaceae, interne pallide flavae, maculâ violaceâ, inaequales; exteriores breviores, glabrae, interne basi foveâ subrotundâ; interiores ibidem foveâ semirotondâ. Stam. calyce duplo breviora. Filamenta subulata, glabra. Antherae oblongae. Ovarium triquetrum, glabrum. Stylus trigonus, brevis. Stigma 3-fidum, laciniis reflexis. Caps. oblonga, trigona. Semina minuta, axi centrali affixa. *Kunth. In apricis aridis Nov. Hisp. prope Pazquaro. 4.*

20. *Fr. cantoniensis* Lour.; foliis trinervibus: summis oppositis; floribus geminis axillaribus. *Lour. cochin. I. p. 206. ed. Willd. p. 255.*

Caulis annuus, simplicissimus, durus, tenuis, teres, erectus, 1½ ped.. Folia glabra, integerrima, basi rotundata, inde conica,

acumine longo, inferiora alterna, suprema opposita. Flores penduli, toti fusco-purpurei, inodori. Cor. crassa, 6-gona, erecta, subclausa. Stamina corollae aequalia. Stylus sublongior, 3-fidus; stigmatibus simplicibus. Petalorum basis crenata nectarifera. Caps. supera, subrotunda, 3-loba, polysperma; seminibus 3-4 inaequalibus. Colore convenit cum Fr. serotina atropurpurea *Bauh. Pin.* p. 64. n. 8.; foliorum situ cum Fr. pyrenaica *Linn.*, sed ab utraque diversa. *Lour. Fr. plantaginifoliae Lam.* affinis. *Willd. Clo Gawler* eadem videtur cum *UVULARIA chinensi B. M.* t. 1537. in nota. *Colitur Cantone Sinarum.* 4.

21. *FR. macrophylla Don*; caule plurifloro, striato; foliis sparsis, lineari-lanceolatis, praelongis, glabris; pedunculis bracteis triplo brevioribus; perianthiis cernuis: foliolis spathulatis, obtusis, apiculatis. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 51.

Caulis erectus, $1\frac{1}{2}$ -2 ped., teres, obsolete sulcatus. Folia 5-6 poll., 3 lin. lata, plana, utrinque glabra ac viridia, versus apicem attenuata. Flores 3-4, flavi, magnitudine Fr. *Kamtschatisensis*, cernui. Perianthii foliola oblongo-spathulata, basi angustata ibique foveolâ nectariferâ instructa, apice mucronulo obtuso incrassata. Stamina 6, aequalia, erecta, perianthio breviora. Stylus trigonus, staminibus longior. Stigma trifidum, exsertum. *Don. In Gosainsthan Nepalesium. Wallich.* 4.

22. *FR. alba Nutt.*; glaucescens; foliis remotiusculis, sparsis, oblongo-linearibus, obliquis, sessilibus, planiusculis, obtusis, subtus substriatis; floribus 1-5 terminalibus axillari-busque, majusculis. *Nutt. gen.* p. 222.

Bulbus parvus, subsquamosus, uti in LILIIS. Caulis solitarius, fere 2-ped.. Folia 2 fere-poll., 2 lin. lata. Flores subinde racemosi, albi. Caps. subturbinata, angulis 3 acutis, subtus tridentatis. Semina magna, triangularia, plana, pallida. *Nutt. In vallibus et declivibus a Fort Mandan ad montes usque.* 4.

Quid: *FRITILLARIA cornuta H. Gorenk.*

Cornuti H. Dorp. 1810.

glaucescens Willd. in Hort. Breiting. et Beral. 1818.

pontica Wahlenb. in Berggren Resor uti Europ och Österlaenderne 8^o Stockh. 1826. *Byh.* p. 70.

tardiflora Lehmann H. Hamb.?

1376. L I L I U M.

a. *Fritillarioidea.*

1. **L. camtschalcense*; foliis verticillatis 3-4, supremis oppositis alternisque, ovato-lanceolatis, obtusiusculis, nervosis; floribus subsolitariis, erectiusculis, campanulatis; petalis obovato-lanceolatis, sessilibus. L. fol. verticillatis; flore erecto; corollâ campanulatâ; petalis sessilibus. *Linn. Amön. Acad. II.* p. 348. *Spec.* 435. *Willd. Spec.* p. 89. *Mill. Dict. n. 12. Lambert Account of the Herb. of Pall. in Trans. Linn. Soc. X.* p. 265. t. 12. *Hort. Kew. ed. 2. II.* p. 245. β petalis angustioribus.

„Rad. bulbosa, squamata. Caulis simplicissimus, teres laevis, ped. Folia lanceolata, sessilia, 4-6, striata, parum obtusa, laevia; suprema 2-5, saepius alterna, angustiora. Pedunculi brevissimi, nudi, erectiusculi. Petala ovata, obtusa, laevia, striata, purpurascens. Filamenta subulata, petalis dimidio breviora. Antherae oblongae, erectae. Germen triangulare, oblongum. Stigmata 3, oblonga, recurva, longitudine fere germinis. Folia ut in Martagone. Flores parvi, magnitudine et figurâ *Lilii persici*.“ *Linn.* „6-18 poll. Folia inferiora plerumque 5-na, superiora alterna, interdum opposita ternaque, ovata, integerima, longitudinaliter nervoso-striata, 2-5 poll., 9-10 lin. lata. Rad. e tuberculis parvis, imbricatis, bulbum rotundum obtinentibus, basi fibris ramosis. Flores terminales, solitarii, 2-5 ni, nutantes.“ *Lambert* qui FRITILLARIAM esse suspicatur. In speciminibus ab *Eschscholz* lectis in Herb. cli *Martius*: bulbi magnitudine fere pruni, albidi, e bulbillis ovatis rotundatisque congesti, superne squamis aliquot albidis diaphanis caulem laxè ambientibus. Caulis 9-12 poll., glaberrimus, crassitie fere pennae anserinae minoris, ad $\frac{2}{3}$ nudus, apice foliosus. Folia plerumque 3, rarius 4, superiora opposita, supremum solitarium, ovato-lanceolata lanceolatave, utrinque angustata, obtusa potius quam acuta, glaberrima, nervis 5-7 paulo magis conspicuis, 2-2 $\frac{1}{2}$ poll., 8-10 lin. lata. Flores terminales in speciminib. *Eschscholz*. semper solitarii in pedunculo glabro 2 $\frac{1}{2}$ lin. quidquam curvato. Cor. ut videtur purpurascens, immaculata, inexpansa perfecte campanulata, expansa magis patens; petala obovata vel obovato-lanceolata, basi attenuata, sed sessilia, intus striata, foveolâ nectariferâ nullâ, apice obtuso sub lente tenuiter fimbriata, 9-11 lin., medio 4-5 lin. lata. Filamenta corollâ duplo breviora, gracilia, erectiuscula, basi dilatata, apice subulata. Antherae crassae, oblongae, obtusae, 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin., flavae. In β (*L. camtschaticum* *Herb. Schreb.*) caulis 5 poll., tenuior, flexus; folia eadêm, sed paulo angustiora; pedunculus paulo longior; corolla magis patens; petala fere *L. affinis*, late lanceolata, utrinque angustata, 10-11 lin., medio 3 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ lin. lata; stamina ut in α ; pistillum stamina paulo superans; stylus brevis; stigmata 3 basi erecta, supra medium revoluta patentia, 2 $\frac{1}{2}$ lin.; germen 2 $\frac{1}{2}$ lin.. *Link* in *Enum.* notat, „affine *L. philadelphico*, sed petala basi non ita angustata.“ *L. camtschatcense* *Mill.*, quod clo *Lamarck* a planta *Linn.* differre videtur, nobis hujus loci. In *Camtschatca*; in *America boreali*. 4.

2. *L. affine*; foliis inferioribus 4-5 verticillatis, lanceolatis: superioribus oppositis alternisque lineari-lanceolatis, obtusiusculis, nervosis; floribus subsolitariis, erectiusculis; petalis lanceolatis sessilibus. FRITILLARIA lanceolata; caule folioso 1-2 floro; fol. lineari-lanceolatis, obtusiusculis; inferioribus verticillatis; petalis lanceolatis. *Pursh Fl. sept. Amer.* I. p. 250. (excl. syn. *L. camtschatcensis*).

Flores obscure purpurei, maculis fuscis. *Pursh*. In speciminibus ab *Eschscholz* lectis et in herb. cli *Martius* asservatis, quae nobis huc spectare videntur: bulbus magnitudine cerasi e squamis crassis, ovatis, acutis et bulbillis subglobosis, albidus; superne vaginis paucis, albidis, diaphanis, 10 lin. longis, basin que

caulis laxè involventibus. Caulis strictus, crassitie pennae gal-
linaceae ad pennam anserinam minorem usque, teres, glaber,
8-10 poll., ultra medium nudus. Folia inferiora 4-6, patentia,
glabra, subtus pallidiora, nervoso-striata, nervis 5 evidentiori-
bus, $1\frac{1}{2}$ poll., 4-5 lin. lata; superiora terna oppositaque,
suprema solitaria, similia, sed angustiora et subinde acutiuscula,
 $1-1\frac{1}{2}$ poll., $2-2\frac{1}{2}$ lin. lata. Flores terminales, solitarii bi-
nive. Pedunculi glabri, floriferi suberecti, fructiferi stricti,
crassitie pennae corvi, $3\frac{1}{2}-10$ lin.. Corolla purpurascens, vix
maculata, expansa 14-15 lin. in diametro; petala erecto-pa-
tentia, lanceolata, obtusiuscula, utrinque angustata, glabra, stria-
ta, praesertim intus, apice sub lente tenuiter fimbriata, poll.,
 $2\frac{1}{2}-3$ lin. lata, foveolâ nectariferâ nullâ. Stamina corollâ tri-
plo fere breviora; filamenta erecta, basi dilatata, apice subulata,
gracilia; antherae crassae, oblongae, obtusae, flavae, $1\frac{1}{2}$ lin..
Pistillum stamina duplo fere superans, corollâ duplo brevius;
stylus brevis; stigmata 3, basi erecta, apice revoluto-potentia,
 $2\frac{1}{2}$ lin.. Capsula oblonga, truncata, glabra, angulis 6 rotun-
datis, 6-sulcata, pallida, 10 lin.. Semina ut in FRITILLARIA,
rufo-fusca, nitida, 2 lin. longa. — *Pursh* plantam suam om-
nino cum icone *L. camtschatcensis* ab ill. *Lambert* data con-
venire dicit; *Nuttall. nov. gen. p. 222.* vero et *L. camtschat-*
cense (sub specierum enumeratione) et FRITILLARIAM lanceolatam
Pursh adducit. *Sprengel* utramque conjunxit. Nobis *FR. lan-*
ceolata petalorum formâ foliisque angustioribus numerosioribus-
que et staminibus brevioribus differre videtur, nisi forte *L.*
quadrifoliatum Meyer, camtschatcense L. et planta haec varieta-
tes speciei unius. Ad fontes Missouri et Columbiae,
Lewis; in Unalaska, Eschscholz. 4.

3. *L. quadrifoliatum Meyer*; foliis quaternis, verticil-
latis, ovato-lanceolatis, glabris, 5-nervibus; floribus subbinis,
cernuis; petalis patentibus, immaculatis. *Meyer in Reliqu.*
Haenk. Fasc. II. p. 126.

Tota glaberrima. Caulis pedalis et ultra, laevis, crassus. Folia
remote verticillata, rarius superne terna, rarissime inferne
quina, 2 poll., obtusa; suprema angustiora, magis attenuata.
Flores parvi. Petala patentia, unguiculata, lanceolata, obtusa,
purpurea, maculis destituta. Filamenta corollâ dimidio bre-
viora. Antherae oblongae, basi ad commissuram dehiscentes.
Germen oblongum, filamenta aequans. Stylus reclinator, hama-
tus, superne sensim incrassatus. Fructus? *Meyer l. c.* An
certe a *L. camtschatcensi* diversum? *In Nootka Sund v.*
Portu Mulgrave. 4.

4. *L.? pudicum Pursh*; foliis sparsis, lineari-lanceola-
tis; caule unifloro; corollâ campanulatâ, cernuâ; petalis erec-
tis, sessilibus, spathulato-obovatis, obtusis, intus planis.
Pursh Fl. sept. Amer. I. p. 228. c. ic. Nutt. gen. p. 221.

AMBLIRION *Rafinesq. prodr. nov. gen. in Journ. d. Phys.*
T. 89. p. 102. FRITILLARIA *pudica Spreng. S. V. II. p. 64.*
„Caulis circiter 10 poll. Flores pallide flavi. Primo intuitu FRI-
TILLARIAM refert „(qualis etiam videtur clo *Nuttall l. c.*)“; at
stylus longitudine petalorum stigmatè obtuso LILII appropin-
quat hanc speciem. Fructus mihi ignotus. Rad. bulbis com-
Syst. Vegetabil. Vol. VII.

planatus." *Pursh. Char. generis AMBLIRII apud Rafin. l. c.:*
 „Perigon. 6-partitum, campanulatum: laciniis sessilibus, superne
 dilatatis, planis, sine nectario. Stam. brevia, filiformia. Ger-
 men oblongum. Stylus filiformis, apice incrassatus. Stigma ob-
 tusum, integrum. Caps.? *Ad aquas Missouri. M. Le-
 wis. 4.*

b. *Martagones: corollis revolutis.*

a; foliis verticillatis.

5. **L. Martagon; foliis verticillatis, ovato-lanceolatis; floribus reflexis; corollis revolutis. Willd. Spec. II. p. 88. Linn. Spec. p. 435. Mill. Dict. ed. 8. n. 9. Lam. Enc. III. p. 557. ill. t. 246. f. 3. Roth germ. II. 396. En. pl. Germ. I. 2. p. 69. Brotero Fl. lusit. 1. p. 522. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 203. Savi Bot. etrusc. 1. p. 133. Allion. pedem. n. 1886. Tenor. Fl. neap. 1. p. 151. Bieb. Fl. taur. cauc. 1. p. 267. Mert. et Koch Deut. Fl. II. p. 556. Gmel. sib. 1. p. 44. Hall. helv. 1233. Jacq. aust. t. 351. Rédout. Lil. t. 146. Svensk Bot. 381. Gawl. Bot. Mag. 1634. Mayerhoff. Fl. monac. t. 13. Plench off. t. 274. Hayne off. Gew. VIII. 28. Kerner t. 161. Kniph. C. III. n. 55. Knorr Del. 1. T. 6. L. mont. s. sylvestre min. Clus. Hist. 1. p. 154. Lob. ic. t. 168. f. 1. β . floribus reflexis alterum hirsutum. Bauh. pin. 78. Gmel. Sib. p. 44. L. hirsutum Mill. Dict. 8. n. 10. Bot. Mag. 893. L. Milleri; fol. verticillatis sparsisque; caule hirsuto; petalis reflexis pallidioribus. Schult. Obs. bot. p. 67. L. mont. s. sylv. majus. Clus. l. c. Lob. l. c. f. 2. γ . pallidum Spreng. Cur. post. p. 135. L. glabrum; caule multifloro, scabro; fol. oblongis, acutis, nervosis; corollis racemosis, reflexis, revolutis, intus glaberrimis. Spreng. S. V. II. p. 62. Reichenb. in Mössl. Handb. p. 548. δ . Floribus reflexis albis. Bauh. pin. 78. Swert. Florileg. t. 53. L. Martagon β Fl. fr. n. 1914.*

Bulbus flavescens. Caulis 1-4 ped., teres, rubro striatus v. maculatus, superne fusco-purpurascens. Folia 6-8 in verticillis nunc remotis, nunc duplicatis, basi attenuata, sessilia, sordide virentia, 2-5-poll., $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ poll. lata, 5-7-nervia, firmula: superiora sparsa acuta. Racemus laxus, nunc pauci-nunc multiflorus; floribus subinde etiam verticillatis. Pedicelli atropurpurei, maculati, patentibus, cernui, fructiferi erecti, 1-2-poll., basi foliolis 2, lanceolatis, acutis, carnosulis, duplo brevioribus. Cor. dilute purpurascens vel carnea, rarius alba, a medio ad basin punctis v. maculis purpureis v. atropurpureis. Petala primum reflexa, serius revoluta, ovato-lanceolata, apice calloso glanduloso-puberulo, carinata, praesertim interiora carinâ validâ subquadrata, pubescente, carnosula, 1-2 poll., 4-6 lin. lata, intus basi virescentia et cristis 2 puberulis $\frac{1}{2}$ lin. altis. Filamenta subulata, erecta, albide-viridia, corollâ $\frac{1}{4}$ breviora. Anthe.

rae aurantiacae, 4 lin.. Stylus germine staminibusque longior, primum erectus, serius curvatus, superne purpurascens. Stigma purpurascens, glandulosum, capitato-trilobum. Caps. pyriformis, angulis 6 valde prominentibus, fere poll.. In β caulis 3-4 ped., villosus; folia copiosiora majora 4-7 poll.. Cor. saepius 4 poll. diam., maculis majoribus; lacinae interiores obtusiores, apice villosae. Culturâ perstare videtur. Variat floribus albis, roseis, flavis, plenis. *In totius Europae mediae atque meridionalis montosis sylvaticis et in Sibiria; e Britannia exul.* 4.

6. **L. canadense*; foliis remote verticillatis, lanceolatis, trinerviis, subtus ad nervos hirsutis; pedunculis terminalibus, elongatis, plerumque ternis; corollis cernuis, turbinato-campanulatis, recurvo-patentibus: laciniis lanceolatis. *Pursh Fl. sept. Am.* 1. p. 229. *Linn. Spec.* 455. *Mant.* p. 564. *Willd. Spec.* II. p. 89. *Mill. Dict. n.* 11. *Lam. Enc.* III. p. 536. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 245. *Mich. Fl. sept. Am.* 1. p. 197. *Bigel. Fl. bost.* p. 82. *Elliott. Sk.* 1. 549. *Torr. Fl. N. M. St.* p. 349. α floribus flavis, s. lateritio-fuscescentibus. *Ker in Bot. Mag.* 800. *Catesb. Carol.* 5. p. 11. t. 11. *Rudb. Elys.* 1. p. 177. f. 5. *Moris. Hist.* II. 408. S. 4. t. 20. f. 9. *Park. Par.* 53. t. 55. f. 2. β floribus rubicundis *Ker in Bot. Mag.* 858. *L. canadense* B. *Rédout. Lil.* fol. 301. et se teste: *L. penduliflorum*; fol. vertic., 3-nerviis, ovali-lanceolatis; flore solitario pendulo, subinfundibuliformi. *Redout. Lil.* 105. *L. pendulum Hortul. fid. Com. a Hoffmanns. 6ter Nacht.* p. 46. γ . foliis angustioribus; floribus minoribus magisque contractis. *Bart. Elem. of Bot.*

Folia verticillata, 3-lineata. Corollae aequae ac Martagon revolutae, basi flavae punctis atris. *Linn. Mant.* Differt a *L. superbo* praeter characteres datos: caule virente nec atro-purpureo; foliis latioribus (?) per verticillos magis remotos magisque regulariter dispositos; corollis limbo recurvo-patente, nec revolutis. *Ker.* In α spontaneo; bulbus magnus, oblongo-ovatus. Caulis 3-4 ped., teres, glaber, crassitie pennae anserinae vel cygnaeae. Folia 4-8 in verticillo, rarius unum alterumve sparsum, erecto-patentia, acuminata, apice calloso, basi attenuata, 3-5-nervia, subtus pallidiora et ad nervos marginesque pubescentia, $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ poll., 5-8 lin. lata; suprema sub pedunculis ovato-lanceolata, 2 poll., 8 lin. lata. Pedunculi 3-5 et ultra, subumbellati, teretes, glabri, erecto-patentes, apice cernui, 4-6 poll., medio plerumque foliolo stipati. Flores 2 poll., $2\frac{1}{2}$ -3 poll. in diametro, infundibuliformes, limbo subreflexo-patenti. Petala lanceolata, utrinque attenuata, glabra, apice calloso puberula, interiora dorso nervo fortiori, flava, ad medium usque et ultra maculis densis subrotundis, fulvis, in siccis atropurpureis. Stam. flava, corollâ $\frac{1}{3}$ breviora; antherae crassae, aurantiacae, $3\frac{1}{2}$ -4 lin.. Stylus stamina paulo superans. Stigma trilobo-capitatum. Germen 7 lin.. In β apud *Gawl.*: flores magis cernui, 3-poll., tubo unguium coccineo; lacinae flavo-coccineae vel lateritiae,

basi intus fusco-virentes, purpureo-punctatae. Genitalia fusco lateritia. Apud *Rédouté*: „Bulbus subrotundus, magnitudine circiter nucis juglandis, squamosus. Caulis apice subnudus. Folia omnia verticillata, 3-4-5, internodiis paulo breviora, acuta, patentia, margine et ad nervos pilis brevissimis, intense viridia, 18-23 lin., 6-6½ lin. lata. Flos terminalis, aurantiacus, extus magis ruber, intus maculis subrotundis fuscis. Cor. basi tubulosa, apice patens, 27 lin. longa, carnosae, vix ciliata; petala exteriora subplana nervo prominente nullo, interiora dorso nervo longitudinali valde convexo; omnia apice callosa. Filamenta pallida, cylindrica, apice acuta; antherae oblongae, obtusae, nigricantes, 3½-4 lin., polline aurantiaco. Germen virescens, subtrigonum. Stylus teres, fere aurantiacus, stamina paulo superans. Stigma crassum, lobis 3 brevibus, fusciscentibus, papilloso. Nec cum *L. camtschatcensi* (sub cuius nomine occurrit specimen in *H. Schreber.*) nec cum *philadelphico* conjungendum.“ In γ, spontaneo, caulis tenuior humilior; folia 5-6 in verticillo patentia, nervis 3 validioribus minus pubescentibus, 1-2 poll., 2-3 lin. lata; flores 2, aurantiaci, 1½ poll., parum cernui, infundibuliformes, nec revoluti, poll. in diametro; pedunculi 4-5 poll. In America boreali a Canada ad Virginiam. 4.

Obs. Cls. *Link* in *Enum.* p. 321 et 322. *L. canadense* *Linn.* (quod flavum) cum *L. pendulifloro* commutasse videtur, cum utrumque specie distinguat, et *L. canadensi* „fol. verticillata; cor. subrevolutas, rubras, nigro-punctatas“; *L. pendulifloro* *Red.* vero: „fol. 8-na, multinervia, 4 poll., 4 lin. lata; cor. croceas punctis elevatis nigris; petala 1½ poll., 4 lin. lata“ adscribat.

7. *L. maculatum* *Thunb.*; foliis sparsis verticillatisque, lanceolatis, glabris; corollis campanulatis, intus maculatis; limbo reflexo. *Thunb. Act. Soc. Linn. II. p. 334.* *Willd. Spec. II. p. 89.* *L. canadense* *Thunb. jap. 135.* (excl. syn.). Caulis teres, striatus, glaber, simplex, inanis, pedalis, superne subumbellatus. Folia sessilia, multinervosa, erecta, digitalia. Flores subumbellati. Pedunculi digitales, erecti. Corolla incarnata, intus maculis plurimis purpureis. Differt a *L. canadensi*: foliis basi latis et corollis minus revolutis. *Thunb.* In *Japonia*. 4.

8. *L. Michauxianum*; foliis plerumque verticillatis, cuneato-lanceolatis s. obovalibus, enervibus, glaberrimis; ramis floriferis crassis, ternato-terminalibus, (1-3); floribus reflexis; corollis revolutis. *Mich. Fl. bor. Amer. 1. p. 197.* (sub *L. caroliniano* uti *Pers. Syn. 1. p. 359.* *Pursh Fl. sept. amer. 1. p. 230.* *Nutt. gen. p. 222.* *Elliott. Sketch. 1. p. 388.* *Bot. Reg. 580.* et *Bot. Mag. 2280.*) *L. Martagon* *Walt. Fl. carol. 123.* *L. Michauxi* *Poir. Enc. Suppl. III. p. 457.* *L. autumnale* *Loddig. Bot. Cab. 335.* *L. superbum* β *uniflorum* *Redout. Lil. fol. 103.*

Caules glabri, uti tota planta. Corollae magnae, maculatae. Affine *L. Martagoni* *Poir.* *Nuttall l. c.* monet proximum esse *superbo*, et se *uniflorum* tantum vidisse caulem in montibus Carolinae septentrionalis, nec dubitare culturâ fieri multiflorum, et in *L. superbum* transire; at *Pursh*, qui utrumque vidit, spontaneum *L. superbum* 30-50 florum invenit. Specimina nostra spontanea uniflora foliis superioribus plerumque 4-5 verticillatis, sub-

enervibus, crassioribus, patentibus et subcuneatis abunde differunt a *L. superbo*, cui flores simillimi. In culto: caulis ped. circiter, strictus, viridis (maculatus), teres. Folia sparsa et 3-4 in verticillis, sessilia, coriacea, sursum brevius, deorsum longius attenuata, obscure viridia, interdum maculis oblongis nigrescentibus, saepius undulata, nitida, subnervia vel nervis 3 vix apparentibus, 2-3 unc., ubi latiora, $\frac{3}{4}$ unc.. Pedunculus cum caule continuus et aequicrassus, semper fere 1., rarius bi- vel pluriflorus, $1\frac{1}{2}$ unc., folio vago (nunc 2-3-) stipatus, erectus, (sub flore incrassatus et flexus). Cor. lateritio-flavicans, odore strenuo vix grato, cernua, turbinato-reflexa, 3 unc., glabra, intus (nigro-) punctata, (apicem versus intense aurantiaca, extus flavescenti-viridis); laciniis elongato-oblongis, exterioribus duplo angustioribus, acuminatis; interioribus abrupte breveque acutis, $1\frac{1}{4}$ unc. latis, dorso lineâ quadratâ longitudinali. Stam. corollâ $\frac{1}{3}$ breviora; antherae $\frac{1}{2}$ unc., fuscae; (polline aurantiaco). Stylus virescens, elongato-clavatus, trigonus; stigma trilobo-capitatum. *L. superbum* differt: caule multifloro; foliis angustioribus, 3-nervibus, lineari-lanceolatis, planis, tenuioribus, 6-9 in verticillo. *Bot. Reg.* Conf. Obs. ad *L. superbum*. *In praxis fertilibus Virginiae inferioris, Carolinae et Floridae.* †

9. **L. superbum*; foliis imis verticillatis, ceteris sparsis, lanceolatis, acuminatis, trinervibus; floribus racemoso-pyramidatis, reflexis; corollis revolutis, glabris, maculatis. — *Linn. Spec.* 454. *Willd. Spec.* II. p. 88. *Mill. Dict.* n. 8. (a *Gawler* exclus). *Hort. Kew. ed. 2.* II. p. 242. *Lam. Enc.* III. p. 536. *L. fol. lineari-lanceolatis, glabris, trinervibus, inferioribus verticillatis intermediis duplo longioribus, superioribus sparsis; floribus racemoso-pyramidatis, reflexis; cor. revol.* *Pursh Fl. Sept. Am.* 1. p. 250. *Elliott Sketch.* I. p. 389. *Torr. N. M. U. St.* 1. p. 349. *Redout. L. t.* 105. (excl. syn. *Mich.* et excl. β). *Gawl. Bot. Mag.* 956. (excl. syn. *Mich.*) *Thornton illustr.* n. 2. *Trew Ehret.* 2. t. 11. *Trew. Seligm.* 1. t. 26. *Catesb. Carol.* II. p. 56. t. 56. (fid. *Linn.* et *Lam.*)

In planta spontanea: bulbus magnus; caulis 3-7 ped., erectus, foliosus, inferne teres, superne quidquam angulosus, glaber. Folia infima 6-8-10 in verticillis 2-3, superiora sparsa, erectiuscula, omnia lanceolata acuminata, vix linearia, basi angustata, glabra, fusco-viridia, subtus pallidiora nervisque 3 prominentibus, margine quidquam revoluta, 3-4 poll., 5-6 lin. lata; suprema $2\frac{1}{2}$ poll., 7-8 lin. lata. Racemus pyramidalis, erectus, 5-multiflorus, (saepe 30-50-florus *Pursh*) laxus, foliosus. Pedunculi erecto-patentes, apice subcernui, teretes, glabri, $2\frac{1}{2}$ -4 poll., basi medioque plerumque foliolo vestiti. Flores graveolentes, cernui, miniatii, magni. Petala $2\frac{1}{2}$ -3 poll., 6-7 lin. lata, lanceolata, in acumen longum obtusum attenuata, basi quidquam angustata, exteriora angustiora, mox revoluta, utrinque glabra, dorso basin versus carinata, fundo flavo ad medium fere usque maculis numerosis subrotundis atris vel atropurpureis, supra medium immaculata, aurantiaca vel fulva. Filamenta superne patentia subulata, basi dilatata, $1\frac{1}{2}$ poll. Antherae lineares, serius curvatae, 6-8

lin.. Germe 8 lin.. Stylus longitudine fere staminum, stigmatē crasso clavato-trigono. Caps. oblonga, subclavata, matura erecta. *Gawler* bulbum dicit candidissimum. In argillosis uliginosis a Canada ad Virginiam. 4.

Obs. *Pursh* tantum *Trew.* *Ehret.* t. 11 ad *superbum* laudat, *Catesby* t. 56 vero ad *Michauxianum* ducit. *Gawler* utrumque in *Bot. Mag.* conjunxit, in *Bot. Reg.* vero bene distinguit.

β; foliis sparsis.

10. *L. speciosum* *Thunb.*; foliis sparsis, ovatis, petiolatis; caule ramoso: ramis unifloris; flore cernuo; corollis revolutis, intus papilloso-dentatis. *Willd. Spec. II. p. 86.* *Thunb. Act. Soc. Linn. II. p. 332.* *L. superbum* *Thunb. jap. 154.* *Kasbiaki* *Kaempf. Amoen. p. 871.* *Banks Ic. Kaempf. t. 47.*

Caulis teres, laevissimus, glaber, superne paniculatus, 2-ped. et ultra; rami alterni, divaricati, erecti, „(sic)“ cauli similes, apice reflexi, florentes. Folia caulina alterna, subpetiolata, basi complicata, ovato-oblonga, acuta, integerrima, glabra, subtus 5-nervia, patentia, poll. vel paulo ultra; ramea sub ramo singulo et in medio multo minora. Petiolus depressus, vix $\frac{1}{2}$ unguicularis. Cor. magnae, speciosae. Petala oblonga, acuta, alba, maculis magnis purpureis et minoribus nigris a medio ad basin adpersa, 2-poll.. Carina nectarea barbata. Filamenta alba, longitudine fere corollae. Antherae lineares, unguiculares. *Thunb.. In Japonia juxta Nangasaki, etc. 4.*

11. *L. tigrinum* *Gawl.*; foliis sparsis, sessilibus, 5-nervis: superioribus cordato-ovatis; corollis revolutis, intus papillosis. *Hort. Kew. ed. 2. II. p. 241.* *Bot. Mag. 1257.* *L. foliis sparsis, lanceolatis, axillis bulbiferis; caule villosa; cor. pendulis, revolutis, intus maculatis. Red. Lil. 595. et 475. Hern. h. semperv. t. 396. Savi Fl. it. c. ic. Gart. Mag. Forts. 1. t. 1. L. speciosum Andr. Repos. 586. Kentan v. Oni juri i. c. L. diaboli etc. Kaempf. Amoen. exot. V. 871. Mss. f. 138. L. pomponium Lour. Coch. ed. Willd. p. 257. L. sinense Hort.*

Species superba. Bulbi subrotundi, 3 poll. diam., squamis maximis, edules. Caulis 2-5-ped., violaceo-purpureus, floccis griseis, foliosus praeter basin, erectus v. subflexuosus. Folia quidquam conferta, anguste lanceolata, longe acuminata, lineata, gradatim breviora et latiora, glabra, subtus pallidiora, 5-6 poll., basi 2 poll. lata; bulbis 2-3 atropurpureis, axillaribus. Bractae sessiles, ovatae, obtusae, 2-3 poll., 2 poll. latae. Flos nunc unicus, nunc multi (14), in thyrsum paniculati subinde $1\frac{1}{2}$ -pedalem. Pedicelli erecto-patentes, e violaceo purpurei, 5-6 poll., floccosi. Cor. nutans, hexapetalo-partita, deorsum turbinato-coarctata, superne revoluta-patens, cinnabarina, intus maculis ovatis numerosis, atris purpureisve, basin versus carunculis flavescentibus, 2 lin., extus sordide miniata, striâ mediâ basi apiceque viridescente: lacinae 4-5 poll., 2 poll. latae, lanceolatae, longe acuminatae, obtusae: interiores fere duplo latiores; exteriores apice bullulâ carnosâ virente. Stamina albida rubrave, corollâ $\frac{1}{4}$ fere

breviora. Antherae fere pollicares, puniceae. Germen viride, prismaticum, $\frac{1}{2}$ poll., stylo triplo brevius. Stylus longitudine filamentorum, stigmatе trigono paulum incrassato, dilute purpureo. *Gawl. et Red. In China et Japonia. 2.*

Obs. Loureiro citat ad L. pomponium suum: Amman. Ruth. p. 106. n. 139 et L. pomponium Thunb. Fl. jap. p. 134, in quo folia subulata, linearia et lanceolata, corollae vero vix revolutae, et quod clo Thunberg, qui Santan v. Fime Juri Kaempf. Amön. p. 871 laudat, quod in Bot. Mag. 1417, nota ad 1165, ducitur ad concolor, varietas potius L. pomponii L., quam distincta species.

12. *L. pyrenaicum Gouan*; foliis sparsis, lineari-lanceolatis, (albo-marginatis); floribus reflexis (flavicantibus); corollis revolutis, intus punctis distinctis. *Gouan ill. p. 25. Lapeyr. Hist. Abr. p. 183. Lam. et Dec. Fl. fr. 3. p. 205. Gmel. Fl. bad. II. p. 32. Redout. Lil. 145. L. pomponium β . Lam. Enc. III. p. 536. H. Kew. ed. 2. II. p. 242. Bot. Mag. 798. L. chalcedonicum β . Linn. S. V. ed. Gmel. 1. p. 544. L. flavum Lam. Fl. fr. III. p. 283. L. montanum flavo flore. Clus. hist. app. p. 256. f. 1. 2. L. flavum angustifol. Bauh. pin. 79. Tournef. 371. Park. Parad. 32. f. 3. Rudb. Elys. 176. (excl. syn. Bry, monente Gouan).*

Flores e viridi flavicantes, atropunctati. Antherae cinnabarinae, odore gravi, spermatico, *Lapeyrouse*, qui hoc, non vero *pomponium*, occurrere in Pyrenaeis. Bulbus flavescens, squamis trilulcis. Caulis $1\frac{1}{2}$ - 2 ped., basi fere crassitie digiti minimi. Folia inferiora lanceolata, 2 poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata, superiora fere linearia, 2 poll., 1 - $2\frac{1}{2}$ lin. lata, approximata, patentia et erecto-patentia, subtus pallidiora, nervis plerumque 7 obsoletis, alternis evidentioribus, margine ciliis brevissimis, albis. Flores 1-3, raro ultra, $1\frac{1}{2}$ - 2 poll. diametro. Pedunculi $1\frac{1}{2}$ - 2 poll., longitudine foliorum floralium, obsolete rubro-maculati. Petala oblonga, utrinque attenuata, acutiuscula, medio 3-4 lin. lata, glabra, striata, intus atro-subinde quoque purpureo-maculata. Filamenta subulata, petalis $\frac{1}{3}$ breviora. Antherae 2 lin.. Pollen flavum. Ad specimina in Pyrenaeis lecta. *Per totum tractum Pyrenaeorum. 2.*

Obs. Clo Gmelin in Fl. Bad. II. p. 31. Lil. flav. angustifol. Bauh. pin. 304 a Mapp. Fl. alsat. p. 174 in Alsaciae montium jugis retro Hohehach dem Hochgebirge lectum ad L. pyrenaicum G. spectare videtur. Willdenow in Enum. H. berol. p. 362 male L. pomponium γ , (quod sphalmate chalcedonicum scripsit) Spec. II. p. 88 ad pyrenaicum duxit, neque cl. Link hoc sphalma animadvertibat in Enum. p. 312, cum iterum L. chalcedonicum γ Spec. II. p. 88 dicat pyrenaicum, addens: „flores purpureo-sanguineos punctatos.“

15. * *L. chalcedonicum*; (caule ad apicem fere usque folioso); foliis lineari-lanceolatis, sparsis, margine scabris; floribus reflexis; corollis revolutis, intus punctatis (pilisve glandulosis.) *Willd. Spec. II. p. 87. Linn. Spec. 453. Mill. Dict. 8. n. 7. Lam. Enc. III. p. 536. Scop. Carn. n. 405. Mert. et Koch Deut. Fl. II. p. 537. Roth En. pl. Germ. I. 2. p. 70. Jacq. Austr. V. t. 20. * Curt. Bot. Mag. 1. 30. Kerner t. 35. Trattinn. Oestr. Fl. t. 157. Kniph. C. III. n. 54. α . L. chalcedonicum A. caule unifloro. Red. Lil. 276. L. rubr. s. miniat. byzant. Clus. Hist. 1. p. 151.*

L. byzant. miniat. *Bauh. pin.* 78. *Tournef. inst.* 371. *Hemerocal. byzant. altera. Lob. ic. t.* 169. f. 2. β . L. *chalcedonicum* B. caule multifloro, floribus miniatis. *Red. Lil. fol.* 276. L. byzant. min. saturatiore flore polyanth. *Clus. hist.* 1. 152. L. byzant. miniat. polyanth. *Bauh. pin.* 78. *Tournef. l. c.* γ . L. *chalcedonicum* C. caule multifloro, floribus sanguineis. *Red. Lil. fol.* 276., et, se teste et prius monente *Gawler*: L. *pomponium* *Liliac. t.* 7. L. purpureo-sanguineum flore reflexo. *Bauh. l. c.* *Hemeroc. chalcedonica. Lobel. ic.* 169. f. 1. *Tournef.* 371. δ . foliis albo-marginatis, omnino scabris. L. *superbum* H. E. in *Herb. Schreb.*

„Racemus ante florescentiam vix incurvatus, ut in *pomponio* et *superbo*, et caulis usque ad apicem foliis vestitus confertis.“ *Linn.*

Bulbus magnus, subrotundus, flavus, squamosus. Caulis 1-3 ped., simplex, teres, glaber, basi saepius purpurascens. Folia inferiora verticillata, dein subspiralia, suprema sparsa, sessilia, oblonga, vix acuta, approximata, striata, dorso praecipue nervosa, pubescentia, pilis s. potius denticulis cartilagineis brevissimis albidis ciliata, 3-4 poll., 6 lin. lata. Flores 1-6, miniati vel sanguinei, 3-4 poll. diametr.. Pedunculi teretes, nudi vel folio solitario, cernui. Petala basi erecta, dein recurva, oblonga, obtusa, apice pilis paucis ciliata, basi hirsuta filis concoloribus globulo terminatis, medio longitudinaliter tuberculis parvis, oblongis: 3 interiora costâ longitudinali subtus prominente; omnia subinde intus atropunctata. Filamenta erecta, subulata, flavescencia. Antherae rubescentes polline miniato. Stylus erectus, clavatus, trisulcus, flavus, stigmatate crasso, trigono, trisulco; stamina aequante. Germen viride, profunde sexsuleum. In δ folia inferiora 2 poll., 4 lin. lata, superiora subtus punctis nitidis. Petala miniata, impunctata, $1\frac{1}{2}$ poll., 4 lin. lata. L. *carniolicum Bernh.* nobis ignotum (nisi forte illud *Scopoli* „petalis 2 poll. miniatis, revolutis; filamentis semicylindricis, poll.; polline miniato; stylo $\frac{1}{2}$ poll.; odore aurantiaco“ (quod forte B *Réd.*)), vix differre dicunt *Mert.* et *Koch l. c.*; aliis vero nervis 3 subtus pubescentibus differre videtur. Varietates ultra 20 passim in hortis coluntur. In Oriente; in Carniolia et Pannonia. 4.

14. *L. *pomponium*; (caule apice nudo); foliis sparsis, lineari-subulatis; floribus reflexis; corollis revolutis, intus papilloso- (lamelloso-) dentatis. *Willd. Spec. II. p.* 87. (excl. syn. *Amm. ruth.*) *Linn. Spec. p.* 434. (quo teste: *Gmel. sib. I. p.* 42. n. 9.) *Mill. dict. n. 5. ic. t.* 65. f. 2. *Lam. Enc. III. p.* 536. *Lam. et Dec. Fl. fr. III. p.* 202. *Lapeyr. Abr. pl. pyr. p.* 185. *Kniph. C. II. n.* 40. (mala.) *Knorr Del. 1. T. 4.* L. *pomponium* α flore rubro. *H. Few. ed. 2. II. p.* 242. *Ker Bot. Mag. 971.* L. *rubrum* *Lam. Fl. fr. III. p.* 283. L. *rubrum praecox. Clus. hist. 1. p.* 155. *Hort. eyst. aest. O. 3.* *Rudb. Elys. f. 1.* 157. β . L. *miniatum* odorum angustifolium. *Rudb. l. c. f. 3.* (fide *Linn.*; a *Ker* cum α conjungitur, addito *Weinm. phyt. t.* 660. ab

aliis ad *tigrinum* male ductum). γ . brevi et gramineo folio. *Bauh. pin.* 79.; ergo: *L. angustifolium*; fol. angustissimis sparsis; pedunculis longissimis. *Mill. Dict. ed. 8. n. 6.* δ . flore albo. ϵ . flore pleno.

„Folia linearia, acuta, triquetra, canaliculata, sparsa: nectarium rima valde dentata.“ *Linn.* Caulis $1\frac{1}{2}$ ped., simplex, foliosus, apice tantum nudus. Folia sessilia, acuta, sulcata, margine subvillosa (omnino glabra *Gawl.*), sensim apicem versus decrescentia. Flores terminales (3 poll. diametr. *Gawl.*), pedunculati, penduli, plerumque 2-5, rubri miniativae. In γ . (quod *Miller* *chalconicum* inter et *pomponium* posuit, et *pomponio* tardius florere monuit) caules altiores; folia breviora, magis conferta. Flores 15-30, lacte rubri, fere coccinei, cernui, pedunculi longissimi; petala reflexa. Varietates *L. pomponii* ultra 30 in hortis coluntur. In *Siberia* et in *Pyrenaeis*. *Linn.* Vix in *Pyrenaeis*. *Lapeyr.* In *Oriente*. *Lam.* 4.

Obs. Plantam sibiricam differre foliis angustissimis, floribus 13-14, *Gawler* *l. c.* monuit, qui „an species distincta?“ addit. Certe synonyma *Clusii* et *Gmelin sibir.* a *Linnaeo* laudata haud bene conveniunt; non occurrere in *Pyrenaeis* *L. pomponium* affirmat *Lapeyrouse*; non quadrare descriptionem plantae sibiricae a *Gmelin* datam cum *pomponio* nostro culto patebit legenti. „Coloris elegantia cinnabari vix inferior, nec aurantius. Stylus hexagonus, viridis. Antherae corollam aliquantum dilutiores, filamenta punicea. Caulis centro bulbi clavi instar infixus, facile solvendus, teres, glaber, albide viridis, dodrantalis et sesqui-bicubitalis. Folia alterna, 2 unc., lineam lata, acuta, glabra, intense viridia. Flores amoene odorati 8-10, subinde 1 et tunc folia magis carnosae. Radix oblonga, candida, non squamosa, sed tunicata, sive e plurimis tunicis invicem superinductis, basi fibris candidis, quae etiam e basi caulis. Radicis conformatio omne punctum fert, quo a *chalconico* distinguatur.“ An forte ad sequentia?

15. *L. tenuifolium* *H. Gorenk.*; foliis sparsis, angustissime linearibus; caule unifloro, superne nudo; corollam cernuam; petalis subrevolutis, intus rimam nectariferam pubescente. *Schrader. Plant. rar. H. Gott. Fasc. 1. Reichenb. Mag. t. 79.?* *Schrank pl. rar. H. monac. t. 91.?*

Planta tenera, caule spithamaeo, supra medium foliato. Folia approximata, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., vix lineam lata, apicem versus attenuata, obtusiuscula. Flos inodorus. Cor. pollicem vix superans, colore *L. chalconici*; petalis lanceolato-ovalibus, basi in unguem brevissimum, extus carinatum desinentibus. *L. pumilum* *Red.* simile differt: caule altiori, ad apicem usque foliato; foliis paucioribus (11-12 nec 27-30), distantibus, duplo longioribus, paulo latioribus, in apicem fere subulatum attenuatis; corollam majori, magis revolutam, intus glabram. *Lil. linifolium* *Horn.* ad *pumilum* pertinere videtur. *Schrader.* In *Davuria*, monente *Fischer*, qui semina cum *H. Gott.* communicavit 4.

Obs. Clo *Reichenbach* *L. tenuifolium* et *linifolium* eadem species; clo *Jan in litt.* *L. tenuifolium* varietas *pomponii*. *Amic. Besser Ann. ruth. n. 138* a *Willdenow* perperam ad *pomponium* tractum, a *Gawler* ad *pumilum* laudatum, huc spectare monuit: sic etiam nobis videtur. In specimine spontaneo, verisimiliter sibirico, in herb. *Schreber.* nomine *L. pomponii* asservato, quod nobis certe huius esse loci videtur: caulis 10 poll., crassitie pennae anatinae, glaber, inferne ob folia emarcida nudus, apice ad $\frac{1}{3}$ nudus. Folia sparsa, erecta, angustissime linearia, acutiuscula, marginibus sub lente cartilagineo-serrulatis revolutis, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., vix ultra $\frac{1}{2}$ lin. lata; utrinque e foliorum axillis fimbriae breves, albae, reversae; folia ad basin pedunculi 3 subverticillata, ceterum caulinis similia. Pedunculus solitarius, glaber, crassitie pennae corvi, 2-poll., inferne erectiusculus, apice cernuus. Petala mihiata, lanceolata, utrinque angustata, apice obtuso quidquam calloso, sub lente puberulo, basi patentia supra medium revoluta, 15 circiter lin., medio 3 lin. lata, intus elevato-striata, sed absque maculis lamellisque; rimam nectariferam 4-5

lin. utroque margine pube albidâ. Stamina corollâ breviora; filamenta subulata, basi quidquam dilatata, erectiuscula, 8 lin.; antherae lineares, obtusae, 8 $\frac{1}{2}$ lin., polline aureo. Pistillum longitudine staminum; stylus 5 lin., crassus; stigma crassum, ut videtur, fere trilobum. Germen 4 $\frac{1}{2}$ lin..

16. *L. pumilum* Red.; (caule apice nudo, 1-4-floro); foliis linearibus-subulatis, sparsis, glabris; floribus reflexis; corollis revolutis, intus glabris. Redout. Lil. t. 378. B. Reg. 152. Loddig. Bot. Cab. 358. *L. linifolium*; fol. linearibus; flor. nutantibus; cor. reflex. intus nudis. Hornem. h. hafn. p. 526. *L. uniflorum* H. Angl. *L. reflexum* etc. Am. Rûth. 105. n. 158. (nec planta ad hoc synonymon ducta a Gmel. Sib. p. 42. fid. Gawl., rectius forte ad *tenuifolium*).

Bulbus albus, compacto-squamosus, ovato-pyramidalis, nuce avelanâ quidquam major. Folia radicalia florente plantâ emarcida, numerosa, caulina patentissima, carnosula, acuminata, 2-3 poll., vix lineam lata, obsolete canaliculato-carinata, pustulis minutis, oblongis, lucidis, creberrimis, margine laevia, (sub lente tenuissime denticulata, superiora basi fasciculo foliorum tenuissimorum. Red.). Caulis 6-7 poll., crassitie pennae corvinae, erectus, apice nudus, (undique foliosus Red.) teres. Flores aurantiaco-coccinei, fortiter grateque odori, 1-4, subumbellati, pedunculis 2 poll., corollâ longioribus, erectis, apice inflexis, foliis totidem ad basin umbellae instar involucri. Cor. cernua: lacinae ad basin usque revolutae, immaculatae, intus striatae, lanceolatae, basin versus sulco generis, apice lanuginosae, (15 $\frac{1}{2}$ lin., omnes obtusiusculae Red.). Stam. corollae aequalia, pallide rubra, subinde 4; pollen aurantiacum. Germ. viride, columnare, tereti-trigonum vel hexagonum, 3-3 $\frac{1}{2}$ lin., longitudine styli rubro-fusci; stigmate capitato, trilobo. B. Reg. E Moscovia, nec e Peruvia Ker; e Davuria nobis. 4.

17. *L. concolor* Salisb.; foliis sparsis, lanceolato-oblongis; corollis erectis, revolutis-campanulatis, intus papillois, extus glabris. Hort. Kew. ed. 2. II. p. 241. Salisb. Parad. t. 47. Ker Bot. Mag. 1165. Kern. H. semp. t. 382. Haempff. Amoen. exot. 871. β . uniflorum. Link Enum.

Bulbus ovatus, magnitudine ovi columbini, squamosus. Caulis teres, villosus, simplex, 1-3-ped. Folia numerosa, remote sessilia, patentia, nervosa, acuminata, villosa-ciliata, 5 poll., poll. fere lata, suprema floralia verticillatim 3-4 approximata. Racemus pauciflorus, (1-5-florus), erectus, foliaceus, terminalis. Pedicelli 2-3 poll., inferiores axillares, superiores 3 fureatim binati. Cor. saturate aurantiaca: lacinae oblongo-lanceolatae, concaviusculae, basi latius unguiculatae, revolutis-deflexae fere ultra dimidium, apice glanduloso-incrassatae et subpubescentes, extus carinâ filiformi: interiores parum latiores, carunculis rarioribus, obsolete verruculatae punctisque parvis, nigricantibus, 2 poll. longae, 9 lin. latae. Filamenta rubra, subulato-filiformia, erecto-divergentia, corollâ fere duplo breviora. Pollen miniatum. Germen cylindrico-clavatum, obsolete sulcato-hexagonum, viride, stylo subclavato longius. Stigma tumidiusculum, tricolle. Differt a *L. pensylvanico* (quocum jungebatur a Ker in Bot. Mag. in nota 1082) caule robustiore tereti laevi, nec striato; pedicellis corollaeque extus non lanato-tomentosis; unguibus corollae arctius con-

niventibus; laciniis magis revolutis; staminibus brevioribus; germine stylo parum, nec duplo longiore. *Ker.* Flos unicus, minor. *Link.* *In China.* 4.

c. *Lilia spuria*; floribus campanulatis; petalis unguiculato-petiolatis.

18. *L. umbellatum Pursh*; foliis sparsis, linearibus, brevibus: supremis verticillatis, pedunculis brevioribus; floribus 3-5 umbellatis, erectis; petalis recurvo-patentibus, subaequalibus, ovato-oblongis, subunguiculatis. *Pursh Fl. sept. Amer.* 1. p. 229. (excl. syn. *L. concoloris*.) *L. andinum*; foliis sparsis, sublinearibus-oblongis, acutis: floralibus verticillatis; floribus 1-5 terminalibus, erectis; pedunculis glabris; corollis campanulatis; petalis lanceolatis, unguiculatis: alternis angustioribus, maculatis. *Nutt. gen.* p. 221. *Fraser Cat.* 1815. *L. philadelphicum* β. *andinum Bot. Reg.* 594.

Clo Pursh l. c. idem videbatur cum *concolore*, ob flores coccineos, immaculatos. At *Nuttall l. c. andinum* suum, (quod omnino idem asserit esse cum *umbellato Pursh*) minime affine esse *concolori*, sed potius *philadelphico* (quocum utrumque junxit *Sprengel S. V. II. p. 61*), ejus formae et magnitudinis flos *andini* coccineus, maculis fuscis ad ungues longos et angustos: lacinae interiores margine involutae. Germen et stigma atro-fuscum, staminibus longius. Flores plerumque 5. *In humidis ad ripas fluviorum a Fort Mandan ad montes usque. Nutt.* 4.

19. **L. philadelphicum*; foliis verticillatis; floribus erectis; corollâ campanulatâ; petalis unguiculatis. *Linn. Spec.* 435. *Willd. Spec.* II. p. 90. *Mill. Dict.* n. 15. *ic. t.* 165. f. 1. *H. Kew. ed. 2. II. p. 245.* *L. fol. vertic., lanceolato-linearibus; caule subbifloro; corollâ erectâ, campanulatâ, patente; petalis lanceolatis, unguiculatis. Pursh Fl. sept. Am.* 1. p. 229. *Nutt. gen.* p. 222. *Bigel. Fl. bost.* p. 82. *Elliot. Sketch.* 1. p. 387. *Torrey Fl. N. M. U. St.* p. 548. *Bot. Mag.* 519. *Redout. Lil.* 104. β. fol. angustioribus longioribusque.

„Simillimum est *L. camtschatcensi*; sed ejus petala ovata, sessilia; hujus unguibus oblongis, distinctis; separandum itaque secundum vivi auctorem Millerum.“ *Linn.* Caulis plerumque 1-florus, subinde etiam 3-florus et ultra. *Pursh.* Caulis 2-ped., nitens. Folia 6, acutiusecula, trinervia. Flores magni, obscure aurantiaci. Unguis petalorum longus. Petala subtus fulvo-maculata. Stamina corollâ breviora: filamenta tenuia, glabra. Stylus longitudine staminum; stigmatibus crasso. Caps. oblonga, obtuse trigona, angulis sulcatis. Semina ovata, plana. *Torr.* In cultu: bulbus parvus, subovatus, albidus, squamosus. Caulis 2-3 ped., teres, glaber, pallide vel rubescente-viridis cum rore parco glauco. Folia reflexa, 4-5, unum vel alterum saepius sparsum, ovato-lanceolata et lanceolata, glabra, obsolete trinervia, internodiis breviora, 18 lin-. Petala miniato-flava, extus pallidiora; unguibus longis angustis lutescentibus roseisque, medio et basi punctis

subrotundis fusco-purpureis; laminis lanceolatis, minime reflexis. Filamenta rubra, subulata. Antherae nigricantes polline aurantiaco. Germen sub-6-gonum, virescens. Stylus flavescens, triangularis. *Redout. et Sims.* In β spontaneo: caulis $1\frac{1}{2}$ -2 ped., crassitie pennae anatinae. Folia inferiora 5-7, superiora plerumque 5, erecto-patentia vel patentia, nec reflexa, internodiorum longitudine, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll., 2-4 lin. lata, lanceolata et lineari-lanceolata, acuta, evidentius 3-nervia, subtus pallidiora, margine sub lente calloso-ciliata. Flores terminales solitarii, erecti, $2\frac{1}{2}$ poll.; petala exteriora laminà oblongo-lanceolata acutâ, 5-6 lin. latâ, interiora laminà ovatâ obtusâ, poll. latâ; omnia utrinque glabra, striata, basi maculis subrotundis atropurpureis; unguis 10 lin., lin. lat. Stam. corollâ breviora; filamenta gracilia; antherae 5 lin.. Stylus stamina quidquam superans, superne incrassatus. Stigma clavato-capitatum, trigonum. Germen 5 lin.. An hujus varietatis potius *Pursh?* *In sylvis pratisque a Canada 69° (Richardson App. to Frankl. Journ. p. 10) ad Virginiam. 4.*

20. *L. Catesbaei Walt.*; foliis sparsis, lineari-lanceolatis (lineari-subulatisque); caule unifloro; corollâ erectâ: petalis longe unguiculatis, margine undulatis, apice reflexis. *Willd. Spec. II. p. 86. Walt. Carol. 123. Mich. Fl. bor. Am. 1. p. 197. Pursh Fl. sept. Am. 1. p. 228. Elliott Sk. 1. p. 387. Torr. Fl. N. M. U. St. 1. p. 349. Lew. Beck in Sill. Am. Jour. XI. p. 177. Curt. Bot. Mag. 259. Kerner H. semp. t. 87. Bot. Cab. 807. L. carolinianum Lam. Enc. III. p. 535. Bosc Act. Soc. h. n. Ms. I. spectabile Salisb. ic. rar. 5. t. 5. L. carolinianum Catesb. II. p. et t. 58.*

Caulis 1-2-ped., simplex, teres, glaber, substriatus, foliosus. Folia 2 fere poll., (superiora anguste lineari-lanceolata) fere lineari-subulata, sessilia. Flos magnitudine *L. bulbiferi*. Petala dorso virentia, intus coccinea, maculis flavis atropurpureisque, ovato-lanceolata, undulata, (8-10 lin. lata) acuminata (potius acuta). Stam. longitudine pistilli. (Stigma clavato-trigonum). *Lam. et Torr. et spec. spont. A Virginia ad Carolinam in arenosis humidis depressis. 4.*

d. *Lilia vera*; floribus campanulatis; petalis sessilibus.

a; corollis rubris, aurantiacis, luteis.

21. *L. spectabile Fischer*; foliis subternis sparsisve, linearibus, subtrinerviis; superioribus margine subtomentosis; pedunculis tomentosissimis; corollis erectis, intus scabris. *Link Enum. 1. p. 521. Reichenb. Hort. bot. Cent. I. p. 21. t. 50. L. bulbiferum β umbellatum Hort. Kew. ed. 2. II. p. 241. Bot. Mag. 1018.*

Caules erecti, crassitie digiti, 4-5-ped., angulati, foliosi, superne sublanati. Folia lineari-lanceolata, suprema involucri formantia, lanceolato-attenuata, hinc inde sublanata, (4-poll., 4 lin. lata). Flores in umbella multiflora, saepe composita, subpyramidata. Pedunculi teretes, adscendentes, flore breviores. Petala aequalia, late elliptico-rhombea, basi vix distantia, intus sulcata:

cristis inter sulcos elevatis, lacinulatis, late saturateque croceo-aurantia, puniceo-punctata. Filamenta aurantia, apicem versus punicantia; antherae badae, polline flavo. Germen 6-sulcatum, stylo aurantiaco brevius. Stigma demum fuscescens. *L. bulbifero* proximum, sed omnibus partibus robustius, satius coloratum et pedunculis lanatis atque petalis latioribus diversum. Minime ad *L. davuricum* Ker, uti in *Sprengel S. V. Reichenb. Fischer*, qui an *croceum*? quaerit, non bulbiferum esse monuit div. Römer. At in *Bot. Mag.* l. c. depingitur cum bulbillis axillaribus et in textu cultum umbellâ 60-florâ, spontaneum 3-4 florâ, dicitur. In *Davuria.* 4.

22. **L. bulbiferum*; foliis sparsis, lineari-lanceolatis; corollis erectis, campanulatis, intus papillois, extus pubescentibus; (capsulâ oblongâ, angulis obtusissimis). *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 241. *Linn. Spec.* 435. *Willd. Spec.* 85. (excl. syn. *Thunb.*) *Mill. Dict.* n. 3. *Lam. Enc.* III. p. 555. *ill. t.* 246. f. 2. *Roth germ.* II. 396. *En. pl. Germ.* I. 2. p. 68. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 202. *Savi Fl. pis.* 1. p. 348. *Bertolon. Amoen. ital.* p. 353. *Tenor. Fl. neap.* 1. p. 151. *Seb. et Maur. Fl. rom. prodr.* p. 127. *Mert. et Koch Deutsch. Fl.* II. p. 555. *Jacq. Austr. t.* 226. *Curt. Mag.* 36. (quod *L. bulbiferum* α *H. Kew.*) *Hayne term. bot. t.* 3. f. 11. *Redout. Lil. t.* 219. *Knorr Del. 1. t.* I. 4. *Svensk Bot.* 598. *L. scabrum* *Mönch meth.* p. 305. *Hall. helv.* 1255. *Besler H. Eyst. vern.* V. fol. 6. f. 1. 2. fol. 7. f. 1. 2. fol. 8. f. 1. *Weinm. Phyt. t.* 655. b. c. et 656. *Park. parad. t.* 27. f. 2. 3. β . *L. purpureo-croceum* fl. pleno. *Linn. Spec. l. c.* γ . *L. purpureo-croceum* minus. *Bauh. pin.* 77. δ . *L. phoeniceum.* *Bauh. l. c.* ϵ . *L. bulbiferum latifolium majus.* *Bauh. pin.* 77. *L. latifolium* *Link Enum.* 1. p. 321. *L. purpureo-croceum majus.* *Bosc. L. bulbiferum* β . *bulbis axillaribus sessilibus.* *Lam. l. c.* *L. bulbiferum* *B. Réd. fol.* 210. *Moris. hist.* 2. p. 411. S. 4. t. 21. f. 19. ζ . *L. bulbif. angustifol.* *Bauh. pin.* 77. η . *L. bulbiferum* *C. Rédout. fol.* 210. *L. humile* *Mill. Dict.* 8. n. 4. *L. bulbiferum minus.* *Bauh. 77.* θ . *L. bulbiferum incanum.* *Bauh. pin.* 77. ι . *Fol. variegatis.*

Bulbus albidus, ovatus, squamis laxè imbricatis. Caulis 1-1½ ped., tereti-angulatus, fere glaber. Folia numerosa, approximata, patentia, acuta, saepius, non semper, bulbillo atro vel intense viridi globoso nitido in axillis. Corollae solitariae vel numerosae, aurantiacae, erectae, intus carunculis cristatis; laciniis lanceolato-ovatis, basi angustatis, patentibus, recurvis nec revolutis, exterioribus ad dorsi basin parce lanato-pubescentibus. β et γ aliaeque varietates in hortis; in ϵ folia ultra 6 lin. lata. Ultra 30 varietates coluntur in Hollandia. In *Europa media et meridionali, in America boreali.* 4.

Obs. *Gmelin Sib.* I. p. 41 notavit *L. bulbiferum* et hujus varietatem γ , (quae illi *Linarum* *B. II.*) at in neutro describit bulbillos axillares. In γ vero, (suo II.) duas iterum distinguit subvarietates: alteram, α solitum *Bauhini* *L. purpureo-croceum minus, flore miniato*; alteram β flore luteo quam

Steller infra Jacutiam ad Lenam et Aldanum fluvios legit, et quae foliis subtus albescentibus, ergo distincta sano et huc dum neglecta species. An forte *monadelphum* hocce suum β ? et a *Ker* ad *dauricum* ducitur.

25. *L. croceum* *Chaix*; foliis sparsis, 5-nervibus; pedunculis simplicibus; bulbis nullis; petalis interne maculis nigris variegatis; (capsulâ pyriformi, angulis alatis). *Chaix* in *Vill. Delph.* 1. p. 322. *L. bulbiferum* β *Pers. Syn.* 1. p. 558. *Vill.* II. p. 275. *L. bulbiferum* β caule non bulbifero, *Sebast. et Maur. Fl. rom. prodr.* p. 127., et hoc teste: *L. purpureo-croceum majus Hort. Rom.* 6. t. 82. *L. purpureum majus et minus Dod. Pempt.* 188. *L. bulbiferum* A *Redout. Lil. f.* 210. (excl. plur. synonym.)

Species a *L. bulbifero* omnino distincta; a quo praesertim differt: capsulâ pyriformi apice retusâ, nec oblongâ apice emarginatâ, angulis 6 alatis, nec rotundatis obtusissimis. *Besser* in *Suppl.* II. ad *Catal. Hort. Cremen.* p. 10. Specimina nostra ex horto praeter capsulam a *L. bulbifero* recedunt: caule semper humiliore, nunquam bulbifero, plerumque 1-2-floro; petalis minoribus, pallidioribus, multo magis patentibus, angustioribus, basi multo magis angustatis. *In Italia?* 4.

24. *L. pubescens* *Bernh.*; foliis linearibus, sparsis; corollis campanulatis, erectis, intus scabris; pedunculis unguibusque petalorum externe pubescentibus. *Hornem. H. Hafn.* 2. p. 962.

Differt a *L. bulbifero* praesertim pedunculis pubescentibus. *Hab.?* 4.

Obs. Hujus loci esse videtur *L. croceum* *Bernh.*; fol. subternis sparsisve, linearibus, falcatis, trinerviis, subciliatis; pedunculis pubescentibus; corollis erectis, intus scabris. *Link* in *Enum.* 1. p. 321. Folia a poll., 4 lin. lata. Ad varietates *L. bulbiferi* passim refertur. An hujus γ ?

25. *L. davuricum* *Ker*; foliis sparsis, lineari-lanceolatis: supremis 4-5 verticillatis floremque subaequantibus; caule subunifloro, subalato-pentagono; pedunculo lanato; corollâ erectâ, turbinato-patente, extus floccoso-lanatâ: laciniis inferioribus ovali-lanceolatis. *Ker. Bot. Mag.* 1210. in not. *Bot. Reg.* 594. in not. *L. pensylvanicum* *B. Mag.* 872. *Parsh Fl. am. sept.* 1. p. 229. *Nutt. gen.* 1. p. 221. *L. bulbiferum* γ . *pensylvanicum* *H. Kew. ed.* 2. II. p. 241. *L. bulbiferum* e *Davuria* *Pall. in H. Lamb.* *L. bulbiferum* β *Dryand.* L. II. fol. angustior. α . fl. miniato. *Gmel. sib.* 1. 41. (fid. *Ker*). *L. angustifol.* fl. rubr. singulari. *Catesb.* 3. p. 8. t. 8. (planta monente *Gawler* in *Hort. suburb. Lond.* culta et perperam pro *americana* depicta).

L. bulbifero valde affine; sed semper „(?)“ unislorum et totum minus, tenerius, laxius. Bulbus sabâ duplo major. Caulis 1-2-ped., 1-3-florus. Folia erecto-patentia, 5-nervia, margine basique lanata, 3-3½ poll. Cor. 3-4-poll. diametro; lacinae coccineae, basin versus flavescens et purpurâ guttatae. Filamenta et antherae purpureae. Stylus? *Ker.* *In Davuria.* 4.

Obs. *Dr. Pursh* se hanc speciem in montibus Pennsylvaniae et Virginiae vivam invenisse. At clo *Nuttall* hybrida videtur in hortis culta. Hinc de patria americana dubitandum. *Sprengel S. V.* II. p. 61. *L. pensylvanicum*

Her ad *bulbiferum* tanquam synonymon; *pensylvanicum Pursh* vero, eandem plantam, instar synonymi ad *davuricum* trahit!

26. *L. Thunbergianum*; foliis sparsis, lanceolatis; corollis campanulatis, erectis; caule villosa. *L. bulbiferum Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. II. p. 555.* *L. philadelphicum Thunb. Jap. 135.* (excl. syn.) *L. bulbiferum D.* caule non bulbifero?, fol. basi latioribus, superioribus verticillatis, inferioribus sparsis. *Redout. Lil. fol. 210.*

Div. *Willdenow* ipse, licet utrumque citasset ad *bulbiferum*, addit ad finem: „planta japonica videtur a nostra diversa.“ *Clis. Gawler Bot. Mag.* eandem 1165 trahit ad *concolor*; sed cum ?? Descriptio data a *Thunberg* sequens: „Caulis simplex, erectus, pedalis. Folia inferiora sparsa, superiora terna et subquaterna, sessilia, basi lata, integra, glabra, nervosa, erecto-subimbricata, 1½-poll.. Corolla terminalis, petalis lanceolatis, erectis. Differt a *L. philadelphico* foliis basi latioribus et corollis non revolutis.“ *Thunb. l. c. In Japonia. 2.*

Obs. An huc *L. camtschaticense Lour. Fl. Coch. p. 257*, ubi *Amman. Ruth. p. 105. n. 138.* laudatur? Descriptio sequens: Bulbus subrotundus, squamosus, parvus. Caulis ped., simplicissimus, teres. Folia sparsa verticillataque, lanceolato-lineararia, erecta, glabra. Flos terminalis, paucus, erectus, 1½ poll., coccineus. Cor. campanulata, suberecta, nec revoluta, basi attenuata. Filamenta corollae breviora. Stigma trigonum. Caps. trigono-oblonga. *In China, rarius in Cochinchina.*

27. *L. monadelphum M. a Bieb.*; foliis sparsis, lanceolatis, subtus pubescentibus, nervosis; corollis campanulatis, cernuis; staminibus basi connatis. *M. a Bieb. Fl. taur. cauc. 1. p. 267. Suppl. p. 262. Ejusd. Cent. pl. rar. Russ. t. 4.* *Steven in Mem. Mosc. III. p. 261.* *L. orientale latifolium* flore luteo maximo odoratissimo. *Tournef. Cor. 25?*
β caule unifloro. *Steven?*

Bulbus jugtande duplo major, squamis carnosis, albidis, imbricatis. Statura *L. albi*. Folia conferta, erecta, sensim minora. Flores 2-6; magnitudine et forma fere *L. albi*, lutei. Filamenta interdum in tubum germinis longitudine, alias in anulum angustum connata. Simile caule unifloro, foliis remotioribus patentioribus, summis verticillatis ex *Iberia* retulit am. *Steven*, varietatem *L. monadelphi* asserens, quod equidem suae speciei esse suspicor. *M. a Bieb.* In speciminibus cultis e seminibus tauricis a clo *Bes-ser* communicatis: caules 2-4 ped., inferne crassitie digiti minoris, teretes, glabri, pallide virides. Folia erecta et erecto-patentia, semper sparsa, sessilia, numerosa, approximata, summo apice remotiuscula, pallide viridia, nervosa, subtus ad nervos margineque pilis densis brevibus albidis; inferiora oblongo-lanceolata, acutiuscula, 2½-3½ poll., 8-9 lin. lata; superiora linearilanceolata, acuta, 2-2½ poll., 3-4 lin. lata. Racemus erectus, 2-4-florus, subinde secundus. Pedunculi subalterni, virides, teretes, glabri, erecto-patentes, apice cernui, 1-1½ poll.; basi foliis 2-3, altero 1-1½ poll., 4-5 lin. lato, altero paulo brevior vix ultra lin. lato. Corollae campanulatae, basi tubulosae, apice patentes, nullo modo vero revolutae, 2-2½ poll., 1½-3 poll. in diametro; petala omnino lutea nec intus punctata, basi in tubum 8-10 lin. longum approximata, lanceolata et oblongo-lanceolata, basi attenuata, acumine obtusiusculo puberulo, ceterum glabra, tenuiter nervosa, exteriora inferne obsolete carinata, me-

dio 6-7 lin. lata; interiora obtusiora sed vix angustiora. Filamenta corollâ $\frac{1}{3}$ breviora, pallide flavescentia, glabra, apice subulata, inferne plana, dilatata et in tubum germine paulo longiorem connata. Antherae luteae, quidquam flexae, 4-5 lin., non punctatae. Stylus longitudine staminum, vel paulo longior, germen duplo superans, crassus, saepe incompletus vel profunde bipartitus, etiam clavatus et apice deflexus; stigmatе crasso capitato-clavato. Germen 7 lin., obtuse trigonum. *In Caucaso, ad Montem Beschtau, Kasbeck etc.* 2.

Obs. LILIVM monadelphum Gawl. Bot. Mag. 1405 nobis ob corollas revolutas intus punctatas, petala interiora duplo latiora, omnino alia species esse videtur, quamvis ips. M. a Bieberst. in Suppl. Flor. taur. cauc. iconem in Bot. Mag. laudet. Describitur apud Gawler l. c.: „caulis 2-3 ped.; folia omnia caulina, numerosa, confertius sparsa, patentia, hinc inde subverticillata, ovato-lanceolata, obtusiuscula, subtus, praesertim in margine et venis, breviter puberula, superne gradatim decrescentia. Racemus erectus, pauciflorus, distans; pedicelli flore 2-3plo breviores foliolo bracteati. Cor. cernua, cyathiformi-revoluta, flava, intus maculis parvis oblongis fuscis; laciniis citra medium convergentibus, inde brevius revolutis-patentibus, intus nudis glabris, explicatis superne versus subcanaliculatis; interioribus duplo fere latioribus. Filamenta germinis longitudine connata, corollâ $\frac{1}{4}$ breviora; antherae luteae polline pallide flavo. Germen stylo triplo fere brevius, rotundato-trigonum, 6-striatum. Stylus triqueter clavatus stigmatеque elliptico-ovato, stamina aequante, viridis. Odor fortis, ingratus. Differt a L. pomponio foliis basi non angustatis, obtusioribus, brevioribus, latioribus; pedicellis flore duplo brevioribus; limbo corollae non ultra medium reflexo, laciniis intus non verrucosis; filamentis monadelphis; polline pallide flavo; germine stylo triplo breviorе; stigmatе magis elongato.“ Planta nostra minimam cum L. pomponio habet afinitatem, sed potius L. candidum refert. Si species distincta (a monadelpho M. a Bieb. saltem distincta), L. Loddigesianum dicenda foret, quia Loddiges e seminibus e Russia allatis primum educavit eandem.

β; corollis albis.

28. *L. candidum; caule ad apicem usque sensim attenuato; foliis sparsis, decrescentibus: infimis cuneato-lanceolatis, superioribus lineari-lanceolatis, supremis ovato-lanceolatis; corollis campanulatis, intus glabris; stylo sub stigmatе trisulcato. Hayne getr. Darst. 8. t. 26. Mill. Dict. n. 1. L. fol. sparsis; corollis campanulatis, intus glabris. Linn. Spec. p. 433. Willd. Sp. Pl. II. p. 84. (uterque excl. β.) Lam. Enc. III. p. 554. ill. t. 246. f. 1. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 202. Desf. Fl. atl. 1. p. 292. Hall. Helv. 1231. Ludw. Ectyp. t. 190. Kniph. C. VII. n. 4. Knorr. del. I. t. L. Blackw. t. 11. Curt. Bot. Mag. 278. Redout. Lil. t. 199. Trattin. Tabul. 458. Oestr. Fl. t. 1. Swert. t. 45. Parkins. Parad. p. 59. t. 37. f. 4. Tournef. Inst. 369. t. 195. et 196. Moris. s. 4. t. 21. f. 13. β floribus extus purpurâ striatis. γ flore pleno. δ. fol. variegatis. ε? caule plano compresso. Gron. orient. 106. L. albi pulchri et ignoti species. Bauh. pin. 76. ζ caule fasciato multifloro. Lil. candidum B Redout. Lil. liliorum sive 122. lilia ex eodem bulbo enata. Bry Fl. nov. ic. (monstrositas). Caulis $1\frac{1}{2}$ -3 ped., simplex, teres, viridis. Folia inferiora approximata, superiora remota, sensim minora; infima acuta, superiora et suprema acuminata. Flores primum erecti, dein cernui. Corolla basi quidquam coarctata; petala lanceolata, obtusa. Filamenta filiformi-subulata, erecta, corollâ breviora. Antherae primum

primum lineares, dein oblongo-lineares. Stylus trigonus, erectus, apicem versus quidquam sursum incurvus, sub stigmate trisulcus. Stigma decurrenti-trilobum, crassius quam longum, plerumque depressum. *Hayne*. Variat floribus purpureis, kermesinis, flavis, variegatis, plenis etc.; foliis variegatis. *L. candidi* monstrositatem vide in *Bot. Zeit.* 1827. p. 700. In Oriente, ad columnas Herculis, prope Cadix, in Sardinia, in Helvetia, an sponte? 4.

29. *L. peregrinum* *Mill.*; caule ad medium usque attenuato, superne subaequali, tereti; foliis sparsis decrescentibus: infimis cuneato-lanceolatis, superioribus linearibus, supremis lanceolatis; corollis campanulatis, intus glabris; stylo sub stigmate trigono. *Hayne getr. Darst.* 8. t. 27. *L. fol. spars.*; cor. campanulatis, cernuis, petalis basi angustioribus. *Mill. Dict.* n. 2. *Redout. Lil.* fol. 199. p. 2. *L. candidum* β *Linn. Spec.* p. 435. *Willd. Sp. Pl.* II. p. 85. *L. alb. flor. depend.*, sive peregrinum. *Bauh. Pin.* 76. Sultan Zambach etc. *Clus. Hist.* 1. p. 155. ic. *De Bry Flor. nov.* t. 4. *Lobel. ic.* t. 155. f. 2.

Differt a *L. candido*; caule graciliore, semper fusco, nec viridi; foliis superioribus linearibus, nec lineari-lanceolatis; supremis lanceolatis, nec ovato-lanceolatis; corollâ semper cernuâ, minore, basi multo magis coarctatâ; petalis basi angustioribus; antheris effoetis oblongis; stylo sub stigmate trigono, nec trisulcato; stigmate longiore quam crasso. Culturâ perstat. *Hayne et Miller.* In Oriente?

30. *L. lancifolium* *Thunb.*; foliis sparsis, lanceolatis; corollis erectis, subcampanulatis. *Thunb. Act. Soc. Linn. Lond.* II. p. 355. *Willd. Spec.* 85. (excl. syn. *Kaempf.*) *L. bulbiferum* *Thunb. Jap.* 134. (excl. syn. *Linn.*)

Caulis angulatus, hirsutus, erectus, simplex, pedalis et ultra. Folia alterna sessilia, glabra, digitalia, superiora sensim breviora. Corollae parvae, unguiculares, albae. Axillae foliorum superiorum bulbiferae. *Thunb. Act.* l. c. Rad. bulbosa, esculenta. *Thunb. Jap.* In Japonia. 4.

31. *L. longiflorum* *Thunb.*; foliis sparsis, lanceolatis, (3-nervibus, utrinque attenuatis); corollis tubulato-campanulatis; (petalis elongato-spathulatis, acutis); caule glabro. *Thunb. Act. Soc. Linn.* II. p. 353. *Willd. Spec.* II. p. 84. *L. candidum* *Thunb. Jap.* 133. (fid. auct.) *Biakko* vulgo Juri *Kaempf. Amön. exot.* p. 870. — β *suaveolens*, uniflorum. *Bot. Reg.* 560.

Caulis teres, nodulosus, inanis, erectus, 2 ped.. Folia sessilia, integra, glabra, trinervia, basi adpressa, apice recurva, 1½ poll. Cor. albae, palmares, erectae. Differt a *L. candido*: fol. basi latioribus, apice acutioribus, reflexis, non undatis; corollâ triplo longiori, longitudinali. A *L. bulbifero* corollâ maximâ albâ; caule laevi, tereti. *Thunb. l. c.* Affine *L. japonico*; sed differt: foliis omnibus sparsis, lanceolatis, 6-poll.; perianthii foliolis sessilibus. *Don. Prodr. Fl. nep.* p. 52. Perperam a quibusdam *Hr.* *Syst. Vegetabil.* Vol. VII.

HEROCALLIS alba dicitur. In β caulis ped. et ultra, pennâ scriptoriâ crassior, sparsim dissiteque foliosus. Folia patentissima, anguste lanceolata, nervis 3 magis conspicuis, 3-4 unc., latitudine 4-5 plo minori, acuminata, plana, utrinque attenuata. Pedunculus solitarius, terminalis, 1-florus, erectus, 3-unc., caule parum tenuior, nudus. Flos nutans, 5-unc. et ultra; laciniis elongato-spathulatis, acutis; interioribus sublatioribus cum nervo medio extus prominente, intus sulco utrinque marginato respondente, laminâ ovali-lanceolatâ, unc. circiter latâ, in exterioribus $\frac{1}{3}$ latiore; tubus ex unguibus elongatis, imbricato-cohaerentibus, chloroleucus, 3-nervis, diametro pennae olorinae, limbo aequalis, superne levissime dilatens; limbus turbinato-recurvus. Filamenta laxius fasciculata, supra curvaturâ brevi assurgentia, corollâ $\frac{1}{4}$ circa breviora, gracilia, alba; antherae vitellinae, oblongae, effoetae subrotundae. Stylus longitudine staminum, sed duplo robustior, triqueter, albus. Stigma capitato-trilobum, lobis crassis, breviter ovatis, pruinosis, replicatis. Germen viride, elongato-oblongum, stylo duplo brevius, angulis 3 obtusis cum linea media depressa. *L. japonicum* differt corollâ duplo majori late turbinatâ, brevissime tubulosâ, polline rubro-fuseo; odore ingrato. *Bot. Reg.* In *Japonia prope Nangasaki et Miaco; β in China.* 4.

Obs. Nec huc, nec ad *L. candidum* pertinere videtur *L. candidum* *Jour. Fl. Coch.* p. 156., in quo folia sparsa, radicalia subulata; caulina lanceolata, striata; flores inodori magni, albissimi; corolla campanulata; petala semirevoluta, intus glabra, extus lineâ longitudinali exarata.

32. *L. japonicum* *Thunb.*; foliis sparsis, (petiolatis), lanceolatis, mucronatis, nervosis, utrinque glabris; caule simplici, tereti, glabro, unifloro; perianthiis turbinato-campanulatis, cernuis: foliolis elliptico-oblongis, sessilibus, apice patulis, obtusis. *Don prodr. Fl. nep.* p. 52. *L. fol. sparsis, lanceolatis; cor. cernuis subcampanulatis.* *Thunb. Jap.* 153. *Willd. Sp. Pl.* II. p. 85. *Ait. hort. Kew.* ed. 2. II. p. 240. *Bot. Mag.* 1591. *Loddig. Bot. Cab.* 438. *Sazuri Kaempf. Amön.* p. 871. *L. Batisua* *Hamilt. Mss.*

Caulis teres, simplex, laevis, glaber, 2 ped.. Folia alterna, petiolata, acuminata, integerrima, marginata, glabra, $1\frac{1}{2}$ palmaria, subtus pallidiora, 3-5-nervia. Flores terminales, reflexo-cernui. Cor. campanulata, albida, palmaris. Affine albo, differt vero: foliis in caule paucis, remotis, longissimis, petiolatis, nervosis, et caule debiliore, unifloro. *Thunberg.* In culta (caulis viridis, rubro-variegatus). Folia caulina distantia, divaricata, passim per paria approximata, ligulato-lanceolata, acuta, sessilia, angusta, $1\frac{1}{2}$ spitham., 6-8 lin. lata, (laete viridia, basi sanguinea); floralia pauca, verticillata. Pedunculus terminalis, crassus, teres, recurvus, cauli concolor, 2 poll., foliis floralibus aliquoties brevior. Cor. ampla, ultra spithamam longa, cernuo-nutans, cucullato-campanulata, recurvo-patens, alba, ad medium dorsi laciniarum exteriorum purpureo suffusa (cum nervo medio virescente): lacinae intimae latiores, laminâ subrotundatâ. Filamenta alba, corollâ $\frac{1}{4}$ circiter breviora. Antherae saturate aurantiaco-rubrae, oblongae, magnitudine Pisi. Stylus corollam quidquam excedens, viridis. Stigma clavato-capitatum, tricolle, viride. *Gawl.* Flores omnium amplissimi, intus nivei, extus purpureo suffusi, diametro limbi 5-pollicari. *Don.* Perperam

huc trahitur a quibusdam *HEMEROCALLIS alba*. In *Japonia*,
China et ad Narainhetty Nepalensium. *Hamilt.* 4.

33. *L. nepalense Don*; foliis elliptico-oblongis, sparsis, acuminatis: floralibus verticillatis; caule unifloro, laevi; perianthiis campanulatis, cernuis: foliolis unguiculatis, acutis. *Don Prodr. Fl. nep.* p. 52. et in *Mem. Wern. Soc.* 3. p. 412. *Topho incol.*

Caulis erectus, simplicissimus, teres, uniflorus, laevis, crassitie calami scriptorii, 1½-2 ped., superne foliosus. Folia floralia verticillata, cetera sparsa, elliptico-oblonga v. lanceolata, nervosa, utrinque glabra, 3 poll., 1½ unc. et ultra lata. Flos amplus, albus, extus, praesertim ad basin, roseo suffusus, pedunculatus, fere 3 poll. longus, diametro limbi 3-4 pollicari. Perianthii foliola lanceolata, nervosa, apice patula. *Don*. In speciminibus in Herb. cli *Martius* ab ill. *Lambert* communicatis: Rhizoma bulbum versus sensim attenuatum, superne fibris copiosis albide villosis; bulbillus junior magnitudine Pruni e squamis exterioribus membranaceis, interioribus carnosis margine membranaceis. Caulis basi crassitie pennae cygnae vel anserinae et ob folia squamaeformia delapsa nudus, teres, sub lente tenuiter scabridus, apice sulcato-angulatus, glaber. Folia alterna, satis remota, lanceolata et ovato-lanceolata, sessilia, subtus pallidiora; inferiora minora, nervis 5 fortioribus, 1-1½ poll., ½ poll. lata; superiora 3-5-nervia, 2 poll., ½ poll. lata; suprema 4-6 verticillata, 3-5 nervia, 2 poll. et ultra, 5-8 lin. lata, patentia. Pedunculus erectus vel arcuato-cernuus, crassus, teres, glaber, 1-2 poll. Flos 3-4 poll. Petala lanceolata, basi longe attenuata erecta et in speciem tubi approximata, utrinque glabra, longitudinaliter nervosa, medio 6-8 lin. lata, exteriora nervo medio fortiori. Stam. corollae paulo breviora; filamenta tenuia plana; antherae ½ poll. Stylus longitudine fere corollae, crassus. Stigma crassum, truncatum. Germen sulcato-angulosum, ½ poll. In *Nepal.* 4.

34. *L. giganteum Wall.*; caule folioso, racemoso; foliis petiolatis, sparsis, cordatis, amplissimis; floribus infundibuliformi-campanulatis, intus glabris. *Wallich Tent. Fl. nep. ill.* t. 12. 15. p. 21. (excl. syn.)

Bulbi ovato-globosi, aggregati, magnitudine pomi mediocris, vetusti maximi; squamis crassis ovatis, truncatis, subpatulis. Caulis strictus, cylindricus, glaberrimus uti tota planta, saepius sulco laterali alternatim interrupto, basi diam. 1-2 poll., sensim in crassitiam calami scriptorii vel digiti minimi attenuatus, 4-10 ped.; fructifer elatior, cavus, et plane inanis. Folia membranacea, patula, quaedam remotiora, alia saepe interstitiis plus duplo longiora, late ovato-cordata, attenuato-acuminata, sinu profundo subdecurrente, lobis latis rotundatis distantibus, leviter repanda et undulata, membranaceo-marginulata, nitida, supra saturate viridia, subtus pallidiora, costa crassa albicante, nervis distantibus; inferiora 9 poll. - ped.; superiora minora minus cordata; summa 3 poll., gracilius et longius acuminata, basi rotundata subintegra. Petioli crassi, sulco lato canaliculati, basi ⅓ caulis amplectente, infimi folia aequantes vel superantes, superiores 2-3-plo breviores, summi latissimi, poll., marginati. Flores maximi, oblique nutantes, 8-10 in racemo 1-1½ ped. nudo, albi, extus

deorsum virescentes, intus rufescentes, fragrantés; tubus virescens, crassitie digiti, obtuse 3-angularis, basi retusâ subtrilobus; limbus aequaliter patulus, subrevolutus, 4-5 poll. Pedunculi teretes, $\frac{1}{2}$ poll., recurvo-nutantes, virides; bracteis obtecti ovatis, albicantibus, valde caducis; bracteolâ internâ albâ, linearifiliformi, adscendente, poll., supra basin pedunculi singuli. Petala oblongo-spathulata, dimidio inferiore valde crassa et vix 4 lin. lata, exteriorè dilatata in laminam lanceolatam acutiusculam tenuiter striatam, intus ad margines punctis minutis densissimis rufescentem, basi subtus gibboso-convexa, supra foveâ latiusculâ leviter excavata, paginâ superiore sulco longitudinali, marginibus nunc parum inaequalibus; 3 exteriora parum latiora, dorso convexo; interiora costâ latâ elevatâ utrinque sulco exsculptâ profundo. Stam. recta, conniventia, limbo parum breviora, parum inaequalia; filamenta alba, plana, sulcis petalorum interiorum incumbentia, apice teretia; antherae obtusae, pallide flavae, rectae. Germen obtuse triangulare, lineis 6 notatum, nitidum, $1\frac{1}{2}$ poll., 3-loculare; ovulis orbiculato-planis. Styl. crassus, rectus, filamentorum longitudine, sub stigmatè leviter incrassatus. Stigm. prismatico-trilobum, obtusum, vertice triangulari, scabro. Caps. ovato-prismatica, retusa cum cuspidè, basi clavata, angulis obtusis, $2\frac{1}{2}$ poll. longa, 2 lata, fusca, glabra, valvulae margine incrassatae, serie simplici ciliorum longissimorum pectinatae. Sem. innumera, laevissima et tenuissima, 3 angularia, oblique obovata, membranâ latâ tenuissimâ marginata, $\frac{1}{2}$ poll. Wallich, qui huc laudat: Ssiré, rectius Ssirvi etc. Kaempf. Amoen. 870. Ic. Kaempf. ed. Banks. p. 3. t. 47, et cum? *L. candidum* Thunb. Jap. p. 133 (quod fid. auct. *L. longiflorum* Thunb.). In umbrosis humidis montis Sheapore in Nepal. 4.

35. *L. cordifolium* Thunb.; foliis cordatis, acuminatis, petiolatis, sparsis; spicâ terminali, pauciflorâ; perianthii foliolis, lanceolatis, praelongis, rectis, inferne angustatis. Don Prodr. Fl. nep. p. 52. *L. fol. cord. petiolatis.* Thunb in Linn. Trans. 2. p. 332. Willd. Sp. Pl. 2. p. 84. Kaempf. Amoen. 870. Banks. ic. Kaempf. t. 46. HEMEROCALLIS cordata, fol. cord. venosis. Thunb. Jap. 143. SAUSSUREA Salisb. Trans. Linn. Soc. VIII. p. 11. (sive Smith in Rees). Caulis erectus, 3-4-ped., teres, crassitie digiti, fistulosus. Folia ampla, longe petiolata, sparsa, apice cuspidata, reticulato-venosa, membranacea, glabra, palm. long., 4-5 poll. lata. Spica 4-flora. Perianthium album, campanulatum. Stamina perianthio paulo breviora: filamenta basi dilatata: antherae oblongae, cylindraceae, versatiles. Stylus stamina subaequans, filiformis, obscure triangularis, germine trigono fere triplo longior. Don. Perperam quibusdam HEMEROCALLIS caerulea. In Japonia Thunb., in montibus Shivapoorâ prope Katmandu, metropolim Nepaliae. Wallich. 4.

Quid? *L. aurantium* Don H. Cantabr.

noricum Bernh. H. Erford.

persicum Fisch.

praecox Loddig. Cat. 1813.

recurvum H. Belv. et Breit.

sibiricum Willd. En. H. Berol. Suppl. p. 7, quod, monente

Link En. p. 333, nec in Horto, nec in Herb.

Willd.

sinense Noisette.

1377. F U N K I A.

1. *F. subcordata Spreng.*; foliis subcordatis, acuminatis; corollis infundibuliformibus. *HEMEROCALLIS japonica H. Kew. ed. 2. II. p. 305.* H. fol. ovatis, undulatis, multinerviis. *Thunb. Act. Soc. Linn. II. p. 335. Willd. Spec. II. p. 198. Red. Lil. t. 3. Gawl. Bot. Mag. 1433. H. plantaginea Lam. Enc. III. p. 103.* H. *cordata*; fol. cordatis, venosis. *Thunb. Jap. p. 145.? Cav. Desc. p. 125. H. alba Andr. Repos. t. 194.* H. fol. ovatis, subcordatis; corollis infundibuliformibus; bracteis persistentibus. *Willd. Enum. p. 389. (excl. syn. uti in) Poir. Enc. Suppl. III. p. 34. Kerner hort. semperv. t. 435.* *ALETIS japonica Houtt. Pfl. Syst. XI. p. 486. t. 84. f. 2. (fid. Gawl. l. c.) NIOBE cordifolia Salisb. Hosta japonica Trattin. tabul. t. 89. Thes. t. 52.* *FUNKIA subcordata Spreng. S. Veg. II. p. 41.* Joksan vulg. Gibboosi, Gladiolus plantaginis folio etc. *Kaempf. Amön. exot. 863. Banks ic. Kaempf. T. 11.*

„Folia radicalia petiolata, ovata, acuminata, undulata, costâ mediâ multinervia, transversim tenuissime venosa, glabra, palmaria. Petioli alati, membranacei, palmares v. paulo ultra. Flores ut in *H. lancifolia*.“ *Thunb. Act. l. c.* „Caulis teres, erectus, glaber, ped. et ultra. Folia alterna, cordata, ovato-oblonga, supra viridia, subtus pallida, erecta, spithamaea, palmam lata, juniora sensim minora et minus cordata. Petioli compressi, alati, longitudine folii. Flores alterni, erecti. Caps. angulata, ovata, 6-valvis (?), 6-locularis, glabra, poll.. Semina in singulo loculo plurima, orbiculata, depressa, glabra, alâ membranaceâ. *Thunb. Fl. Jap.*.. In culta: Radices fibrosae, carnosae, teretes, alidae. Folia plura, 3-7 poll. lata, laete viridia, convoluto-petiolata; nervi e petiolo foliorum marginibus parallele curvati, apice iterum conjuncti. Caulis folio bracteâve stipatus, 1 1/2 ped.. Racemus erectus, 10-15-florus, folioso-bracteatus. Bracteae virides, convoluto-ovato-lanceolatae, acutae; inferiores geminae: exteriore majore tubum vix aequante. Pedicelli breves, albi, vix cernui. Cor. subnutans, candida, fragrantissima, fere 4-poll.; tubus obsolete hexagonus, limbo longior; limbus campanulatus, quidquam recurvus; lacinae ovato-lanceolatae. Stam. vix longitudine corollae, alba, tubo germen aequanti adnata; antherae lineares, emarginatae, flavae. Stylus germine 3-4-plo longior, albus. Stigma laeve. Caps. prismatica, subnutans, valvis planis. Sem. sursum imbricata, alata, elliptica. Cum hac ab aliquibus commutatur *LILIUM longiflorum et japonicum.* *In China et Japonia.* 4.

2. *F. ovata Spreng.*; foliis ovatis, acuminatis; corollae limbo campanulato. *HEMEROCALLIS caerulea Hort. Kew. ed. 2. II. p. 305. Andrews's Repos. 6. Ventenat Malmais. t. 18. Redouté Lil. t. 106.* H. fol. ovatis, subcordatis; corollae limbo campanulato; bracteis marcescentibus. *Willd. Enum. p. 389. (excl. syn. LIL. cordifolii Thunb.).* H. fol. petiolatis, ovatis, acuminatis, subplicatis, nervosis; bracteis pedi-

cellum parum superantibus, scarioso-membranaceis; racemo multifloro; corollae tubo sulcato-cylindrico, limbum 6-fidum, campanulatum vix aequante; staminibus apice involutis. *Gawl. Bot. Mag.* 894. *Kern. H. Semperv.* t. 126. *H. caerulea* β flore violaceo. *G. Bot. Mag.* in Nota ad 1453. *HOSTA caerulea Tratt. Tabul.* 189. *Thes.* t. 51. *FUNKIA ovata Spreng. S. V.* II. p. 40. *BRYOCLES ventricosa Salisb. Trans. Hort. Soc.* 1. p. 555. *H. japonica* β *Willd. Spec.* p. 198. Gibboosi altera flore autumnali *Kaempfer. Amön. exot.* 865. β flore albo. *H. lancifolia*; fol. lanceolatis, 7-nervibus. *Thunb. Act. Soc. Linn.* II. p. 555. *Willd. Spec.* II. p. 198. *H. japonica Thunb. Fl. Jap.* p. 142. *H. caerulea* α *Gawl. Bot. Mag. l. c.* *ALETIS japonica Thunb. Act. Ups.* III. p. 208. *Gmel. S. V.* p. 552. *FUNKIA lancifolia Spreng. S. V.* II. p. 41.

Variat utraque foliis angustioribus et latioribus. *Gawl.* Radix e fibris crassis albidis fasciculatis. Folia 8-10, lacte viridia, glabra, basi quidquam dilatata, $4\frac{1}{2}$ - $6\frac{1}{2}$ poll., nervis longitudinalibus apice conjunctis, subtus prominentibus. Petiolus 6-8 poll., subtus angulosus, supra canaliculatus. Scapus nudus, 22-30 poll., teres, firmus, glaber, florum racemo terminatus. Pedicelli breves, ceterati, teretes, basi bractea ovato-oblonga, acuta, ventricosa, pallide viridi. Flores primum patentes, dein cernui, violaceo-caerulei. Cor. tubus cylindricus, 6-sulcatus, 9 lin., campanulato-dilatatus; lacinae ovato-oblongae, acutae, basi sutura albidam connatae, (apice inflexae potius quam reflexae). Filamenta alba, subulata. Antherae pallide purpureae, polline flavo. Stylus uti stamina deflexus, dein adscendens, albus, stamina paulo superans. Germen album, teres, sexsulcatum. Caps. subcylindrica, basi quidquam attenuata, striis 3; sem. biserialia, numerosa, nigra, angulosa, appendice membranaceo. *Redout.* In β spontanea: folia ovato-lanceolata, acuminata, apice patulo, erecta, supra saturatius viridia, digitalia, poll.-palmam lata. Petioli canaliculati, carnosi, subulati, glabri, folio longiores. Scapus teres, articulatus, erectus, glaber, foliis longior. Bractee ovatae, concavae, glabrae. Flores racemosi, cernui. Pedunculus teres, glaber, unguicularis. Cor. alba; tubus cylindricus, sulcatus, apice campanulatus, unguicularis; limbi campanulati lacinae ovatae, extrorsum flexae. Filamenta corollae basi affixa, declinata, reflexa, alba, aequalia, corolla longiora. Antherae oblongae, flavae. Germen ovatum. Stylus filiformis, declinatus, reflexus, albus, staminibus longior. Stigma simplex, obtusum, album. Caps. oblonga, 6-sulca, glabra. Semina plurima. *Thunb. In Japonia.* 2.

Obs. *Cl. R. Brown* in *H. caerulea* semper „embryones 6-10 teretes, breves, inaequales (unice forsan adollescenti ad umbilicum sito), albuminis unica cavitate inclusos et a basi communi oriundos“ observavit. *Prodr. Fl. Nov. Holl.* p. 296.

1578. HEMEROCALLIS.

H. flava; foliis linearibus, carinatis, (margine glabris); petalis planis, acutis: nervis petalorum indivisis. *Willd. Spec.* II. p. 197. (excl. β .) *Linn. Spec.* 462. *Mill. Dict.*

n. 1. *Lam. Enc. II. p. 103. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 205. Schult. Oestr. Fl. 1. p. 551. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 568. Roth En. pl. Germ. I. 2. p. 64. Gmel. Sibir. 1. p. 37. n. 5. M. a Bieb. Fl. taur. cauc. Suppl. p. 273. Hall. helv. add. p. 188. Jacq. Hort. vind. t. 159. Curt. Bot. Mag. t. 19. Redouté Lil. t. 15. (excl. β .) Sturm Deutschl. Fl. 1. A. 7. H. Hayne term. bot. t. 1. f. 39. Trattinn. Tabular. t. 216. Thesaur. t. 49. Knorr delic. 1. t. L. 5. Kniph. Cent. X. n. 51. HEMEROCALLIS Lilio-Asphodelus Linn. Spec. ed. 1. p. 824. Scop. Carn. p. 253. H. fulva var. β . flava Pollin. Fl. veron. p. 458. Lilio-Asphodelus luteo flore. Clus. hist. 137. Bauh. Hist. 2. p. 700. Besler Eystett. O. 9. f. 5. t. 3.*

Rad. tuberibus oblongis, fasciculatis, fusco-flavescentibus, uti in ASPHODELO. Folia recta, vel apice quidquam desflexa, $1\frac{1}{2}$ -2-ped., $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata, acuta, canaliculata, pallide viridia, obsolete striata. Scapi teretes, nudi, 1-4-ped., supra ramis 2-3 brevibus. Bractea sub ramis ovato-lanceolata, acuminata. Flores breviter pedunculati, erecti vel subcernui, flavi, odori, 2-3 $\frac{1}{2}$ poll. Cor. basi in tubum cylindricum $\frac{1}{2}$ poll. contracta, campanulata: lacinae exteriores angustiores, oblongo-lanceolatae; interiores latiores, tenuiores, subovatae, omnes apice quidquam reflexae, planiusculae, nervis simplicibus. Stamina corollae breviora, inaequalia. Antherae subsagittatae, acutae. Stylus longitudine corollae, apice incurvus. Stigma trilobum. Semina atra, nitida. Variat flore pleno et foliis variegatis. „In H. flava lacinae corollae uno ordine, in lutea duobus positae.“ *Gmel. sib. l. c. In campis Sibiriae, Hungariae, Istriae, Carnioliae, Salisburgi, Helvetiae?* 4.

2. *H. graminea Andr.*; foliis linearibus, (subtriquetro-) carinatis; petalis tribus interioribus undulatis nervisque petalorum indivisis. *Hort. Kew. ed. 2. II. p. 504. Andr. Repos. t. 244. Bot. Mag. 873. Trattinn. Thes. t. 50. H. flava β . Linn. Mant. 568. Willd. Spec. II. p. 504. H. minor Mill. Dict. n. 8. Lilio-Asphodelus luteus minor. Tournef. inst. 334. β europaea? Hornem. h. hafn: Suppl. p. 42.*

Nil differt, nisi tempore florendi et quod minor. *Linn. Mant. l. c. Scapus compressus, minus ramosus quam in flava, $1\frac{1}{2}$ ped. Folia longissima, acuminata, angustiora quam in flava, vix 3-4 lin. lata, intensius viridia. Pedunculi breviores. Bractea breves, membranaceae. Cor. vix 3 poll., basi tumidula, lutea, inodora: lacinae interiores latiores, obtusiores, vix breviores: omnes extus fusco-virentes. Antherae flavae. Stylus longior. Stigma trilobum. Cls. Sprengel hujus nequidem instar varietatis meminit. In Sibiria.* 4.

3. *H. disticha Don*; foliis linearibus, carinatis, margine cartilagineis, scabris; floribus spicatis; perianthii lacinarum nervis omnibus reticulatim junctis. *Don Prodr. Fl. nep. p. 53. Don Cantab. ed. 6. p. 93. Bot. Mag. ad 1435. H.*

fulva Thunb. Jap. 142. (excl. syn. Linn.) Ken etc. Iris.
Hæmpf. Amön. exot. 872.

Magnitudine et habitu *H. flavæ* accedit. Flores lutei. Don. Variat flore simplici et pleno; foliis unicoloribus et variegatis. Thunb.. In *Gosaingsthan Nepalensium Wallich, in Japonia Thunb.* 4.

4. **H. fulva*; foliis linearibus, carinatis, (margine glabris); petalis 3 interioribus obtusis, undulatis: nervis petalorum exteriorum ramosis. *Willd. Spec.* II. p. 197. *Linn. Spec.* 462. *Mill. Dict.* n. 5. *Lam. Enc.* III. p. 103. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 205. *Roth En. pl. Germ.* I. 2. p. 65. *C. a Sternberg in Hoppe bot. Taschen.* 1809. p. 20. *Curt. Bot. Mag.* t. 64. *Red. Lil.* t. 16. *Trattin. Tabul.* t. 217. *Kniph. Cent.* VII. n. 51. *H. crocea Lam. Fl. fr.* III. p. 267. *Hort. Eyst. Vern. ord.* 9. t. 6. f. 1. *Lilio-Asphod. puniceus. Clus. Hist.* 1. p. 137. *Lob. ic.* 93. *Park. Par.* p. 148. t. 149. f. 5.

„Specie diversa hæc esse videtur, nec tamen differentiam reperi: hæc major, illa (*flava*) minor; hæc floribus fulvis, illa flavis, hæc maturationis, illa grossificationis mense floret.“ *Linn. Spec.* l. c. „*H. fulva* culturâ mutatur in *H. flavam* (*Trans. Linn. Soc.* II. p. 355); quod mihi haud credibile videtur; etiamsi mutetur color *fulvæ* in pallidiorum, remanent tamen characteres constantes.“ *Willd. Spec.* l. c. Certe distincta a *H. flavæ* et facilis distinctu; nam differt præter characteres a *Linn.* et *Willd.* datos: antheris obtusis; stigmatibus subglobois. *Lamarck* huc trahit *Haller* p. 188. *Addend.* In *China*; in *Galloprovincia, prope Salisburgum Funk, in rupe Golling Sternb., in Austria forte ex hortis delata; in America boreali* *Nuttall. gen.* 1. p. 219. clo *Torrey* tantum culta. 4.

Obs. Loureiro in Fl. Coch. p. 254, qui, præter *Linn., Thunb. Fl. Jap.* p. 142. (a *Gawl.* ad *H. disticham* ductam), et *Burm. Ind.* p. 84. citat, plantam in *China* et *Cochinchina* cultam sequentibus describit: radix fasciculata, bulbis subulatis. Folia subulata, longa, canaliculata, glabra, reflexa. Caulis 4-ped., erectus, simplicissimus, glaber. Panicula terminalis, pauciflora. Flos magnus, luteo-ruber, tubo cylindrico longissimo, limbo patente undulato. Stamina declinata, corollæ aequalia. Caps. 3-gona. Variat fl. pleno, laciniis corollæ 10, staminum numero indeterminato. — An hæc forte potius ad *H. disticham*.

1579. C Z A Ç K I A.

1. Cz. *Liliastrum Andr.* Czachia. 4. Krzemieniec. 1818. c. ic. *HEMEROCALLIS Liliastrum Linn. S. Nat.* II. p. 142. *Spec. pl.* 1. p. 324. *Mill. dict.* n. 4. *Allion. Fl. pedem.* n. 1858. *Lam. Dec. Fl. fr.* III. p. 205. *H. sol. linearibus, planis; scapo simplici: petalorum nervis indivisis.* *Willd. Enum.* p. 389. *Roth En. pl. Germ.* I. 2. p. 66. *Host. Fl. aust.* p. 444. *ANTHERICUM Liliastrum Linn. Spec.* 445. *). *Willd. Spec.* II. p. 142. *Wulf. in Röm. Arch.* III. p. 557.

*) Qui tunc subscripsit: „generis hujus naturalis species est: sed quis character uniet.“

Mert. et Koch D. Fl. II. p. 558. Kniphof Cent. 7. n. 50. Curt. Bot. Mag. 518. PHALANGIUM Liliastrum Pers. Syn. 1. p. 369. Broter. Fl. lusit. p. 554. Rêdout. Lil. t. 255. Trattinn. Fl. aust. n. 184. (qui nomen ALLOBROGIAE proposuit). ORNITHOGALUM liliforme Lam. Fl. fr. 5. p. 278. Hall. helv. 1250. Tournef. inst. T. 1. p. 569. t. 194. Moris. hist. S. 4. t. 1. f. 5. Parkins. parad. p. 150. t. 151. f. 1. Phalang. flore lilii. Bauh. Hist. 2. p. 656.

Rad. e napulis 12 et ultra, albis, gracilibus, 2-3 poll., subfusiformibus, carnosulis, fibrillis copiosis. Scapus simplicissimus, teres, erectus, firmus, laevis, 1-3 spith., crassitie fere calami scriptorii, in racemum heteromallum abiens. Folia omnia radicalia, scapo vix breviora, eumque basi obvolventia, erecto-patula, lineari-lanceolata laevigata, saturate viridia, 1-2 lin. lata, carinata. Racemi terminales, laxi, 4-6-flori, secundi. Flores 1² poll., nivei, fragrantis, LILIO candido minores: ex axilla bracteolae lanceolatae; pedunculo tereti, 1/2 poll., aphylo, flore triplo brevior. Petala subaequalia, oblongo-ovalia, basin versus attenuata, alterna paulo latiora marginibusque subundata; primum conniventia, post anthesin apice erecto-patula. Filamenta alba, subulata, corollâ quidquam breviora, alterna minora, omnia demum declinata sursumque adscendentia. Antherae oblongae, lineares, quadrisulcae, flavae vel aurantiacae. Stylus gracilis, corollae longitudine, albus, demum deflexus. Stigma crassiusculum, subtriquetro-turbinatum, flavum. Germen in fundo corollae sessile, saturate virens, glabrum, subtriquetro-ovatum, liris 6, alternis, superficialibus. Capsula oblongo-ovata, liris elevatis exarata. *Wulf.* Variat floribus majoribus et minoribus. *In alpibus Europae meridionalis et in Polonia. 4.*

1380. B L A N D F O R D I A.

1. *BL. nobilis Smith*; bracteis pedunculo florifero duplo brevioribus; foliis anguste linearibus. *R. Brown Prodr. Fl. n. Holl. p. 296. Smith Exot. Bot. 1. p. 5. t. 4. Bot. Repos. 266. Trattinn. tabular. t. 794. Bot. Mag. 2005. Bot. Reg. 286.*

Rhizoma horizontale, carnosum. Folia radicalia basi disticha, vaginantia, subensiformia, laxa, sulcata, acuminata, integerrima, (glauca) basi flavicantia, 1/2 ped. et ultra, 2 lin. lata, caule breviora. Caulis erectus, teres, foliis alternis, remotis, subadpressis, acuminatis, striatis, concavis, pollicaribus: superioribus sensim brevioribus, superne flavescens, rubro-punctatus, spicâ distichâ subsexflorâ. Spatha bivalvis, glauca, basi flavo-marginata: valvulae lanceolatae, acuminatae; exterior 1/2 poll., interior duplo brevior. Corollae tubus filiformi-cylindricus, pollicaris, miniatus, apice deflexus, dilatatus in faucem campanulato-ventricosam, coccineam, pollicarem: lacinae breviter ovatae, cuspidatae, flavae, apice virides. Filamenta capillaria, limbo parum breviora, cum antheris flavescencia. Stylus subulatus, viridis. Flores longissime persistentes. *Ker.* In specimine nostro spontaneo: folia radicalia margine interdum basin versus tenuissime serrulata, stricta, erecto-patentia, 1 1/2 ped., 1 1/2 lin. lata, ner-

vosa et basi carinata: caulina multo minora 3-4, suprema tantum spathacea. Caulis $2\frac{1}{2}$ ped., glaber. Bractea interior exteriore vix $\frac{1}{3}$ brevior, angustior; exterior ovato-lanceolata, acuminata, 4-5 lin. Tubus a *Sims* descriptus verus est pedunculus 10-15 lin., glaber. Cor. tubulosa, subcampanulata, subflorescentia cernua, primum erecta, 4-5 lin, diam. poll.; lacinae ovatae cum acumine, alternae acutiores, 2 fere lin., $1\frac{1}{2}$ lin. latae. Filamenta tubo infra medium inserta, filiformia. Antherae oblongae, obtusae. Stylus corollam aequans. Germen lanceolatum. Circa Port Jackson. 2.

2. *Bl. grandiflora* R. Br.; bracteis pedunculum fliferum subaequantibus, interiore triplo minore; (foliis serratis). R. Brown. prodr. Fl. nov. Holl. p. 296. Bot. Reg. t. 924. ALETRIS *punicea*; foliis lineari-lanceolatis, striatis, crenulatis; scapo subfolioso. Labill. nov. Holl. t. 111. (?). Poir Enc. 1. p. 289. Kerner H. semperv. t. 449.

Folia (inculta in Bot. Reg.) rigida, erecta, lacte viridia, utrinque striata. Scapus erectus, 2-3 ped., compressus, striatus; squamis rigidis, acuminatis, distantibus. Racemus cylindricus, multiflorus, floribus solitariis, bracteatis; bractea exteriore ovata, acuminata. Pedunculi post anthesin multum elongantur. Cor. magna, (in icone fere $1\frac{1}{2}$ poll.) inflata, rubro-aurantiaca, diu persistens, limbo sexlobo: laciniis exterioribus ovatis, obtusis, interioribus latioribus retusis. Lindl. Labillardiere, a R. Brown cum? adductus, describit suam sequentibus: „Folia radicalia plana, rigida, margine subcartilaginosa et denticulata, longitudine fere scapi, 2 ped.. Scapus teres, basi folio uno alterove radicali simili, sed minori, squamisque bracteiformibus, vaginantibus. Racemus terminalis, $\frac{1}{2}$ ped. et ultra. Pedunculi simplices, pollicares. Cor. extus punicea, intus sulfurea, tubulosa, ventricosa, limbo brevi; laciniis ovatis, acutis, flavo marginatis. Antherae hastatae, obtusae. Germen liberum, lanceolatum, trigonum. Stylus subulatus, vix e corolla prominens. Stigma trifidum. Caps. elongata, trigona, 3-loc., 3-valv.; semina numerosa, hispida, oblonga, serie duplici margini interiori affixa, quae descriptio ab illa data a Lindley praecipue laciniis acutis, foliisque crenatis. Recte miratur Lindley, clm. Brown silere de foliis, ut forte hic plures species latitent. In promont. van Diemen. 2.

Quid BLANDFORDIA maculata Spreng.?

speciosa Hort. Angl. in Link Enum. h. berol. 1. p. 330, ubi nondum floruit?
cordata Andr. Repos. est GALAX.

1381. XANTHORRHOEA. *)

1. *X. arborea* R. Br.; caudice arborescenti; foliis an-

*) Plantae habitu proprio. Caudex saepe resiniferus, nunc elevatus et saepe divinus, crassus, nunc brevissimus vel subnullus. Folia longissima, angusta, graminea, linearia, subtriquetra v. ancipitia, confertissima, undique patula apicibusque recurvis; basibus dilatatis, semivaginantibus. Scapus terminalis, simplicissimus, teres, saepe longissimus. Spica terminalis, cylindracea, amentiformis, scapum quandoque aequans. Flores sessiles, confertissimi, albi, parvi, multibracteati. Bracteae numero indeterminatae, imbricatae, unguiculatae, interiores sensim minores. Caps. exsertae, obtuse triquetrae, nitidae, cartilagineo-ligneae. Semina atra, albumine carnosio, molli. R. Br.

cipitibus, extra medium triquetris anticeque striatis; scapo amentum longissimum vix aequante; bracteis perianthiisque imberbibus. *R. Brown Prodr. Fl. Nov. Holl.* p. 288.

Rami comâ amplâ foliorum numerosorum, gracilium, longorum, pendulorum terminati, e quorum centro scapus solitarius. *Smith in Rees Cycl. Ad Portum Jackson.* h.

2. *X. australis R. Br.*; caudice arborescenti; foliis longitudinaliter ancipitibus; scapis amento elongato brevioribus; bracteis fasciculos subtendentibus elongatis. *R. Brown Prodr.* p. 288.

In insula van Diemen. h.

3. *X. hastile Smith*; caudice brevissimo; foliis longitudinaliter ancipitibus; scapo longissimo amentum ($1\frac{1}{2}$ pedale) aliquoties superante; bracteis foliolisque exterioribus apice tomentosus. *R. Brown Prodr.* p. 288. *Smith Act. Soc. Linn.* IV. p. 219. *Ait. H. Kew.* ed. 2. II. p. 271. *Link Enum.* 1. p. 535. *X. resinosa Pers. Syn.* 1. p. 570.

Folia elongata, tenuia, crassiuscula, creberrima. Nondum floruit. *Link.* Caudex lignosus, resinâ flavâ scatens. Scapus teres, 18-20 ped.. Amentum floribus abortivis interstinctis squamosum. *Smith.* *Ad portum Jackson.* h.

4. *X. media R. Br.*; caudice abbreviato; foliis (longitudinaliter?) ancipitibus; scapo longissimo amentum ($1\frac{1}{2}$ pedale) aliquoties superante; bracteis perianthiisque imberbibus. *R. Brown Prodr.* p. 288.

Ad Portum Jackson. h.

Obz. Nimis forsân affinis *X. hastili R. Br.*

5. *X. minor R. Br.*; acaulis; foliis triquetris, antice planis, extra medium concaviusculis; scapo amentum (5-8 unciale) aliquoties superante; bracteis fasciculorum flore vix brevioribus, omnibus perianthiisque imberbibus. *R. Brown Prodr.* p. 288. *Ait. H. Kew.* ed. 2. II. p. 271.

Folia perfecte trigona, glabra, striata, ut videtur 2 ped.: lateribus inferioribus planis $\frac{3}{4}$ lin. latis; superiore $1\frac{1}{2}$ fere lin. lato, inferne sulco leni margini alteri propiore, superne quidquam convexo. Scapus sub amento teres, glaber, rigidus, crassitie pennae cygnae. Amentum densissimum, cylindricum, 8 poll., $\frac{3}{4}$ poll. diam.. Bracteae numerosae, floribus paulo breviores, inferne subulato-attenuatae, apice in spathulam parvam acutam, subconcavam, margine fimbriatam dorso pilis raris obsitam dilatatae, 2-2 $\frac{1}{2}$ lin., fuscescens. Perianth. foliola exteriora linearia, acutiusecula, superne concava carinataque et ad carinam pilis rarissimis, fuscescens, 5 lin., facile decedens; interiora paulo longiora tenuioraque, 5 $\frac{1}{2}$ lin., margine albida, dorso fuscescens maculisque minutissimis purpureis, oblonga, obtusa, apice concava, glabra, $\frac{1}{3}$ superiore patentia, imâ basi connata, ultra medium tubum simulantia. Filamenta subulata, supra sulcata, perianthium $\frac{1}{3}$ superantia, parte inclusâ erectâ purpurascens, exsertâ patente flavidâ; antherae lineares, obtusae, incumbentes, flavae, vix lin.. Stylus longitudine fere staminum, albus, sub-

latus, 5-salvus; stigmatе minuto. Ad specimen in Herb. cli
Martius. Ad Portum Jackson. h.

6. *X. bracteata R. Br.*; acaulis; foliis triquetris, infra medium antice parum elevatis, supra medium concaviusculis; scapo amentum (5-6 unciale) aliquoties superante; bracteis fasciculos subtendentibus flore 2-3 plo longioribus, lanceolatis, divaricatis: omnibus perianthiisque imberbibus. *R. Brown Prodr. p. 288. Link Enum. 1. p. 133.*

Folia longa, crassiuscula, subtriquetra. Nondum floruit. *Link. Ad Portum Jackson. h.*

7. *X. Pumilio R. Br.*; acaulis; foliis infra medium planiusculis, axi utrinque parum elevatâ, extra medium triquetris, canaliculatis; (scapo pedali) amentum subovatum multoties superante; bracteis subaequalibus perianthiisque imberbibus. *R. Brown Prodr. p. 288.*

Ad littora novae Hollandiae intra tropicum. 4.

1382. B O R Y A.

1. *B. lucens Labill.*; capitulorum involucris foliisque acerosis, radiculisque simplicibus nitidis. *Labillard nov. Holl. 1. p. 81. t. 107. Poir. Enc. VIII. p. 615. Suppl. V. p. 480. DAVIESIA lucens Lam. ill. Suppl. 10. n. 1.*

Herbacea, 6-8 poll. et ultra. Caules teretes, firmi, subdecumbentes, glaberrimi, ramosi, radicanes una cum ramis, cortice fungoso, lucido. Folia numerosissima, approximata, subulata, basi vaginantia, dilatata, apice trigona, glaberrima, pollicaria et ultra, mucronata, denticulata. Capitulum ovatum, basi bracteis 5-6, inaequalibus, elongatis, patentibus, similibus foliis, attamen brevioribus. Pedunculus communis elongatus, substriatus. Squamae calycis oblongae, obtusiusculae: altera integra, altera bi-tridentata: plures steriles. Tubus corollae s. calycis gracilis, cylindricus, basi dilatatus, laciniis limbi patentibus, lanceolatis, tubo brevioribus. Stamina vix longitudine corollae. Germen superum, ovali-oblongum, glaberrimum. Stylus vix longior staminibus. Stigma capitatum. Caps. ovato-rotundata, trigona, basi attenuata. Semina plura ovata, subrugosa, dorso convexa, altero latere angulosa. *La Bill. Sprengel hanc speciem neglexit. In terra van Leuwin. 4.*

2. *B. nitida R. Br.*; caule ramosissimo, radicante; fibris simplicissimis nitidis; scapo ramis adscendentibus brevioribus; capitulo ovato. *R. Brown Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 286.*

BAUMGARTENIA nitida Spreng. S. Veg. II. p. 91.

An eadem ac *B. lucens*?

In ora meridionali novae Hollandiae. 4.

3. *B. sphaerocephala R. Br.*; caulibus simplicibus, erectiusculis, scapo brevioribus; capitulo globoso. *R. Brown*

*Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 286. *) BAUMGARTENIA sphaerocephala Spreng. l. c.*

Ad oram meridionalem novae Hollandiae. 4.

1585. L A X M A N N I A. **)

1. *L. minor R. Br.*; perianthii foliolis interioribus brevioribus; bracteis margine nudis; stipulis bipartitis: laciniis capillaribus. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 286.*

Ad Portum Jackson.

2. *L. gracilis R. Br.*; perianthii foliolis interioribus longioribus; bracteis margine lanatis; stipulis lanceolatis: apice semibifido. *R. Brown Prodr. p. 286.*

Cespitosa et fere stolonifera; radicis fibrae longae, descendentes superne purpurascenti-fuscae. Folia radicalia plura, subtriquetro-filiformia, basi vaginis laceris scariosis lanâque connexa, rigida, erecta v. quidquam patentia, acuta, canaliculata, sub lente marginibus carinâque denticulata, pallide viridia, 5-12 lin.; caulina alterna, internodiis plerumque paulo breviora, erecta, supra planiuscula; basi vaginis albidis, scariosis, marginibus, praesertim inferne, lanatis, bifidis, $1\frac{1}{2}$ -3 lin.; e foliorum axillis plerumque folia 2 minora. Caules plures, filiformes, rigidi, teretiusculi, glabri, purpurascenti-fusci, $2\frac{1}{2}$ -6 poll., vix crassitie filii emporetici; juniores simplices, erecti; vetustiores ascendentes et e foliorum axillis caules similes emittentes. Pedunculi ex apice caulium plerumque 2, scapiformes, teretes, stricti, glaberrimi, pallide virides, $1\frac{1}{2}$ -4 poll.; altero multo minore tardioreque. Capitula ovata, truncata, 2-3 lin. alta et totidem lata, 2-8 flora. Bractee ovatae, obtusae, scariosae, basi margine lanatae, floribus appressae iisque breviores, scariosae; exteriores breviores pallide fuscae, interiores longiores albidae. Flores brevissime pedicellati. Perianthii foliola exteriora ovalia, obtusa, concava, scariosa, marginibus albida, dorso purpurâ suffusa, $1\frac{1}{2}$ lin., lin. fere lata; interiora 2 lin., paulo angustiora, oblonga, tenuiora, purpurascencia margine diaphano. Stam. corollâ fere duplo breviora, erecta; filamenta subulata, inferne quidquam dilatata, alba, glabra, alterna paulo breviora; antherae ovato-rotundatae, erectae, dorso paulo supra basin affixae, flavae. Germinum ovato-trigonum, glabrum. Stylus stamina subaequans, germine longior, subulatus. Stigma depressum. Ad specimen Sieberianum. *Ad Portum Jackson. 4.*

Obs. An huc LAXMANNIA Annuenda Raeuschel VI. l. apud Steudel?

*) Herbae perennes, aridae. Radices fibrosae, fibris longis, tenacibus, subnitentibus. Caules simplices v. divisi et repentis. Folia acerosa, confertissima, mucronata, basibus dilatatis, scariosis, semivaginantibus. Scapus terminalis, simplex. Capitulum subglobosum, bracteis nonnullis foliaceis brevibus involucreto. Squamae florales scariosae, glabrae: exteriore includente interiorum angustiorum perianthium amplexantem. *H. Brown.*

**) Herbae perennes facie POLYCARPAE. Rad. fibrosa. Caules ramosi, filiformes, foliati. Folia aceroso-filiformia, radicalia conferta; caulina alterna, medio quasi vaginae brevis, scariosae, margine lanatae, apice fissae inserta; minorum fasciculis axillaribus. Capitulum pedunculo scapiformi terminali insidens, parvum. Flores sessiles, unibracteati, parvi, purpurascens vel albi. *R. Br.*

1584. A P H Y L L A N T H E S.

1. * *A. monspeliensis* Linn. Spec. 422. Willd. Spec. II. p. 65. Lam. Enc. III. p. 277. II. p. 499. Desf. Fl. Atl. 1. p. 285. Brotero Fl. lusit. p. 554. d'Asso Fl. Arrag. p. 42. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 170. Lapeyr. Pyr. 178. All. Ped. 2. p. 165. Vivian. Fl. lyb. p. 19. Balbis Fl. Lyon. 1. p. 755. Boiss. Fl. eur. t. 244. Bot. Mag. 1152. Redout. Lil. 485. *A. monspeliensium* Vill. Delph. II. p. 244. *A. juncea* Parad. lond. t. 9. DIANTHUS *prolifer* Forsk. Fl. Aeg. ar. 25. (fid. spec. sui in Herb. Banks). Bauh. Hist. 3. p. 556. Tournef. Inst. 657. t. 450. Morris. Hist. II. Sect. 5. t. 25. f. 12. Lobel. ic. 454. f. 2. Magn. Monsp. 1. 286.

Rad. repens. Culmi nudi, simplices, cincti basi vaginis uti Junci. Gluma bivalvis, 2-flora: gluma propria etiam 2-valvis. Juncus esset, si corolla careret." Linn. Rad. fibrosa. Caules cespitosi, basi foliis aliquot brevissimis, squama vaginante margine membranacea apice subulato, teretes, glabri, 5-8 poll., erecti vel subadscendentes, striis 6 intensius viridibus. Flores solitarii vel gemini, caerulei; bracteis pluribus (calyx Lam.) scariosis, rufis: 2 exterioribus cuspidibus 3: 2 lateralibus membranaceis, mediâ setaceâ rigida, interioribus 6-12 (quoad numerum florum) oblongis, acutis, integris: intimis longioribus; series interna e squamis alternatim positis, uti perigonii lobi. Perigonium infundibuliforme, parte exsertâ caeruleum, parte absconditâ pallidum, virescens; tubus brevis; lobi oblongi, basi angustati, obtusi vel emarginati, nervo medio intensius caeruleo, 3 exteriora, 5 interiora, basi erecta, superne patentia; basis circa fructum persistens. Stam. tubo adhaerentia; 3 lobis interioribus opposita praecociora longioraque, dimidium loborum vix superantia; filamenta basi albida, apice caeruleo; antherae ovatae, caeruleae, polline albido. Germen liberum ovatum, viride, obtuse trigonum. Stylus basi albus, superne caeruleus. Stigma cristis 4, 3 lateralibus, 1 centrali. Caps. turbinato-trigona, valvulis intus nervo medio prominente. Sem. solitaria in quovis loculo, nigra, sulco tenui. Redout. In Galliae meridionalis, Pedemontii, Hispaniae, Lusitaniae, Barbariae siccis lapidosis. 4.

1585. C O N A N T H E R A.

1. *C. bifolia* Ruiz et Pav.; pedunculis bifloris; petalis variegatis; bulbo articulato, solido. Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 68. t. 501. f. a. Bot. Cab. 904. Bermudiana pulposa flore reflexo caeruleo. Feuill. Peruv. III. p. 8. t. 5. Perennis, glabra. Bulbus uniarticulatus, formâ cucurbitae lagenariae, edulis; radiceulae numerosae, capillares, flexuosae. Scapus $\frac{1}{2}$ ped., erectus, teres, tenuis; squamis 4 remotis, amplexicaulibus, membranaceis, ovato-lanceolatis, semivaginantibus, appressis. Folia 2 radicalia lineari-ensiformia, utrinque attenuata. Flores in racemo brevi cernui. Pedunculi 4-5, alterni, biflori. Bractee ovatae, acutae, semiamplexicaules, nervosae, membra-

naceae. Petala violaceo-caerulea, basi variegata, lanceolata, acuta, marcida spiraliter contorta, 5 alternantia, margine leviter ciliata. Filamenta brevissima, subulata, basi dilatata. Antherae suberectae, longae, luteae, biloculares, rimâ longitudinali utrinque debiscentes, post deflorationem ad medium usque sejunctae. Stylus filiformis, longitudine antherarum. Caps. globosa, magnitudine Pisi, corollae vestigio circulari ultra medium notata. *Ruiz et Pav.* Flores SOLANUM referentes rite notat *Loddiges.* In collibus ventosis regni *Chilensis.* 4.

2. *C. campanulata Hook.*; foliis (tribus) lineari-lanceolatis, longe attenuatis, canaliculatis; perianthio monophyllo, campanulato, sexfido: segmentis aequalibus. *Hooker Exot. Fl. t. 214.* *Graham in Edinb. Philos. Journ. 1825. p. 174.* *C. fol. lin. lanc., humifusis; perianth. laciniis obtusis, patentibus, immaculatis: alternis minoribus, simbriatis. Lindl. in Trans. Hortic. Soc. VI. p. 285.* *C. bifolia Bot. Mag. t. 2496.* (excl. synonym. fide *Hooker*).

Rad. ut videtur bulbosa. Folia apud nos 5 tantum, 8-10 poll., basi apiceque attenuata. Scapus ped., teres, glaber; bracteis remotis, lanceolatis, vaginantibus. Racemus terminalis, simplex. Pedicelli longiusculi, basi bractea parvâ, subulato-membranacea. Perianthium semisuperum, nutans, magnitudine formaque floris CAMPANULAE rotundifoliae, intense purpureo-caeruleum; laciniis ovatis, obtusis, patentibus, serius reflexis, margine ciliatis. Stam. basi perianthii inserta; filamenta brevissima, alba, glabra, basi-bus dilatatis in anulum connata; antherae lanceolatae, flavescenti-virides, apice bifidae, stylum circumdantes et in conum approximatae; loculis 2 longitudinaliter debiscentibus. Germen ovato-globosum, viride, semiinferum, superne obtuse trigonum et in stylum subulatum erectum album attenuatum, triloculare: loculis ovulis pluribus. Stigma acutum. Stamina omnino ut in CONANTHERA bifolia, a qua perianthio monophyllo praesertim diversa. Icon in *Bot. Mag.* melius quadrat in plantam nostram, sed corollae lacinae inaequales et longiores quam in nostra. *Hooker.* Haud paucis differt descriptio a *Graham* l. c. data, ubi: „bulbi (e Chili) solidi, articulati, conici, plani, basi obliqui, ubique proliferi. Folia radicalia 3; caulina amplexicaulia, omnia linearia, plana, costis 3? contiguis flavis incrassatis, subtus prominulis. Caulis erectus, superne ramosus, 1½ ped.. Panicula lara, pedunculis 1-floris. Cor. profunde caerulea, venosa, limbo patente; laciniis 6 concavis, alternis ciliatis; tubo campanulato.“ *Lindley* notat cor. lacinias exteriores concavas, rotundatas; interiores planiores minores, ciliatas, nunquam acutas reflexas vel punctatas. In *Chili.* 4.

Obs. Non ausi fuissimus conjungere „CONANTHERAM bifoliam; foliis lineari-lanceolatis; seapo superno ramoso; pedunculis bifloris: petalis alternis ciliatis“ *Sims* in *Bot. Mag. t. 2196* cum *campanulata Hook.*; nisi *Hooker* hoc suaderet; discrepat enim utriusque icon haud ita paucis. Dubitamus etiam, utrum *C. bifolia Sims* eadem cum *bifolia Ruiz et Pav.*, cum ipse *Sims* petala in icone *Florae peruvianae* et apud *Feuillée* angustiora magisque reflexa dicat. Descriptionem els. *Sims* nullam dedit: monet tantum folia ante anthesin marcescere, foliaque 3 depinxit e bulbo nondum florente 7 pollicaria, 3-4 lin. lata, carinata, mucronata; frustum caulis superne paniculati, ramis 2-3-floris patienti-recurvis; bracteam sub ramo pedunculisque lineares, albas; pedunculos 3 lin.; flores pendulos, subcampanulatos, lilacinos, violaceo-variegatos, 5/4 poll. diametro in limbo patente, tuboque, 1/4 poll.

5. *C. Echeandia Pers.*; scapo simplici, basi folioso; foliis lanceolato-ensiformibus; petalis 3 exterioribus angustissimis; filamentis glandulosis; antheris coalitis. *Pers. Syn.* 1. p. 570. *Poir. Enc. Suppl.* II. p. 526. *Echeandia terniflora*; fol. ensiform. scapo triplo brevioribus; racemo simplici longissimo; floribus ternis. *Orteg. Dec. pl.* p. 90. *Redout. Lil.* VI. t. 315. *ANTHERICUM reflexum*, antheris coalitis. *Cav. ic.* III. p. 21. t. 241. *Willd. Spec.* II. p. 140. *PHALANGIUM reflexum Poir. Lam. Enc.* V. p. 250. *Suppl.* p. 580.

Caulis teres, 2-ped., folio uno alterove, acuto, oblongo. Folia ensiformia, 1½ ped., poll. lata, striata, basi caulem amplexantia aut potius vaginantia. Flores spicati, sparsi, 2-5 in singulis bracteis scariosis acutis; pedicelli inaequales. Cor. patens, lutea; petala ovato-oblonga, subtus linea viridi; 3 inferiora angustiora, acuta, revoluta. Filamenta conniventia squamoso-tuberculata, lutea, apicem versus sensim crassiora. Anthera tubuloso-conica, utrinque 6-crenata, ut in Syngenesiis, lutea. Germen ovato-trigonum. Stylus simplex, antheram vaginatus eaque longior. Stigma crassiusculum. Caps. polysperma. Semina globoso-angulata, minima. *Cav. Hab.?*

Obs. Nec *ANTHERICUM* esse, nec *CONANTHERAM*, sed sui generis ob fructum, quam baccam dicit in *CONANTHERA*, quod, monente *Ruiz et Pav.*, non est; *DIANELLAE* propinquiorem habitu, sed ob capsulam *PHALANGIIS*: *Decandolle ap. Redouté*, ubi radix fasciculata e fibris albis crassis fusiformibus crassitie pennae anserinae; folia pauca, apice attenuata, canaliculata, glabra; scapi 3-4 graciles, teretiusculi, glabri, glauci, simplicissimi; racemus longissimus, laxus; bractea sub ternis quibusvis floribus lanceolato-linearibus, semi-membranacea; pedicelli graciles, arcuati, 6½ lin.; cor. ad basin usque partita in lacinias 6 patentes, subreflexas, quarum 3 exteriores triplo angustiores, apice reflexae, 3 interiores ovatae: omnes obtusiusculae. Filamenta flava, clavata, arcuata, basi laciniarum inserta. Antherae flavae, lineares, in cylindrum coalitae. Germen liberum, viride, prismatico-trigonum, sulcis 6. Stylus filiformis, flavus, staminibus longior, stigmate parvo, globoso.

4. *C. Forsteri Spreng.*; radice fibrosa; foliis linearibus canaliculato-triquetris; scapo superne paniculato; floribus nutantibus; petalis inaequalibus. *Spreng. S. V.* II. p. 91. *ANTHERICUM Adenantha*; foliis linearis-ensiformibus, basi connatis; glandula filamentum inter et antheram. *Forst. prodr.* n. 149. *Willd. Spec.* II. p. 140. *PHALANGIUM Adenantha Poir. in Lam. Enc.* V. p. 252.

Habetur passim pro synonymo *DIANELLAE nemorosae* s. *DRACAENAE ensifoliae Willd.*, quam confer. Si glandula, monente *Forster*, filamentum inter et antheram, vix *CONANTHERA*, sed potius *DIANELLA*. *In Nova Caledonia.* 4.

1386. STYPANDRA.

a. Flores nutantes, pedicellis ebracteatis. Folia caulina disticha, vaginis integris. Semina opaca.

1. *S. glauca R. Br.*; * foliis omnibus distinctis, aversis; baseos margine altero reflexo. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl.* p. 279. Caulis

*) *Cls. Sprengel S. V.* II. p. 87. *STYPANDRAE Brownianae* omnes, servatis intacta nominibus specificis, *ANTHROPODIA* esse jussit.

Caulis $1\frac{1}{2}$ ped., erectus, vaginis tectus, compressiusculus, glaber, apice ramulosus, inferne fere crassitie pennae gallinaceae, glaucescenti-viridis. Vaginae $\frac{3}{4}$ poll., integrae, apice tantum fissae, marginibus suberispis, striatae, carinatae, glabrae, caulem arcte cingentes. Folia graminea, linearia, acuminata, plana, basi carinata, glabra, striata, integerrima, erecto-patentia, baseos margine altero plerumque quidquam reflexo, 5-5-poll., 3 lin. lata, glaucescenti-viridia; suprema ad ramificationes lanceolata, sine vaginis, acuta, 1- $1\frac{1}{2}$ poll., ceterum similia. Paniculae terminales, erectae; pedunculi teretes, glaberrimi, dichotomi, graciles, erecti; pedicelli filiformes, glaberrimi, apice nutantes, graciles, ebracteati, cum flore articulati, 1-flori, infra medium plerumque appendiculo minimo articulum simulante, poll. et ultra. Flores nutantes, 4-6 lin., caerulei, decidui. Cor. lacinae (s. petala) erecto-patentes, integerrimae; 5 exteriores ovato-lanceolatae, acutae, 5-striatae, obscurius caeruleae, lin. latae; 3 interiores ovato-ellipticae, fere obtusae, 5-striatae, nervis 2 obsoletioribus, paulo breviores, $1\frac{1}{2}$ lin. latae, dilutiores. Stamina corollâ duplo breviora; filamenta subaequalia, basi capillaria, glabra, supra medium villis luteis, quidquam curvata; antherae erectae, lineares, obtusiusculae, flavae, lin. longae. Germen subglobosum, glabrum, parvum, coloratum. Stylus tenuis, glaber, erectus, longitudine staminum. Stigma obsoletum, truncatum, glabrum. Ad specim. *Herb. Sieber.* *Circa Port Jackson.* 4.

2. *St. imbricata* R. Br.; foliis imbricatis; baseos marginibus simplicibus. R. Brown *prodr. Fl. nov. Holland. p. 279.*
In ora meridionali nov. Hollandiae. 4.

b. *Flores erecti, pedicellis basi bracteolatis. Folia caulina alterna, basi semivaginantia; radicalia disticha basibus equitantibus. Semina splendentia.*

5. *St. cespitosa* R. Br.; foliis radicalibus (9-12 unc.), ensiformibus, complicatis planisve, margine scabris: caulinis abbreviatis, laevibus, infra divisuram 1-2; corymbi ramis inaequalibus: pedicellis 3-5 umbellatis perianthiisque laevibus. R. Brown *Prodr. nov. Holland. p. 279.*

Caulis erectus, subflexuosus, inferne compressus, glaber, rore glauco ut videtur, foliis circiter 2-3, superne in corymbum patentem divisus, $1\frac{1}{2}$ ped., basi crassitie pennae corvi et ultra. Folia radicalia 4 et plura, disticha, stricta, lineari-ensiformia, acuta, striata, glabra, in siccis plerumque omnino complicata, margine carinâque denticulato-scabra, subinde etiam glabriuscula, ut videtur, glaucescenti-viridia, basi vaginâ fissâ equitante, fuscâ, striatâ, glabrâ, ped., vix ultra lin., expansa $2\frac{1}{2}$ lin., lata; caulina plerumque 2 remota semivaginantia, vaginâ complicatâ, laevia, 1- $2\frac{1}{2}$ poll., ceterum similia. Corymbus patens, laxis, pauciflorus: rami glaberrimi, rigidi, inferiores longiores, 3-5 poll.; ad ramificationes bractea lanceolatâ, acuminatâ, semivaginantia, integerrimâ, glabrâ, appressâ: inferiore 6 fere lin., superioribus sensim minoribus. Pedicelli in apicibus ramulorum plerumque 3-4 umbellati, erecti et erecto-patentes, quidquam compressi, glaberrimi, graciles sed rigidi, apice vix incrassato cum flore articulati, 1-flori, 6-14 lin., singuli basi bracteolâ lanceolatâ, subulato-acuminatâ, glaberrimâ, integerrimâ, erectâ, lin.. Flores caerulei,

4 lin., inexpansi ovato-lanceolati, obtusiusculi, glaberrimi. Cor. lacinae subaequales: exteriores lineari-oblongae, obtusiusculae, obscuriores, 5-nerves, margine submembranaceae; interiores ejusdem formae, obtusae, tenuiores et dilutiores. Stamina corollâ $\frac{1}{3}$ breviora; filamenta erecta; antherae lineares, obtusae, erectae, $1\frac{1}{2}$ lin., flavae. Stylus staminibus brevior, glaber. Germen ovatum, glabrum. *Herb. Sieber. Circa Port Jackson. 4.*

4. *St. umbellata R. Br.*; foliis radicalibus (4-8 unc.) angusto-linearibus, margine laevibus; corymbi ramis alternis; pedicellis 2-3 umbellatis perianthiisque glabris. *R. Brown prodr. Fl. nov. Holland. p. 279.*

Caulis erectus, teres, inferne compressus, glaberrimus, tenuis, crassitie fili emporetici, 1- $1\frac{1}{2}$ fere ped. Folia radicalia pauca, disticha, stricta, linearia, acuta, striata, glabra, margine laevia vel obsolete denticulata, pallide viridia, basi vaginâ equitante striatâ glabrâ purpurascens; 6-7 circiter poll., $\frac{3}{4}$ lin. lata; caulina plerumque 2, remota, semivaginantia, laevia, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ poll. Corymbus rarus, erectus; rami erecto-patentes, teretes, glaberrimi, tenues sed rigidi, simplices, poll. et ultra; basi bractea ovato-lanceolatâ, acuminatâ, subcarinatâ, integerrimâ, glaberrimâ, inferiore 3 fere lin., superioribus minoribus. Pedicelli 2-3 umbellati, rarius solitarii, filiformes, erecto-patentes, teretes, apice cum flore articulati, 1-flori, 8-12 lin.; singuli basi bracteolâ ovato-lanceolatâ, subulato-acuminatâ, glaberrimâ, $\frac{3}{4}$ lin.. Flores caerulei, 4 lin.; inexpansi lanceolati, acutiusculi. Cor. lacinae subaequales; exteriores lineares, obtusiusculae, obscuriores, striatae; interiores paulo breviores et latiores, oblongae, obtusae, tenuiores, dilutiores, medio tristriatae. Stamina corollâ $\frac{1}{3}$ breviora; filamenta glabriuscula, supra medium luteo-villosa, incrassata et quidquam incurva; antherae lineares, obtusae, flavae (?), effetae revolutae. Stylus staminibus brevior, glaber, erectus. Germen ovatum, obtusum, glabrum. Capsula ovata, glabra, trisulca, apice styli rudimento coronata, basi corollae rudimentis cincta. Semina 1-2 in quovis loculo, reliqua abortiva, ovalia, dorso convexo, glabra, nigricantia. *Herb. Sieb. Circa Port Jackson. 4.*

5. *St. scabra R. Br.*; foliis radicalibus linearibus, complicatis planisve; caulinis 3-5 subsimilibus; corymbi pedicellis alternis, perianthiisque hispidulis. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holland. p. 279.*

In novae Hollandiae ora meridionali. 4.

c. *Spuriae; filamentis glabriusculis.*

6. *St. ? caerulea R. Br.*; foliis ensiformibus; panicula longissimâ; floribus caeruleis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 67. (sub ANTHEMICO caeruleo ut Spreng. S. V. II. p. 85.) PHALANGIUM caeruleum Pers. Syn. 1. p. 368. Poir. Enc. Suppl. IV. p. 581. Bermudiana caerulea. Feuill. II. p. 715. t. 8. Glabra. Radix fasciculata, fibrillosa, odore Iridis florentinae. Caulis teres, nitidus, erectus, 2-ped., gracilis, parum foliosus. Folia radicalia disticha, imbricata, striata, nervo per dorsum acutum, 2-3 palmaria, 3 lin. lata; inferiora deflexo-patentia; supe-*

rora erecta; caulina 2-3, semiamplexicaulia, remota. Panicula terminalis. Pedunculi 3-6-flori, longi, bracteis lanceolato-linearibus. Pedicelli 1-flori, bracteis minimis. Cor. obscure caeruleae, marcida spiraliter contorta. Petala nitida; 3 interiora latiora, exteriora subcarinata. Filamenta subulata, 3 alterna paulo breviora. Caps. turbinata. *Ruiz et Pav.* Habitu florumque colore *Stypandris* similis, sed filamenta imberbia. Descriptioni in *Ruiz et Pavon* sequentia tantum addenda: folia radicalia subdisticha, basi subcomplicata et in vaginam fere equitantem tenuem pallide fuscam subventricosam dilatata, ceterum plana, carinata, 12-16 poll., 3-4 lin. lata; caulina 2 basi semivaginantia, 2-5 poll., acuminata. Caulis cum panicula fere 3 ped., crassitie pennae anserinae. Panicula 11 poll.; rami erecto-patentes, alterni, inferiores ramulosi, subcompressi; ramuli laxe racemosi, 4-6-flori. Pedicelli primum subnutantes, serius erecti, 1-5 lin.; bracteolae ovatae, acuminatae, fuscescentes, vix lin.. Cor. lacinae 6 lin.: exteriores oblongae, dorso 5-nerves, obscure caeruleae; interiores ellipticae, latiores, tenuiores, cyanae. Filamenta corollae $\frac{1}{3}$ breviora, erecta, subulata, glabra, alterna breviora: antherae oblongae, obtusae, basi emarginatae, dorso paulo supra emarginaturam affixae, flavae, fere lin.. Stylus longitudine staminum, filiformis. Stigma trifidum. Ad specimen chilense in Herb. cli *Martius.* In umbrosis Chili, praesertim prov. Conceptionis, St. Jacobi, Itatae, Rere. 4.

7. *St.?* *coarctata* *R. Br.*; foliis inferne carinatis, medio coarctatis; pedunculis bifido-dichotomis; pedicellis subumbellatis; filamentis ad medium incrassatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 67. t. 299. f. a.* (sub *ANTHERICO coarctato*). *PHALANGIUM coarctatum Pers. Syn. 1. p. 568.* *Poir. Enc. Suppl. IV. p. 391.* *CAESIA coarctata Spreng. S. V. II. p. 88.*

Glabra, speciosa. Rad. fasciculato-ramosa, fibrillosa. Caules plures, ulnares, erecti, foliosi, geniculati, internodiis angulati, purpurei, compressi. Folia alterna, ensiformia, a basi ad medium usque carinata, dein coarctata, superne plana, subtus glauca, striata, fere 2 ped., fere poll. lata, amplexicaulia, erecto-patula; floralia lanceolata, amplexicaulia. Pedunculi axillares, in paniculam diffusam distantes, bifido-dichotomi. Pedicelli 4-5, subumbellati, inaequales, filiformes; bracteis subulatis, inaequalibus. Cor. violaceo-caerulea, patens, marcescens. Filamenta subulata, medio incrassata. Antherae luteae. Caps. pendula, obovata, obtusa, trigona, ad medium usque trivalvis; valvulis septiferis patulis. Semina atra, nitida. *Ruiz et Pav.* In montibus Andium Peruviae ad Tambillo et Pillao. 4.

1387. THYSANOTUS. *)

a. *Hexandri.*

1. *T. tuberosus* *R. Br.*; bulbis fasciculatis, pedicellatis;

*) Herbae perennes. Rad. fibrosa vel e bulbis fasciculatis, carnosis. Folia anguste linearia, saepius canaliculata, quandoque filiformia vel abbreviata. Flores terminales, umbellati, raro sparsi; pedicellis medio articulatis. Perianthii foliola intus caerulea, extus calycina. Antherae purpureae, loculorum valvulae exteriori productione; exteriores quandoque albicantes, in triandris deficientes. Capsula perianthio emarcido tecta. Semina atra, margini interiori saepe in pedicelli speciem attenuatae, strophiole albae cyathiformis vasculosae "(sic)" inserta. *R. Br.*

foliis radicalibus canaliculatis, laxis, glabris, caule tereti, laevi, supra paniculato parum brevioribus; umbellis 2-3-floris; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 283.*

Ad Portum Jackson. 4.

2. *T. Banksii R. Br.*; bulbis fasciculatis; foliis radicalibus, laxis, caulem teretem simplicem laevem aequantibus; umbellis alternis, 5-8-floris; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr. p. 283.* α ; umbellis sessilibus. β ; umbellis pedunculatis. (An distincta species)?

Ad littora Novae Hollandiae intra tropicum. 4.

3. *T. Baueri R. Br.*; bulbis?; foliis radicalibus caule tereti indiviso multoties brevioribus, laxis, glabris; umbellis alternis, sessilibus, paucifloris; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr. p. 283.*

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. 4.

4. *T. elatior R. Br.*; bulbis?; foliis radicalibus canaliculatis, laxis, glabris, caule tereti, laevi (1- $\frac{1}{2}$ ped.) parum brevioribus; ramis alternis, subsimplicibus; umbellis 2-3-floris; pedicelli articulo inferiori involucris duplo longiore; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr. p. 283.*

Ad Portum Jackson. 4.

5. *T. paniculatus R. Br.*; bulbis fasciculatis; foliis radicalibus canaliculatis, laxis, glabris, caule tereti laevi infra simplici supra paniculato parum brevioribus; pedicellis solitariis; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr. p. 283.*

Ad littora Novae Hollandiae intra tropicum. 4.

6. *T. isantherus R. Br.*; bulbis fasciculatis; foliis radicalibus canaliculatis, caulem teretem laevem subsimplicem fere aequantibus; umbellis 4-5-floris; antheris aequalibus. *R. Brown Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 283. Bot. Reg. 655. F. G. Mag. VII. t. 23.*

Radix e tuberibus oblongis carnosis fasciculatis. Caules ped., apice ramosi; ramis alternis, basi bracteis lanceolatis, acutis. Folia 4-5, erecta. Umbellae 2-5-florae. Pedunculi flore breviores, medio articulati; bracteis lanceolatis, acutis, articulo brevioribus. Cor. purpureo-violaceae, patentes; lacinae exteriores paulo breviores lanceolatae, acutae, 4-plo angustiores, extus virescentes margine albido, intus violaceae, margine pallidiores, medio basique intensius coloratae; interiores ovales, obtusae, ciliis longissimis densis concoloribus, extus caerulescentes costâ viridi, intus violaceo-purpureae, costâ media intensiore. *Ad iconem. Bauer. 4.* *Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. D.*

7. *T. gracilis R. Br.*; radicibus fibrosis: rhizomate incrassato; caulibus subramosis, filiformibus, laevibus; ramis supra striato-angulatis; stipulis caulinis filiformibus; floribus

solitariis geminisve; antheris aequalibus. *R. Brown Prodr.*
p. 283.

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. 4.

8. *T. elongatus* *R. Br.*; caule ramosissimo, laevi, multistriato; ramulis tetragonis, subunifloris; stipulis caulinis scariosis; pedicellis perianthio brevioribus. *R. Brown Prodr.*
p. 283.

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. 4.

9. *T. junceus* *R. Br.*; radicibus fibrosis; caulibus ramosis, diffusis, teretibus, striatis: ramulis subangulatis; foliis radicalibus abbreviatis caulisque strictis, patenti-erectis; umbellis paucifloris; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr.*
p. 283. *Bot. Reg.* 656. *Bot. Mag.* 2351. *Fortg. Gart. Mag.* VII. t. 25. CHLAMYSPORUM *juncifolium* *Salisb. Parad. Lond.* 103. (bene si ex sicco, pessime si ex recenti: fructus forsitan *Th. Banksii*, monente *R. Brown*).

Herba cespitosa. Caules ped. vel ultra, plures, cinereo-virentes, fastigiato-ramosi, crassitie fere pennae corvinae: rami alterni, distantes, basi foliolis 2 oppositis, subulatis. Folia lineari-subulata, semiteretia, canaliculata, radicalia pauca, erecta, 1½-2 unc., caulina breviora, paucissima. Umbellae terminales, 5-6-florae. Flores valde fugaces. Pedunculi successivi, flore breviores, teretes, infra medium articulati; bracteis ovato-acutis, mucronatis, margine scariosis, articulo inferiore brevioribus, appressis. Cor. rotata, unciam diametro excedens, tota intus purpurâ violaceâ micans, basi breve connivens; lacinae aequilongae: exteriores pluries angustiores, lineares, mucronatae, recurvato-patentes, persistenter conniventes, extus virentes, apice pulverulento-pubescentes; interiores ovaes, ciliis profundis, dense articulatis, concoloribus, mucronatae, costâ mediâ intus intensiore, extus virente. Stamina interiora longiora, declinata, corollâ ⅓ fere breviora, exteriora adscendentia; filamenta viridia vel flavescens, aequalia, tereti-compressa, antheris breviora; antherae purpureo-fuscae, basi subsagittato-muticae, biloculares, apice per rostellum duplex introrsum dehiscentes; interiores plus duplo longiores, subulato-lineares; exteriores lineari-oblongae, obtusae. Germen viride, glabrum, ellipticum, obsolete angulosum, loculis biseriatis polyspermis. Stylus albus (purpureus *Bot. Mag.*), staminibus interioribus aequalis (longior *Bot. Mag.*), filiformis, curvato-inclinatus, germine pluries longior. Stigma punctum pruinatum inconspicuum. *Bot. Reg.* *In Nova Hollandia.* 4.

10. *T. sparteus* *R. Br.*; radicibus fibrosis: rhizomate perenni, incrassato; caule tereti, subtilissime striato, stricto, apice paniculato; stipulis adpressis, scariosis, distantibus; umbellis paucifloris; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr.*
p. 284.

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. 4.

11. *T. deformis* *R. Br.*; radicibus?; caule tereti, striato,

laevi, ramoso; ramis falcatis flexuosisve; umbellis 2-3-floris; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr.* p. 284.

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. 4.

12. *T. volubilis* *R. Br.*; radicibus?; caule volubili, sulcato; ramis simplicibus, angulatis, strictis; umbellis paucifloris; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr.* p. 284.

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. *D. Bauer.* 4.

13. *T. divaricatus* *R. Br.*; radicibus fibrosis; foliis radicalibus cauleque (vix $\frac{1}{2}$ ped.) striato hispidulis; ramis dichotomis, divaricatis, striato-angulatis, glabris; floribus solitariis. *R. Brown Prodr.* p. 284.

An sequentis varietas? quaerit *R. Brown.* *Sprengel* S. V. II. p. 90 sine dubio conjungit utrumque. *Ad oram meridionalem Novae Hollandiae.* 4.

14. *T. dichotomus* *R. Br.*; radicibus fibrosis; foliis radicalibus hispidulis; caule ($1\frac{1}{2}$ ped.) supra dichotomo, tereti, striato; ramulis modice patentibus; floribus 1-3; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr.* p. 284. (ex ic. et descr. *Labill.*)

ORNITHOGALUM dichotomum; petalis alternis ciliatis; caule dichotomo, subaphyllo; filamentis subulatis. *Labill. Nov. Holl.* 1. p. 85. t. 109. *Poir. Enc. Suppl.* IV. p. 196.

Radix vix tuberosa. Caules $1\frac{1}{2}$ ped., ramosissimi; rami dichotomi. Folia omnia fere radicalia, angusta, linearia, quidquam striata, subciliata, caulibus 4-6 plo breviora. Ad dichotomias folium minutissimum lanceolatum. Flores terminales. Petala lanceolata, 3 interiora intus purpurea, ciliis purpureis; 3 exteriora virescentia. Stamina sub corolla inserta, petalis opposita. Filamenta plana, subulata. Antherae versatiles, lanceolatae. Caps. ovata, 3-sulcata; valvulis 2-spermis. Semina ovata, tenuiter punctata, lucida, nigricantia. *Labill.* *Ad oram meridionalem Novae Hollandiae, in Terra van Leuwin.* 4.

15. *T. flexuosus* *R. B.*; radicibus fibrosis; foliis radicalibus compresso-filiformibus, hispidulis; caulibus a basi dichotomis, ramosissimis, divaricatis; ramis inferioribus striato-angulatis, scabriusculis; mediis tetragonis ultimisque laevibus ancipitibus; floribus solitariis; antheris inaequalibus. *R. Brown Prodr.* p. 284.

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. 4.

16. *T. Menziesii* *R. Br.*; radicibus?; caule infra simplici, striato, basi attenuato, laevi, supra paniculato volubili; ramis ramulisque tetragonis; ultimis brevissimis; floribus solitariis; bracteis pedicellum subaequantibus. *R. Brown Prodr.* p. 284.

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. *Menzies.* 4.

17. *T. Patersoni* *R. Br.*; bulbis fasciculatis, sessilibus; caule infra simplici, rectiusculo, striato, basi attenuato, laevi, supra volubili, angulato, dichotomo; floribus solitariis; pedi-

cello bracteis obtusis duplo longiore. *R. Brown Prodr.*
p. 284.

In insula van Diemen. Paterson. 4.

** *Triandri.*

18. *T. triandrus R. Br.*; radicibus fibrosis; foliis linearibus, longitudinaliter ciliatis, scapum laevem simplicissimum aequantibus; umbellâ multiflorâ; pedicellorum articulo inferiore bracteis aliquoties longiore. *R. Brown Prodr.* p. 284. (ex ic. et descr. *Labill.*) ORNITHOGALUM *triandrum*; petalis alternis ciliatis: pedunculis in scapo compresso umbellatis, articulatis; filamentis subulatis. *Labill. Nov. Holl.* 1. p. 84. t. 110. *Poir. Enc. Suppl.* IV. p. 197. (THYSANTHUS *triandrus Steudel Nomencl. sphalmate*).

Radix quidquam tuberosa. Folia omnia radicalia, angusta, scabra, quidquam carnosâ, leviter striata. Scapi 6-7 poll., compressi, longitudine foliorum, inferne scabri. Pedunculi subaequales, 2-poll. et ultra, uniflori, glabri, teretes, articulati, basi bracteis brevibus, ovatis, lanceolatis. Petala 5 interiora ciliata, intus purpurea. Stamina petalis interioribus opposita. Reliqua ut in *Th. dichotomo. Labill.* *Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. 4.*

19. *T. multiflorus R. Br.*; radicibus fibrosis; foliis radicalibus linearibus, planiusculis, scapum simplicissimum, teretem, laevem subaequantibus: marginibus apice scabriusculis; umbellâ multiflorâ; pedicellorum articulo inferiore vix longitudine bractearum. *R. Brown Prodr.* p. 285.

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. 4.

20. *T. pauciflorus R. Br.*; radicibus fibrosis; foliis radicalibus compresso-filiformibus, scapum teretem simplicissimum subaequantibus: marginibus longitudinaliter laevibus; involucri 1-4-floro. *R. Brown Prodr.* p. 285.

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. 4.

21. *T. hispidulus R. Br.*; radicibus fibrosis; foliis radicalibus compresso-filiformibus, undique hispidulis, scapo scabriusculo simplicissimo (unciali) longioribus; umbellâ pauciflorâ. *R. Brown Prodr.* p. 285.

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae. 4.

1588. A R T H R O P O D I U M.

1. *A. paniculatum R. Br.*; racemo diviso: pedicellis aggregatis; perianthii foliolis interioribus crenulatis; capsulis pendulis; bulbis pedicellatis. *R. Brown prodr. Fl. nov. Holl.* p. 276. *Hort. Kew. ed. 2. II.* p. 271. *Bot. Mag.* t. 1421. ANTHERICUM *paniculatum Andr. Repos.* 395. *Dryand. Chlor. etc. Ann. of Bot.* II. p. 517. ANTHERICUM *milleflorum*; fol. subcarinatis; filamentis barbatis; pedicellis aggregatis.

gatis, medio articulatis; corollae laciniis 5 internis patulis, serrulatis: externis reflexis, integerrimis. *Rédout. Lil. 58.*

PHALANGIUM paniculatum Poir. Enc. Suppl. IV. p. 385. PHALANGIUM milleflorum Hort.

Rad e fibris albidis, subcarnosis, subtuberosis, subteretibus. Folia radicalia, pauca, divaricata, graminea, plicato-canaliculata, intense viridia, pedalia et ultra; ad basin caulis 2-3 plana, semi-amplexicaulia, brevia, bracteiformia, remota. Caulis erectus, gracilis, teres, 2-4-ped., superne paniculatus. Racemus laxus, paniculatus: partiales solitarii geminive, fasciculis florum distantibus, numerosis, 2-4-floris, secundis. Bracteae parvae, foliaceae, acutae, e quarum axillis pedicelli 4-6 graciles, filiformes. Flores $\frac{1}{2}$ poll. diametri, albi, violaceo-variegati, magnitudine *BULBINES annuae*. Corollae lacinae exteriores firmae, ovali-lanceolatae, concavae, acutae, apice quidquam callosae, extus purpurascens, intus albae: interiores ovatae, obtusae, tenerae, triplo latiores, lateribus deflexis, rotundatae, albae, nervo longitudinali viridi. Filamenta alba, nervo longitudinali viridi, ad medium usque glabra, dein barbâ densâ flavâ. Antherae apice quidquam curvatae, violaceae, polline luteo. Germen violaceum, striis 6 albis, elliptico-subglobosum, subtrigonum, trisulcum, triplo brevius stylo filiformi, albo, apice violaceo, stigmate purpureo, sub lente ciliato. *Red. et Gawl. In Nova Hollandia circa P. Jackson. 4.*

Obs. Clo Ker in *Recens. Liliac. Red. Journ. of Science N. II. p. 181* huc quoque *PHALANGIUM pendulum* Red. spectare videtur, quod iterum denegat *Redouté*, monens, *A. pendulum* non spectare ad *ARTHROPODIUM*, cum petala interiora non sint undulata. Etiam nobis *A. pendulum* certe differre videtur ab *A. paniculato*.

2. *A. pendulum Dec.*; foliis linearibus, carinatis, scapo ramoso brevioribus; floribus ternatim aggregatis, pendulis; corollis reflexis; filamentis papillosis. *Willd. Enum. h. berol. p. 571.* (sub *ANTHERICO pendulo* uti:) *Hornem. Hort. hafn. 1. p. 553.* *A. racemo* diviso; pedicellis aggregatis; perigonii foliolis interioribus integris; capsulis pendulis; tuberculis radicum pedicellatis. *Decand. Cat. H. Monsp. p. 80. Spreng. S. V. II. p. 87. A. elongatum Dec. H. monsp. Ms. PHALANGIUM pendulum Réd. Lil. t. 360. ANTHERICUM multiflorum Hortul.*

Folia radicalia pauca, flaccida, plana, fere linearia, utrinque attenuata, acuta, obsolete nervosa carinataque, saepius quidquam undulata, lucida, $\frac{1}{2}$ -1 ped., 2-3 $\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapus $1\frac{1}{2}$ -3 ped. erectus, glaber, folio uno vel altero lanceolato, basi dilatato, acuto, carinato, erecto, 1-2 poll.; rami 1-3, rarius nulli, erecto-patentes, apice nutantes. Bracteae ad ramificationes lanceolato-subulatae, basi dilatata marginibusque membranaceae, virides, 3-4 lin. Racemi laxi, multiflori, apice nutantes. Pedicelli plerumque 3, saepius 2, rarius 1, penduli, capillares, purpureo-fuscescentes, medio articulati, apicem versus quidquam incrassati, 5-6 lin., secundi; basi bractea ovata, acuta, fuscescente, margine membranacea, lin. longa. Corollae purpurascens, post anthesin convolutae, saepius abortientes et mox a pedicellorum articulo deciduae; petala 3 exteriora oblonga, acutiusecula, margine submembranaceo pallidiora; interiora angustiora, palli-

diora, nervo medio intensiore, margine albido membranaceo, diaphano, vix undulato; omnia $1\frac{1}{2}$ lin. Filamenta germine longiora, petalis paulo breviora, albida, a medio ad apicem barbâ flavescente. Antherae oblongae, polline flavo. Stylus erectus, longitudine staminum, germine duplo longior, flavescens. Capsula trisulca, rudimento styli coronata, plerumque petalis persistentibus involuta, magnitudine seminis Cannabis. Semina nigra. Ad specim. cultum. *In Nova Hollandia.* 4.

3. *A. strictum* R. Br.; racemo subsimplici, multifloro; pedicellis solitariis; capsulis erectis. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holland. p. 276.*

In insula van Diemen. 4.

4. *A. minus* R. Br.; racemo simplici, paucifloro, (multifloro in cultu *Bot. Reg.*); pedicellis solitariis, (2-5 *Bot. Reg.*); bulbis sessilibus. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 276. Bot. Reg. t. 866. Lindl. in Trans. Hort. Soc. T. VI. p. 278.*

Herba $1\frac{1}{2}$ ped., gracilis, glaberrima, glaucescens. Folia radicalia, lineari-lanceolata, subcanaliculata, erecta, obscure striata, scapo multo breviora. Scapus erectus, subflexuosus, divisus, ad ramificationes foliosus. Racemi cernui, multiflori; pedicellis aggregatis, 2-5, raro solitariis, medio articulatis; bractea communi ovato-lineari, partialibus minutis squamiformibus. Perianthium album, reflexum, post anthesin convolutum, assurgens; petalis exterioribus oblongis, angustis; interioribus duplo latioribus, margine crispis. Stam. sub germine inserta, erecta, petalis paulo breviora, regularia; filamentis supra medium villosis, flavis; antheris linearibus, purpureis, innatis, polline albo. Germen parvum, subrotundum, glabrum, 6-nerve. Stylus declinatus, purpureus. Stigma punctum fimbriatum. *Bot. Reg. Circa P. Jackson.* 4.

Obs. Ulterius adhuc inquirendum, an planta in *Bot. Reg.* depicta verum sit *A. minus* R. Brown, cum haud paucis abluat. *ANTHROPODIUM laxum* R. Brown (?) in *Sieber Herb. nov. Holl. n. 164.* hujus varietas vel nova species, quam ex unico specimine incompleto statuere non audemus: scapus solitarius e centro foliorum, simplicissimus, nudus, erectus, teres, glaber, cum racemo ped.; folia radicalia scapo 2-3 plo breviora, plura, linearia, acutiuscula, basi in vaginam albidam dilatata, erecta, angustissima, subcarinata, glabra, 3-4 poll., vix $\frac{1}{2}$ lin. latiora; racemi laxi, indivisi, rari, 5-poll.; flores plerumque gemini, altero plerumque minori, sub florescentia penduli; pedicelli filiformes, graciles, teretiusculi, glabri, supra medium articulati, $\frac{1}{2}$ poll. longioresque; bractea e basi ovata concava margine membranacea subulato-acuminatae, pedicellos subaequant, glabrae, sub lente marginibus carinaeque scabriusculae, pallide virides; bracteolas 2 parvas scariosas albas nervo medio purpurascens ovatas acuminatas includentes; corolla profunde 6-partita, subaequalis, persistens, purpurascens (?), 5 lin.; lacinae lanceolatae, acutae, integerrimae (?), 3-striatae, margine submembranaceae, lin. fere latae; filamenta corollae breviora, basi corollae inserta, linearia, albida, superne barbata, aequalia, antheris paulo breviora; antherae lineares, obtusae, caeruleae, 2 lin.; stylus stamina aequans, apice incrassatus, erectus, albidus; stigma obsoletum, sub lente puberulum; germen ovatum, filamenta subaequans, glabrum, pallidum.

5. *A. cirrhatum* R. Brown; racemo diviso; bracteis foliaceis; pedicellis fasciculatis; petalis interioribus integerrimis; filamentorum dimidio barbato, basi 2-appendiculato; foliis lanceolato-ensiformibus. *R. Brown Bot. Mag. 2550. Bot. Reg. 709. ANTHERICUM cirrhatum; foliis lanceolatis,*

planiusculis; scapo paniculato; filamentis barbatis, bicirratis. *Forst. Prodr.* n. 148. *Willd. Spec.* II. p. 146. ANTHERICUM *latifolium* Banks et Soland. *Mss.*

Differt ab *ARTH. paniculato*: foliis multo majoribus; bracteis revolutis; floribus majoribus albis; ab omnibus reliquis: appendicibus calcariformibus majoribus ad basin partis barbatae filamentorum; radice crassiore, fere tuberosa. *Gawl.* Folia carinata, mucronato-acuminata, striata, lacte viridia, margine tenui albidis, $1\frac{1}{2}$ - 2 fere poll. lata. Scapus paniculatim divisus: ramis fere horizontalibus, rigidulis, teretibus. Flores bini ternive, nutantes, fere $\frac{1}{2}$ poll., pedicello longiores. Bractee lanceolatae, acutae, striatae, virides, revolutae, pedicellis longiores brevioresque. Lacinae albae, reflexae, exteriores lanceolatae apice atropurpureo (in *Bot. Reg.* omnino albae), acutae, duplo angustiores interioribus ovatis, 5 - 7 lin. longae. Stam. erecta, corollâ breviora, superne barbâ violaceâ, inferne appendicibus 2 luteis. Antherae virescentes, revolutae. Stylus longitudine staminum. Germen ovatum, viride. Ad ic. in *Bot. Mag.* In *Nova Zeelandia.* 4.

6. *A. fimbriatum* R. Br.; racemo simplici; pedicellis inferioribus geminis; filamentis infra imberbibus, apice strumoso, stuposo; antheris linearibus; foliolis perianthii interioribus fimbriatis. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl.* p. 276.

A reliquis structurâ staminum multo differt: an proprii generis?

R. Brown l. c. Circa *P. Jackson.* 4.

1389. B U L B I N E.

a. *genuinae: floribus luteis:*

a. *foliis teretibus vel subtriquetris:*

1. **B. frutescens* Willd.; foliis carnosis, teretibus, (viridibus); caule fruticoso, erecto, ramoso. *Willd. En. H. berol.* p. 372. ANTHERICUM *frutescens* Willd. *Spec.* II. p. 142. *Linn. Spec.* 445. *Mill. dict.* n. 4. *H. Kew. ed. 2.* II. p. 269. *Rédout. Lil. V. t.* 285. *Decand. pl. Grass. t.* 14. *Gawl. Bot. Mag.* 816. BULBINE *caulescens* Linn. *Hort. Cliff.* 122. *Dill. Elth.* 510. t. 251. f. 298. *Pluk. Am.* p. 168. *Till. pis.* p. 17.

Rhizoma caulescens, rufescens, pollicis crassitie, apice subinde radicans, foliis siccis, infra emarcidis, persistentibus vestitum. Folia subulato-acuminata, 7 - 8 poll., supra quidquam planiuscula, basi dilatata, primum erecta, dein patula vel pendula. Inter folia pedunculi emergunt $1\frac{1}{2}$ ped., basi planiusculi, racemo oblongo conico terminati. Pedicelli bractea fulti parvâ, spathaceâ, basi lacera, fimbriatâ. Flores flavi, stellato-patentes; petala oblonga, plana, striâ longitudinali virente. Filamenta erecta, lutea. Antherae rotundatae, luteae. Germen stylusque virent. Caps. obtuse trigona. Semina 3 - 4, tetraëdra, nigra. *B. longiscapae* et *rostratae* valde affinis, sed altior, foliisque haud adeo insigniter glaucis. In *Prom. b. spei.* 4.

2. *B. rostrata* Willd.; foliis carnosis, teretibus, (subn.

latis), glaucis; caule brevissimo, fruticoso, radicante. *Willd. Enum. H. Berol. p. 372. ANTHERICUM rostratum Willd. Spec. II. p. 145. Jacq. Coll. Suppl. 82. Icon. II. t. 405.*

Proximum *B. frutescenti*, a quâ praesertim foliis glaucis diversa. *Willd.* Rad. digitum minimum crassa, brevis, fibris plurimis aurantiaco-fuscis. Caulis digitum crassus, foliorum reliquiis scaber, multiceps. Folia pulposa, mucrone innocuo, sessilia, approximata, numerosa, glabra, glauca, 6-10 unc., calamum crassa, interiora erecta, reliqua recurva. Racemus subterminalis, teretiusculus, fere calamum crassus, glaber, simplex, erectiusculus, tandem $1\frac{1}{2}$ ped.. Flores numerosi, inodori, toti flavi. Pedicelli $1\frac{1}{2}$ poll., patentissimi, bracteis membranaceis, ovato-cuspidatis. Petala lanceolato-oblonga, obtusiuscula, subtus lineâ longitudinali, viridi, patentissima vel reflexa. Germen subrotundum, sexsulcum, glabrum, viride. Stigma trifidum. Caps. parva, subrotunda, triquetra, nigricans, glabra. Semina subovata, acuta, hinc convexa, inde angulata, nigricantia. *Jacq. In Promontorio b. spei.*

5. *B. longiscapa Willd.*; foliis carnosis, subulatis, semiteretibus, flexuosis, glaucis, (margine laevibus), scapo triplo brevioribus; (pedunculis patentissimis). *Willd. Enum. h. berol. p. 372. ANTHERICUM longiscapum Willd. Spec. II. p. 145. A. caulibus fruticosis, brevissimis etc. Jacq. Coll. Suppl. 84. ic. rar. II. t. 404. Red. Lil. 425. Bot. Mag. 1339, quo teste: A. asphodeloides H. Kew. 1. ed. I. p. 450. (excl. syn. Linn. Willd. Jacq. et Mill.) A. altissimum Mill. Dict. ed. 8. n. 8. ic. fol. 26. t. 59.*

Sempervirens, glabra. Rad. digitum et ultra crassa, fusca, multiceps. Caules brevissimi, fere digitum crassi, radicantes: unde cespes, e quo folia aggregata scapique. Folia acuta, supra plana, pulposa, basi mutuo amplexantia, ad oras laevissima, (qua nota facile a *B. asphodeloide* distinguitur), firmula, 8 circiter poll., extrema pauca patentissima, reliqua erecta. Scapi simplices, triquetri, basi adscendentes, calamum crassi, firmi, erecti, glauci, $1\frac{1}{2}$ ped., racemo terminali iterum $1\frac{1}{2}$ ped.. Bracteae subulatae, breves, fuscescentes, basi utriusque membranâ albâ, ad oras lanato-ciliatâ. Pedunculi numerosissimi, glabri, 5 poll., virides, patentissimi, demum revoluti. Petala lanceolata, obtusa, reflexo-patentissima, utrinque flava lineolâ mediâ viridi: alterna 5 angustiora. Filamenta flavescentia, uti antherae erectae, didymae. Stylus crassus, erectus, flavus. Stigma simplex, acutum. *Jacq.* Folia $\frac{1}{2}$ -1-ped., basi 4 lin. lata, et membranâ angustâ glabrâ integerrimâ marginata. Pedunculi pollicares, corollâ duplo et ultra longiores, virides, basi purpurascens, bractea iisdem paulo brevior, basi albâ lacerato-dentatâ, apice punicea. Differt a *Bulb. asphodeloide* foliis intense glaucis, multo longioribus, integerrimis nec denticulatis; scapo subinde 5-ped., multo longiore; racemo longiore; corollâ minore, pallidior. *Gawl.* Planta *Milleri* acaulis. Planta a *Redoute* depicta differt foliis supra canaliculatis; pedunculis $4\frac{1}{2}$ lin., bracteis parvis, subulatis, scariosis, laceris; petalis 3 exterioribus extus fuscis striâ media testaceâ, intus flavis, 3 interioribus flavis striâ fusca; staminibus

corollâ brevioribus, basi ad $\frac{1}{3}$ nudis; stylo longitudine corollae apice attenuato; stigmatibus capitato. *In Prom. b. spei.* 4.

4. *B. favosa*; (radice subconicâ, subtus convexo-planâ); foliis carnosissimis, semiteretibus, glabris, scapo brevioribus; racemo erecto, longissimo; (pedunculis erectis). ANTHERICUM *favosum* *Thunb. Prodr.* p. 65. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 321.

A divo *Willdenow*, cum? licet, ad *A. longiscapum* ductum, differre videtur ex sequente descriptione: „Rad. carnosâ, subconica, subtus convexo-plana, laevis, fibrosa, magnitudine Rapae mediocris; fibrae marginales. Folia radicalia, 3 vel plura, apice attenuata, glabra, erecta, spithamaea et ultra. Scapus solitarius, simplex, teres, glaber, flexuoso-erectus, $1\frac{1}{2}$ -3 ped.. Racemus sensim florens, palm.- $1\frac{1}{2}$ ped.. Pedunculi erecti, capillares, unguiculares, superiores magis approximati.“ *Thunb. In campo arenoso extra Cap.* 4.

5. *B. asphodeloides*; foliis carnosissimis, lineari-subulatis, semiteretibus, strictis, (margine scabris, glaucis; racemo elongato; pedunculis patulis). ANTHERICUM *asphodeloides* *Linn. Spec.* 446. *Willd. Spec. II.* p. 144. *Mill. Dict.* n. 6. *Lam. Enc.* 1. p. 199. *Roth Obs. in Röm. Arch.* 1. p. 33. *Jacq. H. Vind.* t. 181. *Scop. Del. Fl. et Faun. insub.* III. p. 70.

„Folia vix striata; sed stricta, margine aspera, dorso versus alterum latus gibbosiora. *Linn.* Rad. e fibris numerosis, flavescens, amaricantibus. Scapus pedalis, suberectus, glaber, obsolete angulatus, plane aphyllus, ad foliorum altitudinem abit in racemum longum, rarum. Pedunculi proprii $\frac{1}{2}$ poll., patuli, bractea setacea, albidâ, membranacea. Flores odore citri, paucissimi simul florescentes. Petala lutea lineâ mediâ virente, patentissima. Filamenta lutea villis concoloribus, antheris fulvis. Stylus flavescens. Germen obtuse trigonum, virens. Folia radicalia subulata, acuta, antice planissima, aut superiora versus quandoque leviter canaliculata, subtus convexiuscula, pulposa, succo subflavescenti, vix striata, ad oras asperiuscula ob marginem acutum limbo albo subdentato sub lente, basibus vaginantibus, exteriora patula, interiora magis erecta. *Jacq.* Tota poliline glauco obtecta. Filamenta raro fertilia. Spica $1\frac{1}{3}$ ped.. *Scop.* Pedunculi post florescentiam recurvi. *Roth.* *In Prom. b. spei, Jacq.; in Aethiopia Linn.: uterque 4: © vero Willd.*

6. *B. pugioniformis* *Link*; acaulis, perennis; foliis carnosissimis, crasso-subulatis, antice sulcatis, apice teretibus, acuminatis, glabris, pulposissimis, erectis; scapo foliis (vix) duplo longiore. ANTHERICUM *pugioniforme* *Jacq. Coll. Suppl.* 85. *ic. rar. II.* t. 405. *Willd. Spec. II.* p. 144. *Hort. Kew. ed. 2. II.* p. 270. *Bot. Repos. t.* 586. *Bot. Mag. t.* 1454. Rad. tuber subrotundum, depressum, fuscum, diametro $1\frac{1}{3}$ poll., fibris crassis, fusiformibus. Folia radicalia pluscula, annua, fere pedalia, integerrima, basi digitum crassa, subtus teretia, oris obtusis, valde compressibilia et elastica, plena pulpâ aquosâ in avulsis exstillante, parenchymate albo residuo. Scapus foliis paulo

praecocior, lateralis, una cum his vaginata stipulis brevibus pallide viridi purpurâque variis, teres, glaber, calamo gracilior, erectus, debilis, solidus, simplex, pedalis, virens cum rore glauco. Racemus terminalis, pedalis. Pedicelli graciles, $\frac{1}{2}$ poll., glabri, sparsi, numerosi, flore expanso patentes, ceterum erecti. Bractea lanceolato-linearis, acuminata, glabra, erecta, parva. Petala oblonga, obtusa, plana, patentissima, lutea, fasciâ longitudinali utrinque viridi. Filamenta patula, petalis breviora, flavescencia, barbâ viridi-flavâ. Antherae flavae. Germen ovatum. Stylus erectus, longitudine staminum. Stigma obtusum. *Jacq.* Folia glaucescentia, juniora purpurascencia, adulta $1\frac{1}{2}$ ped.; scapus 2-ped.; foliis gracilior. Racemus laxus, basi interruptus fere. Bractea subulata, viridis, incurva. Petala exteriora paulo angustiora. Filamenta longitudine corollae, erecto-patentia, exteriora parcius et medio tantum barbata. Germen virens, ovato-oblongum, obsolete hexagonum, stylo pallido triplo brevius. *Gawl.* In *Promont. b. spei.* 4.

7. *B. bisulcata* *Haw.*; foliis pulposis, longe subulatis, acuminatis, utrâque canaliculatis; radice magnâ bulbosâ. *Haw.* in *Philos. Mag. et Ann. of Philos.* 1827. Febr. p. 121.

Folia (in aëre aperto) pedalia, erectiuscula, valde pulposa nec fistulosa, viridia, utrâque latissime, sed interne altius, sulcata, obsoleteque sulcato-striatula. Scapus (an semper?) foliis brevior, teres, erectus, calamo brevior. Flores spicati, lutei, ut in affinis: filamentis omnibus barbatis. *B. pugioniformi* magnitudine habituque simillima, sed facillime distinguitur foliis utrinque profunde sulcatis. *Haw.* E *Prom. b. spei* in horto *D. Sweet.* 4.

8. *B. bulbosa* *Haw.*; bulbo depresso; filamentis declinatis, omnino barbatis. *Haw. Revis.* p. 55. ANTHEERICUM bulbosum *R. Brown Prodr. Nov. Holl.* p. 275. BULB. australis; radice bulbosâ; fol. semiteretibus, canaliculatis; racemo laxo. *Spreng. S. V. II.* p. 86.

Circa Portum Jackson. 4.

9. *B. semibarbata* *Haw.*; radicibus fibrosis; filamentis declinatis: exterioribus imberbibus. *Haw. Revis.* p. 55. ANTHEERICUM semibarbatum *R. Brown Prodr. Nov. Holl.* p. 275. *Loddig. Bot. Cab.* 330.

Circa *P. Jackson*, in insula van Diemen et in ora meridionali nov. Hollandiae.

Obs. Nomine ANTHEERICI semibarbati vidimus specimina in ins. van Diemen lecta quae nec ad *B. semibarbatam* nec ad *B. bulbosam* pertinent, et speciem novam sistere videntur; at desunt radices foliaque. Scapi pars superior simplex, teres, glabra, crassitie pennae gallinae. Racemus simplex, laxiusculus, apice cernuus; rhachis quidquam flexuosa angulosaque, 3'-5 poll. Pedicelli filiformes, teretes, glabri, sub flore articulati, graciles, erecto-patentes, inferiores remoti, floriferi 2-3 lin., fructiferi 7-8 lin. Bractae ovatae, acuminatae, concavae, carinatae, membranaceae, flavae, 2-3 lin. Cor. flava; lacinae 4-5 lin., lineâ mediâ intensiore, oblongae, obtusae; interiores paulo breviores, latiores, multo pallidiores, 1 $\frac{1}{2}$ lin. latae, basi angustatae. Stam. corollâ plus duplo breviora, subaequalia, erecta; filamenta omnia supra medium barbâ densâ luteâ, pilis apice incrassatis et fere purpurascens; antherae ovato-oblongae, obtusae, magnae, luteae, 3 $\frac{1}{2}$ lin. Stylus stamina superans, erectus, filiformis. Stigma minutum, depressum, sub lente puberulum. Caps. subglobosa, impressa, obsolete angulosa, 2 lin.

10. *B. annua* *Willd.*; (radice fibrosâ); foliis carnosis,

subulatis, teretiusculis; scapo subracemoso. *Willd. Enum. h. berol.* p. 372. *ANTHERICUM annuum Linn. Spec.* 446. (ed. 1. PHALANGIUM N. 4.) *Willd. Spec.* II. p. 145. *Mill. Dict.* n. 7. *Lam. Enc.* 1. p. 199. *Medic. Bot. Beob.* p. 49. *Ait. h. Kew.* ed. 2. II. p. 270. *Decand. pl. gr.* t. 8. *Redout. Lil.* 597. *Bot. Mag.* 1451. *Asph. africanus angustif. luteus minor. Tournef. Inst.* 343.

Radix fibris teneris (fusciscentibus). Folia plura, radicalia, supra subcanaliculato-depressa, erecto-divergentia, 6-8 poll., pulposa, (scapo plerumque breviora, pallide et flavescenti-viridia, vix glaucescentia). Scapi solitarii vel plures, teretes, (plerumque simplices, subinde ramo uno vel altero). Racemus simplex, distanter 7-14 florus. Pedicelli crassiusculi, inferiores flore bracteaque longiores, virides, erectiusculi, (vel subpatentes) 1-(1½) poll., superiores sensim breviores. Bractee naviculari-cuspidatae (membranaceae, dorso virescente). Corolla erecta, rotata, flava, 4-5 lin. in diametro; laciniae (planae) extus lineâ viridi; exteriores ovato-lanceolatae obtusae, interiores latiores elliptico-lanceolatae. Filamenta hypogyna, incurva, infra apicem inaequaliter barbata; alterna subbreviora barbâ parciore. Antherae exiguae, didymo-ovatae, pallide flavae. Germen fulvum, nitens, sulcis 6, umbilicatum depressum. Stylus triqueter, stamina superans; stigmatibus albido-depresso, subpubescente. Caps. membranacea, rotundato-trigona, (trisulca). Sem. tetraëdra, 3-4 in loculo singulo, nigra. *Gawl. De germinatione B. annuae conf. Jaume St. Hil. in Journ. d. Bot. T. I. p. 68. Mirbel in Ann. d. Mus. XIII. t. 5. f. 4. In Promont. b. spei.* ☉.

11. *B. graminea Haw.*; foliis carnosis, lineari-subulatis, striatulis, viridibus, supra planis, subtus convexis. *Haw. Revis. Succ. Pl.* p. 33.

Acaulis; folia omnia radicalia, ambientia, patula; scapus pedalis; flores lutei. *Haw. In Horto Chelseano.* 4.

12. *B. incurva*; (radice fasciculata); foliis carnosis, trigonis, incurvis, brevissimis; racemo elongato, cernuo. *ANTHERICUM incurvum Thunb. Prodr.* 62. *Fl. Cap. ed. Schult.* p. 319. *Willd. Spec.* II. p. 144.

Rad. fasciculata, fibris filiformibus. Scapus filiformis, solitarius, simplex, glaber, spithameus. Folia radicalia, plura, subulata, erecta, apice incurvo, viridia, glabra, poll.. Flores remoti. Racemus digitalis. Pedunculi capillares, ½ unguiculares. Cor. flavae. *Thunb. In Prom. b. spei.* 4.

13. *B. praemorsa*; acaulis; radice perenni, difformi, praemorsa; foliis subtriquetris, antice sulcatis, erectis, basi vaginante mutuo imbricatis, amplexicaulibus, distichis, pulposis, (scapo brevioribus). *ANTHERICUM praemorsum Jacq. Coll. Suppl.* 85. *icon. rar.* II. t. 406. *Willd. Spec.* II. p. 142.

Tota glabra. Rad. tuber carnosum, fuscescens, superne flavescens, tandem rubescens. Folia plura disticha, 1½ ped. et ultra, digitum crassa, dorso obtusa, lineata, aquose pulposa, hinc elastica. Scapus centralis, erectus, teres, pulposus, calamus crassus. Racemus 1½ ped., flexuosus. Pedicelli numerosissimi, 1-flori, pa-

tentes, $\frac{1}{2}$ poll., bracteolâ minutâ scariosâ. Petala lutea, lineâ longitudinali viridi, acutula, patentissima: 3 alterna ovata, duplo latiora. Filamenta albida, barbâ sulphureâ. Germen virens. Stylus albus. *Jacq. In Promont. b. spei. 4.*

β . foliis planis v. subhemisphaericis.

14. * *B. latifolia*; (bulbo rotundato); foliis carnosis, oblongo-lanceolatis, (ensiformibus), acuminatis, nervosis, rectis, scapo (simplici) quadruplo brevioribus; (racemo longissimo). *ANTHERICUM latifolium Linn. Suppl. 202. Thunb. Prodr. p. 63. Fl. cap. ed. Schult. p. 525. Willd. Spec. II. p. 144. Jacq. Collect. II. 249. ic. rar. II. t. 408.*

*Thunberg l. c. describit in planta spontanea: „folia basi lata, apice attenuata, integra, spithamaea; scapum solitarium, teretem, striatum, glabrum, erectum, 1-2 ped.; racemum erectum, teretem, spithamaeum usque ped.; pedunculos sparsos, frequentissimos, erectos, unguiculares; corollas luteas; bracteas membranaceas, lanceolatas, acuminatas, erectas.“ Jacquin in culta: bulbum rotundatum, basi planum, 2 unc. in diametro, $1\frac{1}{2}$ unc. altum, albidum, tunicâ nigrâ obductum; fibris aliquot crassis pallide fuscescentibus ex ambitu laterali inferiori; squamas emarcidas et fuscas et unum alterumve folium brevissimum basin reliquorum foliorum circumdantes; folia radicalia plura, $\frac{1}{2}$ ped., acuta, nervose-lineata, erectiuscula, parum concava, nitida, laete virentia, interiora angustiora, extimum latissimum, inferne unciam superans, hinc subensiforme; scapum extra folia lateralem, calamo graciliorem, 2-ped., a medio ad apicem racemosum; pedicellos unciales, graciles, in florescentia semper patulos, ceterum erectos; flores quidquam odoros; bracteas lanceolato-lineares, acutas, pedicellis duplo breviores; petala sordide lutea cum linea media virescente, reflexo-patula, superne concava, in fructu erecta et marcida; filamentorum barbâ densam flavescenscentem; antheras ochroleucas; stylum filiformem, album. *In Prom. b. spei. 4.**

15. *B. nutans*; acaulis; radice perenni in crura longa divisâ; foliis subensiformibus, planis, pulposis, patulis (apice reflexis, scapo brevioribus, subtus lineatis; racemo apice nutante). *ANTHERICUM nutans Jacq. Coll. suppl. 86. ic. rar. II. t. 407. Willd. Spec. II. p. 143.*

Tubera plura, teretia, carnosâ, digitum crassa, $\frac{1}{2}$ ped., sordide flavescenscentia. Folia radicalia plura, acuminata, crassula, nitida, ad oras denticulis albidis, vix tactu percipiendis, ceterum glabra, lineata subtus, 4-8 poll., $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata. Scapus centralis, teres, crassitie pennae columbinae, simplicissimus, erectus, $1\frac{1}{2}$ ped., supra medium racemosus. Pedicelli 1-flori, $\frac{1}{2}$ poll., patentissimi, bracteolis minutis. Racemi apex cum pedunculis nondum elongatis semper nutat, ad scapum saepe reflectitur. Flores inodori. Petala oblonga, obtusa, superne subconcava, patentissima, sulphurea, lineolâ mediâ virente. Filamenta omnia barbata, petalis paulo breviora iisdemque concoloria. Antherae luteae. Germen subrotundum. Stylus erectus, filamentis concolor. Stigma simplex, obtusum. *Jacq. In Promont. b. spei. 4.*

Obs. Dis. Willdenow huc duxit A nutans fol. lineari-ensiformibus, scapo brevioribus: racemo ovato, cernuo, Thunb. prodr. 63. Fl. Cap. Schult.

p. 319; attamen haud bene quadrat. Si distincta species, alio nomine, forsas *adnutans*, salutanda erit. Descriptio data a *Thunberg* sequens: „Folia radicalia, 6-8, apice valde attenuata, erecta, integra, glabra, scapo paulo breviora, spithamæa. Scapus solitarius, simplex, teres, erectus, glaber, sub ped. Racemus pollicaris. Cor. flavæ.“ *Patria eadem.*

16. * *B. alooides Willd.*; foliis carnosis, linguiformi-lanceolatis, utrinque planiusculis, (scapo simplici brevioribus). *Willd. En. H. berol. p. 572. ANTHERICUM alooides Willd. Spec. II. p. 145. Linn. Spec. p. 446. Mill. dict. n. 5. ed. Mart. n. 15. Thunb. prodr. 62. Fl. cap. ed. Schult. p. 319. Ait. H. Kew. ed. 2. II. p. 269. Lam. ill. t. 240. f. 2. Decand. pl. grass. t. 26. Réed. Lil. V. t. 285. Gawl. Bot. Mag. 1517. BULBINE acaulis Linn. H. Cliff. 125. Dillen H. elth. t. 252. f. 299. Sab. Hort. rom. 6. t. 8. (mala). Till. pis. p. 17.*

Plantam spontaneam describit *Thunberg Fl. cap.* „Radix orbiculata, truncata, subconica, fibrosa, carnosæ, sæpe magnitudine pomi; fibrae marginales, radiatae, attenuatae, fibrillosae. Folia radicalia semiteretia s. interius plana, exterius convexa vel basi semiteretia, laevia, glabra, calame anserino crassiora, erecta, apice sensim attenuata et teretia, palmaria. Scapus teres, erectus, glaberrimus, foliis duplo longior. Flores in summo scapo in racemo oblongo. Pedunculi capillares semiunguiculares. Bractea ad basin pedunculi ovata, acuta, alba, brevissima. Corolla patens. Petala lanceolata, acuta, flava, carinâ viridi. Filamenta corolla breviora, basi capsulae inserta, subulata, medio barbâ flavâ. Antherae ovatae, sulcatae, erectae, fusco-flavescentes. Germen trigonum glabrum. Stylus longitudine staminum. Stigma simplex, obtusum. Caps. ovata, triangularis, 6-sulca, glabra. Sem. globosa, glabra.“ *Thunb.* In culta caudex subnullus, folia pallida, obtusa, basi nunc $1\frac{1}{2}$ poll., nunc 6 lin. lata, $\frac{1}{2}$ -1 ped. Scapi solitarii v. plures, 1-2 ped., quidquam compressi. Pedicelli primum erecti, dein patentés, serius subreflexi. Bracteae lineares, rubescentes. Cor. $\frac{3}{4}$ poll. diam.; lacinae planae, oblongae, alternae duplo angustiores, aureae, carinâ virescente. Germen virescens. Styl. luteus. Sem. subtetraëdra. *In Prom. b. spei. 4.*

17. *B. crispa*; foliis ellipticis, crispis, ciliatis; scapo ramoso. *ANTHERICUM crispum Thunb. prodr. 65. Fl. cap. ed. Schult. p. 524. Willd. Spec. II. p. 146.*

Folia radicalia, circiter 4, lanceolato-elliptica, glabra, erecta, $1\frac{1}{2}$ poll. Scapus filiformis, glaber, superne ramosus, erectus, ped. Rami alterni, patienti-erecti. Flores racemosi, remoti. Filamenta brevissima. Antherae oblongae, flavæ. *Thunb. In Prom. b. spei. 4.*

18. *B. mesembryanthemoides Haw.*; acaulis: foliis subtribus, arcte imbricatim erectis, truncatis, pulposis, subhemisphaericis. *Haw. in Philos. Mag. et Journ. 1825. Jul. p. 31.* Planta vere mirabilis; subsemiglobosa, pulposa, et semuncialis simulat *Mesembryanthea minima*; singula planta sistit circiter 5 folia inaequalia, (inferiora minora), imbricatim aretissime adpressa subhemisphaerico-truncata, pallide viridia, apicem versus saturatiora et subaristata, interne concava. Scapus erectus, 4.

4-5-entalis, filiformis, nudus. Flores laxè spicati, fere terni, quaterni, alterni, pedunculati, lutei at morientes solum vidi. Capsula obtuse sulcata sive angulata. *Haw.* 4. *In Prom. b. spei.* 4. *D. Bowie.*

b. *spuriae: floribus albidis, nervis mediis coloratis.*

19. **B. planifolia*; foliis planiusculis, carinatis, scapo ramoso (brevioribus); corollis intus albis; extus purpurascens; (filamentis apice appendiculatis, geniculatis). *ANTHERICUM planifolium Brotero Fl. lusit.* p. 534. *Phytogr. lusit.* 1. n. 22. *A. fol. planis, scapo filamentisque lanatis. Vandelli Mss. Linn. Mant.* 224. *Willd. Spec.* II. p. 156. *Schousb. Maroc.* 1. p. 157. *Poiret. Barb.* 2. p. 152. *Vivian. Fl. cors. diagn.* p. 5. *A. Mattiazzi Vandell. Pl. hisp. et lus.* p. 57. *A. bicolor*; fol. caul. etc., filamentis pubescentibus, apice appendiculatis. *Desf. Fl. Atl.* 1. p. 304. t. 90. *Poiret in Lam. Enc.* V. p. 254. *Lapeyr. Hist. Abr.* p. 189. *A. ericetorum Bergeret Fl. b. Pyr.* 2. 168. *PHALANGIUM planifolium Pers. Syn.* 1. p. 367. *PHAL. bicolor Redout. Lil.* t. 215. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 209. β . foliis subcanaliculatis, tortilibus. *Thore Chlor. Land.* p. 128.

Radices oblongae, crassae, flavescentes. Folia radicalia (vaginantia), linearia, planiuscula, striata, subcarinata, extremitate involuto-subulata. Scapus (palmaris *Vand.*) ramosus, bracteis lanceolatis, pedunculis subracemosis. Flores rubri magnitudine *ANTH. ramosi*. Filamenta lanata, (corollâ breviora *Vand.*). Antherae flavae. Stylus staminibus brevior. Statura *A. graeci*; sed flores minores, filamentis non laevibus. *Linn. Mant.* Descriptio in *Desf. et Poiret* (in specimina nostra gallica quadrans) parum abluere videtur: Bulbi fasciculati, numerosi, carnosissimi, oblongi, fusiformes. Folia radicalia, numerosa, glabra, acuta, plana, basi canaliculata, medio patentia, falcatis recurva, (5-) 10-poll., 1 $\frac{1}{2}$ -3 lin. lata; vaginâ membranaceâ, albâ, diaphanâ, 2-poll.; caulina 1-2-3, breviora, angustiora, ceterum similia. Caules erecti, rarius cernui, (6-10 poll.), glabri, torti, apice angulosi, sicci toti angulosi. Panicula laxa. (Rami solitarii vel gemini, inferiores dichotomi, primum apice cernui.) Pedunculi inaequales, simplices vel quidquam ramosi, (2-6 lin.) glabri, filiformes. Bractee angustae, acutae, membranaceae, caducae. Corolla (3-4 lin.), extus violaceo-purpurea, intus lactea. Petala patentia, aequalia, elliptica, obtusa. Filamenta superne attenuata, geniculata, alba, ad $\frac{2}{3}$ barbâ tenui (in siccis fuscescente, corollâ fere duplo breviora). Antherae laete luteae, (ovatae). Stylus filiformis, acutus, longitudine staminum. Caps. subglobosa. Descriptio a *Vand.* data differt: foliis apice involuto subulatis, floribus rubris, stylo staminibus breviora. *Vandelli* omnino silet de scapo lanato, quem *Linn.* in *Mant.* fid. *Vand. Mss.* petit. Specimen antiquissimum in Herb. *Schreber.* vidimus nomine Phalangii parvo flore ramosi *Bauh.* insignitum. In collibus aridis prope *Capo de Spizel, Conimbricam, alibi in Beira et Estremadura; in Pyrenaeis, in Sardinia, in Barbaria.* 4

20. **B. Cauda felis*; foliis canaliculato-ensiformibus, (glabris), scapo simplici longioribus; racemo oblongo, erecto. ANTHERICUM *Cauda felis* Linn. Suppl. 202. Willd. Spec. II. p. 146. *A. caudatum* Thunb. Prodr. 65. Fl. Cap. ed. Schult. p. 321. BULBINE *caudata* Spreng. S. Veg. II. p. 86.

Folia radicalia, 6-8, apice attenuata, striata, integra, glabra, inferne erecta, superne laxa, subreflexo-dependentia. Scapus solitarius, teres, glaber, flexuoso-erectus, 1-2 ped.. Racemus digitalis. Cor. albae. Variat foliis latioribus et angustioribus. Thunb. In Swartland prope pontem fluvii.

21. **B. ciliata* Link; foliis ensiformibus, (intus planis) carnosio-subtriquetris, ciliatis, scapo simplici (aequalibus); racemo longissimo; (filamentis 5 longioribus petala aequantibus). Linn. Suppl. 202. (sub ANTHERICO *ciliato* uti) Thunberg prodr. 63. Fl. cap. ed. Schult. p. 324. et Willd. Spec. II. p. 146. — Link Enum. 1. p. 329.

„Folia longissima, carnosissima.“ Linn. fil. Folia radicalia, latere altero contracto-subundulata, intus plana, extus convexa, transverse rugosa, carinâ elevata praesertim apicem versus subtrigona, striata, glabra, decumbentia, 3 ped.. Scapus teres, carnosus, subangulatus, glaber, erectus, 5 ped.. Flores sparsi, remoti, sensim florentes. Bractea sub singulo pedunculo lanceolata, convoluta-carinata, acuta, membranacea, alba carinâ fuscâ, pedunculo triplo brevior, erecta, persistens. Racemus 2-ped., excresecens. Pedunculi teretes, glabri, uniflori, unguiculares, ante florescentiam imbricato-appressi, erecti, sub florescentia erecto-patentes, dein reflexi. Petala patentia, ovato-lanceolata, obtusa, semiunguicularia, alba, carinâ rubra. Filamenta receptaculo inserta, filiformia, erecta, alba; 3 longiora, petala aequantia, supra basin inflexa, a basi ad medium villo tenui, simplici, albo, brevissimo. Antherae ovatae, dorso affixae, erectae, flavae. Stylus erectus, albus, longitudine staminum. Stigma obtusiusculum, simplex, villosum. Caps. globosa, pallide viridis, lineis 3 saturatioribus, minutissime punctata, glabra. Semina in singulo loculo circiter 4, imbricata, ovata, acute triquetra, glabra, nigra, punctis micantibus, virentibus. Thunb.. ANTHERICUM *ciliatum* Jacq. longe alia planta est. In lateribus Leuwekop ad Prom. b. spei. 4.

22. *B. dubia*; scapo gracili, erecto, simplici, glabro; racemo laxo; filamentis purpureis, apice barbatis: barbâ concolore.

Specimen imperfectum, sed species, ut videtur, certe distincta. Radix foliaque desunt. Scapus e vaginis aliquot membranaceis $\frac{1}{2}$ poll., glabris, obtusis vel acutis, teres, crassitie fili emporetici, quidquam flexuosus, 8 poll.. Racemus 2 poll., laxe multiflorus, (14-) florus, curvatus. Pedunculi filiformes, floriferi erecto-patentes, 2 lin., fructiferi erecti, 4-5 lin., glabri, solitarii. Bractea ovatae, acuminatae, concavae, carinatae, membranaceae, albidae, lin.. Cor. 7 lin. diametr.; lacinae oblongae, obtusae, albidae, diaphanae, lineâ mediâ fusciscenti-viridi, $5\frac{1}{2}$ lin., lineatae, interiores paulo latiores. Stam. corollâ $\frac{1}{3}$ breviora, alternata breviora; filamenta compressa, basi attenuata et fere glabra, supra medium pilis densis, patentibus, apice subglandulosis,

quasi in fasciculos 2 collectis, purpureis, summo apice subulata et glabra; antherae parvae, oblongae, luteae, dorso paulo supra basin affixae. Stylus longitudine staminum longiorum, filiformis, purpureus, glaber. Stigma obsoletum. Caps. parva, obovato-subglobosa, obtuse trigona, vix ultra lin., glabra. *Ad specimen in herb. cli Zuccarini. In Prom. b. spei. 4.*

23. **B. triquetra*; foliis filiformibus, triquetris, scapo simplici brevioribus; racemo ovato. *ANTHERICUM triquetrum* Linn. *Suppl.* 202. *Thunb. prodr.* 65. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 317. *Willd. Spec. II.* p. 146.

Radix fasciculata. Folia radicalia, plura, glabra, erecta, interdum flexuosa, acuta, spithamaea. Scapus solitarius, filiformis, erectus vel flexuoso-erectus, glaber, spithamaeus usque pedalis. Pedunculi erecti, lin. longi. Corollae albae. *Thunb. In Koude Boekveld et alibi ad Prom. b. spei. 4.*

24. **B. scabra*; foliis triquetris, serrulatis, caule ramoso, scabro longioribus; pedunculis fructiferis recurvis. *ANTHERICUM scabrum* Linn. *Suppl.* 202. *Thunb. prodr.* 65. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 320. *Willd. Spec. II.* p. 146.

Scapus compressus, debilis, decumbens, lucidus, spinulis crystallinis scaber, ped. et ultra. Rami alterni, breves, simplices. Folia radicalia, plurima, exacte trigona, supra canaliculata, angulis serrato-scabris, subtus carinâ laevi, carnosâ, diffusa, glabra, saepe scapo longiora. Racemi spicati, erecti. Pedunculi teretes, uniflori, scabri, poll.; superiores breviores, fructiferi remotiores, reflexi. Bractea sub pedunculo ovata, brevis, acuta, margine tenui. Petala patentia, ovata, oblonga, obtusa, concava, alba, carinâ viridi scabrâ, lin.. Filamenta filiformia, alba, simplicia, corollâ breviora, 3 brevioribus. Antherae ovatae, didymae, flavae, inferne fissae. Stylus albus, longitudine staminum. Stigma simplex obtusum. Caps. subrotunda, 6-striata. *Thunb. In campo sabuloso inter Cap et Hottentott Holland.*

25. *B. brevifolia*; foliis lanceolatis, brevissimis; floribus remotissimis. *ANTHERICUM brevifolium* *Thunb. Prodr.* 62. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 319.

Div. *Willdenow*, cum? licet, duxit ad *A. squameum*; at differt descriptio. Nec laudatur a *Thunberg* synonymon *Linnaei* filii, sibi sane bene notum. Folia radicalia circiter 6, convoluta, integra, striata, glabra, carnosâ, falcata, inaequalia, 1-1½ poll.. Scapus solitarius, filiformis, erectus, glaber, 1½ ped.. Racemus palmaris et ultra, floribus inferioribus remotissimis. Pedunculi capillares, unguiculares, patuli. Corollae cernuae. *Thunb. In Prom. b. spei. 4.*

Obs. An haec et sequens hujus potius generis, ex descriptione non liquet.

26. **B. falcata*; foliis carnosiss, ensiformibus, falcatis, glabris, decumbentibus; caule ramoso, racemoso. *ANTHERICUM falcatum* Linn. *Suppl.* 202. *Thunb. Prodr.* 65. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 323. *Willd. Spec. II.* p. 158.

Folia depressa, terrae incumbentia, latere falcata. *Linna. fil.* Fol. plura, radicalia, subcarnosa, paginâ alterâ plana, alterâ convexiuscula, diffusa, poll. lata, ped. et ultra. Scapus articulatus, carnosus, subteres, glaber, erectus, 2-ped.. Rami ex singulo nodo

circiter 3, erecti, florentes fere toti racemo elongato, spithamaei. Flores erecti, remoti. Pedunculi teretes, glabri, uniflori, unguiculares. *Thunb. Ad Prom. b. sp. in Saldanhabay.* 4.

1390. TRICORNE. *)

1. *T. simplex* R. Br.; caule integro; foliis planis, margine scabriusculis; umbellâ solitariâ 10-16-florâ; pedicellis involucri triplo longioribus. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 278.*

Ad Portum Jackson.

2. *T. elatior* R. Br.; caule tereti, folioso ramisque laevibus, paniculatis, angulato-striatis; foliis planis; umbellis 5-6-floris. *R. Brown Prodr. p. 278.*

Ad Portum Jackson.

3. *T. scabra* R. Br.; caule tereti, hispido, folioso; ramis paniculatis, angulato-striatis, scabris; foliis planis, margine denticulatis; umbellis 5-7-floris. *R. Brown Prodr. p. 278.*

Ad littora Novae Hollandiae intra tropicum.

4. *T. tenella* R. Br.; caule filiformi, tereti, dichotomo, laevi, aphylo, stipulato; umbellis 2-3-floris. *R. Brown Prodr. p. 278.*

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae.

5. *T. anceps* R. Br.; caule ramosissimo, aphylo, stipulato, angulato, laevi; ramis ancipitibus; umbellis paucifloris. *R. Br. Prodr. p. 278.*

Ad littora Novae Hollandiae intra tropicum.

1391. CHLOOPSIS. **)

1. *CHL. acaulis* Blume; acaulis; foliis linearibus, acuminatis. *Blume Enum. pl. jav. I. p. 14.*

In sylvis montanis Javae. ☉.

2. *CHL. caulescens* Blume; caulescens; foliis linearibus, obtusiusculis. *Blume l. c.*

In sylvis temperatis Javae montis ignivomi Gede. 4.

1392. CHLOROPHYTUM.

1. *CHL. laxum* R. Br.; acaule; racemis raris, elongatis, indivisis bifidisve; pedicellis geminis solitariisque; foliis linearibus racemum subaequantibus. *R. Brown Prodr. Fl.*

*) Herbae. Rad. fibrosa, saepius perennis. Folia graminea, angusta. Rami dum adsunt, basi stipulâ interiori instructi. Flores umbellati, erecti, flari; pedicellis cum perianthio articulatis. Perianthium desloratum spirale, mox totum deciduum. Pericarpia nuceis corticatas simulantia, abortione quandoque bina rariusve solitaria. *R. Br.*

**) Herbae subacaules, glabrae. Radix fibrosa. Folia fasciculata, graminea, nervosa, linearia, angusta, basi membranaceo-dilatata. Flores racemosi, azuroi; pedicellis medio articulatis. *Blume.*

nov. Holl. p. 277. Poir. Enc. meth. Suppl. II. p. 259. (deletâ descriptione.)

In Nova Hollandia tropica. 4.

2. *Ch. inornatum* Gawl.; radice fibrosâ; caule strictissimo, simplici, vel ramo solitario, villosô-scabro; foliis lanceolatis, longe acuminatis, nervosis; floribus paniculato-vel capillato-racemosis, brevissime pedicellatis. Gawl. Bot. Mag. 1071. et 1223. Bot. Reg. in App. ad Vol. VIII. Ait. Epitom. 365.

Folia radicalia alterna, plura, subtus nervoso-striata, carinata, undulata, basi convoluto-amplexicaulia, fasciculato-compacta, sursum divergentia, recumbentia, $\frac{1}{2}$ pedis, $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, dilute viridia. Caules subhini, centrales, teretes, foliis sublongiores, ramo, si adest, parum divergente, stipulâ foliaceâ fulto. Racemuli vel capitula (?) plurima, sparsa, remotiuscula, 1-4-flora, breviter atque fasciculatim pedicellata. Spathae communes subfoliaceae, adpressae: partiales parvae, membranaceae, lineari-lanceolatae, fuscae, apice viridulae. Cor. luteo-virens, magnitudine fere *Hyacinthi orientalis* ($\frac{3}{4}$ poll. diam.): laciniis lineari-oblongis, acutiusculis, ad quartam circiter usque partem longitudinis suae cylindrico-convergentibus, dein reflexis: intimis nonnihil angustioribus acutioribus. Filamenta laciniis subaequalia, basi corollae inserta, linearia, aequalia. Antherae sagittato-lineares, acutae. Stylus longitudine staminum. Stigma subdepressum, ad lentem glanduloso-puberulum. Germen virens, stylo duplo brevius, turbinato-trigonum. Caps. obovato-turbinata, molendinacea, stylo partim persistente, secundum angulorum marginem dehiscentes. Semina nigra, papillulis minutissimis scabra, ad umbilicum dentata. Gawl. In Sierra Leone. 4.

Obs. In Herb. Banksiano prostat specimen absque floribus nomine *TILLANDSIAM flexuosae* ex Jamaica. An nostra planta? Gawl.

3. *Chl. Orchidastrum* Lindl.; 2-pedale; foliis lanceolatis, acuminatis, a basi stricte patentibus; paniculâ ramosâ, strictâ, multiflorâ; ramis glabris. Lindl. in Bot. Reg. 815. et in Trans. Hortic. Soc. VI. p. 79.

Acaulis radicibus fibrosis, carnosis. Folia $1\frac{1}{2}$ ped., subundulata, glaberrima, petiolo alato, canaliculato, stricto; laminâ patente. Panicula racemosa, rigida. Bractee spathaceae, nigro-fuscae, plurimae: exteriore acuminatâ pedicelli longitudine. Flores capitellati, cum pedicellis articulati, virescenti-albi, subterni. Perianthium rotatum, patens, 6-partitum; tubo perbrevis; laciniis lineari-lanceolatis, interioribus magis reflexis. Stamina hypogyna, longitudine corollae laciniarum, circa stylum erecta, conniventia. Filamenta filiformia. Antherae innatae, lineares, anticae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes, luteae. Germen parvum, subrotundum, trigonum, angulis sulcatis, ovulis circiter 8. Stylus filiformis. Stigma minutum simbrillatum. Capsula corollae vestigiis emarcidis vestita, subrotunda, triquetra, triloba, angulis acutis. Semina 2-3 in quovis loculo, nigra, reniformia, compressa, placentae centrali affixa. Flores omnino ut in *Chl. inornato*, sed folia majora, inflorescentia magis composita. Lindley. In Sierra Leone. 4.

4. *CHL. elatum* *R. Brown*; radice fasciculatâ; foliis lanceolatis; scapo ramoso; pedicellis aggregatis. *R. Brown Prodr.* p. 277. *Spreng. S. Veg.* II. p. 88. *ANTHERICUM elatum*; fol. planis; scapo ramoso; pedunculis aggregatis; corollis planis. *Ait. h. Kew.* 1. p. 448. ed. 2. II. p. 268. *Willd. Spec.* II. p. 138. *PHALANGIUM elatum* *Poir.* in *Lam. Enc.* 5. p. 248. *Redout. Lil.* 191. et hoc teste *fid. herb. Lam.*: *PHALANGIUM fastigiatum*; caulibus altissimis, nudis; ramis pluribus virgatis, confertis; floribus subternatis. *Poir. Enc.* V. p. 246. *ASPHODELUS capensis* *Linn. Syst.* ed. 10. 982. *Mill. ic.* 58. t. 56.

Radix fasciculata e fibris fusiformibus vix crassitie digiti minimi. Folia 7-8, glauca, integra, levissime undulata, acuta, $7\frac{1}{2}$ -11 poll., medio 13-18 lin. lata, utrinque attenuata. Scapus 21-45 poll., gracilis, foliis aliquot sparsis similibus sed parvis; rami simplices, attenuati, sparsi oppositique. Flores parvi numerosi per ramos dispositi, superiores solitarii subsessiles, inferiores fasciculati pedunculis vix longitudine florum. Cor. alba; lacinae patentes, lanceolatae. Stamina corollâ breviora, 3 breviora; filamenta alba, capillaria, glabra; antherae ovatae flavae. Stylus erectus stamina superans. Stigma obtusum. Caps. rotundata, obtuse 5-alata. *Redout.*, qui *fid. herb. Lam.* huc spectare jubet *PHAL. fastigiatum* a *Poiret* ad *herb. Lam.* descriptum, in quo: caules teretes, fistulosi, glaberrimi, lucidi, tenuissime striati, 4-ped., apice ramosi; rami graciles, longissimi, fere fasciculati, pyramidati. Flores albi, parvi in fasciculis 2-3-floris, sparsis, remotis. Pedunculi inaequales, medius duplo longior. Bractee rufescentes, squamaeformes, acuminato-subulatae. Petala oblonga, obtusiuscula, stellata. Filamenta erecta, corollâ breviora; antherae flavescens. Stylus corollam superans, erectiusculus. Folia desunt in specimine *herb. Lamarck.* in horto *paris.*, ut videtur, lecto. *Clo Ker* in *Revis. Redout.* in *Journ. of sc.* 2. p. 182 *Pn.* *elatum* vix congener *CHLOROPHYTI inornati* esse videtur. *In Prom. b. spei.* 4.

5. *CHL. Brehmeanum*; foliis lineari-ensiformibus, fere planis, striatis, ciliatis, scapo simplici, compresso duplo brevioribus; racemo laxo; pedunculis solitariis; bracteis latis, rotundatis cum acumine subulato; filamentis pilis raris hirtellis. Rhizoma subrepens, durum, ad foliorum ortum foliorum basibus in setas laceratis, basi fibris pluribus fasciculatis, carnosus, longis, subinde in tubera oblonga incrassatis, fusciscentibus. Folia radicalia circiter 7, erecta vel varie flexa, acuta, inferne quidquam attenuata et subcanaliculata, medio fere plana, obsolete carinata, longitudinaliter striata, margine ciliato subundulata, pallide viridia, 6 circiter poll., 2-3 lin. lata. Scapus strictus, glaber, penna corvi paulo crassior, 15 poll., tortus, compressus et utroque latere sulco levi; (an exsiccatione?) squamis 3 distantibus semiamplexantibus, appressis, e basi late ovata abrupte in acumen longam attenuatis, inferiore albidâ 7 lin.; superioribus fusciscentibus minoribus. Racemus multiflorus, erectus, latus, $2\frac{1}{2}$ poll. Pedunculi alterni, solitarii, glabri, obsolete angulosi, infra medium articulati, superne quidquam incrassati, crecto-pa-

tentes, 3-4 lin.. Bracteae ovato-rotundatae, fere scutellatae, abrupte in acumen subulatum attenuatae, concavae, glabrae, purpurascenti-fuscae, pedicellos juniores superantes, vetustioribus breviores. Cor. lacinae lanceolato-oblongae, obtusae, glabrae, 3-4 lin., lin. et paulo ultra latae, albae; exteriores lineâ dorsali fortiore viridi apice purpurascente et ibidem subfornicatae; interiores paululum breviores, lineâ dorsali viridi; infima in floribus plerisque magis reflectitur, an semper? Stam. corolla $\frac{1}{3}$ breviora, acuta, subaequalia: filamenta albida, subulata, pilis paucis brevibus, albidis, sub lente tantum conspicuis; antherae oblongae, obtusae, erectae, dorso paulo supra basin affixae, $\frac{2}{3}$ lin., flavae. Germen parvum, obovatum, apice impressum, obtuse 3-alatum. Stylus staminibus vix brevior, erectus, filiformis, albidus, glaber, sub lente tortus. Stigma obsoletum. Ad specimen in herb. cli *Martius* lectum a *D. Brehm.* In *Prom. b. spei.* 4.

Obs. An hoc vel sequens forte species capensis illa indescrupta, de qua *R. Brown* in *Prodr. nov. Holl.* p. 277.?

6. *CHL. dubium*; foliis linearibus, patenti-reflexis, convoluto-canaliculatis, ciliatis, scapo simplici tereti brevioribus; pedunculis solitariis geminisque; bracteis lanceolatis, acuminatis; filamentis muricatulis.

Radix fasciculata e fibris carnosis, rugosis, superne crassitie pennae anserinae, dein angustatis, nigris. Folia radicalia, circiter 7, basi erecta et semivaginantia, dein arcuato-recurva, subulato-attenuata, carinata et complicato-canaliculata, striata, margine undulato tenuiter ciliata, sicca fusciscenti-viridia, imâ basi purpurascencia, 5-7 lin., 2 lin. lata. Scapus rigidus, obsolete flexuosus, glaber, teres, flores inter trigonus, crassitie pennae galinaceae, cum racemo 8 poll.; squamâ unâ alterâve semiamplexicauli, lanceolatâ, acuminatâ, fusciscente, appressâ, glabrâ, 7 lin.. Racemus erectus, multiflorus, $2\frac{1}{2}$ poll.. Pedunculi alterni solitarii vel rarius gemini, trigoni, glabri, medio articulati, floriferi erecto-patentes, deflorati cauli appressi, 5-4 lin.. Bracteae e basi ovato-lanceolata mox acuminatae, quidquam concavae, glabrae, dorso fuscae, margine albae membranaceae, pedicellos juniores superantes, vetustiores aequantes, 3-5 lin., bracteolam minorem albidam includentes. Cor. 8 lin. diametr.; lacinae elliptico-oblongae, obtusae, apice quidquam concavae, glabrae, albae, lineâ dorsali viridi purpurâ suffusâ, 5 lin., $1\frac{1}{2}$ -2 lin. latae: interiores tenuiores et paulo latiores. Stam. corollâ paulo breviora, subaequalia; filamenta albida, filiformia, sub lente retrorsum muricatulâ; antherae lineari-oblongae, basi emarginatae et paulo supra affixae, flavae, lin.. Germen oblongum, alato-trigonum, apice retusum, glabrum. Stylus stamina paulo superans, filiformis, erectus vel apice incurvus, albidus. Stigma obsoletum. *CHLOROPH. Brehmeano* et *ANTHEMICO trifloro* v. *bipedunculato* affine. Ad specimen in *Herb. cli Zuccarini.* In *Prom. b. spei.* 4.

1595. CAESIA. *)

1. *C. vittata* *R. Br.*; floribus nutantibus; staminibus 7 re-

*) Herbae saepius annuae, glabrae. Radix fasciculata, e fibris crassisculis tuberosisve oblongis. Folia graminea. Racemi divisi v. simplices, pedicellis eg-

pendentibus; filamentis vittatis; racemis divisis simplicibusve; foliis planiusculis; bulbis fasciculatis. *R. Brown Prodr. Fl. nov. Holl. p. 277.*

Ad Portum Jackson, in insula van Diemen.

2. *C. parviflora R. Br.*; floribus erectis; filamentis concoloribus; racemis paniculatis; radicibus fibrosis. *R. Brown Prodr. p. 277.*

Ad Portum Jackson et in insula van Diemen.

3. *C. occidentalis R. Br.*; floribus erectis; filamentis concoloribus; racemis parum divisis; foliis filiformibus, canaliculatis. *R. Brown Prodr. p. 277.*

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae.

4. *C. corymbosa R. Br.*; scapo simplici; corymbo paucifloro; foliis planiusculis. *R. Brown Prodr. p. 277.*

Ad oram meridionalem Novae Hollandiae, in insula van Diemen.

5. *C. lateriflora R. Br.*; caule ramosissimo, stipulato; floribus lateralibus, subsolitariis, nutantibus; pericarpis clavatis, pendulis, submonospermis. *R. Brown Prodr. p. 277.*

Habitu, inflorescentiâ, filamentis hispidulis, capsulâque clavata monospermâ a reliquis valde diversa. *R. Br. In Nova Hollandia tropica.*

1394. ANTHERICUM.

a. GENUINA: radice fasciculata.

a. foliis filiformibus.

1. *A. filiforme Ait.*; foliis filiformi-teretiusculis, scabridis; filamentis glabris; petalis lanceolatis. *Ait. Kew. l. p. 451. ed. II. p. 267. Willd. Spec. II. p. 135. PHALANGIUM filiforme Poir. in Lam. Enc. V. p. 247.*

Scapus filiformis, pedalis, foliis brevior, basi rufescens, maculis pallidis. Petala 5 exteriora intus alba, extus viridia; 3 interiora alba; extus lineâ viridi. *Ait. In Prom. b. spei. 4.*

Obs. In specimine spontaneo, quod nobis ad *A. filiforme Ait.*, quod non vidimus, pertinere videtur: Rhizoma crassitie digiti, oblique ascendens, densissime foliorum basibus emarcidis setiformibus fuscis tectum. Folia radicalia plura, erecta, scapo breviora, rigida, filiformia, acuta, supra sulcata, ceterum striata, ad sulci margines scabrida, aeruginoso-viridia, 2-3 poll., setâ porcinâ paulo crassiora. Scapus strictus, simplex, nudus, teres, glaber, superne viridis, inferne pallide fuscis, maculis in sicco nullis, 7 poll., vix crassitie pennae corvi. Racemus ovato-oblongus, densissimus, erectus, poll. Pedunculi capillates, erecti, glabri, teretes, bracteis floribusque longiores, 3 lin. Bractee membranaceae, albidae, basi ovatae, concavae, subearinatae, apice subulato-acuminatae, 1-1½ lin. Cor. lacinae v. petala ovato-oblonga, obtusa, glabra, 1-1½ lin., ½ lin. latâ; exteriora aeruginoso-viridia, lineâ mediâ intensiore; interiora albida, lineâ mediâ viridi, paulo minorâ. Stam. corollâ paulo breviora, aequalia; filamenta subulata, erecta, albida, glabra; antherae parvae, ovatae Stylus erectus, albidus, longitudine staminum; stigma minutum.

2. *A. elongatum Willd.*; foliis lineari-filiformibus,

gregatis solitariisve, cum perianthio articulatis. Flores albicantes vel caerulei, erecti, raro nutantes. Perianthium desloratum spirale, mox totum deciduum. Antherae flavae. *R. Br.*

(basi pilosis), scapo ramoso flexuoso brevioribus; racemis elongatis. *Willd. Spec. II. p. 136. A. filiforme Thunb. prodr. 62. Fl. cap. ed. Schult. p. 318.*

„Mutavi nomen, quum mihi diversum videatur.“ *Willd. Sprengel S. V. II. p. 83.* sine omni dubio junxit cum *A. filiformi Ait.* Rad. fasciculata. Folia radicalia, plura, 5-7, apice attenuata, inferne pilosa, patula vel flexuoso-erecta, scapo paulo breviora, spithamaea vel ultra. Scapus teres, raro simplex, saepius ramosus, flexuoso-erectus, glaber, subpedalis. Rami similes, alterni vel dichotomi, divaricato-patuli, ultimi filiformes. Racemi in scapo et ramis sensim florentes. Pedunculi capillares, lin., superiores sensim breviores et approximati. *Thunb. In collibus infra Taffelberg, latere occidentali. 4.*

3. *A. capillare*; foliis capillaribus, substriatis, longis, (glabris); scapo nudo, simplici; spicâ brevi viridescente. *PHALANGIUM capillare Poir. Enc. V. p. 247.*

Radix e bulbis pluribus, brevibus fasciculatis, angustis, obtusis. Folia numerosa, omnia radicalia, 4-5 poll., tenuissima, acutissima, glabra, tenuiter longitudinaliter striata, basi in membranam vaginalem, albam, tenuem, pollicem dilatata. Scapus e foliorum centro, 6-7 poll., erectus, teres, glaberrimus, crassitie pennae columbinae, virescens, apicem versus purpurascens vel fuscus. Spica ad plurimum poll.. Flores pallide virescenti-flavi. Petala patentia, subovalia, brevia, obtusa, longitudine pedunculorum. Filamenta filiformia, glabra ut videtur, corollâ breviora. *Poir. ad Herb. Lam. Hab.?*

4. *A. longepedunculatum Steudel*; foliis filiformibus, glabris, scapo simplici longioribus; bracteis cordato-amplexicaulibus, ovatis, setaceo-acuminatis; pedunculis longissimis, demum curvatis. *Steudel in litt.*

Rad. fasciculata. Folia radicalia, circiter 6, subflexuoso-erecta, teretiuscula, acuta, intense viridia, striata, 2½-5½ poll., omnia scapique basi vaginâ scariosâ tenuissimâ albidâ apice lacerâ inclusa. Scapi 2, erecti, teretes, glabri, crassitie fili emporetici, cum racemis, 2½-3 poll.. Racemus erectus, rhachi angulosâ, glabrâ, vix flexuosâ, 1½ poll.. Pedunculi erecto-patentes, subinde subincurvi, teretes, glabri, breviores 5½ lin., longiores 8 lin.. Bracteae basi subhorizontales, amplae, valde concavae, nervo medio carinatae, ex late ovato in acumen longum aristaeforme attenuatae, glabrae, fusciscentes margine membranaceo albido, 3-4 lin.. Flores desunt. Capsula oblonga, trisulca obsolete trigona, obtusa cum mucronulo, glabra, fusca, 3 lin.. *Ad specimen in Herb. cli Steudel, qui nomine A. filifolii Thunb. e Prom. b. spei a D. Ludwig accepit. 4.*

5. *A. spiratum Thunb.*; foliis tereti-filiformibus, flexuosis, scapo flexuoso brevioribus. *Thunb. prodr. 62. Fl. cap. ed. Schult. p. 314.*

Div. Willdenow junxit cum *spirali*, a quo ex descriptione *Thunbergiana* diversum: „Folia radicalia, plura, circiter 6, compressa vel subteretia, erecta, apice attenuata et spiralia, undulata, glabra, utrinque striata, scapo paulo breviora, subspithamaea. Scapus solitarius, simplex, flexuoso-erectus, glaber, spi-

thamaeus, vel paulo ultra. Racemus oblongus, poll. Pedunculi patuli, lin. Corolla alba, petalis dorso lineâ purpurascente. Stamina simplicia, 3 longiora. Differt ab *A. triquetro*: foliis teretibus et apice spiralibus, corollis maculatis et racemo longiore. *Thunb.* In collibus montium prope urbem Cap.

β. foliis linearibus v. linearilanceolatis angustioribus:

α. pilosis.

6. **A. hispidum*; foliis carnosis, linearibus, compressis, canaliculatis scapoque multo brevioribus hispidis; racemo denso, subfastigiato; filamentis muricatis: alternis brevioribus. *A. fol. carnos., compress., hispidis. Linn. Spec. 446.* (qui, an *Miller Dict. t. 56.?*) *Willd. Spec. II. p. 145.* *A. fol. carnos., lineariformibus, hispidis, scapo longioribus. Thunb. Prodr. 63. Fl. cap. ed. Schult. p. 521. Ait. h. Kew. ed. 2. II. p. 270.* *ARTHROPODIUM hispidum Spreng. Syst. Veg. II. p. 87.* β majus. *A. hispidum*; filamentis muricatis; acaule; foliis hispidis, pulposis; scapo hispido. *Jacq. Coll. Suppl. p. 91. ic. 2. t. 409.*

„Radix fibrosa. Folia subcarnosa, compressa, striata, $\frac{1}{2}$ ped., recurvata, undique pilis patulis hispida. Scapus simplex, hispidus. Racemus bracteis lanceolatis, longitudine pedicellorum hispidis uti pedicelli. Flores albi carinâ viridi. Antherae luteae.“ *Linn.* Rad. ovata, oblonga, carnosa, saepe bilobata. Folia radicalia ensiformia, canaliculata, spithamaea s. scapo duplo longiora, laxa, undique pilis albis rectis. Scapus simplex v. ramosus, villosus, multiflorus, 1 v. plures. Bractee lanceolato-subulatae, membranaceae, villosae. Rami alterni, erecti. Pedunculi 1-flori, virides v. rufescentes, villosi, unguiculares s. pollicares. Spica fastigiata, excrescens, sensim florens. Petala lanceolata, obtusa, alba, carinâ in junioribus viridi, in adultioribus rufescente, extus ad basin hispida, pilis albis. Filamenta lateri germinis affixa, corollâ paulo breviora, 5 exterioribus brevioribus, subulata, alba, geniculato-inflexa, simplicia. Antherae ovatae, sulcatae. Stylus longitudine filamentorum, albus. Stigma granulato-trigonum, flavescens. Capsula ovata, glabra, 6-sulca, 3-angularis. Semina plura, globosa, glabra. *Thunb.* In β culta apud *Jacquin*: „radix e fibris longis, passim in tubera incrassatis. Folia radicalia plerumque 3, striatula, acuta, graminea, flaccida, hinc in terram prostrata, pedalia et $1\frac{1}{2}$ ped., vix $\frac{1}{2}$ poll.; interius semper brevius. Scapus teres, crassitie peninae columbinae, pilosus, erectiusculus, $\frac{1}{2}$ ped., superne racemosus. Flores plurimi, fortiter odorati. Pedicelli pollicares, pilosi, demum reflexi. Bractea pedunculis paulo brevior. Petala ex carneo alba fasciâ longitudinali mediâ viridi, patentissima, alterna 3 angustiora. Filamenta alba, 5 alterna evidentius muricata. Antherae profundius aurantiacae, oblongae, polline flavo. Stylus filiformis, triqueter, erectus, longitudine staminum, albus. Stigma capitatum. In *Prom. b. spei*, in *Leuweberg*, *Duyvelsberg* et alibi circa Cap. 4.

Obs. Species valde varians et forte, examine ulteriori in vivis instituto, in plures dividenda. Specimina nostra spontanea, e quibus alterum ab ipso *Thunberg*, quae plurimis conveniunt cum descriptione a *Thunberg* data variant:

scapo ferè nullo vel 3 poll., inferne glabriusculo, superne dense hirsuto. Folia 3-7 poll., $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, plerumque 2-3, erecta vel varie flexa, quidquam carinata dorsoque striata, basi subcanaliculata, margine dorsoque praesertim hispida. Racemus densus, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ poll., primum subfastigiatus, serius excrescens. Pedunculi undique hispidi, 6-14 lin., primum erecti, serius reflexi. Bracteae e basi ovata longe subulateque acuminatae, hispidae, concavae, membranaceae, pallide fuscescentes, carinâ intensiore; primum flores subaequantes, serius pedunculis duplo breviores. Flores 6-10 lin. diam. Cor. lacinae 3-5 lin., oblongae, obtusae, dorso ad nervum medium hispidae, praesertim basi, sordide albae, nervo medio-viridi: interiores duplo fere latiores, tenuiores, magis albae, $\frac{1}{2}$ lin. latae. Stam. corollâ $\frac{1}{3}$ breviora, erecta; filamenta subulata, alba, alterna breviora, vix geniculata, sub lente muricata, nec barbata, ut in *ARTHROPODIO*. Stylus stamina aequans, filiformis. Caps. immatura ovata, obsolete angulosa, glabra, 2 lin. Cum *ARTHROPODIIS*, quibus abscribitur in *Sprengel*, nec staminibus, nec corollae laciniis, nec habitu convenit.

7. *A. paradoxum*; foliis binis, suburcolato-truncatis, hirsutissimis, scapo simplici hirsuto longioribus; racemo subfastigiato, denso; bracteis pedunculos superantibus.

Rhizoma oblique adscendens, fuscescens, crassitie pennae anatinae; fibris radicalibus longis crassitie fili emporetici. Vagina radicalis folia et scapum includens, membranacea, fuscescenti-albida, subinfundibuliformis, $\frac{1}{2}$ poll., margine lacero et ciliato, utroque latere in acumen producto. Folia radicalia, 2, erectiuscula, glaucescenti-viridia, pilis densis albidis setosis patentibus, 3 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$ poll.; utrum in vivo carnosae et semiteretiae fuissent, dici nequit; in siccis linearia, striata, basi quidquam attenuata, apice intumescencia, truncata et in lamina 2 fissa, ut urceolus quasi inde formetur 4 lin. diametri, ejus margo superior quidquam longior, revolutus, magis membranaceus, et abrupte in acumen breve setaceum productus; sub margine hoc macula plumbea occurrit in utroque. Scapus teres?, siccus compressus, striatus, erectus, crassitie pennae corvi, cum racemo 3-poll., hispidus uti folia. Racemus erectus, poll., multiflorus, similis illi *A. hispidi*. Pedunculi teretiusculi, hispidi, erecti, in defloratis subinde reflexi, primum breves, inferiores serius 8-12 lin.. Bracteae basi ovatae, concavae, carinatae, mox in acumen longum subulatum attenuatae, hispidae, membranaceae, pallide fuscescentes, primum flores superantes, serius pedicellos subaequantes. Cor. lacinae 6 lin., lanceolatae, albae, dorso linea virescente, medio purpurascente, pilis albis hispida: exteriores acutiusculae; interiores paulo latiores, obtusae, lineâ dorsali angustiore minus hispida. Stam. corollâ $\frac{1}{3}$ breviora, erecta, alterna breviora; filamenta albida, utrinque attenuata, medio quidquam incrassata, sub lente retrorsum muricata, praesertim longiora; antherae oblongae, basi subemarginatae, dorso paulo supra basin affixae, fulvae, $\frac{1}{2}$ lin.. Germen parvum, ovatum, trigonum. Stylus stamina aequans v. paulo superans, albus, filiformis. Stigma parvum, depressum, rufescens. Ad specimen in herb. eli *Zuccarini*. In *Prom. b. spei.* 4.

8. **A. muricatum*; foliis linearibus (carnosis, compressis) muricatis, striatis; scapo ramoso, inferne muricato. *Thunb. prodr.* 65. *Fl: cap. ed. Schull.* p. 322. *Linn. Suppl.* 202. *Willd. Spec.* II. p. 145. *ARTHROPODIUM muricatum* *Spreng. S. V. II.* p. 87. Folia longa, scaberrima. Scapus bipedalis, basi hirsutus, postea ramosus. *Linn.* Rad. fasciculata; fibrae carnosae, filiformes, attenuatae, fibrosae, lutescentes. Folia radicalia, plura, vagi-

nanti-sessilia, apice attenuata, concaviuscula, integra, utrinque striata, glabra, squamulis subulatis albis muricata, diffusa, ped. Scapus teres, inferne saepe flexuosus, purpureus, villosus-hispidus; superne erectus, virescens, rarissime villosus, apice corymboso-ramulosus, ped. et ultra. Rami alterni, erecti, glabri, teretes vel compressi, rarissime villosi, sensim breviores, ramulosi. Flores alterni, approximati, pedicellati. Pedicelli teretes, glabri, rarissime pilosi, purpurascens, uniflori, lin.. Bracteae pedunculos et pedicellos basi cingentes, solitariae, sessiles, concavae, latae, albae, acumine setaceo, longo, rufescente. Petala obovata, obtusiuscula, concava, patentia, alba, carinâ rufescente, $\frac{1}{2}$ unguicularia. Filamenta inaequalia, subulata, corollâ breviora, alba, basi cohaerentia, non connata; 3 breviora simplicia; 3 paulo longiora, a basi ad medium latiora, villosa, subgeniculata, geniculo flavescens. Antherae ovatae, didymae, flavae. Germen conicum, 6-sulcum. Stylus erectus, albus, longitudine staminum. Stigma obtusum, flavescens. Caps. ovata, 6-sulcata, glabra. Semina plurima, globosa, glabra. Differt ab *A. hispido* foliis glabris, nec villosis: sed muricatis, scapo altiore. *Thunb.* In collibus *Duyvelsberg* et *infra latus occidentale Tafelberg*.

9. *A. hirsutum* *Thunb.*; foliis linearibus, hirsutis, scapo ramoso longissimo (hirto) brevioribus. *Thunb. Prodr.* 63. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 522. *Willd. Spec. II.* p. 140.

Folia radicalia, striata, tota hirsuta, ped. et ultra. Scapus teres, hirtus, erectus, 2-ped.. Rami pauci, alterni, glabri, vel inferne parum villosi, erecti. Racemus sensim florens, subpedalis. Pedunculi teretes, erecto-incurvi, unguiculares, inferiores remotiores. *Thunb.* *Cls. Sims* huc, cum?, duxit *A. canaliculatum*. In *Prom. b. spei.* 4.

10. *A. canaliculatum* *Ait.*; foliis subcarnosis, ensiformi-triquetris, latere angustiore canaliculatis, scapoque simplici pilosis. *Ait. h. Kew.* 1. p. 448. ed. 2. II. p. 268. *Willd. Spec. II.* p. 141. *PHALANGIUM canaliculatum* *Poir.* in *Lam. Enc. V.* 249. *BULBINE canaliculata* *Spreng. Syst. Veg. II.* p. 86. β petalis striâ mediâ rufâ; pedicellis hirsutis. *A. canaliculatum* β *rufum* *Bot. Reg.* 877. *Bot. Mag.* 1124.

Scapus teres, pilosus. Racemus multiflorus; pedunculi teretes, glabri, vix unciales. Bracteae lanceolatae, acuminatae, sub anthesi pedunculo breviores, glabrae. Petala patula alba, dorso sordide virentia, semiuncialia. Filamenta subulata, alba, petalis breviora, hispidiuscula, 3 alterna minus hispida. Stylus longitudine staminum. *Ait.* *Cls. Gawler l. c.* huc, cum?, duxit *A. hirsutum* *Thunb.* monetque pedunculos corollamque esse extus hirsutos, purpurascens, nec glabros, uti in *H. Kew.*; strias corollae esse purpurascens nec virides, uti in *H. Kew.* Filamenta depingit glabra. Rhizoma describit e fasciculo fibrarum crassarum, carnosarum, subcylindricarum. Caulis, ut ait, simplex. Bracteae (in icone) lineari-lanceolatae, fuscae. Pedicelli rubri. Corolla diametro fere pollicari, alba, laciniis utrinque striâ mediâ purpureâ; lacinae subovatae, obtusae, alternae paulo breviores angustioresque. Germen viride; stylus et filamenta corollâ breviora, alba; antherae flavae. In *Prom. b. spei.* 4.

Obs. In speciminibus nostris spontaneis, in quae melius quadrat adumbratio a *Gawler* data, quam illa in *Hort. Kew.*: Radix fasciculata. Folia radicalia circiter 4, vaginâ brevi membranaceâ inclusa, carnosula ut videtur, sicca an-

guste linearia, canaliculata, apice teretiuscula vel filiformi-subtriquetra, sicca fuscescentia, striata, undique pilis brevibus rigidis subreversis, inferne erecta, dein reflexa et varie flexa, scapo longiora, 10 poll. - 1½ ped., ½ - 2 lin. lata. Scapus solitarius, simplex, erectus vel incurvus, cum racemo 7 - 15 poll., basi attenuatus, quidquam compressus, crassitie pennae anatinae vel gallinae, undique pilis brevibus, rigidis, reversis. Racemus simplex, laxus, erectus, vel primum subnutans, 4 - 7 poll.. Pedunculi teretiusculi, subanthesi fere patentes, dein erecti, graciles, retrorsum hispidi pilis brevibus rigidis, primum 3 - 4 lin., demum 6 - 9 lin.. Bracteae basi late ovatae, concavae, carinatae, membranaceae, acumine sat longo subulato, fuscescentes, margine tenuiter ciliatae, flores inexpandos duplo fere, pedunculos floriferos paulo superantes, fructiferis duplo fere breviores, 4 - 6 lin.. Cor. lacinae 4 - 5 lin., oblongae, obtusae, sordide albae, nervo medio viridi margine purpurascente: interiores paulo breviores; exteriores ad nervum medium subcarinatum setis brevibus albidis patentibus. Stamina corollâ ⅓ breviora; filamenta subulata, albida, sub lente tenuissime muricata, minime vero barbata, ut in *Bulbine*; alterna paulo breviora, minus muricata; antherae ovatae, luteae. Stylus stamina superans, corollâ paulo brevior, filiformis, erectus, glaber. Stigma parvum, truncatum. Germen oblongum, obtusum, trigonum. *A. hirsutum* Thunb. differt: foliis scapo ramoso longissimo brevioribus.

11. *A. blepharophoron*; foliis ensiformibus in acumen angustatis, subcanaliculatis, dorso convexis, saepe carinatis, margine carinâque ciliatis, scapo longioribus; racemo longitudine scapi; filamentis aequalibus. ANTHEERICUM *ciliatum* Jacq. H. Schönbr. IV. p. 7.

Licet div. *Jacquin* diagnosi ANTHEERICI *ciliati* a *Thunberg* in *prodr.* data usus sit, planta tamen sua a *Thunbergiana* discrepat, et verum est *Anthericum*. „Rad. fascicularis e tuberibus albis, carnosus, 3 unc. calamoque crassioribus. Folia plura, 1 - 1½ ped., inferne ⅓ unc. lata, in acumen angustata, subcanaliculata, dorso convexa et saepe carinata, tunc subtriquetra, pulposula, ad oras carinamque ciliata, flexilia, longiora terrae incumbentia. Scapus teres, crassitie pennae columbinae, glaber, debilis, 8 - 9 unc.; racemo ejusdem longitudinis. Flores inodori, numerosi. Pedicelli fere unc., uniflori, erecti; bractea lanceolata, acuta, parva, erecta, albidâ. Petala oblonga, obtusula, plana, semireflexa, albidâ fasciâ mediâ utrinque purpureâ. Filamenta subulata, imberbia, aequalia, petalis breviora. Antherae flavae. Germen oblongum, triquetrum. Stylus subulatus, erectus, stamina aequans. Stigma trifidum. *Jacq.* In *Promont. b. spei.* 4.

Obs. Specimen spontaneum possidemus, in quod pleraque a *Jacquin* in suo *A. ciliato* petita quadrant, sed: folia 9 - 12 lin., 1½ - 4 lin. lata, vix carnosâ, undique, nec marginibus carinâque tantum, pilis longis albidis; scapi 2 ex eadem radice 3 - 7 poll., erecti, apice incurvi, undique hispidi; racemus 2 - 4 poll., inferne laxiusculus, superne densus; pedunculi erecti, hispidi, floriferi 3 lin. bractea breviores, fructiferi 6 lin. bractea superantes; bractea e basi ovata concava acuminatae, fuscae, ad dorsum nigricantem inferne hispidae; cor. lacinae lineari-oblongae, obtusae, 3 lin., albidae, lineâ mediâ viridi-fuscescente hispidulâ; stam. corollâ paulo breviora, alterna breviora; filamenta sub lente muricatula; stylus filiformis, longitudine staminum breviorum; stigma minutum, simplex, depressum; caps. subglobosa, obtuse trigona, truncata, 2 - 2½ lin.. An varietas, vel species propria?

b. *glabris v. margine tantum ciliatis*:

12. * *A. flexifolium*; foliis subulatis, glabris, flexuosis; caule ramoso. *Linn. Suppl.* 201. *A. fol. linearibus, spiralis, scapo ramoso longioribus.* *Thunb. Prodr.* 62. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 518. *Willd. Spec.* II. p. 155. (excl. syn. *Jacq.*) Rad. fasciculata. Folia radicalia 4 - 6 vel plura, spirali-flexuosa, striata, glabra, apice attenuata, erectiuscula, scapo longiora. Scapus solitarius, teres, flexuoso-erectus, glaber, palmaris. Rami alterni, divaricati, similes. Racemus florum ovatus unguicularis.

Cor. albae, petalis dorso rufescentibus. *Thunb.* In *Prom.*
b. spei. 4.

15. *A. Jacquinianum*; radice tuberosa, fusiformi, saepe bifida; foliis subulatis, flexuosis (subpilosis); scapo ramoso; (petalis patentissimis). *A. flexifolium* *Jacq. Collect. Suppl.* 95. *ic. rar.* II. t. 412. *Hayne term. bot.* t. 59. f. 6. *Willd. Spec.* II. p. 155. (quoad synonymon *Jacquini*.) PHALANGIUM *flexifolium* *Poiret in Lam. Enc.* V. p. 245.

Rad. tuber carnosum, subflavesceus, 1½ poll., ad latus saepe soboliferum. Folia radicalia plura, acuta, infra medium flexuosa, gracilia, debilia, hinc saepius procumbentia, juniora pilis vagis hirsuta, adulta plerumque glabra, plus minus pedalia. Scapus lateralis, teres, nitidus, erectus, superne ramosus, foliis longior. Rami alterni, erectiusculi, ½ ped., racemose multiflori. Bractee ad pedunculos erectos brevesque minutae, lanceolatae, scariosae. Flores odoratissimi, odore HELIOTROPII *peruviani*. Petala oblonga, obtusa, medio carinata, subaequalia, patentissima, alba, linea e fusco virescente: basi punctis 2 viridibus. Filamenta erectiuscula, imberbia, petalis breviora, sub lente subtus et ad oras villosissima, ad apicem usque muricata. Antherae flavae. Germen trilobum, glabrum, viride, superne poris 3. Stylus longitudine staminum; stigma subrotundum, villosum. *Jacq.* In *Promontorio b. spei.* 4.

Obs. 1. In specimine spontaneo, quod omnino huc pertinere videtur: radix e fibris pluribus lutescentibus fasciculata. Folia radicalia 4, cum scapo vagina albidâ ½ poll. inclusa, rigida nec debilia, omnino glabra, infra medium valde flexuosa, vix lin. lata. Scapus imâ basi pilis reversis brevissimis, pedali, superne ramis aliquot solitariis vel geminis, erectis, rigidis, flores inter compresso-trigonis et ad angulos retrorsum scabris. Racemi 1½-4 poll. Pedunculi solitarii, floriferi patentis, fructiferi appressi, glabri, 1-2 lin. Bractee e basi ovata concava subulato-acuminatae, 1-2 lin. Petala 3 lin. longa. Stam. corollâ ⅓ breviora; filamenta sub lente undique retrorsum muricata, nec basi apiceque villosissima. Caps. immatura oblonga, obtuse trigona. *A. flexifolium* *Thunb.* differt: foliis subulatis, scapo longioribus; ramis divaricatis; scapo humiliore; racemo unguiculari.

Obs. 2. *Gawler Bot. Mag. A. flexifolium* *Jacq. et Hayne ad revolutum* sine dubio, *A. flexifolium* *Linn. fil. et Thunb. et Willd.* vero cum? tantum adducit, „quia ab aliis allegata, sed, uti nobis videtur, ex mera conjectura, nominis identitate, repugnante descriptione.“ Interea *A. flexifolium* cum *Jacquini* icone et diagnosi *Willdenowiana*, nullis exclusis synonymis, adducitur tanquam species propria in *Hort. Kew. ed. 2. II. p. 266.* sub n. 3; et ibidem p. 267. sub n. 7 adducitur *A. revolutum* *Linn.* cum diagnosi *Willdenowiana*, et laudata simul icone et descriptione *Bot. Mag.* 1144, nullis exclusis synonymis. Videtur ergo utrumque distincta species, uti et *flexifolium* *Thunb.*

14. **A. revolutum*; (radice fasciculata); foliis linearibus, scabris, scapo ramoso longioribus; (ramis divaricatis); corollis revolutis. *Willd. En. H. Berol.* p. 571. *A. fol. trigonis* scabris; scapo ramoso; cor. revolutis. *Linn. Spec.* 445. *Mant.* p. 565. *Willd. Spec.* II. p. 158. *Mill. Dict.* n. 1. *Thunb. Prodr.* 62. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 318. *Hort. Kew. ed. 1.* p. 447. *ed. 2. II. p. 267.* *Bot. Mag.* 1044. (excl. syn. *A. flexifolii*). *Commel. Hort. amst.* 1. p. 67. t. 54. (a *Gawler* bona dicta). PHALANGIUM *revolutum* *Pers. Syn.* 1. p. 368. n. 18. *Poiret in Lam. Enc.* V. p. 248. et hoc teste: *Asphod. fol. compressis asperis etc. Tournef. Inst.* 345.

Folia trigona scabra. *Linn. Mant. Thunberg* descripsit sponta-

neum sequentibus: Radix fasciculata. Folia radicalia, basi decumbentia, 3 circiter, apice sensim attenuata, carnosae, integra, venosa, subscabra, glabra, flexuoso-erecta, spitham.-ped. Scapus flexuoso-erectus, teres, glaber, ped., subinde ramosus. Rami alterni, divaricati, scapo similes. Racemus subfastigiatus. Bractea ad basin pedunculi singuli, semiamplexicaulis, ovata, acuta, concava, membranacea, alba, carinâ rufescente, lin. longa, glabra. Pedunculi erecto-patentes, inferiores longiores remotiores, superiores breviores approximati. Cor. 6-petala, patens. Petala lanceolata, obtusa, concaviuscula, alba, carinâ rufescente, intus supra basin maculâ rufescente, semiunguicularia. Filamenta subulata, subaequalia, alba, corolla breviora. Antherae ovatae, albae. Germen obtuse 6-angulare, glabrum. Stylus filiformis, longitudine staminum, albus. Stigma simplex obtusum. Caps. ovata, glabra, obtusa; angulis 3 obtusis, sulcatis. Semina in singulo loculamento 2, columnae affixa, globosa, glabra, parva.

Thunb. Apud *Gawler*: fibrae plures carnosae, subfusiformes, descendentes e rhizomate crasso. Folia lorata, striata, glanduloso-scabriuscula. Caulis strictus, subcompressus, paniculato-et divaricato-ramosus, 1½-2 ped. Racemi recti, multiflori, rariusculi; pedicelli diametro corollae breviores, bracteis longiores. Cor. basi brevissime turbinato-convergens; lacinae lineari-oblongae, extus carinatae, lineâ longitudinali viridi, obsolete unguiculatae, intus maculâ baseos duplici flavâ; interiores fere duplo latiores. Filamenta laciniis non adnata, hypogyna, fasciculato-convergentia, inferne complanata, tomentoso-pubescentia, alterna magis. Stylus staminibus longior, subcurvatus. Germen aperturis 3: singulâ nectariferâ. *In Prom. b.*

spei. 4.

15. *A. divaricatum Jacq.*; foliis linearibus, glabris, decumbentibus, scapo paniculato (longioribus); ramis divaricatis; (corollis revolutis). *Jacq. Hort. Schönbr. IV. p. 7. t. 414.*

Radix e fibris fasciculatis pluribus, calamus crassis, carnosus, longis, sordide flavescentibus. Folia plurima, basi squamis membranaceis fuscis laceris, apicem versus sensim angustiora, acuta, carnosula, flaccida et terrae incumbentia, dorso convexula, antice levissime canaliculata, sublineata, nitida, apicem versus tactu subtus asperula, 2-3-ped., 3 lin. lata. Scapus teretiusculus, erectus, glaber, crassitie calami, ped., divaricato-paniculato-ramosus; rami longiores ped. Bractee ad divisiones fuscae, sessiles, latae, lacerae; ad pedicellos lanceolatae, minores. Flores racemosi, inodori. Pedicelli graciles, erecti, 4 lin. Petala lanceolata, acuta, tota revoluta, alba, lineâ mediâ utrinque viridi, alterna paulo angustiora. Filamenta subulata, erecta, alba, longitudine corollae, alterna basi dilatata et concava. Antherae flavae. Germen globosum, viride. Stylus filiformis, erectus, longitudine staminum, albus. Stigma simplex. Caps. ovata. Semina pauca, subrotunda. *Jacq. In Prom. b. | spei. 4.*

Obs. *Cls. Steudel* *A. divaricatum Jacq.* synonymon dicit *revoluti* L., cum *Phalangio spicato Poir.* et *Hyacinthro revoluti Linn.*; plantis satis diversis. Fallitur et in *divaricato* eo, quod *Pers. Syn. I. n. 18* laudet, ubi non *A. divaricatum Jacq.*, sed *Phal. revolutum*, i. e. *A. revolutum* L.; *Persoon* vero iterum sub *Phalangio revoluti* *Syn. I. n. 10* (eodem ergo nomine *bis* usus, lapsu calami) *Hyacinthum revolutum* L. adducit.

16. *A. graminifolium Willd.*; radice fasciculatâ; foliis linearibus, planis, carinatis, prostratis, scapo ramoso brevioribus;

ribus; petalis alternis undulatis; filamentis glabris. *Jacq. Coll. Suppl.* 87. *ic. rar.* II. t. 411. (sub *A. undulato*). *Willd. Spec.* II. p. 159. *H. Kew. ed.* 2. II. p. 268. PHALANGIUM *undulatum* *Poir.* in *Lam. Enc.* V. p. 242.

Totum glabrum. Rad. & fibris pluribus fasciculatis, crassitie pennae columbinae, fibris teretibus ex albo sordentibus. Folia plurima radicalia, in orbem prostrata, sublinearia, acuta, integerrima, striatula, membranacea, longiora 10 poll. Scapus centralis, teres, crassitie pennae columbinae, 2 ped., erectus, inferne ad tactum parum asper, superne laxe racemosus, ramo et foliolo uno alterove. Pedunculiteretes, $\frac{1}{2}$ poll., uniflori, circa medium geniculati, recurvatuli. Bractea viridis, lanceolato-linearis, acuta, pedunculo duplo brevior. Flores inodori, diametri $\frac{1}{2}$ poll. Petala tota nivea, patentissima, oblonga, alterna 3 plana et acutiuscula; 3 obtusa, undulata, paulo latiora. Filamenta filiformia, basi et apice acuta, alba, erectiuscula, petalis duplo breviora: 3 alterna paulo longiora. Antherae flavae. Germen subrotundum, triquetrum, viride. Stylus erectus, staminibus longior, albus. Stigma obtusum, subtrifidum. *Jacq. NARTHECIO* affine. *Poiret. In Prom. b. spei.* 4.

17. *A. vespertinum* *Jacq.*; radice fasciculatâ; foliis lineariformibus, carinato-triquetris, integerrimis, (margine scabris), rectis, scapo tereti ramoso brevioribus (eumque subaequantibus; filamentis muricatis). *Jacq. H. Schönbr.* I. p. 44. t. 85. *Willd. Spec.* II. p. 159. *Hort. Kew. ed.* II. p. 268. *Gawl. Bot. Mag.* 1040. PHALANGIUM *vespertinum* *Poir.* in *Lam. Enc.* V. p. 249.

Rhizoma bulbiceps, radicibus crassis, carnosis, subfasciculatis, (albis, teretibus, crassitie calami, 2-3 unc. *Jacq.*). Folia radicalia caulem basi fasciculatim ambientia, erectiuscula, basi conduplicata, caule duplo breviora, longe attenuata, acuminata, glabra, intense viridia, (nitida), margine scabra, (2 ped. et ultra), basi 4 lin. lata. Scapus aphyllus, (crassitie calami, erectus sed debilis et racemi pondere flexus, succulentus, ramosus vel simplex J.). Racemus multiflorus, erecto-cylindricus, saepius compositus, floribus sparsis, adpressis, confertis. Pedicelli longitudine florum ($\frac{1}{2}$ unc., erecti, teretes J.), bracteis membranaceis, subulato-cuspidatis duplo longiores. Cor. radiato-patens; lacinae ovali-oblongae, obtusiusculae, albae, externe lineâ longitudinali rubente, (utrinque fasciâ mediâ virescente *Jacq.*); interiores paulo latiores, supra basin utrinque obsolete constrictae v. crenatae, intus maculâ ad basin flavâ didymâ. Filamenta alba, radiatim expansa, (erecta J.), laciniis breviora, sublanceolato-filiformia, sublente aculeolis glandulosis muricata (praesertim 3 alterna ad basin J.): antherae obtusae, flavae. Germen sphaericum, 6-sulcatum, minutum, (viride): stylus multoties longior, stamina aequans, tortuosus, erectus. Stigma attenuatum, inconspicuum. *Gawl. In Promont. b. spei.* 4.

18. *A. longifolium* *Jacq.*; radice fasciculatâ; foliis subtriquetris, linearibus, utrinque glabris, ad oras ciliatis, scapisque axillaribus ramosis flexuosis prostratis. *Jacq. Collect. Suppl.*

Suppl. 92. ic. rar. II. t. 415. Willd. Spec. II. p. 139. PHALANGIUM longifolium Poiret in Lam. Enc. V. p. 243.

Rad. e tuberibus teretibus, carnosis, albidis, calamum crassis, pollicem longis. Folia radicalia plura, 1-2 $\frac{1}{2}$ ped., $\frac{1}{3}$ poll. lata, flaccida, pulposula, dorso acuta, ad oras scabriuscula. Scapi plures, longitudine foliorum, glabri, inferne teretes, ad flores triangulares, longissime racemosi. Bracteae ad pedicellos ovatae, acutae, erectae. Pedicelli uniflori, teretes, virides, plus minus $\frac{1}{2}$ poll., in flore patuli, dein erecti. Petala anguste lanceolata, acutula, patentissima nec reflexa, albida cum fascia utrinque longitudinali media ex purpura sordide virente. Filamenta subulata, erecta, alba, omnia pilis carnosis fere tota muricata, (in icone vero glabra)“ alterna 3 longiora. Antherae flavae. Germen subrotundum, trisulcum, glabrum. Stylus glaber, longitudine staminum, albus. Stigma obtusum, subtrifidum. Jacq. In Prom. b. spei. 4.

Obs. Div. Willdenow A. fimbriatum Thunberg forte idem credit cum longifolio; at diversum ex descriptione.

19. A. fimbriatum Thunb.; foliis lineari-ensiformibus, falcatis, margine muricatis; scapo ramoso, glabro, (flexuoso-erecto). Thunb. prodr. p. 65. Fl. cap. ed. Schult. p. 322.

Folia radicalia, striata, glabra, laeviuscula, integra, margine ciliato-muricato, ped. et ultra. Scapus teretiusculus, flexuoso-erectus, ped. et ultra. Rami alterni, patienti-erecti. Racemus oblongus, floribus remotis. Thunb. In Promont b. spei. in campis arenosis prope Cap. 4.

20. A. floribundum Ait. Kew.; foliis planis, glabris, lineari-lanceolatis, acutis; scapo simplici; racemo multifloro, cylindrico, compacto; petalis patentibus; staminibus glabris. Ait. Kew. 1. p. 447. ed. II. 2. p. 267. Willd. Sp. Pl. II. p. 137.

In Prom. b. spei. 4.

Obs. Utrum hujus sit loci A. Lagopus a Willdenow l. c. cum floribundo conjunctum in Hort. Kew. ed. 2. non ad floribundum laudatum, videant autoptae. A. Lagopus, fol. lineari-ensiformibus, scapo simplici brevioribus; racemo erecto longissimo, Thunb. Prodr. 63. Fl. cap. ed. Schult. p. 320, sequentibus describitur apud Thunberg: „Folia radicalia, pauca, apicem versus attenuata, integra, striata, glabra, spithamæa. Scapus teres, striatus, glaber, erectus, ped. et ultra. Racemus sensim florens, spithamæus. Pedunculi capillares, glabri, unguiculares; superiores erecti, approximati; inferiores magis remoti; fructiferi reflexi. Petala oblonga, flava, carinâ rufescente.“ An hoc forte potius Bulbixis species? ..

21. A. pauciflorum Thunb.; foliis ensiformibus, (convoluto-) canaliculatis, (flexuoso-erectis), scapo simplici brevioribus; racemo oblongo, erecto. Thunberg prodr. 63. Fl. cap. ed. Schult. p. 320.

Div. Willdenow in Spec. II. p. 320, cum? tamen, junxit hanc speciem cum pusillo Jacq.; Sprengel vero, sine dubio, utrumque nomine CAESIAE pusillae protulit in S. V. II. p. 88. Attamen, neque CAESIAM esse patet e sequente descriptione: „Radix fasciculata; fibrae fusiformes, carnosae, albae, fibrillosae. Scapus simplex, teres, erectus, glaber, spitham. et ultra. Folia radicalia, 2-6, vel 8, convoluto-canaliculata, striata, integra, glabra. Racemus palmaris. Bractea sub singulo pedunculo, lanceolata, acuta, concava, membranacea, cinerea, lineâ utrinque fuscâ, pe-

dunculo longior. Pedunculus teres, erecto-patens, glaber, semiunguicularis, uniflorus. Petala patentia, ovato-lanceolata, obtusa, concava, semiunguicularia, alba, carinâ viridi. Filamenta filiformia, alba, erecta, corollâ paulo breviora, simplicia. Antherae ovatae, incumbentes, sulcatae, flavae. Germen trigonum, glabrum. Stylus filiformis, erectus, staminibus longior, albus. Stigma simplex, obtusum, villosum. Caps. ovata, obtusa, angulis 3 obtusis, trisulca, 3-striata, glabra. Semina plurima, ovata, glabra. *Thunb.* In lateribus occidentalibus *Leuwekop* et in *Swartland*. 4.

22. *A. triflorum* *Ait.*; foliis canaliculato-ensiformibus; scapo simplici; bracteis remotis, trifloris. *Ait. kew. 1. p. 447. ed. 2. II. p. 268.* *Willd. Spec. II. p. 140.* *A. bipedunculatum*; radice fasciculatâ; foliis lanceolato-linearibus, carinatis; scapo racemoso simplici; bracteis subbifloris. *Jacq. Coll. Suppl. 88. ic. II. t. 410.* PHALANGIUM *pedunculatum* *Poir.* in *Lam. Enc. V. p. 244.* PH. *triflorum* β *Pers. Syn. p. 369.* Totum glabrum et inodorum. Tubera fusiformia, carnosâ, calamus crassa, nigra. Folia radicalia plura, subdisticha, graminea, dorso acuto carinata, lateribus conniventia, acuta, integerrima, e glauco-virentia, plus minus pedalia. Scapus teres, crassitie pennae columbinae, tandem $1\frac{1}{2}$ ped., erectiusculus, spathis paucis, vagis, uncialibus, acutis, sessilibus erectisque; superne racemosus, multiflorus. Pedunculi gemelli, rarissime solitarii ternive, bracteolâ brevi, acutâ, $\frac{1}{2}$ poll.; in flore patuli, in fructu erecti: horum alter multo tardior demum elongatur, praecociore jam fructescente. Petala subcuneiformia, obtusiuscula, $\frac{1}{2}$ poll., reflexo patentissima, alba, lineâ longitudinali virente. Filamenta imberbia, aequalia, erecta, petalis paulo breviora, alba. Antherae oblongae, basi sagittatae, luteae. Germen oblongum, triquetrum, viride. Stylus albus, erectus, longitudine staminum. Stigma obtusiusculum, trifidum. Caps. oblonga, alato-triquetra, obtusa, fuscescens. Semina plura, oblonga, plana, tenuia, atrâ, nitida. *Jacq.* An planta *Jacquiniana* certe eadem cum illa *Hort. Kew.*? An *A. bipedunculatum* potius CHLOROPHYTUM ob capsulam alato-triquetram? In *Prom. b. spei*. 4.

25. *A. ciliatum*; foliis linearibus, canaliculatis, ciliatis, scapo simplici, glabro (brevioribus); spicâ pauciflorâ. PHALANGIUM *ciliatum* *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 276. t. 676.* ANTHERICUM *peruvianum*; fol. lin., canal. recurvatis, margine ciliatis; scapo simplici. *Reliqu. Willd. Ms.* (fide *de Schlechtend. fl.*)

Radix fasciculata, comosa, radicibus partialibus numerosis, carnosâ, fusiformi-cylindraccis, 1-2 poll., comâ filamentoso-setosâ. Folia angustato-acuminata, striata, membranacea, glabra, 6-7 poll., 3 lin. lata. Scapus teres, glaber, basin versus scabriusculus, 1-1 $\frac{1}{2}$ ped. (cum spica), medio bractea ovato-lanceolata, acuminato-cuspidata, striata, membranacea, margine tenuissime denticulata, adpressa, glabra, pollicaris. Spica 4-poll. Flores pedicellati, distantes, bracteati. Pedicelli 2-3 lin. Bractee bracteis supra descriptis simillimae, tantum minores. Calycis laciniâe albae, oblongae, acutiusculae, tristriatae, glabrae. Sta-

mina calyce duplo breviora, glabra. *Kunth.* *Prope Caracas.* 4.

24. * *A. Liliago*; foliis planis (carinatis); scapo simplicissimo; corollis planis; pistillo declinato. *Linn. Spec.* 445. *Mant.* p. 365. *Willd. Spec.* II. p. 141. *Mill. Dict.* n. 3. *Roth Germ.* II. 392. *Enum pl. germ.* I. 2. p. 50. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 557. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 205. *Bertol. Amön.* p. 145. *Desfont. Fl. Atl.* 1. p. 394. *Flor. Dan.* t. 616. *Jacq. Hort. vind.* 1. t. 85. *Wulf. in Jacq. Coll.* III. p. 62. *Svensk Bot.* t. 403. *Curt. Bot. Mag.* 318. *Kniph. Cent.* XII. n. 11. ORNITHOGALUM *gramineum* *Lam. Fl. fr.* 5. p. 278. PHALANGIUM *Liliago* *Schreb. Spicil.* 36. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. 210. *Tenore Fl. neap.* 1. p. 185. *Seb. et Maur. Prodr. Fl. rom.* p. 129. *Redout. Lil.* t. 269. *Trattin. Oestr. Fl.* t. 196. PH. *Liliago* β *minus* *Gawl. Bot. Mag.* 914. *Hall. Helv.* n. 1207. *Moris. Hist.* 1. p. 335. T. IV. t. 1. f. 10. *Parkins. Parad.* 150. 3. t. 151. f. 2. *Bauh. Hist.* 2. p. 635. — β *majus.* PH. *Liliago* α *Gawl. Bot. Mag.* 1635.

Varietas *A. ramosi* ex opin. *Gerard*, sed constans est. *Linn.*

Mant. Radix bulbis fusiformibus, lanceolatis, albis. Folia linearia, acuminata, canaliculata, stricta, apicibus recurvis, glabra, striata, basi vaginâ albâ membranaceâ, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ ped., 2-4 lin. lata. Scapus simplex, erectus, glaber, 1-2 ped., teres, substriatus, qua florifer angulosus, nudus. Racemus laxus, simplex, ante anthesin nutans, 4-8 poll. Flores alterni, inferiores remotiores, longius pedicellati. Pedunculi basi articulati, corollâ breviores, angulo acuto patentes, 4-7 lin. Bracteae lineari-lanceolatae, acutae, pedunculos subaequant, subinde etiam breviores et longiores, virescenti-vel albide lutescentes. Cor. sub fecundatione patentissima, prius et serius clausa, cylindracea. Petala alba, oris diaphano-punctatis, medio striis 3-5 longitudinalibus, diaphanis; 3 exteriora angustiora apiceque magis viridia, lanceolato-oblonga, obtusa, 6-9 lin. Filamenta alba, glabra, non dilatata, 3 longiora, corollâ fere duplo breviora. Antherae lineares, luteae. Germen viride. Stylus albus, stamina superans. Stigma ad lentem pubescens. Caps. oblonga, obsolete trigona. Cor. diametro 8 poll., laciniis albis extus striâ mediâ flavo-viridi. *Gawl.* Variat rarius scapo uno alterove ramo instructo. *de Schlecht. Fl. berol.* 1. p. 191. *Cham. Adnot.* p. 10. — In β folia magis glaucescentia. Pedicelli $\frac{1}{2}$ poll. et ultra; bractea fusco-flavescens, pedicello paulo brevior. Cor. diametro plus quam pollicari, laciniis extus apice virentibus. Filamenta laciniis fere triplo breviora. *Gawl.* *A Norvegia ad Africam borealem per omnem Europam.* 4.

Obs. „A planta *Halleri* n. 1207 differt, quod petala non sint petiolata, uno ordine omnia sita, non extus virente lineâ inscripta; sed capsula ovata, 3-locularis, 3-valvis.“ *Jacq.* 1. c.

25. * *A. ramosum*; foliis planis; scapo ramoso; corollis planis; pistillo recto. *Linn. Spec.* p. 445. *Mant.* p. 365. *Willd. Spec.* II. p. 138. *Roth Germ.* II. p. 519. *Enum. pl.*

germ. I. 2. p. 49. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 558. Wahlenb. Fl. suec. p. 202. Bertol. Amön. it. p. 354. n. 105. Jacq. Austr. t. 161. Fl. Dan. 1157. Boiss. Fl. Eur. t. 254. Plenck Off. t. 269. Schkuhr t. 95. Kniph. C. XII. n. 12. PHALANGIUM ramosum Lam. et Decand. Fl. fr. III. p. 210. Redout. Lil. t. 287. Bot. Mag. t. 1056. Trattin. Oestr. Fl. t. 197. ORNITHOGALUM ramosum Lam. Fl. fr. 3. p. 279. Phalangium Hall. 1208. Lob. ic. 47. Besler H. Eyst. 7. vern. t. 1. f. 2. Horologium florae. Act. bern. 1766. t. 6. — β . simplex Rochel Herb. 221.

Radix rhizoma fere horizontale, foliorum vestigiis laceris tectum, fibris crassis, albis, descendentes. Scapus 1-3 ped., strictus, paniculato-ramosus, teres, apice angulosus, glaberrimus; rami alterni, patentes. Folia $1\frac{1}{2}$ -1 ped., plura, glaucescentia, linearia, acuminata, carinata, glaberrima, obsolete striata, $1\frac{1}{2}$ -3 lin. lata. Bracteae sub ramis infimis foliiformes, anguste lineares, superiores minores; sub pedunculis minutae e basi ovata subulatae. Pedunculi remoti, gracillimi, 1-flori, basi articulati, laxi, erectiusculi, 4-6 lin.. Cor. nivea, pedunculis vix longior; lacinae ellipticae, obtusae, 3-6 lin.: exteriores duplo fere angustiores acutiusculae. Filamenta filiformia, 3 breviora. Stylus stamina paulo superans, subincurvus. Stigma subtrigonum, pilis brevibus apice glandulosis. Caps. globoso-trigona, sulcis 3 profundis, mucronulo brevi. β vix notatu dignum, omnibus partibus paulo minus. In calcareis per omnem Europam temperatiorem praeter Britanniam; in Tauria. 24.

7. foliis lineari-lanceolatis v. ensiformibus latioribus.

26. A. nepalense; foliis lineari-lanceolatis, longitudine scapi; paniculâ simplici; bractea inferiore longissimâ, subtus glaucâ; perianthii laciniis patentibus, oblongis, obtusis. Lindl. in Trans. Hort. Soc. VI. p. 227. Bot. Reg. 998. (utrinque sub PHALANGIO nepalensi.)

Totum glabrum, $1\frac{1}{2}$ -2 ped., radicibus fasciculatis. Scapus intense viridis, teres, ad articulos quidquam incrassatus, foliis paulo brevior. Folia plura, radicalia, ensiformia, suberecta, apice patentia, canaliculata, supra nitentia, viridia, subtus glauca, striata, obtusa, apice nervis 3 obsolete, margine submembranaceo, dorso nervo valido. Flores albi, inodori: expansi nutantes, inexpandi erecti, terni in panicula simplici, erectâ. Bractea inferior longa, lanceolata, obtusa, colore texturâque foliorum: supremae pedicellis breviores. Petala subaequalia, longitudine staminum. Stamina antheraque luteae. Stylus staminibus paulo longior. Caps. erecta, corollae vestigiis tecta. Lindl. In Nepal. 24.

Obs. In specimine vivo, a D. de Martius in Britannia Horto Monacensi illato, quod florens Monachii vidimus, folia plura, erecto-patentia, linearia, basi angustata vaginantia, obtusiuscula vel mucrone parvo, brevi, apice plana, basi canaliculata, subcarinata, glabra, obsolete striata, laete viridia, subtus pallidiora, margine tenuissimo albide membranaceo; infima fere pedalia, superiora $1\frac{1}{2}$ -2 ped., latissima fere pollicis, angustiora 4-5 lin. Scapus erectus, simplex, teres vel basi subanceps, glaber, nudus, viridis, fere 2 ped.; crassitie pennae corvi. Flores in racemis 6-poll. secundi, plerumque terni in axilla bracteae, 1-2 poll. distantes, sub anthesi nutantes, fructificantes erecti. Bractea ovatae, acuminatae, subcarinatae, glabrae, virentes, margine sphacelatae, inferiores majores, longitudine fere pedicellorum, marcescentes. Pedicelli tri-

quetri, infra medium articulati, articulo paulo incrassato, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ poll., sat crassi, glabri, virides. Cor. alba, apice virescens; petala persistentia: exteriora paulo latiora firmioraque, lanceolata, acuta, margine membranacea, $\frac{1}{2}$ poll., $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata; interiora paulo angustiora multoque breviora. Filamenta capillaria, albida, petalis triplo breviora, glabra, antheris linearibus basi subsagittatis, aurantiacis, filamento longioribus, petalo duplo brevioribus. Stylus teres, filiformis, antheris multo brevior, albidus, germine multo longiori, stigmate parvo, rotundato. Caps. alato-triquetra, marginibus incrassatis, viridis, glabra, latior quam longa, δ circiter lin. longa, petalis persistentibus obvallata, stylo persistente coronata, ovalis 10-12 in loculo singulo. Anne potius *Chloropogon*? nam Cor. persistens et capsula alato-triquetra?

27. *A. tuberosum Roxb.*; radicibus plurimis, carnosis, tubere parvo oblongo terminatis; foliis radicalibus ensiformibus, margine undulatis; scapo tereti, nudo; floribus paniculatis; stylo adscendente. *Roxb. Coromand. II. p. 20. t. 158.*

Folia radicalia, numerosa, glabra, 1-2 ped., 2-4 poll. lata. Scapus glaber, 1-5 ped.. Panicula oblonga, erecta. Flores numerosi, suberecti, candidi, magnitudine et forma *GALANTHI nivalis*. Filamenta aequalia, simplicia, brevia, adscendentia: antheris linearibus, erectis. Stigma truncatum. Capsula triquetra. In vallibus montium *Circars. 4.*

28. *A. glaucum Ruiz et Pav.*; (foliis ensiformibus, carinatis, glaucis;) racemo longissimo, simplici, multifloro; pedunculis floriferis patentibus, fructiferis adpressis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 68. Link Enum. 1. p. 329. PHALANGIUM glaucum Poir. Enc. Suppl. IV. p. 380.*

Radix tuberosa, fasciculata. Scapus erectus, teres, nudus. Folia ensiformia, carinata, divergentia, supra glauca, nitida. Pedunculi in flore patentibus, in fructu scapo adpressi. Petala alba, apice et medio dorsi viridia. *Ruiz et Pav.. In montibus Andium Peruviae et in collibus Tarmae. 4.*

29. *A. eccremorrhizum Ruiz et Pav.*; foliis ensiformibus, carinatis; scapo folioso; racemis longis; spathis 2-3-floris. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 67. t. 301. f. 6. PHALANGIUM eccremorrhizum Poir. Enc. Suppl. IV. p. 380.*

Radix fasciculata, tuberoso-pendula, lanuginosa: tubera oblonga; fibrae longae, filiformes; setae numerosae ad radicis ortum, erectae. Caulis erectus, $1\frac{1}{2}$ ped., teres, foliosus. Folia radicalia ped. et ultra, ensiformia, carinata, repanda, glabra, subtus striata, poll. lata; caulina semiamplexicaulia, ensiformia. Racemus multiflorus, spathaceus. Spathae alternae, semiamplexicaules, lanceolato-subulatae, membranaceae, albicantes, 2-3-florae; ex infima spatha pedunculus multiflorus imbricatus. Flores albi aut lutei, pedunculati, cernui. Antherae luteae, incumbentes, oblongae, basi bifidae. *Ruiz et Pav.. An hujus generis? In Peruviae collibus in prov. Chanca, 4.*

30. *A. ramosissimum*; glabrum; foliis lineari-lanceolatis, planis; scapis apice paniculato-ramosis; spicis multifloris; stylo filiformi-setaceo longitudine corollae. *PHALANGIUM ramosissimum Presl in Reliqu. Haenk. Fasc. II. p. 127.*

Folia mere radicalia, 14 poll., 9 lin. lata, apice basique attenuata, haec canaliculata, undique glaberrima. Scapus pedalis crassitie pennae columbinae, erectus, glaber, teres, inferne simplex et

bracteis foliiformibus, lanceolato-oblongis, pollicaribus vestitus, apice in ramos numerosos, $\frac{1}{2}$ ped., paniculatos, patentes, basi bractea lanceolata suffultis divisus. Rami tota longitudine florigeri, floribus laxè spicatis. Pedicelli lin. longi, 2-5, fasciculati, filiformes, erecti, uniflori. Corollae flavescens lacinae vix 3 linear., oblongae, acutiusculae, patentes. Filamenta subulata, plana, erecta, antheris linearibus subcoactis, apice subinde spiritaliter contortis breviora. Stylus staminibus longior, filiformis, erectus, longitudine corollae. Stigma simplex; germen globosum; capsula ovato-globosa, glabra, trigona, loculis polyspermis. Semina subtrigona, nigra, nitentia, subtilissime punctata. *Presl. c. In Mexico ad Acapulco.* 4.

31. *A. undulatum* Thunb.; foliis ensiformibus, falcatis, undulatis, scapo longioribus Thunb. *prodr.* 65. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 321. *Willd. Spec.* II. p. 140.

Rad. carnosà, palmato-4-partita, fibrosa. Folia radicalia, glaberrima, 2-3, undulato-plicata, viridia, marginibus fusciscentibus, integra. Scapus 1, raro 2, simplex, pilosus, digitalis, multiflorus. Bractee ovato-lanceolatae, apice setaceae, glabrae, hyalinae, membranaceae, carinà viridi, pedunculo vix breviores. Pedunculi simplices, pilosi, poll. Petala patentia, lanceolata, obtusa, intus glabra, extus pilosa, marginibus albidis, carinà rufescente; exteriora 3 paulo angustiora. Filamenta corollae breviora, inferioribus 3 brevioribus, alba, linearia, papuloso-villosa, non barbata, germi inserta. Antherae ovatae, flavae, dorso medio affixae, antice trisulcae. Germen ovatum, trisulcum, glabrum. Stylus glaber, longitudine staminum. Stigma obtusum, pallide flavescens. Caps. obovata, obtusa, 3-sulca, glabra. *Thunb. In Prom. b. sp. in collibus arenosis littus inter et montes.* 4.

b. SPURIA: radice bulbosâ.

a. *Albucoidea: corollae laciniis apice subfalcatis.*

32. *A. fragrans* Jacq.; radice bulbosâ; foliis semifiliiformibus, semiteretibus, strictis, scapo erecto (multifloro) duplo longioribus; (vaginis nullis); filamentis glabris. *Jacq. H. Schönbr.* 1. p. 45. t. 86. *Willd. Spec.* II. p. 135. *Hort. Kew.* 2. II. p. 266. *ALBUCA jugax* Ker Bot. Reg. 311. *PHALANGIUM fragrans* Poir. in *Lam. Enc.* V. p. 247.

Totum glabrum. Bulbus tunicatus, subrotundus, ex albido sordens, $\frac{1}{2}$ unc. in diametro. Folia plurima semiteretia, antice sulco exarata, acuta, pennâ columbinâ graciliora, $\frac{1}{2}$ ped., erectiuscula. Vaginae nullae. Scapus subteres. Racemus $\frac{1}{2}$ ped., erectus. Pedicelli patuli, $\frac{1}{2}$ unc., bractea lanceolata-acuminatâ albidâ brevi. Flores fragrantissimi. Petala oblonga, obtusa, patentissima, albida, extus leviter purpurâ suffusa costâque mediâ viridi. Filamenta subulata, petalis duplo breviora. Antherae flavae. Germen ovatum, triquetrum, viride. Stylus subulatus, albus. Stigma trifidum. Apud *Gawler*: Bulbus compacto-squamosus. Folia erecto-patula, carnosâ, semitereti-linearia, subulata, obsolete subtrigona, hinc planiora, non glauca. Scapus ped. vel ultra, glaucus, foliis multo crassior. Racemus laxiusculus, patens, $\frac{1}{2}$ ped. vel ultra. Pedunculi flore breviores. Bractee pedunculis breviores, membranaceae. Cor. succulenta, tenera,

cito collabens, ultra unc. lata, subrotata; laciniis non contiguis, apice incurvis, albidis, extus et summitate colore purpureo suffusis, lineâ mediâ viridi profunde carinatâ. Stam. aequalia, paululum declinata: antherae erectae. Germen oblongum, prismaticum, angulis bicostatis. Stylus purpurascens, crassiusculus, lineari-triqueter, curvo leni assurgens, longitudine corollae. Stigma cavum, subtrifido-apertum, pubescens. Differentiam *Jacquinii* iconem inter et illam in *Bot. Reg.* a pictorum incuria potius pendere, quam a diversitate plantarum: *Ker.* In *Prom. b. spei.* 4.

33. *A. exuviatum Jacq.*; radicé bulbosâ; foliis subulatis, extus convexis, intus concavis, erectis; basi inclusis vaginis scariosis transversim striatis, scapo simplici (longioribus). *Jacq. Coll. Suppl.* 89. t. 14. f. 2. *ic. rar.* II. t. 415. *Willd. Spec.* II. p. 136. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 267. ALBUCA *exuviata Bot. Mag.* t. 871. PHALANGIUM *exuviatum Poir.* in *Lam. Enc.* V. p. 243. β . *minus.*

Totum glabrum. Bulbus subrotundus, tunicatus, sordide e flavo-fusco pallens, diametri $1\frac{1}{2}$ poll. Vaginae radicales ab unica ad 6, membranaceae, scariosae, canaliculatae, albidae, pellucidae, nitidae, ab 1 ad 4 poll. longae, striis transversis valde elevatis, has inter longitudinalibus, fusciscentibus, eleganter variegatae, exuvias serpentum mentitae, folia inferne scapumque amplexantes, nunc integrae, nunc longitudinaliter fissae. Folia pauca, quasi juncea, acuta, glutinose carnosopulposa, firmula, lacte virentia, $1\frac{1}{2}$ ped. vel 2 ped. alta. Scapus teres, erectus, nudus, crassitie pennae columbinae, cum virore fuscescens, superne racemosus, foliis brevior. Racemus subovatus, erectus, laxior. Pedicelli patentes, $\frac{1}{2}$ poll., suffulti bracteolâ lanceolato-acuminatâ, brevi. Petala albida et subpellucida lineâ longitudinali mediâ utrinque viridi-purpureâ, glaberrima. Filamenta albescentia. Antherae flavo virent. Germen virens. Caps. glabra, coloris straminei. Semina atra: *Jacq.*, cui character genericus parum abludere videtur; addit enim: „Petala lineari-lanceolata, acuta, carinata, falcata, patentissima; 3 alterna parum latiora. Filamenta subulata, patula, imberbia, petalis paulo breviora. Antherae oblongae, didymae, obtusae, erectae. Germen oblongum, triquetrum. Stylus filiformis, staminibus longior. Stigma capitatum, trifidum, villosum. Caps. ovata, obtusa, triangularis, trilocularis, trivalvis. Sem. plura, oblonga, membrana subrotundâ alata. — Apud *Gawler* pedicelli fere longitudine corollae, bracteis sphaeclatis, fuscis, sanguineo-striatis, pedicello brevioribus. Cor. patentissima diametro fere pollicari: laciniis ovali-oblongis, albis, fasciâ mediâ viridi. In β spontaneo omnia fere eadem, sed duplo minora; vaginae $2\frac{1}{2}$ poll.; folia tenuissime scabrida, 9-10 poll.; scapus quidquam flexuosus, 8-9 poll., pennâ corvi paulo tenuior; racemus 5-florus; pedunculi patentes, 3-4 lin.; bractee lanceolato-subulatae, purpurascens, pedunculis paulo breviores; petala 4 lin., obtusa, exteriora dorso purpurascens; interiora latiora, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, tenuiora, pallidiora, lineâ mediâ angustiore viridi-purpurascens; stamina corolla fere duplo breviora. In *Prom. b. spei.* 4.

34. *A. filifolium Jacq.*; radicé bulbosâ; foliis filiformi-

bus, flexuosis, glabris, scapo simplici (paucifloro fere longioribus; filamentis glabris.) *Jacq. Coll. Suppl. 95. ic. rar. II. t. 414.* *Willd. Spec. II. p. 155.* *Link. Enum. 1. p. 529.* *ALBUCA filifolia Her Bot. Reg. 557.* *PHALANGIUM filifolium Poir. in Lam. Enc. V. p. 242.*

Totum glabrum. Bulbus ovatus, uncialis, digitum crassus, tunica-tus, fuscus. Folia radicalia plerumque 3, semiteretia, acuta, nitida, basi purpurascens, ceterum viridia, reclinata, rigidula, longiora pedalia, una cum scapo in vagina scariosa, pallida, transversim striata, in planta florente semipollicari fissa. Scapus teres, nitidus, flexuosus, erectus, foliorum crassitie et fere longitudine, inferne purpureus. Flores inodori, sub septem. Pedunculi vix $\frac{1}{2}$ poll., patuli, bractea lanceolata, acuminata. Petala oblonga, obtusa, parum concava, patentissima, albida, lineam longitudinali virente: 3 alterna latiora. Filamenta aequalia, erecta, subulata, petalis duplo breviora, alba. Antherae flavae. Germen oblongum, triquetrum. Stylus adscendens, albus, longitudine staminum. Stigma subcapitatum, villosum. *Jacq.* Folia longissima. *Link. In Prom. b. spei, ad Namaquas. 4.*

35. *A. nematodes*; foliis capillari-filiformibus, flexuoso-erectis, glabris, scapo erecto duplo brevioribus. *A. filifolium*; foliis filiformibus, scapo erecto brevioribus. *Thunb. prodr. 62. Fl. cap. ed. Schult. p. 317.*

Folia radicalia plura, filiformi-capillaria, sulco excavata, flexuoso-erecta, glabra, scapo duplo duplo breviora, pollicaria vel paulo ultra. Scapus unicus, simplex, filiformis, rufescens, glaber, palmaris. Flores in racemo erecto, $1\frac{1}{2}$ poll. Pedunculi lineam longi, erecto-patentes. Cor. albida, petalis dorsali lineam rufescentibus. *Thunb. In Prom. b. spei. 4.*

Obs. Div. *Willdenow* ad *A. filifolium* observavit: „*A. filifolium* *Thunb. prodr. 62* est forte *fragrans* vel *filifolium* *Jacq.*; nam ex diagnosi *Thunbergiana* non ausim quid certi determinare.“ At patet ex descriptione supra a *Thunberg* data ad neutrum spectare *A. filifolium*, cujus nomen, ob *Jacquinianum* nunc ubique receptum, mutandum fuit.

36. *A. alburoides* *Ait.*; foliis linearibus, canaliculatis, glabris, margine cartilagineis; scapo simplici. *Ait. Kew. 1. p. 449. ed. 2. II. p. 269.* *Willd. Spec. II. p. 141.* *ORNITHOGALUM alburoides* *Thunb. Fl. cap. ed. Schult. p. 314.* *Spreng. S. V. II. p. 314.* *PHALANGIUM alburoides* *Poir. Lam. Enc. V. p. 249.* β . *majus*; foliis basi latis. *Thunb. l. c.*

Petalis luteis carina viridi, apice fornicatis refert *ALBUCAM*; sed differt petalis interioribus patulis, et filamentis supra basin non complicatis. *Ait. l. c.* Rad. bulbus ovatus, albus, carnosus, fibrosus, piso major. Folia radicalia subteretia, sensim attenuata, carnosae, scapo breviora, spithamaea. Scapus teres, erectus, glaber, ped.. Flores alterni, pedunculati, remoti, pauci. Spatha sub singulo pedunculo, 1-phylla, lanceolata, acuta, membranacea. Pedunculi teretes, glabri, 1-flori, cernui, unguiculares. Cor. subcampanulata. Petala ovalia, concava, apice incrassata, incurva, flava, carinam viridi, unguicularia. Filamenta subulata, omnia basi dilatata, alba, nervo viridi, corollam duplo breviora, erecta. Antherae ovatae, striatae, erectae, flavae. Stylus stami-

nibus paulo longior, erectus, flavescens. Stigma capitatum, villosum, flavum. Capsula ovata, obtusa, obtuse triquetra, trisulca, glabra. Semina plurima. *Thunb.* Clo *Gawler* *ALBUCA* ost, *vittatae* proxima, quam confer. *Willdenow*, cum? licet, junxit cum *O. suaveolente Jacq.*, cui e descriptione propior. *In Promont. b. spei.* 4.

37. *A. setosum Willd.*; foliis lineari-canaliculatis, margine (sub) cartilagineis, scapo longioribus, basi setis cinctis. *Reliqu. Willd. MS.*

Bulbus? Basis plantae reliquiis foliorum marcidorum in setas aridas fissorum cincta. Folia crassiuscula, scapo longiora, laevia. Scapus pedalis, glaber, subtus sulcatus, superne racemum gerens. Flores dense congesti, pedunculati: pedunculis subpollicaribus. Flores aurei, strii; saturatoribus. De *Schlechtend. fil.* *In Promont. b. spei.* 4. *Lichtenstein.*

β. *Caesioidea*; filamentis medio incrassatis.

38. *A. physodes Jacq.*; filamentis glabris, medio papillosis; radice bulbosâ; foliis (hysteranthiis, lanceolato-) oblongis, planis, lucidis, erectis; scapo simplici; racemo (pyramidato-) corymboso. *Jacq. Coll. Suppl.* 94. *Ik. rar.* II. t. 418. *Willd. Spec.* II. p. 147. *ALBUCA physodes Gawl. Bot.* t. 1046. *CAESIA physodes Spreng. S. V.* II. p. 88. *PHALANGIUM marginatum Poir. in Lam. Enc.* V. p. 251. (excl. *ANTH. marginato Thunb.*)

Totum glabrum. Bulbus subrotundus, $1\frac{1}{2}$ poll. diametro, purpurascens, tunicâ extimâ tenuissimâ fuscâ. Folia post fructum maturum 5-6, basi mutuo amplexantia, canaliculata, ceterum plana, acuta, integerrima, subtiliter lineata, unâ alterâve plicâ carinata, 6-9 poll., $1-1\frac{1}{2}$ poll. lata. Scapus ante folia teres, nudus, crassitie fere pennae columbinae, e fusco viridis, $\frac{1}{2}$ pedis. Racemus erectus, cylindricus, 4-5-poll. Braeetae ad pedunculos parvae, concavae, truncatae, albidae. Pedunculi filiformes, vix poll., numerosi, patentissimi. Flores inodori. Petala lanceolata, acutula, patentissima, subaequalia, albida, dorso linea longitudinali purpureo-fuscâ. Filamenta alba, erecta, aequalia, petalis ($\frac{1}{3}$) breviora, basi angusta, papillis cylindricis muricata, lanceolata, triangulari-compressa, crystallino-papulosa. Antherae oblongae, obtusae, sulcatae, flavae. Germen ovatum, trisulcum, obtusum, glabrum, album. Stylus trisuleus, erectus. Stigma obtusum, trifidum, papillosum. Capsula ovata, obtusa, coriacea, suturis, 5 prominulis, inflata, sordide pallida, pendula: loculis dispermis. Semina in alam ovatam explanata, scabra, atra. *Jacq.* In planta *Gawleri* bulbus fere solidus, ovato-pyramidalis. Folia erecto-divergentia, canaliculato-concava, basi convoluta. Racemus subconfertus, pyramidato-oblongus. Cor. pallidissime flavo-fusca (in icone tamen albida), diametro 4 lin.; lacinae lineari-oblongae, intus concavae, quidquam obtusae, apice fornicato-incurvae, externe striâ longitudinali carinatae. Antherae breves, flavicanti-virides. Stylus germine longior, filamentis altior, fere longitudine corollae. Stigma parum conspicuum, depresso-glandulosum. Germen pyramidale ovatum, striato-sulcatum. *In Prom. b. spei.* 4.

39. *A. marginatum* Thunb.; foliis oblongis, obtusis, marginatis, (margine reflexo villosulo), scapo simplici brevioribus; racemo subumbellato. *Thunb. prodr.* 63. *Fl. cap. ed. Schult. p.* 324.

Willdenow Spec. II. p. 147 junxit cum *A. physode*. *Thunberg* vero descripsit in sua: „folia radicalia circiter bina, sessilia, obtusissima, striata, glabra, margine reflexo tenuissime villosa, patentia, pollicaria, unguem lata; scapum filiformem, basi flexuosum, erectum, glabrum, palmarem usque spithamaeum; flores subumbellatos, fastigiatos; pedunculos capillares, patentes, $1\frac{1}{2}$ poll.“
In Promont. b. spei; in Hantum.

40. *A. pusillum* Jacq.; filamentis lanceolatis, glabris; radice bulbosâ, foliis lanceolato-linearibus, planis, nitidis, in orbem prostratis; scapo simplici; racemo corymboso. *Jacq. Collect. suppl.* 95. *icon. rar.* II. t. 417. *Willd. Spec.* III. p. 147. CAESIA *pusilla* Spreng. *S. V.* II. p. 88. (uterque excl. syn. *Thunb.*) PHALANGIUM *pauciflorum* Poir. in *Lam. Enc.* V. p. 251. (excl. syn. *Thunb.*)

Facies *Scillae*; ante foliorum explicationem florens. *Willd.* Bulbus albus, subrotundus, fere magnitudine nucis juglandis, crasse tunicatus. Folia peractâ anthesi fere 12, acutula, integerrima, utrinque nitidissima, 3 fere poll.. Scapus filiformis, teres, inferne villosus, purpureo-ferrugineus, $1\frac{1}{2}$ -4 poll., debilis, erectus e vicinis, alias procumbens. Pedunculi plurimi filiformes, 1-flori, suffulti bracteolâ minutâ, albidâ, $\frac{1}{2}$ poll., florentes erectiusculi, dein patuli. Flores inodori, ultra florum centralium gemmas producti, et florentes simul paucissimi (unde species corymbi), toti albi, exceptis antheris luteis et petalis floris superne purpurascensibus cum lineâ perpendiculari mediâ virente. Petala oblonga, obtusa, subaequalia, plana, patentissima. Filamenta lanceolata, compressula, aequalia, erectiuscula, ortu cum germinis angulis alternantia, petalis paulo breviora. Antherae oblongae, obtusae, erectae. Germen oblongum, profundissime sexsuleum. Stylus crassus, trisuleus, erectus, longitudine staminum. Stigma obtusum, obsolete trifidum. *Jacq.* *In Promont. b. spei.* 4.

41. *A. fugax* Moris; bulbosum, glabrum; foliis lineari-filiformibus, canaliculatis, scapo tortuoso, simplici brevioribus; floribus laxe racemosis; pedunculis articulatis; filamentis medio subincrassatis. *Moris. stirp. sard. Elench.* 1. p. 46.

Flores ephemeris, Perigonium profunde sexpartitum; laciniis candidis lineâ mediâ purpurascens. *Moris*, In specim. nostro: bulbus ovatus, tunicatus, fuscescens, poll. et paulo ultra; fibris radicalibus crassis albidis. Folia desunt, an hysteranthia? (Folia angustissima, vix ultra poll., acuta, recurva. *Bertol. in litt.*) Scapi 1-2 ex eodem bulbo, erecti vel quidquam flexuosi, teretes, glabri, nudi, purpurascens, 5 poll.-pedales, crassitie fili emporitici. Racemus latus, 4-5 florus, erectus. Pedunculi remoti, alterni, glabri, teretiusculi, superne incrassati, cum scapo articulati; floriferi patentes v. subnutantes, deflorati erecti, 2-3 lin. Braeatea ad eorum basin minutissima, caduca, alba. Corolla 7 lin. diam., decidua, basi brevissime subinfundibuliformis, ceterum patens; lacinae lanceolatae v. oblongo-ellipticae, acutius-

culae, subaequales, tenuissimae, interiores subdiaphanae, albidae cum rubore quodam, lineâ mediâ laete purpureâ, in exterioribus latiore, 4-5 lin., lin. et paulo ultra lata. Stam. corollâ $\frac{1}{3}$ breviora, alterna paululum breviora, erecta; filamenta albida, glabra, basi corollae laciniarum adnata, subulata, medio paululum crassiora; antherae ovato-oblongae, luteae, dorso affixae, $\frac{1}{2}$ lin.. Germen oblongum, trigonum, viride. Stylus filiformis, albidus, glaber, stamina paulo superans. Stigma quidquam incrassatum subtrigonum. Caps. ellipsoidea. *In collibus aridis Sardiniae australioris. Moris, Müller. 4.*

42. *A. comosum Thunb.*; foliis ensiformibus, glabris; scapo racemoso, comoso. *Thunb. prodr. 63. Fl. cap. ed. Schult. p. 523. Willd. Spec. II. 137. CAESIA comosa Spreng. S. V. II. p. 88. PHALANGIUM comosum Poir.*

Folia radicalia, pauca, utrinque attenuata, plana, striata, spithamea et ultra. Scapus angulatus, glaber. Rami alterni, similes, apice ramosi. Stipulae sub ramis lanceolatae, acuminatae. Coma polyphylla; foliola lanceolata, falcata, poll. vel ultra. Flores racemosi, sub coma remoti. Petala infima basi connata, lanceolata, obtusa, patentia, concaviuscula. semiunguicularia, ciliata, caerulea, carinâ subtus rufescente. Filamenta subulata, utrinque attenuata, petalorum unguibus inserta, petalis breviora; 3 breviora, alba, fasciâ mediâ apiceque saturate caerulea. Antherae lanceolatae, flavae. Stylus staminibus paulo longior, albus, fasciâ duplici caerulescente. Stigma acutum, simplex. Caps. ovata, obtusissima, obtuse triangularis, trisulca, glabra. *Thunb. In Langekloof, in collibus ad Prom. b. spei. 4.*

γ. Scilloidea.

43. *A. pomeridianum Ker*; foliis flaccidiusculis, lato-subulatis, triquetro-canaliculatis cum carinâ acutâ, glaucis, margine nervisque supra scabris; caule paniculato-ramoso; filamentis imberbibus. *Ker in Bot. Reg. 564. Journ. of sc. et arts. 1. p. 181. SCILLA pomeridiana; fol. lineari-lanceolatis, undulatis, patulis, scapo ramoso brevioribus. Decand. Hort. monsp. p. 143. ined. t. 6. Poir. Enc. Suppl. V. p. 89. Redout. Lil. t. 421.*

„Habitus PHALANGII; sed radix bulbosa, ut in SCILLA. Nomine PHAL. bicoloris e Burdigala missa, a quo toto coelo diversa bulbo, scapo 5-plo et ultra altiore, filamentis glabris etc. Scapus fere 2-ped.. Flores longitudinaliter per ramos a basi sursum 2 quotidie florentes horâ pomeridiana II., noctu clausi, albi cum parte perigonii externâ purpurascente.“ *Dec. l. c.* Rhizoma bulbiceps, (bulbus superne conicus, basi rotundatus, 2 poll. latus, *Redout.*) tunicis fuscis, grosse fibroso-contextis subvaginantibus. Folia radicalia, scirpoideo-triquetra, lenta, plura, exteriora longiora, $1\frac{1}{2}$ -2 ped., (9 lin. lata R.) supra glauca nervisque scabris striata, (punctisque numerosissimis, albis, minimis R.) ultimis lateribus revoluta, subtus glabra virentia. (Scapus erectus, gracilis, teres, 5-ped., e centro bulbi; ramis pluribus simplicibus divergentibus. R.) Flores fugaces, teneri, convoluto-emarcescentes, inodori. Pedunculi 1-flori, virides, teretes, glabri (9 lin., basi bractea brevi subulata. R.). Corolla fere $\frac{1}{2}$ unc. in diametr.

recurvo-radiata, inferne connivens; laciniis lineari-ligulatis, obtusis, superne distantibus, (longitudine pedicellorum, roseo-albidis. R.) vittâ mediâ dorsali intus roseâ, extus e viridi atque purpureo sordescente, interioribus sublatioribus obtusioribusque. Stam. corollae aequalia, erecto-divergentia; filamenta basi laciniarum brevissime adnata, filiformi-subulata, glabra, inferne subdilatata intusque subcanaliculata; antherae lineari-oblongae, violaceo-fuscaetae, polline luteo. Germen viride, oblongum, superne angustatum, pluries stylo brevius, rotundate 3-gonum, lineis 6 pallidioribus, loculis subdispermis. Stylus setaceus, albus, leviter curvatus, staminibus aequalis, puncto stigmatoso emarginato. *Ker*, cui non differre videtur *A. scabrum*, cuius specimen incompletum asservatur in *Herb. Banks.* *Hab.?*, in *Prom. b. spei.?* 4.

44. *A. esculentum*; radice bulbosâ; foliis omnibus radicalibus, linearibus, carinatis; stigmatate minute trifido. *PHALANGIUM esculentum* Nutt. in *Fras. Cat.* 1813. *Nutt. gen.* 1. p. 219. *Torr.* in *Sillim. Journ.* V. p. 60. *Fl. N. M. U. St.* p. 346. *PHALANG. Quamash*; bulbosum; scapo foliis linearibus carinatis longiore; spicâ racemosâ; bracteis linearibus; petalis 5 adscendentibus: infimo deflexo; stigmatate obtuso. *Pursh Fl. sept. Amer.* 1. p. 226. *SCILLA esculenta* *Bot. Mag.* 1574.

Bulbus ovatus, tunicatus, 1½ - 2 poll. diametro. Folia circiter pedalia, 4 - 6 lin. lata, glaberrima, striata, pauca. Scapus simplex, teres, nudus, erectus, glaber (2 - 3 - ped.). Flores pallide caerulei (etiam pallide purpurei); bractee subulatae, marcescentes, solitariae, lineares, membranaceae, coloratae, pedicellis breviores (*Torr.*), longiores (*Pursh*). Pedicelli teretes, uniflori, solitarii. Cor. marcescens, patens, hexapetalo-partita: petala subaequalia, lineari-lanceolata, acuta, 5-striata. Filamenta subulata, aequalia, basi petalorum inserta iisque breviora, glaberrima. Antherae magnae, oblongae, flavae. Germen trigonum. Stylus filiformis, longitudine corollae, subclavatus. Caps. subrotundo-triquetra, 5-locularis, loculis 5-polyspermis. Semina oblonga, nigra. *Pursh et Torr.* Affine *glauco* R. et *Pav.* *Nutt. l. c.* In cultu apud *Gawler*: bulbus nuce juglandis minor, tunicis fuscis vaginâ radicali brevi; folia 5, erecto-patentia, canaliculato-concava, glaucescentia; scapus sub racemo bractea unâ alterâve, flores inodori, sparsi; pedunculi corollâ fere longiores, longitudine bractearum, convoluto-acuminatarum; corolla stellata diametro pollicis pallide cinereo-caerulea: laciniis planis, prope basin undulatis; antherae sagittato-ovatae; germen ellipticum, obtusum, caeruleo-viride, trisuleum; stylus rectus germine duplo longior; stigma subtrifidum. *In America boreali ab ostiis flum. Huron in lacum Erie ab oriente occidentem versus per 2000 Milliaria angl., ad Ohio, in Rocky Mountains, in Louisiana.* *Nutt.* 4.

45. *A. croceum*; bulbosum; foliis gramineis, scapo multo longioribus; spicâ pyramidalis; bracteis convoluto-amplexantibus; seminibus subglobosis, laevigatis. *PHALANGIUM croceum* *Mich. Fl. Bor. Am.* 1. p. 196. *Pursh Fl. sept. Amer.* 1.

p. 226. *ORNITHOGALUM croceum* Elliott. Spreng. S. V. II. p. 131.

Scapus erectus, simplex, nudus, glaber, teres. Folia angusta, acuta. Bracteae parvae, obtusae. Cor. crocea. Filamenta nuda filiformia. Semina atra, nitida. Mich. In sylvaticis humidis Georgiae Amer. bor. 4.

46. *A. Nuttallianum*; foliis aridis, gramineis; racemo basi interrupto. *PHALANGIUM croceum* Nuttall. gen. p. 220. „Racemus 10-12-florus et ultra: inferioribus pollice distantibus. Bracteae obsusissimae, lineares, lineam longae. Pedicelli erecti, fere pollicares, filiformes. Flores magnitudine et coloris *NARTHECIi americani*, crocei: petalis centro, quidquam extrorsum, fuscescentibus. Petala, s. potius lacinae, persistentia, oblongo-ovata, angusta, patentia. Filamenta subulata, glabra, petalis quidquam breviora. Antherae pallidae, oblongae. Stylus subulatus, trifidus: stigmatibus subulatis, conniventibus.“ Nutt.. Inflorescentia nimis a *croceo* diversa, ut tuto eadem species cum *croceo* haberi possit. In America boreali. 4.

47. *A. latifolium*; (radice bulbosâ); foliis anguste lanceolatis, planis scapoque simplici glabris; spicâ multiflorâ. *PHALANGIUM latifolium* Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. red. Kunth III. p. 276. *ANTHERICUM simplex*; fol. lineari-lanceolatis, acutis, striatis; scapo simplici, racemoso, inferne punctato. Reliqu. Willd. Ms. (fid. de Schlechtend. fil.) Rad. bulbosa. Folia acuminata, striata, membranacea, fere 1½ ped., 6-7 lin. lata. Scapus teres, adjectâ spicâ 2-3-ped.. Spica 8-12 poll.. Flores distantes, pedicellati, bracteâ ovato-lanceolatâ, acuminatâ, striatâ, membranaceâ, glabrâ, pedicello fructifero brevior. Pedicelli teretes, glabri, supra basin nodo instructi, fructiferi 8-9-poll., floriferi duplo breviores. Cal. albus. Filamenta glabra. Caps. oblongo-trigona, viridis, 4 lin.. Sem. nigra. Kunth. In temperatis regni novogranat., Almaguer inter et Pasto, prope Mamendoy et la Cruz. 4.

48. *A. scilloides*; foliis longissimis, planis; scapo brevi; spicâ ovatâ. *PHALANGIUM scilloides* Poirer in Lam. Enc. V. p. 251.

An hujus generis? Habitus *PHALANGII* et *SCILLAE*. Folia omnia radicalia, mollia, pulposa, glaberrima, integra, acutiuscula, ped. basi membranaceâ transparentia. Scapus foliis duplo brevior, simplex, nudus, mollis, aquosus, glaberrimus. Spica brevis, floribus valde approximatis. Petala ovata fere elliptica. Stamina fructusque mihi ignota. Poirer ad Herb. Lam.. In Buenos-Ayres. Commers.

δ. GAGEOIDEA: scapo folioso.

49. **A. serotinum*; foliis semicylindricis; caulinis (anguste lanceolatis), basi dilatatis; flore plerumque solitario; (petalis obovato-lanceolatis, nervosis.) Smith Engl. Fl. p. 150. Fl. brit. p. 367. Engl. Bot. t. 793. Linn. Spec. 444. Mant. p. 365. Willd. Spec. p. 134. Mert. et Koch D.

Fl. II. p. 556. *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 48. *Jacq. Austr.* V. t. 38. *Sturm Deutschl. Fl.* 1. A. 28. H. **BULBOCODIUM serotinum** *Linn. Spec. ed.* 1. 294. *Bulbocodium alpinum* *Dill. in Raji Syn.* 574. t. 17. f. 1. **PHALANGIUM serotinum** *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 210. *Rédout. Lil.* 270. *Trattinn. Tabular.* t. 792. *oestr. Fl.* 122. **ORNITHOGALUM striatum**; caule folioso, unifloro; fol. alternis, oblongo-lanceolatis: radicalibus filiformibus; petalis aequalibus, obtusis, nervosis. *Willd. Spec.* II. p. 112. (se teste). *M. a Bieb. Fl. taur.* c. 1. p. 271. *Spreng. S. V.* II. p. 29. **ORNITHOG. serotinum** *Reichenb. in Moessl. Handb.* p. 554. **GAGEA serotina** *Ker in Journ. of Sc.* II. p. 180. **LLOYDIA alpina** *Salisb. Ms.* **PHALANGIUM** *Hall. n.* 1209. *Pseud. Narciss. gramineo folio.* *Rudb. Elys.* II. 64. f. 9. *Narciss. autumn. min.* *Bauh. hist.* II. p. 663. fig. sinistr. β . *unalaschense*: foliis rigidioribus; petalis apice rotundatis.

„Scapus bracteis s. foliis 3-4 lanceolatis, alternis, minutis, vaginantibus absque spathâ.“ *Linn. Spec.* l. c. „Rad. obducta squamis ramentaceis. Petala lineis rufis, unguibus luteis. Filamenta non lanata.“ *Linn. Mant. l. c.* „Rad. tuberosa potius, quam bulbosa „(squamis longis, vaginantibus, fusciscentibus)“ fibris plurimis longis. Herba glabra, gracilis. Caulis solitarius „(erectus, 2)“ 3-6 poll., teres, raro ramosus et pluriflorus „(crassitie fili imporetici ad pennam usque corvi)“ Folia radicalia pauca „(2-4)“ erecta, caule longiora „(vel eundem aequantia)“ angusta, solida; caulina sparsa „(acuta: infimum majus latius, quidquam concavum, 6-12 lin., sensim ad 2½ lin. usque decrescientia)“ Flos erectus, albus, „(patens)“ extus venis obscure rubris. Petala vix ½ poll. „(4-6 lin., 1½-2 lin. lata, plerumque lineis 3, obovato-lanceolata, obtusa: exteriora paulo angustiora)“ basi attenuata, marcescentia, persistentia, uti stamina. „(Filamenta filiformia, petalis duplo breviora, erecta. Antherae rotundato-ovatae, flavae, basi emarginatae. Stylus stamina subaequans, crassiusculus, superne incrassatus)“ Caps. membranacea, magnitudine pisi. Semina angulata, rugosa, lucide castanea.“ *Smith.* In β . folia rigidiora, caule paulo superantia, 2-5 poll., cum caulis semper 1½-2 poll.; folia caulina inferiora plerumque subopposita, superum foliis approximatum; petala 4 lin., 2 lata, obovata, apice rotundata. In *alpinis Norici, Carniae, Rhaetiae, Britanniae et Sibiriae.* β in *Unalaschka.* *Eschscholz.* 4.

Obs. *Narcissus serotinus* *Clus. hist.* 1. 162. denuo indagandus, monente *Smith.* Nobis ad *Narcissus* potius spectare videtur, cum *Clusius* calycem parvum, planum, pallidum, margine rubro fimbriato in centro floris describat. „Ab *Ornithog.* striato non differre puto *Orn. altaicum*: scapo tereti, 4-phylo; petalis ovatis, 3-nerviis; staminibus subulatis; *Larm. Nov. Comm. Ac. Petrop.* 18. p. 530. t. 6.“: *M. a Bieberst. Suppl.* 264. Sic etiam nobis videtur; cum specimen sibirica cum nostris bene convenient. *Habitus tamen et folia caulina* quidquam aliena, quamobrem descriptionem a *Larman* datam subiungimus: „bulbus oblongus, parvus, fibris longissimis. Caulis liliaceus simplicissimus, spithameus, erectus. Folia radicalia bina, teretia, erecta, caule parum breviora; caulina in superiore semisse caulis alterna, amplexicaulia, linearilanceolata, patentissima, apicem versus sensim minora. Flos plerumque 1 in apice caulis, magnitudine *O. narbonensis*: rarissime flores 2. Petala patentia, ovata, albida, trinervia, nervis basi fuscis. Filamenta corollae dimidio breviora, subulata; antherae oblongae. Germen oblongum, trigonum. Stylus subulatus, persistens, germine paulo brevior. Stigma capitatum, triangulare.“

50. * *A. graecum*; scapo simplici, folioso, foliis planis (anguste lineari-lanceolatis glabris paulo longiore); staminibus (non! *Mant.*) lanatis; floribus subcorymbosis; (petalis obovato-lanceolatis, trinervibus, glabris.) *Willd. Spec. II. p. 136. Linn. Spec. p. 444. Mant. p. 365. Labill. pl. rar. syr. Dec. V. p. 12. t. 8. f. 2. Sibth. Fl. graec. t. 336. PHALANGIUM graecum in Lam. Enc. V. p. 250. Tournef. Cor. 50.*

Bulbus. Folia linearia, glabra, longitudine fere scapi. Scapus simplex, foliis 3-4 brevioribus. Corymbus terminalis, sub-5-florus; pedunculo intermedio 1-floro, lateralibus bifloris. Cor. alba *A. ramosi*. Stamina corollâ breviora, et stylus staminibus brevior. *Linn. Sesquipalmaris. Folia radicalia ut plurimum scapo breviora. Petala lineata. Labill. In specim. nostr. bulbus subrotundus, fuscus, magnitudine Pisi minoris. Folia radicalia scapo paulo breviora, anguste lineari-lanceolata, acuminata, obsolete nervosa, margine praesertim basin versus ciliis sparsis, albis, 2-3 poll., 2 lin. fere lata, subpatentia; caulina 3-4, erectiuscula, basi ciliatâ latiora, longe acuminata, 1-2 poll. Scapus erectus, teres, glaber, 3 circiter poll. Pedunculi teretes, glabri, bractea lanceolato-subulatâ basi ciliatâ breviores. Cor. subcampanulata. Petala obovato-lanceolata, obtusiuscula, trinervia, glabra vel intus ad nervos basin versus pilis raris, 5 lin. longa, basi lin., apice 2 lin. fere lata. Filamenta 3 paulo longiora, corolla $\frac{1}{3}$ breviora, filiformia, pilis raris, nec tamen lanata. Antherae oblongae flavae. Stylus filamentis germineque brevior. Germe oblongum, fuscum? *Herb. Sieb.. In insulis Peloponnesi, Creta, Cypro. 4.**

51. *A. trinervium Viv.*; glabrum; foliis lineari-canaliculatis, brevibus, superioribus semiamplexicaulibus; scapo sub-3-floro; petalis ellipticis, 3 nervibus; filamentis glabris. *Vivan. Fl. Lyb. p. 21. t. 8. f. 2.*

Bulbus parvus, subrotundus, tunicatus. Folia inferiora angustiora, scapo triplo circiter breviora; caulina basi latiora et amplexicaulia; floralia lanceolata, acuminata, pedunculis breviora. Flores grandiusculi, pauci, remoti, ante anthesin cernui. Pedunculus terminalis nudus, reliqui supra medium unibracteolati. Cor. alba, 7-8 lin.; laciniis oblongo-obovatis, basi longe angustatis. Stam. inclusapistillum superantia. Germe trigonum. Stigma incrassatum. *Bert. in litt. In Cyrenaica. 4.*

52. *A. villosum Labill.*; scapo folioso, paniculato; corollis pedicellisque villosis. *Labill. Pl. syr. Dec. V. p. 14. t. 9. f. 1. PHALANGIUM villosum Poiret Enc. Suppl. IV. p. 281. ORNITHOGALUM orientale villosum flore luteo magno. Tournef. Coroll. 26.*

Habitus *A. graeci*. Bulbus mediocris, semi-orbicularis. Scapus erectus, simplex, 5-6 poll. Folia alterna, plana, linearia, radicalia, scapum subaequantia, quidquam villosa; caulina sensim minora latioraque; suprema spathacea. Flores lutei, erecti, terminales, paniculati. Petala oblonga, obtusa, apice quidquam latiora, extus villosa *Labill. Circa Ephesum. 4.*

53. *A. pilosum* Jacq.; radice bulbosâ; scapo simplici, folioso glabro; foliis sublanceolatis. planis, utrinque pilosis, ciliatis; filamentis glabris. Jacq. Coll. suppl. 87. ic. rar. II. t. 416. Willd. Spec. II. p. 140. ORNITHOGALUM hispidum Hornem H. reg. hafn. p. 551. Spreng. S. V. II. p. 35. PHALANGIUM pilosum Poir. in Lam. Enc. V. p. 244.

Bulbus depresso-subrotundus, albus, magnitudine *Avellanae*. Folia plerumque 3, longe vaginantia, acutiusecula, flaccida, integerrima, utrinque striata, ad oras villosa, vaginâ inferioris folii pilosulâ, reliquorum glabris, infimum biunciale aut paulo longius, ad minimum poll. $\frac{1}{2}$ latum, superiora 5 poll. et angustiora. Scapus teres, gracilis, erectus, parumper flexuosus. Racemus terminalis, erectus, laxis. Bracteae lanceolatae, acutae, scariosae, parvae. Pedunculi unciales, 1-flori, erectiusculi. Flores inodori, erecti. Petala 6, alba, angusta, lanceolata, acuta, plana, patentissima: 3 alterna paulo latiora et longiora. Filamenta subulata, aequalia, erecta, petalis duplo breviora, alba. Antherae luteae. Germen oblongum, triquetrum, viride, superne luteum. Stylus filiformis, erectus, albus, longitudine staminum. Stigma trifidum, capitatum. Capsula oblonga, acutula, teres, glabra, pallens. Semina minima, ovato-acuminata, fusca. Jacq. In Promont. b. spei. 4.

Incertae sedis.

54. *A. niveum*; foliis planis, basi plicatis; caule simplici; floribus densissimis, longe spicatis; bracteis niveis, longitudine pedunculorum. PHALANGIUM niveum Poir. in Lam. Enc. V. p. 248.

Folia omnia radicalia, carnosula, tenuiter striata, glaberrima, linearia, obtusiusecula, basi plicata vel canaliculata. Scapus crassus, glaberrimus, teres, albidus, nudus, 10-12 poll. Spica erecta, cylindrica. Pedunculi simplices, glabri, filiformes, erecti. Bracteae tenues, diaphanae, membranaceae, lanceolatae, acutae. Corolla parva. Petala patentia, ovalia, obtusa, brevia. Filamenta filiformia, corollam aequantia. Pistillum longitudine staminum. Germen minimum; in floribus inferioribus saepe abortivum ut videtur. Poir. ad Herb. Lam. In Ind. orientali. Sonnerat. 4.

55. *A. japonicum* Thunb.; foliis ensiformibus, convolutis, glabris, scapo ramoso, angulato (aequalibus); floribus racemosis, cernuis. Thunb. jap. 138. Willd. Spec. II. p. 139.

Folia subradicalia, apice valde attenuata, convoluto-canaliculata, integra, coriacea, erecta, ped. Scapus bracteatus, flexuosus, erectus, glaber, longitudine foliorum. Flores in ramis ramulisque racemosi, albi, decidui. Filamenta subulata, brevissima. Antherae lineares, erectae, longitudine corollae. Thunb. In Japonia, China et Java.

56. * *A. contortum*; foliis planis, ensiformibus, caule ramoso brevioribus; floribus remotissimis. Linn. Suppl. 202. Thunb. prodr. 63. Fl. cap. ed. Schult. p. 319. Willd. Spec. II. p. 139.

Corolla contorta *Linn.* Caulis basi anceps, mox ramosus, glaber, Rami alterni, inferiores ancipites, superiores teretes, ultimi filiformes et capillares, glabri, diffusi, elongati. Folia ad nodos inferiores alternantia, amplexicaulia, attenuata, integra, glabra, spithamaea, superiora sensim multo breviora. Flores in ramis sparsi, pedunculati. Pedunculi capillares reflexi, unguiculares. *Thunb.* In vinetis et arvis infra *Tafelberg* et alibi ad *Prom. b. sp.* 2.

57. * *A. squameum*; scapo squamis membranaceis tumidis imbricato. *Linn. Suppl.* 202. *Willd. Spec.* II. p. 157. (excl. syn. *Thunb.*) PHALANGIUM *squameum* *Poir.* in *Lam. Enc.* V. p. 246. (excl. syn. *Thunb.*)

Rad. tuberibus oblongis, tomentosis, pluribus, filo pendulis. Folia 3 radicalia, graminea, palmaria, in quibusdam transverse plicata. Scapus pollicaris, basi undique cinctus paleis membranaceis, diaphanis, amplexicaulibus, sublanceolatis, laxis. Racemus terminalis e paleis scariosis, hyalinis, acutissimis. Pedunculi inter paleas singulas solitarii, pubescentes, filiformes, longitudine palearum, uniflori. Cor. infundibuliformis, extus subpubescens, 6-partita: tubo cylindrico; limbo acuto, carinato, longitudine pedunculi: carinâ rudi. Stamina limbo dimidio breviora. Stigma simplex. Capsula globosa, cernua. Variat foliis glabris et hirsutis. Media HYACINTHOS inter, ORNITHOGALA, et ANTHERICA. *Linn. fil.* I. c. Vix hujus generis. In *Prom. b. spei.* 2.

58. * *A. spirale*; scapo spirali. *Linn. Mant.* 224. *Willd. Spec.* II. p. 141. (excl. syn. *A. spirati Thunb.*) PHALANGIUM *spirale* *Poir.* in *Lam. Enc.* V. p. 249.

„Planta aphylla. Foliorum rudimenta inferne scapum vaginantia. Rad. bulbosa. Scapus palmaris, filiformis, spiralis contrarius, aphyllus, subquadriflorus, nonnihil scandens. Pedunculi proprii recti, floribus triplo longiores. Bracteae minutae, ovatae. Flores 3-4, magnitudine POLYGONI *avicularis*, ex apice caulis, quos vivos nondum videram.“ *Linn. l. c.* In *Promont. b. spei* in locis glareosis sub monte *Leonis.* 2.

Obs. *Thunberg* *A. spirale* *Linn.* hoc ad HAEMANTHUM suum spiralem cum *Cano tenello* *L.* ducit.

59. *A. plumosum* *Ruiz et Pav.*; scapo striato-angulato, 2-4-floro; petalis interioribus barbato-plumosis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv.* III. t. 300. f. b.

Radix fasciculata; tubera oblongo-obovata. Scapus $\frac{1}{2}$ ped., erectus, nudus, simplicissimus, gracilis. Folia lineari-ensiformia, angusta, carinata. Flores alterni, spathâ lanceolatâ membranacea. Petala extus viridia, intus alba, 3 interiora barbato-plumosa, exteriora glabra. Stamina subulata, (glabra). Anthorae luteae. *Ruiz et Pav.* Quoad petalorum structuram THYSANOTO propius quam ANTHERICO. In arvis aridis et ventosis *Chili.* 2.

60. *A.?* *Gmelinianum*; radice bulbosâ; foliis gramineis, subcarinatis, striatis; caule ramoso longioribus; floribus parvis; bracteis minimis. ORNITHOGALUM II. *Gmel. Sib.* p. 45. t. 8.

„Bulbus oblongus, exiguus, candidus, interdum exterius e fusco lutescens, fibris longis, crassiusculis, eminentiis annularibus. Folia radicalia 3-6, dodrantalia et ultra, graminea, leviter carinata,

utrinque pulcre striata et viridia, non raro subglauca: caulina 2-3, radicalibus similia, sed minora. Caulis tenuis, firmus, 1-5 ped., in planta juniore cinerascens aut caerulescens, in adultiore rubescens, ad folia tumens. Spica „(racemus)“ dimidium fere caulem occupat, inferius spicis „(racemis)“ pluribus patentibus sive adscendentibus, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ poll.. Sub racemo singulo partiali foliolum angustum, vix unciale; sub pedunculis squama caerulescens aut purpurascens, minima. Cor. e viridi-candicans, minor, hexapetala. Filamenta albentia aut levissime purpurascencia, inferius lata, et paulatim in mucronem simplicem contracta, antherâ pro floris parvitate majusculâ, primum purpurascens, dein alba. Tres vaginulae ab initio per parum cohaerentes, serius firmiter concretae, fructum sistunt oblongum, rubentem, trilocularem, seminibus angulosis et aliquantum compressis, lutescentibus. Habitu ad *A. ramosum* accedit.“ *Gmel. l. c.* Species huc usque neglecta. *In sylvis montosis ad Lenam, ad Lacum baicalensem.* 4.

61. *A. cernuum* *Hornem.*; foliis linearibus, subtus convexis, scapo umbellifero longioribus. *Hornem. H. Hafn.* 1. p. 552.

Hab.? 4.

62. *A. aphyllum* *Forsk.*; radice bulbosâ. *Forsk. Fl. aeg. arab.* p. 209. *Gmel. Syst. Nat.* 1. p. 556.

Folia nulla. Bulbus magnitudine pugni, tunicis crassis. Ex una radice 6-7 bulbi. *Forsk. In insula Rhodo.* 4.

63. *A. asphodelum* *Forsk.*; fol. carnosis, teretibus; capsulis trilocularibus, dispermis. *Forsk. Fl. Aeg. arab.* p. 209. *Vitm. Summ. Pl. II.* p. 517.

AN BULB. *asphodeloides?* *In insula Rhodo.*

Obs. AN ANTHERICA bulbosa ve verâ ANTHERICA? Radicis structura in plantis hujus classis nimis neglecta!

Quid *A. costatum* *Don H. Cantab.*

sibiricum *H. Erfurt.*

unilaterale *Thunb. in Herb. Mus. Ups.?*

1595. E R E M U R U S.

1. *E. spectabilis* *M. a Bieb. Cent. pl. rar. ross.* 2. t. 61. *Suppl. Fl. taur. cauc.* p. 269. *ASPHODELUS altaicus*; scapo nudo, simplicissimo; foliis triquetro-carinatis, laevibus. *Pall. Act. Petropol.* 1779. p. 258. t. 10. * *Willd. Spec.* 1. p. 154.

Planta speciosa, 3-4 ped. Radix e fibris pluribus crassis, basi apiceque attenuatis. Folia radicalia numerosa, digitum transversum lata aut angustiora, obtusiuscula, scapo multo breviora, laete viridia, striata, margine ut plurimum sursum scabra. Scapus teres, intra racemum sulcatus, praeter squamas paucas bracteiformes nudus. Racemus $\frac{1}{2}$ ped. et longior, caudatus. Bractee subulatae, praeter carinam scariosae, imae quoque flore breviores, magis minusve pubescentes margineque subciliatae. Pedicelli flore breviores. Flores magnitudine *ONITHOGALI* *Intei.* flavicantes, petalorum carinâ virescente. Stamina subulata, initio intra corollam latentia, peractis nuptiis valde elongata atque rigentia, et corollâ tum involutâ magis reliquis partibus conspicua.

Antherae aurantiae, polline flavo. Stylus elongatus, post fecundationem deorsum pendens, demum iterum adscendit. Capsula corrugata; valvulis septo medio in centro connexis, lateribus dehiscentibus ut in ASPHODELO. Semina trigona, laevia, nigricantia, ASPHODELI. Planta *altaica Pallasii* minus elongata, foliis angustioribus, margine vix exasperatis; *taurico-caucasica* elatior, fol. latioribus, margine exasperatis; huic similis *inderiensis* caule, praesertim racemum versus, pube tenuissima scabrigo. *M. a Bieb.* In campis elatis promontorii Caucasi septentrionalis inter fluvium Kumam et rivum Sablja *M. a Bieb.*, in rupestribus *Tauriae maxime meridionalis. Stev.*

Obs. Quid *EREMURUS tauricus* et *sibiricus Weinmann Hort. Pawlowsk p. 167.*, ad quem forte etiam *ASPHODELUS sibiricus H. Wiln. 3824?*

1396. ASPHODELUS.

1. **A. luteus*; caule toto foliis subulato-triquetris vaginato, simplici; bracteis imbricatis florem subaequantibus. *M. a Bieberst. Fl. Taur. Cauc. Suppl. p. 268. Ejsd. Fl. Taur. Cauc. 1. p. 279.* *A. caule folioso; foliis triquetris, striatis. Linn. Spec. p. 445. Willd. Spec. II. p. 132. Mill. Dict. n. 1. Desf. Fl. atl. 1. p. 301. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 204. Tenore Fl. neap. 1. p. 183. Gusson Prodr. Fl. sic. 1. p. 419. Hall. Helv. 1206. Jacq. H. Vind. t. 77. Bot. Mag. 775. Redout. Lil. t. 223. Jaume St. Hil. 51. t. 5. Kniph. Cent. VIII. 9. Schkuhr. t. 95. Blackw. t. 255. Weinm. Phyt. t. 185. 6. Bauh. Hist. 2. p. 652. Tournef. Inst. 345. t. 178. f. B. Moris. Hist. s. 4. t. 1. f. 6. Lob. ic. 91. β flore majore. Mill. Dict.*

„Corollae 6-partitae, petalis 4 in cruce dispositis: duobus intra 5 superiora petala positis. Stam. declinata, quorum 5 breviora.“
Linn. Radices fasciculatae, carnosae, flavae, 4-5 poll. Caules $1\frac{1}{2}$ -3 ped., in cultis etiam 4 ped., crassitie pennae anserinae ad digitum usque, simplicissimi, stricti, a basi ad apicem foliis tecti. Folia caulem spiraliter ambientia, numerosissima, glabra, acuta, supra et dorso striis glaucis, inferiora ped., recurva, superiora sensim minora, erecto-patentia; basi utrinque membranâ albida subvaginante. Bractee membranaceae, albae, nervo medio fusco, basi ovatae, dein subulato-lanceolatae; exterior interioribus longior, primum florem fere aequans, serius brevior. Racemus $\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ ped., densus; rhachi valde angulosâ. Pedunculi erecti, crassiusculi, simplices, infra medium articalati, vel 2-3 in ramulo erecto. Cor. $1\frac{3}{4}$ -2 poll. diamet.; petala unguibus coacta, odora, flava striâ mediâ viridi, lineari-lanceolata, patentia: infimum magis distans, 9-12 lin., exteriora 1- $1\frac{1}{2}$ lin. lata, interiora 2-4 lin. lata. Stam. 3 corollâ parum, 3 multo breviora; filamenta arcuata, flava, basi dilatata albida. Antherae in filamentis longioribus majores. Germen sulcis 6, alternis profundioribus, paulo supra medium poro in fructu evanescente. Stylus longitudine corollae, arcuatus. Caps. subglobosa, primum viridis, nitida, carnosâ, serius fuscescens et subrugosa. Sem. 2 in quolibet loculo, angulata. De germinatione *A. lutei* conf. *J. St. Hilaire in Journ. d. Bot. T. I. p. 68. t. 1. f. 8.* In *Dalmatia, Sicilia, Africa boreali, Peloponneso et Tauria.* ♂. 4.

2. *A. capillaris* Red.; foliis subulatis, triquetris, tenuissimis; floribus racemosis, bracteis superantibus; corollae laciniis lineari-lanceolatis; filamentorum basi dorso glabrâ. *Red. Lil. t. 380. A. luteus var. angustifolia* Ker.

Caulis fere 4 ped., inferne totus foliis tectus, superne partim nudus, teres, glaber. Folia numerosissima, patentia, fere capillaria, glabra, acuta, marginibus tenuiter serrulato-denticulata, $5\frac{1}{2}$ -8 poll., basi membranaceâ subvaginante dilatata; in utroque foliorum plano striae longitudinales 2 glaucae, nervo medio marginibusque interse viridibus. Flores numerosi in racemo elongato. Pedicelli 3-4, simplices, crassiusculi, $4\frac{1}{2}$ - $6\frac{1}{2}$ lin., medio articulati; basi bracteis 3-4 membranaceis subulatis, albis, nervo medio articulati, basi bracteis 3-4 membranaceis subulatis, albis, nervo medio fusco; exteriori reliquis majore, vix pedicellos superante. Cor. lacinae laete luteae, patentes, 3 interiores obtusiusculae, 3 exteriores acutae paulo angustiores. Stamina declinata, 3 corollâ paulo, 3 multo breviora; filamenta filiformia, flavescenti-albida, valde arcuata, apice attenuata, basi dilatata et subfornicata margine ciliata, ceterum glabra, libera. Germen minimum, viride, rotundatum, profunde 6-sulcatum. Stylus flavus, filiformis, longitudine corollae. Stigma minimum, trilobum. Floret exeunte aestate; flores pomeridiani. Differt ab *A. luteo*, cui simillimus, florescendi tempore, fol. tenuioribus; bracteis brevioribus; cor. laciniis jam a basi patentibus, angustioribus; filamentorum basi glabrâ. Differt etiam ab *A. taurico*. *Redouté. Vix satis diversus ab A. luteo. Habitat. in Hort. Parisiensi.*

3. *ASPH. tauricus* Pall.; caule toto foliis subulatis triquetris vaginato; bracteis imbricatis florem superantibus. *M. a Bieberst. Fl. taur. cauc. Suppl. p. 268. Ejusd. Fl. taur. cauc. 1. p. 279. Pall. ind. taur. Willd. Enum. H. Berol. p. 370. Redouté Liliac. t. 470. ASPH. bracteatus Willd.; (qui eundem hoc nomine cum clo Panzer communicavit.)*

Habitus *A. lutei*. Flores in racemo terminali cylindrico, bracteis magnis nitidis absconditi, albi, lineâ carinali viridi. *M. a Bieb.*, Stamina 3 longiora: antheris circa stigma conniventibus; 3 multo breviora, in hoc, sicut in *luteo* et *prolifero*. Antherae staminum breviorum in hoc effetae; in illis minores antheris staminum longiorum, tamen polliniferae videntur. *Steven in litt. apud M. a Bieb. Suppl.* Radix fasciculata e fibris cylindricis fusiformibus, crassitie fere pennae, epidermide fuscâ vel virescente, intus albidis, medio flavis. Folia fasciculata, radicalia, glauca, acuta, supra plana, dorso semicylindrica, striata, ped. longioraque, medio $1\frac{1}{2}$ lin. lata, exteriora apice reflexa, media stricta; basi dilatata membranâ siccâ diaphanâ; folia caulis fertilis triplo breviora quam in caulibus sterilibus, minus glauca, subulata, subprismatica, 4-gona, apicem caulis versus sensim minora, spiralia, margine membranâ siccâ undulatâ; suprema bractee siccae albidae imbricatae. Racemus elongatus; flos singulus bracteis 2, ovato-lanceolatis: alterâ alteram amplexante; flos primus articulatus e medio valvularum, alter abortivus ad dorsum valvulae anterioris. Pedunculus pallide virens ad $\frac{1}{3}$ superiorem articulo intense viridi. Cor. lacinae lineari-lanceolatae, 8 lin., 2 lin. latae, utrinque striâ viridi vix apicem attingente: infimâ declinatâ,

2 suberectis, 3 adscendentibus. Stamina uti stylus declinata; 5 longitudine corollae, filamentis pallide roseis bis flexis, basi lacinarum exteriorum insertis, antheris linearibus; 5 duplo breviora, apice flava in conum brevem obversum dilatata, in cujus centro anthera parva subrotunda; omnium filamenta basi dilatata, germen includentia. Germen laeve, ovatum, intense viride. Stylus bisflexus. Stigmata 5 brevia, filiformia. Fructus globulosus, 4 lin. circiter crassus, pedicello erecto. *Red.* In specimine *Panzeriano* caulis crassitie pennae cygnaeae. Folia caulina 3-4 poll., basi in vaginam margaritaceam latiore quam longam expansa. *In Tauriae saxosis calcareis, ad montem Besch'tau, ad thermas constantinomontanas.* 4.

4. *A. tenuior Fisch.*; caule superne nudo, foliis subulato-triquetris, striatis; racemo laxo; bracteis flore brevioribus. *M. a Bieb. taur. cauc. Suppl.* p. 268. *Bot. Mag.* t. 2626. *Catal. H. Gorenk.* 1812. p. 9. *Link. Enum.* 1. p. 523. Pedalis circiter, et luteo tauricoque gracilior. Folia angustiora brevioraque, albido-viridia, caulem vix ad medium usque vaginantia, inde usque ad racemum uno tantum alterove diminuto. Racemus spithamaeus: floribus vix ultra 20, bracteis scariosis, subulatis; superioribus diminutis, pedicellos subaequantibus. Flores breve pedicellati, inferiores terni, gemini; superiores alterni, formâ florum *A. lutei*, sed duplo minores, pallidi, lineis 6 viridipurpureis per tubum lacinularumque carinam excurrentibus. Genitalia et fructus *A. lutei*. *M. a Bieb.* *In siccis lapidosis Caucasi septentrionalis Cabardinici, ad montem Besch'tau etc.* 4.

5. *A. liburnicus Scop*; caule simplicissimo, basi folioso, superne nudo; foliis triquetris, subulatis, fistulosis, marginibus denticulato-asperis. *Jacq. Eclog.* p. 113. t. 77. *Scop. Carn. ed.* II. 1. p. 245. t. 11. *Willd. Spec.* II. p. 154. *Mert. et Hoch D. Fl.* II. p. 556. (excl. *A. cretico Lam.*) *A. serotinus Sibth. in litt. ad Jacq.*

„Caulis teres, pedalis, lineam crassus. Folia basin caulis occupant, subtriquetra, uncialia aut paulo longiora, e vaginis propriis membranaceis, tenuissimis, angulis scabris, ad lentem quasi dentatis. Flores penduli, lutei, laxi, unciam longi, lineis 5 fuscis striati. Pedunculi simplices, corollis duplo breviores, sub quibus bractea ovalis, albida, acuminata.“ *Scop.* Radix e tuberibus crassis, cylindricis. Folia conferta, reclinata, flexuosa, tenuia. Bractee minimae, amplexicaules. Petala patentia, ovato-oblonga, subcanaliculata, lutea, lineâ longitudinali viridi. Filamenta 3 reliquis longiora. Germen globosum, trisulcum. Stylus incurvatus. Caps. globosa, rugosa. Semina tetraquetra *Jacq. Clo Sprengel* aliisque idem cum *A. cretico*, ejus varietas forte. *In insula Veglia, in Dalmatia, in Creta.* 4.

6. *A. creticus Lam.*; caule folioso, superne nudo, ramoso; foliis filiformibus, striatis, denticulatis, subciliatis. *Lam. Enc.* 1. p. 360. *Willd. Spec.* II. p. 155. *A. caule inferne folioso, superne ramoso nudo; foliis subulatis, asperis; genitalibus declinatis.* *Desf. Annal. d. Mus.* X. p. 220. t. 11. *A. aestivus Brigant. Stirp. rar. Pempt.* 1. p. 5. t. 5. (fid.

Bertol. in litt.) ASPH. creticus luteus serotinus patulus folio aspero. *Tournef. Cor.* 25.

Radix e bulbis cylindrico-fusiformibus (crassitie digiti minimi) fasciculata. Caulis $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ ped., strictus, teretiusculus, laevis, pennâ anserinâ (vix) crassior; ramis superne 2-5 patentibus, rigidis, elongatis. Folia vaginis basilaribus late membranaceis albidis, caulem infra obvestientia, filiformia, palmaria, obtusiuscula (vel acutiuscula), margine subtiliter cartilagineo-denticulata, striata, inferiora basi canaliculata, ciliolata. Flores laxo spicato-racemosi, patentes, subinde (plerumque) gemini, (erecti). Bracteae ovato-acuminatae, membranaceae, vix lin. longae, (inferiores cum acumine tamen multo longiores). Pedunculi his 3-4-plo longiores, filiformes, (infra medium articulati, apice crassiores). Cor. magnitudine et formâ ASPHODELI lutei (ANTHERICI *Liliaginis*), pedicellis longior, flava, laciniis patentibus (lineari-lanceolatis, obtusiusculis, 3 exterioribus paulo minoribus), lineâ viridi. Stamina inaequalia, (3 plus quam dimidio breviora), inclinata. (Antherae oblongae, fuscescentes. Stylus stamina paulo superans. Caps. globosa, striata. Sem. fusca.) *Lam. et ad specim. e Creta. In Creta; in Calabria.* 4.

7. *A. prolifer* *M. a Bieb.*; caule folioso, apice ramoso; foliis filiformibus, longissimis, striatis, laevibus; racemis terminalibus, pedunculatis, subaggregatis. *M. a Bieb. Fl. Taur. canc.* 1. p. 280. *Suppl.* p. 269. ANTHERICUM dendroides; caul. fol. etc.; bracteis bifloris. *Stev. Dec. et Mem. Soc. nat. Cur. mosq.* 3. p. 249. 261. *Hoff. Com. mosq.* 1. P. I. t. 45. *Cat. H. Mosq.* 1808. Phalang. humile etc. *Buxb. Cent.* 2. p. 54. 56. f. 2.

Caulis basi simplex (erectus, ped. *Hoffm.*), superne in ramos nonnullos (3-4) divisus, e quorum apice racemi pedunculati aut solitarii, aut nonnulli, (longi) quasi scapi in caule. Folia basi scariosa vaginante, (spitham., subtrigona. *H.*). Racemi laxi. Pedicelli ex uno puncto saepe nonnulli floris longitudine, (geminati *H.*). Bracteae subulatae, scariosae. Flores parvi, albi carina viridula, tubo brevissimo. Capsulae seminaute *A. lutei* et *taurici*. (Caps. globosa hyalina *H.*) *M. a Bieb.* Palmulae speciem prae se fert, unde nomen. *Hoffm.* Habitus omnino ANTHERICI bipedunculati et penduli. Nectaria plane nulla. *Steven.* In *Armeniae ibericae campis editis, ad torrentem Debeda et For; circa Gandscham.* ☉.

8. *A. albus* *Willd.*; foliis lineari-lanceolatis, carinatis, laevibus; scapo simplici; pedunculis racemosis, confertis. bracteas nigricantes vix aequantibus; capsulis obovato-globosis, obsolete angulosis. — *Willd. Spec.* II. p. 155. *Mill. Dict.* n. 5. *Lam. et Dec. Fl. jr.* III. p. 205. *Lapeyr. Abr. Fl. pyr.* p. 189. *A. caule nudo, subsimplici; bracteis triangulis, pedicello longioribus; foliis carinatis.* *Savi Bot. etr.* 2. p. 215. *Sebast. et Maur. Prodr. Fl. rom.* p. 129. *Tenore Fl. neap.* 1. p. 184. *Re Fl. torin.* 1. p. 196. *Bes-ser Fl. gal.* 2. p. 552. *Host Fl. aust.* p. 457. *Roth Enum. pl. germ.* 1. 2. p. 53. *A. ramosus* *Murr. nov. Com. Gott.*

1776. p. 37. t. 7. (excl. syn. quibusd.) *Marz. vicent. p. 27.*
A. ramosus β *Lam. Enc. 1. p. 560. Poir. Enc. Suppl. 1.*
 p. 484. *A. ramosus* *B Red. Lil. fol. 514. A. verus albus*
Blackw. t. 258. Asph. II. Clus. hist. 1. p. 197. f. 2. A.
alb. non ramos. Banh. Pin. p. 28.

Div. *Linnaeus* in *Sp. Pl.* junxit cum *ramoso*, et nequidem instar varietatis distinxit. „Differt ab *A. ramoso*: foliis angustioribus, caule semper indiviso, bracteis pedunculorum longitudine, floribus minoribus non alternis, remotis, sed multo confertioribus.“ *Willd.* „Scapus, ut *Savi* rite observavit, interdum ramosus, nec semper indivisus, uti perhibet *Willdenow*; folia non semper angustiora, flores duplo fere majores, nec minores, quam *A. ramosi*; certe vero racemus simplicior; petala candida lineâ dorsali pallide virente; bracteae nigrae, pedunculis aequales; pedunculi supra medium et fere sub flore articulati, supra articulum non, aut vix incrassati; capsula duplo saltem major.“ *Bertol. in litt.* Rad. fasciculata e tuberibus oblongis. Scapus strictus, plerumque simplicissimus, glaucescens, inferne teres, flores inter angulosus, $2\frac{1}{2}$ - 3 ped.. Folia omnia radicalia, patentia, canaliculata, striata, ped., 6 - 8 lin., luride virenti-glauca. Racemus strictus, densus, 10 poll. Pedunculi teretiusculi, sub florescentia patentes, ceterum erecti, 1 - flori, 4 - 5 lin., infra medium articulati. Bracteae basi ovatae, dein subulato-acuminatae, membranaceae et saepe lacerae, semper nigricantes et pedunculum paulo superantes vel aequantes. Corolla fere poll., alba (rubore suffusa *Host*); lacinae basi in tubum brevissimum fuscescenti-viridem connatae, ceterum patentes, lineari-lanceolatae, obtusae, 1 - $1\frac{1}{2}$ lin. latae, alternae paulo latiores, dorso lineâ longitudinali viridi, (purpureâ *Lapeyr.*). Stam. inaequalia; filamenta 3 breviora, inferiora declinata, sursum subarcuata, albida, basi dilatata, vel squamae nectariferae margine fimbriatae albidae inserta. Antherae lineari-oblongae, basi marginatae, polline flavo. Stylus stamina superans, subarcuatus. Stigma parvum emarginatum. Caps. immatura subglobosa, vel obovato-subglobosa, angulis 6 obtusis magisque obsoletis quam in *ramoso*, minus rugosa, 2 - $2\frac{1}{2}$ lin.. In montosis *Europae transalpinae a columnis Herculis ad Podoliam usque.* 4.

Obs. *Asphod. ramosus Murray* l. c. rectius huc quam ad *A. ramosum* pertinere videtur, ut ex descriptione et icone patet. — *A. albi* varietatem? racemo brevi, 3 poll. densiore, primo initio conico, nomine *spicati* in *Herb. Schreb.* invenimus. An *A. spicatus Desfont. H. paris. p. 30?* Folium unicum, quod specimini unico ex frusto (caulis ramivo?) digitum longo, mire et fere monstrose torto, adjacet, omnino, uti flores, *A. albi*.

9. * *A. ramosus*; foliis lineari-lanceolatis, longe acuminatis, carinatis, laevibus; scapo ramoso; pedunculis racemosis, bractea fuscescente brevioribus: capsulis obovato-globosis, obsolete angulosis. — *Linn. Spec. 444. (partim.) Willd. Spec. II. p. 155. (?) Mill. Dict. n. 2. Smith Prodr. Fl. graec. 2. p. 255. Sibth. Fl. graec. t. 554. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 204. Brotero Fl. lusit. p. 524. A. caule nudo, ramoso; bracteis angustis, triangulo-subulatis, pedicello subaequalibus; foliis carinatis. Savi Bot. etr. 2. p. 215. Sebast. et Maur. prodr. Fl. rom. p. 129. Tenore Fl. neap. 1. p.*

185. *Host. Fl. aust.* 1. p. 456. *Mert. et Koch Deutsch. Fl.* 2. p. 555. (excl. syn. *Murr.*) *Roth En. pl. germ.* 1. 2. p. 52. *Sturm D. Fl.* 6. H. *Bot. Mag.* 799. *Red. Lil.* 178. (quoad A.) *A. racemosus Link Enum. h. berol.* 1. p. 528. (sphalmate). *Besl. H. Eyst. vern. ord.* 9. *Park. Par.* 149. *Asph. primus Clus. Hist.* p. 196.

Radix fasciculato-tuberosa e tuberibus oblongis carnosis. Folia radicalia valde numerosa suberecta, e basi latiore subvaginante margine membranacea sensim attenuata in acumen acutum, carinata et inde apice subtriquetra, glabra, striata, ex lacte virenti glauca, $1\frac{1}{2}$ -2 ped., inferne 4-7 lin. lata, interiora angustiora. Scapus erectus, 5 ped. et ultra, crassitie digiti minimi, inferne teres, ramos inter angulosus, glaber, glaucescens; rami numerosi, alterni, erecto-patentes, variae longitudinis. Flores in racemis longis, satis densis, numerosissimi. Pedunculi solitarii, subalterni, vix remotiores quam in *A. albo*, sub florescentia erecto-patentes, ceterum recti, teretiuseculi, paulo infra medium articulati et supra articulum incrassati, in fructu quidquam clavati, glabri, 2-4 lin. Bracteae membranaceae, carinâ striisque aliquot nigricantibus, margine fere albidae, erectae vel reflexae, e basi ovata in acumen subulatum attenuatae, plerumque pedunculos superantes, in fructiferis iisdem etiam breviores, 3-6 lin.. Cor. lacinae albae (colore rubro suffusae *Host*) lineâ dorsali viridi v. purpurascete, basi in tubulum vix conspicuum connatae, ceterum patentes, lineari-oblongae, obtusae, 5-7 lin., 1-2 lin. latae, alternae paulo angustiores. Stamina longitudine corollae vel paulo longiora; filamenta inaequalia, subulata, basi dilatata vel squamae nectariferae margine fimbriatae inserta; antherae oblongo-lineares, basi emarginatae, polline aurco. Stylus filiformis stamina superans. Stigma simplex, subcapitatum, quidquam emarginatum. Caps. obovato-globosa, subtruncata, angulis 6 paulum prominentibus, parum rugosa, $2\frac{1}{2}$ -5 lin., 2-3 lin. lata. *Ad littus totius fere maris mediterranei, in Corsica, in Archipelago etc. 4.*

Obs. Hic nobis verus *A. ramosus* esse videtur, qui praesertim in littoribus maris mediterranei crescit et praecipue capsulae formâ ab *A. neglecto* in montibus collibusque crescente, differt. Hujus esse loci nobis etiam videtur *A. Audibertii Requier* et *A. microcarpus Viviani*, quorum specimina genuina tamen non vidimus. Etiam *cls. Bertoloni in litt.* nos monuit iconem *A. ramosi* L. in *Flor. graec.* satis superque demonstrare identitatem *A. ramosi* L. et *A. microcarpi Viviani* in *Flor. Cors. specim.* ad *A. microcarpum* (scapo ramosissimo; foliis lineari-acutis; floribus in longos racemos imbricatis; bracteis pedunculo in fructu clavato longioribus;) laudat *A. minorem Clus. Hist.* 2. p. 197, a Linnaeo plurimisque aliis ad *A. fistulosum* ductum, et notat plantam suam ab *A. ramoso* foliis latioribus, fructibus minoribus differre. Descriptio *A. minoris Clusii* certe non quadrat in *A. ramosum*, quem supra exhibuimus, sed potius in *fistulosum*; nam: „radices fibrosae, nec nappiformes, crassae, numerosae ex uno capite. Folia minora, multo angustiora, lentiora, dilutiora, quam in *A. ramoso*. Caulis 6 vel plures ex eadem radice, cubitales, ramosi. Flores similes illis *A. ramosi*, sed minores, sparsi, albi medio lineâ purpurascete. Caps. trigonae, primum virides, serius exalbidae. Semen rugosum, angulosum, minus quam in *A. ramoso*.” *Viviani A. microcarpum* in Corsicae maritimis prope St. Serafino, *Walker Arnott* etiam in Gallia narbonensi legit.

10. *A. neglectus*; foliis lanceolato-ensiformibus, acutis, carinatis, laevibus; scapo ramoso; pedunculis racemosis bractea fusciscente brevioribus; capsulis ovato-oblongis, prisma-

tice-hexagonis. *A. ramosus* Lapeyr. *Hist. abr.* p. 188. et plur. forte auctor.

Radix fasciculato-tuberosa, tuberibus cuneiformibus, carnosis, fusciscentibus. Folia radicalia, irregulariter fasciculata, erecta, v. patentia, glauca, multo minus attenuata quam in *ramoso*, pedalia, 7-8 lin. lata, interiora angustiora. Caules 2-3 ped., undique nudi, glaucescentes, glabri, teretes; superne ramos inter angulosi, basi crassitie fere digiti minimi; superne ramis pluribus alternis, patentibus, teretiusculis, mox floriferis, crassitie pennae anatinac, basi bractea spathacea, lanceolata, acuminata, concava, margine membranacea, glabra, tristriata, fusciscente, erecta reflexaque 1-2 poll.. Flores numerosi, spicato-racemosi, alterni sparsique, solitarii, stellati, albi. Pedicelli teretiusculi, glabri, medio articulati, juniores $1\frac{1}{2}$ -3 lin., serius ad 5 lin. exerescentes. Bracteae e basi ovata marginibus membranacea carinata subulato-acuminatae, erectae vel subreflexae, glabrae, fuscae, nervo medio nigricante, pedicellos aequantes, iisdem longioribus paulo brevioribusque in eodem fere specimine. Petala linear-oblonga, obtusa, 7-9 lin., 2 lin. lata, (interiora paulo angustiora acutioraque), linea dorsali purpurascens vel fusca, subinde etiam viridi. Filamenta alba, inaequalia, squamae nectariferae fimbriatae inserta; antherae oblongae, obtusae, luteae. Germen hexagonum, fusco-viride. Stylus corollam paulo superans, filiformis, albus. Stigma simplex, emarginatum. Caps. oblonga vel ovato-oblonga, truncata, impressa, transversim rugosa, angulis 6 acutiusculis prominentibus, glabra, 5-4 lin., 2 lin. lata. *In collibus montibusque Italiae, (in monte Maggiore Jan), Galliae, (copiose in pratis subalpinis Pyrenaeorum Lapeyr.).* 4.

11. *A. asiaticus* Haw.; foliis glaucis, sesquipedalibus, latitudine subunciali; corollae laciniis ovali-oblongis, basi imbricatis; bracteis pedunculo curto brevioribus; scapis simplicibus vel ramosis. *Haw. Syn. Plant. succ.* p. 552.

Differt ab *A. ramoso* foliis hyeme omnino pereuntibus, vere serius prodeuntibus, magis glaucis, triplo brevioribus, magis erectis multoque latioribus; pedunculis multo brevioribus; corollae laciniis brevioribus latioribusque; staminibus styloque brevioribus; antheris luteis, nec flammeis. *A. luteus* generice differt flore irregulari, filamentis incurvis etc. *Haw. Hab.?*

12. *Asph. aestivus* Brotero; scapo ramoso; foliis ensiformibus, carinatis, laevibus; stigmatе trifido; capsula obovato-globosa. *Brotero Fl. lusit.* p. 525.

„Similis *ramoso* radice, scapo et toto habitu, folia similia, angustiora tamen et breviora, subglauca s. dilute viridia, acutius carinata, profundius canaliculata. Bracteae ovato subulatae, basi late membranaceae, pedunculo breviores, illum et squamulam anteriorem amplexantes. Pedunculus teres, infra medium articulatus, basi squamula membranacea dentata. Corollae petala obtusa: alterna latiora. Stamina corolla paulo longiora; squamae nectariferae unisuleatae, ad oras ciliis hyalinis, arcuatae, erectiusculae; antherae croceo-fulvae. Stylus arcuatus, erectus, staminibus altior; stigma trifidum s. potius stigmata tria, saepe adpresso-erecta, obtusa, linearia, ad lentem hyalino-punctata. Caps. obovato-globosa nec ovato-globosa, duplo fere minor quam

in ramoso. Brot. Ab ill. Com. de Hoffmannsegg primum rite ab *A. ramoso* distinctus. A clo *Reichenbach* *A. fistuloso* proximus dicitur; nobis vero planta a *Reichenbach* depicta a planta *Broteriana* diversa videtur, cum in hac folia ensiformia, ut in *Asp. ramoso*, in illa vero folia semiteretia; anne planta *Reichenb.* potius *A. intermedius Horn.*, quem non vidimus? Definitio in *Reichenbach ic. pl. rar. C. V. t. 451* sequens: „foliis radicalibus linearibus, semiteretibus subulatisque, glaucis laevibus; scapo ramoso; pedunculis bracteis superantibus; capsula obovato-globosa. In *Transtagana et Estremadura ad vias, in fossulis soloque depresso et in Beira prope Fundao.* 4.

13. *A. intermedius Hornem.*; scapo aequali; foliis strictis, subulatis, teretibus striato-sulcatis. *Hornem. hort. havn. Suppl. p. 131. Link Enum. 1. p. 328.*

Proximus *A. fistulosus*; differt foliis semicylindricis. In *Canariis C. Smith.* 4.

Obs. An huc *ASPHODELUS canariensis Smith et Buch* in *Abh. Acad. Berl. 1816-17. p. 362 et 368* (absque omni descriptione).

14. * *A. fistulosus*; caule nudo; foliis strictis, subulatis, striatis, subfistulosis, (semicylindricis). *Linn. Spec. 444. Willd. Spec. II. p. 155. Mill. Dict. n. 4. Desf. Fl. atl. I. p. 505. Dec. et Lam. Fl. fr. III. p. 204. Gouan illustr. 26. Savi Bot. Etr. II. p. 214. n. 650. Tenor. Fl. neap. 1. p. 184. n. 205. Sebast. et Maur. Prodr. Fl. rom. p. 129. n. 412. Viv. Fl. lyb. p. 21. Gusson. Prod. Fl. sic. 1. p. 420. Cavan. Ic. III. t. 202. Redout. Lil. t. 178. Gawl. Bot. Mag. t. 984. Sibth. Fl. gr. t. 555. Gaertn. fruct. t. 17. f. 1. ASPHODELOIDES ramosa Mönch Meth. p. 654. Bauh. Hist. 2. p. 651. A. minor. Clus. Hist. 197. Moris. 3. 4. t. 1. f. 5. α. caule ramoso Gawl. β. caule simplici, Gawl. A. scapo humili, simplici; foliis striatis, subfistulosis. Brot. Fl. lusit. p. 525.*

Radix rhizoma descendens, breve, fuscescens, perenne; fibris numerosis, crassis. Folia radicalia cespitosa, erecta, teretiuscula vel obsolete triquetra, longe attenuata, basi vaginâ brevi semiamplexante membranaceâ albidâ, glaucescentia, inferne ad strias pilis brevissimis scabriuscula, in cultu glabra, $\frac{1}{4}$ -1 ped. Caules solitarii, vel plures, $\frac{1}{2}$ -2 ped., simplices, vel ramis 3-5 erectis saepius iterum ramulosis, stricti, teretes, carnosî, basi scabriusculi, superne glaberrimi, glaucescentes; ad ramos bracteis lateovatis cum acumine subulato, carinatis, albide-membranaceis, 2-4 lin. longis. Flores in racemis longis strictis alterni, remoti, solitarii, sub florescentia patentes, serius erecti. Pedicelli teretiusculi, apice paulo incrassati, medio articulati, glabri, 1-4 lin.; bractea ovata, acuminatâ, carinatâ, membranacea, albidâ, carina virescente, primum pedicellos subaequante, serius brevior. Corollae lacinae patentes, obtusiusculae, oblongae, alternae latiores fere ovatae, alidae, lineâ longitudinali purpurascente, 3-5 lin. Filamenta corollae paulo breviora, albida, medio dilatata, basi angustata et squamae nectariferae ovatae, margine limbatae inserta, alterna breviora. Antherae ovatae, (vix sagittatae ut in *Cavanilles*), polline luteo. Stylus longitudine staminum longiorum,

erectus, apice sensim crassior; stigmatibus 3 crassis, brevibus, patentibus, subvillosis. Germen apice poris nectariferis. Caps. obovato-globosa, subtruncata, angulis 6, quorum 3 paulo acutiores, glabra, glaucescens, 2 lin.. Sem. grisea vel nigricantia, triquetra, 2 in quovis loculo. — Specimen in ins. Mauritii a *Sieber* lectum ab hispanicis, gallicis etc. tantum staturâ majori et graciliori; foliis longioribus, magis scabridis magisque glaucis; floribus quidquam minoribus; pedunculis gracilioribus recedit. In Herbariis etiam nomine *ANTHERICI asphodeloidis* et *ASPHODELI ramosi* occurrit. De germinatione *ASPH. fistulosi* conf. *J. St. Hilaire* in *Journ. d. Bot.* T. I. p. 68. t. 1. f. 7. *Mirbel* in *Ann. d. Mus.* XIII. t. 5. f. 31. In Europa meridionali a Graecia ad fretum *Herculis*, in insula Mauritii. 4.

15. *A. clavatus Roxb.*; scapis ad ramificationes clavatis; foliis setaceis, strictis. *Hornem. Hort. Havn. Suppl.* p. 151. *Link Enum.* 1. p. 528. *A. clavosus Don II. Cantab.?*

Ab *ASPH. intermedio* et *fistuloso* differt staturâ humiliore et denique duratione. *Hornem.* In speciminibus nostris cultis scapi ad ramificationes non clavati, sed pedunculi magis clavati. Omnia fere ut in *ASPH. fistuloso*; sed radix annua, perpendicularis, fibris paucis tenuibus; folia multo tenuiora, 3-6 poll.; scapi 5½-12 poll., multo tenuiores, basi ad strias sub lente puberuli, simplices vel ramis brevibus; flores rariores et paulo minores; pedunculi crassiores, infra medium articulati, 1½-3 lin.; bracteae pedunculis semper fere breviores. Capsula et reliqua omnino ut in *A. fistuloso*. In India orientali. ☉.

16. *A. tenuifolius Cavan.*; foliis subulatis, tenuissimis, brevibus; caule nudo; floribus minutis. *Cavanill. Annual. d. Hist. nat.* T. II. No. 6. p. 46. t. 27. f. 2.

Proximus *A. fistuloso*, vix tamen mera varietas. Radix ambobus ramosa, fibrosa, caulisque nudus; differt vero *A. tenuifolius* florum foliorumque magnitudine. Folia vix 3-poll., teretia, graciliora quam folia *STIPAE tenacissimae*, quidquam villosa. Caulis folii, crassior, 4 poll. supra terram ramulum unum vel alterum emittens. Flores sparsi, spicati; singulis bractea pedunculo partiali brevior, 1½ lin.. Petala 6, alba, ovata, 1½ lin.. Stamina basi dilatata et concavitates 6 germen tegentes formantia. Capsula globosa, multo minor quam in *A. fistuloso*, 3-valvis, 3-locularis, loculis 1-2 spermis. *Cav. Prope Mogador. Broussonet.*

17. *A. acaulis Desf.*; caule nullo; foliis subulato-tri-quetris; pedicellis fructiferis reflexis. *Desf. Fl. atl.* 1. p. 502. t. 89.

Radices longae, fusiformes, crassitie digiti minimi. Folia numerosa caespitosa, glabra, substriata, basi dilatata membranacea, 3-4 poll., quandoque 11 poll.. E medio caespitis flores plures, conferti, pedicellati; bracteis albidis, membranaceis, lanceolatis, acutis. Cor. pallide rosea, magnitudine *A. latei*, laciniis ellipticis, obtusis, lineâ mediâ saturatiore. Stam. 3 breviora; filamentis basi unguiculatis, conjuventibus, germen obtegentibus. Stylus staminibus longior, stigmatibus 3, obtusis. Caps. globosa, pedicello ad terram arcuata. *Desf. In Barbaria, in monte Sbiba.* 4.

Obt. *ASPHODELUS africanus Lam. clo Poiret Suppl.* 1. p. 435. *ABELLA abyssinica* videtur.

1397. C Y A N E L L A.

1. * *C. capensis*; caule folioso, paniculato; racemis divaricatis; foliis lanceolatis, undulatis. *Willd. Spec. II. p. 151. Linn. Mant. p. 355. Suppl. p. 201. Thunb. Act. Holm. 1794. p. 196. Prodr. p. 65. Flor. cap. ed. Schult. p. 550. Mill. Dict. n. 1. Lam. Enc. II. p. 251. Ait. H. Kew. ed. 2. II. p. 265. Jacq. Hort. vind. III. t. 55. Andr. Bot. Repos. t. 141. Sims. Bot. Mag. t. 568. Red. Lil. t. 375. Pluk. Phyt. 454. f. 2. (minus bona sec. Linn. Mant.)*

Folia radicalia, lato-lanceolata, acuminata, 6-8, superiora sensim angustiora et acutiora, diffusa, striata, integra, paginis margineque scabra, digitalia; sub florescentia undulae magis disparent. Scapus teretiusculus, flexuosus, ramosus, glaber, palmaris spithamaeusve. Stipula sub ramis alternis solitaria, lanceolata, ramo brevior. Corolla caerulea. *Thunb.* In spontanea capsula 2-5 lin., subgloboso-ovata, subtruncata, obtuse triloba; valvulistransversim rugoso-striatis, medio septiferis, dorso sulco medio; loculis biserialim 6-spermis. Semina oblique ovata, obsolete trigona, basi processu parvo ex quo funiculus, atra, rugosa, vix lin. longa. In culta: Bulbi subrotundi, depressi, albidi vel violaceo-maculati, saepius fasciculato-congesti, (conici, magnitudine Croci, edules. *Sims*; saporis fatui, odoris ingrati, laesi in pulvem foetidam diffluentes. *Jacq.*). Caulis erectus, gracilis, 22 poll.; rami plerumque simplices valde divergentes. Folia acuta, intense viridia, tenuiter ciliata, nervis prominentibus tuberculato-scabris; radicalia ovato-lanceolata (longe lanceolata, glabra, integerrima. *Jacq.*), 4-8 poll., caulina longiora angustioraque. Racemi laxi. Flores plerumque lacte caerulei, in specim. nostris pallide lilacini. Pedicelli semipatentes, 1-1½ poll., medio bracteâ parvâ, viridi, lineari-lanceolatâ, basi bracteâ simili sed majori, canaliculatâ. Cor. ad basin divisa; lacinae ovatae, irregulariter patentes, omnes in eodem plano; exteriores latiores cum acumine parvo; interiores angustiores apice rotundatae; 2 internarum et 1 externarum approximatae et pendulae, reliquae erectae (infima latior. *Jacq.*). Filamenta brevia, crassa, basi connata, apice libera, flavescenti-viridia. Antherae flavae, subcylindricae, exsulcae, apice attenuatae, quidquam pendulae, subarcuatae, loculis 2 apice dehiscantibus poro communi dentibus 4 albidis parvis munito; antherâ infimâ remotâ majore. „(Filamentum sextum multo longius, declinatum, antherâ linguiformi, medio pro incurbente stylo excavata.“ *Sims*). Germen breve, trigonum, albidum lineis viridibus longitudinalibus transversisque. Stylus albidus, subulatus, longitudine staminum, declinatus. Stigma acutum (subtrifidum *J.*) arcuatum. *Red.* In collibus infra *Tafelberg*; in planitie inter *Capstadt* et *Hottentotts Hollandsberg*. 4.

2. *C. orchidiformis Jacq.*; caule ramoso (folioso); racemis erectis; foliis caulinis ensiformibus, strictis, radicalibus ovatis. *Willd. Spec. II. p. 151. Jacq. Coll. IV. p. 211. Ic. rar. II. t. 447.*

Bulbus subrotundus, diametro unciali, tunicâ reticulatâ fuscâ. Tota glabra. Folia elongate lanceolata vel oblonga, acuminata, ad

oras minutissime cartilagineo-denticulata, nitida, infima duo velut in petiolum angustata; reliqua caulina alterna, basi canaliculato-vaginantia, 4-6 unc. Caulis subangulatus, erectiusculus, debilis, hinc flexuosus, 1-1½ ped. Flores racemosi, inodori. Bractee lineari-lanceolatae, acutae, virides, unciae. Petala violaceo-purpurea, oblonga, obtusa, plana; exteriorum 2 superiora reflexa, infimum patentissimum; interiora in unguem convexum angustata, patentissima. Filamenta crassa, brevia, pallida, 5 sursum, 3 deorsum arcuata. Antherae oblongae, magnae, erectae, sulcatae, omnes apice perforatae, fuscae, basi flavae. Germen subrotundum, triquetrum, viride. Stylus filiformis, ad stamina inferiora declinatus, iisdem brevior, albus. Stigma simplex, obtusum. *Jacq. In Prom. b. spei. 4.*

3. **C. lutea*; scapo nudo, subramoso; racemis erectis, foliis lineari-lanceolatis planis. *Willd. Spec. II. p. 151. Linn. Suppl. p. 201. Thunb. Act. Holm. 1794. p. 195. t. 7. f. 1. Prodr. 65. Fl. cap. ed. Schult. p. 550. Gawl. Bot. Mag. 1252.*

Convenit cum *C. capensi*: filamentis basi in urceolum connatis; antherâ unâ majori; stigmati simplici. Differt ab illa: foliis radicalibus lanceolatis, nec linearibus; pedunculis minus divaricatis; petalis majoribus luteis. *Linn. fil. l. c.* Differt ramis 1-2 erectis, nec pluribus horizontalibus divaricatisve. *Gawl. Thunberg* describit spontaneam: „Scapus pedalis, teres, erectus, glaber; rami simplices, nudi, alterni, floriferi, superiores breviores. Folia radicalia, 3-4, vaginantia, lanceolata, acuta, striata, glabra, caule multo breviora, digitalia. Stipulae infra singulum ramum lineari-subulatae, superiores breviores, sessiles, glabrae. Cor. lutea, regularis; petala ovata, acutiusecula, rubro-striata. Filamenta corollâ multoties breviora, subulata, flava. Antherae oblongae, lineares, 5 aequales, infimâ deflexâ majore, striatae, apice perforatae, incurvae, flavae. Caps. subrotunda.“ In culta, ex icone, bulbis tunicâ fuscâ, fibrosâ, magnitudine Juglandis. Caulis ½ ped., basi foliis 4-5, passim dente uno alterove, acuminatis, intense viridibus, 3-4 poll., poll. latis. Pedunculi 1-2 poll., basi bractea lineari, duplo brevior. Cor. diameter 1½ poll.; lacinae extus marginem versus purpurascens, utrinque lineis 5 longitudinalibus, viridibus. Antherae luteae, sanguineo punctatae. Stylus viridis. *In campis arenosis Prom. b. spei; in collibus prope Calcedon. 4.*

4. **C. alba*; scapo nudo, unifloro; foliis filiformibus. *Willd. Spec. II. p. 152. Linn. Suppl. 201. Thunb. Act. holm. 1794. p. 195. t. 7. f. 2. Prodr. p. 65. Fl. cap. ed. Schult. p. 529.*

Radix alte descendens. Folia radicalia, plurima, integra, glabra, scapis breviora. Scapi plures, divaricati, flexuoso-erecti, simplices, teretes, glabri, spithamaei. Bractea in medio scapo lanceolato-setacea, unguicularis. Flos terminalis, solitarius. Cor. alba. *Thunb.* „Bractea filiformis in medio scapi. Stamina erecta, majus tantum deflexum.“ *Willd. In Prom. b. spei; in Bockland. 4.*

1398. ALBUCA.

a. *Staminibus 3 fertilibus.*

1. *A. altissima Dryand*; petalis interioribus apice glandulosis, inflexis; pedunculis recurvato-patentibus; foliis subulatis, canaliculato-convolutis, (explicatis lineari-lanceolatis, flaccidis). *Dryand. Act. Holm.* 1784. p. 292. *Jacq. Coll.* II. p. 264. *Willd. Spec.* II. p. 99. *A. alba Lam. Enc.* I. p. 76.?

Bulbus depressus, albidus. Folia radicalia plura, late ensiformia, basi 5 unc. lata; longiora fere 2-ped., acuta, integerrima, glabra, lineata, succulenta, interiora scapum involventia, exteriora multo breviora et patula. Scapus unus alterve, erectus, 3-5 ped., crassitie digiti minimi, teres, firmus, glaber, intus submedulosus. Racemus longissimus. Bracteae solitariae, unc., lineari-lanceolatae, acuminatae, concavae, virentes oris albidis. Pedunculi 1-flori, bracteis duplo longiores, floriferi recurvati, fructiferi patuli. Flores inodori, nutantes. Petala albida fasciâ longitudinali mediâ viridi: interiora obtusissima, apice incrassato reniformi inflexa, erecta; exteriora obtusa, patentia. Filamenta alba, erecta. Stamina 3 fertilia petalis interioribus opposita, elastica, petalis paulo breviora, compressa, basi articulata, articulo inferiori squamaeformi et latiori; 3 sterilia, subtriangularia, semper erecta. Antherae in staminibus fertilibus oblongae, magnae, sulco longitudinali, sulfureae, appendicula veluti cum filamentis connexae, in sterilibus effetae sulfureae, multo minores, utriusque mucrone albo. Germen breviter pedicellatum, triquetrum, basi apiceque trimucronatum, ad lentem per lineas longitudinales ascendentes muricatum. Stylus crassus, apice tricornis, undique glandulose ciliato-tuberculatus, longitudine germinis. Stigma pyramidale. Caps. glabra, membranacea, oblonga, straminea erecta. Semina angulata, atra, nitida. *Jacq.* Folia 2½ ped., poll. lata. Petala alba, dorso viridia, margine flava. *In Promont. b. spei.* 4.

2. *A. cornuta Redout.*; staminibus 3 et ultra sterilibus: stylo crasso, tricornuto; corollae laciniis 3 interioribus apice glandulosis inflexis; (pedunculis suberectis); foliis convuluto-caniculatis. *Redout. Lil. t.* 70. *A. alba Lam. Enc.* I. p. 76.?

A. majori affinis; sed differt praesertim floribus ex albo viridique variegatis, stylo tricornuto. Folia rore parco glauco, exteriora breviter concava, interiora plana, maxima, 26-30 poll., scapum florentem aequantia, basi 2-3 poll. lata, acuminata, debilia, apice saepe spiralia. Scapus e centro foliorum, erectus, nudus, glaucus. Racemus longus. Pedicelli graciles, erecti, apice non reflexi, sub florescentia 18 lin.. Bracteae concavae, amplexicaules, acutae, ad plurimum 9 lin.. Flores minores quam in *A. majore*, erecti; lacinae margine albae, omnes medio fasciâ latâ viridi; exteriores semipatentes, oblongae, obtusae, vix callosae; interiores concavae, basi quidquam erectae, margine subpellucidae, appendice albo obtuso calloso, stamina fornicatim tegente, apice macula flava pubescente terminatae. Filamenta 3 exteriora sterilia plana, pellucida, acuta; interiora margine membranacea, lata, curvata, apice acuta incurva; unico tantum plerumque antheri-

fero. Pollen pallide flavum. Germen liberum, viride, angulis 5 sinuosis, faciebus 5 apice glandulâ parvâ. Stylus erectus, flavus, trigonus, undique papillis elongatis; angulis apice in cornua acuta erecta exasperata productis. Stigma cornua inter parvum, erectum, acutum, flavum, sine papillis. Differt ab *A. altissima* foliis latis, nec subulatis; floribus erectis. Eadem forte cum *A. alba* Lam., qui tamen styli non meminit et flores nutantes, folia basi poll. tantum lata descripsit. *Redout.* In *Prom. b. spei.* 4.

3. * *A. major*; petalis interioribus apice glandulosis, inflexis; pedunculis angulo acuto patentibus; floribus nutantibus; foliis lineari-lanceolatis, planiusculis, reflexis. *Linn. Spec.* p. 458. *Willd. Spec.* II. p. 99. *Mill. Dict.* n. 1. *Dryand. Act. holm.* 1784. p. 293. *Thunb. Prodr.* 65. *Fl. cap. ed. nost.* p. 330. *Gleditsch in Mem. d. l'Ac. d. Berl.* 1769. p. 61. *Jacq. Coll. Suppl.* 96. t. 445. *Bot. Mag.* 804. *Red. Lil.* 69. *A. lutea* α *Lam. Enc.* 1. p. 76. ORNITHOGALUM canadense *Linn. Spec.* 1. p. 508. *Cornut. Canad.* 160. *Rudb. Elys.* 2. p. 140. f. 7. *Moris. Hist.* 2. p. 425. s. 4. t. 24. f. 7. *Barrel. ic.* 1118.

Tota glabra. Bulbus subrotundus, depressus, poll. et ultra diametro, sobole numerosissimâ bulbilorum. Folia plura (8-10) radicalia, sensim in acumen angustata, longiora 2½ ped., basi ¾-1½ poll. lata, integerrima, inferne canaliculata, striatula, crassula. Scapus teres, erectiusculus, calamo crassior, 3-ped. et ultra, obsolete striatulus, viridis rore glauco, longissime racemosus. Bracteae lanceolatae, acuminatae, primo virides, dein ferrugineae, conniventes, (rubro fuscae, albo-marginatae, fere poll. *Gawl.*) infimae 2½ poll.. Pedunculi teretiusculi, patentissimi, firmuli, 2-3 poll.. Flores inodori, nutantes, (2 poll. diam.). Petala exteriora foris lutea cum fascia infra apicem viridi, intus viridia, oris luteis, ovato-oblonga, obtusa, cum parvo mucrone calloso: interiora 3 alba, fasciâ mediâ utrinque viridi cumque callo albo, oblonga, concava, erecta, paulo breviora. Filamenta alba, plana, erecta, petalis paulo breviora: fertilia 3 alterna basi auriculato-dilatata: in sterilibus appendices transversae, diversimode inflexae. Germen turbinato-oblongum, trilobum, glabrum. Stylus crassus, trilobus, papillose muricatus, longitudine staminum, lobo singulo papillis fasciculatis, flavis. Stigma conicum, triquetrum, papillosum. Caps. ovato-oblonga, obtusa, profunde triquetra. *Jacq.* Folia apice involuta et inde semiteretia, glaucescenti-viridia, striis alternis viridibus et albis. Bracteae primum longitudine florum, fructu maturo pedicellis duplo breviores. Petala interiora apice callo magno, stamina obtegente, extus leviter pubescente. *Red.* Aegre a minore distinguitur nisi statura robustiore bulbique sobole copiosiore *Gawl.* In *Prom. b. spei*, in arenosis prope *Riedvalley.* 4.

4. * *A. minor*; petalis interioribus apice glandulosis, inflexis; scapo erecto; floribus nutantibus; foliis lineari-subulatis, canaliculatis, glabris. *Willd. Spec.* II. p. 100. *Dryand. Act. holm.* 1784. p. 294. *Linn. Spec.* p. 458. *Mill. dict.* n. 2. *Gleditsch in Mem. d. l'acad. d. Berlin.* 1769. p. 60.

Bergius Descr. p. 87. *Thunb. prodr.* 65. *Fl. cap.* p. 330. *Red. Lil. t.* 21. *Bot. Mag. t.* 720. *A. lutea* β *Lam. Enc.* 1. p. 76. *ORNITHOGALUM canadense* β . *Linn. Spec.* 1. p. 508. *Herm. parad. t.* 209.

Folia pedalia vel ultra, basi $\frac{1}{2}$ unc. lata. Scapus $\frac{1}{2}$ ped., diametro vix lineari. Racemus $\frac{1}{2}$ ped. et ultra. Pedunculi $1\frac{1}{2}$ unc. Bracteae virides, marginibus hyalinis, cito marcescentes, $\frac{1}{2}$ unc. Petala lutea, unciâ breviora; exteriora apice incrassata; interiora glandulâ uniformiter inflexâ, albâ. Filamenta sterilia linearia, apice filiformi, inflexo. Stylus obverso pyramidalis, longitudinae germinis, tectus ramentis glandulosus. Stigma pyramidale, inter petala interiora conniventia prominens. *Dryand.* Bulbus subrotundus, compressus, forma et carne similis rapae. Folia saepe 5, erecta (vel recumbentia, pallide viridia, apice semiteretia). Scapus subinde $1\frac{1}{2}$ ped., teres, glaucus, rhachi flexuosâ. Flores viridi-flavi, inodori, remoti, diametro $1\frac{1}{2}$ poll. Pedunculi longi, recurvati. Bracteae ovato-acuminatae, convolutae, pedunculis multoties breviores, vix $\frac{1}{2}$ poll., dilute fusciscentes. Petala exteriora lineari-oblonga, sub interioribus cohaerentia; interiora latiora. Filamenta (alba) fertilia basi dilatata. (Antherae flavae. Germen viride, trigonum.) *Fragranti* affinis, sed inodora. *Gawl.* Petala viridia, margine albo. *Link.* In *Prom. b. spei, Saldanha-Bay, cum majore.* 4.

5. *A. flaccida* *Jacq.*; petalis interioribus apice glandulosis, inflexis; pedunculis rectangulo patentibus; floribus nutantibus; foliis lanceolato-linearibus, oblique flexis, flaccidis. *Jacq. Coll. IV. p.* 201. *ic. rar. t.* 444. *Willd. Spec. II. p.* 99.

„Folia duplo angustiora „(quam in *majore*, albida)“. Scapus 2-ped. et ultra. Petala luteo-alba, tria exteriora basi et apice viridia, interiora albo-lutescentia.“ *Willd.* Tota glabra. Bulbus subrotundus, tunicatus, magnitudine *Avellanae* et ultra. Folia radicalia pluscula, acuta, integerrima, canaliculata, striatula, basi mutuo amplexantia, longiora $1\frac{1}{2}$ ped. Scapus teres, calamum crassus, 2-ped., erectiusculus, debilis, hinc flexuosus, superne racemosus. Bracteae lanceolato-acuminatae, integerrimae, partim fusciscentes et membranaceae, plus minus pollicares. Pedunculi 1-flori, patentissimi, 2 fere poll. Flores penduli, inodori. Petala oblonga, pallide flava, fasciâ longitudinali mediâ viridulâ: 5 exteriora alterna apice acutulo fornicata, 3 interiora paulo breviora, apice appendiculâ convolutâ. Filamenta albida, planiuscula, erecta, petalis paulo breviora: 3 ante petala interiora posita, basi dilatata, fertilia: sterilia apice inflexa. Germen oblongum, triquetrum. Antherae flavae. Stylus crassus, triquetrus, erectus, longitudine staminum. Stigma simplex *Jacq.* In *Promont. b. spei.* 4.

6. *A. viridiflora* *Jacq.*; petalis interioribus apice glandulosis, inflexis; scapo erecto, flexuoso; floribus cernuis; foliis lineari-subulatis, canaliculatis, extus hirtis. *Jacq. Coll. Suppl. 98. ic. rar. 2. t.* 445. *Willd. Spec. II. p.* 100. *Hort. hew. ed. 2. II. p.* 250. *Bot. Mag. t.* 1656.

Scapus pedalis, erectus, basi hirtus, superne glaber, flexuosus, 4-florus. Pedunculi patentissimi. Petala exteriora laete viridia, interiora luteo-virescentia. *Willd.* Bulbus subrotundus, depressus,

pressus, crasse tunicatus, albidus, Avellanâ major. Folia plura, acuta, foris tota villis minutis, capitatis, albis, erectiuscula, flaccidula, pedalia et ultra. Scapus foliis paulo altior, teres, calamo gracilior, erectiusculus, debilis, inferne uti folia villosus, superne glaber et racemosus. Pedunculi 3-5, distantes, patentes, 2 poll.; bractea lanceolata, acuta, fusca, pedunculo duplo brevior. Flores inodori, penduli. Petala interiora cum virore flavescunt, spathulata, obtusa, parum concava, erecta cum apice calloso inflexo: exteriora lanceolata, obtusula. Filamenta subulata, longitudine corollae, alba, 3 antherifera basi lata, subrotunda; tria sterilia apice inflexa, reflexa. Germen oblongum, trilobum. Stylus inverse conicus, trisulcus, crassissimus, tricuspидatus. Stigma oblongum, erectum, in medio inter 3 styli cuspides positum. Caps. ovata, obtusula, triquetra. Semina numerosa, subrotunda. *Jacq.* Bulbus formâ rapae, 1½ poll., laminis griseis. Folia 7-9, basi ultra 2 lin. lata, caudato-attenuata, pallide glaucescentia, intus papulis albidis minutissimis. Racemus 5-10-florus. Bractee virescenti-fuscae, basi dilatatae et glaucescentes. Flores poll., saturate virides, lacinae interiores apice flavo tinctae; exteriores ¾ poll., 4 lin. latae, glauco-virides, limbo flavescente. Germen prismaticum stylo parum brevius. *Gawl.* *In Prom. b. spei;* in saxosis lateris septentrionalis montis tabularis *Ecklon.* 4.

7. *A. caudata Jacq.*; petalis interioribus apice glandulosis, inflexis; foliis lineari-lanceolatis, margine convolutis, strictis, scapo duplo brevioribus; pedunculis rectangulo patentibus, longissimis; floribus rectis. *Willd. Spec. II. p. 102. Jacq. Coll. IV. p. 203. icon. rar. II. t. 442. Hort. Kew. ed. II. p. 251.*

Scapus ultra 2 ped., arcuatim erectus. Pedunculi 3 unc.. Flores in apice pedunculi recti, vel, quod idem, horizontaliter siti, nec nutantes. Petala 3 exteriora alba ab apice ad medium usque maculâ viridi; interiora alba, lineâ patenti latâ viridi, apice flava. *Willd.* Tota glabra. Bulbus rotundato-ovatus, pugni volumine. Folia pauca, acuta, canaliculata, integerrima, apice teretia et subulata, firmula, erecta, pedalia. Scapus 2 ped., teres, calamum crassus, debilis. Racemus latus, dimidiae scapi longitudinis. Bractee lineari-lanceolatae, acutae, unciales, primum virides, dein fuscescentes. Pedunculi 1-flori, teretes, patentissimi, fere 3 poll.. Petala omnia alba, fasciâ longitudinali mediâ viridî utrinque, (interiora apice lutea), oblonga, obtusa, apice calloso, fornicata: 5 exteriora plana, paulo longiora; 3 interiora concava. Filamenta alba, subulata, plana, erecta, longitudine petalorum interiorum: 3 alterna ante petala interiora posita, basi dilatata. Antherae in omnibus oblongae, in dilatatis basi duplo majores: pollen flavum. Germen virens, oblongum, triquetrum, inferne excrescens in substantiam calycem tripartitum mentientem. Stylus virens, clavatus, triqueter, crassus, erectus, longitudine staminum. Stigma conicum. *Jacq.* *In Prom. b. spei.* 4.

8. *A. coarctata Dryand.*; petalis interioribus apice fornicatis; foliis lineari-subulatis, glabris; pedunculis longitudine bractearum; (racemo coarctato.) *Dryand. Act. holm.*

1784. p. 295. *Hort. Kew.* ed. 1. p. 436. 2. ed. II. p. 250.
Willd. Spec. II. p. 101.

Folia lineari-subulata, profunde canaliculata, 2 ped. et ultra, basi vix $\frac{1}{2}$ unc.. Scapus foliis paulo brevior, penna anserinâ angustior. Racemus coarctatus, $\frac{1}{2}$ ped.. Pedunculi patentes, unciâ paulo longiores. Bracteae fere longitudine pedunculi. Flores lutei. Petala exteriora oblonga, apice incrassata, unciâ longiora; interiora ovalia, exterioribus paulo breviora. Filamenta sterilia fertilibus paulo breviora, extus convexa, intus canaliculata. Antherae sagittatae. Stylus prismaticus, longitudine germinis, terminatus stigmatibus ex angulis styli apice rotundatis. *Dryand. In Prom. b. spei: inter saxa ad montem tabularem Eclon.* 2.

b. *Staminibus omnibus fertilibus.*

9. *A. fastigiata Dryand.*; petalis interioribus apice fornicatis; foliis lineari-lanceolatis, planiusculis, (ciliolatis, flaccidis); scapo foliis brevior; pedunculis longissimis, patentibus, (corymbosis). *Willd. Spec.* II. p. 101. *Dryand. Act. Holm.* 1784. p. 296. *Ait. H. Kew.* ed. 2. II. p. 250. *Thunb. Prodr.* p. 65. *Flor. Cap. ed. nostr.* p. 351. *Andr. Repos.* 450. *Redout. Lil.* 474. *Bot. Reg.* 277.

Folia linearia, primum canaliculata, dein planiuscula, (lanceolata, ensiformia *Thunb.*), $1\frac{1}{2}$ ped., unc. lata. Scapus foliis dimidio brevior, crassitie pennae anserinae. Racemus fastigiatus, longitudine scapi. Pedunculi sub anthesi patentes, post florescentiam erecti, 3-4 unc.. Bracteae membranaceae, hyalinae, dorso rufescentes, $\frac{1}{3}$ unc.. Flores albi. Petala exteriora lineari-oblonga, apice incrassata, unciâ breviora; interiora ovali-oblonga, exterioribus paulo breviora. Filamenta 5 alterna paulo breviora, extus convexa, intus canaliculata. Stylus prismaticus, sulcatus, germine paulo longior, staminibus paulo altior, ramentis brevissimis tectus praecipue apicem versus, viridis sulcis luteis. Stigma ex angulis styli apice rotundatis. *Dryand.* Bulbus viridis, nodosus, tunicis carnis, superne cicatrice fuscâ sphaelatâ. Species caudicis e foliis fasciculatis poll.. Folia 4-5, lineari-lanceolata, acuta, canaliculata, tenuissime ciliata, subhorizontaliter patentia, apice arcuato-reflexa, exteriora ped., 2 poll. lata, interiora duplo angustiora $\frac{1}{3}$ breviora, tereti-caliculata. Scapus teres. Racemus tam latus quam longus, 12-15-florus. Pedicelli alterni, approximati, $3\frac{1}{2}$ poll., arcuato-erecti. Bracteae trigonae, 6-8 lin., margine diaphanae, nervis longitudinalibus ferrugineis. Petala exteriora apice calloso fornicata, dorso viridia, margine tenuiora albida; interiora concava, basi latiora, tuberculo flavo ad apicem fornicatum. Filamenta exteriora petalis interioribus applicata longiora, alba, linearia, basi dilatata et plicata; 5 interiora laciniis exterioribus applicata, basi non plicata, omnia apice flexa. Antherae versatiles verticales, in filamentis brevioribus appendice $\frac{1}{2}$ fere lin. longo. Germen trigonum, ad angulos membrana brevi laevâ cristatâ. Stylus obtuse trigonus. Stigma villosum, trilobum, flavum. *Red. In Prom. b. spei, prope Verlooren-Valley, in Roggeveld, Hantum etc.* 2.

10. *A. setosa Jacq.*; petalis interioribus apice inflexis,

glandulosis; foliis lanceolato-linearibus. planiusculis, (scapum subaequantibus, flaccidis); pedunculis rectangule patentibus; floribus erectis; squamis bulbi apice setosis. *Jacq. Coll. Suppl.* 100. t. 14. f. 3. *Ic. pl. rar.* t. 440. *Willd. Spec.* II. p. 102. *H. Kew.* ed. 2. II. p. 251. *Bot. Mag.* t. 1481.

Folia fere longitudine scapi, laxa, reflexa, basi $\frac{2}{3}$ poll. Pedunculi inferiores 3 unc., superiores breviores. Flores erecti, nec recti. Petala exteriora viridia, albo marginata; interiora flavescentia, lineâ latâ, dorsali, viridi. An *fastigiatae* varietas? *Willd.* Bulbus ovatus, crasse tunicatus, albidus, magnitudine ovi gallinae: setis plurimis longis fuscisque. Folia plura, 1-1 $\frac{1}{2}$ ped. alia $\frac{1}{2}$ poll., alia triplo angustiora, basi fere concava, apicem versus canaliculata, subulata, acuta, flaccida. Scapus teres, calamum crassus, firmus, erectus, una cum racemo plus quam 1 $\frac{1}{2}$ ped. Bracteae lanceolatae, acuminatae, concavae, pedunculis adpressae, inferne purpurascens, superne virides, pollicares. Pedunculi plurimi 2-5 poll., fere crassitie pennae columbinae, firmuli. Flores inodori, erecti. Petala flavent fasciâ utrinque viridi: 3 exteriora oblonga, planiuscula, apice inflexo, subcalloso; interiora lanceolato-oblonga, concava, apice calloso inflexo fornicata, exterioribus paulo breviora. Filamenta compresso-plana, 5 alterna basi dilatata. Antherae ochroleucae. Germen virens, triquetrum, glabrum. Stylus e viridi flavescens, inverse subconicus, trisulcus, subtilissime muricatus. Stigma obtusum, muricatum. Caps. ovata, obtusa, trisulca. Sem. plurima, compressa. *Jacq.* In planta *Gawleri* bulbi diameter 5-6 poll., squamis latissimis, viridibus, superne setis crinitis, erectis, 1-3 poll., fusco-viridibus. Folia glaucescentia, dense striatula, convuluto-concava. Cor. ultro poll.; laciniis 4 lin. latis, exterioribus $\frac{1}{6}$ circiter brevioribus. Stam. laciniis paulo breviora, apice uncatoinflexa: exteriora lanceolato-ligulata, subbreviora; intima pistillum aequantia, laminâ basilari subovatâ. Antherae subquadrato-oblongae, utrinque emarginatae. Stylus luteus angulis viridibus. Caps. fusca, magnitudine fabae. *In Prom. b. spei.* 4.

11. *A. aurea Jacq.*; petalis interioribus apice glandulosis, inflexis; foliis lanceolato-linearibus, planis; pedunculis longissimis floribusque erectis. *Jacq. Coll.* IV. p. 202. *Ic. rar.* 441. *Willd. Spec.* II. p. 102.

Scapus 1 $\frac{1}{2}$ ped. Pedunculi 5 unc., fere adpressi. Filamenta exteriora sub apice gibba. *Willd.* Tota glabra. Bulbus subrotundus, depressulus, tunicatus, albus, 1 $\frac{1}{2}$ poll. Fol. radicalia plura, 2 ped., 1 $\frac{1}{2}$ -3 poll. lata, acuta, integerrima, subtilissime striata, virentia cum fascia longitudinali albicante utrinque, inferne plana, dein canaliculata, apice subulato-conniventia, basi tantum erecta, dein tota debiliâ in terram prostrata. Scapus teres, calamo fere crassior, erectus, firmus, foliorum fere longitudine, supra medium flexuosus, corymboso-racemosus. Pedunculi plures, teretes, crassuli, firmi, erecti semper, 5-4 poll. Bracteae lanceolatae, acuminatae, conniventes, erectae, pollicares. Flores erecti, inodori, elegantes. Petala laete lutea, fasciâ utrinque longitudinali viridi, oblonga, apice callosa: 3 exteriora plana, paulo longiora; 3 interiora concava, apice introrsum flexo fornicata. Filamenta alba, filiformia, petalis paulo breviora, alterna basi dilatata, in quibus Antherae duplo majores, ochroleucae.

Germen oblongum, triquetrum, inferne exerescens, ut in *caudata*. Stylus triqueter, crassus, erectus, totus erosulus, longitudine staminum. Stigmata 3, subrotunda, capitata, muricata. *Jacq. In Prom. b. spei. 4.*

12. *A. vittata* *Gawl.*; foliis lineari-semiteretibus, convoluto-canaliculatis, extus striatis; scapo simplici; floribus pendulo-cernuis; staminibus alternis medio membranâ bidentatâ alatis. *Gawl. Bot. Mag. 1329.*

Multum affinis *ANTHERICO albucoidi*. (quod clo *Gawler* *ALBUCA*); differt ab illo, praeter characteres datos, foliis angustioribus, non cartilagineo-marginatis. Bulbus ovatus, albo-fuscus, magnitudine ovi columbini, fibris numerosis, ramosis, albidis. Folia radicalia, plura, erecto-divergentia, angusta, acuminata, 5-6 poll., vix 2 lin. lata, glaucescenti-viridia. Scapus teres, attenuatus, foliis paulo brevior, strictus. Racemus erectus, remotius pauciflorus. Pedicelli divaricati, bractejas solitarias, lanceolato-attenuatas, fuscas, pollicares, vix lineam latas subaequantas. Cor. hexapetalo-partita, rotato-patens: laciniis aequilongis: exterioribus fere duplo angustioribus, lineari-oblongis apiculo calloso, obsolete puberulo; interioribus obovato-ellipticis, apice subincurvis et extrorsum subpenicillatis; omnibus flavis, $\frac{1}{2}$ fere poll., fasciâ longitudinali laete viridi. Filamenta corollae subaequalia, erecto-divergentia, basi membranaceo-alata: alternorum membranâ duplo latiore denticulis binis terminatâ, reliquorum cuneato-oblongâ, edentulâ, cum filamentis styloque flavicantia. Germen stylo subduplo brevius, rotundato-trigonum, sulcis 3 facialibus, totidem striis angularibus. Stylus corollam superans, subclavato-teres, filamentis triplo crassior, apicem versus muricato-pubescens. *Gawl. In Prom. b. spei. 4.*

13. *A. abyssinica* *Dryand.*; petalis interioribus apice fornicatis; foliis lineari-lanceolatis, canaliculatis, strictis, glabris; pedunculis flore cernuo brevioribus; bracteis lineari-subulatis flore longioribus. *Willd. Spec. II. p. 105. Dryand. Act. holm. 1784. Jacq. Coll. 1. p. 55. IV. p. 221. t. II. f. 10. Ic. rar. t. 64. Redout. Lil. 195. AN ASPHODELUS africanus; caule simplici inferne folioso; foliis ensiformibus canaliculatis; petalis erectis, subconniventibus. Lam. Enc. I. p. 300., quod ORNITHOGALUM abyssinicum H. paris olim? ORNITHOGALUM albucoides H. paris. fid. Poir. Enc. Suppl. IV. p. 191. ASPHODELUS abyssinicus Hortul.*

Bulbus subrotundus, albidus. Folia 2-3-ped., unciâ fere lata, apicem versus gradatim angustata, acuta, integerrima, utrinque obsolete lineata, suberecta. Scapus erectus, teres, crassitie calami, subglaucus, cum racemo 3-5 ped.. Pedunculi proprii 4-flori, breves, (2-4 lin.) sparsi; spathis canaliculatis, angustis, acutis, adscendentibus, virentibus, flore (fere) longioribus. Flores inodori. Petala oblonga, (8-9 lin.), medio longitudinaliter virescentia, ad oras albida, apice lutea, dorso plana, apice lateribusque concava; 3 exteriora patula angustiora, 3 interiora erecta. Filamenta linearia, compressa, petalis paulo breviora, erecta, albida, basi dilatata, supra germen in gibbum viridem protuberantia, aequalia, 3 elastica. Antherae magnae, ochroleucae, oblongae.

Germen pyramidale, triquetrum, sessile, glabrum, virens cum gibbis marginatis. Stylus filiformis, basi triqueter, superne teres, erectus, flavescens, longitudine staminum. Stigma obtusum, simplicissimum. Caps. ovata, triquetra, glabra, 3-locularis, apice 6-valvis, erecta. Semina atra, oblonga, inaequaliter 3-angularia. *Jacq.* In *Abyssinia?* 4.

Obs. *Lamarck* habitum sui *A. africanae* omnino esse *ALBUCAE*; stamina fertilia, subulata, 6, basi dilatata. Scapus suae 3-4 ped., superne squamis vaginalibus, spathaceis, apice filiformibus. Folia planiuscula. Racemus terminalis longus, petala parum patentia, margine flava, medio viridia, obtusa. Bracteae sub floribus acutissimae, pedunculis longiores, margine diaphanae. *Ad Abyssiniam* perperam citatur in *Swartz Obs.* p. 126. *A. alba Lam.*

14. *A. fragrans Jacq.*; petalis interioribus apice fornicatis; foliis lanceolato-linearibus, canaliculatis, glabris; pedunculis patentissimis, longitudine floris; bracteis brevissimis; floribus cernuis; filamentis omnibus fertilibus; bulbo depresso. *Jacq. Hort. Schönbr. T. 1. p. 44. t. 84. Willd. Spec. pl. II. p. 105. Hort. Kew. ed. 2. II. p. 251.*

Bulbus tunicatus, nitidus, albus, disciformis, inaequabilis, 2 unc. latus, vix unc. altus, superne planus, ex basi ambituque bulbilli numerosissimi; tunicae crassae, arctissimae. Folia plurima, basi invicem amplexantia sordideque purpurascens, succo viscido acri plena, acuta, erectiuscula, debilia, longiora 2 ped., basi $\frac{1}{2}$ unc. lata. Scapus teres, unus alterve, erectiusculus, crassitie calami, 2-ped.. Racemus laxus, ped.. Pedunculi unc.; bractea lanceolato-acuminata, brevi, marcidâ. Flores fragrantissimi. Petala omnia flavescens utrinque fasciam mediam latam virentem, oblonga, obtusa; exteriora paulo longiora, plana, patentissima; interiora erecta, concava, apice calloso-fornicata. Filamenta aequalia, subulata, compressa, erecta, petalis paulo breviora, alba, alterna basi latiora. Antherae oblongae, incumbentes, flavae. Germen oblongum, triquetrum, viride. Stylus columnaris, trisulcatus, erectus, longitudine staminum, flavus, angulis virentibus. Stigma trifidum, decurrens, muricatum. *Jacq.* In *Promont. b. spec.* 4.

15. * *A. viscosa*; petalis interioribus apice fornicatis; foliis lineari-subulatis, canaliculatis, piloso-viscosis; pedunculis patentibus flore nutante duplo longioribus. *Willd. Spec. II. p. 105. Dryand. Act. Holm. 1784. p. 297. A. floribus erectis; fol. linearibus, villosis-viscosis. Linn. Suppl. p. 196. Thunb. Prodr. 65. Fl. cap. ed. nostr. p. 331. Act. Holm. 1786. p. 58. Jacq. Coll. Suppl. 99. Ic. rar. 2. t. 445. Hort. Kew. 2. ed. II. 251.*

Thunberg l. c. describit spontaneam: „bulbus tunicatus, ovo minor, valde fibrosus. Folia radicalia, plurima, apice sensim attenuato-acuminata, minutissime glandulosa, erecta, vix $\frac{1}{2}$ lin. lata, scapo plus duplo breviora, palmaria. Scapus simplex, striatus, villosus-scabridus, flexuoso-erectus, ped.. Flores racemosi, plures, subcernui. Bractea ad basin pedunculi lanceolata, acuminata, concava, margine membranaceo. Pedunculi valde glandulosi, cernui, bractea longiores, poll.“ — Scapus, bractea et folia piloso-viscosa; pedunculi vero „(nonnunquam)“ glabriusculi. Petala alba, lineam dorsali viridi „(utrinque)“ latam; interiora apice flavescens. *Willd.* Bulbus subrotundo-ovatus, sordide violaceo-purpurascens, carnosus tunicatus, nucis juglandis magnitu-

dine. Folia erectiuscula vel reclinata, pedalia et ultra, calamum vel pennam columbinam crassa. Scapus teres, crassitie foliorum. Flores 5-12, inodori. Bracteae cito marcescentes. Pedunculi 2 poll. Petala exteriora oblonga, obtusa, apice vix callosa; 3 interiora similia, parum concava, exterioribus paulo breviora, apice calloso flavo inflexo, extus inferne albida et superne flava, intus albida fasciâ utrinque virente. Filamenta linearia, longitudine corollae: 3 alterna plana et supra basin latissimam breviter conniventia; alia 3 canaliculata. Antherae oblongae, sagittatae. Germen oblongum, trilobum, glabrum. Stylus inverse conicus, trisuleus, crassus, muricatus, erectus. Stigma capitatum, conicum, trilobum, muricatum. *Jacq.* In *Prom. b. spei.* 4.

16. * *A. spiralis*; petalis interioribus apice fornicatis; foliis lineari-subulatis, convolutis, apice spiraliter tortis, villosis-scabris, scapo (vix) longioribus. *Willd. Spec. II. p. 104.* *Ait. H. Kew. ed. 2. II. p. 251.* *A. floribus nutantibus; fol. spiralibus. Linn. Suppl. p. 196.* *Thunb. Prodr. p. 65. Fl. Cap. ed. nostr. p. 331. Act. Holm. 1786. p. 58. t. 2. f. 1. Jacq. Collect. Suppl. 100. Ic. rar. 2. t. 459.*

Bulbus magnitudine vix *Avellanae*. Folia radicalia, 4-6, lineari-filiformia, inferne erecta, mox spiralia, in adultiore planta flexuosa, scapo breviora. Scapus simplex, filiformis, flexuosus, apice nutans, striatus, villosis-scabridus, digit. s. spithamaeus post florescentiam, 1-2-florus. Bractea lanceolata, acuminata, pedunculo brevior. Antherae 3 fertiles. *Thunb.* Petala sordide flavescencia, lineâ dorsali latâ viridi, *Willd.*; albida *Link.* In culta apud *Jacquin* bulbus ovatus, tunicatus, pallidus, fere pollicem longus. Folia radicalia, semiteretia, concava, carnosula, acuta, integerrima, erectiuscula, flaccida, 6-9 poll., antice glabra, dorso striatula, striis omnibus densissime obsessa villis brevissimis, capitatis, scapum quoque pedunculos, bracteas, petalorum exteriorum dorsum occupantibus. Scapus teres, crassitie pennae columbae, longitudine foliorum, erectus, striatulus. Flores inodori, 1-4. Pedunculi pollicares et ultra, patentissimi. Petala oblonga, apice callosula: exteriora apice acutulo introrsum incurvato: interiora paulillo breviora, conniventia. Filamenta linearia, planiuscula, petalis paulo breviora, alba, omnia antheris luteis. Germen ovato-oblongum, triquetrum. Stylus cylindricus, triquetrus, papilloso-erectus. Stigma trifidum, sessile, papillosum. *Jacq.* In summo monte *Ribeck-Casteel Prom. b. spei.* 4.

17. *A. parviflora* *Don H. Cantabr. Dietr. Gart. Lexic. ed. 2. I. p. 257.*

Bulbus subrotundus. Scapus erectus, 6-10 poll.; floribus parvis, flavescenti-viridibus, subsessilibus. Bracteae parvae, angustae, acuminatae. *Dietr.* In *Prom. b. spei.* 4.

Quid *ALBUCA longifolia* *Fisch. H. Gorenk.?*
maxima *Don H. Cantabr.?*

1599. E R I O S P E R M U M.

1. *E. latifolium* *Jacq.*; foliis subrotundis, acuminatis, basi cucullatis. *Jacq. Coll. Suppl. 83. Ic. rar. t. 420. Willd. Spec. II. p. 110. Hort. Kew. ed. 2. II. p. 256. Thunb.*

Fl. cap. ed. Schult. p. 517. E. latifolium β ; pedicellis flore pluries longioribus. *Bot. Mag.* 1582. ORNITHOGALUM *capense*; fol. cordato-ovatis. *Linn. Spec. p. 441. Mill. Dict. ed. 8. n. 9. Thunb. Prodr. p. 62. Lam. Enc. IV. p. 617. Commel. Hort. 2. 175. t. 88. Breyn Cent. 1. 95. t. 41. Rudb. Elys. t. 158. f. 14.* β ? Pedicellis flore vix longioribus. *E. latifolium* α *Bot. Mag. l. c.*

„Stamina connexa in cylindrum.“ *Linn. Thunberg*, qui florentem nunquam vidit, describit in spontanea: „folia radicalia, ovata, integra, undulata, supra obsolete venosa, subtus tenuissime punctata, pollicaria et ultra.“ In culta apud *Jacquin* tuber subrotundum, capitis infantis pugnive magnitudine, extus fuscum, intus sanguineum, adstringens. Folia pauca e tubere majori, e minore unico, latissime ovatum, glabrum, coriaceum, erectiusculum, firmum, striatum, ad lentem punctatum, fere 3 poll. cum petiolo tereti et unciali. Scapus unus alterve, $1\frac{1}{2}$ ped. et ultra, teres, gracilis, erectus, glaber, superne laxe racemosus. Pedicelli graciles, 1-flori, 2-3 poll., ascendentes vel patuli, remotuli, bracteolis parvis. Petala albida fasciâ mediâ longitudinali utrinque sanguineâ, magis patula quam in *E. lanceaefolio*, quocum ceterum convenit. *Jacq. Gawler* notat in α rhizoma a magnitudine ovi gallinacei ad capitis infantis usque, e tuberibus subrotundis, fusco-flavicantibus nodosum. Folium unicum, nervosum, venis transversis rugulosum, subtus pallidum, laminâ 2-3 poll. latâ, saturate viridi; scapum 1-2 ped.; (bracteas sordide flavo-fuscas, pedicellis viridibus, 3 lin., duplo breviores;) racemum multiflorum, laxum; corollam ochroleucam, interdum viridi purpurâve mixtam, vix $\frac{1}{3}$ poll. in diametro, campanulatam, papillis glandulosis instar pruinae tectam; laciniis interioribus obovatis, quidquam brevioribus, acutiusculis, apice eroso-denticulatis; filamenta membranacea, ovato-acuminata, corollâ $\frac{1}{3}$ breviora; antheras didymas; germen ovato-globosum, obsolete trilobum, trisulcum, tristriatum; stylum staminibus aequalem; stigma obsolete trifidum. Floret Novembri, folium Februario prodit. *In Promont. b. spei. 2.*

2. *E. lanceaefolium Jacq.*; foliis ovato-lanceolatis, margine subundulato, involuto. *Willd. Spec. II. p. 111. Jacq. Coll. Suppl. 72. Ic. rar. II. t. 421. H. Kew. ed. 2. II. p. 255. Link. Enum. 1. p. 325. Redout. Lil. t. 394.*

„Racemus angustus, elongatus, pedunculis flore triplo longioribus, erecto-patentibus.“ *Willd.* Rad. tuber carnosum, pugni magnitudine, subrotundum, inaequale, foris pallide fuscescens suffuso rubore. Folium radicale unum alterumve ex eodem tubere, ad quemlibet scapum (serius prodientem) unicum, longe lanceolatum, integerrimum, acutum vel obtusum, coriaceum, (glaucum veluti pulvere adpersum *Red.*), multinerve, firmulum, erectum, basi connivens, fere $\frac{1}{2}$ ped., 1-2 poll. latum, petiolo compressulo, rubro, pollicari aut ultra. Scapus teres, gracilis, erectus, pedalis et ultra, basi inclusus vaginâ pollicari folii parvi, acuti, concavi, patentis. Racemus terminalis, erectus, laxus, plusquam $\frac{1}{2}$ ped.. Pedicelli 1-flori, graciles, $\frac{1}{3}$ -1-poll. (2 lin. *Red.*), patuli, numerosi. Bracteae ovatae, acutae, concavae, pallidae, minutae. Petala e flavo albida, fasciâ longitudinali mediâ purpureo-virente, subcarinata, 3 exteriora ovata, acuta, patentius.

cula; 3 interiora obverse ovata, acutula, superne crenulata, paulo minora. Filamenta lanceolata, compresso-plana, acuta, apice conniventia, petalis duplo breviora. Germen subrotundum, triquetrum. Stylus longitudine staminum. Stigma breviter muricatum. *Jacq.* Folia angustiora quam in *E. latifolio*, plana. *Link. In Prom. b. spei; in rupibus Tafelberg, Löwenkopf; in arenosis Tiegerberg. Ecklon. 4.*

3. *E. parvifolium Jacq.*; foliis ellipticis, obtusis, planis, (cartilagineo-ciliatulis.) *Willd. Spec. II. p. 111. Jacq. Coll. Suppl. 74. Ic. rar. t. 422.*

Rad. tuber subrotundum, utrinque depressum, carnosum, extus fuscum, intus album, $1\frac{1}{2}$ poll., $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ poll. Folium saepius unicum, lanceolato-oblongum, acutulum, basi canaliculatum, foris connivens, ceterum planum, utrinque glabrum, integerrimum, margine cartilagineo-ciliatulum, erectum, 2 poll., cum petiolo tereti villosulo et unciali. Scapus ante folia unus alterve, teres, gracilis, glaber, centralis, erectus, 8-12 poll., virescens, basi inclusus vaginis 2 brevibus acutis, apice purpurascens, ultra medietatem laxe racemosus. Pedunculi filiformes, 1-flori, patentissimi, pollicares, glabri, bracteolâ minutissimâ. Flores parvi, erecti. Petala albida, lineâ dorsali mediâ virente punctisque ferrugineis, oblonga, aequalia, obtusa, concava: 3 exteriora basi erecta, ceterum patentissima, integerrima: interiora superne crenulata. Filamenta subulata, compressula, petalis paulo breviora: 3 alterna longiora. Germen ovatum, subtriquetrum. Stylus fere longitudine staminum. Stigma subtrifidum, papillosum. *Jacq. In Prom. b. spei. 4.*

4. *E. lanuginosum Jacq.*; folio cordato, acuto, utrinque dense lanuginoso. *Jacq. Hort. Schönbr. 3. p. 7. t. 265.*

Tuber carnosum, difforme, extus cinereum, intus purpureum, crassitie pugni. Folium coriaceum, firmum, erectum, basi cucullatum, disco concavum, lateribus revolutum, 4 unc. cum petiolo tereti lanuginoso biunc. Scapus foliis praecocior, teres, erectus, crassitie pennae columbinae, $1\frac{1}{2}$ ped., debilis et hinc saepe flexuosus, inferne hirsutulus, ceterum glaber, superne longe laxequ racemosus, basi folio spathaeformi, hirsuto. Pedicelli 1-flori, graciles, patentes, teretes, $1\frac{1}{2}$ unc.; bracteolâ lanceolatâ, acutâ, minutâ. Petala sordide pallideque flavescentia, utrinque fasciâ mediâ purpureo-viridi, basi connata, lanceolata, acuta; 3 exteriora patula, planiora; interiora erecta apicibus ad oras conniventibus et patulis; omnia post fecundationem in conum erecta. Filamenta late lanceolata, acuta, plana, apice introrsum nutantia, petalis breviora. Antherae oblongae, incumbentes, luteae. Germen subrotundum, trisulcatum. Stylus filiformis, erectus, superne appendiculis clavatis muricatum. Stigma trifidum. Caps. triloba. Sem. lanceolata, acuta, fusca, lanâ albâ e pilis simplicibus, pyriformibus. *Jacq. In Prom. b. spei. 4.*

5. *E. pubescens Jacq.*; folio subcordato, acuto, cucullato, (leviter) pubescente. *Jacq. H. Schönbr. III. p. 8. t. 264. Bot. Reg. 578. E. lanuginosum β pubescens Poir. Enc. Suppl. II. p. 580.*

Tuber carnosum, difforme, subrotundum, fuscum intus rubrum. Folium post matura semina unicum, erectum, totum leviter pu-

bescens, subcordato-ovatum, basi cucullatum, striatulum, 2-3 unc. Petiolus erectus, subpubescens, 3 unc., inferne rubellus, crassitie fere calami, teres. Scapus ante folium, ped., pennâ columbinâ gracilior, teres, glaber, nudus, superne laxe racemosus. Pedunculi 1-flori, graciles, patentes, teretes, unc., bracteolâ lanceolatâ, minutâ, acutâ. Flores inodori, erecti; petala albida fasciâ viridi, omnino ut in *E. lanuginoso*. Caps. ut in *E. lanuginoso*. *Jacq.* *Gawler* describit folium hirsutius pilosum, coriaceum, ovato-acuminatum, parallele nervosum, inferne cucullato-convolutum, et in petiolum longiorem subcylindricum, striatum contractum. Scapus strictus, viridis. Racemus multiflorus, floribus vage distantibus. Pedunculi elastice rigentes, corollâ quater pluriesve longiores, assurgentes, bractea sphacelatâ. Cor. biformi-patens, fundo nectarifero: laciniis 3 extimis urceolato-rotatis, infra laxius conniventibus, supra recurvo-divaricatis, oblongis, acumine conduplicato; 3 intimis erecto-conniventibus, obovato-cuneatis, supra orbiculatis, eroso-crenulatis atque plicâ brevi posticâ carinatis, infra subunguiculato-angustatis. Stamina corollâ $\frac{1}{3}$ breviora, laciniarum pedi inserta, aequalia, erecta; filamenta ovato-acuminata, planiuscula, alba, apice inflexa. Antherae breves, sagittato-didymae, polline flavo. Pistillum stamina fere superans. Germen viride, glabrum, conicum, disco incrassato corollae insidens, obtuse trigonum, angulis striatis, loculis inferne biseriato-polyspermis, superne vacuis. Stylus albus, erectus, germine parum brevior. Stigma pubescens." *In Promont. b. spei.* 4.

6. *E. paradoxum* *Gawl.*; caulescens; foliis multifidis, ciliatis; scapo racemoso paucifloro; corollis campanulatis; filamentis lanceolatis. *Willd. Spec.* II. p. 115. (sub *ORNITHOGALO paradoxo* uti) *Jacq. Coll. Suppl.* 81. t. 1. *E. paradoxum* *Gawl. Bot. Mag.* 1582. *Bot. Reg.* 795.

Tuber carnosum, difforme, pollicem aut ultra crassum, fuscum. Caulis herbaceus, sterilis, 3-5 poll., erectus, pennae columbinas crassitie, foliisque lanatus pilis mollibus albidisque, basi ruber, ceterum viridis; inferne ornatus foliolo stipulâve subrotundâ, integerrimâ vel emarginatâ, amplexicauli, crassâ, rigidulâ, patentissimâ, parvâ. Folia sparsa, linearia, acuta, petiolata, mollia, infima verticillata, plerumque simplicissima, reliqua furcato-multifida, 1-2 poll. Scapus caule praecocior, aphyllus, erectus, pollicaris, teres, pilis albis, racemosus, sub-7-florus. Bractee subpedicellis ovatae, acutae, parvae, concavae, papillosae. Pedunculi 1-flori, brevissimi. Flores erecti. Petala albida, fasciâ longitudinali mediâ virente, striisque purpureis variegata, oblonga, acuta, concava, erecta, aequalia. Filamenta basi latiora, compressa, petalis fere duplo breviora, 5 iisdem altius inserta. Antherae dependentes. Germen ovatum, 6 sulcum, sulcis alternis profundioribus. Stylus longitudine staminum. Stigma 3-fidum. *Jacq.* Planta florens aphylla. Petala viridia margine alba. *Link.* *In Prom. b. spei.* 4.

7. *E. folioliferum*. *Andr.*; folio foliolifero: foliolis filiformibus, indivisis, sessilibus. *Andr. Rep.* t. 521. (ubi male anthesis et foliatio coetanea pingitur). *Bot. Reg.* 795. et fol. 578. in spec. enum. *Bot. Mag.* 1582. p. 2.

Bulbus tuberosus, vix poll. altus, 2 poll. latus. Folium radicale cum petiolo pollicari circiter $1\frac{1}{2}$ poll.; foliola pollicaria. Caulis erectus, crassitie fili emporetici. Racemus simplex, pedunculis inferioribus fructiferis nutantibus, flore parum longioribus; superioribus eodem triplo longioribus, erecto-patentibus. Bracteola parva ad basin pedunculi. Petala albo-virentia, carinâ viridi interioribus conniventibus apice serratis. Stamina basi dilatata. (Ex icone.) *In Promont. b. spei.* 4.

Obs. Speciem nondum florentem, sed, ut videtur, diversam, descripsit Jacq. in *Fragm.* p. 41. t. 47. f. 3. „Radix perennis, ramosa, subtuberosa, carnosâ, teres, crassitie digiti vel calami, fibris stipata. Folia cordata vel subrotunda, acuta, integerrima, glabra, nervosula, terrae incumbentia. Petioli teretes, infra terram longi, albidi, inferno vaginâ fuscâ inclusi. Flores albos *Ornithogalo* vel *Antherico* similes dixit Scholl, qui plantam ex Prom. b. spei attulit.“

Quid *FRIOSPERMUM pedunculatum* L. in *Ecklon topogr. Verzeich.* p. 2. ex *Herb. Brehm.*
spirale Bergius in *Ecklon l. c.*
virgatum H. Nymphenb.?

1400. ORNITHOGALUM.

a. *Filamentis omnibus bifurcatis.*

1. *O. izioides* Hort. Kew.; scapo nudo; floribus umbellatis; filamentis omnibus bifurcatis, in medio antheriferis. Hort. Kew. ed. 2. II. p. 257.

In California. A. Menzies. 4.

b. *Filamentis alternis bidentatis vel emarginatis.*

2. *O. nutans*; foliis linearibus, canaliculatis; floribus racemosis, subnutantibus, secundis; pedunculis flore bracteâque brevioribus; filamentis dilatatis, fissis, 3 longioribus; lobis antheras subaequantibus. *O. Linn. Spec.* 441. *Willd. Spec.* II. p. 125. *Mill. Dict.* n. 4. *Smith Comp.* 53. *Engl. Fl.* II. p. 144. *Engl. Bot.* t. 1997. *Roth Enum. pl. Germ.* I. 2. p. 47. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 552. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 218. *Balbis Fl. Lyon.* 1. p. 724. *Savi Bot. Etr.* II. p. 216. *Tenore Fl. neap.* 1. p. 179. *Seb. et Mauri prodr.* p. 218. *M. a Bieberst. Fl. taur. cauc.* 1. p. 277. *Suppl.* p. 266. *Jacq. Aust.* t. 301. *Fl. Dan.* t. 192. *Curt. Mag.* 269. *Red. Lil.* t. 253. *Hook. Lond.* t. 44. *Hall. Hist.* n. 1216. *ORN. hyalinum Granier* in *Brouss. Cat. Monsp.* p. 41. *Rudb. Elys.* 2. p. 137. f. 12. *Swert. Floril.* t. 57. f. 2. *O. neapolitanum Clus. App.* 2. p. 9. t. 9. *Bauh. Hist.* 2. p. 631.

Bulbus ovatus, albidus, alte absconditus. Folia radicalia, 3-5, flaccida, scapum superantia vel aequantia, obtusa, striata, laete viridia, glaucescentia, 6-18 poll., 1-4 lin. lata. Scapus centralis, erectus, teres, crassus, laevis, inferne attenuatus, 4-14 poll., crassitie pennae corvi ad pennam anserinam. Racemus simplex, erectus, 3-18-florus. Flores magni, ante florescentiam subalterni erecti, dein penduli secundi. Pedunculi 2-5 lin., glabri. Bracteae ovato-lanceolatae, basi concavae, longe acuminatae, flores aequantes vel paulo superantes, inferiores reflexae, membrana-

ceae, albae, vel fusciscentes. Petala dorso viridia, intus margineque alba, elliptico-lanceolata, obtusiuscula, 7-11 lin., $1\frac{1}{2}$ 3 lin. lata. Filamenta lata, speciem campanae sistentia, unde *Bauhini*, „flos minor magno innatus“ alba, petalis duplo breviora, 3-cuspidata, alterna breviora. Antherae in lacinia media filamenti, oblongae, flavae. Stylus stamina aequans, serius superans, albus, angulatus. Caps. magna, subrotundo-ovata, sulcis 6, carnosae. Sem. rugosa nigra. Specimina ex Asia minore omnibus partibus duplo minorae. *In cultis totius Europae a Balthico ad Mediterraneum; in Archipelago; in Asia minore.* Neapoli innotuit circa 1570, e Creta introductum sec. *Bauhin.* 4.

3. *O. Bergii de Schlechtend.*; foliis scapo brevioribus, hirsutis; racemo paucifloro; bracteis cordato-amplexicaulis, subulato-acuminatis, pedunculos aequantibus superantibusve; filamentis omnibus basi latioribus: interioribus inferne dilatatis, bidentatis. *de Schlechtend. in Linnaea.* 1826. p. 254.

Bulbus albus, carnosus, vix magnitudine Avellanae. Folia 3 radicalia mox marcescentia, retrorsum hirsuta, margine pilis minoribus densissime ciliata; primum folium brevissimum, obtusum, 2 et 3 subaequalia, linearia, plana, acuta, decumbentia. Scapus erectus, teres, foliis longior, $\frac{1}{2}$ ped., glaber. Racemus 2-12-florus. Bractee membranaceae, ferrugineae, margine albae, integerrimae, basi latae, amplexicaules, cordatae, apice longe acuminatae, subulatae. Pedunculi longitudine bractearum. Petala pedunculo breviora, ovato-lanceolata, alba: exteriora dorso basin versus virescentia, apice subferruginea; interiora parum latiora. Stamina dimidia corollae longitudine; filamenta alba, basi dorso carinata; exteriora filiformia, subulata; interiora subulata, inferne quasi alata, dentibus 2 interne conniventibus. Antherae oblongae, flavae, medio insidentes: extremitatibus emarginatae. Pistillum longitudine filamentorum. Germen obtuse triquetrum, superne flavum. Stylus albus, longitudine germinis. Stigma album, trifidum, cristis 3 papilloso-hirsutis. Caps. longitudine corollae, ovata, acuta, carnosae, trilobularis. Sem. numerosa, obovata, subangulata, echinata, nigra. *Bergius*. Primo intuitu *ALBUCAM* refert. *Schlechtend. Clo Spreng. in Cur. post. p. 132.* *In synonymon O. hispidi Hornem. s. ANTHERICI pilosi.* *Prom. b. spei.* 4.

4. *O. virens Lindl.*; racemo spicato, multifloro; foliis lineari-lanceolatis, debilibus, ad apicem breviter teretibus, acuminatis; petalis patentibus; staminibus alternis bidentatis; bracteis floribus longioribus. *Lind. Bot. Reg.* 814.

Folia $1\frac{1}{2}$ ped., apice sensim attenuata in acumen teres breve, pallide viridia, subcanaliculata. Scapus foliorum longitudine, erectus, teres, viridis, glaber. Racemus laxis, rectus, cylindraccus, $\frac{1}{2}$ ped.. Bractee subulatae, sphacelatae, floribus inexpanis longiores. Pedicelli laeves, floris patentes, fructus erecti. Flores virides. Petala plana, oblonga, obtusa; interiora paulo erectiora. Aestivatio duplici serie valvata. Stamina circa pistillum erecta, petalis breviora, inter bases petalorum et germen inserta. Filamenta petalis interioribus opposita dilatata, bidentata, exteriora

subulata. Antherae parvae, oblongae. Germen triquetrum, oblongum, angulis petalis exterioribus oppositis. Stylus subulatus. Stigma simplex. Differt ab *O. caudato* habitu minori, foliis brevius acuminatis; floribus viridibus; filamentis alternis bidentatis. In *O. odorato*, quod etiam affine, flores majores; folia breviora; bractee pedunculis breviores. *Lindley. In Delagoa Bay Africae meridionalis. Forbes. 4.*

5. *O. bicolor* Haw.; racemo subovato; foliis longo-lanceolatis, acuminatis; bracteis pedunculo duplo brevioribus; filamentis alternis furcatis. *Haworth Miscell. natural. 24. nov. pl. Spec. n. 4.*

In Prom. b. spel. 4.

6. *O. aureum* Curt.; foliis lanceolatis, cartilagineo-ciliatis; racemis subcorymbosis, laxiusculis; bracteis ovatis, acuminatis, pedunculo brevioribus; petalis ovatis, subacutis; filamentis omnibus basi dilatatis: alternis latioribus, emarginato-alatis. *α* floribus aurantiis *Hort. Kew. ed. 2. II. p. 261.* *O. aureum*; fol. ovato-lanceol., albo-marginatis; flor. racemos. confertis; filam. nectario emarginato insidentibus. *Curt. Mag. 190.* *O. aureum β* flor. aurant.; bract. pedunculo duplo brevior. *Willd. Spec. II. p. 124.* *O. aur. β aurantiacum* Poir. *Enc. Suppl. IV. p. 191.* *O. aureum B* Redout. *Lil. 439.* *O. thyrsoides α* H. *Kew. ed. 1. p. 442.* *Willd. Spec. II. p. 124.* *O. dubium* Houtt. *Pfl. Syst. 11. p. 347. t. 82. f. 3.* *β* flor. flavis, H. *Kew. ed. 2. II. p. 261.* *O. flavissimum* Jacq. *Coll. Suppl. 65. ic. rar. II. t. 436.* *Andr. Repos. 505.* *O. aureum δ* flor. flav.; bracteis angusto-lanceolatis fere longitudine pedunculi. *Willd. Spec. II. p. 124.* *O. aureum D* Red. *Lil. fol. 439.* *γ* flor. miniatis. *O. miniatum*; racem. corymbos.; bract. pedunculo duplo brevior.; filam. altern. basi utrinque alatis. *Jacq. Coll. III. p. 233.* *Gmel. Syst. Veg. 1. p. 550.* *Kern. semperv. t. 22.* *O. aureum α* fl. rubr.; bract. lanceol., pedunculo duplo brevior. *Willd. Spec. II. p. 124.* *O. aureum A* Red. *Lil. fol. 439.* *O. flavescens β* Poir. *Enc. IV. p. 616.*

In *α* apud *Curtis*: bulbus albidus. Folia radicalia 3-4, glabra, subcarnosa, erecta, obscure viridia, 3-4 poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata, sublente pilis tenuissimis ciliata. Scapus nudus, 8-12 poll., multiflorus; floribus magnis, aureis e bracteis magnis, concavis, acuminatis. Petala 9 lin. longa, 4 lin. lata, basi sulfurea. Stam. omnia dilatata aut basi glandulâ nectariferâ interne emarginatâ insidentia. In *β* apud *Jacquin*: bulbus tunicatus, subrotundus, magnitudine Avellanae. Folia radicalia plura, lanceolata, acuta, ad oras sublente cartilagineo-hirtula, crassula, coriacea, striatula, basi canaliculata, ceterum planiuscula, fere $\frac{1}{2}$ ped. poll. lata, pleraque patentissima. Scapus teres, 1-1 $\frac{1}{2}$ ped., calamum crassus, flexuosus, erectus, racemo terminali, amplo. Flores inodori. Bractee lanceolatae, acuminatae, inferiores 1 $\frac{1}{2}$ poll., superiores successive breviores, erectae. Pedunculi teretes, 1 $\frac{1}{2}$ poll., erectiusculi patulive, sub fructu erecti. Pe-

tala flavissima, immaculata, lanceolata, acuta, patentissima, plana (7.9 lin., 3.5 lin. lata), 3 alterna angustiora. Filamenta petalis triplo breviora, patula, inferne alba, compressula, superne flava, omnia basi latiora: alterna 3 manifeste marginata (auriculis lateralibus brevissimis obtusis). Antherae ochroleucae. Germen ovatum, 3-sulcum, atrovirens. Stylus brevissimus. Stigma capitatum, trilobum, villosulum. Caps. ovata. Sem. plura. In γ bulbus depresso-subrotundus, albus, magnitudine Avellanae vel major. Folia radicalia 3-4, 4 unc. longa, $\frac{1}{2}$ unc. lata, acutiuscula, crassula, ad oras sub lente villo albo ciliata. Scapus crassitie calami, 9 unc. circiter, teres, erectus, superne corymbose racemosus, floribus circiter 14. Pedicelli crassi, teretes, erecti, bracteis duplo longiores. Bracteaë $1\frac{1}{2}$ unc., acutae, concavae. Petala utrinque saturate miniata, parum concava, ovata, acuta, patula, supra unguem leviter fusciscentia. Filamenta petalis 3-plo breviora, erecta, subulata, inferne alba, superne sordide lutescentia, alterna basi utrinque membranulâ albâ, alia 3 basi paulo latiora. Antherae oblongae, apice bifidae, albae, polline sulfureo. Germen ovatum, triquetrum, viride. Stylus crassus, brevis. Stigma capitatum, magnum, trilobum, sordide luteum, villosulum. — Hoc forte et *O. flavescens* merae *O. thyrsoïdis* varietates; patria, habitus, florendi tempus apud nos, odor, foliorum margo in omnibus eadem; sed florum color diversus et constans. *Jacq.* In *Prom. b. spei*; prope *Caledon, Gnadenhal, Elim in montibus*. 4.

7. *O. thyrsoïdes Jacq.*; foliis elongato-lanceolatis; racemis corymboso-thyrsoïdeis, densis; bracteis ovato-lanceolatis, acuminatis; petalis ovatis, acutiusculis; filamentis 3 subulatis, 3 inferne dilatatis subtricuspidatis. α album *Bot. Reg.* 316. *O. thyrsoïdes*; flor. racem. confertissimis; filamentis emarginatis. *Jacq. Vind.* 3. p. 17. t. 28. *Murr. Syst. Veg.* 328. *Thunb. prodr.* 62. *Fl. Cap. ed. Schult.* p. 315. *Hort. Kew. ed. 2. II. p.* 261. *Mill. ic.* 128. t. 192. *Bot. Mag.* 1164. *Trattin. Tabul.* t. 720. *O. thyrsoïdes*; corymb. multifl. racemiformi; filam. alternis furcatis; fol. lanceolatis; β florib. albis, bracteis longitudine pedunculi. *H. Kew. ed. 1. p.* 442. *Willd. Spec. II. p.* 124. *Poir. Enc. IV. p.* 616. (omn: tres excl. α). *Redout. Lil. t.* 333. *O. Grimaldiae Nocc. pl. sel. tic. t.* 4. (fid. *Röm. Arch.* 2. p. 457.) *O. arabicum Linn. Spec.* 441. (quoad definit., sed excl. synonym.) *O. aethiopicum Clus. Cur. post.* 21. *Park. par.* 138. β . *flavescens Bot. Reg.* 505. (quo teste etiam huc spectaret: *O. arabicum Red. Lil. t.* 65.) *O. flavescens*; racem. corymboso, multifl.; bract. acutis, pedunculis subduplo brevioribus; filam. altern. basi utrinque alatis. *Jacq. Coll.* 3. p. 255. *Ic. rar. 2. t.* 457. *Gmel. Syst. nat. II. p.* 550. *Poir. Enc. IV. p.* 616. *Suppl. IV. p.* 191. *O. aureum γ flor. inapertis aurant., apertis albo-flavescentib.; bract. lanceolatis, pedunculo duplo brevioribus. Willd. Spec. II. p.* 124. *O. aureum C Redout. Lil.* 459. γ . petalis subserratis. *Hornem. h. hafn. Suppl. p.* 41.

Thunberg describit in spontaneo: „bulbum parum profundum, globosum, fibrosum, glabrum, album, magnitudine Juglandis; folia radicalia, primum ovata, adultiora lato-lanceolata s. ensiformia, integra, glabra, erecta, scapo breviora, spithamaea; scapum teretem, crassitie fere calami, erectum, glabrum, saepe flexuosum, spitham. - ped.; racemum rotundato-subfastigiatum; pedunculos inferiores longiores, teretes, erecto-patentes, pollic., superiores sensim breviores, unguiculares; bracteas ovato-oblongas, apice setaceas, membranaceas, pedunculis duplo breviores; corollam albam; petala ovata.“ Idem notat: „variat α petalis basi fusco-maculatis; β magnitudine scapi, foliorum et racemi. Valde simile *arabico*, cui racemus magis fastigiatus, pedunculi infimi bracteis pluries longiores et petala magis oblonga et acuta (?).“ Melius cum planta nostra spontanea convenit descriptio a *Jacquin* ad spec. cultum facta, quam etiam *Thunberg* laudat: bulbus albidus, e squamis dense compactus, depressus; folia (radicalia, plura) elongato-lanceolata, acuta, lineata, crassula, debilia, inferne carinata, superne magis plana, longiora pedalia, latiora 2 unc. Scapus ped., calami vel duplo crassitie, teres vel obsolete angulatus, suberectus, rore glauco. Racemus erectus, $\frac{1}{2}$ ped. vel brevior (3 poll.), densus, thyrsiformis. Bracteae lanceolatae (vel ovato-lanceolatae, concavae) longitudine pedunculorum (in floriferis, in fructiferis breviores), acumine setaceo, membranaceae, aridae, sessiles, nec cordatae amplexicaules (?) ut in *O. arabico*. Pedunculi plus minus unciales teretesque, (fructiferi $1\frac{1}{2}$ poll.), florentes et fructigeri erecti (vel erecto-patentes). Flores subodorati. Petala patula, nivea, maculâ basi flavo-fuscescente; alterna interiora exterioribus subinde paulo angustiora: in fructu conniventia, marcescentia, (6-8 lin., 3 lin. lata, acuta potius quam obtusa). Germen ex nigro virescens. Stylus flavescens. Filamenta petalis duplo breviora, albida: alterna 3 subulata (basi vix dilatata) patentia; alia 3 erecta, inferne (et ad medium usque) dilatato-subovata, concava, bidentata, (i. e. tricuspidata: cuspidate medio subulato multo longiore antherifero: 2 lateralibus brevibus obtusiusculis, ovatis, subincurvis). Antherae oblongae, polline flavo. (Caps. petalis emarcidis tecta iisque paulo brevior, ovata, acuminata, obtuse trigona, profunde trisulca, flavescens.) In β apud *Jacquin*: bulbus depresso-subrotundus, unc. diametri. Folia $\frac{1}{2}$ ped., majora $1\frac{1}{2}$ unc. lata, acutiuscula, carnosula, ad oras villulis ciliata. Scapus ped. et ultra. Pedunculi proprii 2 unc. et ultra, crassi, circiter 30. Bracteae virides, acutae, pedunculis duplo breviores eisdemque connivendo amplexantes. Petala subaequalia, late lanceolata, acuta, quidquam concava, patula, primum flava, dein alba, ad unguem ex fusco-luteola, fere uncialia. Filamenta petalis triplo breviora, inferne alba, superne sordide lutescentia, alterna basi utrinque membranâ alba alata. Antherae flavae, oblongae, incumbentes, polline luteo. Germen viride. Stylus brevis, crassus. Stigma capitatum trilobum, villosum, sordide luteum. Reliqua exacte ut in α . In *Prom. b. spei*; in monte *Löwenberg*. 4.

Obs. Haec de *O. thyrsoides Jacq.* et antiquior. *Hott.* *Poir.* notat in specimine suo spontaneo folia radicalia numerosa, lata, margine ciliata, scapo duplo breviora; racemum longum, conicum; pedunculos $1\frac{1}{2}$ poll.; petala ovata, obtusa. Reliqua conveniunt. *Hedouté* describit bulbum subrotundum, tubicis fuscis; folia acutiuscula, erecta, pallide viridia, glabra; scapum 11-30 poll.; racemum densum, primum brevem, ovatum, conicum, serius subcylindri-

cum, exerescentem, pedicellis 9-17 lin., basi bracteâ lanceolatâ, albâ, acutâ, pedicello paulo brevior; cor. laciniâ ovatas, acutiusculas, concavas, aequales, albas, basi maculâ viridi; filamenta 3 ad medium membranâ albâ in utroque latere in acumen breve recurvum, filamento brevius, producta. Germen flavum, ovatum, obtuse trigonum. Stylus trigonus, staminibus brevior, stigmate trigono-capitato. Reliqua conveniunt cum *Poiret*. Dubitat *Redouté* an ab *arabico* diversum, cum differat tantum foliis margine ciliolatis: sed *arabicum* suum β *flavescens* est, sec. *Ker*. Apud *Gawler*: folia laxa, recumbentia, lorato-acuminata, 4-5 poll., subconvoluto-concava. Scapus saepius 1-ped.. Cor. subcampanulato-rotata, diametro $\frac{1}{2}$ poll. et ultra, disco fuscescente, laciniis lanceolato-oblongis. Stylus germine viridi paulo brevior. Stigma subtrilobo-capitatum. stylo duplo brevius. Reliqua conveniunt cum *Redouté*. Differre a *revoluto* stylo stigmate duplo longiore, a *lacteo* stylo germine brevior: in *aureo* stylus fere obsoletus. stigma majus, 3-lobum. — An huc *O. thyriflorum Hortul.*?

8. *O. coarctatum Jacq.*; filamentis alternis marginatis; foliis linearibus, canaliculatis; racemo oblongo pedunculis valde approximatis coarctato. *Jacq. Coll. Suppl. 77. ic. rar. 2. t. 435. Willd. Spec. II. p. 125.*

Bulbus subrotundus, depressulus, tunicatus, Avellanâ duplo major. Folia radicalia 3-4, sublinearia, acuta, integerrima, erectiuscula, superne declinata, viridia, longiora fere pedalia. Scapus teres, erectus, racemo terminali, foliis paulo altior. Bracteae lanceolatae, acutae, concavae, scariosae, erectiusculae, albidae, $\frac{1}{2}$ poll. Pedunculi fere 30, $1\frac{1}{2}$ poll.. Flores inodori, basi campanulati, dein patentes. Petala lanceolata, obtusa, utrinque nivea, ungue sordide luteo: 3 alterna paulo angustiora. Filamenta subulata, erecta, petalis duplo breviora, alba: 3 alterna basi utrinque in membranam excurrentia. Antherae erectae, flavae. Germen ovatum, triquetrum, saturate ex luteo sordens. Stylus albus, longitudine staminum. Stigma capitatum, obtusum, trifidum, villosum. Capsula ovata, erecta, acuta. Semina plurima, atra. Maxime affine *corymboso*, a quo differt patriâ, bulbo non ovato, scapo magis multifloro, petalis non patentissimis, utrinque niveis, nec subtus virentibus; filamentis alternis marginatis, florescentiâ tardiore. *Jacq.*. In *Prom. b. spei; prope Uitenhagen. 4.*

c. *Filamentis lanceolatis vel subulatis.*

a. *Floribus racemosis.*

9. **O. arabicum*; foliis lorato-linearibus, glabris; corymbo laxo, multifloro; bracteis subcordato-ovatis, acuminatis; petalis ovalibus, obtusis: exterioribus obsolete tridentatis; filamentis omnibus lanceolato-subulatis. *O. Linn. Spec. 441.* (quoad synonym. sed excl. delin.) *Willd. Spec. II. p. 123. Mill. Dict. n. 8. O. corymb. multifl.; filament. subul.; cor. late campanulatâ; pet. exter. obsolete tridentatis. H. Kew. ed. 1. p. 412. ed. 2. II. p. 260. Roth bot. Abh. p. 62. Desf. Atl. 1. p. 296. (corr. synonym.) O. flor. subcorymb. laxis; fol. sublin., latis: bract. ovatis, acumin., pedunculo brevior.; filam. omn. subulatis. Brot. Fl. lusit. p. 551. Phyt. lusit. sel. p. 105. t. 46. Loisel. Fl. gall. p. 201. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 217. Tenore Fl. neap. 1. p. 78. Guss. Prodr. Fl. sic. 1. p. 414. Gawl. in Bot. Mag. 728. Tratt. Tabul.*

722. *O. arab.* *Clus. Hist.* 1. p. 186. *Besl. H. Eyst. vern.* 5. t. 12. f. 1. *Grisl. Virid. lusit.* n. 1594. *O. umbell. maxim.* *Bauh. pin.* 69. *Lil. alexandr. s. O. magn. syriac.* *J. Bauh. hist.* 2. p. 629. *O. arab. multifl.* *Swert Floril.* t. 57. f. 1. *Melanomphale Renealm.* p. 89. t. 90. *Park. Parad.* t. 137. f. 1.

Bulbus tunicatus, ovatus, 1-1½ poll. crassus, cortice fusco, basi bulbulis adnatis 3 aut pluribus. Folia omnia radicalia, in orbem strata, demum erectiuscula, sublinearia (planiuscula vel canaliculata, acuta) ½ ped. et ultra, (4-) 6-9 lin. lata, dilute viridia. Scapus basi crassitie pennae anserinae et ultra, 1½-2 ped., (teres, glaber), apice floribus 8-16 primum subcorymbosis, demum laxe racemosis. Pedunculi adscendentes, remotiusculi, (glabri, teretes, 1-3½ poll.). Bractea ad singulum pedicellum viridi-alba, subinde ovato-subcordata, nulla amplexicaulis, (rostrato-acuminata, membranacea, subconvoluta, obsolete nervosa, in junioribus pedunculos aequans, serius brevior, subinde reflexa, 8-18 lin.). Petala magna, subovata, alba (sicca pallide flavescencia), apice calloso, patentia, (exteriora truncato-emarginata cum acumine minuto calloso ex emarginatura, ut inde fere tridentata videantur; interiora obtusa, 6-11 lin., 3-5 lin. lata.). Filamenta omnia aequalia, subulata, ut in icone *Besler* et *Swerts*, viridi-fusca, (corollâ duplo breviora, basi lanceolata, apice subulata. Antherae ovatae, obtusae, flavae, 1-1½ lin.). Germen subglobosum, viridi-nigricans, nitidum, ut capsula. (Stylus germine staminibusque brevior, trigonus.) *Brotero*. *Culta apud Gawler* differt tantum: foliis extus convexis, poll. latis, minutim ciliatis, plus minus caudatis, 1-2 ped.; cor. laciniis exterioribus apice mucrone utrinque dente acuto; germine punctis 6 albidis. *In Europa meridionali ad Mediterraneum in Sardinia, Sicilia, in Biscaya, Lusitania; in Africa boreali et in Madera.* 4.

Obs. Recte jam *Brotero* et *Gawler* monuerunt, *Linnaeum* sub *O. arabico* et *O. arabicum* *Bauhinorum* et *O. thyrsoides* confudisse. Hoc patet e definitione a *Linnaeo* data: *O. flor. corymbosis; pedunculis scapo humilioribus; filamentis subemarginatis; e patria, cum praeter Alexandriam etiam Cap. b. spei adjecisset, et e specimine capensi ex Herb. Retzii, quod ibi nomine O. arabici prostat, omnino vero ad O. thyrsoides spectat.* Synonyma a *Linnaeo* ad *arabicum* laudata, certe huc pertinent, definitio vero ad *O. thyrsoides*. Etiam *Poiret* in *Lam. Enc.* IV. p. 616. de suo *O. arabico* toties a se in Barbaria observato (quod „fol. longissimis, angustis; pedunculis scapo longioribus, filamentis subemarginatis“ definit) dubitat utrum idem cum *Linnaeano*. Quamvis *Poiret* omnia synonyma a *Brotero* citata (*Clusium* attamen cum?) laudet, descriptio ab eodem data nonnullis tamen abludit: „bulbus magnitudine nucis juglandis, tunicis pluribus albis glutinosissimis, crassis. Caulis strictus, rigidus, laevis, sulcatus, gracilis, nudus, 2-3 ped. Folia 5-6 e medio bulbi, scapum basi amplexantia, recta, glabra, canaliculata, apice filiformia, ⅓ longitudinis scapi, 2-3 lin. lata. Flores magni, ochroleuci, tere corymbum brevem sistentes. Pedunculi ultra pollicem longi, recti, rigidi, bracteis albis, membranaceis, basi latis, acutis, pedunculo ⅓ brevioribus. Rhachis torta, subflexuosa. Petala oblonga, obtusa, tenuia, transparentia. Filamenta alterna dilatata, sagittata.“ *Redouté* 1. 63. (a *H. Kew.* ad *arabicum*, a *Ker* in *Bot. Reg.* et in *Recens. Hed.* in *Journ. of science* II. p. 180. vero ad *thyrsoides* laudata) plurimis convenit cum *arabico*; descriptio filamentorum vero et icon potius in *thyrsoides* quadrant, cum filamenta alterna basi dilatata et germen primum occultum dicat appendicibus filamentorum petalis interioribus oppositorum. Qua ratione cl. *Link* *O. arabicum* *Brotero* ad *O. lacteum* citet, non intelligimus.

10. *O. corymbosum* *Ruiz et Pav.*; scapo tereti; floribus corymbosis, (paucis); corollâ magnâ, germine atro. *Ruiz* et

et Pav. *Fl. Peruv.* 3. 68. t. 300. Lindl. in *Bot. Reg.* p. 906. t. 907. et in *Trans. Hort. Soc.* VI. p. 86.

O. arabico simillimum. Bulbus semisubterraneus, supra terram foliorum vestigiis cicatrisatus. Folia $1\frac{1}{2}$ ped., ligulata, canaliculata, carnosae, debilia, humifusa, glaberrima, viridia. Scapus 2-ped., teres, pennae cygneae crassitie. Racemus corymbosus, decussatus, 6-florus. Bracteae acuminatae, cordatae, membranaceae, pedicello duplo breviores, subdentatae, appressae, apice virides firmiores. Flores albi, odore laeto *Oxyacanthae*, ($2-2\frac{1}{2}$ poll. diam.). Petala primum cyathiformia, dein patentissima, imbricata, late ovata, subundulata, venosa, aequalia, carnosae, apice quandoque paululum divisa. Stamina petalis duplo breviora, erecta, sepalis inserta; filamenta subulata; antherae ovatae. Germen obovatum nigro-viride. Stylus filiformis, simplex, basi viridis. *O. arabico* proximum et hujus forte varietas. Lindl. in *Peruviae provinciis Chancay, Cercado et Huanuco, in Chili.* 4.

11. *O. revolutum* Jacq.; racemo pauci- (v. multi-) floro; filamentis lanceolato-subulatis; petalis lineari-oblongis, oblique flexis, emarginatis; foliis sublinearibus, planiusculis, glabris, (marginatis). Jacq. *H. Schönbr.* 1. p. 46. t. 89. Willd. *Spec.* II. p. 118. Gawl. *Bot. Mag.* 655. *Bot. Reg.* 315.

Totum glabrum. Bulbus subrotundus, tunicatus, albidus, magnitudine Avellanae. Folia saepe 3. integerrima, obtusula, inferne canaliculata, ceterum planiuscula, erectiuscula (patenter recurva Gawl.), $\frac{1}{2}$ ped. circiter, (crassiuscula, sub lente tuberculato-scabra, cartilagine tenuissimâ albo-marginata G.). Scapus teres, calamo gracilior, 8 unc., flexuosus, erectus, laevigatus. Racemus multiflorus (supra pauciflorus!, conico-oblongus). Pedunculi crassuli, unc.. Bracteae lanceolatae, acuminatae, conniventes et amplexantes, scariosae, inferne albae, superne fuscescentes, pedunculis duplo breviores, (inferiores longitudine pedicellorum). Cor. lacinae obverse ovatae, obtusulae, ad oras revolutae, convexulae, patentissimae, subaequales, (exteriores interdum emarginatae vel obsolete tridentatae; interiores acutiores, integrae G.), fere unc., albae cum sola basi utrinque virente (flavo-badiâ G.). Filamenta planiuscula, erecta, brevia, alba, alterna basi latiora, (corollâ triplo breviora, inferne convoluto-canaliculata, 3 laciniis interioribus opposita plano-expansa et interdum superne in dentes 2 conniventes elongata, 3 convoluta multoque angustiora G.). Antherae oblongae, subincumbentes, flavae. Germen ovatum trisulcatum, (obtusum trigonum, atro-viride, lineis 6 parallelis longitudinalibus G.). Stylus crassus, brevis, (stamina aequans). Stigma capitatum, subrotundum, flavescens, (cristis 3 minutis dehiscenti-fimbriatis G.). Jacq. In *Prom. b. spei.* 4.

12. *O. lacteum* Jacq.; racemo longo (cylindrico-) pyramidato, denso; filamentis subulatis, alternis ad basin leviter marginatis; bracteis membranaceis ovatis, pedunculo duplo brevioribus; foliis lanceolatis, planis, apice conniventi-acutis, margine ciliatis. Jacq. *Coll. Suppl.* 76. ic. rar. 2. t. 344. Willd. *Spec.* 2. 117. Andr. *Bot. Rep.* 1. 274. Gawl. *Bot. Mag.* 1134. Réduit, *Lil.* 418. Trattin. *tabular.* t. 725.

Bulbus subrotundus, tunicatus, albidus, $1\frac{1}{2}$ poll. diametri. Folia radicalia plura, fere 10, in orbem posita, basi mutuo amplexantia, versus apicem ad oras involuta, utrinque glabra, margine villis densis, albis, (brevibus), inferne erectiuscula, superne reclinata, plus minus $\frac{1}{2}$ ped., (7-11 poll.), pollicem lata. Scapus teres, calamo crassior, glaber, flexuosus, erectus 2 (etiam 3-) ped., racemo terminali erecto, $\frac{1}{2}$ -1 ped.. Bracteae lanceolatae, acutae, concavae, erectiusculae, albidae, pedunculo duplo breviores, (longitudine pedunculorum *Red.*). Pedunculi erectiusculi, fere $\frac{1}{2}$ poll. (9-15 lin.). Flores inodori, diametri $1\frac{1}{2}$ poll. Petala lanceolata, obtusula, patentissima, tota lactea (basi macula parva viridi *Red.*): alterna 3 paulo angustiora, in fructu adhuc persistentia. Filamenta subulata, erecta, petalis $\frac{1}{3}$ breviora, alba, 3 alterna (petalis nempe interioribus opposita) basi utrinque breviter marginata. Antherae oblongae obtusae, incumbentes, sulphureae. Germen oblongum, trisulcum, (viridi-) flavescens. Stylus trisulcus, erectus, albus, longitudine staminum. Stigma obtusum, subtrifidum, flavescens. Caps. oblonga, triquetra, obtusa, stylo mucronata, cinerascens, longitudine corollae. Semina oblonga, angulata, rugosa, atra. *Jacq.* Folia pallide viridia, carnosula. *O. thyrsoidi* affine, sed omnibus partibus majus; filamenta simplicia, subuliformia. *Link* cum? huc ducit *O. arabicum Brot.* In *Prom. b. spei.* 4.

13. *O. conicum Jacq.*; racemo conico; filamentis subulatis; bracteis membranaceis (longitudine pedunculorum); foliis lanceolatis, planis, margine membranaceis, ciliatis. *Willd. Enum. H. berol. p. 369. Spec. II. p. 118. Jacq. Coll. 3. p. 252. Ic. II. t. 428.*

Bulbus ovatus, albus, magnitudine Juglandis. Folia lineari-lanceolata, acuta, plana, glabra, carnosula, ad oras villo albo brevissimo ciliata, radicalia, plura, 5-8 unc.. Scapus teres, crassitie fere calami, erectus, glaber, foliis duplo longior. Racemus multiflorus, conicus, tandem elongatus. Pedicelli unciales, erecti. Bracteae lanceolato-acuminatae, concavae, ad minimum longitudine pedicellorum, albidae, totae scariosae, pellucidae, tenuissimae. Petala subpellucida, nivea, immaculata, subaequalia, lanceolata, acuta, parum concava, tota patentissima, stellata. Filamenta petalis duplo breviora, alba, subulata, alterna basi brevissime auriculata. Antherae oblongae, utrinque bifidae, obtusae, incumbentes, sulfureae. Germen oblongum, triquetrum, viride. Stylus albus. *Jacq.* Bracteae nunc longitudine pedunculi, nunc pedunculo duplo breviores. *Willd.* In *Prom. b. spei.* 4.

14. **O. latifolium*; racemo longissimo; filamentis subulatis, pedunculis (patientissimis) flore multoties longioribus; foliis lanceolatis. *Willd. Spec. II. p. 119. Linn. Spec. 440. Suppl. 200. Mill. dict. n. 3. Jacq. Coll. 2. p. 318. ic. rar. II. t. 424. Gawl. Bot. Mag. 876. O maximum Clus. Hist. app. 57. O. v. Lil. alexandrinum Swerts Floril. 58. Park. parad. 155. t. 137. f. 2. STELLARIS latifolia Mönch.*
Folia radicalia pedalia, pollicis transversae latitudine. Scapus $1\frac{1}{2}$ ped., teres, viridis. Pedunculi pollicis transversae longitudine, bracteis vix longiores. Flos utrinque albissimus. Petala lanceo-

* lata, patentia. Filamenta erecta, lanceolata, petalis dimidio breviora, alba. Antherae flavae. Germen virescens. Stylus simplex, albus. Stigma simplex. *Linn.* Bulbus tunicatus, subrotundus, 2 unc. in diametro (albus). Folia plura, 1½ ped., 2 unc. lata, erecta, acutiuscula, plerumque canaliculata, striatula, cum suffusa flavedine virentia, sub florescentia jam emarcescentia. Scapus calamo crassior, erectus, glaber, cum racemo 2-4½ ped.. Racemus in scapis longioribus 2-ped. et ultra, (primum conicus). Bracteae subulatae, acutae, breves, (albido-fuscae). Pedicelli 2-(3) poll., florentes patentissimi, fructescentes erecti, sparsi, numerosissimi. Flores inodori. Petala utrinque lactea sine macula, (lanceolata, ½ poll.) acuta, patentissima, 3 paulo angustiora. Filamenta omnia lanceolato-subulata, acuta, plana. Antherae oblongae, incumbentes, flavae. Germen flavescens. Stylus albidus (germine brevior). Capsula pyramidalis, trisulcata. Semina plura, atra, subrotunda vel oblonga vel angulata. *Jacq.* In Arabia, Aegypto. 4.

15. **O. pyramidale*; racemo conico; floribus numerosis, adscendentibus; petalis elliptico-oblongis, planis, (albis striâ dorsali virescente); staminibus lanceolatis, aequalibus; stylo brevissimo. *Ait. Hew.* ed. 1. 1. p. 441. ed. 2. II. p. 259. *Willd. Spec.* II. p. 121. *O.* racemo conico; flor. num. adscendentibus. *Linn. Spec.* p. 441. *Mill. Dict.* n. 2. *Jacq. Collect.* II. p. 517. *ic. rar.* t. 425. *Poir. Enc.* IV. p. 614. *Red. Lil.* 422. *Rudb. Elys.* 2. p. 154. f. 4. *Besl. Eyst. vern.* 5. t. 14. f. 2.

Bulbus subrotundus, tunicatus, (fuscescens) 2 unc. diam.. Folia (1-) 2 ped. et ultra, ½ poll. (-10 lin.) lata, ensiformia, canaliculata, acuta, glauco- (vel flavescenti-) viridia, recurvata, striatula, plura. Scapus nudus, rectus, cylindricus, crassitie calami, rore glauco, (2-) 3 ped. cum racemo, infra racemum vix ped.. (Racemus 8-12 poll..) Bracteae lanceolatae, acutae, breves, (5-7 lin.). Pedunculi floriferi patentissimi, fructiferi erectiusculi, (glabri, 2 fere poll.). Petala intus lactea, extus viridia (vel flavescencia) marginibus lacteis, obtusula, patentissima, alterna paulo angustiora. Filamenta late lanceolato-acuminata, plana. Antherae oblongae, flavescens. Germen luteum, (trigonum, nitidum). Stylus albus. Caps. oblonga. Sem. plura, atra, angulata, punctata. *Jacq.* Ab affinibus stylobrevissimo distinguendum. *Link.* In Europa australi; in collibus Lusitaniae *Linn.* et *Poir.*; sed non occurrere in Lusitania *Link.* 4.

16. **O. narbonense*; racemo oblongo; filamentis lanceolatis, membranaceis; pedunculis floribusque patentibus. *Linn. Amön. Acad.* IV. p. 512. *Spec.* p. 440., quo teste: *O. spicat. majus fl. alb.* *Bauh. Pin.* 70. *O. narbonense* *Dodon. Pempt.* 222. *Linn. Mant.* 364. *Willd. Spec.* II. p. 118. quo teste: *Pall. it.* 5. p. 654. et *Gouan ill.* 26. Nobis hujus loci videntur: *Poir. Enc.* IV. p. 614. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 216. *Savi Bot. Etr.* 2. p. 215. *Tenor. Fl. neap.* p. 178. *Seb. et Maur. Prodr.* p. 127. *Bertol. Amön. it.* p. 143. (partim,) *M. a Bieb. Fl. taur. catc.* 1. p. 276. *O. fol. linearibus scapo dimidio brevioribus; racemo elongato; filamen-*

tis aequalibus; petalis alternis 3-dentatis pedunculisque patentissimis. *Bot. Mag.* 2510.? *O. lacteum*; racemo oblongo; filam. lanceolatis; petalis alternatim apice glandulosis. *Vill. Delph.* II. p. 272. (a *Dec.* et *Poir.* cum? ad *pyrenaicum* ductum). *Scilla montana Savi due Cent.* p. 89.

„Vix diversum ab *O. pyrenaico* *Gerard, Mygind.*“ *Linn. Mant.* I. c. In *Galliae australis et Italiae (Sibiniaequae) agris.* 4-

Obs. Species dubia et forte ab *O. pyrenaico* non satis distincta. Specimina nostra italica gallicaque non differunt ab *O. pyrenaico* *L., Smith, Jacq.* nisi staturâ majore; foliis longioribus et paulo latioribus, (4-8 lin. latis); racemis longioribus; pedunculis crassioribus longioribusque, post florescentiam nec tam arcte appressis; floribus $\frac{1}{3}$ majoribus magisque albis vel lacteis; petalis interioribus apice latioribus et obsolete emarginatis, nec tamen tam evidenter tridentatis, quam in icone *Bot. Mag.* Descriptio plantae cultae in *Bot. Mag.* I. c. (ubi *Linn., Willd., Lam.* et *Dec.*, nullis exclusis synonymis, et praetera *M. a Bieberstein, Fl. taur. cauc., Dod. Pempt.* 222. et *O. majus* *H. Clus. Hist.* quoad descriptionem, synonyma dicuntur) data, sequens: „folia canaliculata (nec plana ut in *M. a Bieberstein*) apice marcescentia. Scapus teres, erectus, pallide viridis, foliis duplo longior, multi-saepe 100-florus. Bracteae lanceolatae, parvae, pedunculo maturo fructu erecto quintuplo breviores. Petala intus alba, dorso striâ mediâ viridi, filamentis basi dilatatis duplo longiora. Antherae ovatae, versatiles, flavae. Germen obtuse triangulare, flavum. Stylus staminibus brevior, truncatus. Differt a *stachyoide*: staminibus omnibus aequalibus; a *pyrenaico*: scapo brevior; pedunculis longioribus; floribus nullibi flavescentibus; stylo staminibus brevior.“ Laudatus huc *Brotero Fl. lusit.* p. 532. sub *narbonensi* tam hoc, quam *O. pyrenaicum* et *stachyoides* descripsisse videtur, tum ait: „planta in nostris collibus nimis magnitudine partium varians. Folia canaliculata, patula, ultra $\frac{1}{2}$ poll. lata, scapo breviora, aut ejusdem in umbrosis longitudine. Scapus $1\frac{1}{2}$ -3 ped.; flores semper numerosi, 50 et ultra; bracteae ad pedunculos solitariae, non amplexicaules, acuminatae, albido-virides, pedunculis aequales, nunc et saepius breviores. Petala subplana, sublanceolata, candida, subtus viridia soloque margine alba. Pedunculi floriferi patentes aequales; fructiferi scapo approximati. — Occurrit simul cum isto in humidiusculis et frigidioribus varietas omni habitu similis; sed petalis sulfureis aut flavescentibus, longitudinaliter concavis, apice vix latioribus: haec pro *O. pyrenaico* habetur, „(videtur *sulfureum*)“ sed folia angustissima, vix palmaria, pro distinctione a clo *Gouan* assignata, saepe desunt et saepe sunt praecedentis illis simillima, unde cum clo *Gerardo* et *Mygindo* varietatem esse praecedentis.“ — *O. lacteum* *Vill., a Decandolle et Poir.* cum? ad *pyrenaicum* ductum, nobis potius hujus esse loci videtur cum *Villars*, qui ipse „an *O. narbonense*“ quaerit, scapum teretem viridem 3 ped.; folia albida, $\frac{1}{2}$ poll. lata, mollia, flaccida; spicam primum inclinatam, serius erectam e floribus circiter 20 niveis; pedunculos 2 poll., patentes, bractea longiores; petala alba, patentia: 3 exteriora utrinque glandulâ viridi terminata; stamina petalis dimidio breviora descripsisset. — Div. *M. a Bieberstein* *O. narbonensi* suo tribuit: folia digitum lata, flores ad 100, petalis albis, dorso viridibus, trinerviis; bracteas pedunculis breviores; pedunculos florentes patulos, fructiferos erectos, quae omnia satis bene quadrant in plantam italicam. Specimina *O. narbonensis* e Sibiria a *Pallas* lecta, quae in herb. *Schreber.* vidimus differre videntur tam a planta a *Bieberstein* descripta, quam ab illa in *Bot. Mag.* depicta et ab italica; magis vero in eadem quadrat nimis brevis diagnosis *O. narbonensis* a *Linnaeo* data. In hisce speciminibus bulbus ovatus, albidus, fere poll. Scapus erectus, teres, glaber, crassitie pennae anatinae, 8-12 poll. Folia radicalia 3-4, sub florescentia apice jam emarcescentia, scapo breviora, suberecta, linearia, canaliculata, acuta, ut videtur rore glaucescenti, 6-8 poll., $1\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{4}$ lin. lata. Racemus erectus, oblongus, 2-5 poll., semper rarior quam in *pyrenaico* et *stachyoide*. Pedunculi floriferi fere patentes, serius et postea vero adscendentes, teretiusculi, 4-8 lin. Bracteae interne ovatae, concavae, semiamplexantes, dein in acumen longum attenuatae, membranaceae, albidae, dorso nervis aliquot fusciscentibus, pedunculos aequantes vel duplo breviores. Petala subaequalia, patentia, elliptico-oblonga, albidâ, insiccis dorso fusciscenti crassiori carinata, obtusiuscula vel acumine minuto, callosa, sub lente puberula, persistentia et dein apice in acumen contracta, 4-5 lin., 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata. Stamina petalis $\frac{1}{3}$ breviora, subaequalia; filamenta alba, subulata, inferne minus dilatata quam in *pyrenaico*, erecta; antherae ovatae, basi emarginatae, flavae, $\frac{3}{4}$ lin. Germen subrotundo-ovatum, trigonum, trisulcum, obtusum. Stylus stamina aequans vel paulo superans, filiformis, albus. Stigma minutum, obtusum.

17. **O. pyrenaicum*; racemo longissimo; filamentis omnibus dilatatis, (subaequalibus); pedunculis floriferis patentibus aequalibus, fructiferis erectis, seapo adpressis; (petalis albis, dorso virescentibus; foliis synanthiis). *Smith Engl. Flor.* p. 145. *Fl. brit.* p. 363. *Engl. Bot.* t. 499. *Prodr. Fl. graec.* p. 251. et fide *Smith in Engl. Fl.*; *Linn. Spec.* 440. (excl. syn. *Ren.*) *Jacq. austr.* 103. *O. angustif. maj.*; flor. ex albo virentibus. *Bauh. Pin.* 70.; *Rudb. Elys.* 2. 154. f. 5. *O. majus* I. *Clus. Hist.* 1. 187., *O. pyrenaicum* *Clus. Cur. post.* 21.; *Asphod. bulbosus.* *Dod. Pempt.* 209. f.; *Ger. Emac.* 97.; *Dalech. Hist.* 1589.; *Bauh. Hist.* 2. 627. f.; *Hall. Hist.* 2. 101. (excl. syn. *Ren.*). *O. racemo longissimo; petal. linearibus, obtusis; filam. lanceolatis, aequalibus; stylo longitudine staminum.* *Ait. Kew.* 1. p. 441. ed. 2. II. p. 258. (quatenus *Engl. Bot.* laudat.) *Willd. Spec.* II. p. 16. *Red. Lil.* 254. (fid. *H. Kew.* et quoad iconem). *Desf. Fl. Atl.* p. 295? (excl. saltem syn. *Ren.*) *Lam. et Dec. Fl. fr.* II. p. 216. (excl. β .) *Poir. in Lam. Enc.* IV. p. 117. (excl. *stachyoidi* cum syn.) *Lapeyr. Fl. abr. Pyr.* p. 185. *M. a Bieberst. Fl. taur. cauc.* p. 276? *Mert. et Koch Deutsch. Fl.* II. p. 550. *Roth En. pl. Germ.* I. 2. p. 46. *O. pyrenaicum* A *Tenore Fl. neap.* 177. *O. narbonense*; racemo longissimo; filamentis inferne dilatatis; pedunculis floriferis patentibus, fructiferis strictis; foliis synanthiis. *Bertol. Amön. it.* p. 145. (partim). *O. flavescens* *Lam. Fl. fr.* n. 15. (fid. *Poir.*; nobis potius ad *sulphureum* spectare videtur).

Bulbus ovatus. Folia radicalia longissima, canaliculata. Scapus teres, subtripedalis, erectus, multiflorus. Flores racemosi, pedicellati, albido-virescentes. Pedunculi vix unciales, sub florescentia patentibus, dein erecti, bractea solitaria lanceolata, acuminata, persistenti ad basin. Petala patentissima, lineari-oblonga. Stamina ad medium usque dilatata, apice subulata. Antherae versatiles. Stigma obtuse triquetrum. *Smith.* Folia linearia, acuta, ex glauco virentia, ad terram reflexa, cito marcescentia; bracteas membranaceas et albidas: petala pallentia, medio notata lineam longitudinali subvirente, oblonga, obtusa, alterna sublinearia: capsulam triquetram notat div. *Jacquin.* In umbrosis sylvaticis *Britanniae, Galliae, Helvetiae, Austriae, Hungariae, Italiae; in collibus apricis Tauriae, in montibus Cretae.* 4.

Obs. III. possessor *Herb. Linnaeani, Smith,* quem in expositione species hujus tantis dubiis pressae acuti sumus, ad *O. pyrenaicum* *Linn.* laudat iconem *Fl. austriac. Jacquini,* contra *Willdenow,* qui plantam *Linnaei* cum *O. pyrenaico* *Gouan* perperam ad *O. stachyoides* traxit, et contra *elm. Bertoloni,* cui *O. pyrenaicum* *Jacq.* et auctor. idem ac *O. narbonense* *Bertoloni* in litt. scribit: „nullus dubito, quin ex *O. pyrenaico, stachyoides* et *narbonensi* *Willd.* duae tantum eruendae species, scilicet *pyrenaicum* nostrum et *narbonense* *Willd.,* ad quod etiam referendam *stachyoides.* Neque in ipso *Smith,* tum in *Fl. brit.* tum in *Prodr. Fl. graec.,* synonymia utriusque speciei probe distincta, cum indubium sit, *O. pyrenaicum* *Jacq.* et *Engl. Bot.* cum *stachyoides* *Renealm* unam eandemque esse plantam, cui folia synanthia et petala supra marginibusque alba, dorso virentia, quod non in *pyrenaico* cujus icone bona haecum videremus.“ Idem in *Amön. ital.* p. 143. in nota ad

suum *O. narbonense*, (ad quod *O. narbonense* Linn., Savi, Dod. Pempt. 222, *O. pyrenaicum* Smith Engl. Bot et Jacq., Scilla montana Savi, *Stachyoides Renealm* (quod bonum dicit) laudat, et sub quo ergo *O. pyrenaicum* et *narbonense* nostrum conjunxisse videtur) monet: *O. pyrenaicum* Linn. loca montana, nec collina aut campestria, habitare, foliis hysteranthiis et floribus sulphureis vel ex viridi lutescentibus, dorso viridioribus gaudere, et *O. majus* v. Clus. Hist. 187. sive *Azaron. bulbosum Galeni Dodon. Pempt. 209* (iconem ob folia synanthia anachronismo laborantem) sistere hocce *O. pyrenaicum* L. Nobis vero Linnæus in *Spec. pl.* 440 et *O. pyrenaicum* Jacq., et *O. stachyoides* et *O. sulfureum* nostrum commutasse videtur; exponimus tamen, auctoritate ill. Smith, *O. pyrenaicum* Jacq. tanquam verum *O. pyrenaicum* L., a quo *O. narbonense* paucis tantum differre videtur; *O. stachyoides* nobis uti Smith, species est propria, Graeciae et Asiae minori tantum indigena, et a Willdenow et Host cum *O. sulfureo* nostro commutata, ad quod *O. pyrenaicum* Bertol. et Gouan et *Ανθηρικον sulfureum* Waldst. et Kit. pertinet. — Redouté, cujus icon satis bene convenit cum illa a Jacquin data, in textu *O. pyrenaicum* et *stachyoides* nequidem instar varietatum sejungit, cum „nec specimina, nec synonyma uni alterive certe apponenda ex inconstantia characterum Aitoni.“

18. *O. stachyoides* Ait.; racemo longissimo; (pedunculis flore bracteave vix longioribus); petalis lanceolato-oblongis, (albidis, viridi-carinatis); filamentis late lanceolatis: alternis dimidio (paulo tantum) brevioribus; (foliis synanthiis, anguste lineari-lanceolatis.) Ait. Kew. ed. 1. p. 441. ed. 2. II. p. 259. Willd. Spec. II. p. 116. (excl. omn. synonym. praeter H. Kew. et Ren.) Smith Prodr. Fl. Graec. p. 251. *Stachyoides Renealm.* t. 90. (fid. h. Kew, see. Smith media.) *O. majus spicatum* alterum. Tournef. Inst. 579.

Folia radicalia, 3-4, basin scapi vaginantia, inferne erectiuscula, superne flaccida et florente planta apice emarcida, scapum subaequantia, valde canaliculata, longe attenuata et acuta, parum striata, glauca, 10-12 poll., 1½-2 lin. lata. Scapus teres, simplicissimus, erectus, glaucus, 10-14-poll., crassitie pennae gallinae. Racemus 2-7 poll., satis densus, strictus, vel ante florescentiam apice cernuus, 20-50-florus. Pedicelli teretes, glauci, floriferi erecto-patentes, nec patentissimi, ut in *pyrenaico* et *sulfureo*, 3-4½ lin., fructiferi stricti, scapo appressi, 6 lin. Bractea e basi concava lanceolata longa acuminatae, membranaceae, albidae, dorso virescentes, primum pedicellos superantes, serius iisdem paulo breviores, 4 lin. Cor. 6-7 lin. diam.; petala subaequalia, lineari-oblonga, obtusa, apice calloso sub lente puberulo, albida, dorso fascia longitudinali viridi, praesertim in exterioribus, quae basi magis gibba, 4 lin., fere lin. lata. Filamenta corollae 4/3 breviora, alterna paulo, sed vix dimidio, breviora, ultra medium in membranam albidam ovatam, basi quidquam attenuatam dilatata, superne in subulam brevem terminata. Antherae oblongae, obtusae, basi sagittato-emarginatae, pallide flavae. Stylus stamina paulo superans, subulatus. Stigma subulatum, obtusum. Germen sat magnum, ovatum, obtuse trigonum. Differt ab *O. pyrenaico*: habitu strictiore; pedicellis brevioribus, floriferis multo magis erectis; petalis fascia dorsali evidentiore; filamentis alternis paulo brevioribus; iisdem characteribus et florum colore differt etiam ab *O. sulfureo*. Ad specimina a D. Fleischer prope Smyrnam lecta. In insulis Graeciae vulgaris, tum in agro laconico et byzantino: Sibth; in Asia minore. 4.

19. *O. sulfureum*; racemo longo; pedunculis flore brac-

teave longioribus, floriferis patulis, fructiferis erectiusculis; petalis oblongo-linearibus, (sulfureis); filamentis dilatatis, subaequalibus; foliis hysternanthiis. *Bertol. Amön. it. p. 555.* (excl. syn. *Linn.*) et p. 145. *Seb. et Mauri Prodr. Fl. rom. p. 127.* (excl. syn. plur.) *O. pyrenaicum* β *Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 216.* (excl. syn. *Linn.*) *O. pyrenaicum sulfureum* *Rochei* *Herb.* *O. stachyoides* *Host Fl. austr. 1. p. 432.* (excl. syn. *H. Kew. et Bauh.*) ANTHERICUM sulfureum; fol. lanceolato-linearibus, canaliculatis, apice obtuso concavis; scaporacemoque simplicissimo; corollis patentissimis. *Waldst. et Kit. pl. rar. hung. t. 95.* *Schult. Oest. Fl. 1. p. 557.* *Roth Enum. pl. germ. 1. 2. p. 50.* *Willd. Enum. p. 371.* *Sprengel S. Veg. 2. p. 85.* *Bot. Mag. 2625.* PHALANGIUM sulfureum *Poir. Enc. Suppl. IV. p. 581.* SCILLA sylvestris *Savi d. cent. p. 88.* (fid. *Mauri*).

Apud *Gouan* l. c., qui *Rudbeck Elys. t. 136* bonam dicit et praeterea *Clus. hist. 187. Cur. post. 40.* *Hall. 1210* (ab aliis ad *pyrenaicum* ductos) laudat, et quem *Willdenow* ad *stachyoides* duxit: „scapus fere 3 ped.; stipulae solitariae, non amplexicaules (contra *Haller*) valde caudatae, pedicellorum longitudine; petala angustissima, concava, apice latiora, ut in icone *Rudbeckii* sulphurea, nervo dorsali virente. Flores 50-60. Stamina alterna non latiora, sed alterna tantum breviora. Differt ab *O. narbonensi* fol. vix palmaribus, angustissimis, nec $1\frac{1}{2}$ ped., poll. latis.“ In planta *Kitaibeli* „rad bulbosa, subovata. Folia lanceolato-linearibus, canaliculata, apice obtuso, concavo, 4-6, striata, primum erecta, dein reflexa, longitudine scapi, vix $\frac{1}{2}$ poll. lata. Scapus teres, glaucus, pedalis (-2 ped.). Flores 20 circiter in racemo laxo, simplicissimo, 3-4-poll., sulfurei, patentissimi. Pedunculi floribus quidquam longiores, sub anthesi patentes. Bracteae subulatae, pallidae, membranaceae, longitudine pedicellorum. Petala elliptica, apice fornicata, obtusa. Filamenta subulata, basi dilatata. Caps. triangularis. Sem. nigra, angulosa.“ In montibus et alpinis Galliae, Helvetiae, Italiae, Carnioliae, Banatus. 2.

Obs. Specimina hungarica *Ant. sulfurei* a clo *Rochei* in loco a divo *Kitaibel* indicato lecta, omnino conveniunt cum speciminibus, quae ex Italia et ex Helvetia nomine *O. pyrenaici* accepimus, et quae nobis speciem propriam ab *O. pyrenaico* et *stachyoidi* satis diversam sistere videntur. Conf. Obs. ad *O. pyrenaicum*. In speciminibus nostris *O. sulfurei*: bulbus ovatus, albidus, $1\frac{1}{2}$ poll. Folia hysternanthia, vel forte florente planta jam omnino emarcida, linearibus, fere plana vel parum canaliculata, 12-18 poll., 2-4 lin. lata, glaucescenti-viridia. Scapus $1\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ ped., basi crassitie pennae anserinae. Racemus 3-9 poll., 20-40-florus. Pedunculi graciles, teretes, primum bracteas aequantes 4-5 lin., serius 12-15 lin., floriferi patentissimi, fructiferi erectiusculi, sed non tam arcte appressi quam in *pyrenaico* et *stachyoidi*. Bracteae e basi concava ovato-lanceolata longe acuminatae, albidae vel pallide fuscescentes, 4-6 lin. Cor. 8-9 lin. diam.; petala virescenti-sulfurea, extus dorso magis viridia, oblongo-linearibus, apice callosa et sub lente fimbriata, 4-5 lin., 5 lin. lata, deflorata cito marginibus involuta et inde angustiora. Filamenta subaequalia, vel alterna subinde paululo breviora, corollae $\frac{1}{3}$ vel duplo fere breviora. Antherae oblongae, utrinque obtusae, nec basi subsagittato-emarginatae, ut in *pyrenaico* et *stachyoidi*, medio dorsi affixae, flavae. Stylus longitudine staminum, subulatus. Stigma obtusum, obsolete capitatum. Caps. rotundato-ovata, angulis 3 obtusis, 6 sulcis, 3 lin. longa lataque. Reliqua uti apud *Kitaibel*. Plures praeter *clm. Bertoloni* auctores hanc plantam pro *O. pyrenaico* habuisse videntur.

20. *O. trigynum* *Rédouté*; foliis linearibus; racemo cylindrico, elongato; floribus trigynis. *Rédout. Lil.* 417.

Bulbus subrotundus, leviter depressus, magnitudine fructus Pruni armeniacaе, tunicatus, pallide cinereus; fibris radicalibus brevibus numerosis. Folia linearia, acuta, canaliculata, glabra, integra, mollia, decumbentia, 11-15 poll., 9-13 lin. lata, sub florescentia jam emarcida. Scapus 22-30 poll., simplex, teres, laevis, glaucus, erectus, crassitie digiti minimi. Racemus cylindricus, multiflorus, elongatus, basi laxis, superne densus. Pedicelli $4\frac{1}{2}$ -9 lin. semipatentes; bracteae foliaceae, lineari-lanceolatae, acutae, pedicellos paulo superantes. Cor. lacinae oblongae, obtusae, basi angustatae, quidquam canaliculatae, intus albidae, extus pallide virides marginibus albidis; exteriores apice intus puberulae; interiores minores angustiores, supra longitudinaliter striatae. Stamina corollam duplo breviora. Filamenta alba basi dilatata, superne attenuata, 3 paulo angustiora. Antherae ovatae, albidae, medio affixae, basi emarginatae. Germen liberum, ovatum, subtrigonum, pallide viride, nitidum. Styli 3 filiformes, albidi, staminibus breviores, ad basin usque distincti. Stigmata simplicia. Habitus *O. pyrenaici*, sed stylis 3, corollae laciniis latioribus, albidis abunde diversum. *Rédouté*. Habitat? *Hort. Paris.* 4.

21. *O. caudatum* *Ait.*; foliis lanceolato-linearibus, (canaliculatis, caudato-acuminatis); racemo longissimo; (bracteis pedunculosis subaequantibus); corollis patentibus; staminibus dilatatis; alternis cuneiformibus. *Ait. Fiew.* ed. 1. p. 442. ed. 2. II. p. 261. *Jacq. Coll.* 2. p. 515. *ic. rar.* II. t. 425. *Willd. Spec.* II. p. 125. *Bot. Mag.* 805. *O. Massoni* *Gmel. S. N.* 1. p. 551. β fol. variegatis.

Tota glabra. Folia $1\frac{1}{2}$ ped., $1\frac{1}{2}$ poll. lata. Scapus teres, 3 ped., (crassitie digiti minimi). Racemus $1\frac{1}{2}$ ped. Pedunculi sparsi, sub anthesi patentes, vix unciales, (5-10 lin.). Bracteae lanceolatae, subulatae, longitudine pedunculorum, membranaceae. Petala semuncialia, (4-5 lin., $1-1\frac{1}{2}$ lin. lata), alba, vittâ longitudinali viridi. Filamenta petalis breviora, alba. Stylus triquetus, albus, longitudine staminum. *H. Kew. ed. 2. l. c.* Bulbus magnitudine pugni, subrotundo-ovatus, albidus, extra terram prominens, ex filis lateralibus facile rumpendis bulbillos emittens. Folia canaliculata, nitida, crassa, reflexa, 2-5 ped., unc. lata, in bulbis junioribus breviora angustioraque; superne in caudam teretem, subulatam, acutam, $\frac{1}{2}$ ped., marcescentem et in foliis adultis deciduam abeuntia; in bulbis junioribus mere subulata. Scapus crassitie calami, erectus, viridis. Bracteae albidae scariosae, pedunculis patentibus duplo breviores. Flores suaveolentes, odore prunorum. Petala obtusa, patentissima, crassiuscula, utrinque virentia, marginibus lacteis; alterna paulo breviora angustioraque. Filamenta omnia plana e basi lata, 3 latiora. Antherae ochroleucae. Capsula subovata, obtusa, 3-sulcata. Sem. pauca. *Jacq.* Bulbus virens, magnitudine saepius capitis infantis. Corollae lacinae apice subincrassatae, lanceolato-oblongae, $\frac{1}{2}$ poll.; 3 interiores apicibus subinvolutis. *G. A. Poiret* cum? jungitur cum *O. longibracteato*. *In Prom. b. spei. ad fluvium Sea-Cow River ad radices arborum putridas.* 4.

22. *O. longebracteatum* Jacq.; foliis lanceolato - ensiformibus, (attenuato - acuminatis); racemo longissimo; bracteis pedunculis fere duplo longioribus; (filamentis subulatis, basi dilatatis). *Murr. Syst.* 327. *Jacq. Hort. vind. t.* 29. *Willd. Spec. II.* p. 120. *Redout. Lil. t.* 119. *Trattin. tabul.* 725. *O. bracteatum* Thunb. *Prodr.* p. 62. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 514.

Spontaneae apud *Thunberg*: Folia apice attenuato - acuminata, integra, glabra, unguem lata, 2 - ped. Scapus teres, erectus, glaber, 2 ped. Racemus erectus, sensim florens, spithamaeus vel ultra. Pedunculi inferiores longiores, remotiores, poll.; superiores approximati, sensim breviores, ultimi vix unguiculares. Bracteae lanceolato - setaceae, supremis floribus duplo longioribus. Cor. alba, petalis dorso viridibus. In culta apud *Jacquin l. c.* Bulbus ovatus, albidus, squamis dense compactis, ovi mole. Folia $1\frac{1}{2}$ ped., $1\frac{1}{2}$ poll. lata, nitida, acuta, lacte virentia, erecto - patula, crassula. Scapus digitum crassus, 2 - ped. Racemus densus, conicus, paulatim solutus in racemum laxum, cylindricum, fere pedalem. Bracteae ad pedunculos omnes laxae, pallide virentes, subulatae, inferiores 4 poll., superiores successive breviores, ultra gemmas florum in racemo conico extantes. Pedunculi numerosi, 2 poll., in flore patentissimi, dein magis erecti. Petala ovalia, alba, extus lineam media virente, obtusiuscula, patentissima. Filamenta omnia aequalia, simplicia, subulata, inferne compressa, latiora, patula, petalis breviora, alba. Antherae oblongae, flavae. Pistillum virens. *Jacq. l. c.* Apud *Redouté* folia ejusdem dimensionis, sed canaliculata dicuntur; scapus 3 - ped.; pedunculi poll.; bractea medio viridis, margine alba; caps. rotundata, obsolete trigona; semina numerosa, angulosa. *In Prom. b. spei.* 4.

23. * *O. altissimum*; foliis oblongo - ellipticis, obtusis, glabris; racemo longissimo; bracteis setaceis. *Thunb. prodr.* 52. *Fl. cap. ed. nostr.* p. 515. *Linn. Suppl.* 199. *Willd. Spec. II.* p. 119. *O. giganteum*; filamentis sublanceolatis; foliis linearilanceolatis, apice connivente mucronatis, scapo racemoque longissimis, bracteis subulatis, brevibus. *Jacq. Hort. Schönbr. l.* p. 45. t. 87. *DRIMIA altissima* *Bot. Mag.* 1074. *Scilla africana* *Commel. Hort.* p. 187. t. 94.?

Spontaneae apud *Thunberg*: „bulbus tunicatus, magnitudine capitis infantis, albus. Folia radicalia, pauca, integra, glabra, ped., $1\frac{1}{2}$ poll. lata. Scapus simplex, flexuoso - erectus, teres, glaber, viridis, 3 - ped. et ultra. Flores racemosi, remoti, patententes. Pedunculi capillares: inferiores longiores, $\frac{1}{2}$ poll., patententes; superiores breviores, contracti. Bractea vix longitudine pedunculorum.“ In culta apud *Gawler* bulbus depressoglobosus, tunicato - squamosus, (ex pallide flavo fuscoque sordens); squamis latissimis, fuscis, arctissime conjunctis. Folia hysteranthia, $1\frac{1}{2}$ ped., 2 poll. lata, lorato - lanceolata, tenuiter nervoso - striata, convoluta - mucronata. Scapus strictus instar baculi, glaucus, vix attenuatus, crassitie digiti, cum rhachi 4 - 5 - ped. Racemus cylindricus, apice attenuatus, fere 2 ped. Pedicelli filiformes, rectangulo patententes, corollam breviores, (pal-

lide purpurascens, $\frac{1}{2}$ unc.). Bractee membranaceae, dimidio superiore primum uncinatim introrsum duplicatae, demum reflexae. Cor. hypocrateriformi-campanulata, $\frac{3}{4}$ poll., flavescens-alba, inodora: lacinae fere ad basin usque divisae, lineari-oblongae, obtusae, aequales, tertia parte longitudinis in cylindrum convergentes, supra rotato-patentes et subincurvae, convoluto-concavae, extus carinato-convexae stria viridi (purpurascens, alternae paulo angustiores. *Jacq.*) Filamenta laciniis $\frac{1}{3}$ breviora, erecta, fasciculatim convergentia; antherae magnae, primum virides, dein flavae. Germen viride, oblongo-pyramidatum, subtriquetrum, tuberculatum, stylo corollam aequante vel vix superante, subclavato-filiformi, triquetro, erecto-subcurvato. Stigma trigono-subcapitatum, vix conspicuum, glanduloso-pubescent. *In Promont b. spei; in arenosis Swartland. Ecklon. 4.*

24. *O. scilloides Jacq.*; racemis longissimis, cylindricis; (bracteis setaceis, pedunculis paulo superantibus); filamentis subulatis; foliis subensiformibus, apice caudatis. *Jacq. H. Schönbr. 1. p. 46. t. 88. Willd. Spec. II. p. 119. Cavan. descr. p. 125. Link Enum. 1. p. 326.*

Bulbus ovatus, crassitie pugni, tunicatus, sordide virescens. Folia radicalia plura, basi concava mutuo amplexantia, dein planiuscula, 1-2 ped., $\frac{1}{2}$ -2 unc. lata, apice subulato brevi, vel breviter caudata, striata, crassa, firma, erecta, superne patula. Scapi plures successivi, teretes, crassitie calami, nonnihil striati, virides, erecti, ad flores usque 2 ped.. Racemus $1\frac{1}{3}$ ped., densus, erectus. Bractee setaceae, petiolis paulo longiores. Flores inodori. Petioli $\frac{1}{2}$ unc., patuli. Petala lanceolata, acutula, subaequalia, plana, in stellam expansa, alba, utrinque fascia media longitudinali viridi. Filamenta e basi dilatata subulata, plana, aequalia, erectiuscula, petalis breviora. Antherae oblongae, incumbentes, sordide ochroleuae. Germen ovatum, triquetrum. Stylus albus. Stigma trilobo-capitatum, papillosum, ochroleucum. Caps. ovata. Sem. plura, oblonga. *Jacq. In Prom. b. spei. 4.*

25. *O. prasinum Bot. Reg.*; foliis glauciusculis, supra tortis, (scapo brevioribus); racemo divaricato, longe pedunculato; (pedunculis bractea longioribus; petalis oblongis, obtusis); filamentis basi ovatis; stylo germine longiore. *Bot. Reg. 158.*

Bulbus ovatus, integumentis subfuscis. Folia plurima (4-9) erecto-patentia, subpedalia, lorato-attenuata, involuto-concava, cuspidata. Scapus glauciusculus, foliis longior, teres. Racemus oblongus, rarus, pedunculis rigidis, fere horizontalibus, corollam 2-5 plo longioribus: bractea ad basin lanceolato-lineari. Corolla stellato-patens, horizontem respiciens, pollicis fere diametro, glauco-virens, inodora: lacinae subaequales, oblongae, obtusae, vix 2 lin. latae; exteriores parum latiores, concaviusculae, apice inflexae; interiores planiores, apice glandulose albicantes, basi margine utrinque deflexae. Filamenta laciniis $\frac{1}{3}$ breviora, alba, plana, alterna basi latiora; antherae breves, luteae. Germen virens, ellipticum, trilobum, lobo singulo dorso striato, nervoque in sulco singulo prominulo. Stylus setaceus, germine

longior, albus, stigmatе pubescente, stamina superante. *B. Reg.* In *Prom. b. spei prope Graaf Reynett.* 4.

26. *O. pilosum* Thunb.; foliis lineari-ensiformibus, ciliatis, (scapo brevioribus); floribus racemosis; pedunculis incurvis, (bracteas superantibus.) *Linn. Suppl.* 199. *Thunb. prod.* 61. *Fl. cap. ed. nostr. p.* 315. *Hornem. h. hafn. Suppl.* p. 41.

Folia radicalia 3 v. 4, glabra, erecta, scapo breviora, digitalia. Scapus unicus, raro 2, simplex, teres, flexuoso-erectus, glaber, spithamacus. Flores erecti, plurimi, albi. Racemus palmaris. Bracteae lanceolatae, pedunculis breviores. Pedunculi filiformes, patulo-erecti, inferiores longiores, poll., superiores sensim breviores, ultimi unguiculares. Corollae albae. *Thunb. In campis arenosis Prom. b. spei.* 4.

27. *O. fuscatum* Jacq.; filamentis lanceolatis, tribus latioribus; racemo oblongo; foliis paucis, lineari-cuneiformibus, scapo triplo brevioribus; capsulis alato-trilobis. *Jacq. Coll. Suppl.* 80. *ic. rar. 2. t.* 429. *Willd. Spec. II. p.* 122.

Bulbus subrotundus, avellanâ major, tunicâ fuscâ. Folia pluscula, integerrima, acutula, superne latescentia, crassula, plus minus 4 poll., 4 fere lin. lata, nitida, reclinata. Scapus teres, simplex, crassitie pennae columbinae, flexuosus, erectus, e fusco cinerascens, $\frac{1}{2}$ ped., desinens in racemum laxum, 3-5 poll. Pedicelli $\frac{1}{2}$ poll., erectiusculi, e fusco pallentes; bracteis lanceolato-acuminatis, fere duplo brevioribus, concoloribus cum oris inferne albidis. Flores inodori. Petala oblonga, obtusa, subaequalia, patentissima, e rubello fuscescencia fasciâ mediâ utrinque viridi. Filamenta subulata, plana, erecta, petalis breviora, alba, 3 alterna multo latiora. Antherae sordide ochroleucae, polline flavo. Germen subrotundum, profunde trilobum. Stylus filiformis, trisuleus, erectus, albus, longitudine staminum. Stigma capitatum, subtrifidum, papillosum. Caps. triloba, obtusissima, basi angustata, fuscescens. Semina pauca, rugosa, scabra, nigra. *Jacq. In Promont. b. spei.* 4.

28. *O. odoratum* Jacq.; foliis lanceolato-linearibus, superne planis, humi prostratis, (scapo brevioribus); racemo longo; (bracteis pedicello brevioribus); filamentis lanceolatis. *Jacq. Coll. Suppl.* 78. *ic. II. t.* 452. *Willd. Spec. II. p.* 121. *Andr. Rep. t.* 260. *Trattin. Tabul. t.* 724.

Bulbus tunicatus, extus fuscescens, ovato-subrotundus, diametri 2 poll.. Folia radicalia pluscula, acuta, integerrima, inferno canaliculata, crassula, $\frac{1}{2}$ ped.. Scapus teres, superne angulatus, erectus, calamum fere crassus, viridis, cum racemo fere 2-ped.. Bracteae lanceolatae, acutae, pollicares. Pedicelli fere 15, distantes, $1\frac{1}{2}$ poll., patuli. Flores colore, structurâ, magnitudine, odore simillimi *O. suaveolenti*, ut fere inde videantur decerpti. *Jacq. In Prom. b. spei.* 4.

29. *O. suaveolens* Jacq.; foliis linearibus, canaliculatis, longitudine scapi; racemo brevi; (bracteis pedunculos aequantibus; petalis oblongis, obtusis); filamentis lanceolatis. *Jacq.*

Coll. 2. p. 316. *ic. rar.* 2. t. 431. *Willd. Spec.* II. p. 122.
(excl. syn. *O. albucoidis Thunb.*)

Totum glabrum. Bulbus subrotundus, albus. Folia radicalia pauca, sublinearia, acuta, integerrima, carnosula, longitudine fere scapi, basi erecta, caeterum flaccida. Scapus ped. et ultra, teres, erectus, superne plus minus flexuosus, purpureo-fuscus, apice laxe racemosus et circiter 5-florus. Spathae anguste lanceolatae, acutae, longitudine pedunculorum, colore scapi. Flores suaveolentes. Petala oblonga, obtusa, planiuscula, tota patentissima, utrinque viridia marginibus flavis, alterna angustiora. Filamenta omnia compresso-plana, lanceolata, aequalia, erecta, petalis breviora, albido-virentia. Antherae incumbentes, flavae. Germen triquetrum, viride. Stylus filiformis, erectus, staminibus paulo longior. Stigma capitatum, subtrifidum hirsutum. *Jacq.* *In Prom. b. spei.*; *inter saxa am Löwenkopfe Ecklon.* 4.

50. *O. polyphyllum Jacq.*; foliis plurimis subulatis, semiteretibus, (scapo brevioribus); racemo brevi; (petalis linearibus, obtusis, apice calloso-inflexis); filamentis lanceolatis. *Jacq. Coll. Suppl.* 79. *ic. rar.* II. t. 450. *Willd. Spec.* II. p. 125.

Bulbus ovatus, fuscescens. Folia radicalia numerosa, e basi latiuscula linearia, acuta, integerrima, carnosula, subtus teretia, antice subcanaliculata, erectiuscula, angusta, 8 fere poll. Scapus unus alterve, teres, foliis crassior, erectus, superne racemosus et angulatus, $1\frac{1}{2}$ ped. Bractea lanceolata, acutae, virides, pedicellis patulis, pollicaribus, paulo breviores. Flores 7-10, magnitudine, colore, structurâ *O. suaveolentis.* *Jacq.* *In Promont. b. spei.* 4.

31. *O. barbatum Jacq.*; filamentis foliisque subgeminis subulatis; (racemo paucifloro); petalis tribus alternis apice barbatis. *Jacq. H. Schönbr.* 1. p. 47. t. 91. *Willd. Spec.* II. p. 122.

Bulbus ovato-subrotundus, tunicatus, sordide pallens, avellanâ duplo major, non florens plerumque bifolius, florens unifolius. Folia subcanaliculata, acuta, 5-9 unc., inferne erectiuscula, debilia. Scapus teres, folio crassior, erectus. Racemus laxus circiter 6-florus, erectus. Pedicelli $\frac{1}{2}$ unc., erectiusculi; bractea lanceolata, acuta, sordide purpurascens breviora. Petala oblonga, obtusa, plana, patentissima, flava utrinque cum fascia media viridi; omnia apice callosa, 5 interiora apice fornicata. Filamenta erecta, petalis breviora, flava, basi membranacea dilatata alba et pellucida. Antherae oblongae, incumbentes, fulvae. Germen ovatum, triquetrum, glabrum. Stylus filiformis staminibus paulo longior, flavus. Stigma capitatum, trifidum, muricatum. Caps. ovata, obtusa, glabra. Semina plura, oblonga, compressa, nigra. *Jacq.* *In Promont. bon. spei.* 4.

32. *O. juncifolium Jacq.*; filamentis sublanceolatis; racemo longissimo; foliis subulatis, plurimis. *Jacq. H. Schönbr.* I. p. 46. t. 90.* *Willd. Spec.* II. p. 125.

Bulbus subrotundus, fere 2 unc. in diametro, tunicatus, ex viridi albus. Folia numerosa ex basi lata membranacea albicante

et amplexante, inferne semiteretia, superne teretia, acuta, rigidula, erectiuscula, 8-9 unc.. Scapus unus alterve, teres, gracilis, flexuosus, erectus, debilis, ad flores usque ped.. Racemus ped., superne reclinatus. Flores numerosissimi, inodori. Pedicelli patentissimi, $\frac{1}{2}$ unc.; bracteolâ lanceolatâ brevi. Petala oblonga, albida fasciâ longitudinali mediâ subtus ex purpureo-virente, obtusula, plana, patentissima, 3 alterna paulo latiora et apice callosula. Filamenta erecta, alba, petalis breviora, 5 alterna inferne latiora. Antherae oblongae, incumbentes, flavae. Germen oblongum, triquetrum, nitidum, viride. Stylus crassus, filiformis, erectus, longitudine staminum. Stigma capitatum, trifidum, muricatum. *Jacq. In Promont. bon. spei. 4.*

55. *O. Rudolphi Jacq.*; racemo multifloro; petalis ovalibus, apice glanduloso-callosis; filamentis planis, subaequalibus; corollâ patente; foliis linearibus, canaliculatis. *Jacq. Eclog. p. 51. et p. 151. t. 20. O. rupestre Rudolphi Bem. in Schrad. Journ. 1799. B. II. S. 281. O. tenuifolium; foliis canaliculatis, tenuibus, scapum teretem aequantibus; racemo paucifloro, cylindrico, coarctato; petalis ovatis; filamentis lanceolato-subulatis. Red. Lil. VI. p. 312. t. 312. O. juncifolium Bot. Mag. 972. (sphalmate junceum in Jacquin, in Poir. Enc. Suppl. IV. p. 197. et in Steudel, excl. syn. juncifolii Jacq. et Willd.)*

Bulbus diametro poll. et ultra, tunicâ viridi-fuscâ. Folia e centro bulbi, 5-8, linearia, 1-1 $\frac{1}{2}$ ped., carnosâ, superne teretia, acuta. Scapi e medio foliorum, plures, erecti, folio breviores, pedales et ultra, obsolete ancipites, glabri, rigidi. Flores conferti. Pedunculi alterni, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ poll., patentés, glabri: singuli bracteâ lineari marcescente. Petala patentia, ovalia, alba, plana, persistentia, apice callosa, obtusa, ad lentem fimbriato-glandulosa: carinâ primum viridi, dein rufescente; tria exteriora majora. Filamenta alba, corollâ breviora, basi dilatata, 3 exterioribus paulo latioribus. Germen ovatum, trigonum. Stylus filiformis, albus. Stigma pilis pellucidis. Caps. ovata acuta, 3-valvis, valvulis apice deliscentibus, bifidis, petalis persistentibus tectis. Sem. angulata, nigra. *Jacq. fil. In Promont. b. spei. 4.*

Obs. Descriptio a *Redoute* data discrepat tamen nonnullis: Bulbus subrotundus quidquam depressus, tunicis membranaceis, virescentibus: fibris radicalibus numerosis; basi pedunculis apice bulbiliis ovatis. Folia 6-8, erecta, gracilia, subulata, canaliculata, acuta, glabra, intense viridia, 7 $\frac{1}{2}$ -11 poll. Scapi 1-2, foliorum longitudine, laeves, glabri, teretes, pallide virides. Racemus brevis, teretiusculus, densus. Pedicelli 8-12, erecti, $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ lin., basi bracteâ membranaceâ, subulatâ, ejusdem longitudinis vel paulo longiori. Perianth. laciniae patentés, concavae, ovatae, obtusae, albae, striâ mediâ latâ viridi, exteriores paulo angustiores; omnes apice in labia 2 minutissima divisae et margine pilis glandulosis brevissimis. Stam. longitudine perianthii. Filamenta alba, subulata, basi paulo dilatata. Antherae oblongae, flavae. Germen viride, ovatum, subprismaticum, triangulare, 6 sulcatum. Stylus albus, crassiusculus, longitudine staminum. Stigma trigonum margine fimbriatum. Capsula formae germinis, sulcis tantum 3. Semina 1-3 in quovis loculo, nigra: in loculis 2 plerumque abortiva. In *tenuifolio Red.* folia breviora, racemus magis depauperatus, petala exteriora angustiora. Differre *tenuifolium Red.* a *barbato* numero et consistentiâ foliorum angustorum, canaliculorum, longitudine scaporum; colore florum alborum nervo viridi et pubescentiâ laciniarum ad apicem minore; a *scilloide* et *polyphyllo* racemo brevi denso et parvitate florum; a *nivco* magnitudine, longitudine bractearum et staminum fere

corollae; *Red. l. c.* Clo *Poiret l. c. juncifolium Jacq.*, non vero *Bot. Mag.*, varietas *tenelli* esse videtur. Occurrit in hortis passim nomine *O. rupestris*, *alburoidis Thunb.* et *ANTHERICI alburoidis*. Possidemus etiam specimen *O. alburoidis Thunb.* ex herbario ipsius *Thunberg*, quod omnino idem cum *O. Rudolphi Jacq.* et in quod minime quadrat descriptio *O. alburoidis a Thunberg* in *Flora capensi* data. *Sims* jam olim notavit in *juncifolio* suo, *Jacquinianum juncifolium* haud ita bene quadrare cum suo; folia numerosiora, flores copiosiores, laciniæ corollæ angustiores esse et acutiores in planta *Jacquini*.

34. *O. canaliculatum Lag.*; scapo nudo, teretiusculo; racemo oblongo, submultifloro; bracteis subulatis, pedicello longioribus; foliis linearibus-subulatis, canaliculatis, tandem involuto-junciformibus. *Lagasca gen. et spec. p. 14.*

Colitur sub dio in horto regio *madritensi*. 4.

35. *O. tenellum Jacq.*; foliis linearibus, canaliculatis, (scapo brevioribus); scapo filiformi, laxo racemoso; bracteis pedunculo duplo brevioribus; (petalis acutis); filamentis subulatis, (aequalibus). *Jacq. Coll. 2. p. 516. ic. rar. II. t. 427. Willd. Spec. II. p. 121. (excl. syn. Thunb.)*

Totum glabrum. Bulbus subrotundus, niger, parvus. Folia pauca, angustissima, acuta, scapo breviora. Scapus debilis, gracilis, teres, erectus, pedalis, viridi-fuscus, superne floribus 8-12 laxo racemosus. Bracteae subulatae. Pedunculi graciles, florentes patentissimi, fructigeri magis erecti. Flores inodori. Petala lanceolata, acuta, patentissima, intus lactea, fasciâ mediâ longitudinali subvirente, alterna paulo breviora latioraque. Filamenta omnia subulata, aequalia, alba. Antherae parvae, ochroleucae. Germen oblongum, inferne pallens, superne flavens. Stylus albus. Caps. oblonga. Semina pauca, atra. *Jacq. In Pro. mont. b. spei; in vineis; inter saxa in cacumine Löwenrücken. Ecklon. 4.*

36. **O. rupestre*; foliis filiformibus, carnosissimis, scapo paucifloro (1-5-) (brevis; floribus alternis; bracteis pedunculos aequantibus; petalis obtusis; filamentis alternis latioribus). *Linn. Suppl. 199. Thunb. Prodr. 61. Fl. cap. ed. Schult. p. 313. Willd. Spec. II. p. 123. H. Kew. ed. 2. II. p. 260.*

Bulbus carnosus, albus. Scapus simplex, erectus, teres, glaber, poll.-digitalis. Folia radicalia, 1, 2 vel 3 subcarnosa, dorso convexa, intus basi sulcata, apice plana, glabra, scapo longiora, rarius breviora. Flores in summo scapo pedunculati, 1, 2, 3-5. Bractea ad basin pedunculi, ovata, basi lata, acuta, membranacea, longitudine pedunculi. Pedunculi teretes, erecti, glabri, uniflori, lin.. Petala 3 exteriora alba, carinâ virescente; interiora tota alba, ovata, concava, aequalia, obtusa. Filamenta complanata, basi latiora, apicem versus sensim subulata, corollæ breviora, alba, erecta, intus concava, 3 alterna sesquialtiora. Antherae ovatae, minutae, polline flavo. Stylus nullus. Stigma trigonum, obtusum, flavum. Caps. ovata, acuta, angulis 3 obtusis, sulcatis, glabra. Semina plurima. *Thunb. In muscis summarum rupium, flore albo in Witteklipp, flore flavo in Groene Kloof Prom. b. spei. 4.*

37. *O. graminifolium Thunb.*; foliis linearibus, integris, glabris, (scapo brevioribus); racemo spicato, erecto; (brac-

teis pedunculos paulo superantibus.) *Thunb. Prodr.* 61. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 515.

Folia radicalia, scapo breviora, spithamaea. Scapus teres, erectus, ped.. Racemus ovatus, poll.. Pedunculi vix lin. longi. Cor- albae, carinâ petalorum virescente. Bracteae lanceolatae, apice setaceae, pedunculis paulo longiores. *Thunb.. Div. Willd. cum? ad O. tenellum Jacq. traxit. In Prom. b. spei.* 4.

38. *O. niveum Ait. Kew.*; racemo paucifloro; petalis lanceolatis; foliis filiformibus, canaliculatis, (scapo longiori- bus); filamentis subulatis. *Ait. Kew.* 1. p. 440. ed. 2. II. p. 257. *Willd. Spec.* II. p. 115. *Bot. Reg.* 235. An gra- minifolium *Thunb.?*

Folia glabra, vix digitalia. Scapus foliis brevior. Pedunculi vix $\frac{1}{2}$ poll.. Bracteae oblongae, acuminatae, brevissimae. Petala 4 lin., alba, 3 exteriora carinâ virescente. Filamenta petalis di- midio breviora, alterna sesquialtiora. Antherae flavae. *Ait. l. c.* Bulbus tunicatus, depresso-sphaericus, laevis, virescens, $\frac{3}{4}$ unc. diametro. Folia radicalia pauca, subquaterna, tenacius graminea, nec carnosâ, erecto-recurva, subinde duplo et ultra scapo lon- giora, 2-8 poll., obscure viridia, superne vix setâ crassiora, basi membranaceo-dilatata. Scapus (subinde plures) erectus, quid- quam strictus, 1-5 poll.. Flores racemosi erecti, 2-10, inodori, diametro vix $\frac{2}{3}$ poll.. Bracteae membranaceae, late-ovatae, ca- rinâ fuscâ, abrupte setaceo-cuspidatae, appressae pedicello erecto filiformi, corollâ parum breviori, eoque ipso breviores. Cor. pa- tentissima, laciniis lanceolato-oblongis: 3 exterioribus quidquam latioribus, magisque concavis, dorso carinatis, maculâ viridi ob- longâ: interioribus planis, dorso parcius vel non virentibus. Fi- lamenta alba, plana, corollâ $\frac{1}{3}$ et ultra breviora, erecto-paten- tia, alterna lanceolata, sublongiora, 3 subulata, sesquiangustiora. Antherae oblongae, breves. Germen viridè, oblongum, trisulco- trigonum, angulis rotundatis. Stylus albus, triquetus, erectus, germine quidquam brevior: stigmâ triquetro, puberulo. *Ker. In Prom. b. spei, in rupibus Zwartwater Port.* 4.

39. *O. secundum Jacq.*; filamentis lanceolatis; racemo brevi, secundo; foliis (hysteranthiis) sublinearibus, apice acuto fornicatis, cartilagineo-muricatis, erectis; (petalis oblongis, obtusis, apice villosis; stylo stamîna superante.) *Jacq. Coll. Suppl.* 79. ic. rar. 2. t. 435. *Willd. Spec.* II. p. 122. (excl. syn. *Thunb.*)

Bulbus subrotundus, albidus, tunicatus, magnitudine *Acellanae.* Folia post anthesin plura, erecta, 5-5 poll., sublinearia, $\frac{1}{4}$ poll. lata, leviter canaliculata, utrinque glabra. Scapus teres, gracilis, erectus, glaber, purpurascens, rore glauco tectus, 4-5 poll., racemo terminali 3 poll., subsexfloro, erecto. Pedunculi erecti, 1-flori, graciles, purpurascens, bractea ovato-acumi- natâ, erectâ, brevi, purpureâ, margine inferiore hyalino. Pe- tala oblonga, obtusa, patentissima, apice villosa, intus flava, foris alba, fasciâ utrinque mediâ sordide purpureâ: 5 exteriora callose fornicata. Filamenta subulata, erecta, petalis breviora, compressa, basin versus latiora, virescentia, omnia aequalia. Antherae oblongae, flavae. Germen oblongum, trisulcum, gla-

brum: Stylus filiformis, flavescens, staminibus longior. Stigma penicilliforme, albidum. *Jacq. In Promont. b. spei. 4.*

40. *O. maculatum Thunb.*; foliis lanceolatis, (scapo brevioribus); floribus secundis; petalis (ovatis, obtusis): 3 exterioribus brevioribus fusco - maculatis; (stylo subnullo.) *Thunb. Prodr. 62. Fl. cap. ed. Schult. p. 314.*

Folia radicalia circiter 3, linearia vel lanceolata, attenuato-acuminata, convoluto-concava, integra, glabra, erecta, scapo triplo breviora, poll.-digit.. Scapus teres, subfiliformis, flexuoso-erectus, glaber, spithamaeus. Flores racemosi, solitarii, bini vel 6, erecti. Spatha paulo infra florem, membranacea, ovata, acuta, convoluta. Petala inaequalia, ovata, concava, obtusa, patula, erecta: 3 exteriora paulo breviora, obtusa, carinata, crocea, sub apice maculâ magnâ fuscâ; 3 interiora tota crocea, unguicularia. Filamenta infimâ petalorum basi inserta, erecta, corollâ duplo breviora, alba, subulata, 3 alterna basi dilatata. Stylus o. Stigma triquetrum, marginatum. Capsula ovata, angulis 3 obtusis, trisulca, tristriata, glabra. Semina plurima. *Thunb. In Saldanhabay, Compagnie Post prom. b. spei. 4.*

41. *O. notatum*; foliis lineari-lanceolatis, canaliculatis, scapo longioribus; racemo paucifloro; petalis lanceolatis, (acutis): 3 latioribus sub apice fusco-maculatis; filamentis corollâ duplo brevioribus. *O. maculatum Jacq. Collect. II. p. 558. t. 18. f. 13. Gmel. S. N. 2. p. 550. Poir. Enc. IV. p. 615.*

Totum glabrum et palmare. Bulbus ovato-subrotundus, albus, ex squamis crassis, fungosis totum bulbum ambientibus indivisisque. Folia radicalia plusecula, acuta, erecta, integerrima, carnosula. Scapus erectus, teres. Bractee lanceolatae, concavae, acutae, virides. Pedicelli breves, crassuli. Petala plana, acuta, patentissima, saturate lutea; 3 alterna latiora infra apicem macula unâ alterave fuscâ. Filamenta omnia subulata, erecta, flava. Antherae oblongae, incumbentes, flavae. Germen ovatum, triquetrum. Stylus brevis, crassus. Stigma trifidum, patentissimum; laciniis lanceolatis, acutis, supra pubescentibus. *Jacq.. Mirum hanc speciem omnes praeter Gmel. et Poir. praetervidisse; nomen mutandum fuit ob maculatum antiquius Thunb.. In Prom. b. spei. 4.*

42. *O. ovatum Thunb.*; foliis ovatis, integris, glabris; racemo ovato. *Thunb. prodr. 62. Fl. cap. ed. Schult. p. 315. Willd. Spec. II. p. 117.*

Folia radicalia, 2, acuta, poll.. Scapus teres, striatus, erectus, poll.. Racemus erectus, vix poll.. Pedunculi vix lin. longi. Bractee lanceolato-setaceae, pedunculis aequales. Corollae albidae, carina petalorum virente. *Thunb.. In Prom. b. spei. 4.*

43. *O. ciliatum Thunb.*; foliis ovatis, acutis, ciliatis; racemo erecto. *Thunb. prodr. 62. Fl. cap. ed. Schult. p. 316. Linn. Suppl. 199. Willd. Spec. II. p. 117.*

Folia radicalia, bina, expansa, basi lata, margine cartilagineo-ciliata, unguicularia. Scapus filiformis, flexuoso-erectus, glaber, ru-

rufescens, spithamaeus. Racemus 1-2-poll. Pedunculi capillares, horizontales, apice nutantes, unguiculares. Flores cernui. Thunb. In Prom. b. spei. 2.

44. **O. crenulatum* Thunb.; foliis oblongis, obtusis, ciliatis; floribus racemosis, erectis. Linn. Suppl. 198. Thunb. prodr. 62. ed. Schult. p. 515. Willd. Spec. II. p. 118. *O. unifolium*; folio radicali solitario, carnosio, oblongo, ciliato; scapo nudo; racemo brevi. Retz obs. 2. p. 17.

Folia radicalia, bina, striato-subrugosa, tenuissime ciliato-crenata, patentia, vix poll. Scapus filiformis, flexuoso-erectus, palmaris. Racemus floribus 3-7, pollicaris. Corolla alba, petalis dorso virentibus. Bracteae basi latae, apice setaceae, pedunculis breviores. Pedunculi vix lineam longi. Thunb. Bulbus ovatus magnitudine Avellanae. Folium erectum, planum, lato-lanceolatum, basi scapum vaginans. Scapus erectus, teres, folio longior. Racemus pauciflorus. Bracteae pedicellos aequantes, subulatae, basi amplectentes. Cor. sordide flavescens, patentissima; petalis lanceolatis, obtusis. Filamenta lato-lanceolata, alterna angustiora; antherae versatiles, luteae. Germen subrotundo-trigonum, angulis canaliculatis basi albentibus; sinus interjectis profundis, viridibus, melliferis. Stylus subulato-trigonus. Stigma simplex. Retz. In Prom. b. spei. 2.

45. **O. unifolium* Gawl.; folio saepius unico, linearilanceolato, inferne apiceque teretiusculo, basi scapum vaginante; racemo subspicato, paucifloro; bracteis ovato-subulatis, pedunculo duplo longioribus. — Gawl. Bot. Mag. 955. *O. nanum*; folio saepius unico, lin. lanc., bas. scap. vag.; racemo terminali, paucifloro, bract. acuminatis, pedunculo longioribus. Brot. Fl. Lusit. p. 529. Phyt. lusit. sel. p. 108. t. 46. f. 1. Scilla unifolia; folio teretiusculo, latere subspicato. Linn. Spec. p. 443. Mant. p. 365. Willd. Spec. II. p. 131. H. Kew. ed. II. 2. 265. Link et Hoffmanns. Abh. d. Berl. Ges. 4. p. 22. Ann. of Bot. 1. p. 106. Bulbus monophyllus. Clus. App. alt. c. ic. Bauh. Hist. II. p. 622. *O. spicat. unifol. et trifol.*, flore niveo odorato. Griseb. Lusit. n. 1596. β spica subcylindracea, multiflora, conferta; floribus erectis, odoratis; foliis 2-3 breviter cuspidatis. Gawl. l. c. t. 953. *O. concinnum* Salisb. Prodr. 240. *O. nanum* γ foliis 3, scapo unico in eodem bulbo. Brot. l. c. *O. roccense*; fol. pluribus, linearibus, scapo saepe longioribus; racemo brevi, paucifloro, bracteis e lata basi longe acutis, pedicello duplo longioribus. Link in Schrad. Journ. 1799. IV. St. p. 520.? γ foliis scapisque duobus in eodem bulbo. *O. nanum* β Brot. l. c. Bulbus tunicatus, magnitudine Avellanae vel minor, (in cultu magnitudine nucis moschatae, ovatus), externe subfuscus, radiculis flexuosis. Scapus erectus, filiformis, 3-4 poll., glaber, ad apicem crassior. Folium saepius unicum, rarissime 3, vagina albidâ junciformi, canaliculatum, viride, externe striatum, 3-4 lin. latum, curvum, apice iterum junciforme, $\frac{1}{2}$ -1 ped. Flo.

res sessiles aut subsessiles, spicati, 2-3, raro unus terminalis, alterui, rhachi subflexuosa, pollicari, inodori, quamvis a *Clusio* et *Grisleyo* (et *Gawler*) odori. Bractea ovato-subulata, membranacea, dorso virens, petalis saepius dimidio brevior, raro subaequalis. Petala alba, lanceolata, aequalia, erecto-patula, (subpellucido-) striata, 4-6 lin., $1\frac{1}{2}$ lin. lata, marcescentia. Filamenta plana, sublanceolata, acuminata, alterna vix latiora, alba, corolla breviora. Antherae incumbentes pallidae. Germen obconico-triangulare, angulis leviter unisulcatis. (Stylus germine longior). Stigma obtusum subpubescens. Caps. ovali-triangularis, 3-valvis. Semina plurima, subrotunda. Brot. β multo majus. Folia fere pedalia, vix cuspidata, latiora. Cor. lacinae albae, oblongae, obtusae, $\frac{1}{2}$ poll.. Filamenta corolla breviora; antheris flavis. Germen viride. *Link.* *O. roccense* signatur 4-6 poll., floribus sat magnis et simile dicitur *Sc. unifoliae*. In collibus macris, dumetis sabulosis circa *Cornimbricam* et alibi in *Beira* et trans *Tagum*; ad *Cabo di Rocco*. 4.

Obs. *Smith*, *Link*, *Brotero* et *Gawler* hanc plantam omnino ad *ORNITHOGALUM* spectare affirmant; *Sprengel* *S. F. H.* p. 66. eandem sub *Scilla unifolia* exhibuit, et eadem *Sc. paradoxam* *H. a Bieb.* cum? instar synonymi subscripsit.

46. *O. sessiliflorum* *Desf.*; foliis canaliculatis, acutis; floribus laxè spicatis, subsessilibus; bracteis subulatis, florem subaequantibus. *Desfont. Fl. Atlant.* 1. p. 295. *Poir. Enc. Suppl.* IV. p. 196.

Bulbi ovati, solidi, tunicati. Folia glabra, pedalia, 3-4 lin. lata. Scapi erecti, 1-3 ped.. Flores parvi, erecti, sessiles vel brevissime pedicellati. Bractee membranaceae, concavae. Petala elliptica, obtusa, dorso fusca, albo marginata. Filamenta alterna basi dilatata. Stigma simplex. *Desf.* In *Atlante prope Tlemsen*. 4.

47. * *O. comosum*; racemo brevissimo; bracteis lanceolatis, longitudine pedunculorum (adscendentium); petalis (lanceolatis) obtusis; filamentis lanceolatis; (foliis linearibus, canaliculatis, scapo brevioribus). *Linn. Spec.* 440. *Amön. ag.* 4. p. 312. *Willd. Spec.* II. p. 120. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 551. *Roth En. pl. Germ.* I. 2. p. 46. *Jacq. Coll.* 2. p. 315. *Ic. rar.* 2. t. 426. *Hayne term. bot.* t. 34. f. 4. *Clus. Hist.* p. 187. *O. apicatum* s. *comosum* *Rudb. Elyt.* 2. p. 155. f. 1. *O. lactei* species major. *Best. Eyst. vern.* 5. f. 14. f. 5. β . *O. comosum caucasicum*.

Bulbus ovatus vel subrotundus, saepe obliquus, diametr. uncialis; fibrillis crassulis. Folia plura, radicalia, vix $\frac{1}{2}$ ped., $\frac{1}{4}$ poll. lata, acuta, glauco-viridia, glabra, reflexa, in planta florente saepius (nec semper) jam emarcida. Scapus foliis fere duplo longior, teres, erectus, glaucus. Racemus oblongus, floribus inodoris, 12 circiter. Bractee membranaceae, acutae (acuminatae, pedunculos aequantes vel superantes). Pedunculi in flore fructuque erectiusculi. Petala lanceolata, obtusa, interdum parvo mucrone, patentissima, subaequalia vel alterna paulo angustiora brevioraque, intus albo, rarius viridi-maculata, extus virescentia marginibus albis. Filamenta plana. Antherae ochroleucae. *Ger.*

men flavum. Stylus albus. Capsula ovata, obtusa. Semen plerumque 1 in quovis loculamento, subrotundum, atrum, punctatum. *Jacq.*. *O. pyrenaico* minus. *In Austria, Pannonia.* 4.

b. *Floribus subcorymbosis.*

48. *O. lanceolatum Labill.*; racemo subcorymboso, foliis lanceolatis brevioribus; filamentis alternis vix latioribus. *Labill. pl. rar. syr. Dec. V. t. 8. f. 1.*

Folia plana, basi vaginata, striata, 4-5 poll., poll. et ultra lata. Racemi foliis paulo breviores. Scapi nudi. Pedunculi apicoid quidquam incrassati. Bracteae lanceolatae, pedunculos vix aequantes. Petala alterna longiora latioraque (alba vel flava?). Filamenta acuta, dilatata, alterna petalis majoribus opposita vix latiora. Antherae versatiles. Capsula ovata. *Labill.* *Prope Laodiceam ad mare.* 4.

49. *O. montanum Cyr.*; floribus corymboso-racemosis; pedunculis brevibus; petalis oblongo-lanceolatis; filamentis basi dilatatis; foliis lanceolato-canaliculatis, subrepandis; bulbo solido, simplici. *Tenore Fl. neap. p. 176. t. 35.* *O. bulb. solid. simpl. tunicato*; foliis lanceolato-linearibus, planiusculis, scapo brevioribus; floribus corymbosis; petalis acutis. *Bertol. in litt. Guss. Prodr. Fl. sic. i. p. 415.* *O. patulum*; foliis patentibus, longitudine scapi; corymbo multifloro; bracteis lanceolatis. *Rafin. in Desv. Journ. d. Bot. IV. p. 271. Prec. d. dec. semiol. p. 44.*

Folia exacte lanceolato-lineararia, acuminata, planiuscula vel subundulata, glabra, laxa. Bracteae pedunculis breviores. Petala lanceolato-lineararia, acuta, dorso viridi, albo marginata, alterna minora. Filamenta subulata, basi dilatata. Caps. parva, oblonga, sexsulcata. *ORNITHOGALUM umbellatum* distinctissimum bulbo prolifico; foliis prorsus linearibus, canaliculatis, scapo longioribus; statura floribusque majoribus. *Bertol. in litt.* Proximum *O. comoso*, sed differt foliis planioribus; racemo longiori; bracteis pedunculo brevioribus; petalis acutis. *Balbis Cat. h. Taur. 1813. p. 55.* *Sprengel S. V. II. p. 50.* instar varietatis *umbellati* habet. *In regno neapolitano et in Sicilia.* 4.

50. *O. collinum Gusson.*; bulbo solido, simplici; foliis linearibus, canaliculatis, ciliatis, scapo subaequalibus; floribus corymbosis; petalis oblongis, obtusis. *Gusson. Prodr. Fl. sic. i. p. 412. Ind. sem. 1825.* *O. garganicum Tenor. Append. ad ind. sem. ann. 1827. p. 5.*

Forma, longitudine ciliisque foliorum statim dignoscitur ab *O. montano*. Item bulbo simplici; foliis ciliatis; petalis oblongis obtusiusculis, toto habitu minore differt ab *O. umbellato*. *Bertolon. in litt.* Pluribus varietas tantum *O. exscapi*. *In Gargano et in Sicilia.* 4.

51. *O. fimbriatum Willd.*; racemo subcorymboso, paucifloro; pedunculis fructiferis elongatis, patentissimis; foliis linearibus scapo pedunculisque hirsutis. *M. a. Bieb. Fl.*

Taur. cauc. 1. p. 276. *Suppl.* p. 266. O. fol. linear. ciliatis; scapo subbifloro; bracteis pedunculos subaequantibus. *Willd. Nov. Act. nat. Cur. berol.* 3. p. 420. *Hoffm. C. H. mosq.* 1808. *Edward. Bot. Reg.* 555. (mala.) *Lindl. Coll. bot. Fasc.* VI. t. 28. O. umbellato affine, foliis pilosis. *Pallas ind. taur. Nov. Act. petrop.* 10. p. 509. O. samium *Tournef. Coroll.* 26.

Folia radicalia, linearia, acuta, margine villis ciliata (vel in spontaneis extus omnino villosa). Scapus erectus, vix digiti. Flores facie et colore O. *umbellati*; pedunculi bini (vel plures), 4-flori, patentes, subalterni in apice scapi. Bractea lanceolata, acuta, membranacea. *Willd.* Simillimum O. *umbellato*, ut praeter hirsutiem vix ullâ aliâ notâ distinguatur. Pili foliorum scapi et pedunculorum crebri patuli albi. *M. a Bieberst.* In culta bulbis magnitudine ovi anatis, pallidus, ferrugineo-maculatus. Folia canaliculata, obtusa, (decumbentia, 3-4 poll., 3-4 lin. lata,) paululum torta. Racemus brevis, scapo pedunculisque glabris. Bractee ovatae, pedunculi longitudine. Flores (plures racemoso-corymbosi) colore et magnitudine O. *umbellati*: variant laciniis acuminatis. *Lindl.* O. *nano* proximum. In *Tauriae nemorosis.* 4.

52. * O. *umbellatum*; bulbo prolifero; foliis linearibus, canaliculatis, striâ longitudinali albidâ; pedunculis corymbosis, longissimis, erecto patentibus vel patentissimis, bractee lanceolatas superantibus; petalis elliptico-lanceolatis; filamentis lanceolato-subulatis. *Linn. Spec.* 441. *Mant.* p. 564. *Willd. Spec.* II. p. 116. *Mill. Dict.* n. 7. *Smith Fl. brit.* 1. 564. *Engl. Fl.* II. p. 145. *Engl. Bot.* t. 130. *Roth Germ.* II. p. 395. *Enum. pl. germ.* I. 2. p. 45. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 551. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 217. *Desf. Fl. Atl.* I. p. 296. *Brot. Fl. lus.* p. 531. *Savi bot. etr.* II. p. 214. *Tenore Fl. neap.* 1. p. 174. *Bertol. Amön. it.* p. 144. *M. a Bieb. Fl. taur. Cauc.* 1. p. 275. *Pursh Fl. sept. Am.* 1. p. 227. *Jacq. Austr.* t. 343. *Redout. Lil.* t. 143. *Schkuhr* t. 94. *Fl. Dan.* t. 1266. *Hook. Lond.* t. 45. O. *narbonense Reich. Fl. monofrancof.* *SCILLA campestris Savi Pis.* 1. p. 350. *STELLARIS corymbosa Mönch Meth.* p. 304. *Hall. Helv.* n. 1215. *Bauh. Hist.* 2. p. 650. *Lobel. ic.* 148. f. *Swert* t. 57. f. 4. *Renealm. Spec.* t. 87.

Bulbi ovati, solidi, albidi, proliferi, 6-12 lin. Folia radicalia, 5-6, primum erectiuscula, scapo breviora, demum flaccida scapoque longiora, basi angustata, obtusa, glabra, laete viridia, intus striâ longitudinali albidâ, 3-10 poll., $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapus teres, erectus, basi tenuior, 3-11 poll. Corymbus primum umbellatus, serius racemosus, subfastigiatus, 5-14-florus. Pedunculi teretes, alterni, primum erecto-patentes, serius patentissimi; inferiores 1-4 poll., scapum superantes, superiores sensim minores. Bractee solitariae, pedunculis inferioribus duplo breviores (1- $1\frac{1}{2}$ poll.) superiores aequantes et superantes, lanceolatae, basi concavâ semiamplexantes, subulato-acuminatae, sca-

riosae, albidae, nervis fuscescentibus. Petala dorso viridia margine albo, intus candida, glabra, obtusa vel exteriora apice callo parvo intus sub lente puberulo, 6-10 lin., $1\frac{1}{3}$ -3 lin. lata; interiora paulo angustiora, vix breviora, latius marginata. Filamenta petalis duplo breviora, basi dilatata, alterna angustiora sed vix breviora. Antherae flavae, basi bifidae, lin. et ultra. Germen turbinatum, 6-angulare. Stylus staminibus paulo brevior, filiformis. *In pratis, cultis, pomariis totius Europae, Tauriae, Caucasi, borealisque Africae et Americae.* 4.

Obs. „Primo vere scapo occurrit brevissimo itidemque pedunculis, ita ut fasciculus florum ad ipsam radicem sessilis appareat. Praecocem hanc varietatem exprimere videtur *O. nanum* *Sibth. Fl. gr. et Spreng. pug. 2. p. 59. n. 111.*“
M. a Bieb. Suppl. p. 366. — Quid: „*O. minus* simillimum *umbellato* et maxime affine: sed huic petala acutiora; saepe haec non crescit in variis provinciis, ubi illa vulgaris.“ *Linn. Mant. p. 360?*

53. *O. tenuifolium* *Guss.*; bulbo solido, simplici; foliis filiformibus, scapo subaequalibus; floribus corymbosis. *Gusson. Prodr. Fl. sicul. 1. p. 413.*

Folia longe angustiora quam in *O. exscapo* et *collino*, leviter canaliculata, nervo albo destituta, glabra, margine nuda. *Hertol. in litt.. In Sicilia.* 4.

Obs. Hujus loci nobis esse videtur specimen, quod nomine *O. umbellati* e Podolia australi a clo *Besser* accepimus et quod a simillimo *umbellato* tantum notis supra indicatis differt: bulbus albidus, ovatus, 9 lin., nullis sub tunicis exterioribus bulbillis. Folia anguste linearia, canaliculata, ut videtur concoloria, glabra, scapum aequantia, vix lin. lata. Scapus 5 poll., gracilis. Corymbus pauciflorus. Pedunculi floriferi erecto-patentes, 9-14 lin., bracteam lanceolatas, longe acuminatas, albas superantes vel juniores easdem aequantes. Cor. paulo minores quam in *umbellato*. Petala paulo acutiora angustioraque, $4\frac{1}{2}$ - $6\frac{1}{2}$ lin.. Filamenta alterna paulo breviora. Reliqua ut in *O. umbellato*.

54. *O. refractum* *Kit.*; bulbo prolifero; scapo longitudine corymbi, foliis linearibus, canaliculatis cum striâ albidâ, duplo brevior; pedunculis fructiferis refractis, bracteam lanceolatas vix superantibus; petalis oblongis, acutiusculis; capsulis angulatis. — *Schult. Oestr. Fl. 1. p. 559. Reichenb. Ic. pl. rar. t. 142.*

Bulbus ovatus, solidus, albidus, pollic. et ultra, bulbillis numerosissimis subglobosis sub tunicis exterioribus. Folia radicalia, circiter 7, suberecta vel flaccidula, ped., explicata 5 lin. lata, basi angustiora, valde canaliculata et medio striâ albidâ longitudinali, glaucescenti-viridia, sub florescentia apice emarcida, glaberrima. Scapus cum corymbo $4\frac{1}{2}$ poll., erectus, glaber, crassitie pennae corvi, corymbum versus crassior et angulatus. Flores numerosi (circiter 25) in corymbo racemoso 2 pollicari; rhachi angulosâ et ad pedunculorum ortum incrassatâ. Pedunculi alterni, glabri, basi apiceque paulo crassiores; floriferi patentes (floribus tamen erectis), bracteam vix superantes, 6-7 lin.; fructiferi a basi refracti, (capsulis tamen suberectis), 12-14 lin.. Bracteam lanceolatae vel ovato-lanceolatae, longe acuminatae, basi concavae, albae, nervosae, primum patentes, serius reflexae, 6-12 lin.. Petala elliptico-vel ovato-lanceolata, acutiuscula, glabra, dorso viridia, margine albedo, intus alba, 6-8 lin., 2 lin. lata; interiora paulo angustiora fasciaque dorsali angustiore. Filamenta petalis plus quam $\frac{1}{3}$ breviora, alba, lanceolata, alterna paulo breviora. Antherae oblongae, flavae, basi emarginatae. Stylus filiformis, stamina fere superans; stigmate obtuso. Caps. immatura 3 lin.,

oblongo-ovata, apice retusa, angulis 3 acutis, repandis, trisulea. Differt ab *O. umbellato*: scapo brevioribus; pedunculis brevioribus, vix corymbosis, defloratis cito a basi refractis; capsulis majoribus magisque angulosis; ab *O. exscapo*, quocum plerumque conjungitur: bulbo valde proliifero; foliis lineam longitudinali albidam percursis magis erectis longioribusque; scapo altiore; floribus numerosioribus. Ad specimen a divo *Kitaibel* lectum. In *graminosis Hungariae*. 4.

Obs. Vix erandum e definitione, an huc vel potius ad *O. exscapum* spectet: *O. refractum*, scapo brevissimo; racemo radicali, sessili; bracteis longitudine pedunculorum; stamin. lanceolatis, alternis longioribus; pedunculis defloratis reflexis. *Willd. Enum. Suppl.* p. 18. *Sprengel in Syst. Veg.* II. p. 30. utrumque sub *O. refracto* conjunxit.

55. *O. exscapum Tenor.*; bulbo solido, simplici; scapo floribus corymbosis brevioribus; (bracteis ovato-lanceolatis pedunculos subaequantibus); pedunculis fructus declinatis; foliis linearibus, canaliculatis, elongatis, (concoloribus); petalis obtusis; capsulis angulatis. *Bertol. in litt.* *O. flor. corymb.*; pedunc. fructif. refract., bracteis longioribus; petalis ovato-oblongis; filam. subul. basi dilatatis; caps. ovatis, angulato-repandis; fol. lin., canaliculatis, flaccidis, concoloribus, striatis; bulb. solid. simpl. *Tenor. Fl. neap.* p. 175. t. 34. *Gusson Prodr. Fl. sic.* I. p. 412. *O. nanum Spreng. Pug.* II. p. 59. (excl. syn. *Smith.*) *O. refractum Moris. Stirp. sard.* El. I. p. 46. *O. pauciflorum*; fol. plan., linearibus, glabris, erectis, scapo longioribus: corymbo simplici; bracteis subulatis, membranaceis; petalis lanceolatis, acutis. *Rafin. Prec. d. dec. semiol.* p. 44. et in *Desv. Journ.* IV. p. 272. (fid. *Bertol.*) *O. valg. aliud. Clus. Hist.* 188. o.

Differt ab *O. umbellato*: bulbo simplici; foliis recurvato: flaccidis, corymbum multo superantibus, sulco albo longitudinali destitutis; scapo brevissimo, ita ut longe distet a longitudine corymbi; petalis latioribus; capsulis ovatis, fere duplo majoribus, angulatis. Pedunculi floriferi erecti; fructiferi declinati. Bractee lanceolatae, acuminatae, nec late ovatae, ventricosae, abbreviatae ut in *O. nano*. *Bertol. in litt.* Bulbi ovati, 6-8 lin., albidi, tunica extima pallide fusciscente. Folia 5-6 et ultra, flaccida v. reflexa et humi decumbentia, scapum 2-3-plo superantia, valde canaliculata, sulco medio concolore nec albido, acutiusecula, glabra vel basin versus obsolete ciliata, 3-4 poll., 1-1 1/2 lin. lata. Scapus vix ullus vel cum corymbo 1-1 1/2 poll., erectus, glaber, subangulosus, praesertim flores inter. Corymbus racemosus, 3-14-florus, scapo duplo longior; rachis scapo crassior et ad pedunculorum ortum incrassata. Pedunculi alterni vel suboppositi, florescentes patentes, serius reflexi, glabri, teretes, juniores 3 lin., serius 6-9 lin.. Bractee ovato-lanceolatae, concavae, acuminatae, semiamplexantes, albae, nervosae, 3-8 lin.. Petala ovato-vel oblongo-lanceolata, obtusa, glabra, dorso viridia, margine albido, intus alba, 5-8 lin., 1 1/2-2 lin. lata; interiora paulo breviora angustioraque. Filamenta petalis fere duplo breviora, alba basi dilatata; alterna paulo latiora et breviora. Antherae oblongae, basi bifidae, pallide flavae, lin.. Germen ovato-oblongum, angulis subrepandis. Stylus filiformis, stamina aequans.

A pluribus conjungitur cum *O. nano* Sm., quod fide Bertoloni
diversum. In Italia, Sicilia, Sardinia et in Gallia
sec. Loiseleur. 4.

Obs. An huc: *Oxizum siculum*; scapo nullo; floribus pedunculatis Bern. et
Ucria in Röm. Arch. I. St. 1. p. 67.? *Ox. pauciflorum* Rafin., quod
auctoritate eli Bertoloni huc citavimus, forte alius loci, cum foliis planis
et bracteis subulatis ablutat et in Desvauz Journ. GAONAN *spathaceae* et
sine dicatur.

56. *O. nanum* Smith; corymbo simplici, paucifloro,
glabro, scapo longiore; bracteis ventricosis, scariosis; foliis
linearibus, numerosis. *Smith Prodr. Fl. graec. p. 250. Fl.*
graec. t. 552. O. humifus.; flor. umbell., albis. *Buxb. Cent.*
2. p. 35. t. 37. f. 1. (a *M. a Bieb.* ad *O. umbellatum* ductum.)

Bulbus magnitudine Avellanac. Folia 6 et ultra, late patentia, 6
poll., angusta, glaucescentia. Scapus brevissimus; floribus 2-5
magnis, erectis, albis nervo viridi. Filamenta 5 basi dilatata.
Smith in Rees Cyclop. Differt ab *O. exscapo* bracteis late ova-
tis, ventricosis, abbreviatis. *Bertol. in litt.* In Arcadia
et prope Abydum. 4.

D u b i a.

57. *O. ? afrum* Thonin; scapo tereti, nudo; floribus
umbellatis; pedunculis simplicibus, inaequalibus. *Zuccag.*
in Röm. Collect. p. 137.

Scapus fere 2-ped., erectus, viridis, glaberrimus. Folia numerosa,
ensiformia, canaliculata, substriata, apice obtusa, scapo breviora.
Umbella plerumque 5-flora. Spathae binae, oppositae, connatae,
basin umbellae vaginantes, marcescentes, deciduae. Pedunculi
1-flori, spathis triplo longiores, teretes, glaucescentes, albo-ma-
culati. Flores magnitudine *ASPHODILI fistulosi*. Petala alterna,
aequalia, oblongo-ovata, obtusa, concava, alba, basi viridia, ex-
tus lineâ longitudinali purpureâ interruptâ, persistentia. Stamina
aequalia, ad pistillum appressa. Filamenta membranacea, plana,
superne attenuata, quandoque coalita, plerumque libera et petal-
orum basi affixa. Antherae basi bifidae vel sagittatae, incum-
bentes, luteae. Germen ovale, viride, glabrum, lineis 6 longi-
tudinalibus. Stylus longitudine staminum, candidus, teres, basi
crassior et persistens. Stigma capitatum, obtusum, trigonum,
flavescens. Caps. trigona, viridi-purpurea. Semina nigra, tri-
gona, rugosa. *Zuccagni.* Vix generis. *Ex Aegypto*
Desf. 4.

58. *O. flavum* Forsk.; foliis linearibus, plano-compli-
catis; floribus flavis, racemosis. *Forsk. Fl. aegypt. p. 209.*
In Arabia prope Surdud. 4.

59. *O. oligophyllum* Clarke; foliis lanceolato-oblongis,
scapum subaequantibus, glabris; corymbo paucifloro; filamen-
tis subulatis. *Clarke Trav. T. VIII. p. 224. Spreng. Neue*
Entd. III. p. 166.

In systemate non occurrit amplius. Quid vero est?

60. *O. indicum* Willd.; foliis lanceolatis, vaginantibus,
scapo multifloro longioribus; floribus glomeratis, sessilibus.
Reliqua. Willd. Ms.

Folia copiosa, basi vaginantia, fere pedalia, lato-lineararia, undu.

lata, glaberrima, recurvata, scapo longiora. An generis? De Schlechtend fil.. In India orient. prope Cardapilly. Heyne.

61. *O. tuberosum* Mill.; racemo brevissimo; foliis teretibus, fistulosis. Mill. Dict. ed. 8. n. 10. *O. afric. luteum, odoratum, fol. cepaceis, radice tuberosâ* H. L.

Bulbus magnus, depressus, magnitudine pugni, tunicâ inaequali, fuscâ. Folia plura, cylindrica, 9-10 poll.. Scapus nudus fere ped.. Racemus laxus. Flores flavi, odori. Mill. In coll. siccis Prom. b. spei. 24.

Obs. ORNITHOGALI speciem novam detexit div. Prof. C. Smith in Guinea. Hornem. d. indol. pl. guin. p. 12.

Quid ORNITHOGALUM album Kitaib.

brachystachys H. Gorenk.

belgicum Lejeune.

elatum Andr. Delile.

nervosum Burchell.

Noccaeanum Balb. in Giorn. d. Fic. Chim. etc.

VI. Bim.

palustre Ecklon topogr. Verz. p. 6. (e locis ndis Hottentotte hollands Bloof inter et Hauhoek.)

siculum Ræusch.?

1401. G A G E A.

1. *G. pratensis*; bulbis 3 subhorizontalibus: lateralibus denudatis; folio radicali solitario (rarius 2-3), lineari, plano, utrinque attenuato, carinato: floralibus 2 oppositis; pedunculis simplicibus, subumbellatis; petalis lineari-lanceolatis, acutiusculis, glabris. ORNITHOGALUM *pratense*; scapo polyphylo; pedunculis simplicibus, glabris, triquetris. Pers. in Ust. Annal. XI. p. 8. t. 2. f. 1. (excl. syn. Fl. Dan.) Henk. a Donnersm. p. 226. Wallr. Sched. Crit. p. 140. *O. bulb. nidulante*; fol. rad. 1 (rarius 2-3), involucralibus 3-8; pedunculis trigonis glabris; stylo trigono, glabro, stam. superante. de Schlechtend. Fl. berol. 1. p. 192. Bönningh. Prodr. Fl. Westph. p. 98. *O. pedunc. umbellatis, simplicibus*; pet. obtusis, sublinearibus, glabris; fol. rad. subsolitario, lineari, plano, glaucescente; bulbi tuberculis divergentibus, denudatis. Wahlenb. Fl. succ. p. 201. Roth Enum. pl. Germ. 1. 2. p. 40. ORNITH. *stenopetalum* Fries Novit. p. 69. Fl. hall. 58. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 541. ORN. *luteum* Willd. Spec. Pl. II. p. 115. (excl. β). Enum. h. berol. p. 367. Roth Fl. Germ. II. 1. p. 395. (excl. β). Poll. Pal. 1. p. 352. Lam. et Dec. Fl. fr. 3. p. 214. (excl. β). Gmel. Bad. II. p. 37. Schult. Oest. Fl. 1. p. 558. Schultz Fl. Starg. Prodr. p. 18. Hoppe Bot. Zeit. 1807. p. 137. Bot. Taschenb. 1808. p. 218. Sturm D. Fl. Fasc. 12. *O. luteum pratense* Pers. Syn. 1. p. 363. *O. luteum* α Poir. Enc. IV. p. 612. *O. luteum* α minus invol. polyphyllis. Red. Lil. p. 302. Moris. hist. 2. s. 4. t. 13. f. 12. Chabr. Stirp. 219. f. 6. β . *grandiflora*; floribus majoribus; petalis acuminatis. *O. stenopeta-*

lum β grandiflorum Mert. et Koch l. c. p. 542. Reichenb. in Mössl. Handb. p. 557. O. Schreberi Reichenb. in Bot. Zeit. 1822. p. 557. γ . spathacea; fol. floralibus spathaceis; petalis obtusis. O. stenopetalum γ pratense Mert. et Koch l. c. (excl. syn. O. pratensis Pers. ad α spectantis). δ . intermedia; pedunculo radicali s. scapo simplici; fol. radicalibus 1-3. O. stenopetalum δ intermedium Schultz in Bot. Zeit. 1827. p. 664. t. 1. O. intermedium Schultz in Herb. ϵ . nudiscapa; pedunculo radicali s. scapo simplici; fol. rad. 3. O. stenopetalum ϵ nudiscapum Schultz. l. c. O. nudiscapum et exscapum Schultz in Herb. O. simplex Becker Fl. francof. ζ fol. caulino solitario, axillâ bulbifero.

Species valde varians et forte in plures dividenda. Radix e bulbis 3 horizontalibus vel obliquis absque tunica communi; bulbus florens biennis, oblongus, pallide fuscus, exsuccus, tunicâ siccâ, apice radiculis siccis, basi radiculis recentibus; bulbi 2 laterales annui nudi, ovati, nec scapum nec folium emittentes. Folium radicale plerumque solitarium (in varietatibus etiam 2-3), erectum vel plerumque apice arcuato-reflexum, scapum superans, 5-10 poll., $1\frac{1}{2}$ -3 lin. latum, lineare, rarius lineari-lanceolatum, carnosulum, carinâ acutâ prominente, nervosum, nervis 2 basi tantum fortioribus, attenuato-nec abrupte acuminatum, acumine teretiusculo callo terminato, vix glaucescens, glabrum; floralia plerumque 2 opposita, margine villosa, alterum majus lineari-lanceolatum, elongato-acuminatum, vix spathaceum, umbellae basin semiamplexans, fere planum, trinerve, umbellam superans, $1\frac{1}{3}$ -3 poll.; alterum duplo brevius et angustius; praeterea foliola involueralia ad petiolorum basin tot quot pedunculi, similia, sed multoties breviora, linearia, margine magis villosa, inaequalia. Scapus erectus, basi attenuatus, 1-6-florus, plerumque 2-4-florus, glaber, angulis acutis, 2-7 poll. Pedunculi in umbella sessili, glabri, trigoni, inaequales, 6-24 lin., rarissime basi conereti, nudi vel rarius bracteolâ parvâ lineari. Petala aequalia, 5-nervia, extus virescentia margine flavescenti, intus lutea, lineari-lanceolata, obtusa vel acutiuscula, paulo angustiora et acutiora, quam in lutea, a medio patentia, 4-8 lin., lin. lata, interiora paulo angustiora, utrinque glaberrima. Stam. petalis duplo breviora; filamenta subulata; antherae oblongae, luteae. Germen obovato-oblongum, trigonum, lateribus non excavatis, glabrum. Stylus trigonus, stamina paulo superans. — β differt folio florali majori $\frac{1}{2}$ poll. ab umbella 2-flora remoto, in scapum decurrente et oblique affixo; petalis longe acuminatis, 8-9 lin., 4- $1\frac{1}{2}$ lin. latis. — In γ , quod forte species propria, ad quam vero non pertinet ic. a Persoon l. c. data, folium radicale scapum paulo superans, magis erectum, 4-6 poll., $1\frac{1}{2}$ -2 lin. latum; scapus gracilior, 4 poll., 1-2 florus; folia floralia 2 opposita; majus spathaceum fere ut in G. spathacea et fistulosa, inferne concavum, ovatum, flores vix aequans, 9-12 lin., margine ciliatum; alterum lineari-lanceolatum, duplo minus; petala oblongo-lanceolata, magis obtusa, pallidiora, margine magis membranacea, 6 lin. In δ , quod facile pro diversa specie haberetur, nisi specimina numerosa a Schultz lecta egregie transitum docerent, aut folium radicale 1 et scapus 1-florus, 3-6 poll., foliis floralibus

3. 5 oppositis vel alternis, longe a flore remotis angustis elongatis, aut folia radicalia 2-3 et in scapo foliola 2 minora, alterna; praeterea petala lineari-lanceolata, obtusiuscula, 5-7 lin.. Subinde etiam excrescentia bulbosa in medio scapi. In ϵ folia radicalia 3, altero maximo 5-10 poll., reliqua (folia floralia compensantia) minora, scapus vel pedunculus radicalis, nudus et glaber, $1\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ poll., reliqua ut in δ . *Lachmann* in *Fl. Brunsv.* 1. p. 130. adducit varietatem *O. stenopetali* folio florali majore basi spathaceo; floribus majoribus. De bulbillarum structura conf. *Mert. et Koch* *Deutsch. Fl.*, *Tausch* in *Bot. Zeit.* 1821, *Hornung* *ibid.* 1824. Conf. *Obs.* ad *G. luteam*. In pratis, nemoribus et ad saepes totius fere *Europae*, praesertim *mediae*; β in *Saxonia*; γ in pratis prope *Erlangam*; δ et ϵ in circulo *Rhenano Bavariae*. 4.

2. * *G. lutea*; bulbo ovato folioque radicali solitario, lineari-lanceolato, abrupte acuminato, carinato-3nervi: floralibus suboppositis; pedunculis simplicibus, umbellatis, glabris; petalis oblongis, obtusis, glabris. *ORNITHOGALUM luteum* *Linn.* *Suec.* n. 285. *Spec.* 439. *Smith Fl. brit.* 1. p. 362. *Engl. Fl.* 2. p. 142. (excl. *O. pratensi Pers.*) *Engl. Bot.* t. 21. *O.* bulb. solit. solido; fol. rad. 1: involucralibus 2-5; pedunculis teretibus, glabris; stylo tereti, glabro, staminibus brevior. *de Schlechtend.* *Fl. berol.* 1. p. 191. *Wallr. Sched.* 1. p. 139. *Bot. Zeit.* 1824. p. 54. *O.* pedunc. umbellatis, simplicibus; petalis obtusis, glabris; folio radicali solitario, lineari, plano; bulbis convergentibus inclusis. *Wahlenb. Fl. suec.* p. 201. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 548. *Roth En. pl. germ.* I. 2. p. 39. *Marz. vicet.* p. 27. *Host Fl. aust.* 1. p. 429. *Fl. Dan.* t. 378. *Svensk Bot.* t. 654. *O. luteum* β *sylvaticum* *Willd. Spec.* II. p. 118. *Pers. Syn.* 1. p. 363. (excl. syn. *Fl. Dan.*) *O. luteum* β *majus*, involucro diphylo. *Redout. Lil.* t. 302. *ORNITH. sylvaticum*, scapo diphylo; pedunculis simplicibus, triquetris. *Pers.* in *Ust. Ann.* XI. p. 7. t. 1 f. 1. (excl. syn. *Fl. Dan.* et *Krock.*) *Willd. Enum. h. berol.* p. 368. *Decand. Fl. fr.* VI. p. 315. *Schult. Oestr. Fl.* 1. p. 558. *ORN. Persoonii* *Hoppe Bot. Zeit.* 1807. p. 137. *Pohl Fl. boh.* 2. p. 17. *Sturm Deutsch. Fl. Fasc.* 27. *ORNITH. foliosum Presl.*?

Bulbus solitarius, erectus, solidus, 4-8 lin., tunicis pallide fuscescentibus; bulbillis lateralibus nullis. Folium radicale ex apice bulbi, erectum, scapo longius, 6-12 poll., 5-6 lin. latum, basi attenuatum scapumque quidquam vaginans, superne latius et dein abrupte attenuatum in acumen tereti-subulatum callo terminatum, fere planum vel quidquam canaliculatum, nervosum, nervis 5 fortioribus carinatum, praesertim medio, glaberrimum, glaucescenti-viride; floralia plerumque 2, saepius 5-4, opposita et subalterna, inaequalia, nervosa, immediate sub umbella, sed non spathacea, ciliato-lanuginosa: maximum lanceolatum, folio radicali simile et eodem modo acuminatum, umbellam subaequans, $1\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{3}$ poll., 5-5 lin. latum, nervosum;

alterum vel reliqua duplo breviora et angustiora, 1-nervia, apice fere plana. Scapus ex apice bulbi compresso-4-gonus, basi attenuatus, glaberrimus, glaucescenti-viridis, 4-7 poll. Umbella sessilis, 2-8 flora. Pedunculi inaequales filiformes, glabri, triquetri, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ poll. Petala extus virescentia margine lutescente, glabra, intus lutea, anguste elliptica, obtusa, 4-6 lin., 1-2 lin. lata, interiora paulo angustiora. Stam. petalis duplo fere breviora; filamenta subulata; antherae ovatae, luteae, $\frac{3}{4}$ lin. Germen obovatum, angulis 3 obtusis, glaberrimum. Stylus stamina aequans, teretiuseculus, basi paulo attenuatus. *Ad sepes et in nemoribus totius fere Europae; in Sibiria, Kamtschatka.* 4.

Obs. Secuti sumus hic cels. *Wahlenberg*, *de Schlechtendal*, *Mertens et Koch*, *Roth* etc., qui omnes *O. sylvaticum Pers.* huc pertinere dicunt, quod cels. *Hoppe* in *Bot. Zeit.* 1824. p. 61. ob synonymon *Bauh. Pin.* p. 71. a *Linnaeo* laudatum, et ad *O. pratense* spectans, denegat. *III. Smith* in *Engl. Fl.* l. c. omnino silet de hac confusione, et sub suo *O. luteo* utrumque confundere videtur, cum simul *Engl. Bot.* t. 21., *Fl. Dan.* t. 378., *Bauh. Pin.* 71., *Lobel. ic.* 149., *Rudb. Elys.* 2. 139. f. 3., *Ger. Em.* 165. f. *Pyrochiton Renalm.* t. 90., *Bulb. agrest. Trag. hist.* 710. f. 737., *Bulb. sylv. Fuchs Hist.* f. 169., *Dod. Pempt.* 222. f. et *O. pratense Pers.* in *Ust. Ann.* l. c. citet. Descriptio a cels. *Smith* data, huc sane, nec ad *pratense* spectat. — *GAGEA lutea Ker Bot. Mag.* 1800. quoad iconem ad *G. luteam* nostram spectare videtur, quoad textum vero ita ambigit *Ornithogalum pratense* inter et *sylvaticum Pers.*, ut eandem ad neutrum citare ausi simus, eo magis cum utrumque laudasset ad suam *luteam*. Idem valet de *G. fasciculari* et *bracteolari*, quas *Salisb.* in *Ann. of Bot.* II. p. 555. 556. distinxit, et quas pariter ad suam *G. luteam* trahit *Ker.* — *III. Com. Henkel a Donnersmark* l. c. p. 226. (et in *Bot. Zeit.* 1807. p. 151.) ad *O. sylvaticum* laudat *Pers. Syn. et Fl. Dan.* t. 612. quae *GAG. spathacea* et distinguit *O. sylvaticum* a *luteo*: caule subcompresso multangulo, in hoc triquetro; foliis sub umbellâ 2, alternis, remotis, omnibus apice calloso-tubulosis, in hoc imis oppositis maximis; pedunculis subumbellatis, unico solitario, folii majoris sinu adnato; in hoc umbellatis. — Conf. praeterea *Tausch* in *Bot. Zeit.* 1821., *Voigt ibid.* 1820. p. 542., *Hornung ibid.* 1824. p. 33. — *Willd. Spec.* II. p. 113., *M. a Bieberstein* in *Fl. taur. Cauc. et Wahlenberg* in *Fl. ups.* p. 109. sub *O. luteo* junxerunt *O. pratense* et *sylvaticum Pers.* *Sprengel S. Veg.* p. 29. ad suum *O. luteum* laudat tanquam synonyma: *O. pratense* β *Willd.* (quod non existit), *O. sylvaticum Pers.* et *O. foliosum Presl.* — *Besser* in *Enum. pl. Volk.* p. 56. *O. sylvaticum* variare notat: 1. pedunculis ipsâ basi ramosis; 2. pedunculis stipiti semipollicari insidentibus; 3. pedunculis bracteatis; 4. foliis scapo multo longioribus. Idem l. c. asserit specimen singulare se legisse stipite bifloro et bracteis $\frac{1}{2}$ pedunculis subaequalibus, et aliud pedunculo tetragono radicali, 1-floro. Varietatem foliis angustioribus, scapo multo longioribus glaucis prope Kuna, distr. Haysyn Podoliae legit *Andrzejowski.* — *ORNITHOGALUM* in *Gmel. Sib.* p. 47. e synonymis allatis huius sane loci; sed plura apud illum sub eodem latere species, patet ex eo, quod candidissime praemittat descriptioni speciei: „Vix plantam vidi, quae modo crescendi, altitudine totius, latitudine foliorum, florum magnitudine horumque et foliorum colore magis variaret, quare nec nomina specifica adhuc excogitata omnibus quadrant.“ Varietatis interea meminit, quae sane species, et quam distinxit: „bulbo tuberoso, violaceo, pisi minoris magnitudine, quasi e multis minoribus bulbis constipato; scapo foliisque pallide virentibus, uno scapi folio basi latissimo et fere ovato.“ Quorsum spectet *O. luteum*, fol. filiformibus: scapo angulato, tenuissimo, subumbellato; floribus luteis. *Brotero Fl. lusit.* p. 529, ubi laudatur *O. lusit.* capillaceo folio luteum. *Pournef. Inst.* p. 380., videant autoptae; certe non huius est loci.

3. **G. minima*; bulbo solitario nidulante, ovato; folio radicali solitario lineari-filiformi, erecto; florali subspathaceo, lanceolato, remoto; umbellâ 2-5-florâ pedunculatâ; pedunculis ramosis simplicibusve, petalisque lanceolatis, acuminatis, glabris. *ORNITHOGALUM minimum Linn. Fl. Suec.* p. 107. n. 286. *Spec.* p. 440. (excl. syn. *Bauh.*). *Gunn. norv.* n. 1114. *Gort. ingr.* p. 50. *Sobol. Petrop.* p. 223. *M. a Bieberst.*

Fl. Taur. Cauc. 1. n. 675. *Suppl.* p. 265. (excl. *O. spathaceo* et *Aiton.*) *Poir. Enc. Suppl.* IV. p. 192. (excl. β .) *Wallr. Sched.* p. 141. *Hornung in Bot. Zeit.* 1824. p. 55. de *Schlechtend. Fl. berol.* 2. p. 249. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 547. *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 43. *Wahlenb. Fl. Suec.* p. 202. (excl. β .) *Fl. ups.* p. 109. *Fries Hall.* 58. *Fl. Dan.* 1351. *Svensk Bot.* t. 494. f. 1. ORNITH. *Sternbergi Henk. a Donnersm.* l. c. p. 227. *Hoppe bot. Zeit.* 1806. p. 339. c. *tab.* 1807. p. 104. 1819. p. 35. T. II. p. 613. 1820. p. 543. 1824. p. 63. *Bot. Taschenb.* 1807. p. 85. *Sturm Deutsch. Fl.* 23. H. *Besser Enum. pl. Volh.* p. 14. et p. 56. *Schult. Oestr. Fl.* 1. p. 558. ORNITH. *gracile Hagen Chlor.* 276. *O. luteum* β *Steudel* (partim.) ORNITH. *acutipetalum Herbar.*

„*O. luteo* rarior; differt ab eodem non solum magnitudine, sed petala in hoc acuminatissima, in illo obtusissima; pedunculi in hoc ramosi, in illo semper simplices.“ *Linn. Suec.* Bulbi solitarii, saepe gregarii, sed non aggregati, ovati, 3-5 lin., tunicis fuscis striato-foveolatis, bulbillos 2 (e quibus major erectus, minor fere horizontalis aphyllus) includentibus. Folium radicale fere semper unicum, (rarissime bulbillus uterque folium gerit), erectum, sed non strictum, scapo longius, 4-6 poll., viride, anguste lineare, basi albidâ angustatum, medio crassius et fere planum, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ lin. latum, apice acuto canaliculatum, obsolete carinatum; florale s. involucrale infimum magis vel minus remotum ab umbella, spathaceum, lanceolatum, apice in acumen subulatum flores aequans productum, basi attenuatum semiamplexicaule, glabrum vel pilis rarissimis, nervis 3-5, $1-1\frac{1}{2}$ poll., basi $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. latum. Scapus bulbos inter proveniens, filiformis, debilis, inferne attenuatus, erectus, glaber, vel pilis rarissimis crispis, 3-4 poll. Umbella 1-8 flora in pedunculo 1-4 lin. Pedunculi simplices vel divisi, ita, ut inflorescentia saepius corymbum referat, inaequales, teretes, glabri vel pilis rarissimis, 4-14 lin. Bracteae ad pedunculos pedicellosque solitariae, anguste lineares, utrinque attenuatae, nervo medio subcarinatae, margine pilis crispis ciliatae, variae longitudinis, pedunculis semper 2-5-plove breviores. Flores erecti vel primum subcernui, intus lutei, extus flavo-virides. Petala subaequalia, basi erecta, dein patentia, lineari-lanceolata, trinervia, glabra, rarius extus basi puberula, 4-7 lin. $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. Stam. petalis duplo breviora; filamenta altera plerumque breviora, subulata, glabra; antherae ovato-oblongae, basi bifidae, flavae. Germen ovato-rotundatum, trigonum. Stylus staminibus paulo longior, teres, glaber, superne crassior. In nemoribus Sueciae, Russiae, Borussiae, Saxoniae, Austriae, Bavariae, ubi etiam in alpidibus. 4.

Obs. Secuti sumus hic cell. M. a *Bieberstein, de Schlechtendal fl. Reichenbach, Mertens et Koch, Roth, Wahlenberg* etc., qui omnes *O. minimum* *Linn.* cum *O. Sternbergi* *Hoppe* conjungunt, contra elm. *Hoppe*. Cum adumbratio ab ipso *Linnaeo* data omnino quadret in *O. Sternbergi*; cum planta suecica omnino eadem; cum *Oax. arvense* in Suecia non occurrat; et cum ill. *Smith*, possessor *herb. Linn.*, *O. minimum* *L.* ab *arvensi* differre dicat, multo majore jure gaudere videtur opinio: div. *Linnaeum* *O. minimum* ad specimina suecica constituisse, et cum planta *Bauhini* (quam vix vidit) commutasse. Synonymon *Bauhini* ergo

in *Linnaeo* excludendum. *Cls. Hoppe* plane contrarium, nempe *O. minimum* L. ad *arvense* ob *Bauhini* synonymon pertinere asserit in *Bot. Zeit.* l. c. — *M. a Bieberstein, Sprengel et Wahlenberg* *O. spathaceum* varietatem tantum dicunt *O. minimi*; sed species certe diversa. *Tausch* in *Bot. Zeit.* 1821. *O. Sternbergi* conjungit cum *O. fistuloso Lapeyr.*, in quo certe errat; magis adhuc a veritate aberrat *Hort Fl. austr.* p. 480., qui *O. Sternbergi* ad *O. pusillum* citat. *O. minimum Hort. Kew.* ed. 1. II. p. 257., a *Bieberstein* simul cum *Fl. Dan.* t. 1331. et *O. spathaceo Willd.* ad *O. minimum* L. laudatum, *fid. Ker* ad *Gagea spathaceam* pertinet. — *Besser* de suo *O. Sternbergii* recte monet: fert flores bulbos simplices, tunicis fuscis, subreticulato-striatis, interstitiis transversis, rugulosis. Bulbi juniores, nondum florentes, emittunt demum evoluta folio basi bulbillos 3, albos, ovatos. Folia scapum concomitantia planiuscula, dorso angulata. Spathae s. folia floralia plus minusve planae, late lanceolatae, apice tereti, attamen non cucullatae, intus tomento raro, evanido aequae ac bracteolae et pedunculi. Scapus supra spatham in ramos duos et hi varie dividuntur in pedunculos, corymbum 4-12-florum sistentes. Flores cernui, petalis lanceolatis, acutis, basi intus parum lanatis. Genitalia dimidium corollae superant.

4. *G. spathacea*; bulbo solitario, ovato; foliis radicalibus 2 erectis, filiformibus; florali spathaceo, lanceolato, ab umbellâ longe pedunculatâ 1-5-florâ remoto; pedunculis simplicibus, glabris; petalis lanceolato-oblongis, obtusis, glabris. *ORNITHOGALUM spathaceum*; scapo subtereti; spathâ 1-valvi; umb. peduncul., sub 3 flor. *Hayne* in *Uster. n. Ann.* XV. St. p. 11. t. 1. *Term. bot.* t. 5. f. 14. t. 27. f. 4. *Willd. Spec.* II. p. 112. *O. corymbo* simplici, paucifloro; pedicellis glabris; bracteis lanceolatis, subciliatis; fol. linearibus. *Smith Prodr. Fl. graec.* p. 229. *Sibth. Fl. graec.* t. 551. *Roth Catal.* II. p. 57. *Enum. pl. germ.* I. 2. p. 44. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 547. *Bönnigh. Prodr. Fl. monast.* p. 87. *Redout. Lil.* t. 242. (haud bona). *Svensk Bot.* 494. f. 2. *O. Haynii* *Roth* in *Röm. Arch.* III. p. 42. *Sturm D. Fl.* 27. *O. minimum Fl. Dan.* 612. (excl. syn.) *H. Kew.* ed. 2. II. p. 257. (fid. *Ker.*) *O. minimum* β *spathaceum* *Wahlenb. Fl. suec.* p. 202. et p. 1054. *O. transversale* *Pall. ind.* in *nov. act. Petrop.* X. p. 309. α umbellâ triflorâ, involucri pentaphyllo. β umbellâ biflorâ, involucri tetraphyllo. *Willd.* γ umbellâ 1-florâ, involucri triphyllo. δ fol. radicalibus 3-4. Planta ab *O. minimo* distinctissima: fol. radicalibus strictis; scapo folio a floribus remoto lanceolato spathiformi instructo; involucri margine subciliatis; pedunculis nunquam ultra 5, semper glabris. *Willd.* Bulbus ovatus, erectus, 4 lin., tunicis fuscis, serius latere prolifer, primum e bulbillis 2 oblongis foliiferis. Folia radicalia 2, rarius 3 vel 4, filiformi-linearia, obsolete canaliculata, stricta, glaberrima, scapo longiora, 6-9 poll., $\frac{1}{2}$ lin. lata; florale basi perfecte spathaceum, concavum, ovato-dilatatum, intus dehiscens, glabrum, nervosum, dein attenuatum in mucronem teretiuseculum, strictum vel apice recurvatum, umbellam aequans vel eadem paulo brevius, $1\frac{1}{2}$ poll. et ultra, basi 3-3 $\frac{1}{2}$ lin. latum. Scapus strictus, teretiuseculus, basi attenuatus, glaber, 3 $\frac{1}{2}$ -6 poll. Umbella in pedunculo suberecto, 6-9 lin., glabro, simplex, plerumque 2-3 flora, rarius 1-vel 4-5-flora; pedicelli inaequales, teretes, glabri, nudi, 6-12 lin. Bracteae ad pedicellorum basin 3-7, pedicellis numerosiores, inaequales, lanceolatae, glabrae vel margine villosae, concavae,

2-5 lin. Petala aequalia, oblongo-lanceolata, semper obtusa, omnino glabra, 3-nervia, intus flava, extus virescentia, $3\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$ lin., $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Stam. petalis duplo breviora; filamenta subulata, basi dilatata; antherae lineari-oblongae, flavae, fere lin.. Germen obovato-globosum, stylo multo brevius. Stylus stamina multo superans, filiformis; stigmate parvo, truncato. Differt a proxima minima: bulbo latere prolifero: foliis radicalibus 2-4 strictis; pedunculis semper simplicibus, petalis obtusis; a *G. Chustana*, cui flores similes: bulbis minoribus; foliis radicalibus pluribus, et umbellâ pedunculatâ; a *G. Liotardi* habitu tenuiore, umbellâ pedunculatâ etc. In nemorosis prope

Hamburg, ducatus *Oidenburgensis* et *Bremensis*, *Westphaliae*, *Hungariae*; in insulis *Graeciae* et in *Cypro*. 2.

Obs. Sprengel S. F. II. p. 30., M. a Bieberst. Fl. Taur. cauc. Suppl. p. 265. et Wahlenb. Fl. suec. p. 202 et 1054 conjungunt *O. spathaceum* cum *O. minimo*; etiam Gawler in Rec. Liliae. Redout. Journ. of Sc. II. p. 180. *O. minimum* H. Hew. idem dicit cum *spathaceo* Red., quod nomine *O. minimi* a Swartz. e Suecia tulisse monet Redouté: at certe diversae sunt species, ut etiam Smith in Fl. graec. II. cc. et in Engl. Fl. sub *O. luteo* docuit, cum *O. minimum* L., *arvense* Pers. et *spathaceum* Hayne tres distinctas sistere species dicat.

5. *G. bracteata*; scapo bracteato, unifloro, tereti; petalis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis; filamentis linearibus; foliis filiformibus, canaliculatis. ORNITHOGALUM *bracteatum* Torrey in Ann. of the Lyc. Nat. Hist. New York. 1827.

O. spathaceo affine. Torrey. In Rocky Mountains Americae septentrionalis. James. 2.

6. *G. reticulata*; bulbo solitario; folio radicali solitario floralibusque filiformibus, recurvatis; pedunculis subternis, umbellatis, pubescentibus; petalis exterioribus longioribus, aristato-acuminatis. ORNITHOGALUM *circinatum*; scapo nudo; pedunculis subternis, umbellatis, pubescentibus, petalis 3 exterioribus longioribus, acuminatis; fol. filiformibus. Linn. Suppl. p. 199. Willd. Spec. II. p. 115. M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 275. *O. reticulatum* Pall. it. 5. app. n. 85. t. D. f. 2. Poir. Enc. IV. p. 615.

„Simillima *G. minimae*, at distinctissima. Vagina laxa, fibrosa, reticulata, ferruginea, folium scapumque quasi cucullo circumdans. Folium radicale unicum, gracile, recurvatum, lineare, canaliculatum, scapo cymaque longius. Folia caulina 3-4, tot, quot flores, quibus adsident, figurâ radicalis. Cyma divisione et numero florum, ut in *minima*. Flores majores et speciosiores, quam in *lutea*. Petala exteriora valde subulata. Tota planta, flore excepto, hirsutiae minimâ canescente tecta. Pallas descripsit nomine *O. reticulati*, at misit nomine *circinati*, alias non mutassem. Perinde, quale sit nomen, modo retineatur, ne iterum confusio scientiam laedat.“ Linn.. In specim. nostris a Pallas lectis: bulbus subrotundo-ovatus, fuscus, 3-4 lin.. Vaginae aliquot scapum foliumque basi includentes, erectae, laxae, fuscae, eleganter reticulatae, 1-1½ poll.. Folium radicale basi erectum, dein reflexum vel inflexum, subfiliforme, canaliculatum, acutiusculum, inferne pilis brevibus sparsis, 3½-5 poll., filo emporetico tenuior. Scapus solitarius, erectus, teres, superne pubescens, cum umbella 2-3 poll.. Involuceri folia plerumque 3 aliquot brevioribus inter-

mixta, folio radicali similia, sed basi latiora planioraque, magis pubescentia recurvo-patentia, 1-2 $\frac{1}{2}$ poll., basi $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lin. lata. Pedunculi plerumque 3, erecti, teretes, involucre breviores, dense pubescentes, inaequales, 3-14 lin. Petala lutea, extus forte virescentia?; exteriora lanceolata, longissime acuminata, obsolete striata, margine submembranacea, 7-8 lin., 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata; interiora lineari-lanceolata, acuta, margine membranacea, 5-6 lin., $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. Stam. petalis exterioribus duplo breviora, erecta, aequalia; filamenta subulata, inferne quidquam dilatata, antherae oblongae, fere lin.. Germe oblongum, 1 $\frac{1}{2}$ lin.. Styl. stamina paulo superans, superne subelavatus. Stigma obsolete lobatum, truncatum. *In arenosis deserti caucasico-caspici inter Astrachan et Kisljar; in Tauria. 4.*

7. *G. pusilla*; caule anguloso, diphylo, sub-2-floro; foliis radicalibus linearibus, gramineis: caulinis oppositis, lanceolatis, spathaeformibus, glabris. *Schmidt Fl. Boh. Cent. II. p. 41. n. 339.* (sub *ORNITHOGALO pusillo*, uti sequentes). *O.* bulbo folioque radicali lineari, basi canaliculato solitario; scapo sub-2-floro; pedunculis laxis; petalis linearibus, acutiusculis, staminibus duplo longioribus; spathis oppositis lanceolato-linearibus. *Tausch in Bot. Zeit. 1828. p. 450.* (qui in *Schmidt* synonyma excludit). *Mert. et Koch D. Fl. II. p. 549. Reichenb. Ic. C. II. p. 8. t. 117. ORNITH. pratense pusillum*, scapo nano subbifloro; bracteis filiformibus, subspathaceis; pedunculis approximatis. *Hornung in Bot. Zeit. 1824. p. 47. et p. 56. O. arvense* β *Pohl Tent. Fl. boh. II. p. 18. et hoc teste: O. uniflorum Tausch. et Richter.*

Pedunculi inaequales, valde laxi et subnutantes. Petala longiora, angustiora, magis acuminata, minus inaequalia, quam in *O. Clusii*. Flores *O. pratensi Pers.* proximi. *Tausch.* Scapus vix digitalis, 1-2-florus. Involucrum foliolum exterius saepius omnino spathaceum. Folium radicale solitarium laxissimum: *Hornung*, qui specimina similia *O. pratensis* in montibus gypsaceis se legisse asserit. *In Bohemia prope Pragam. 4.*

Obs. Species dubia et ulterius indaganda. Specimina plurima, quae nomine *O. pusilli* accepimus ad sequentem *G. Clusianam* pertinent; specimina, quae cl. *Reichenbach* clo *Fanzer* nomine *O. pusilli* communicavit, non differant a speciminibus minoribus *G. pratensis*, quacum etiam *Hornung O. pusillum Schmidt* conjunxit. *Treviranus in Abh. Berl. Ges. Nat. F. 1813. p. 148. O. pusillum* tantum *O. lutei* L. varietatem esse asserit, cum *O. pratense Pers.* illi verum *O. luteum* L. sit. Attamen non ausi sumus *O. pusillum Schmidt* instar varietatis *G. pratensis* exhibere, cum *Tausch* bulbum solitarium describat, quod minime in *G. pratensi*.

8. *G. Clusiana*; bulbo solitario, ovato; folio radicali solitario, lineari, canaliculato-triquetro: floralibus suboppositis, lanceolatis, subciliatis, altero spathaceo flores superante; scapo tetragono; umbella sessili, 1-4-flora; petalis lineari-lanceolatis, obtusis, glabris. *ORNITHOGALUM Clusii*, bulbo folioque radicali lineari basi canaliculato solitario; scapo sub-5-floro; pedunculis umbellatis, strictis; petalis inaequalibus: exterioribus obtusissimis; spathis oppositis, lineari-lanceolatis. *Tausch in Bot. Zeit. 1828. p. 431. O. pusillum*; fol. radic. solitario

canaliculato-triquetro; floralibus oppositis; pedunc. simplic. umbellatis; petalis glabris. *M. a Bieb. Fl. Taur. Cauc.* 1. p. 273? *Baumg. Enum.* 1. p. 294. *Besser Enum. pl. Volh.* p. 56. *Presl. Fl. Cech.* p. 75. (fid. *Tausch*). *Host Fl. austr.* p. 430. (excl. syn. *O. Sternbergii* et excl. descript. bulbi). *O. marginatum Pall. ind. taur. in nov. Act. Petrop.* X. p. 509. *O. trigonophyllum Auctor.* *O. X.* sive pannonicum luteo flore. *Clus. Hist.* 1. p. 189. β spathis floribus plus duplo longioribus; sepalis obtusioribus; fol. canaliculatis, carinatis. *Besser in litt.* γ fol. latioribus. *Besser Enum.* l. c.

Bulbi tunicae intensius fuscae quam in *O. pusillo Schm.*; scapus validior, plerumque 3-florus; pedunculi breviores, fere congesti, subaequales; flores minores. Icon. Clusiana melius exprimit plantam nostram, quam illa a *Reichenbach* data. *Tausch*. In specimenibus nostris bulbi solitarii, obliqui, 2-4 lin., ut videtur e bulbillis 2, tunicis pluribus flavescenti-fuscis inclusis, e quibus 1 foliifer; fibris numerosis tenuibus, albidis. Folium radicale erectum vel suberectum, scapo duplo longius, laete viride, glabrum, $2\frac{1}{2}$ -4 poll., $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lin. latum, carinatum et fere canaliculato-triquetrum, sub florescentia apice emarcidum; floralia plerumque 2 subopposita, subinde foliolis aliquot paucis intermixtis, fere glabra vel pilis parvis ciliata: alterum basi convolutospathaceum, ovato-lanceolatum, dein in acumen longum canaliculato-triquetrum attenuatum, $\frac{3}{4}$ -2 poll., basi 1-2 lin. latum; alterum lanceolatum, duplo minus, pedunculos vix superans. Scapus erectus, acute tetragonus, basi attenuatus, glaber, 1- $2\frac{1}{2}$ poll. Umbrella sessilis, nec pedunculata, plerumque 2-3-flora, saepius 1-4-flora. Pedunculi inaequales, angulosi, glabri, 5-9 lin. Flores similes illis *G. spathaceae*. Petala subaequalia, 5-6 lin., line. fere lata, lineari-lanceolata, vel lineari-oblonga, obtusa, glaberrima, dorso quidquam rugosa, extus viridia et purpurascens, praesertim apice, intus flava, praesertim margine, ubi interiora membranacea. Stam. petalis duplo fere breviora; filamenta subulata; antherae subrotundo-ovatae, luteae. Germen obovato-oblongum, trigonum, stylo brevius. Stylus longitudine staminum vel paulo longior, basi tenuior. Stigma truncatum, puberulum. Affine *G. spathaceae* et *minimae*, sed ab utraque abunde diversa. *Besser*, qui *O. minimum L.* cum? instar synonymi adducit, notat tunicas bulbi pallidas, ad lentem foveolis seriatis alternantibus ex epidermide destructa, ut in *lutea* et *sylvatica*. In siccis arenosis Bohemiae, Moraviae, Hungariae, Transylvaniae, Russiae merid. et Italiae; β et γ per Volhyniam et Podoliam. 4.

Obs. Vix dubitamus, quin huc pertineat *O. pusillum M. a Bieberstein*, a clo *Reichenbach* idem cum *O. stenopetalo (G. pratensi)* dictum. In plapta *Biebersteinii*, ad quam *O. pusillum Schmidt*, *O. marginatum Pall.*, *Clus. Hist.* p. 189. et *Bauh. Hist.* 2. p. 624. ab auctore laudantur: „bulbus grumosus; folium radicale caule multo longius, angustissimum, canaliculatum, argute carinatum ut triquetrum appareat: flores pauci, umbellati ex sinu foliorum floralium oppositorum, bracteis propriis nullis. Affinium maximum praecox.“ Omnia haec quadrant in specimenibus nostris hungarica, bohemica et italica, praeter bulbum grumosum, cujus genuinam significationem non intelligimus. Descriptio, quam *Host O. pusillo* suo, (quocum perpetuo *O. Sternbergii* conjunxit), adjecit, omnino quadrat in plantam nostram praeter ea, quae de bulbo dicit et quae aperte e specimenibus *G. pratensis* petita sunt. — Ad *G. nostram Clusianam* forte spectat; *Omnigalum tunicatum*; bulbo solitario, oblongo, subhorizontali; folio radicali solitario, canaliculato, caulam

caulem longe excedente: floralibus oppositis, villosis; pedunculis subumbellatis. *Presl* apud *Spreng. S. Veg. II. p. 30.* et in *Bot. Zeit. 1824. p. 237.* quod a *Kosteletzky* in *Clav. anal. Fl. Boh. p. 50.* varietas *O. pusilli Schmidt* dicitur. Conf. *Obs. ad G. pusillam.*

9. *G. podolica*; foliis triquetris, subcanaliculatis; scapo angulato; spathis margine villosis, vix florum longitudine; umbellâ 4-florâ; petalis obtusiusculis. *ORNITHOG. podolicum Bess.* in litt.

An a *G. Clusiana* diversa? In *Podolia. 4.*

10. *G. erubescens Bess.*; foliis linearibus, canaliculatis, carinatisque; spathis pluribus; umbellâ multiflorâ; pedunculis subramosis; petalis acutiusculis. *ORNITH. erubescens Bess.* in litt.. *Ejusd. Enum. p. 45.*

Flores congenerum minimi, extus demum fusciscentes. An varietas *G. Liotardi*? *Jan* in litt. In *Podolia et Volhynia. 4.*

11. *G. chrysantha*; bulbo solitario, nidulante, subgloboso; foliis radicalibus 2 angustissime linearibus, glabris: floralibus oppositis, basi subspathaceis, ciliatis; scapo 1-3-floro; pedunculis glaberrimis, bracteatis, simplicibus ramosisque; petalis obovato-oblongis, obtusis, glabris. *ORNITHOGALUM chrysanthum Jan Elench.*

Bulbilli gemini, parvi, ovati, erecti, tunica intense fusca scariosa inclusi; uterque folium emittens. Folia radicalia semper 2, angustissima, fere lineari-filiformia, obtusiuscula, apice calloso fusciscente, glaberrima, flaccida varieque flexa, scapo paulo longiora, laete viridia, trinervia, 3-4 poll., $\frac{1}{2}$ lin. lata; floralia 2 opposita, rarius 3, inaequalia, basi concava dilatata semiamplexante ovato-lanceolata, dein fere plana et anguste linearia, uti radicalia apice obtuso calloso fusciscente, obsolete nervosa, basi ciliis parvis albidis, erectiuscula, floribus breviora; alterum majus 8-12 lin., basi $1\frac{1}{2}$ -2 fere lin. latum, alterum 6-8 lin.. Scapus solitarius, erectus, gracilis, vix crassitie foliorum radicalium, glaber, $1\frac{1}{2}$ -3 poll., 1-3-florus, plerumque 2-florus. Pedunculi erecti, graciles, glaberrimi, 10-14 lin., simplices, vel 2 in pedunculo communi brevi, ex his unus vel alter rarius iterum divisus, ut inde flores 3; ad pedunculi divisionem bracteolae 2 oppositae lineari-lanceolatae acutae, ciliatae, 4 lin., $\frac{1}{2}$ lin. latae; in pedunculis simplicibus infra medium bractea similis, sed angustior adhuc. Flores erecti, splendide aurei. Petala semipatentia, omnia obtusa, glaberrima, trinervia, 4-4 $\frac{1}{2}$ lin., $1\frac{1}{4}$ lin. lata: exteriora oblonga, interiora obovato-oblonga. Stam. petalis $\frac{1}{3}$ breviora; filamenta setacea, basi vix dilatata, alterna paulo breviora; antherae ovatae, aureae, $\frac{1}{2}$ lin.. Stylus longitudine staminum, erectus, flavus, apice paulo incrassatus, staminibus multo crassior. Stigma subtrigonum, truncatum. Germen oblongum, angulosum. *Ad specimina a clo Jan* in *Sicilia prope Ficuzza lecta. 4*

12. *G. Liotardi*; bulbo solitario, nidulante, subgloboso; foliis radicalibus solitariis, rarius 2, semiteretibus, basi canaliculatis, fistulosis, glabris: floralibus oppositis: majore spathaceo, convoluto, basi ovato; pedunculis 1-5, umbellatis. pu-

bescentibus; petalis elliptico-lanceolatis, obtusis. *ORNITHOGALUM Liotardi*; scapo tereti, fistuloso; pedunculis subternis, inaequalibus; involucri subtriphyllo; foliis linearibus, semiteretibus, glaberrimis. *Sternb. Denksch. bot. Ges. II. p. 56. t. 3. Vill. Delph. II. p. 269. (in Obs. ad O. luteum). ORNITHOG. fistulosum Ram.*; scapo folioso, subunifloro; foliis radicalibus filiformibus, fistulosis, pedunculis pilosiusculis; perigonii laciniis lanceolatis, acutis. *Lam. et Decand. Fl. fr. III. p. 215. Lapeyr. H. abr. Pyr. p. 188. (excl. syn. O. bohemicum). Mert. et Koch Deutsch. Fl. II. p. 545. Red. Lil. t. 221. (excl. syn. O. bohemicum). O. bohemicum Poir. Enc. Suppl. IV. p. 195. (partim). Loisel. Fl. gall. 1. p. 200. (excl. definit. et synon.) Balbis Misc. p. 18. (excl. syn.)* β *fragiferum*; scapo bulbillarum capitulo terminato. *ORNITH. fragiferum Vill. l. c.*

Bulbus solitarius, subrotundus, solidus, tunica cinerea (bubillos 2, alterum multo minorem includente, magnitudine bulbi *G. arvensis*). Folium aut unicum (ut plerumque), scapum multo excedens (4-8 poll.); aut folia 2, altero breviora: in minoribus lineare, semiteretes, latere superiore plano ($\frac{1}{2}$ -2 lin. latum apice obtuso calloso); in majoribus ambo obsolete canaliculata, apice teretia, fistulosa, glaberrima. Scapus teres, fistulosus, glaber, 3-4 poll. (folio radicali paulo tenuior). Involuerum 2-4 phyllum, (folia floralia 2 opposita, folia 1-2 minora includentia); folio altero spathaceo ceteris multo latiore, (pedunculos subaequante vel paulo superante, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll., 5-6 lin. lato, inferne ovato, dein in acumen longum angustato, erecto vel semipatente; altero duplo fere minore, reliquis multo adhuc minoribus), omnibus nervosis glaberrimis. Pedunculis 2-5 (in specim. gallicis saepius 1), solidi, pubescentes, (rarius glabriusculi, 1-2 poll., nudi, vel foliolo parvo lanceolato, ciliato), simplices, in maximis tantum exemplaribus ramosi. Petala lutea, (sec. *Villars* subinde tantum 4 v. 5, quod nunquam vidimus, nervis 5-7 obsolete subvirentibus, subaequalia, 6-9 lin.); 3 exteriora latiora, oblongo-obtusa (2-3 lin. lata, glabra vel basi extus pilis aliquot raris; interiora magis lanceolata, $1\frac{1}{2}$ lin. lata). Stam. longitudine styli (vel paulo breviora), petalis duplo fere breviora; filamenta subulata, lutea; antherae tetragono-oblongae, concolores (1- $1\frac{1}{2}$ lin.). Germen oblongo-trigonum, virens, longitudine styli. (Stylus erectus, superne incrassatus.) Stigma obsolete. (Caps. acute trigona, petalis persistentibus decoloratis cineta. *Vill.*) Valde varians; primo anno folium 1 angustissimum; secundo scapus bracteis 2-4, in quarum medio glomerulus bulbillarum loco floris, tunc *ORNITHOG. fragiferum Vill.* (quod est *Decandolle* varietas bulbifera *Obs. lutei*); tertio pedunculi loco bulbillarum. *Exc. Com. a Sternberg.* In alpihus noricis circa Heiligenblut, *Pasterze Hoppe*; in alpihus Delphinatus *Taillefer, Liotard, Villars*; in Pyrenaeis *Ramond et Lapeyrouse.* 4.

Obs. Planta norica non differt a gallica nisi floribus plerumque umbellatis et foliis crassioribus. Perperam olim ab auctoribus gallicis *O. bohemicum* cum *O. fistuloso* confusum fuit, quod toto caelo diversum. — *Sprengel O. fistulosum Cand.* cum *fistuloso Wallr.* (GAGEA saxatili) commutasse videtur, cum hoc cum bohémico conjungat et *O. Liotardi* specie distinguat.

13. *G. pygmaea*; foliis radicalibus geminis, lineari-filiformibus, canaliculatis; floralibus alternis subciliatis; pedunculis simplicibus, subternis, villosis; petalis obtusis, glabris. ORNITHOGALUM pygmaeum Willd. Enum. H. Berol. p. 367.

O. pedunculare Presl. (fide Spreng.)

Bulbus solitarius. Caulis plerumque 1-interdum 3-florus. Accedit habitu ad *pusillam* Bieberst.; sed fere minor, et characteribus datis abunde diversa. In Germania boreali occurrit altera species hujus generis nova, *spathaceae* proxima. Aliam descripsit cl. Hoppe. Willd. l. c. In Hispaniae humidis prope Matritum. 4.

Obs. Specimina ORN. pygmaei, quae ex herbario unionis itinerariae wirttembergensis accepimus, et quae D. Fleischer prope Smyrnam legit, plurimis conveniunt cum adumbratione a Willdenow data; cum vero specimina genuina *G. pygmaeae* non vidissemus et specimina smyrnensia formis paucifloris *G. arvensis* admodum similia, non audemus eorum descriptionem sine dubio subjungere. Bulbi in his solitarii vel gregarii, duplices, ovati, 2-3 lin., e bulbillis 2 ovatis, erectis: altero minore, tunica atrofusca glabra inclusis; uno latere fibris numerosis intertextis, albidis. Folia radicalia plerumque 2, rarissime 3, erecta vel superne pendula, scapo longiora, anguste linearia, obtusula, obsolete carinata, glaberrima, 3-6 poll., 1/2 lin. lata; floralia 2 opposita et subopposita: exterius majus pedunculos superans rarius eosdem aequans, inferne spathaceo-dilatatum, concavum, ovatum, obsolete 7-nerve, dein in acumen lineare erectum vel apice recurvum attenuatum, 1-3 poll., basi 3 lin. latum; interius simile, sed duplo minus et minus attenuatum, fere lanceolatum; omnia glabra vel inferne parce ciliata. Scapus bulbillos interproveniens, erectus, 1-3-florus, crassitie foliorum, glaber, superne pubescens, 1 1/2-4 poll. Pedunculi teretes, erectiusculi, villosi, 10-16 lin., simplices vel subinde 2 in pedunculo communi brevi, et tunc ad eorum basin bracteae 2 oppositae lineari-lanceolatae, acutae, magis ciliatae quam folia floralia. Petala flava, deflorata extus apice purpurascens, glabra vel inferne ad nervum medium parce pilosa, 5-nervia; nervis 2 extimis magis obsolete, 4-6 lin., 1-1 1/2 lin. lata; exteriora oblongo-lanceolata, paulo latiora, interiora lanceolata, angustiora, subinde monstrosa dente uno alterove; omnia obtusiuscula. Stam. petalis 1/3 breviora; filamenta subulata, alterna paululum breviora; antherae ovato-oblongae. Stylus stamina paululum superans, crassus, trigonus, inferne tenuior, glaber. Stigma trigonum, obsolete trilobum. Germen obovatum, trigonum, retusum, glabrum.

14. *G. arvensis*; bulbo solitario, nidulante, subrotundo; foliis radicalibus binis, linearibus, canaliculatis, recurvis: floralibus oppositis lineari-lanceolatis; scapo angulato; pedunculis subramosis corymbosis petalisque lanceolatis acutis pubescentibus. ORNITHOGALUM arvense; scapo polyphyllo; pedunc. ramosis, teretiusculis, tomentosis. Pers. in Ust. Ann. XI. p. 8. t. I. f. 2. (excl. syn. Linn.) Henk. a Donnersm. l. c. p. 226. *O. corymbo* compos., multifl., pubescente; bracteis lanceolatis, ciliatis; fol. linearibus. Smith Prodr. Fl. graec. p. 250. Sibth. Fl. gr. t. 532. Wallr. Sched. 140. de Schlechtend. Fl. berol. 1. p. 193. Bönningh. Pr. Fl. mon. p. 421. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 545. Roth Enum. pl. Germ. l. 2. p. 41. Hornung in Bot. Zeit. 1824. p. 55. ORN. villosum M. a Bieb. Fl. Taur. Cauc. 1. p. 274. Suppl. p. 265. Willd. Enum. p. 368. Wahlenb. Carp. n. 315. Schult. Oestr. Fl. 1. p. 559. Baumg. Enum. 1. p. 294. Host Fl. austr. 1. p. 430. Ré Fl. torin. 1. p. 194. Gusson Prodr. Fl. sic. 1. p. 411. ORN. minimum Willd. Spec. II. 114. (excl. syn. Fl. suec. et Gunn.) Roth Germ. II. 1. p. 394. Schmidt

Bohem. n. 538. *Savi Bot. Etr.* II. p. 216. *Tenor. Fl. neap.* 1. p. 173. n. 190. *A. B. D. Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 215. (excl. β). *Lapeyr. H. abr. Pyr.* p. 185. *Balbis Fl. Lyon.* I. 2. p. 725. *Gmel. Fl. bad.* II. p. 58. *van Hall. Fl. belg. sept.* 1. p. 276. (excl. undique syn. *Linn.*) *Hoppe Bot. Zeit.* 1807. p. 145. *Fl. Dan.* t. 12. *Sturm D. Fl.* 12 H. *Red. Lil.* t. 502. f. 2. (haud bona). *Orn. minimum arvense Pers. Syn.* 1. p. 365. *Orn. luteum Pall. ind. taur.* *Orn. luteum β Poir. Enc.* IV. p. 612. (quoad descr., excl. quibusd. synonym. fid. *Poir. Enc. Suppl.* IV. p. 192. ubi iterum plura excludenda). *Stellaris minima Monch Meth.* p. 505. Phal. radice bulbosâ; stipulis maximis hirsutis; floribus umbellatis; petiol. multifloris. *Hall. Helv.* n. 1214. *O. luteum minus Bauh. Pin.* 71. (a *Linnaeo ad minimum ductum*). *O. luteum Seguier. veron.* II. p. 67. (fide *Pollini Fl. veron.* p. 452.) β . florum floralium axillis bulbiferis. *O. villosum β M. a Bieb. Fl. taur. cauc.* 1. p. 275. *O. minimum β Tenore Fl. neap.* l. c. C. *O. min. B. Red. Lil.* 502.* *O. proliferum Pall. ind.* *O. bulbiferum minimum Column. Ecphr.* 325. 324. γ . acaulis; scapo fere nullo. *O. min. γ acaule Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 215. *O. minimum C. Red. Lil.* l. c. δ . scapo 1-2 floro.

Bulbus saepius gregarius, ovato-rotundatus, e bulbillis 2 erectis, inaequalibus, tunicis fuscis vel fuscescenti-cinereis inciuis, 2-4 lin.. Folia radicalia 2, rarius 1 vel 3, inferne erecta, dein plerumque patienti-recurva, scapo longiora, anguste linearia, acuta, canaliculata, obsolete carinata, saepe torta, glabra vel puberula, 3-9 poll., $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata; floralia opposita vel subalterna, linearilanceolata, acuminata, basi dilatata, quidquam concava et subspathacea, praesertim infimum, flores aequantia vel paulo superantia, obsolete nervosa, margine albo-villosa, $\frac{3}{4}$ -5 poll., 2-4 lin. lata; altero minori. Scapus bulbillos inter proveniens, erectus vel subflexuosus, crassus, angulosus, inferne glaber, superne pubescens et plerumque rubellus, 1-6 poll.. Corymbus 3-multiflorus. Pedunculi teretes, erecti, patentes et subnutantes, ramosi vel simplices, dense pubescentes v. villosi, rarius glabriusculi, $\frac{1}{4}$ -2 poll.. Bracteae numerosae, solitariae, majores linearilanceolatae, reliquae lineares, pubescentes, magnitudinis valde varia. Petala subaequalia, intus lutea, extus virescentia et apice saepe purpurascens, 3-nervia, 5-7 lin., lin. lata; exteriora dorso pubescentia et apice subfornicato barbatula; interiora ad dorsi basin tantum puberula. Stam. petalis duplo fere breviora: filamenta subulata; antherae ovatae, luteae. Germen obovatum, trigonum, retusum, glabriusculum; valvulae apice cordato-emarginatae. Stylus stamina paulo superans, trigonus, puberulus; stigmate truncato. Variat petalis staminibusque 8, petalis apicem versus saepius dente uno alterove. *D. Schultz* communicavit etiam specimen flore unico e 2 composito, petalis staminibusque 12, germinibus 2, in quo folia floralia fere alterna. β differt tantum foliis floralibus basi glomerulum bulbillarum numerosorum foventibus, a corymbo remotis et plerumque multo longioribus;

corymbis plerumque paucifloris; γ varietas tantum scapo humilimo. δ scapo 1-2 floro γ a *G. saxatili* omnino diversa. In agris, vineis et arvis per totam fere Europam, praesertim mediam, in Caucaso, Tauria, et in Asia minore. 4.

Obs. Hornung in Bot. Zeit. 1824, p. 55. *O. Liotardi*, bohemicum et saxatile varietates tantum *O. arvensis* dicit, quod certe nimium: eadem bulborum structura etiam in pluribus speciebus adesse potest.

15. *G. bohemia*; bulbo solitario, nidulante, subgloboso; foliis radicalibus 2 subfiliformibus, canaliculatis, solidis: caulinis alternis, lanceolatis, acuminatis; flore terminali, subsolitario; petalis oblongo-lanceolatis, obtusis, fere glabris; germine impresso. ORNITHOGALUM bohemicum Zauschn. Act. boh. II. p. 121. c. ic. (haud bona). Schmidt Fl. boh. n. 556. *O.* scap. folioso, 1-floro; fol. rad. filif.: caulinis alternis lanceolat.; pedunc. pilosiusculis; pet. aequal., lanceol., obtusiusc. Willd. Spec. II. p. 115. Pohl in Bot. Zeit. 1806. p. 542. Mert. et Koch Deutsch. Fl. II. p. 544. (excl. syn. *O. fistulosi* Wallr., *O. lutei* β Roth et β saxatilis). Roth Enum. pl. Germ. I. 2. p. 45. Sturm D. Fl. t. 23. *O. Zauschneri* Pohl. Fl. boh. II. p. 14.

Bulbi ovato-globosi e bulbillis 2 tunicis fuscis inclusi, duplo minores quam in *G. arvensi*, 2-5 lin., saepius plures gregarii; fibris radicalibus copiosis albidis. Folia radicalia fere semper 2, rarius 3, (nec numerosa ut in ic. Zauschn.), scapo longiora, inferne erecta, dein recurvo-patentia vel varie flexa, recumbentia, apice saepe torta, subacuta, semiteretia, apice superne planiuscula, basi canaliculata, glabra, 2-5 $\frac{1}{2}$ poll., $\frac{1}{4}$ lin. lata, subflorescentia plerumque apice emarcida; caulina 3-4, rarius 5, glabra vel pilis paucis ciliata: infimum basi concavum et dilatatum, lanceolatum, dein attenuatum in acumen varie flexum, semiteres, scapum superans vel aequans, 1-1 $\frac{1}{2}$ poll., basi 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. latum; reliqua lanceolata, acuminata, erecta, sensim minora, 3-4 lin., scapum aequantia vel eodem breviora. Scapus teres, 1-2, rarius 3-poll., vix crassitie filii emporetici, inferne glaber, superne, uti pedunculus, plerumque pilis paucis brevibus, ut plurimum 1-rarius 2-florus, rarissime 3-5-florus. Flores erecti, flavi. Petala subaequalia, 3-7 lin., nervis 5: exterioribus a medio ramosis, et inde superne obsolete 7-nervia, glabra vel basi ad margines dorsumque pilis rarissimis; exteriora lanceolata, 1 $\frac{1}{2}$ lin. lata; interiora obovato-lanceolata, magis erecta, 2 fere lin. lata, omnia obtusa. Filamenta petalis $\frac{1}{3}$ breviora, subulata; antherae subrotundo-ovatae aureae, $\frac{1}{2}$ lin.. Germen obovatum, apice impresso, acute (?) angulosum, 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin.; valvulis, ut videtur e capsulis siccis immaturis, impressis, cordato-emarginatis. Stylus erectus, longitudine staminum, superne incrassatus. Stigma truncatum, obsolete lobatum. In saxosis et inundatis siccis Bohemiae, Saxoniae et Silesiae. 4.

16. *G. saxatilis*; bulbo solitario, nidulante, subrotundo; foliis radicalibus 2 filiformibus, canaliculatis, solidis: caulinis alternis, lanceolatis, acuminatis, margine scapoque subunifloro pubescentibus; petalis lineari-oblongis, obtusis: exterioribus basi villosis; germine non impresso. ORNITHOGALUM saxatile

Koch in Herb. plur. ORNITH. bohemicum β *saxatile Mert. et Koch D. Fl. II. p. 545. ORN. fistulosum*; fol. radical., filiform. fistulosis: floralibus alternis; pedunculis pubescentibus; scapo subunifloro; petalis lanceolatis hirsutis; staminibus subulatis; bulbo solitario. *Roth Enum. pl. germ. I. 2. p. 42., et hoc teste: Wallr. Sched. crit. 1. p. 141. (excl. syn. Zausch. et Schmidt). O luteum* β *Roth Fl. Germ. T. II. P. I. p. 293. Ejusd. Beytr. II. 140.*

Valde praecox. Bulbi rotundato-ovati, 2 lin., e bulbillis 2 tunicis fusco-cinereis inclusis; fibris tenuissimis fuscis. Folia radicalia 2, subinde 3, scapo longiora, crassitie setae porcinae, semiteretia, acuta, supra canaliculata, glabra vel pilis raris brevibus, inferne erecta, dein patenti-recurva, solida ut videtur, $1\frac{1}{2}$ -4 poll.; caulina 2-4, alterna, amplexicaulia, pilis albidis ciliata; infimum majus, scapo longius, spathaceum, magis remotum, basi subconcavum et dilatatum, 1- $1\frac{1}{2}$ lin. latum, dein attenuatum in acumen filiforme varie flexum, $\frac{1}{2}$ -2 poll.; superiora sensim minora, lanceolata, acuminata, plana magisque pubescentia, longitudine floris brevioraque. Scapus solitarius, teres, gracilior quam in *G. bohémica*, inferne crassitie foliorum radicalium, superne crassior pilisque crispis densis albidis villosus, plerumque 1-florus, saepius quidquam flexuosus, $\frac{1}{2}$ -2 poll.. Flores erecti, pallidiores et minores quam in *G. bohémica*. Petala subaequalia, 4-6 lin., nervis 3-7 obsoletis; exteriora lineari-lanceolata vel anguste oblonga, minus obtusa quam in *G. bohémica*, $\frac{3}{4}$ lin. lata, dorso virescentia et villosa, praesertim basin versus; interiora apice latiora, lin. lata, margine latius membranaceo, basi paulo attenuata. Stam. petalis $\frac{1}{3}$ breviora, alterna paulo breviora; filamenta capillaria; antherae subglobosae, flavae, minores quam in *bohémica*. Stylus staminibus paulo brevior, in defloratis longior, sursum inerassatus; stigma subrotundum, obsolete lobatum. Germen obtusum apice vix retuso, stylo brevius, obovato-trigonum, lateribus vix impressis, quidquam convexis: valvulis vix emarginatis. *G. bohémica* proxima differt: staturâ majori robustiorique, scapo minus pubescente; petalis omnino fere glabris latioribus, praesertim vero germinis formâ nimis neglecta, et in utraque ulterius in vivis indagandâ. *G. arvensis* varietas uniflora abunde differt. *ORN. fistulosum Roth* omnino differt ab *O. fistuloso Dc. (Gag. Liotardi)* et nobis huc spectare videtur, quamvis folia fistulosa dicat. *In rupium fissuris Donnersberg, prope Kreuznach Koch, prope Halam Roth, Wallroth. 4.*

17. *G. Szovitsii Besser*; bulbo solitario, nidulante, intricato-fibrilloso; foliis radicalibus 2 filiformibus, subcanaliculatis: caulinis alternis, lanceolatis, acuminatis, pubescentibus; scapo villosa, ramosa 3-multifloro; petalis oblongo-lanceolatis, obtusis, striis maculisve purpureis, dorso pubescentibus; germine impresso. *ORNITHOGALUM Szovitsii Lang Herb. ruth. Cent. 1. n. 61. et in Bot. Zeit. 1827. Beyl. p. 64.*

G. bohémicae valde affinis et forte mera varietas ulterius in vivis examinanda. In speciminibus nostris a cels. *Besser et Lang* communicatis: bulbi ovati e bulbillis 2 subrotundis tunicis fuscis inclusis, 2-3 lin., fibris numerosis longis, villosis, fuscis intri-

cati. Folia radicalia 2 scapo longiora, patenti-recurva, sub flo-
rescentia plerumque emarcida, semiteretia, supra planiuscula vel
quidquam canaliculata, glabra v. puberula, 2-3 poll., $\frac{1}{2}$ lin.
lata; caulina 3-5, pilis albidis puberula ciliatave: infimum maxi-
mum, scapo longius, basi spathaceo-dilatatum, apice in acumen
longum filiforme varie flexum attenuatum, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ poll., $2-2\frac{1}{2}$
lin. lata; reliqua sensim breviora, lanceolata, basi subspathacea,
acuminata, erecta; minima ad pedunculorum divisiones. Scapus
erectus, subflexuosus, foliis radicalibus crassior, teres, dense pu-
bescens, 1-2 poll., 5-10 florus; rami erecti, teretes, axillares,
fastigiati, 1-2-flori, pubescentes, foliolo uno alterove. Flores
erecti, flavi, sec. Lang in vivis apicem versus purpureo-striati
maculatique. Petala subaequalia, 4-7 lin., nervis 3 exterioribus
ramosis; exteriora oblongo-lanceolata, dorso pubescentia, prae-
sertim basi, lin. et paulo ultra lata; interiora superne latiora
margineque magis membranacea, anguste obovato-lanceolata,
glabra, $1\frac{1}{2}$ fere lin. lata. Stam. petalis $\frac{1}{3}$ vel duplo breviora:
filamenta alterna paulo breviora, capillaria; antherae subrotundo-
ovatae, aureae, $\frac{1}{2}$ lin.. Germen obovato-trigonum, retusum;
valvulis, ut videtur, lateribus impressis apice emarginatis. Sty-
lus clavatus, primum longitudine staminum, serius $\frac{1}{3}$ longior.
Stigma subrotundum, truncatum, lobatum. In graminosis
apricis circa Odessam: Szovits, Lang et Besser. 4.

18. *G. chlorantha*; scapo folioso, paucifloro; foliis al-
ternis: inferioribus filiformibus, superioribus lineari-lanceo-
latis; pedunculis glabris; petalis obtusis, inaequalibus. ORNI-
THOGALUM *chloranthum* M. a Bieb. Fl. t. c. Suppl. p. 265.

„Proxima *bohemicae*, et perquam affinis, nisi fors eadem cum *G.*
triflora. Bulbus globosus, magnitudine Avellanae, fibrillis pluri-
mis intricatis velatus, ut in *bulbifera*. Caulis digitalis palmarisque,
teretiuseculus, basi subvillosus. Folium radicale filiforme unicum,
caule longius: caulina radicali similia, caulem superantia; supe-
riora breviora, basi dilatata, omnia subtilissime striata, margine
praesertim pilis albis mollibus vagis pubescentia. Flores magni-
tudine *O. lutei*, nec formam multum abludentes, terminales, et
unus alterve lateralis ex axillis foliorum superiorum. Pedunculi
elongati, subcorymbosi, medium versus folio uno alterove instructi
parvo, ut plurimum simplices, uniflori, subinde biflori. Petala
oblonga, glabra, striata: exteriora viridia, margine angusto, lu-
teo, tenuiore; interiora minora, breviora, dorso viridia, mar-
gine luteo latiore. Stamina subulata, tenuia. Stylus staminibus
longior. M. a B. In Promont. caucasici septentrio-
nalis campestribus apricis; in hortis circa Kisljar. 4.

19. *G. triflora*; folio radicali solitario; scapo subtrifloro;
pedunculis racemoso-corymbosis; petalis oblongis, obtusis.
ORNITHOGALUM *triflorum* Ledeb. Mém. de l'Acad. de Pe-
tersb. 1812. p. 529.

„Bulbus solitarius, subglobosus, centralis. Folium radicale lineare,
longitudine fere scapi erecti, stricti, teretis, medio folio unico
oblongo, lineari, acuto, marginibus valde inflexis concavo, et
fere spatham referente. Interdum alterum adhuc folium simile
apici propius, minus. Flores rarius 2-5 in racemo bifido, flore
intermedio solitario. Flores erecti; pedunculi flore duplo tri-

pluve longiores, inferiores bracteis 2; alterâ ad basin, alterâ supra eandem sessili, lanceolato-linearî, superiore terminali plerumque ebracteato. Cor. patens, petalis albidis? alternis latioribus, venis coloratis. Filamenta capillaria. Stylus staminibus longior. Haud dissimilis *O. striato* Willd. et *altaico* Laxm. (quae una eademque species videntur ill. *M. a Bieberst.*), ab utroque diversa radice bulbosâ in illis tantum fibrosâ; folio radicali solitario latiori, numero florum, ab *altaico* petalis angustioribus. *Ledeb.* In alpibus Sibiriae. 4. Communicavit *Tilesius*.

20. **G. bulbifera*; bulbis solitariis, aggregatis; caule folioso, simplici unifloro vel ramose 2-5-floro, pubescente; foliis alternis, lineari-subulatis, canaliculatis, pubescentibus, basi bulbiferis: radicalibus subfiliformibus; petalis subaequalibus, acutis: interioribus margine membranaceis. ORXITHOGALUM *bulbiferum*; bulbis axillaribus; caule polyphyllo. *Linn. Suppl.* 199. *Willd. Spec.* II. p. 112. *M. a Bieb. Fl. taur. cauc.* 1. p. 272. *Pall. it. 2. app.* 106. t. Q. *Reichenb. ic.* t. 117. *Amm. Ruth.* n. 140. *O. bulbigerum et bulbosum Herbar.* β major; caule ramoso 5-floro; foliis latioribus; floribus majoribus. *Besser. Lang in Bot. Zeit.* 1827. *Beyl.* p. 64.

Distinctissima planta caule simplici unifloro; foliis alternis filiformibus; bulbillo in axillis omnibus; floribus *O. minimi*, luteis; petalis subulatis. *Linn.* Bulbilli plures ovati, fusciscentes, 2 lin. diam., fibris radicalibus numerosis longis fere absconditi. Caulis erectus, teres, pube brevi cinerascens, $1\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$ poll., simplex flore terminali solitario, vel ramis 1-2 e summis axillis, basi subpatentibus, sed mox erectis, unifloris. Folia radicalia 2 circiter, caulem superantia vel eodem breviora, patentirecurva, teretiuscula, canaliculata, $1\frac{1}{2}$ -4-poll., caulina numerosa, sparsa, erecta, apice plerumque recurva, acuta, superne sensim breviora, canaliculata, rarius planiuscula, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ lin. lata, omnia, praesertim inferiora, basi bulbillo subgloboso pallide fusciscenti magnitudine noduli aciculae; pubes brevis cinerascens. Flores lutei, dorso virentes, erecti. Petala aequalia, 4-6 lin., glabra; exteriora lanceolata, acuta, margine submembranaceo, basi vix angustata, $\frac{3}{4}$ -1 lin. lata; interiora obovato-lanceolata, obtusiora, basi attenuata, margine late membranaceo fere albido, lin. lata. Stam. petalis duplo fere breviora, 3 alterna paulo breviora; filamenta capillaria; antherae ovatae, flavae, $\frac{1}{2}$ lin. Stylus stamini paulo superans, superne paulo incrassatus. Stigma trigonum, obsolete lobatum. Caps. subrotundo-ovata, 5 fere lin., petalis persistentibus brevior; valvulis sulco medio. β 6 poll., caule crassitie pennae corvi minus pubescente; ramis 2, quorum uterque 5-florus: floribus solitariis in pedunculis axillaribus gracilibus $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ poll.; foliis caule brevioribus, magis planis, lin. fere latis; petalis 6-7 lin., lin. et ultra latis; stigmatibus magis lobato. In *Tauriae* collibus lapidosis, in arenosis deserti *caucasico-caspici*, in *Sibiria*; β circa *Odessam*, *Besser.* 4.

21. *G. fibrosa*; radicibus fibrosis, intertextis; foliis subulatis, radicalibus, subulatis, canaliculatis; scapo 1-floro, bre-

vissimo. *ORNITHOGALUM fibrosum Desf. Fl. Atl. I. p. 294. t. 84. Poir. Enc. Suppl. IV. p. 105.* - β caule foliis longiore. *ORNITH. fibrosum β hirtum Vivian. Fl. Lyb. p. 19.*

Habitus *G. luteae*. Bulbus parvus, ovatus; fibris gracilibus, numerosissimis, tortuosis. Folia radicalia 4-5, glabra, inaequalia, 5-9 poll.. Scapus nudus, 1-2 poll.. Corolla intus flava, extus virescens, *G. luteae* similis. Petala linearia, acuta. Stam. corollâ duplo breviora. Floret hyeme. *Desf.* In β : bulbus ovatus, squamosus, fibrillis simplicibus radicanibus totus tectus. Scapus filiformis, uniflorus, hirtus uti tota planta. Folia tria simul e caulis nodo nec e squamis bulbi radicalis, linearia, acuta, canaliculata, caule breviora. Petala lanceolato-linearia, acuminata, striata, margine membranacea, exteriora tria majora. Stam. corollâ breviora; filamentis basi dilatatis. Stylus longitudine staminum. Stigma crassiusculum. Germen trigonum. *Vivian. et Bertol. in litt.* In arenosis prope *Kerwan*; β in deserto *Syrteos magnae*. 4.

22. *G.?* *uniflora*; bulbo solitario; scapo diphylo, unifloro; foliis suboppositis, lanceolato-linearibus, planis; petalis exterioribus lanceolatis, subretusis: interioribus obovato-ellipticis, duplo fere latioribus. *ORNITHOGALUM uniflorum Laxm. Nov. Act. petrop. XVIII. p. 529. t. 6. f. 5. Linn. Mant. 62. Willd. Spec. II. p. 111.*

Refert omnino *G. luteam*; sed pedunculus indivisus, 1-florus. Flos *TULIPA sylvestri* dimidio minor, *G. lutea* triplo major. Petala lanceolata, obtusiuscula, lutea, subtus viridia. Filamenta et antherae luteae, petalis breviora. Germen oblongum. Stylus longitudine staminum. Stigmata 5, obtusa, omnia lutea. Folia caulibus 2, altero superiore, longitudine ambo floris s. plantae, *lutea* duplo latiora. II. V. In speciminibus nostris spontaneis: bulbus ovatus, fuscus, ut in *Tulipa*, 6-8 lin.. Scapus solitarius, erectus vel inferne quidquam flexus, glaber, teres, vix crassitie pennae corvi, 3½-4 poll.. Folia radicalia nulla, caulina 2, subopposita vel subalterna, in medio circiter scapi, erecto-patentia, semiamplexicaulia, plana vel basi paululum canaliculata, obtusiuscula, glaberrima, obsolete nervoso-striata, utrinque quidquam attenuata, 2-5 poll., 2-4 lin. lata. Flos solitarius, terminalis, erectus, ut videtur luteus, 1½ poll. diametr.. Petala semipatentia, undique glabra; exteriora 8-10 lin., 2½-3½ lin. lata, lanceolata et elliptico-lanceolata, obtusa, medio nervis longitudinalibus obsolete; interiora obovata, basi angustata, acumine vix conspicuo, apice margine plerumque involuto, medio nervis longitudinalibus 5 conspicuis e quibus laterales plures obliqui, 9-10 lin., 5-5½ lin. lata. Stam. corollâ duplo breviora; filamenta glabra, plana, erecta, apice subulata, alterna breviora; antherae ovato-oblongae, 1½ lin.. Germen ovatum, 5 lin.. Stylus erectus, subclavatus, stamina aequans. Stigma truncatum, obsolete trilobum, sub lente puberulum. Vix hujus generis. Habitus, bulbus et flos *TULIPAE* potius, stylustamen a *Tulipis* diversus. Nomine *TULIPAE altaicae Gebler* passim in Herbariis occurrit. In *Sibiriae montium Sinie Sopka et Maloi Altai summo cacumine*, in monte caeruleo. 4.

23. *G.?* *bonariensis*; spathâ diphyllâ, brevi; floribus um-

bellatis. *ORNITHOGALUM spathaceum* Poir. Enc. IV. p. 618.
O. bonariense Pers. Syn. 1. p. 363.

Differt ab affini *lutea* floribus in spatha inclusis, cujus phylla squamae membranaceae, inaequales, latae, ovatae, acutae, 5-6 lin.. Scapus debilis 7-8 poll., nudus, foliis radicalibus longis, angustis. Flores parvi, striati, extus purpureo-albicantes, in pedunculis gracilibus, inaequalibus. Nervus in medio petali singuli crassior. Poir. Circa Buenos Ayres. *Commers.* 4.

24. *G. callosa*; folio radicali caulinoque unico, lineari, apice calloso; scapo 1-4-floro, pedunculis alternis; petalis lanceolatis, acutis, glabris. *ORNITHOGALUM callosum* Hit. *Schult. Oestr. Fl.* 1. p. 557.

Petala flava. In subalpinis Carpath. Div. Mauksch. *Kitaib.* 4.

1402. P U S C H K I N I A.

1. *P. scilloides* Adams; foliis radicalibus geminis. *M. a Bieberst. Fl. Taur. cauc.* 1. p. 277. *Suppl.* p. 266. *Cent. pl. ross.* II. t. 91. Adams in *Nov. act. petrop.* XIV. p. 164. t. B. Sims. *Bot. Mag.* 2244. *ADAMSIA scilloides* Willd. in *Mag. naturf. Fr.* II. p. 16. *Enum. Suppl.* p. 16. Lindl. *Collect. Fasc. V.* t. 24.

„Bulbus ovatus, cortice cinereo. Scapus spithamaeus, filiformis. Folium radicale 1, lanceolato-lineare; scapi 2 opposita, spithamaea. Racemus 2-5-florus, terminalis: pedunculis e glandula scapi. Corolla cyanea, laciniis caesiis.“ Adams. *Habitus et statura Sc. amönae* (i. e. *sibiricae*). Bulbus foliaque simillima. Flores magnitudine *Sc. amönae*. Pedicelli floriferi circiter longitudine floris, fructiferi longiores. Bracteae tantum rudimentum. Cor. tubo brevis; limbus triplo longior, patens: laciniis aequalibus, lanceolatis, obtusiusculis, praeter nervum dorsale tubo pallidioribus. Nectarium brevissimum, 6-dentatum: dentibus erectis, emarginatis. Stamina intra nectarium subordinata; filamentis brevissimis; antheris oblongis, acutis, flavis. Germen superum, ovatum. Stylus columnaris, longitudine staminum. Stigma oblongum, crassiusculum, simplex. Floris structura accedit ad *Tulbaghiam*: sed huic flores spathacei: tubo nectarioque longis: *Puschkiniae* flores nudi; tubo nectarioque brevissimis. *M. a Bieb.* Nectarii lacinulae obtusiusculae, denticulatae. Antherae oblongae, intra nectarium subsessiles et lacinularum ejus basin attingentes. Ergo stamina non subordinata. *M. a Bieb. Suppl.* In culta, quae omnino eadem ac illa in *Bot. Mag.*: bulbus subrotundus, sordide flavescenti-albidus, diam. pollic.. Folia 2-5, erecta vel suberecta, vaginantia, lanceolata, concava, apice acutiusculo subfornicata, glaberrima, 5-6½ poll., 4-8 lin. lata. Scapus solitarius, vel 2-5 ex eodem bulbo, erectus, 4-8 poll., foliis parum longior, teres, glaber. Racemus laxiusculus, erectus, 6-16-florus, 1-2 poll. Pedunculi sub florescentia erecto-patentes, antea et postea magis erecti, filiformes, primum caerulescentes, 2-4 lin., inferiores vero mox 8-12 lin.. Bracteae brevissimae, oblongae, obtusae.

concavae. Cor. primum subcernua, demum erecta, albida caeruleo pallidissimo suffusa, 8-9 lin. diametro; tubus vix lin., in limbum expansus nec constrictus; lacinae oblongae, obtusae, lineâ mediâ azureâ, 1½-2 lin. latae. Nectarium urceolatum, corollâ duplo brevius, albidum; dentibus 6 ovato-lanceolatis, lin., emarginato-denticulatis. Filamenta nectario adnata et inde antherae sessiles, oblongae, obtusae, flavae, ½ lin., nectarium laciniis oppositae earumque basin vix superantes. Germen ovatum, nectarium basin replens, lineis 6 longitudinalibus. Stylus nectarium subaequans, stamina superans, erectus, apice subuncinatus, albidus. Stigma subsimplex. *In jugis subalpinis Ararat, ad fluvios Debeda et Aschtapha, in monticulo Garvasin, ad latera montis Beschtau. 4.*

Obs. Descriptio a Lindley l. c. data discrepat a nostra: foliis primordialibus 2 latis, oblongis, concavis; serioribus angustis, teretibus filiformibus; scapo 3-4 unc., foliis duplo longiore; pedicellis subaequilongis; corollâ supra basin constrictâ, inde campanulatâ; staminibus in eorum faucem coronantem connatis, laciniis duplo brevioribus iisque oppositis; filamentis apice bidentatis, in sinibus dentium antheriferis, subdiaphanis; germine totam conicavitatem replente: loculis distiche 8-spermis; stigmate simplicissimo. Icon plurimis convenit, sed haud bona dicenda.

1403. BARNARDIA.

1. *B. scilloides Lindl.*; foliis linearibus, canaliculatis, cuspidatis, scapum aequantibus: scapo 6-angulati; racemo conico; pedicellis patentibus; filamentis aequalibus. *Bot. Reg. 1029.*

Bulbus ovatus, tunicatus, magnitudine ovi columbini. Folia debilia, duriuscula, extus subangulata, scapi longitudine vel longiora. Scapus erectus, glaber, 1½-2 ped.. Racemus simplex. Pedicelli filiformes, subhorizontales, basi bracteolâ minimâ. Perianthium erecto-patens, carneum; laciniis oblongis, concavis, basi angustatis, dorso viridibus: exterioribus latioribus. Stamina aequalia, patentia, petalorum basi inserta, basi latâ fimbriatâ carneâ. Antherae anticae, oblongae. Germen ovatum, substipitatum, obtuse triquetrum, inflatum; loculis 1-spermis: ovulo in fundo cujusvis loculi, vix ½ cavitatis replente. Stylus rectus. *Lindl. Prope Macao. 4.*

Obs. Ad genus hoc, si non ad eandem speciem, pertinent *ORNITHOGALUM chinense Lour.* et *O. japonicum Thunb. Lindl.*

2. *B. japonica*; foliis linearibus, planis, scapo brevioribus; scapo tereti, striato; racemo spicato, cylindrico, longissimo; pedicellis erectis; filamentis alternis basi latioribus. *ORNITHOGALUM japonicum Thunb. Jap. 157. Willd. Spec. II. p. 120. Kwi-Simira. Liacmpf. Am. Exot. Fasc. V. p. 872.*

Bulbus conicus, carnosus, albus, nucis avellanâ paulo major. Folia radicalia, glabra, erecta, digitalia. Scapus glaber, erectus, pedalis et ultra. Racemus sensim florens, digitalis vel ultra. Flores erecti. Bractea sub pedunculis linearis, marcescens, persistens, pedunculo brevior. Pedunculi capillares, erecti, uniflori, longi. Cor. purpureo-caerulea, patens, persistens. Petala lanceolata, lin. longa. Filamenta subulata, erecta, alba, corollae longitudine, alterne basi latiora. Antherae ovatae, didymae. Stylus subulatus, erectus, albus, longitudine corollae. Stigma simplex, obtusum, album. Caps. ovata, acuta, trique-

tra, 6-striata, subvillosa. *Thunb.* In Japonia juxta *Jedo et Nangasaki.* 2.

Obs. An huc, suadente *Willdenow*, *O. sinense*, scapo tereti, sulcato; spica simplici, longâ, erectâ. *Lour. Fl. Coch.* p. 255. cum *Loureiro* non tantum pedunculos breves petiisset, sed etiam bulbum $1\frac{1}{2}$ poll., folia subulato-lineararia, scapum 2 ped., cor. laciniâs parum patentem?

1404. SCILLA.

a. *Ornithogaloideae*; corollis plus minus rotatis vel subcampanulatis.

1. **Sc. maritima*; foliis hysteranthiis, lanceolatis, acutiusculis; racemo longissimo, multifloro; pedunculis flore longioribus; bracteis lineari-lanceolatis, subtus calcaratis. *Sc. nudiflora*; bracteis refractis. *Linn. Spec.* 442. *Amön.* IV. p. 14. *Willd. Spec.* II. p. 125. *Mill. Dict.* n. 1. *Link et Hoff. Abh. d. Berl. Ges.* IV. p. 16. *Ann. of Bot.* 1. p. 101. *Poir. Enc.* VI. p. 755. *Voy. en Barb.* 2. p. 148. *Desf. Fl. Atl.* 1. p. 297. *All. Ped.* II. p. 162. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 214. *Savi bot. etr.* II. p. 217. *Tenore Fl. neap.* 1. p. 180. *Vivian. Fl. lyb.* p. 21. *Gusson. Pr. Fl. sic.* 1. p. 417. *Red. Lil.* II. t. 116. *Woodw. Mat. med.* t. 118. *Plenck Off. Gew. Blackw.* t. 591. *Regn. Bot. ic. Guimp. et Schlechtend. Abbild. u. Beschr. off. Gew. Fasc.* II. t. 12. *ORNITHOGALUM maritimum Lam. Fl. fr.* III. p. 276. *ORNITH. Squilla & Bot. Mag.* 918. *Tratt. tabul.* t. 721. *STELLARIS Scilla Mönch Meth.* p. 504. *Sc. vulg. radice rubra Bauh. Pin.* 73. *Panocratum Clus. Hisp.* 295. *Hist.* 171. *Lob. ic.* 152. *Ger. hist.* 172. *Fuchs hist.* 782. β radice alba. *Linn. etc. Sc. maritima & Desf. Fl. Atl.* 1. p. 297. *O. maritimum Brot. Fl. lus.* p. 535. *O. Squilla & Bot. Mag.* 918. *Sc. hisp. Clus. Hisp.* 296. *Hist.* 171. *Lob. ic.* 151. *Ger. Hist.* 171. *Sc. rad. alba. Bauh. Pin.* 73. *Besl. H. Eyst.* t. 35. f. 1. *Seb. Mus.* 1. t. 44. f. 4. 5.

„Folia lanceolata, stricta. Scapus ante folia, longissimus, multiflorus. Flores albi: bracteae lineari-lanceolatae, refractae genu in medio, sursum flexae, subtus calcaratae.“ *Linn.* Bulbus ovato-globosus, ruber, subinde magnitudine capitis infantis, rhizomate imo umbonatum exstante; tunicis rufis, summis subsquarrosis. Folia radicalia fasciculata, $\frac{1}{2}$ -1 ped., 2-3 poll. lata, canaliculata, reflexa, acuta. Scapus rubescens, teres, racemo spicato 1-1 $\frac{1}{2}$ ped., (in spontanea 3-4 ped.), pyramidalis (v. subcylindrico), multifloro. Bracteae lineares, fuscae, longitudine fere pedicellorum (patentium, defloratorum erectorum). Cor. 6-8 lin. diam., albida cum rubore quodam; laciniis fascia mediâ obsolete virescente (patentibus, oblongis, obtusis, apice puberulis, subconcavis.) Filam. alba, aequalia, longitudine fere corollae; antherae subsagittatae, virescentes, polline flavo. Germ. flavum. Stylus longitudine staminum. Caps. alato-triloba ($\frac{1}{2}$ poll., valvulis interne quasi deauratis.) Sem. nigra, plana, paleacea. *Gawl.* In β : bulbus conicus, tunicis albis, 3-4 inferne poll. crassus, nimis aeris. Scapus 2-5 ped., racemo

longo, floribus numerosis. Bractea ad singulum pedunculum solitaria, membranacea, subulata. Pedunculi $\frac{1}{2}$ poll., floriferi patentes, demum erecti. Petala alba, costâ viridi. Caps. oblongiuscula, triangularis, trisulca. Semina oblongiuscula, nigricantia, hinc compressa, acuta, inde crassiora, obtusa, absque ulla ala. Folia octobris fine aut novembri post florescentiam lineari-lanceolata, erecta, saturate viridia, 10-15 lin. lata, 6-8 poll. longa. ORNITHOG. *pyrenaicum* nullibi in Lusitania et illud, quod *Linnaeus* et *Löffling* in Lusitania crescere dicunt, nullum aliud nisi hoc solum esse videtur. *Brotero*. In oris maris mediterranei et *Normandiae*; β in collibus maritimis et aliis a mari remotis in omni Lusitania, ubi α non occurrit. 4.

2. *Sc. anthericoides* *Poir.*: racemo longo; bracteis subulatis; pedicellis corollâ (sub) brevioribus. *Desf. Atl.* 1. p. 301. *Sc.* racemo longo, spicato; floribus pedunculos aequantibus basi bracteatis. *Poiret it.* II. p. 150. *Enc.* VI. p. 741. ORNITHOGALUM *anthericoides* *Link.*

Bulbi ovati, oblongi, solidi, albidi, tunicis rufo-fuscis, e quibus scapi 2-3 recti, glabri, firmi, fistulosi licet, subcompressi, 2-ped., basi membranaceis lanceolatis, striatis. Racemus spicatus laxus, subcylindricus, floribus pallide flavis, pedunculis filiformibus longitudine corollae et ultra, parum patentibus, basi bracteis membranaceis, angustissimis, subulatis, longitudine pedunculorum aut brevioribus. Cor. patula, (magnitudine fere ORNITHOGALI *pyrenaici* *Desf.*); laciniis profundis, oblongis, ellipticis, obtusis, medio striâ fuscâ. Stamina corollâ paulo breviora, acuta. Antherae breves, ovales, flavae. Pistillum longitudine staminum. Capsula? Folia post anthesin. *Poir.* III. *Smith* in *Rees Cyclop.* SCILLAS inter enumeravit quidem, sed spectare ad ORNITHOGALUM monuit. *Schousboe* cum? hanc speciem trahit ad SCILLAM (UROPETALUM) *serotinam*. In sylvâ *Freje*, *Bonne inter et Calle*. 4.

3. **Sc. hyacinthoides*; racemo longissimo; floribus subverticillatis; pedunculis patentibus; (foliis numerosis, oblongis, planiusculis; bracteis minimis, abruptis, quidquam distantibus. *Smith*). *Gouan illustr.* p. 26. *Linn. Suppl.* 201. *Smith Rees Cycl.* *Sc.* racemo cylindrico, multifloro; petalis germine sesquilongioribus; pedunculis coloratis; foliis lanceolatis. *Hort. Kew. ed.* 1. p. 445. ed. 2. p. 264. *Willd. Spec.* II. p. 150. *Link et Hoffm. Abh. Berl. Ges.* IV. p. 21. *Ann. of Bot.* 1. 105. *Brot. Fl. lusit.* 1. p. 528. *Tenor. Fl. neap.* 1. p. 181. *Bertol. Lucub.* p. 10. n. 39. *Gusson. Prodr. Fl. sic.* 1. p. 417. *Pl. rar.* p. 144. *Gawl. Bot. Mag.* 1140. *Sc. eriophora*; radice solidâ; corymbo conferto, hemisphaerico; scapo longissimo. *Mill. dict. n.* 10. *Var. Ornithogal. erioph. orient.* *Tournef. inst.* p. 381. *Bulb. eriophor.* *Clus. hist.* 1. p. 172. *Bauh. pin.* 147. *Dod. pempt.* 681. *Bonann. Panph.* t. 21.

Scapus 5-ped., a medio ad apicem florens, caeruleescens. Pedicelli caerulei, 3-1 proximi subverticillati. Stipulae minimae a

pedicello parum remotae. Cor. minimae, violaceo-caerulescentes. Germen album." *Linn. Suppl.* „Rad. bulbillis lateralibus valde sese propagans; bulbi conici, tunicati, scapiferi, diametro 2-poll., albi, glabri: tunicae, uti folia, tracheis abundantissimae, unde *eriophori* fors nomen. Folia radicalia saepe 12, in orbem posita, procumbentia, linearia (potius lanceolato-linearia), concava, acuta, pollicem lata, pedalia et ultra, viridia, ut illa nostri *ORNITHOG. maritimi* (*Sc. maritimae* β). Scapus simplicissimus, teres, laevis, glaberrimus, 5-4 ped., a medio ad apicem florens. Flores racemosi, laxi, rhachi sulcatâ, angulatâ, caerulescentes, demum virides. Pedunculi ad 150, nonnulli 3-4ni subverticillati, setacei, petalis triplo longiores, saepius 1½ poll., caerulei et sub anthesi patentés, postea virides, adscendentes. Stipulae minimae, tuberculiformes, apice denticulatae, basin pedunculi laxè semiamplexantes. Cor. diametr. ½ poll.: petalis violaceo-caerulescentibus, lanceolatis, patentissimis, postea clausis marcescentibus. Stamina longitudine petalorum. Filamenta violacea; antherae caeruleae. Germen albidum, subglobosum, sexsulcum, saepe abortivum. Stylus colore et longitudine staminum, subflexuosus. Stigma simplex, subpubescens." *Brot.* In collibus basalticis *Madeirae, de Alcantara, in prom. Pausilippi, in Italia, Sicilia, Dalmatia; in Gallia merid. Loisel.* 4.

Obs. „Nisi saepius a bulbo principe avellantur bulbilli, per annos saepe non florebit, monente *Dodonaeo.*“ *Gouan.* „Terrae libere commissam facile florere, etiamsi bulbilli laterales non adimuntur.“ *Tenore et Bertolon. in litt.* — *Her* ad *Sc. lusitanicam* notat: iconem in *Bot. Mag.* 1140 datam haud bene quadrare cum caractere ab *Aiton* concinnato, nec cum specimen *Herb. Banks,* unde decerpebatur; bene vero convenire cum descriptione *Linn.* in ed. S. N. ed. 12. ex *Gouan.* Sibi videri, adjicit, *lusitanicam* suam prae oculis versatam fuisse, cum character *hyacinthoidis* in *H. Rev* exarabatur.

4. *Sc. biflora Ruiz et Pav.*; racemo laxo; floribus geminis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv.* p. 69. t. 302. f. a.

Glabra. Bulbus subrotundus, tunicatus; radiculis plurimis, fibrosis. Scapus erectus, teres, tenuis, 1½ ped. Folia ensiformia, acuta, striata, procumbentia, ped. et ultra, poll. fere lata. Racemus terminalis, laxis, multiflorus. Flores remoti, pedunculati. Pedunculi erecti, teretes, filiformes; bracteis ovatis, parvis, acutis, membranaceis, marcescentibus, persistentibus. Cor. alba. Filamenta subulata. Antherae incumbentes. Caps. pisi magnitudine, globosa, acuminata, trisulca. *Ruiz et Pav.* In collibus arenosis *Chanca y et Cercado Peruviae.* 4.

5. **Sc. peruviana*; foliis lanceolatis, planis, longe den-
seque ciliatis; thyrso multifloro, conferto; bracteis nervosis;
capsulis rostratis. *Bertol. in litt.* Sc. flor. subcorymbosis;
corymbo late conferto, subconico; fol. radicalibus circa scapum
terrae appressis. *Brot. Fl. lus.* p. 526. Sc. fol. late linea-
ribus; flor. confertis, corymboso-racemosis; bractea solitaria
pedicellis elongatis duplo brevioribus; corolla patulâ. *Hoffm.*
et *Link N. Schr. d. naturf. Fr. z. Berl.* IV. p. 18. Sc. co-
rymbo conferto conico. *Linn. Spec.* 442. *Willd. Spec.* II.
p. 127. *Mill. Dict.* n. 4. *Poir. Enc.* VI. p. 756. *Desf.*
Fl. atl. 1. p. 298. *Vivian. Fl. lyb.* p. 20. *Gusson Prodr.*

Fl. sic. 1. p. 415. *Moris Stirp. sard. Elench.* 2. p. 10. *H. Kew.* ed. 2. II. p. 265. *Red. Lil.* t. 167. *Bot. Mag.* 749.

ORNITHOGALUM *speciosum Rafin.* Hyac. stell. peruv. *Clus. Hist.* 182. *Eriophorus peruvianus Clus. Hist.* 173. *Hort.*

Eyst. vern. II. t. 9. f. 1. Hyac. ind. bulbosus stellatus. *Bauh. Pin.* 47. *Rudb. Elys.* 1. 37. f. 1. *Park. Par.* 25. f. 7.

Ornith. caerul. lusitan. latifol. *Tournef. Inst.* 381. et ibidem

Ornith. eriophorum peruvianum. *Moris. s.* 4. t. 12. f. 19.

β flore albo. *Tournef. l. c.*

Rad. tunicata, lanuginosa *Sauv.*. Scapus teres. Corollae senescentes, recurvatae, petalorum marginibus recurvatis. *Linn.*

l. c. Folia margine barbata potius quam ciliata, sed culta amittunt barbam. *Bertol.* Bulbus (magnitudine fructus Aurantii

minoris) tunicatus, conicus, glaber; tunicae tracheis copiosis.

Folia radicalia $\frac{1}{2}$ -1 ped., $1\frac{1}{2}$ poll. lata, concava, viridia, similia *SCILLAE maritimae*, (leviter undulata). Scapus teres, glaber $\frac{1}{2}$ -1 ped..

Racemus florum primum (densissimus) fastigiato-pyramidalis, demum, florentibus supremis pedunculis, conicus; rhachis sulcato-angulosa, (2-) 4-6 poll.; pedunculi filiformes, approximati, confertissimi (20-100 et ultra), primum

caerulescentes, postea virides, patentes, inferiores ($1\frac{1}{2}$) 2- (3) poll., superne ad apicem rami decrescentes, (fructigeri elongati.)

Bracteae ad basin pedunculi cujusvis (lanceolato-) subulatae, (solitariae), fere longitudine pedunculi (et duplo breviores), infimae primae illis multo longiores. Cor. violaceo-caerulescens, (stellato-) patens, senescens petalis (4-5 lin.) recurvis, dein clausa, marcescens (persistens). Filamenta caerulea, lanceolato-subulata, antherae flavae. Germen caeruleum, sulcatum. Stylus etiam caeruleus, sulcatus. Germen in cultis abortivum. Cor. variare fertur colore violaceo, carneo, subcineritio, albo, tunc absque costa viridi.

(Capsulae ovato-conicae, rostratae.) *Brotero.* In planta culta apud *Gawler*: bracteae infimae deflexae; corollae diam. pollic.: laciniis lanceolatis, acutis, stamina excedentibus: germen caeruleum, nec albidum uti in *Redouté*, qui antheras violaceo-caeruleas dicit et *Sc. eriophoram Mill. Dict.* n. 10 huc ducit.

In pascuis prope *Cintra Lusitaniae*, in *Algeria* et agro tunetano, in *Sicilia*, *Italia*, *Sardinia* et *Corsica*; nec in *Peruvia*, nec in *India* hucdum inventa. 4.

6. *Sc. Cupaniana Gusson*; foliis lanceolatis, planis, brevissime denseque ciliatis; corymbo paucifloro; capsulis rostratis. *Bertol. in litt. Gusson. Prodr. Fl. sic.* 1. p. 416. *Sc. fistulosa Rafin. Schmaltz.* ORNITHOGALUM caeruleum;

fol. lanceolatis; scapo subfistuloso; racemo corymboso; bracteis membranaceis lineari-lanceolatis; pedunculis longissimis; stamin. consimilibus. *Rafin. Schm. Caratteri* p. 85. *Bertoloni Lucubr.* p. 10. n. 38. O. latif. umbellatum amöno caeruleum. *Bonann. t.* 20. (bona). Hyac. stellatus caerul. umbellat. latifol. *Cupan. Panph. sic.* V. 1. t. 20. 1.

Maxime affinis *Sc. peruviana*, sed multo minor. Differt praeterea foliis margine brevissime pubescenti-ciliatis floribusque corymbosis paucis. *Bertol.* Bulbus ovatus. Folia per terram

extensa, acuta, nervis longitudinalibus plurimis. Scapus 8 circiter poll. Bracteae duplo triplove breviores pedunculis subfastigiatis: inferioribus longissimis, superioribus sensim minoribus. Corymbus e floribus 8-12 azureis. Corollae lacinae oblongo-lanceolatae obtusiusculae. *In Sicilia prope Villafrata et Ogliastro et ad Castrogiovanni.* 4.

7. *Sc. odorata* Link et Hoffm.; foliis pluribus radicalibus linearibus; racemo oblongo; bracteis solitariis pedicello demum brevioribus; corollâ patentiusculâ, caeruleâ. Link et Hoffm. *Abh. Berl. Ges.* IV. p. 21. *Schrad. Journ.* 1799. IV. St. p. 21. *Brotero Fl. lusit.* p. 527.

Brotero nec hanc, nec *lusitanicam* se unquam vidisse ingenue fatetur. Proxima iconi *Rudb.* ad *Sc. lusitanicam* laudatae. Bulbus solidus. Vagina radicalis, evanescens. Folia angusta, subcanaliculata, scapo plerumque breviora. Scapus $\frac{1}{2}$ -1 ped., ascendens, teres, laevis, glaber. Racemus e floribus 10-20 confertis; pedicellis inferioribus parum longioribus 4-6 lin. longis. Bractea plerumque pedicello longior, demum parum brevior, caerulescens. Cor. 3-4 lin., odora; petala lanceolata, caerulea. Filam. dilatata, basi cum petalis cohaerentia. Antherae caeruleae. Germen globosum. Stylus stamina non superans. Hoffm. et Link. A *Sprengel S. V.* II. p. 67, cum? licet, jungitur cum *italica*; a *Gawler Bot. Mag.* 1885. cum *lusitanica*. *In arenosis, siccis Algarb. circa Lagos et Cap St. Vincent.* 4.

8. **Sc. lusitanica*; racemo oblongo, conico; petalis lineatis. *Syst. Veg.* p. 271. et seqq. *Willd.* II. p. 129. *Hort. Kew. ed. 2.* II. p. 264. *Sc.* racemo oblongo; pedicellis flore brevioribus; foliis lato-lanceolatis, undulatis, distichis. *Sims Bot. Mag.* 1999. *Sc. italica* β *Smith* in *Rees Cyclop. Hyacinth. stellaris caeruleus*, staminibus e viridi luteis. *Bauh. Pin.* 46. *Rudb. Elys.* 2. p. 54. f. 4. (fid. *Hort. Kew.* et *Sims.*) *Hyac. stellatus italicus.* *Hort. Eyst. vern. ord.* 2. (fid. *Sims.*)

Similis *Sc. amoenae*. Scapus teres. Racemus oblongus, subconicus: floribus distantibus, petiolo fere brevioribus. Petala elliptica, obtusiuscula, sulcato-lineata, patentia. Stamina petalis paulo breviora: antheris flavis. "Linné, in cujus Herbario deest. Nec *Brotero* nec *Link* in Lusitania eandem invenit. *Link et Hoffm.* l. c. p. 20 figur. *Rudbeckianam* haud ita bene quadrare cum descriptione a *Linné* data dicunt, et synonymon *Bauh. et Hort. Eyst.* ad *Sc. italicam* spectare jubent. Nulla specierum lusitanicarum huc pertinet, nisi forte *Sc. odorata*. In planta culta a *Sims* descripta: bulbus glaber, tunicatus. Folia erecta, flavo-viridia, exteriora 2 ped., medio 2 poll. lata. Scapus erectus, teres, racemo longo. Pedicelli brevissimi, caerulescentes, patentes, 3 lin., bractea baseos remotâ, subulatâ, vix lineae. Cor. diametro 4 lin.: petala albido-caerulescentia, ovalia, acuta. Germen intense caeruleum. Filamenta subulata, petalis duplo breviora, alba. Antherae obscure purpureae, poline flavo. *Ker.* *In Hispania: Sims.* *In Lusitania: Hort. Kew.* 4.

Obs. Smith l. c. monet: Linnaeum specimen luxurians Sc. vernae commutasse cum italica, et, cum hac vernâ tantum gauderet in Herbario suo, descripsisse varietatem latifoliam italicae, in Horto Upsaliensi cultam et forte e Lusitania allatam, nomine lusitanicae. Sunt, re verâ, varietati huic bractee solito breviores, sed haud separanda ab italica, cum etiam icon Rudbeckii, a Linnaeo laudata, italicam potius exhibeat, quam hanc varietatem, quam lusitanicam Linnaeus dixit.

9. **Sc. italica*; racemo oblongo; bracteis binatis, subulatis; petalis patentibus. *Bertolon. Amoen. ital. p. 144.* *Sc. racemo ovato-oblongo, bracteis binatis, acuminatis, flore sublongioribus. Viviani Fragm. t. 19.* *Sc. foliis pluribus, linearibus; racemo oblongo, 20-floro; bracteis duabus: alterâ longitudine fere pedicelli vel longiore; germine sphaerico; polline caeruleo. Link et Hoffm. N. Schrift d. Berl. Ges. naturf. Freund. IV. p. 17. Linn. Spec. 442. Mant. p. 364. (cui? apposuit Smith in Rees Cyclop.) Willd. Spec. II. p. 126. Mill. dict. 8. n. 3. Poir. Enc. VI. p. 736. Vitm. Summ. pl. II. p. 309. Hort. Kew. ed. 2. II. p. 262. (excl., monente Smith, umbellatâ Red.) Allion. Fl. pedem. n. 1896. II. 163. Lam. et Dec. Fl. III. p. 213. Redouté Lil. t. 304. Curt. Bot. Mag. t. 663. *Sc. pauciflora* Link (fide Smith). *Sc. bifolia* Retz Act. r. Acad. Sc. suec. 1769. p. 246. (se teste in *Obs. fasc. I. p. 15.*) *Sc. hyacinthoides* Hort. Edinb. (fid. Smith in Rees Cycl.) Hall. helv. 1212. (excl. syn.). *Hyac. stellat. cinerei coloris.* Clus. hist. 184. *Hyac. stellar. spicatus cinereus.* Bauh. pin. 46. *Hyac. stellar. ital.* Hort. Eyst. vern. 43. f. 1. *Moris. hist. s. 4. t. 12. f. 16. Park. Parad. 132. f. 6.**

Bulbus solidus, parvus. Folia numerosa, linearia, 5-10 poll., 3-4 lin. lata, canaliculata, obtusiuscula, basi attenuata. Scapus subpedalis. Racemus florifer patens, fructifer strictus. Bractee 2 ad basin cujusvis pedunculi, angustissimae, inaequales, longior pedunculum in floribus inferioribus 7-8 lin. aequans. Flores modo pauci, 10-12, modo valde numerosi. Petala caerulea, patentia. Filamenta teretia, antheris caeruleis. Icones a Curtis, Redouté et Clusio datae bene referunt plantam multifloram, luxuriantem. Bert. Filamenta basi dilatata. In planta helvetica bractee inaequales pedunculo post anthesin valde elongato paulo breviores remanent. Vivian.. Apud Smith l. c. „Bulbus ovatus, solidus, glaber, magnitudine ovi columbini. Folia numerosa, linearia, spithamaca, plana, supra canaliculata, carinâ acutâ ibique triangularia. Scapus pedalis. Racemus oblongus, quidquam conicus, densus, multiflorus: flores pallide et cinerascenti-caerulei, saepius albi. Bractee 2-3 linearum, variae longitudinis, at semper angustae, membranaeae, basi dilatatae. Pedicelli floribus 2-3-plo longiores, praeque erecti. Cor. late expansa. Talem esse originalem Linn., qui serius, fide speciminis in ejusdem Herbario, specimen luxurians vernae pro italica habuit, unde ejusdem nota in Mantissa: („Racemus conico-oblongus, pedicellis erectiusculis, longitudine floris. Flos patens, petalis lateribus reflexis, apice obtusis, albis caeruleisve. Bractee longitudine pedicellorum“) dubia.“ In Redouté t. 304, quae certe italica, flores

nimis parvos nimisque coelestino-caeruleos notat *Smith*. *Redoute* in culta describit bulbum ovato-rotundatum, magnitudine Juglandis, tunicis membranaceis; folia fasciculata, mollia, acutiuscula, 4 poll., saepe scapum 6-8 poll. et ultra, erectum, teretem aequantia; racemum confertissimum e floribus parvis; pedicellos erectos vel semipatentes, 5-6 lin., basi bractea lineari pedicellum aequante; corollae lacinias ovatas, aequales, obtusiusculas, $2\frac{1}{2}$ lin.; stam. corolla parum breviora, caerulea, filamentis subulatis; germen rotundatum, caeruleum; stylum staminibus paulo breviora, intense amethystinum. In *Bot. Mag.*, (cujus iconem ad umbellatam *Red.* accedere monet *Smith*) pedunculi infimi pollicares; filamenta alba, corolla fere duplo breviora, basi unguiformi laciniarum inserta; germen tuberculatum, sexsulcum; stigma obsolete trifidum, purpurascenti-caeruleum; flores fragrantis. Hanc esse italicam *H. Kew.*, *Allion pedem.* n. 1896. *Link. et Hoffm.* (excl. syn. *Linn.*) *Hall. Helv.* n. 1212 (excl. syn.) *Orn. hisp. minus Clus. hist.* 1. 188, *Park. Parad.* 139, *Gerard Emac.* 166. f. 4 monet *Gawl.* in *Bot. Mag.* n. 1506 fol. vers. In collibus genuensibus secus aquas, monte di Portofino, in *Helvetia*. 4.

Obs. SCILLAM italicam *L.* (paucifloram *Link*) diversam esse ab italica *Hortul.* monuit *Smith*. *Sprengel* S. V. II. p. 67. *Sc. odoratam Link* cum ad italicam duxit, cui perperam cum *H. Kew.* etiam umbellata a *Poir.* *Enc. Suppl.* V. p. 89. adscripta.

10. *Sc. pratensis Waldst. et Kit.*; racemo oblongo, conico; pedunculis flore triplo longioribus; bracteis brevissimis. *Waldst. et Kit. Pl. rar. hung.* t. 189.

Bulbus ovato-conicus, tunicatus. Folia 3-4, scapo longiora, patentia, lineari-lanceolata, apice teretiusculo subangulato, subnervosa, margine albido. Scapus erectus, 3-4 poll., flores inter angulatus, nudus, laevis, uti folia atomis impalpabilibus confertus. Racemus poll. et paulo brevior, primum conicus, dein subcylindricus, densus; floribus 15-40. Pedunculi patuli, flore 3-4 plo longiores, filiformes, rubroviolacei. Bractea brevissimae, pedunculorum bases amplexantes, erosae, purpureae. Corollae violaceo-caeruleae, parvae. Petala patentia, oblongo-ovata, apice obtusiusculo incurvo subfornicata, marginibus basi subreflexis. Stam. petalis paulo breviora, stylum nonnihil excedentia, erecto-patula, sub anthesi incurva; filamenta angusto-subulata, caerulea; antherae ovatae, obtusae, intense caeruleae. Germen subrotundum, caeruleum, sulcis 6 albis. Stylus erectus, caeruleus. Stigma angustius, obtusum, obtuse tridentatum, albidum. Caps. subrotunda. *W. et Kit. Hort Fl. austr.* p. 434. junxit cum italica, a qua bulbo ovato, nec subrotundo, bracteis brevissimis, nec pedunculos superantibus, aliisque notis certe differt. In pratis Croatiae, ad *Korenizam*. 4.

11. *Sc. vincentina Hoffmanns. et Link*; foliis pluribus, linearibus; racemo 5-6-floro; bracteis binis: altera pedicello subaequali; germine oblongo; polline flavo. *Hoffmanns. et Link* in *n. Schr. d. Ges. naturfr. Fr. Berl.* 4. P. 17. *Annals of Botan.* 1. 102.

Bulbus solidus. Vagina radicalis, scariosa, obtusa, acumine parvo. Folia radicalia 2-3, acuta, scapo parum breviora vel longiora. Scapus erectus, teres, laevis, glaber, 2-5 poll. Racemus flori-

bus non confertis. Bracteae binae; major 3-4 lin. lanceolata; altera duplo minor, linearis; utraque caerulea. Pedicelli bracteae majori subaequales, patentes. Cor: patula; petalis lanceolatis, aequalibus, acutis, uninerviis, caeruleis, 2-3 lin.. Filamenta superne attenuata, basi dilatata, alternatim petalis ad $\frac{1}{4}$ usque adnatis. Antherae incumbentes, caeruleae, polline flavo. Stylus filamenta parum superans. Differt a *Sc. italica* floribus paucioribus, majoribus, intense caeruleis, germine oblongo, polline flavo. *Hoffmanns. et Link.* Crederem vernam, nisi bracteae binae. *Smith Rees Cycl.* Copiose in collibus ad Cap S. Vincent Lusitaniae. 4.

12. *Sc. verna* *Huds.*; bulbo tunicato; corymbo hemisphaerico, paucifloro; bracteis lanceolatis, obtusis; foliis linearibus, canaliculatis. *Smith Engl. Fl.* p. 145. *Fl. Brit.* p. 364. *Engl. Bot.* t. 23. *Huds. Angl.* 142. *Lam. ill.* t. 258. f. 1. *Poir. Enc.* VI. p. 759. *Hook. Scot.* 102. *Dicks. H. Sicc. Fasc.* X. 8. *Sc. b. t.*; racemo paucifloro, bracteato; corollis campanulatis (?); foliis linearibus, canaliculatis: radicalibus pluribus. *Ait. H. Kew.* ed. 1. p. 445. *Willd. Spec.* II. p. 129. *Sc. bifolia* *Lightf.* 121. *Fl. Dan.* t. 568. *Sc. umbellata* *Red. Lil.* 166. Ornith. hispan. minus. *Clus. Hist.* 1. 188. f. *Ger. Emac.* 166. f. Orn. flosculis ex albo subcaeruleis. *Bauh. Pin.* 70. *Rudb. Elys.* II. 132. f. 6. (nimis ampla fid. *Smith*). *H. parv. stell. vern.* *Besl. Eyst. Vern.* t. 37. f. 4. β pallidior, corymbo subfastigiato. *Sc. verna* *Lapeyr. Hist. abr. Pyr.* p. 188. et hoc teste: *Sc. allifolia* *Lapeyr.* *Sc. pratensis* *Bergeret.* *Sc. umbellata* *Ramond. Bull. Soc. phil.* n. 41. p. 130. t. 8. f. 6. (fid. *Gawl. Bot. Mag.* ad 1885.) *Poir. Enc. Suppl.* V. p. 89. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 215. *Thore Chlor.* p. 129. *Sc. scapo tereti*; corymb. paucifloro, subumbellato; bracteis filiformibus pedunculos subaequantibus. *Willd. Enum. h. berol.* p. 370. *Sc. fastigiata*; bulbis tunicatis; fol. angusto-linearibus, basi attenuatis, scapum filiformem superantibus; bracteis amplexantibus, ovato-acuminatis; pedunculis inferioribus elongatis, scapo longioribus. *Vivian. Fl. cors. App.* p. 1.

Bulbus parvus, albidus, ovatus. Folia numerosa, intense viridia, angusta, acuta, basi attenuata. Scapus centralis, teres, glaber, suberectus, saepius flexuosus. Corymbus brevis, densus, 5-6 florus, cultus 7-8 florus. Bracteae membranaceae, acuminatae, longitudine pedunculorum. Petala ovata, carinata, profunde caerulea. Filamenta teretia, nec dilatata. Antherae peltatae, caeruleae. Stylus brevis, stigmatibus obtuso. Caps. rotundata, subdepressa angulis 3 prominentibus sulcisque totidem intermediis, styli basi mucronata. *Smith l. c.* Differt ab affini *italica*: foliis canaliculatis, rotunde carinatis; bracteis latis, concavis, solitariis; colore profundiore ditio. *Smith in Rees Cyclop.* In β : bulbus ovalis. Folia 3-5, angusta, crassa, subcanaliculata, erecta, (obtusiuscula $1\frac{1}{2}$ -4 poll.), scapo breviora. Scapus teres sine angulis striisque, (3-5 $\frac{1}{2}$ poll.), gracilis, sed firmus, erectus.

Flores 4-8 in corymbo umbellato. Pedunculi bracteâ albâ longitudinis eorundem, (lanceolatâ, 2-4 lin., lin. fere latâ, (nec filiformi ut *Willd.* et *Spreng.*) nunc pedunculis longiori nunc breviori). Flores magnitudine et colore *Sc. Liliohyacinthi* (2 1/2 lin.), sordide et cinereo-caerulei, nervo saturatiore. Germen satius caeruleum, uti antherae. *Ramond.* In rupibus maritimis a *Dania* ad *Hispaniam* usque, in *Sardinia*, in magniducatu *badensi* prope *Kleinlaufenburg*, (*Gmel.*); β praesertim in *Pyrenaeis*; γ in monte *Coscione Corsicae*. 4.

Obs. Icon *SCILLAE umbellatae* *Red.* t. 166. (ab *Ait.* et *Poir.*) ad *Sc. italicam* ductae) potius specimen macrum *Sc. italicae* quam *Sc. vernam* exprimit; attamen descriptio ab eodem data quadrat cum illa a *Ramond* data, praeter corollae laciniâ apice callosas; stamina caerulescentia; antheras flavas; germen flavescens; stylum flavum, subconicum. *Sprengel* in *Syst. Veg.* II. p. 67. distinguit *Sc. vernam*, (fol. numerosis, linearibus, canaliculatis, erectis; racemo corymboso, paucifloro; bracteis lanceolatis, obtusis; bulbo solido,) a *Sc. umbellata*, (fol. linearibus; scapo tereti; corymbo paucifloro, subumbellato; bracteis filiformibus, pedunculos subaequantibus.) *Viviani* l. c. *Sc. fastigiatam* certe differre dicit a *Sc. verna* *Engl. Bot.* et ab omnibus reliquis et quaerit: an huic spectet synonymon *Clusii* a *Willdenow* ad *vernâ* relatum, a *Smith* vero in *Fl. Brit.* abjectum? Attamen synonymon hoc *Clusii* in *Smith Engl. Flor.* omnino ad *vernâ* laudatur. *Cl. Bertoloni* in *litt. Sc. fastigiatam Viv.* certe ad *Sc. vernam* pertinere dicit, de qua notat: „planta nunc vix a pollicaris, nunc pedalis. Cum longitudo pedunculorum maximo varia sit, ideo et multum variat eorum proportio ad bracteas.“

13. *Sc. byzantina Poir.*; foliis linearibus, obtusis, scapo subaequalibus; spicâ conicâ multiflorâ; bracteis pedunculo longioribus, (subulatis.) *Poir. Enc.* VI. p. 739.

Media quasi *Sc. amoenam* inter et *vernâ*, a quibus characteribus datis satis distincta. Folia angusta, linearia, glaberrima, striata, integerrima, 6-8 poll., 3-4 lin. lata, obtusa, recta, plana, basi vaginantia. Scapi debiles, glabri, teretes, vix longitudine foliorum. Spica brevis, densa, apice obtusa. Flores caerulescentes in pedunculis inaequalibus, filiformibus, corollâ longioribus. Bracteae membranaceae, coloratae, subulatae, flores subinde superantes. Cor. in stellam patens, laciniis lanceolatis stamina superantibus. *Poir.* In *Oriente*. 4.

14. **Sc. Lilio-Hyacinthus*; racemo paucifloro; bracteis lineari-lanceolatis, apice subulatis; foliis lanceolatis, humi adpressis, scapo brevioribus; bulbo squamato. — *Linn. Spec.* 442. *Willd. Spec.* II. p. 126. (correctâ diagnosi, uti in *Hort. Kew. ed. 2. II. p. 262. Poir. Enc.* VI. p. 738.) *Mill. dict.* n. 2. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 213. *Asso in Röm. script. lus. hisp.* p. 16. t. 1. f. 2. *Lapeyr. abr. pyr.* 187. *Smith in Rees Cyclop.* *Redouté Lil.* t. 205. ORNITHOGALUM squamosum *Lam. Fl. fr.* 3. p. 274. *Hyac. stellaris folio et radice Lilii. Bauh. pin.* 46. *Hyac. stell. liriophyll. Clus. hist. et app. ic. alt.* *Hyac. lilifol. stellat. Bauh. hist.* II. p. 589. ic. *Lob. ic. t.* 101. f. 1. 2. *Moris. hist.* II. p. 375. t. 12. f. 21. *Rudb. Elys. ß.* p. 35. f. 13. β angustifolia *Lapeyr. Hist. Abr.* p. 187.

Bulbus similis bulbo *Lilii*, flavescens, ovatus; squamis carnosissimis apice truncatis; fibris radicalibus numerosis subsimplicibus. Folia 3-6, oblonga, patentia, glabra, laete viridia, obtusiuscula, basi angustata, 6-6 1/2 poll., 9-13 lin. lata. Scapus rectus, gra-

cilis, folia superans. Racemus e floribus 5-6 (9) pallide caeruleis. Pedicelli 7-9 lin., basi bracteis linearibus, acutis, membranaceis, $4\frac{1}{2}$ -5 lin.. Cor. lacinae patentes, oblongae, acutae. Antherae caerulescentes. Germen ovoideum, 6 angulum. *Redout.* In β spontanea: bulbus poll. longus et latus. Folia 5, apice callosa, basi attenuata membranacea, albida, 3- $5\frac{1}{2}$ poll., 4-6 lin. lata. Scapus vix crassitie pennae corvi, 6-10 poll.. Racemus laxus, erectus vel apice incurvus, 5-9-florus. Pedunculi erecti, inferiores 4-8 lin., superiores 1- $1\frac{1}{2}$ lin.. Bractee membranaceae, albidae, pedunculis inferioribus breviores, superioribus longiores. Petala 3 lin., vix lin. lata. Stamina petalorum basi affixa iisque paulo breviora; filamenta basi dilatata, apice subulata; antherae oblongae, caeruleae. Stylus stamina paulo superans, subulatus, apice caeruleus. *Smith* l. c. monet deesse hanc speciem in *Herb. Linn.*, et male *Willdenowium* ad *Clusium* pedunculos ebracteatos dixisse, cum adsint bractee angustae, subulatae, membranaceae, erectae, solitariae, pedicellos aequantes. Interea *Poiret*, qui siccam vidit, pedicellos nudos dicit. An ergo eadem planta? Specimina nostra omnia bracteata. Folia scapo longiora passim dicuntur. In *Biscaya*, *Aquitania*, *Hispania*, in *Pyrenaeis*; prope *Orleans*. 4.

15. *Sc. lingulata Desf.*; foliis lanceolatis, planis, (scapo brevioribus); racemo denso, conico; bracteis subulatis pedicellos aequantibus. *Desfont. Atl.* 1. p. 298. t. 85. f. 1. *Poir. Enc.* VI. p. 743. *Red. Lil.* t. 521. β . B. scapo hispido; bracteis pedicellos superantibus. *Red.* l. c. *Sc. lingulata*; foliis lineari-ligulatis; floribus spicatis; bracteis pedunculo longioribus. *Poir. it.* p. 298. γ . *Sc. l. β .* scapis foliisque triplo longioribus *Poiret Enc.* l. c.

„Bulbi ovati, parvi (magnitudine Avellanae vel paulo majores). Folia radicalia circiter 6, plana, lineari-lingulata v. lanceolata, mollia, glabra, utrinque viridia, margine integerrima, subciliata (in specimine stcco apud *Smith Rees Cycl.* ad nervos marginesque tenuiter pubescentia; talia etiam in specimin. *Salzmann.* observavimus) subinde acutiuscula, 1- $1\frac{1}{2}$ -2 poll., 3-4 lin. lata, basi vaginam albidam (membranaceam). Scapi recti, graciles, glabri aut subpubescentes (striis pluribus sub lente serrulato-pubescentibus) foliis $\frac{1}{3}$ longiores, 4-5 poll.. Racemus fere ovatus. Pedunculi 5-10, filiformes, longitudine florum, 2- $2\frac{1}{2}$ lin., bracteis 2 subulato-setaceis (albidis). Cor. similis *italicae*, caerulea, parva: lacinae profundae, ellipticae, obtusae, $2\frac{1}{2}$ -3 lin., medio lineam saturatiore. Stamina corollam breviora. Filamenta basi dilatata albida. Antherae ovatae, magnae, caeruleae, basi bifidae. Germen subrotundum, glabrum. Stylus erectus, crassus, stamina paulo superans. In β bulbus magnitudine nucis juglandis minoris; folia hysteroanthia; scapus pilis brevibus reversis: bractee pedicellos, subinde etiam flores aequantes; cor. lacinae vix 2 lin. longiores. *Red.* γ triplo altius; racemus longior; flores alterni, minus approximati *Poir.* A *Gawler B. M.* 1885 ducitur, cum?, ad *lusitanicam*; sed haec floret *Majo*, *lingulata* hyeme et veris initio. Proximam *vincentinae*, et ab hac bracteis solitariis distinctam notant *Hoffm.* et *Link.* In collibus *Barbariae populi Nade*; in pascuis *tingitanis.* *Salzm.* 4.

16. *Sc. villosa Desf.*; foliis lanceolatis, planis, villosis, (scapum fere superantibus); floribus corymbosis; (bracteis lanceolatis, pedunculos subaequantibus.). *Desf. Fl. atl.* p. 299. t. 85. f. 2. *Poir. Enc.* VI. p. 743.

Habitus *Sc. lingulatae*; sed folia angustiora, praeter characteres datos. Bulbi ovati, solidi, tunicati. Folia radicalia, integerrima, procumbentia, obtusiuscula vel subacuta, inaequalia, 4-5 poll., 2-3 lin. lata. Scapus rectus foliis parum brevior, simplex, glaber, teres. Pedunculi filiformes, inaequales, floribus longiores: inferiores pollicares, superiores breviores; bracteis lanceolatis, concavis, membranaceis, acutis, nunc longioribus nunc brevioribus pedunculo. Cor. laete caerulea, magnitudine *amoenae*, laciniis 6 patentibus, ellipticis, obtusiusculis. Stamina corollae breviora; filamentis planis, basi dilatatis. Stylus longitudine staminum, stigmate simplici. Germen subrotundum. *Poir. Sc. odoratae proxima. Link et Hoffmanns. In arenis prope Kerwan, hyemalis.* 4.

17. *Sc. latifolia Willd.*; foliis lanceolatis, v. ovato-oblongis, acutis; racemo multifloro; bracteis setaceis. *Reliqu. Willd. Ms.*

Bulbus magnitudine ovi gallinacei. Folia pedalia et ultra, 3-4 poll. lata, acuta, tenuia, laevissima. Scapus foliis brevior, apice racemosus. Pedicelli vix $\frac{1}{2}$ poll., flores parvi, e minimis generis. *De Schlechtend fl. In Teneriffa. Broussonet.* 4.

18. *Sc. undulata Desf.*; foliis (hysteranthiis), lanceolatis, undulatis; floribus laxe racemosis; bracteis (subulatis) brevibus. *Desf. Atl.* 1. p. 500. t. 87. *Poir. Enc.* VI. p. 742. *Horn. H. Havn.* 1. p. 551. *Vivian. Fl. lyb.* p. 20. *Moris Stirp. Sard. Elench. Fasc.* 1. p. 47.

Bulbi ovati, compacti; tunicae membranaceae, solutae. Folia post anthesin, decumbentia, utrinque glabra, 3-4 poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata, acutiuscula. Scapi graciles, teretes, recti, 1-2 ped.. Pedunculi filiformes, floribus longiores, basi bracteis subulatis, minutissimis. Cor. campanulata, pallide rosea, patens; laciniis profundis, linearibus, obtusiusculis, medio intensius tinctis. Filamenta angusta, aequalia. Antherae flavae. Stylus longitudine staminum. Caps. obtusa, triangularis, scapo appressa, polysperma. Sem. nigra angulosa. *Desf. et Poir.* In specimenibus e Sardinia omnia fere eadem; bulbus albidus, $1\frac{1}{2}$ poll., fibris radicalibus crassis. Scapus 9 poll., crassitie pennae gallinae, glaber, inferne purpurascens, superne rore glaucescente. Racemus 3 poll., erectus, multiflorus. Pedunculi erecto-patentes, 2-3 lin.. Bractee membranaceae, angustissimae, $1-1\frac{1}{2}$ lin.. Cor. lacinae 4-5 lin., $\frac{3}{4}$ lin. latae, basi angustatae. Stamina corollae paululum breviora; filamenta basi laciniarum inserta, inferne paulo dilatata et albida, superne subulata, rosea; antherae oblongae, vix lin.. Stylus in defloratis stamina superans. Stigma incrassatum. *In Barbariae collibus circa Tunis et Algier, autumnalis, Desf.; in Sardinia, Moris, Müller; in Corsica Loisel.* 4.

19. *Sc. obtusifolia Desf.*; scapo laterali; foliis (hysteranthiis), linguiformibus, undulatis; floribus racemosis, ebra

cteatis. *Desf. Fl. Atl.* 1. p. 299. t. 86. Sc. fol. ovato-oblongis, obtusis; racemo longissimo; floribus pedunculo brevioribus. *Poiret Voy. en Barb.* II. p. 149. *Enc.* VI. p. 742. *Redout. Lil.* IV. t. 190. β minor. Sc. *obtusifolia Moris Stirp. Sard. Elench. Fasc.* 1. p. 47.

Bulbi magni, ovati, solidi, tunicis membranaceis. Folia omnia radicalia, oblonga, utrinque glabra, integerrima, subinde submucronata, 3-4 poll., pollicem lata, attenuata, submembranacea, basi concava. Scapi 2-3, firmi, duri, teretes, graciles, basi rufescentes, recti aut subcurvati, pedales et ultra. Racemus spicatus, laxis, longus. Flores primum pallide caerulei, demum violacei. Pedunculi glabri, filiformes, ad minimum pollicares, patentes, ebracteati. Cor. parva, similis *autumnali*, laciniis ellipticis, obtusiusculis. Stamina longitudine corollae. Germen ovatum, stylo simplici longitudine staminum. Capsulae breves, subrotundo-triangulares. Semina oblonga, nigricantia. *Poir.* In culta apud *Redouté*: bulbus magnitudine juglandis, fibris paucis. Folia 4-5, post florescentiam tantum omnino evoluta. Scapi 1-2 ped. Pedicelli erectiusculi, flore triplo longiores. Cor. lacinae patentes. Filamenta rubescentia. Antherae oblongae, caeruleae. Stigma simplex, minimum. In β bulbus rotundato-ovatus, poll., fuscus. Scapi 2, inferne curvati striisque scabriusculis, superne glaberrimi, crassitie pennae corvi, 3-3 poll. Racemus 1-1 $\frac{1}{2}$ poll., erectus, multiflorus. Pedunculi patentes, deflorati subinde incurvi, 1-4 lin., pallide rubelli. Bracteae nullae. Cor. lacinae violaceo-rubellae, dorso intensius, oblongae, obtusae, inferne paululum angustiores, 2 lin., $\frac{1}{2}$ lin. latae. Stam. corollae paulo breviora; filamenta rubella, plana, inferne dilatata, apice subulata; antherae rotundato-ovatae, caeruleo-rubrescentes. Stylus longitudine staminum. In *Barbaria prope la Calle*; β in *Sardinia et in insula S. Petri*. 4.

20. Sc. *parviflora Desf.*; foliis lineari-lanceolatis, acutis, glabris, scapo brevioribus; floribus racemosis, confertis; bracteis brevissimis. *Desf. Atl.* 1. p. 300. t. 87. Sc. *numidica*; fol. linearibus, planis; floribus racemosis; pedunculis flore longioribus. *Poir. it.* p. 151. Sc. *autumnalis* β *Smith* in *Rees Cyclop.* Hyac. autumn. major. *Clus.*

Affinis Sc. *lingulatae*, praecipue β ; sed bracteae breviores, racemi elongati, nec conici. Bulbi sat magni, albidi, ovati, solidi, tunicis fuscis. Folia radicalia 4-6, glabra, inaequalia, integerrima, crassiuscula, substriata, basi latiuscula, plus minus acuta, $\frac{1}{2}$ ped., 5-6 lin. lata. Scapi recti, teretes, glabri, pedales et ultra. Racemus ab initio subconicus, brevis, demum elongatus, cylindricus. Pedunculi post anthesin incrementos, floribus triplo longiores, glabri, filiformes, horizontales, bracteis exiguis, caducis. Cor. violacea, laciniis 6 profundis, obtusis. Stamina longitudine corollae. Filamenta basi dilatata. Antherae caeruleo-rubrescentes. Stylus acutus, simplex. *Poir.* Flores Sc. *autumnalis Desf.* Anno huc Sc. *autumnalis Gawl. Bot. Mag.* 919, cum flores petat bracteatos? In *Algeria Desf.*, circa *Hipponem Poiret*. 4.

21. Sc. *intermedia Gusson*; foliis lanceolato-linearibus, planis, acutis; racemo laxifloro, ebracteato, patulo; capsulis

obcordato-ovatis. *Bertol. in litt. Gusson. Prodr. Fl. sicul. 1. p. 417. Ind. sem. 1825.*

Floret autumnno. *SCILLAE autumnali* valde affinis, sed folia diversa, 3 lin. lata, nec lineari-angustissima; capsulae superne depressae emarginatae, nec convexae acutiusculae. *Bertol. in litt. Flores Sc. autumnalis; folia Sc. parviflorae. Gusson. In Sicilia. 4.*

22. * *Sc. autumnalis*; foliis (anguste) linearibus, numerosis, (hysteranthiis); racemo subcorymboso; pedunculis ascendentibus longitudine florum, ebracteatis; (capsulis convexis). *Smith Engl. Fl. p. 147. Fl. brit. 366. Engl. Bot. t. 78. Sc. fol. filiformibus etc. Linn. Spec. p. 443. Willd. Spec. II. p. 130. Mill. dict n. 7. Poir. Enc. VI. p. 741. Link et Hoffmannsegg Abh. Berl. Ges. IV. p. 22. et in Ann. of Bot. 1. 106. Desfont. Fl. atl. 1. p. 301. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 212. Balb. Fl. Lyon. 1. p. 722. Savi Bot. etrusc. II. p. 218. Bertolon. Amoen. ital. p. 144. n. 109. Tenor. Fl. neap. 1. p. 182. Seb. et Maur. Prodr. Fl. rom. p. 129. Gusson Prodr. Fl. sic. 1. p. 418. M. a Bieb. Fl. taur. cauc. 1. p. 279. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 554. Curt. Fl. lond. Fasc. VI. t. 25. Cav. ic. III. t. 274. f. 2. Redout. Lil. t. 317. Gawl. Bot. mag. 919. α (haud bona: *Rédouté* β laudat). *ANTHERICUM autumnale Scop. carn. 1. p. 415. ORNITHOGALUM autumnale Lam. Fl. fr. III. p. 274. Hyac. stellar. autumn. minor. Bauh. pin. 47. H. autumnalis minor. Clus. 1. 185. Lob. ic. 102. Moris. s. 4. t. 12. f. 18. Rudb. Elys. II. 36. f. 15. β . minor: flore dilute purpureo. Tournef. inst. 381.**

„Bulbus subglobosus, tunicâ fuscâ. Folia numerosa, patentia, canaliculata, glabra, profunde viridia. Scapus solitarius, rarius 2, circiter 3-poll. „(6-8 poll. in Eur. merid.)“ teres. Racemus conicus. Flores plures, rosei, inodori, staminibus purpureis, pistillo caeruleo. Bractee nullae. Pedunculi maturescente fructu incurvi.“ *Smith l. c.*, qui varietatem majorem antiquorum pedunculis 2 vix distinctam esse notat. In culta apud *Rédouté*: „bulbus subrotundus magnitudine Avellanae, tunicis cinereis, fibris numerosis, brevibus. Scapi 2-3, nudi, teretes, graciles, erecti, 9 circiter poll. Folia 5-6, linearia, angusta, fere filiformia, rigidula, carnosâ, supra subcanaliculata, scapis dimidio breviora. Flores plerumque pallide caerulei; subinde rosei. Racemus laxus, (9-30 florus). Pedicelli primum florum longitudine, serius elongati, fructiferi 9 fere lin., graciles, apice recurvi. In speciminibus nostris numerosis ne vestigium quidem bractearum; planta *Gawleri* ergo forte alia species. Cor. lacinae ovatae, lanceolatae, acutae, concavae, semipatentes, 5 circiter lin.. Filamenta subulata, caerulea, corollâ duplo breviora „(rectius plana, lanceolata, corollâ $\frac{1}{3}$ breviora)“. Antherae ovatae, intense caeruleae. Germen ovatum, apice angustatum in stylum filiformem stamina aequantem. Stigma capitatum. Caps. rotundata. Sem. 2 in quovis loculo, nigra, oblonga, basi quidquam attenuatâ axeos basi

affixa. Floret exeunte aestate: tempore humido tardius, atque tunc folia cum floribus; sicco vero folia post flores." *Gawler* describit folia hyemalia (verna nulla) scapo breviora; bracteas obsoletas; pedicellos depingit rubicundos, $\frac{1}{2}$ poll.; flores diametro 4-5 lin., subinde caeruleos, vel apice laciniarum et germine virides; stamina longitudine corollae, alba, antheris fusco-purpureis.

In Europa occidentali et meridionali a Britannia ad mare mediterraneum et in boreali Africa inque Tauria meridionali. 4.

Obs. Utrum *Sc. autumnalis*; radice tunicatâ; foliis angustissimis, linearibus; floribus subcorymbosis, paucis, laxis; pedunculis adscendentibus, flore longioribus *Brotero Fl. lusit. p. 528.* huc spectet, ipsi auctori dubium. Folia linearia, subtus convexa, striata, supra canaliculata, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. lata, 4-7 poll. longa, scapus 3-6 poll.. *In Beira* dimidio et ultra toto habitu minor quam *in Estremadura.* *In collibus siccis macris circa Olissiponem et Conimbricam.* 4. Specimina nostra *Sc. autumnalis* ex Hispania meridionali et a Lusitania omnino conveniunt cum descriptione a clo *Brotero* data et vix differunt a planta gallica et culta, nisi habitu minore, graciliore; atamen flores omnino caerulei. occurrit in Gallia floribus caerulescentibus et purascentibus.

25. *Sc. pumila Brotero*; radice tunicatâ; folio radicali saepius unico, lanceolato, basi scapum vaginante; floribus erectis, paucis; bractea ovatâ, acuminatâ, subaristatâ, pedunculis valde breviori. *Fl. lusit. p. 527. Phyt. lusit. sel. p. 113. t. 46. f. 2. Sc. monophyllos Link ap. Schrad. Journ. 1799. IV. p. 519.* *Sc. folio unico, (rarissime 2), lanceolato; racemo multifloro; floribus confertis; bractea solitariâ, demum pedicello brevior; corollâ patulâ. Hoffm. et Link Schr. Berl. Ges. IV. p. 20. Annals of Bot. I. p. 104. β . corollâ albâ, costâ non viridi. Brot. l. c. γ . fol. radicalibus 2. Brot. l. c.*

Scapus teres, 3-5 poll., folio longior. Flores primum subcorymbosi, postea evidenter racemosi, 7-12, pedunculis inferioribus sensim patulis, remotiusculis, 1-2 poll; bractea unica ad singulum pedunculum membranacea. Cor. caerulea, patens, petalis lanceolatis, 3-4 lin.. An γ . *Sc. bifolia?* *Brotero.* Bulbus solidus. Folium radicale late lanceolatum, naviculare, acutum, scapo plerumque brevius. Scapus erectus, subcompressus, laevis, glaber, 4-6-poll.. Racemus e floribus 6-20, demum subcorymbosis, confertis. Pedicelli inferiores poll. et ultra, arrecti. Bractea e lata basi longe acutata alba, demum pedicello brevior. Cor. parva uti in *Sc. italica*, caerulescens, subinde alba. Filamenta basi dilatata, imae corollae adnata, petalis minorâ. Germe subglobosum. Stylus filamenta superans. *Hoffmanns. et Link.* *In dumetis sabulosis et in ericetis prope Conimbricam et Ulyssiponem trans Tagum.* 4.

24. * *Sc. bifolia*; bulbo tunicato; racemo subcorymboso, ebracteato; floribus suberectis; foliis lanceolatis, subbinis, (canaliculatis). *Smith Engl. Fl. p. 146. Fl. brit. 365. Engl. Bot. t. 24. Sc. rad. solidâ; flor. erectiusculis, paucioribus. Linn. Spec. 443. Willd. Spec. II. p. 128. (excl. syn. Fl. Dan.) Mill. Dict. n. 6. Poir. Enc. VI. p. 743. Sc. fol. late linearibus, radicalibus caulisque; racemo multifloro; floribus confertis; bracteis nullis; corollâ patulâ. Hoff-*

manns. et *Link in n. Schrift.* etc. IV. p. 20. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 212. *Savi bot. etr.* II. p. 217. *Sebast. et Mauri Prodr. Fl. rom.* p. 128. *Tenor. Fl. neap.* 1. p. 180. *Guss. Prod. Fl. sic.* 1. p. 416. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 553. *Roth Enum. pl. germ.* L. 2. p. 57. *Jacq. Austr.* t. 117. *Römer Fl. Europ.* F. 5. *Boiss. Fl. Eur.* t. 252. *Bot. Mag.* 746. *Bot. Cab.* 283. *Redout. Lil.* t. 254. (haud bona). *STELLARIS bifolia Mönch Method.* p. 304. *ANTHERICUM bifolium Scop. Carn.* 1. n. 414. *ORNITHOGALUM bifolium Neck. Act. pal.* II. p. 46. *Lam. Fl. fr.* III. p. 274. *Phalangium Hall. Helv.* n. 1211. *Hyac. stellaris german. Rudb. Elys.* II. 33. f. 1. *Fuchs Hist.* 837. f. 838. f. *Moris. Hist.* II. s. 4. t. 12. f. 15. *H. stell. bifol. Bauh. Hist.* 2. p. 579. *Clus. Hist.* 1. p. 184. β flore albo. γ fl. carneo *Bot. Mag.* 746. f. sinist. δ sicula *Jan*; foliis 2-3; floribus majoribus.

„Flores saepe 4, altitudine aequales.“ *Linn.* Bulbus ovatus, tunicatus. Folia erecta, obtusa, concava, subcarinata, subindeterminatio angustiore. Scapus centralis foliis parum altior, teres. Racemus inclinatus. Flores 4-10, cyanei, inodori, inferiores longius pedicellati. Bracteae nullae. Petala ovata, obtusa, patentissima. Antherae fuscæ. *Smith.* Bulbus sordide albicans vel pallide fuscescens, 6-8 lin.. Folia 2, rarius 1 vel 3, scapum ad medium fere usque arcute vaginantia illoque paulo breviora, rarius longiora, erecto-patentia, late linearia, canaliculata, apice callosa, 5-8 poll., 2-5 lin. lata. Scapus 3-7 poll., erectus; rarius scapi 2: altero subunifloro. Racemus corymbosus v. thyrsoides, latus, erectus vel subincurvus, rarius distichus, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{3}$ poll., 2-8-florus. Pedunculi solitarii, rarissime gemini, inferiores 4-10 lin., erecto-patentes. Bracteae nullae vel earum vestigia minuta. Cor. 5-8 lin. diam.; petala 2-4 lin., $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ lin. lata, alterna paulo angustiora. Stam. petalis $\frac{1}{3}$ breviora, petalorum basi affixa; filamenta basi dilatata albida, apice subulato caerulea; antherae oblongae, intense caeruleae, polline flavo. Germen ovato-trigonum, virescenti-caeruleum. Stylus crassus, stamina aequans. In Podolia major magisque latifolia. In Sicilia petala $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ lin., racemi rariores; folia saepius 3, scapo longiora. *Per omnem Europam mediam et meridionalem, etiam in Sicilia et Tauria.* 4.

Obs. *SCILLA praecox*; scapo angulato; racemo subcorymboso; pedunculis flore duplo longioribus, bracteis obscuris, *Willd. Spec.* II. p. 128., quam dicit ab *amöna* differre: parvitate et praecocitate florum; pedunculis inferioribus longissimis, flore triplo et ultra longioribus, superioribus flore duplo longioribus; bracteis obtusis minutissimis, vix conspicuis, corollâ campanulatâ triplo minore, foliis linearibus, obtusiusculis, nunquam ut in *Sc. amöna* basi attenuatis, hujus saltem varietas videtur: sic etiam clo *Link in Enum.* I. p. 327.

25. *Sc. orientalis Thunb.*; floribus erectis, racemosis; foliis elliptico-ensiformibus. *Thunb. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. p. 354. *Willd. Sp. Pl.* II. p. 129. *Sc. bifolia*; flor. erectis racemosis; fol. binis; radice solidâ. *Thunb. Jap.* 138. (excl. synonym.)

Folia radicalia plura, inferne attenuata, ensiformia, glabra, spitha-

maea. Scapus erectus, glaber, 2-ped.; squamis alternis spathaceis. *Thunb.* In *Japonia*. 4.

26. **Sc. amöna*; scapis angulatis, 2-6-floris, folia vix aequantibus, fructiferis decumbentibus; pedunculis suberectis: inferioribus flore longioribus; bracteis brevibus; corollis substellato-patentibus. *Sc. flor. lateralibus alternis, subnutantibus. Linn. Spec. 443. Mant. p. 365. Willd. Spec. II. p. 127. Mill. Dict. n. 5. Poir. Enc. VI. p. 757. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 218. Roth Germ. II. p. 396. Enum. pl. germ. l. 2. p. 36. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 553. Jacq. austr. l. 218. Curt. Bot. Mag. 341. Réd. Lil. t. 298. Trattinn. oestr. Fl. t. 112. Tabular. t. 621. Schkuhr t. 94. Kniph. Cent. XI. 91. Sc. amoena a. Gawl. Bot. Mag. 1025. Hyac. stellaris caeruleus amoenus. Bauh. pin. 46. Rudb. Elys. II. p. 54. t. 7. H. stellaris byzant. H. Eystett. vern. Ord. 2. fol. 15. Park. Parad. p. 128. t. 151. f. 4. Moris. hist. II. p. 374. s. 4. t. 12. f. 17. β . Ornith. byzant. fl. e caeruleo purpurascente. *Tournef. Inst. 380.* γ . fl. albo. *Tournef.**

„Petala ad basin lineolis 2 albidis: exteriora petala intra apicem unguiculata. Germen flavum.“ *Linn.* Bulbus solidus, ovatus, carnosus, intus albus, extus pallide fuscescens, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ poll. Folia radicalia, 4-6, subcanaliculata, serius plana, glabra, primum erecta demum flaccida, late linearia, obtusa, apice subfornicata, dorso sulcis 2, basi attenuatä breviter laxaque vaginantia, $\frac{1}{2}$ -1 ped. circiter, 4-7 lin. lata. Scapi 1-3 ex eodem bulbo, foliis primum longiores, serius plerumque breviores, 1-8 flori, fructiferi tantum prostrati, altero latere plani, altero convexi, striati. Pedunculi erectiusculi, vix nutantes, superiores flore breviores, 2-5 lin., inferiores remoti 6-12 lin.. Bractee plerumque geminae, alterä minore, membranaceae, albidae, truncatae vel acumine brevi, vix lin.. Flores laete azurei, 10-12 lin. diam.; lacinae patentis, lineari-oblongae, obtusae, basi albidae, nervo medio intensiore prominulo, 1-3 lin. latae; alternae paulo latiores. Filamenta corollä duplo fere breviora, basi dilatata, apice subulata et caerulea, laciniarum basi inserta, vix coalita. Antherae oblongae, caeruleae, polline flavo. Stylus longitudine staminum. Germen pallide flavescenti-virescens, 6-sulcum. Caps. subrotunda, membranacea, rugosa, obtuse trigona, superne rufescens, sulcis obsolete. *Redouté*, qui *Linnaeum* et *H. stell. obsolete caerul. v. majorem Bauh. Pin.* cum? adducit, germen viride, *Curtis* vero pallidum notat. Scapi apud *Redouté* foliis longiores; cor. lacinae obtusiusculae; apud *Curtis* acuminatae; pollen cinerascens. In *Europae meridionalis et mediae pratis et pomariis. (Linnaeus* adjecit: habitat forte *Byzantii*, unde venit in *Europam* 1590 (!)). 4.

27. *Sc. amönuia Hornem.*; scapo quinquangulo; racemo bifloro; pedunculis nutantibus; corollis campanulato-patulis; bracteis brevissimis. *Hornem. H. Hav. 1. p. 351. Bot. Mag. 2408.* β *Sc. cernua*; scapo paucifloro; flori-

bus lateralibus, nutantibus, campanulatis; pedicellis coloratis, brevissimis; bracteis minimis. *M. a Bieb. Fl. taur. cauc. Suppl. p. 266.* (excl. syn. *Sc. sibiricae Andr.*) *Redout. Lil. in textu ad 298.* *Sc. amoena M. a Bieb. Fl. taur. cauc. 1. n. 684.* (excl. syn. praeter *Pallas*). *Red. Lil. t. 130.* (nec t. 298.) *Sc. sibirica Redout. in Addit.* (excl. syn.) *Sc. azurea Goldb. in Mem. Mosq. 5. p. 125.* γ uniflora. *Sc. uniflora*; scapo filiformi, 1-floro, foliis 2 radicalibus, linearibus canaliculatis. *Reliqu. Willd. Ms.*

„Bulbus ovatus, tunicis intense fuscis. Folia plerumque 3, sub florescentia vix 2 poll., erecta, divergentia, lanceolata. Scapi 3-4 ex eodem bulbo, angulosi, foliis duplo longiores. Flores 1-3, caerulei. Cor. stellato-patens. Filamenta subulata, germine longiora, petalis duplo breviora. Antherae oblongae, caeruleae, polline viridi. Germen orbiculare, obsolete trigonum. Stylus staminibus brevior. Stigma simplex. Vix dubitamus de differentia specifica hujus speciei a *Sc. amoena* et *sibirica*. *Sc. sibirica* differt foliis numerosioribus, apice latioribus, curvatisque; floribus numerosioribus, magis cernuis, magis campanulatis, minus stellatis. In icon. *Red.* folia tantum numerosiora, reliqua conveniunt.“ *Bot. Mag. β s. Sc.* „*cernua* differt ab affini *Sc. amoena* scapis (ancipitibus, hinc planis striatis, illinc convexis, angulosis) in spontanea saepe unifloris, alias bi-, rarissime 3-floris, post florescentiam statim decumbentibus; floribus nonnihil majoribus, magis campanulatis atque nutantibus; bracteis adhuc minoribus, denique tempore florendi praecociori.“ *M. a Bieberst.* In culta apud *Redouté*: „Bulbus ovato-subrotundus, nuce minor, tunicis tenuibus; basi fibris simplicibus, albis. Folia radicalia plura, canaliculata, oblonga, obtusa, apice quidquam callosa, omnino glabra, subnitentia, primum scapo breviora, demum ejusdem longitudine longioraque. Scapi solitarii vel plures, erecti, simplices, valde angulosi, $5\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ poll. Flores 1-2-3, majores quam in reliquis *Scillae* speciebus, amethystini, remoti. Pedicelli corollâ breviores, teretes, intense virescenti-violacei, basi bracteâ brevissimâ latâ tridentatâ violaceâ. Cor. campanulata, basi quidquam contracta; lacinae profundae, oblongae, aequales, obtusae, 9 lin.; nervo longitudinali intensiori, basi maculis 2 albis. Stam. corollâ duplo breviora erecta, germine appressa; filamenta subulata, albida, apice caeruleo et valde acuta; antherae ovatae, caeruleae, versatiles: polline virescenti-cyaneo. Germen liberum, rotundatum, obtuse 3-gonum, pallide-virens. Stylus erectus, filiformis, longitudine staminum, albus, apice caeruleus. Stigma lobis 3 brevissimis. Differt ab *amoena* bulbo rotundato, nec ovato; scapo mox post anthesin procumbente, nec demum fructu submatureo; floribus paucioribus, raro 3, semper cernuis, ante florescentiam pendulis, nec erectis 4-6; laciniis basi in speciem cyathi approximatis; foliis brevioribus, latioribus, intensius viridibus. *Praecox* differt ab utraque floribus multo minoribus, pedunculis longioribus.“ *Redouté.* *Deliquescente nive per Russiam mediam frequentissima, vix in Sibiria M. a Bieb.; γ circa Tiflin et in Ucraina. 4.*

Obs. Div. *M. a Bieberstein* (qui in *Bot. Mag. t. 2308* tantum cum? et excl. synon. praeter *Hornemann* et *Goldbach* adducitur) laudat etiam (*Bot. Mag. laudatum*) *Redouté t. 298* (sphalmato); *Sc. amoenam Fl.*

taur. cauc. n. 684 (excl. syn. praeter *Pallas* et *Clus.*); *Sc. sibiricam* *Andr. Rep.* t. 365. *Bot. Mag.* t. 1025; *Hornemann* et *Goldb. II. ce.*, ut videatur confudisse synonyma. *Redouté* *Sc. amoenam* suam, t. 130. depictam, in nota ad t. 298, ubi genuinam *amoenam* *Linna.* demum depinxit, *cernuam*, et in additamentis tandem hanc *cernuam* iterum mutato nomine *sibiricam* dixit, et eandem pronunciavit cum *Sc. amoena* β . *Bot. Mag.* t. 1025. et *Sc. sibirica* *Andr.*; et sane eandem crederes, nisi scapum valde angulosum diceret. In tantis dubiis verba ipsorum auctorum attulimus. Specimen e *Sarepta* in *Herb. Schreber.* omnino convenit cum descriptione a *Redouté* data. Folia radicalia 3, basi laxius et brevius vaginantia quam in *sibirica*, arctius quam in *amoena*, 8 poll., 2-6 lin. lata, acumine brevissimo obtuso calloso. Scapi 7, magis angulosi et graciliores quam in *amoena* et *sibirica*, 1-2-flori, 4-8 poll. Pedicelli subnutantes, 3 lin. Bractee caeruleoscentes, vix lin. inaequaliter dentatae. Cor. basi magis campanulatae quam in *amoena*, minus quam in *sibirica*, majores quam in utraque; lacinae 6-8 lin., 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. latae, interiores paulo latiores. In specimine ex *Ucrania* ad varietatem γ spectante: folia radicalia 2, magis canaliculata, 3 $\frac{1}{2}$ poll., 2 $\frac{1}{2}$ lin. lata; scapus filiformis, debilis, angulosus, 3 $\frac{1}{2}$ poll.; flos terminalis, solitarius, cernuus, 10 lin. diam.; petala exteriora magis lanceolata, 5 lin., 1 lin. lata; interiora oblonga, paulo latiora. Reliqua eadem.

28. *Sc. sibirica* *Andr.*; tetraphylla; scapis plurimis, semiteretibus, striatis, bifloris, post florescentiam decumbentibus. *Andr. Repos.* 365. *Hort. Kew. ed. 2. II. p.* 263. *Loddiges Bot. Cab.* 151. *Sc. amoena* β *sibirica* *Bot. Mag.* 1025. *Sc. praecox* *Donn Cat. H. Cant?* (fid. *Gawl.*)

Scapi virides, superne rosei. Bractee et pedicelli 1-4, brevissimi, rosei. Cor. diametro $\frac{3}{4}$ poll., laciniis externe cyaneis, basi albis, interne obscure caeruleis. Filamenta primum rosea, dein alba. Antherae aeneo-cyaneae, stylo viridi. Differt, ait, ab *amoena*: floribus dilutioribus; filamentis styloque magis coloratis; antheris dilutius caeruleis; foliis erectis, brevioribus. *Sims. In Sibiria.* 4.

Obs. „Utrum *Sc. sibirica* *Andr. amoenulae* vel *amoenae* varietas, vel intermedia utramque inter, evincens hasce tres omnes eandem sistere speciem, decidere non audemus; de specie interea dubitamus.“ *Smith Rees Cycl.* In *Herb. Schreber.* nomine *Sc. amoenae* asservatur specimen a *Pallas* lectum et nomine *Sc. bifoliae* communicatum, quod omnino pertinet ad *Sc. sibiricam* *Andr.* vel ad *Sc. amoenam* β *sibiricam* *Bot. Mag.* 1025, in quam exactissime quadrat. In hocce specimine: bulbus ovato-rotundatus, extus fuscus, 9 lin. diam. Folia radicalia 4, parte subterranea 3 poll. arcte vaginantia, supra terram patentia, late linearia, obtusa, apice subfornicato calloso, plana, inferne canaliculata, striata, ad bulbum usque 7 poll. 3-5-lin. lata. Scapi 3, folia paululum superantes, ut videtur teretiusculi, omnes 2-flori, crassitie pennae gallinae, erecti. Pedunculi remoti, primum erectiusculi, dein nutantes, vix lin. Bractee pedicellis duplo breviores, inaequales. Corollae nutantes, campanulato-patentes, 10-11 lin. diam.; lacinae exteriores oblongae, obtusae, 1 $\frac{1}{2}$ lin. latae; interiores ellipticae, 2-3 $\frac{1}{2}$ lin. latae; omnes intense caeruleae, lineâ longitudinali. Filamenta corollae $\frac{1}{3}$ breviora, basi laciniarum affixa, basi dilatata et sublancoolata, apice subulata. Antherae oblongae, incumbentes, caeruleae, polline flavo, lin. Germen magnum, subrotundum, trigonum. Stylus stamina aequans vel paululum superans, erectus, crassus. Stigma obsoletum, obtusum.

b. *Limonanthae*; corollis campanulatis.

29. *Sc. brachyphylla*; corollis 6-partitis, subrotato-campanulatis; racemo subsecundo, nutante; bracteis obsoletis; foliis carnosis, semitereti-linearibus, scapo brevioribus. *Sc. brevifolia* *Gawl. Bot. Mag.* 1468. (excl. syn. *Thunb.*)

Bulbus magnitudine *Juglandis*, fusciscenti-albidus, globosus. Folia 4-5 erecto-divergentia, carnosae, semitereti-linearia, subacuta, vaginâ radicali herbaceo-membranaceâ, convuluto-oblongâ, foliis parum breviora (nunc humo immersâ, nunc exstante et ad latera foliorum), glaucescentia, basin versus sanguinea, 2-4

poll., 2-3 lin. lata, scapo subinde duplo breviora. Scapus hinc sanguineus. Pedicelli 6-8, $\frac{1}{2}$ poll., cernui, sanguinei, basi tuberculo aucti et obsolete bracteati. Cor. diametro $\frac{3}{4}$ poll., albido-rosea: laciniis obtusis, dorso lineâ longitudinali saturatiore. Filam. alba, alterna breviora, longiora corollâ $\frac{1}{4}$ breviora. Antherae flavae. *Gawl.* Abunde distincta a *Sc. brevifolia*. In *Prom. b. spei.* 4.

50. *Sc. brevifolia*; corollis 6-partitis (subcylindricis); racemo (ovato) cernuo; (bracteis lanceolatis, setaceo acuminatis); foliis (lineari-lanceolatis reflexis) scapo brevioribus. *Thunb. prodr.* 65. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 525. (sub *HYACINTHO brevifolio*, uti:) *Willd. Spec.* II. p. 168.

Thunberg describit plantam spontaneam: „Folia radicalia, circiter 2, lineari-lanceolata, apicem versus attenuata, reflexa, glabra, scapo multoties breviora. Scapus simplex, erectus, glaber, spithameus. Racemus ovatus, sensim florens. Bracteae lanceolatae, setaceo-acuminatae. Corolla subcylindrica, fauce parum coarctata, albida, carinâ externe virescente, subunguicularis. In *Canneland, Hantum, Roggeveld, prope Cap, in Prom. b. spei.* 4.

51. **Sc. corymbosa* *Gawl.*; corollis infundibuliformibus, corymbosis, erectis; scapo foliis (linearibus, angustis, patentireflexis) brevioribus; (bracteis minimis; filamentis alternis duplo brevioribus.) *Linn. Mant.* 225. (sub *HYACINTHO corymboso*, uti) *Thunb. prodr.* p. 64. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 525. *Jacq. Collect.* III. p. 230. t. 19. f. 2. *Willd. Spec.* II. p. 168. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 282. *Andr. Repos.* t. 345. *MASSONIA corymbosa* *Bot. Mag.* t. 991. *SCILLA corymbosa* *Gawl.* in *Bot. Mag.* ad 1468 et 1885.

„Rad. bulbosa. Folia radicalia linearia, angustissima, saepius 3, digito breviora. Scapus brevissimus, foliis brevior, corymbo terminali. Flores infundibuliformes, semisexsidi, purpurei. Stam. 3 longitudine corollae, 3 dimidio breviora. Stylus simplex, longitudine corollae.“ *Linn. Mant.* Bulbus globosus, magnitudine *Pisi* (v. *Cerasi*), carnosus, (tunicatus, fuscus). Folia radicalia, vagina membranaceâ (albidâ, oblique truncate 6-14 lin.) involuta, obtusiuscula, convoluta, (dorso convexa), carnosâ, 3-6, glabra, patentirevoluta (in culta suberecta), digitalia ($1\frac{1}{2}$ -3 poll., in culta 3-4 poll., $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata, basi purpurascens). Scapus simplex, multiflorus (4-multiflorus), glaber, $\frac{1}{2}$ digit. vel paulo longior, (1-3 $\frac{1}{2}$ poll., teres). Flores racemoso-fastigiati, corymbosi, (in fructifera racemosi, in culta apud *Gawler* subcapitato-congesti.) Pedunculi brevissimi ($\frac{1}{2}$ -3 lin., corollâ breviores, erecti), crassi, 1-flori, glabri. Bractea sub singulo pedunculo ovata, membranacea, brevissima ($\frac{1}{3}$ lin., obtusa). Cor. tubulosa, (turbinato-campanulata, basi cylindrica, inodora, 4-5 lin., culta $\frac{1}{2}$ poll.); tubi brevi; limbo (infundibuliformi-) campanulato; laciniis ovato-lanceolatis (v. oblongis), obtusis, patentibus (subrevolutis), glabris, purpureis carinâ rubrâ (vel violaceis nervo medio intensiore, interioribus paulo latioribus). Filamenta latere germinis affixa, (corollae ad $\frac{1}{6}$ usque adnata), capillaria, pallida (longiora corollâ $\frac{1}{3}$, reliqua plus duplo breviora). Antherae ovatae, sul-

catae, flavae, lateraliter affixae. Pori 3 melliferi ad germen (subrotundo-ovatum, trigonum). Stylus filiformis, longitudine staminum longiorum, pallidus. Stigma subtrigonum, flavescens. Caps. obovata (subrotundave, angulis 3 obtusis, membranacea) glabra, trisulca. Sem. plurima, ovata, acuta, triquetra (in *Gawl. globosa*, apud nos dorso convexa, intus angulo acuto, sub lente rugulosa), glabra. *Thunb.* In arenosis pascuis inter *Leuwestart et littus Prom. b. spei.* 4.

32. *Sc. mauritanica Schousb.*; floribus racemosis; bracteis binis, pedunculos aequantibus; foliis linearibus, planis, apice involutis. *Schousb. Marocc. 1. p. 154. Roth N. Beytr. 1. p. 192. Poir. Enc. Suppl. V. p. 89. Sc. mauritiana Steudel Nomencl. (sphalmate).*

Affinis *Sc. campanulatae Ait.*, a qua differt: corollis minoribus, minus patulis, nec apice subreflexis; foliis angustioribus, apice involutis. Scapus fere ped., longitudine foliorum. Flores caerulei. Bracteae 2 inaequales, coloratae: interior pedicello duplo brevior; exterior longitudine hujus. *In monte Shibil Kibir.* 4.

33. *Sc. tingitana Schousb.*; floribus racemosis; bracteis solitariis, pedunculo brevioribus; foliis lanceolatis, planis, apice involutis. *Schousb. Marocc. 1. p. 155. Roth N. Beytr. 1. p. 192. Poir. Enc. Suppl. V. p. 90.*

Simillima *Sc. campanulatae et mauritanicae*, sed differt foliis parum latioribus, minus apice involutis; bractea tantum unica, pedunculo triplo brevior. Affinis quoque *Sc. parviflorae*, at bracteae non caducae, sed persistentes et corollae majores quam in *Sc. autumnali.* *Cum Sc. mauritanica.* 4.

34. *Sc. campanulata Ait.*; bulbo solido; racemo multifloro, oblongo, subconico; corollis campanulatis, erectis; bracteis bipartitis pedunculo longioribus; foliis lanceolatis. *Ait. Kew. 1. p. 444. 2. ed. 11. p. 263. (excl. Bot. Mag. 1102.) Willd. Spec. II. p. 128. Redouté Lil. t. 455. (diagnosi Aitonii utente, et laudante: Bot. Mag. 128. (nec 1102, ad patulam spectantem)). Hyac. hispanicus stellato flore. Clus. Cur. post. 59. Hyac. hisp. major, flore campanulae instar. Park. parad. 125. (Haec Redouté, cui synonyma reliqua omnia ab auctoribus huc laudata ad *Sc. patulam* spectare videntur: attamen huc spectat certe adhuc: *Sc. campanulata*; foliis late linearibus, pluribus; floribus subnutantibus, distantibus in racemo multifloro; bracteis 2: altera pedicello initio subaequali, demum brevior; filamentis alternatim petalis ultra medium adnatis. *Link et Hoffmanns. Abh. d. Berl. Ges. naturf. Fr. IV. p. 19. Annals of Bot. 1. 103. Lois. not. p. 57., et, ut videtur: Poir. Enc. meth. VI. p. 740. (excl. descript.) Sc. campanulata major. Her in Recens. Liliac. Redout. in Journ. of Science II. p. 181. Sc. hyacinthoides Jacq. Coll. 1. p. 61. ic. rar. t. 65. Sc. Jacquini Gmel. S. V. p. 552.**

Sc. hispanica; radice solidâ; floribus paniculatis, subnutantibus. *Mill. Dict.* 8. n. 8. ORN. hispanicum saturate caeruleum. *Tournef. Inst.* 381.)

„*Sc. patulae* valde affinis, sed omnibus partibus major. Flores non in tubum elongati, sed fere ut in *Hyac. flore stellato Clusii*, et illis *Sc. peruviana*e similes, uti *Clusius* recte monuit. Bulbus rotundato-ovatus, magnitudine Juglandis; tunicis exterioribus sordide flavis vel pallide rufis; fibris radicalibus brevibus, albis, numerosis. Folia lanceolata, 11 poll., glabra, arcuato-reflexa, poll. circiter lata, quidquam canaliculata, medio crassiora. Scapus erectus, teres. Racemus fere conicus, 12-20 florus: rhachi angulatâ. Pedicelli inferiores longiores. Bracteae 2 coloratae, lineari-subulatae, apice subsetaceae: inferiore saepius pedicellum superante. Cor. lacinae ovato-oblongae, campanulatae, subaequales, pallide caeruleae, extus intensius coloratae, $6\frac{1}{2}$ lin., 2-3 lin. latae; striâ mediâ longitudinali intensiore in laciniis exterioribus in callum parvum desinente. Stam. aequalia, corollâ $\frac{2}{3}$ breviora; filamenta subulata pallide caerulea, ad medium usque dorso laciniis corollae adnata. Antherae oblongae, versatiles. Pistillum longitudine fere staminum. Germen breviter pyramidatum 6-angulum. Stylus subulatus, 3-striatus. Stigma capitatum, glandulosum. Caps. ovato-triquetra, acuta, $7\frac{1}{2}$ lin. longa, loculis 3 inflatis. Sem. angulo interiori biserialiter affixa.“ *Red.* Sem. angulata. *Mill.* In Hispania et Lusitania. 4.

Obs. III. *Smith* in *Rees Cycl.* sub *Sc. campanulata* conjungit *Sc. campanulata* *Ait. H. K. et Curt. Mag.* t. 128, 1102, et *Sc. patulam* *Red. Lil.* t. 225, *Sc. hyacinthoidem* *Jacq. et Rudb. Elys.* v. 2. 17. f. 6. 10. sequente diagnosi: „fol. numerosis, lanceolatis, quidquam concavis; racemo multifloro erecto; floribus cernuis, campanulatis; bracteis profunde bifidis, subulatis.“ Ex descriptione tamen: „bulbus subrotundus, solidus, albus, pollicis diametro. Folia circiter 6, pedalia, patula, flaccida, quidquam canaliculata. Scapus foliis longior, teres, erectus. Racemus suberectus, densus. Flores intenso caerulei, secundi. Bracteae erectae, coloratae, basi latae, plerumque profunde partitae, laciniâ alterâ pedicello multo longiore. Petala basi campanulata, ultra medium recurva,“ potius ad *patulam* spectare videtur. Monet „*Linnaeum* hanc semel confudisse cum *italica*, et serius cum *nutante*; quaecumque etiam Helveti plures eandem commutabant, cum ex *Herb. Regnier* patet, *Sc. campanulata*“ (*Smithii*) „crescere in locis ab *Haller* n. 1248 indicatis sub *nutante*.“ *Clusium* descriptioni hujus plantae addidisse iconem *Sc. nutantis* ex *Dodon. pempt.*, unde errorem *Linnaei* natum esse sub *H. cernuis*: *Gawl. Bot. Mag.* 1102. Hujus forte loci: *HYACINTHOIDES racemosa* *Medic.* in *Usteri Annal.* II. St. p. 9; cum *Sc. hyacinthoidem* *Jacq.* paucis tantum recedere dicat, simulque illi huc spectare videatur *H. non scriptus* *L.* *Character. gener.* *HYACINTHOIDES* apud *Medicus l. c.*: Cor. campanulata, ad basin usque 6-fida. Caps. triangulari-pyramidalis, 3-loc., 3-valv., stylo persistente coronata. Sem. rotundato-ovata. Quid *Sc. macrogona*; foliis linearibus, pluribus; racemo oblongo; bracteis binis; corollâ campanulatâ, cernuis; filamentis petalis parum adnatis; stylo corollae subaequali. *Link* in *Schrad. Journ.* 1799. 4 St. p. 310., quae affinis *Sc. campanulatae* *Ait.*, sed filamentis longioribus minusque adnatis differre dicitur, et cujus nulla amplius mentio apud *Hoffm.* et *Link* in *Schr. Berl. Ges.*? Circa Hellas et in Serra de Arrabida.

35. *Sc. patula* *Red.*; foliis lanceolatis, decumbentibus; spicâ erectâ; floribus subcernuis campanulato-cylindricis, apice reflexis; bracteis geminis. *Redont. Lil.* 225. *Dec. et Lam. Fl. fr.* III. p. 211, quo teste: *HYACINTHUS patulus* *Desf. H. paris.* *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 190. *HYAC. amethystinus* *Lam. Enc.* III. p. 190. *H. non scriptus* *Thuill. Fl. par. ed.* 2. I. p. 173? *H. spicatus* *Mönch meth.* p. 632. *Sc. campanulata*

panulata *Gawl.* in *Bot. Mag.* 1102. (excl. syn. ad *campanulata* spect.) *H. cernuus* *H. Kew.* ed. 1. v. *carnea*, fide *Ker*). *H. anglic.* *Moris.* 11. s. 4. t. 11. f. 8. (Certe *Sc. campanulata* β . *minor* *Ker* in *Recens. Lil. R d.* *Link* et *Hoffm.* *Berl. Abh.* IV. p. 19.; forte etiam *Sc. campanulata* *Sav.* *Bot. etrusc.* II. p. 218. *Seb.* et *Maur.* *Fl. rom.* p. 128. *Hya .* corollis campanulatis, 6-partitis, floribus utrinque dispositis. *Mill. dict.* 8. n. 3. *Bauh. pin.* 44. *H. hispanicus minor fl. camp.* *Parkins. parad. t.* 125. f. 4.)

Sc. non scriptae valde affinis, sed differt fol. latioribus decumbentibus; floribus paulo majoribus, numerosioribus; spic  rect ; bracteis angustioribus; filamentis magis liberis. *SCILLA campanulata* affiniore adhuc differt tantum floribus magis patentibus; vix ergo specie diversa. Bulbus ovatus. Scapus erectus, teres, viridis, glaber, 8-12 poll.. Folia 5-6, lanceolata, acutiuscula, 9-15 lin. lata, scapum aequantia. Flores post florescentiam nutantes. Pedicelli subaequales, basi bracteis 2 membranaceis caeruleis, subulatis, exteriori corollae limbum aequante vel superante. Cor. caeruleae, anguste campanulatae, ad basin usque partitae; lacinae aequales, lanceolatae, obtusae, apice reflexae. Filamenta subulata, coroll  breviora, laciniis ad dimidium usque adnata. Antherae oblongae. Germen ovoideum. Stylus filiformis longitudine staminum. Stigma obsoletum, capitatum *Red.* In culta apud *Gawl.*: bulbus nunc pruni magnitudine, nunc 3 poll. diametro. Cor. urceolato-campanulata, nutans. Stamina alterna medio tenus adnata, alia libera, breviora: haec pistillo aequalia. Variat floribus azureis, violaceis, carneis, albis. *Loiseleur* recte monet, aegre *campanulata*, *non scriptam* et *patulam* distingui. In *Gallia meridionali, Italia, Lusitania.* 4.

Obs. Hujus esse loci videtur: *USHERIA dispersa*, floribus hexapetalis, cylindraceis, fauce non angustatis, apice reflexis, subsecundis, bulbis rotundatis *Medicus* in *Urt. Ann.* 3 St. p. 13., qui *Bauh. Pin.* 44. sp. X. et *Tourn. Inst.* 345. laudat. Etiam *HYACINTHUS?* sine nomine specifico descriptus in *Both Beytr.* II. p. 147.

36. *Sc. nutans* *Smith*; foliis linearibus; racemo nutante; floribus pendulis, cylindrico-campanulatis; petalis apice reflexis; bracteis geminis. *Smith Engl. Fl.* p. 147. *Fl. brit.* 566. *Engl. Bot.* t. 577. *Rees Cyclop.* *Lam.* et *Dec. Fl.* fr. III. p. 211. *Mert.* et *Koch Deutschl. Fl.* II. p. 554. *Sc. non scripta*; foliis late linearibus, pluribus; racemo multifloro; floribus non confertis; bracteis 2, pedicello multo longioribus, corollis nutantibus; petalis arrectis, caeruleis; filamentis petalis ultra medium adnatis. *Link* et *Hoffmannsegg Nov. Act. Amic. N. C. berlin.* 1803. IV. p. 19. *Annal. of Bot.* 1. p. 103. *Redout. Lil. t.* 224. *Gawl. Bot. Mag.* t. 1102. 1185. 1461. *Sc. festalis* *Salisb. Prodr.* 242. *HYACINTHUS non scriptus*; corollis campanulatis, 6-partitis, apice revolutis. *Linn. Spec.* II. p. 453. *Willd. Spec.* II. p. 166. *Huds.* 141. *Mill. Dict.* 8. n. 1. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 282. *van Hall. Fl. belg. bor.* p. 283. *Curt. Lond. fasc.* II. t. 18. *Hook. Scot.* 102. *Bulliard Herb. Franc.* t. 353. *Flor. bat.*

t. 36. *Kniph. Cent. II. n. 53. Knorr del. 2. t. H. Blackw.*
 t. 61. *Hyac. non scriptus Dodon. Pempt. 2. l. 2. f. 16.*
H. pratensis; coroll. subcylindricis, 6-partitis; bracteis binis
 longitudine floris, racemo subcernuo. *Lam. Enc. III. p. 190.*
 (fid. *Dodon. synonymo*). *H. cernuus Thuill. Fl. paris. II.*
1. p. 174. H. spicatus Mönch meth. p. 652. (quoad synonym.)
 USTERIA *hyacinthiflora Medic. Act. palat. VI. p. 480. USTE-*
RIA secunda Id. in Ust. Annal. d. Bot. St. II. p. 11. Hall.
helv. 1248. H. anglicus Raii Syn. 273. Lob. ic. 103. f.
H. oblongo flore caeruleus. Bauh. pin. 43. Rudb. Elys. 11.
26. f. 1. β. flore albo; fol. latioribus corollisque magis pa-
tulis. Gerard. Emac. III. 2.

„Bracteae sunt saepius floribus longiores et binae. Petala apice
 revoluta. Stigma guttula madidum.“ *Linn. l. c.* Bulbus globo-
 sus, albus, tunicatus, mucilaginosus, sed acris. Folia numerosa
 (4-10) lucide pallideque virentia, subglaucescentia, acuta, canali-
 culata, carinata, flaccida, basi tantum erecta ad medium usque,
 superiore parte reflexa, (9-13 poll., 3-4¹/₂ lin. lata). Scapus
 centralis, teres, (pedalis circiter vel ultra) foliis altior (brevior-
 que). Racemus supra medium nutans (fere unilateralis) floribus nu-
 merosis, pendulis, caeruleis, suaveolentibus, pollicaribus, (6-10 lin.).
 Bracteae lanceolatae, attenuatae, inaequales, (minores 4, majores
 10 lin.), pedunculo (1-3 lin. longo) longiores (interiore multo bre-
 viore). Petala lanceolata, angusta, obtusa, basi approximata,
 superne patentia. Stamina cum petalis ad horum medium usque
 connata. (Filamenta alba, antherae flavae.) Germen ovatum,
 angulosum, absque poro nectarifero. Stylus longitudine germi-
 nis, supra basin deciduus. Stigma abruptum. Affinis *Sc. campan-*
ulatae Banks et Soland., 6-petala, nec 6-partita. Smith
Engl. Fl. l. c. — Differt a *campanulata*: floribus multo longiori-
 bus, magis cylindricis; foliis angustioribus; racemi parte supe-
 riore magis cernua: floribus magis odoris, rosam semperfloren-
 tem spirantibus. *Smith in Rees Cycl. A Britannia per*
totam Europam occidentalem et meridionalem: utrum
in Persia et Sibiria? 4.

Obs. An *Gmelin it. 3. p. 309. hujus loci?* — USTERIA *secunda* floribus hexa-
 petalis, cylindraccis, fauce angustatis, apice quidquam reflexis, secundis sca-
 poque cernuis, bulbis crassitie digiti minimi, 1¹/₂ poll., tum e synonymis, tum
 e varietatibus ad eandem adductis floribus caeruleis, alb. et rubicundis huc et
 ad *cernuam* simul spectare videtur. *Charact. gener. USTERIAS apud Me-*
dicus: Cor. 6-petala, cylindrica. Bulbus communis propaginibus annuis
bulbosis serie triplici, corpore ceparum solito carentibus.

37. **Sc. cernua Hoffm. et Link; foliis pluribus, late*
linearibus; racemo multifloro; floribus non confertis; bracteis
2 pedicello multo longioribus; corollis cernuis; petalis arrec-
tis, rubicundis; filamentis alternatim ultra medium adnatis.
Link et Hoffm. n. Schr. d. Ges. etc. IV. p. 19. - Sc. nutans
var. Smith in Rees Cyclop. Sc. non scripta β fl. incarnato.
Bot. Mag. ic. 1461. HYACINTHUS cernuus; corollis campa-
nulatis, 6-partitis; racemo cernuo. Linn. Spec. 453. Mill.
Dict. n. 4. Willd. Spec. II. p. 167. (correctâ patriâ). H.
oratensis β cernuus; cor. 6-petalis, campaniformibus, apice

reflexiusculis; bracteis 2 inaequalibus, corollam fere excedentibus; racemo subcernuo. *Brot. Fl. lusit.* p. 535. *H. angl.* aut *belgicus incarnatus.* *Ger. Emac.* 112. 3. *H. oblongo* flore suaviter rubente, minor. *Bauh. Pin.* 64? *H. hispanicus.* *Clus. Hist.* 1. p. 77.? (fide *Linn.*)

„Convenit cum *H. non scripto* habitu et facie, quamvis minor; differt vero foliis magis linearibus, minus lanceolatis, erectioribus; racemo magis nutante; corollis incarnatis, nec caeruleis, teretioribus, cum petalorum lateribus ad basin minus plano patentibus, nec dorso lineâ elevatâ notatis, minusque revolutis, (quamvis reflexis), quam in illo. Pistillum demum staminibus brevius est. Bractee binæ saturatius incarnatae.“ *Linn. Spec.* „Corolla huic basi ventricosior, praecedenti „(*non scripto*)“ vero minime.“ *Willd. Gawler H. pratensem* β *cernuum Brot.* ad *Sc. campanulata* ducit; at *Brotero* suum sequentibus describit. „Folia sublinearia, 1/2 poll. lata, 1/2 ped. et paulo ultra longa, erectiuscula, non undulata. Scapus 1/2-1 ped.. Racemus subcernuus, aut rarius cernuus, pauciflorus, floribus 5-8, saepius secundis. Bractee subulatae, membranaceae. Petala lanceolata, purpurascencia, caerulea aut alba, apice subrecurvo, lineâ dorsali vix elevatâ. Filamenta sublanceolata, singula singulo petalo infra medium inserta. Stylus staminibus longior, corollâ brevior. Variare fertur in Algarbiis filamentis 5 alternis liberis, quae forte species diversa.“ *In Hispania, Linn.; in humidiusculis umbrosis sylvaticis Serra d'Arrabida circa Conimbricam et in Beira boreali et Extremadura: Brotero; non in Prom. b. spei, uti Willd. l. c. 2.*

Obs. III. *Smith* in recentissimo suo opere: *Engl. Flora*, ad *Sc. nutantem* trahit quidem synonymon unicum, quod div. *Linnaeus* sine dubio a *HYACINTHUM cernuum* adduxerat: „*H. hispanicum Clus. hist.* L. p. 177.“ sed *cernui* ipsius *Linnaei* ne verbulo quidem mentionem fecit, quod sane non neglexisset, si *H. cernuus Linn.* eadem fuisset species cum *Sc. nutante*, aut saltem hujus varietas Britanniae indigena; eò magis, cum in *Rees Cyclop.* dixisset: „*SCILLAE nutantis* varietas rosea est *HYACINTHUS cernuus L.* Hoc si animadvertissemus prius in *Engl. Bot.*, *Sc. nutantem* rectius, tam jure prioritatis quam sensus communis *cernuam* dixissemus,“ nunc vero in *Engl. Flora* nec *HYACINTHI cernui L.* nec sui in *Rees Cycl.* mentionem fecisset. *Gawler H. cernuum Linn.* (quem *SCILLAE nutantis* β esse jubet) vix non ubique in Anglia occurrere dicit, et describit: „foliis 5-6 poll., 1/2 poll. latis, linearibus, loratis, acutis, flavescenti-viridibus, scapo brevioribus; pedicellis 1/2 poll.; bracteis geminis, linearibus, acuminatis, pallide caerulescenti-roseis; alterâ pedicello duplo longiore, alterâ duplo brevior et angustiore: corollâ 3/4 poll., caerulescenti-carneâ, laciniis lanceolato-linearibus, apice revolutis, antheris flavis.“ *Anne nutantis* potius varietas, quam *cernuus Linn.*? In *H. Kew. ed. I.* p. 457. occurrebat *HYACINTHUS cernuus*, qui nunc omissus est et neque ad *Sc. campanulata*, neque ad *HYAC. non scriptum* tanquam synonymon adducitur: a *Gawler* vero in *Bot. Mag.* 1102 ad *Sc. campanulata* ducitur, sub qua monet, iconem tantum, *H. hispanici Clus.* ad *Sc. non scriptam* spectare, textum vero ad *campanulata*. *Clus. Sprengel Sc. non scriptam Link* et *H. cernuum L.*, *H. pratensem* et *amethystinum* conjungit *S. F. II.* p. 66. *Steudel* sub *HYACINTHO non scripto* β *nutante* adducit *Sc. nutantem Smith* et *MUSCARI nutans Bieberst. Link* in *Enum.* p. 327. *SCILLAS* corollis campanulatis, *campanulata*, *nutantem*, *cernuam* et *corymbosam*, *LEMONANTHUS* dicit.

e. Dubiae.

38. *Sc.?* *paradoxa M. a Bieb.*; folio radicali solitario; scapo unifloro; pedunculo bulbifero. *M. a Bieberst. Fl. Taur. cauc. Suppl.* p. 267.

Planta singularis, generis dubii. Bulbus ovatus, simplex, *Sc. bifoliae* bulbo minor, ceterum similis. Vagina radicalis hyalina bre-

vis. Folium lineari-lanceolatum, acutum, glabrum, striatum, longitudine scapi, 3 circiter lin. latum. Scapus vix spitham., gracilis, subangulatus. Pedunculus terminalis, filiformis, flore triplo longior. Bractea spathaeformis, oblonga, acuta, hyalina ad basin pedunculi, et altera minor infra eum, e cuius axilla bulbillus albicans subrotundus. Flos *Sc. bifoliae* paulo minor, ceterum formâ simili, in sicca totus albus. Petala oblonga, obtusa, canaliculato-concava, aequalia. Stamina corollâ duplo breviora; filamentis subulatis. Germen subglobosum. Stylus germine longior, stamina aequans. Stigma vix incrassatum. Odor saporque bulbi et herbae siccae nullus. *M. a Bieb.* *Sprengel*, cum? licet, traxit ad *Sc. unifoliam*. *In Iberia. Wilhelms.* 4.

39. *Sc. japonica Thunb.*; florum umbellâ terminali, fastigiata. *Thunb. Jap.* 137. *Willd. Sp. Pl.* II. p. 127.

Scapus erectus, simplex, glaber, palmaris. Bractee in scapo et sub floribus alternae, membranaceae, lanceolatae, erecto-adpressae, unguiculares, interstitiis longiores. Pedunculi semiunguiculares. Corolla patens, albo-purpurea. Petala in ungues attenuata, oblonga, obtusa, unguicularia. Filamenta infimâ basi petalorum inserta, corollâ paulo breviora. Antherae oblongae, caerulescentes. Stylus corollâ paulo longior. Stigma capitatum, lobatum. Germen ovatum, glabrum. Folia nunquam vidi in planta florente. *Thunb.* *In Japonia.* 4.

40. **Sc. tetraphylla*; acaulis; floribus fasciculatis; foliis quaternis, ovato-lanceolatis. *Linn. Suppl.* 200. *Willd. Spec. Pl.* II. p. 126.

Radix bulbosa. Folia 4 radicalia, patentia, cruciata, cordato-lanceolata, sessilia, nervosa, laevia. Scapus nullus. Flores foliis dimidio breviores, pedunculis filiformi-setaceis, unifloris, copiosissimis, (bracteis longis). Petala lanceolata, margine membranacea. Filamenta 6, setacea, petalis breviora. Antherae oblongae. Germen subrotundum, sexangulare, obtusum. Stylus filiformis. Stigma obtusum. *Linn.* *In Africa. Fabricius.* 4.

Sc. purpurea Mill.; radice solidâ; racemo conico; floribus numerosis, adscendentibus. *Mill. Dict.* ed. 8. n. 9.

ORNITHOGALUM purpureum *Tournef. Inst.* 380.

Bulbus albus. Folia plura, ut in *Sc. maritima*. Scapus 10-11 poll. Flores intense purpurei. *Mill.* *In Italia.* 4.

1405. HYACINTHUS.

1. **H. orientalis*; corollis infundibuliformibus, semisexfidis, basi ventricosis; (bracteis brevissimis). *Linn. Spec.* p. 454. *Willd. Spec.* II. p. 167. *Mill. Dict.* n. 6. ic. t. 148. *Lam. Enc.* III. p. 191. *Desf. Atl.* I. p. 507. *Loisel. Fl. gall.* 724. *Decand. Fl. fr.* VI. p. 514. *J. St. Hil.* 25. t. 5. *H. racemo sparsim multifloro; bracteis minutis; corollâ deorsum cylindricâ, basi ventricosâ: laciniis recurvo-patentibus; guttulis 3 crystallinis ad apicem germinis.* *Gawl. Bot. Mag.* 937. *Schneevogt Ic.* 8. *Bot. Reg.* t. 995. *Kniph. Cent.*

l. t. 75. *H. Eyst. Vern. ord.* 2. fol. 4-7, 14. 15. Zumbul
 Indi *Parkins. Parad.* t. 121. f. 2. 5. 5. 6. *Barrel. Ic.* 169.
 170. 981. 982. 985 — 988. *Clus. Hist.* 1. p. 174. 175. *H.*
orientalis Bauh. Pin. 44. *Hist.* 2. p. 576. *Moris. s.* 4. t. 11.
 f. 10. — β fol. recumbentibus. *Redout. Lil.* 465. (nec
 uti sphalmate in textu 475.) — γ . monstrosus. *Hirt Forts.*
Gart. Mag. V. p. 4. tab. 5.

Spontaneae, a *Lamarck l. c.* descriptae, bulbus squamosus; fo-
 lia 5-6 erecta, 5-8 poll., latiora quam in reliquis, glabra, tenuis-
 sime striata, subsucculenta, dorso convexa, subcarinata. E cen-
 tro foliorum scapus (subinde plures) teres, glaber, foliis parum
 altior. Racemus erectus, 6-18-florus: floribus sparsis, odoris,
 caeruleis, rubellis albisve. Cor. campanulato-cylindrica, basi
 subventricosa, ad medium usque divisa in lacinias 6 recurvas.
 Pedunculi 4-5 lin., basi bracteis 2 membranaceis pedunculo multo
 brevioribus. *In Oriente prope Bagdad et Aleppo; in*

Barbaria; in Gallia merid. prope Toulon et Nicaeam. 4.

Obs. De varietatibus ultra 2000 flore albo, rubro, flavo, caeruleo, pleno et se-
 mipleno vide *J. G. Olearius, Hyacinthen - Betrachtung.* 12. Leipzig 1665.
G. Voorhelm, Abhandlung von den Hyacinthen. A. d. Franz. übers. v.
Huth. 8. Nürnberg. 1753. *Traité sur la connoissance et la culture des Jacin-*
thes. 12. Avignon. 1765. *Des Jacinthes, de leur anatomie, reproduction et*
culture, par Mr. le Marquis de St. Simon. 4. Amsterd. 1768 (Rapport sur
 cet ouvrage par *Gleditsch. Mém. de l'Acad. d. Berlin.* 1768) *Grotjan*
physikal. Winterbelustigungen mit Hyacinthen, Jonquillen, Tulpen etc. 8. Nörd-
 lingen 1766-74. 3 Th. *Nic. van Kampen, Beschreibung der Hyacinthen*
und Tulipanen. 8. Quedlinb. 1771. (Conf. Beschreibung der schönsten (647) Hy-
 acinthen, welche sich in der berühmten Sammlung *N. van Kampen u. Sohn*
 befinden.) *J. C. Küster, Abh. von d. Schönheit d. Hyacinthen.* *Hannöv.*
Mag. 1778. *Buchoz, Collection coloriée de plus belles variétés de Jacin-*
thes. Paris 1781. *Gebrüder Veen u. Comp., kurze Abhandlung v. Blumen-*
zwiebeln, übers. v. Münster. 1781. *S. J. Schröter, Beschreibung ei-*
ner Haarlemer Hyacinthen-Flor. 8. Erfurt 1789. *J. Krepis u. Sohn, Be-*
merkungen über die Cultur der Hyacinthen. A. d. Fr. mit Anmerk. v. *D. G.*
Schröter. 8. Erfurt 1791. *Neuenhahn, die Blumenzwiebel-Gärtnerei.*
 8. Leipzig 1804. 2 B. *C. G. Rössig, Anweisung zur Wartung und Pfl-*
gung d. Hyacinthen für Freunde u. Freundinnen dieser Blumen; nebst einem
Versuche, die verschiedenen Arten derselben in ein System zu bringen. 8. Leip-
 zig 1806. *Desselb. Die Hyacinthen nach ihren Varietäten u. Sorten, nach der*
Natur gezeichnet. *Ebend. Gründliche Anweisung Hyacinthen u. andere be-*
liebte Zwiebelgewächse im Winter auf verschiedene Art zu treiben. 8. Glogau
 1816. Confer etiam *Krünitz Enc. B. XXVII. S. 368. et e Catalogis pluri-*
 mis: Katalog d. schönsten u. auserlesensten Sorten Hyacinthen, welche bey Joh.
 u. Matth. *Klefecker* in Hamburg zu bekommen sind; et in *Allg. Gart. Mag.*
 1804. Int. Bl. n. 8. *Küster.* 1805. Int. Bl. n. 5. *Schaeffer.* N. 10.
Voorhelm et Schneevogt. 1807. Int. Bl. n. 11. *J. J. Gottholdt.*
 1808. Int. Bl. n. 4. *Voorh. et Schneev.* 1809. Int. Bl. n. 6. *Leuschner.*
Fortges. Gart. Mag. v. IV. Int. Bl. n. 1. Platz. N. 3. *A. F. Dreyssig.*
 In *Allgem. Garten-Magazin* 1804. S. 196-201. v. *Essen.* *Fortsetz.*
Allg. Garten-Mag. vol. VII. p. 213-216. *Herbert. On the Culture of*
Hyacinths. Trans. Hortic. Soc. IV. p. 163. *Campbell über d. Cultur d.*
 Garten-Hyacinthe. *Neues Gart. Magaz. B. III. St. 1.*

2. *H. nanus*; corollâ terminali, solitariâ, rarius 2, in-
 fundibuliformi-campanulatâ, semisexfidâ, basi ventricosâ; fo-
 liis 1-2. *SCILLA bifolia Sieber Herb. Fl. Cret. PUSCHKINIA*
scilloides Sieber Reis. Cret. 2. p. 519. t. 7.
Sieber in Reise n. Creta SCILLAM bifoliam suam in Herb. Fl. cret. et
cum? etiam Sc. bifoliam Smith Prodr. Fl. graec. ad PUSCHKI-
NIAM scilloidem spectare dicit. Specimina 2 nostra ab ipso Sieber
 communicata omnino abhorrent a *PUSCHKINIA*, et propriam sorte
 Hyacinthi speciem, *H. orientali* proximam, sistere videntur, quod
 examen ulterius in speciminibus vivis docebit. Bulbus ovatus, tuni-

catus, fuscus, $\frac{1}{3}$ poll.. Scapus solitarius, erectus, gracilis, glaber, vix crassitie fili emporetici, $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ poll., uniflorus, rarius biflorus. Folia radicalia 1 - 2, (an semper?), linearia, erecta, apice obtusiusculo reflexo, inferne canaliculata, glabra, scapum aequantia, 1 - $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Bractea nulla. Corolla erecta, 4 - $4\frac{1}{2}$ lin., apice 4 lin. diam., pallide lilacina; inferne tubulosa et quidquam ventricosa, dein paulo constricta et infundibuliformi-dilatata, ad $\frac{2}{3}$ fere usque divisa in lacinias oblongo-lanceolatas, obtusas, apice callosas, vix revolutas, nervo medio percursas, subaequales, vix lin. latas. Stam. corollâ plus duplo breviora, alterna paulo breviora; filamenta brevia, tubo adnata, planiuscula, albida; antherae lineari-oblongae, obtusae, basi emarginatae, dorso supra medium affixae, magnae, flavae, $1\frac{1}{2}$ lin.. Germen subrotundum, obtuse trigonum. Stylus brevis, crassus, erectus, staminibus brevior. Stigma obsoletum. *In summis mont. Sphakioticis Cretae.* 4.

3. *H. Pouzolzii Gay*; foliis lineari-filiformibus, interdum basi bulbiferis; scapo 2-3 unciali, 2-4-floro; corollis caeruleis, campanulatis, (basi vix ventricosus); bracteis ovato-lanceolatis pedicellum subaequantibus, (vel paulo superantibus). *Loisel. in Ann. d. l. Soc. Linn. d. Paris. T. VI. 1827. Bulletin. d. Sc. natur. 1828. p. 328.*

Bulbus ovatus, tunicatus, fuscescens, $\frac{1}{2}$ poll.. Folia radicalia, 2-3, erectiuscula v. flaccida, scapum aequantia v. paulo superantia, in siccis linearia, basi canaliculata, obtusa, glabra, $3\frac{1}{2}$ poll., lin. lata; unum alterumve 3 - 4 lineis supra basin in sulco medio gerit bulbillum globosum, pallidum, vix magnitudine seminis Cannabis. Scapus gracilis, flaccide erectus, ut videtur, teretiusculus, glaber, viridis, 3 poll., vix crassitie fili emporetici, apice floribus 2 sat approximatis. Pedunculi erecti, $1\frac{1}{2}$ lin., basi bracteam lanceolatam inferne dilatatam et scapum semiamplexante, membranaceam, dein in acumen obtusum angustatam, erectam, appressam, $2\frac{1}{2}$ - 3 lin., pedicellos superante. Corolla erecta, infundibuliformi-campanulata, $3\frac{1}{2}$ lin. longa et totidem superne in diam., basi tubulosa, sed non ventricosa, ad $\frac{1}{3}$ usque partita in lacinias ovatas obtusiusculas, erecto-patentes, sed non revolutas, nervo medio percursas. Stamina cor. tubum vix superantia: filamenta brevia, tubo infra medium affixa, basi dilatata plana, superne subulata, erecta, glabra, alterna paululum breviora; antherae oblongae, obtusae, medio dorsii affixae, caeruleae, $\frac{1}{2}$ lin. longae. Germen subrotundum, magnitudine seminis Sinapeos. Stylus crassiusculus, erectus, subulatus, stamina paulo superans. Stigma obtusum, et ut videtur excavatum. *Ad specim. in Herb. cli de Martius, qui eundem nomine HYACINTHI comosi ex Herbario societatis itinerariae wirttembergensis accepit. In Corsica prope Bastia.* 4.

4. **H. amethystinus*; corollis campanulatis, semisexfidis, basi cylindricis, (nutantibus; bracteis longitudine pedunculorum; foliis linearibus, glabris.) *Linn. Spec. 454. Willd. Spec. II. p. 167. (excl. Pall. it.) Mill. Dict. ed. 8. n. 5. Lam. et Decand. Fl. fr. III. p. 206. Redout. Lil. t. 14. (excl. Pall.) Bot. Reg. 398. Bot. Mag. 2425. H. hispanicus; cor. campanulatis, basi cylindricis; limbo 6-fido;*

bracteis solitariis pedicellis longioribus. *Lam. Enc. III. p. 191.* (fid. syn. *Bauh. a Linn. laudati*). *H. angustifolius Medic. in Usteri Annal. St. 2. 18. Rudb. Elys. II. p. 27. f. 8.* *H. minor hispanicus angustifolius. Bauh. Hist. II. p. 587.* (uterque fid. *Linn.*) *Park. Parad. 120. H. minor hispanicus Clus. Exot. App. alt.*

Bulbus (ovatus) magnitudine *Olivae*. Folia 5-6, angusta, striata, subtus carinata. Scapus 5-7 poll., gracilis, subpurpurascens. Racemus erectus, e floribus 6-7 parvis, caeruleis, (nutantibus), inodorus. Cor. lacinae quidquam patentes. *Clus.* Folia 3-4, erecta, linearia, 3 $\frac{1}{2}$ poll. Scapus teres. Racemus primum cernuus, dein erectus, 4-7-florus. Flores laete caerulei, ad $\frac{1}{4}$ usque 6-fidi. Bractee ad minimum longitudine pedicellorum *Dec.* In cultu: folia 6-7, scapum aequantia vel breviora, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ poll. lata, ligulata, attenuata, canaliculata, recumbentia. Scapus (7-) 9 poll. - ped.. Racemus multiflorus, laxus, erectiusculus; floribus nutantibus caeruleis. Pedicelli (8-12) recurvati, longitudine florum vel breviores (3-4 lin.; fructiferi erecti 5-6 lin.). Bractee membranaceae, subcoloratae, lineari-lanceolatae, angustae. Cor. fere $\frac{1}{2}$ unc. (4-5 lin.), diametro pennae corvinae majore, nec fundo tumida, ut in *H. orientali*, superne obsolete hexagona, angulis saturatius caeruleis; limbus pallidior, aequalis, recurvo-divaricatus; laciniis obovato-rotundis, exterioribus incrassato-apiculatis, interioribus retusis. Stam. corollae $\frac{1}{2}$ fere breviora, alterne longiora; filamenta ad $\frac{3}{4}$ adnata, subulata, conniventia; antherae erectae, a dorso appensae, subrotundae, polline sulfureo. Germen subrotundum, obsolete 3-lobum, 6-lineatum. Stylus subulato-continuus, strictus, subtriqueter, ad lentem 6-striatus, stamina breviora aequans; stigma obtusum. *Ker.* Corollae semisexfidae ad subgenus *Scillarum LIMOXANTHEN* transit. *Link.* In *Hispania?* (quaerit *Linn.*), in *Pyrenaeis: Ramond; in Croatia. 4.*

5. *H. pallens M. Bieb.*; corollis campanulato-cylindricis; limbo erectiusculo tubo duplo brevioribus; bracteis minimis; foliis lineari-lanceolatis, erectis, (planiusculis, nervosis.) *M. a Bieb. Fl. taur. cauc. 1. p. 283. Suppl. p. 275. Hornem. h. hafn. Suppl. p. 42. Reichenb. Ic. rar. Cent. IV. p. 27. t. 331. HYAC. amethystinus Pall. it. III. p. 589. Gildenst. it. p. 35. 109. MUSCARI pallens Cat. H. Gor. 1812. p. 9. Besser Cat. H. Crem. 1816. p. 89.*

Statura et folia *M. botryoidis*, cujus magnitudine etiam flores campanulato-cylindrici, ex albido caerulei, erecto-patuli. Pedicelli flore breviores. Bractea squamula obsoleta. *H. amethystinus L.* est planta flore magnitudine *H. orientalis*, ergo nequaquam nostra. *M. a Bieb.* Cor. lacinae ovatae: alternae interiores breviores. Genitalia intra tubum corollae. Huic similimum corollae triplo majore saturatiore, in collibus ad rivum Belaja, Donez inter et Don, occurrit, quod forte genuinus *HYAC. amethystinus L.* *H. amethystinus Fl. fr. n. 1922.* discrepat: bracteis pedicellos aequantibus. *M. a Bieb. Suppl.* In speciminibus nostris e Podolia: scapi 1-2 ex uno bulbo, erecti, teretes, 5 poll. - Folia scapum subaequantia, erecta, lanceolata, acuta, basi attenuata, plana, glabra, margine sub lente scabriuscula,

nervosa, pallide viridia, medio 4-5 lin. lata. Racemus oblongus, multiflorus, 4-4 $\frac{1}{2}$ poll.. Pedunculi erectiusculi vel patentés, filiformes, 1 $\frac{1}{2}$ lin.. Bracteae minimae. Corollae 2 lin., ad $\frac{1}{3}$ usque 6-fidae; lacinae ovatae, acutae, alternae interiores quidquam breviores. Stamina corollâ duplo breviora, filamenta corollae adnata; antherae oblongae, intense caeruleae, polline flavo. Germen rotundato-ovatum. Stylus filiformis, antheras aequans. *In planitie ad Caucasum; in Caucaso iberico; in Podolia Besser; prope Odessam Lang. 4. Conf. HYACINTHUM lineatum Steud.*

6. *H. lineatus Steudel*; corollis campanulatis, semisexualibus, basi cylindricis; bracteis minimis; foliis ovato-lanceolatis, nervosis, ciliatis.

Habitu *H. pallenti* proximus, floribus etiam *H. amethystino* affinis, sed ab utroque diversus. Bulbus ovatus, albus, $\frac{1}{2}$ poll.. Folia radicalia, 2-3, basi erecta et sese involventia, dein patentia, scapo breviora, plana, ovato-lanceolata lanceolatave, abrupte acuminata et apice subfornicata, pallide viridia, nervis prominentibus 6-12 circiter lineata, margine subcalloso, ciliis patentibus albidis, 2-4 $\frac{1}{2}$ lin. lata, cum parte subterranea 2-5 $\frac{1}{2}$ poll.. Scapus erectus, teres, 2 $\frac{1}{2}$ -5 poll., pedicellos inter caerulescens. Racemus erectus vel subincurvus, circiter 12-florus, $\frac{3}{4}$ -1 poll.: Pedunculi erecto-patentes, rarius subnutantes, teretes, caerulei, glabri, 1-2 $\frac{1}{2}$ lin.. Bracteae minutissimae, inaequales, lacerae, pallide caerulescentes. Cor. erectae vel subnutantes, azureae, minores quam in *H. amethystino*, 2-2 $\frac{1}{2}$ lin., apice 2 lin. in diam., obsolete angulosae; limbo concolori, quidquam patulo, nec contracto; laciniis vix $\frac{1}{2}$ corollae attingentibus, rotundato-ovatis, obtusis. Stam. corollâ paulo breviora, aequalia; filamenta subulata, medio tubi adnata et decurrentia; antherae ovatae, erectae, polline luteo. Germen subrotundo-ovatum, trilobum, viride. Stylus longitudine staminum, erectus, superne caerulescens. Stigma obsoletum. *H. ciliatus Cyr.* (quo nomine hanc plantam etiam ex herbario societatis itinerariae wirttembergensis accepimus) omnino differt. Huc videtur spectare planta, de qua div. *M. a Bieberstein* sub *HYACINTHO pallenti* monuit: „huic (*H. pallenti* nempe) simillimus corollâ triplo majore, saturatiore, in collibus ad rivum Belaja, Donez inter et Don occurrit, qui forte genuinus *H. amethystinus* L. Alium, bracteis pedicellos aequantibus discrepantem, sub eodem nomine proponit *Flor. gall. n. 4922.*“ Planta Linnaeana tamen fide synonymorum eadem ac illa in *Lam. et Decand. Fl. fr.*, quae omnino ab hac diversa. *Prope Smyrnam. Fleischer. 4.*

7. **H. convallarioides*; corollis campanulatis, ovatis, pendulis; scapo filiformi; (foliis hysteroanthiis). *Thunb. prodr. 64. Fl. cap. ed. Schult. p. 526. Linn. Suppl. p. 204. Jacq. H. Schönbr. I. p. 42. t. 81. Willd. Spec. II. p. 168.*

Bulbus ovatus magnitudine Avellanae. Folia sub florescentia nulla. Scapus flexuoso-erectus, glaber, palmaris. Racemus oblongus, suberectus. Pedunculi sparsi, capillares, reflexi. Corollae cernuae, albidae, carinâ dorsali viridescente. *Thunb.* An *Jacquinii* planta re verâ eadem, cui: „Bulbus subrotundus, tunicatus, fuscescens, avellanâ major. Folia plura, linearia, acutula, angusta, crassula, antice sulcata, erecta, scapo breviora.

Scapus ante folia, teres, erectus, nitidus, purpureus, 4-5 unc. Racemus laxus. Pedunculi circiter 7, uniflora, subnutantes, graciles, purpurei, 3-4 lin.; bracteolâ minutâ, lanceolato-acuminatâ concolore. Flores penduli, inodori, sordide albidi, cum fascia media purpurea. Cor. patens; laciniis ovatis, obtusis, concavis, erectis. Filamenta subulata, erecta, laciniis duplo breviora. Antherae sagittato-oblongae, erectae, conniventes, luteae. Germen ovatum, leviter trisulcatum, subflavescentis. Stylus albus, crassulus, trisulcatus, erectus, staminibus longior. Stigma trifidum, obtusum. " In *Cairo infra Roggeveld*. 4.

8. *H. flexuosus* Thunb.; corollis campanulatis; racemo erecto; foliis linearibus scapo (flexuoso) longioribus. Thunb. *prodr.* 64. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 326. Willd. *Spec.* II. p. 168.

Folia circiter 3, laxa, integra, flexuoso-erecta, glabra, spithamaea. Scapus simplex, teres, glaber, flexuoso-erectus, palmaris. Racemus ovatus, pollicaris. Pedunculi filiformes, flexuosocernui post florescentiam. Thunb. In interioribus regionibus *Prom. b. sp.* 4.

9. **H. revolutus* Thunb.; corollis sexpartitis, (ovato) campanulatis, revolutis; foliis oblongis (lanceolatisve) undulatis. Linn. *Suppl.* p. 204. Thunb. *Prodr.* 64. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 326. (excl. syn. Willd.) PHALANGIUM *spicatum*; fol. oblongis, undulatis; spicis longissimis, pyramidatis; petalis revolutis. Poiret in *Lam. Enc.* V. p. 247.? PH. *revolutum* Pers. *Syn.* 1. p. 367. n. 10.

Div. Willdenow nonnisi cum? *H. revolutum* DRIMIAE *undulatae* subscripsit; Thunberg vero sine dubio in *Fl. cap.* DRIMIAM *undulatam* Willd. ad suum *H. revolutum* laudavit. Differt vero DRIMIA *undulata* toto coelo, ut ex descriptione utriusque liquet: „Folia radicalia circiter 5-4, lato-lanceolata, acuminata, undulata, glabra, margine membranacea, scapo breviora, poll. usque palmaria. Scapus filiformis, sulcatus, simplex, glaber, flexuoso-erectus, palmaris vel spithamaeus. Racemus terminalis, erectus, sensim florens, multiflorus, pollicaris palmarisve. Pedunculi filiformes, sparsi, reflexi. Corollae revolutocernuae, albidae, carinâ dorsali viridi. Differt ab *H. non scripto*: corollis subglobois; foliis ovatis. Thunb. In *Prom. b. sp.* 4.

Obs. *H. Kew.* ed. 2. II. p. 283. citat ad suum *H. revolutum* Linn. *Suppl.* monetque DRIMIAM *undulatam* plantam esse omnino distinctam. *H. revolutus* *H. Kew.* vero non *revolutus* Linn. *Suppl.*, sed DRIMIA *lancaefolia* β minor Gawl., i. e. DRIMIA *Gawleri* Schrad. est. — Cls. Poiret l. c. specimen incompletum PH. *spicati* in *Herb. Lam.* cum specimen *H. revoluti* a Thunb. misso comparavit, et utrumque unam eandemque speciem, ad PHALANGIA, nec ad HYACINTHOS spectantem, sistere putat. Specimen in *Herb. Lam.*, in quo folia omnia desunt, sequentibus describitur a cl. Poiret: „Scapus videtur fuisse praealtus, glaber, simplicissimus, teres. Racemus terminalis, 7-8 poll., simplex, pyramidatis, attenuatus, apice obtusus. Flores sparsi, basi remotiusculi, apice approximati, solitarii, rarius congesti. Pedunculi filiformes, inaequales, saepe poll. Bractee membranaceae, acutae. Corolla pallide flava, fasciâ fuscâ, pedunculis duplo fere brevior. Petala lanceolata, obtusa, a basi ad medium usque approximata, dein revoluta. Stamina corollâ paulo breviora. Filamenta glabra, alba; antherae parvae, flavescentes. Caps. ovalis, subrotunda.“ Miramur elm. Poiret specimen incompletum, non *HYAC. revolutum* ipsius Thunberg descripsisse.

10. *H.?* *pusillus* Thunb.; corollis infundibuliformibus,

erectis, semisexfidis; bracteis pedunculis brevioribus. *Lam. Enc. III. p. 194.* *H. pusillus Thunb.* Ms. apud *Lam. l. c.*

Hujus *Thunberg* serius nullibi, saltem sub hoc nomine, mentionem fecit; misit clo *Jussieu*, in cujus *Herb.* observavit *Lamarck*, et descripsit sequentibus: „Scapus $1\frac{1}{2}$ -2 poll. Flores a medio scapi ad apicem 6-7, rubelli aut caerulescentes, pedicellati, limbo mediocriter patente, 4 lin. longi, pedunculis duplo et ultra longiores. Bracteaec geminae, inaequales. Folia 3 poll., $1\frac{1}{2}$ lin. lata. *Lam.* ad specim. *Thunb.* et *Sonnerat.* A *DRIMIA pusilla Jacq.* abunde diversa. *In Promont. b. spei.* 4.

11. *H. sulphureus Poir.*; spicâ pedunculisque brevissimis; corollis clavato-campanulatis, semisexfidis; foliis linearibus; caule maculato. *Poir. Enc. meth. Suppl. III. p. 119.*

H. monomotapensis, flore clavato, sulphureo-rufescente; caule maculato. *Desf. Herb.*

Caules debiles, 8-10 poll., plerumque maculati. Folia radicalia, caule breviora, angusta, obtusiuscula. Spica brevis, laxa. Pedunculi setacei, corollâ duplo breviores. Bracteaec minutissimae. Corolla pallide vel rufescenti-sulphurea. Stamina tubo longiora; filamenta capillaria; antherae minutissimae. *Poir. In Monomotapa.* 4.

12. *H. spicatus Sibth.*; corollis campanulatis, semisexfidis, spicatis; staminibus membranaceis. *Smith Prodr. Fl. Gr. I. p. 237. n. 816.* *Βοῦβοί Zacynth.*

Folia lineari-lanceolata, angusta, spithamaca. Scapus foliis paulo brevior. Flores dense spicati, omnes omnino fere sessiles, triste caerulescentes, magnitudine vix *romani*. Bracteaec parvae, plus minus reflexae. *In insula Zacyntho, et in agro argolico.* 4.

13. *H. dubius Guss.*; corollis angulato-cylindricis, 6-dentatis, racemosis: summis subsessilibus; pedunculis patentibus, flore nutante brevioribus; filamentis teretibus, basi dilatatis; antheris ferrugineo-rubellis; capsulis trigonis, emarginatis. H. cor. campanul., subsexfidis, angulatis, racemosis; stam. teretibus, basi dilatatis. *Guss. Cat. Boccadifalc. 1821. p. 70. n. 11. Prodr. Fl. sic. 1. p. 424.* *Tenore App. 4. p. 17.*

Medius quasi *H. romanum* inter et *spicatum*. Folia lato-linearia, canaliculata, acuminata, laxa, glaucescentia, 9-11 poll., 4-6 lin. lata. Scapus solitarius vel 1-3 ex eodem bulbo, teres, crassitie pennaec anatinae, 5-6 poll.. Racemus cylindraceut, laxus, erectus 2-2 $\frac{1}{2}$ poll.; rhachis pedicellique purpurco-rubri. Pedicelli parsi, subaequales, horizontales vel subrecurvi, 1-2 lin. Bracteaec minutae, ovatae, irregulares, lacerae. Corollae inodorae, ante et sub anthesi caeruleae, ore albo-virente vix aperto, peractis nuptiis sordide virescenti-ferrugineae ore pallenti-viridi, 2 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ lin., plerumque quidquam nutantes; laciniac minus profundae quam in *romano*, ovato-rotundatae, minus patulae. Stam. corollae adnata eademque paulo breviora; filamenta apice teretia, inferne plana, dilatata et connata; antherae ante anthesin ferrugineo-rubellae. Stylus staminibus

paulo brevior. Capsula fere obcordata, dimidio minor quam in *H. romano*. „Species intermedia *romanum* inter et *comosum*; sed uterque major, pedicellis longioribus: prior differt colore caeruleo rhachis et formâ racemi thyrsoidê; corollis majoribus campanulatis, patulis, basi tantum subcaeruleis, reliquâ parte totis albis et demum sordide cinereis; filamentis liberis, longioribus, dilatatis; antheris azureis; capsulis apice tantum rotundatis, obtusis; alter: comâ terminali sterili; corollis brevioribus.“ *Bertolon in litt. Sprengel Syst. Veg. II. p. 65.* junxit perperam cum *H. romano*. *In Sicilia et Apulia. 4.*

14. **H. romanus*; corollis campanulatis, semisexfidis, angulatis, racemosis; pedunculis erecto-patentibus, flore longioribus; filamentis membranaceis, planis; antheris azureis; capsulis apice rotundatis. *Linn. S. V. p. 335. Mant. 224. Willd. Spec. II. p. 169. Lam. Enc. III. p. 192. Hort. Kew. ed. II. p. 285. Desf. Atl. 1. p. 308. Savi Fl. pis. 1. p. 355. Smith Prodr. Fl. gr. II. p. 237. Sibth. Fl. graec. t. 340. Lam. et Dec. Fl. fr. VI. p. 314. Sebast. et Mauri prodr. Fl. rom. p. 130. n. 417. Sebast. rom. pl. Fasc. II. p. 10. t. 1. f. 2. Tenor. Fl. neap. 1. p. 186. Guss. Prodr. Fl. sic. 1. p. 424. Redout. Lil. VI. t. 354. SCILLA romana *Gawl. in Bot. Mag. t. 959. BELLEVALIA operculata Picot de Lapeyr. in Journ. d. Phys. T. 67. p. 425. t. 1. Schrad. n. Journ. V. 5. p. 121. B. appendiculata Fl. abr. d. Pyr. p. 186. Musc. byzantin. flore candicante. Tournef. Inst. 347. H. alb. comos. belgicus. *Bauh. Pin. 4. H. alb. com. cum caerul. stam. Bauh. Hist. II. p. 584. (uterque fid. Linn.) Lob. ic. t. 107. f. 1. H. comos. albo flore Clus. Hist. 180. f. 2. H. com. byzantinus Besl. Eyst. vern. ord. II. t. 11. f. 2. H. comosus Park. par. t. 117. f. 1.***

„Folia latitudine digiti, longissima. Racemus longus, teres, floribus numerosissimis. Pedicelli longitudine florum. Bracteae minutae, membranaceae, muticae. Corollae campanulatae (cylindrico-ovatae *D. Capeller*) ultra medium 6-fidae, albae. Filamenta membranacea, lato-lanceolata, laciniis corollae opposita. Antherae caeruleae.“ *Linn.* Bulbus ovatus, fere poll., tunicis fuseis. Folia 4-5, lanceolato-lineararia, canaliculata, apice subconvoluta longe attenuata, et plerumque marcescentia, striata, intus glaucescentia, glabra, scapo multo longiora, $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ ped., inferne 4-6 lin. lata. Scapus teres, erectus, glaber, subinde rubro-punctatus, apice caeruleo, 8-16 poll., crassitie pennae gallinae ad pennam anserinam fere usque. Racemus erectus, latus, conico-cylindricus, $1\frac{1}{2}$ -4 poll., 10-30 florus. Pedunculi adscendentes, teretes, virides, supremi caeruleo, primum longitudine corollae vel breviores, 2-3 lin., serius 5-6 lin. Bracteae minutae, ovatae, lacerae, reflexae, caducae, irregulares, albidae vel caeruleo, vix lin., superne minores. Cor. albida, cito marcescens et dein sordida et rugosa, basi angulata, superne patula, ad medium usque partita, 3-5 lin.; lacinae ovatae, exteriores superne incrassatae et appendice minuto subtriangulâ. Stam. corollâ paulo bre-

viora; filamenta alba, plana, lineari-lanceolata, inferne in membranam cum corolla concretam connata; (corollâ exsiccata corpus filamentorum fit liberum et germen obvolvitur. *Lapeyr.*) Antherae intente caeruleae, primum sagittatae, demum didymae. Germen ovatum, 6-striatum, subtrilobum, caeruleum. Stylus longitudine staminum, erectus, albus. Stigma simplex depressum. Caps. triangularis, obtusa (ex *Lapeyr.*), lobis attenuato-compressis fere ut in *Muscari* (ex *Gawl.*). Sem. globulosa, nigricantia. Inodorus. In *Gallia merid.*, *Pyrenaeis Lapeyr.*, vulgaris in *Italia meridionali*, in *Sicilia*, in *insulis Dalmatiae*, in *Barbaria*. 4.

Obs. Character *Bellevaliae Lapeyr.*, quae nobis omnino eadem videtur cum *H. romano* ex *Italia*, et quae forte merito genus proprium: „*Cor.* infera, 6-partita, persistens. *Filam.* monadelphia, basi perigonio primum adnata, deinde libera.“ *Lapeyr.* l. c. „Cum corolla sit campanulata semisexfida, patens nec botryoidea, ore coarctato, species haec non videtur conjugere genus *Hyacinthi* cum genere *Muscari*, uti placet ill. *Smith* in *Prodr. Fl. graec.*“ *Bertoloni* in *litt.*

Obs. *Hyacinthus spicatus Pursh* a *Steudel* adductus non existit in *Pursh Fl. sept. Am.*

Quid: *Hyacinthus aporus Forsk. Fl. aeg. ar.* p. CX. ex *Arabia felici?*
griseus Brouss. Cat. H. Monsp.?

1406. M U S C A R I

1. *M. ciliatum Her*; corollis campanulato-cylindricis, semisexfidis; pedunculis fructiferis longissimis, horizontalibus; foliis ciliatis. *M. a Bieberst. Fl. Taur. cauc.* 1. p. 284. (sub *HYACINTHO ciliato*). *M. ciliatum Bot. Reg.* 594. *Besser Enum. pl. Volh.* p. 45. *Hyacinthus sarmaticus Pall. Ind. taur.* in *Nov. Act. petrop.* X. p. 509. *HYAC. ciliatus*; spicâ laxâ, diffusâ; pedunculis longissimis, subnutantibus; corollis angulatis. *Cyrill. Neap.* 2. 22. t. 10. *HYAC. romanus β*; flor. inferioribus longissime pedicellatis. *Lam. Enc.* III. p. 192. (fid. *Poir. Enc. Suppl.* III. p. 119.) *Musc. byzant.* flore candidante *Tournef.* 347. *H. comos. byzant. Clus. Hist.* 1. p. 180. *Bauh. Hist.* 2. p. 583. (uterque fid. *Bieberst.*, ab aliis ad *romanum.*)

Folia digitum lata, patentia. Corolla tubo lurido, limbo viridulo. *M. a Bieb.* Bulbus rotundus, tunicis externis subfuscis, interioribus candidantibus, basi fibris multis albis. Folia 4-6, oblonga, compressa, palmaria et longiora, obtusa. Scapus ped. inferne teres, superne subtrigonus, a medio ad apicem floridus. Pedunculi ante anthesin erecti, scapo adpressi, 1-2 poll., teretes, punctis minutissimis purpureis; sub florescentia cernui, arcuati, insigniter elongati, demum horizontales, vel adscendentes. *Cor.* 6-partitae, obscure purpurascens, laciniis lanceolatis, undulatis, crispis, e viridi lutescentibus, externe angulatae. Filamenta corollae laciniis adnata, antheris purpureis. Germen ovato-oblongum. Stylus longitudine staminum, stigmate trigono. Caps. trigona. Sem. subrotunda. *Cyrill.* Omnino diversum a *H. romano*, pro cuius varietate habuit *Lamarck.* Corollae minores quam in *M. comoso*, primum albidae. Filamenta omnino corollae adnata; antherae purpureae. Stylus longitudine staminum; stigma trigonum, quidquam pubescens. Capsula oblonga, trigona. Semina nigra, rotundata. *Her.* In planta volhynica capsulae loculi 3-spermi. *Besser.* Coma

nulla. In Europa australi, in Volhynia ad Jaorlik, in Ucraina, Tauria, in Caucaso et in Syria. 4.

2. **M. comosum* Mill.; racemoso-spicatum; floribus supremis comosis, approximatis, sterilibus, erectis: inferioribus remotis, distantibus, patulis. *Targ. Tozz. obs. bot. n. 24.* *M. corollis cylindraceis, angulatis, longe pedunculatis, summis sterilibus longissime pedicellatis. Willd. Enum. H. berol. p. 378. Mill. Dict. n. 2. Desfont. Atl. 1. p. 309. Dec. et Lam. Fl. fr. III. p. 207. Roth Enum. pl. germ. I. 2. p. 61. Mert. et Koch D. Fl. II. p. 566. Guss. Prod. Fl. sic. 1. p. 425. Redout. Lil. 231. Musc. longissimum Med. in Ust. Ann. St. 2. p. 15. HYACINTHUS comosus Linn. Spec. 455. Mant. p. 366. Willd. Spec. II. p. 169. Lam. Enc. III. p. 192. Scop. Carn. n. 425. Roth germ. II. 589. Bertol. Amoen. ital. p. 145. Seb. et Maur. prodr. Fl. rom. p. 150. Savi Fl. pis. 1. p. 354. Tenor. Fl. neap. 1. p. 187. n. 208. Jacq. Fl. austr. t. 126. Curt. bot. Mag. t. 133. Hall. helv. n. 1247. H. major purpur. Bauh. pin. 42. Hist. 2. p. 571. ic. Lob. ic. 106. f. 2. H. Eyst. vern. 2. p. 17. f. 1. Moris. Hist. II. p. 371. s. 4. t. 11. f. 1. Zannich. Ven. t. 100. Hort. Rom. VI. t. 49. Musc. arvense latifolium purpurascens Tournef. inst. 347. fid. Smith in Prodr. fl. graec. β . H. monstrosus; corollis subovatis. Linn. Spec. 454. Brot. Fl. lusit. p. 536. H. paniculatus; racemo paniculato, sterili; pedunculis ramosis, coloratis; corollis campanulatis, basi acutis. Lam. Enc. III. p. 195. MUSCARI monstrosum Mill. Dict. n. 4. Kern. oek. Pfl. t. 122. Mord. Delaunay II. t. 6. Musc. paniculatum Med. in Ust. Annal. II. p. 16. Bauh. pin. 42. H. sanne-sius. Column. Ecphras. II. p. 10. t. 10. Moris. l. c. f. 2. γ . ustilagine corruptum. HYACINTHUS fuliginosus Pall. ind. taur. in Nov. act. Petrop. X. p. 309. δ . flore albo. ϵ . flore carneo.*

„Corollae decolores, tristes, fere H. *Muscari*, horizontaliter exstantes sub et post anthesin; ante anthesin erectae, caeruleae, pedicellis viridibus longitudine florum. Corollae superiores minutae, steriles, vix dehiscentes, violaceae: pedicellis longissimis caeruleis, laetis, corymbum formantibus.“ *Linn. Mant. 366.* — Bulbus rotundato-ovatus, albus. Scapus rectus, nudus, teres, glaber, pedalis et ultra. Folia radicalia prostrata, 8-16 poll., scapum subaequantia, 4-6 lin. lata, glabra, basi canaliculata, medio plana. Racemus subcylindricus, laxus, 4-8 poll. Flores inferiores fusco-flavicantes, basi virescentes, superne purpurâ suffusi, cylindrici vel ovato-cylindrici, subangulosi, 3-4 lin., in pedicellis horizontaliter patentibus longitudine corollae et ultra. Limbus corollae minimus, constrictus, laciniis brevissimis reflexis. Bracteae brevissimae. Flores superiores erecti, magis approximati; supremi steriles, caerulei, in pedunculis 9-12 lin., coloratis. In β . (cujus flores perfectos, nec omnes steriles,

in *Herb. Juss.* vidit *Lamarck*, quare etiam speciem propriam inde constituebat) folia radicalia 7-8 poll., 4 lin. lata, fere plana, decumbentia. Scapus *comoso* humilior. Flores omnes caerulei in panicula 4 poll.; pedunculi ramosi, colorati, squamis oblongis, membranaceis, sparsis: ramuli ultimi corollâ terminali campanulatâ, basi attenuatâ, ultra medium divisâ in laciniâs 6 oblongas, apice incurvas, $5\frac{1}{2}$ lin. longâ. *Lam.* In *Europae mediae et australis agris; in Africa boreali; β primum inventum in agro Papiensi et juxta Boran Galliae, in Sicilia; γ in Tauria.* 4.

3. *M. maritimum Desf.*; foliis subulatis; racemo tereti; corollis cylindricis: summis coloratis, sessilibus, abortivis. *Desf. Fl. Atl.* 1. p. 308. *Gusson. Prodr. Fl. sic.* 1. p. 426. *HYACINTHUS maritimus Pers. Syn.* 1. p. 375.

Bulbus ovatus, tunicatus, solidus. Scapus 4-6 poll. Folia canaliculata. Flores conferti, pedicellati, horizontales; racemo superne attenuato. Cor. fere *M. comosi*, pallide virescentes, cylindricae, apice subhexagonae; terminales amethystinae, sessiles, steriles. Caps. triquetra; angulis acutis. *Desf.* Flores subsessiles in racemo laxo cylindrico. Bracteae minutae, acutae. Cor., dentibus conniventibus, luteae, supremâ abortivâ. Folia linearia, canaliculata, flaccida, scapum fere aequantia. *Bertol. in litt.* Ad maris littora prope veterem Carthaginem; in *Sicilia.* 4.

4. *M. sessiliflorum Spreng.*; floribus dense spicatis; corollis cylindræis; limbo sexfido, patente: (laciniis ovatis). *Vivian. Fl. Lyb.* p. 21. t. 7. f. 5. (sub *HYACINTHO sessilifloro*). *Spreng. S. Veg.* II. p. 66.

Spica brevis, densa, ovata. Corollae purpureae, siccae purpureo-nigricantes. Bracteae flore breviores. Lacinae perigonii ovatae, vix acutae. Stamina brevissima, inclusa, in fauce contra laciniâs corollae orta, membranacea, plana. Antherae oblongae, violaceae. Germen trigonum. Stylus brevis, acutus, inclusus. Proximus *H. spicato Sibth. et Sm.*, sed differt corollis cylindricis ad $\frac{1}{3}$ sectis, nec campanulatis semisexfidis. *Bertol. in litt.* In arenis ad Syrtim magnam Africae. 4.

5. **M. moschatum Desf.*; corollis cylindræo-ovatis, uniformibus, horizontalibus, subsessilibus. *Willd. Enum. H. ber.* p. 378. *M. ambrosiacum Mönch. Meth.* p. 635. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 207. *Redout. Lil.* t. 132. *M. Muscarimi Medic. in. Usteri Annal.* St. II. p. 15. *M. racemosum Mill. Dict.* n. 5. *HYACINTHUS Muscari*; corollis ovatis, omnibus aequalibus. *Linn. Spec.* 454. *Willd. Spec.* II. p. 169. *Lam. Enc.* III. p. 195. *Russel It. Alepp.* II. 250. *Bartholdy Voy. en Grece.* 2. p. 105. *Schkuhr Handb.* t. 96. *H. moschatum* griseo obsoleto flore. *Tournef.* 348. *Clus. Hist.* 1. p. 178. *Lobel. ic.* 109. f. 2. *Hyac. moschatus odoratissimus Weinm. Phyt.* 583. f. 6. *M. obsoletiore flore Moris. Hist.* I. s. 4. t. 11. f. 6. 7. *Hort. Eystet. Vern.* 2. t. 13. f. 1. *Park. Parad.* t. 112. f. 1., 2., t. 113. f. 3. 4. α corollâ macriore, e rubello cinerascente.

M. moschatum *Gawl. Bot. Mag.* 734. β flavum; corollâ
obesiore, e rubro flavescente. *Gawl.* 1565. *Lam. Enc.* 1.
c. β . *Gusson. Prodr. Fl. sic.* 1. p. 426. *M. flavo flore.*
Clus. Hist. 1. p. 179.

Bulbus tunicatus, ovatus, albus. Folia 3-4 vel plura, patentia, lanceolato-ligulata, subconvoluto-concava, 7-10 poll., $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata, obtusiuscula, crassiuscula, laxa, glauca; scapum teretem, glabrum, iisdemque paulo breviorum cingentia. Racemus oblongo-ovatus, densiusculus, 1-2 poll. Pedicelli breves, vix lin., e scrobiculis rhacheos, bracteis 2 minutis, brevibus, laceratis. Corolla horizontaliter patens, vel subnutans, lanceolato-cylindrica, collo angustiore, obsolete trigona, limbo minuto, rotato, 6-partito, flavicante, membranulâ inclusâ lacerâ connata. Stamina corollâ duplo breviora, alterna longiora, tota adnata, antheris minutis obscuris, polline flavo. Germen ovatum, acute trigonum. Stylus brevis stigmatate obsolete trifido, capitato-trigono. (Caps. trigonae, majores quam in reliquis. *Lam.*) In β bulbus magnitudine ovi columbini, fuscus. Folia pallide glauca, 6 poll., 4-6 lin. lata. Scapus 4-6-poll., rubro violaceus, superne viridis. Cor. pendula, 4 lin., ovata, crassior, primum glaucescens, basi purpurea, dein virescenti flava, limbo rubro-violaceo. *Gawl.* In Asia; in Europam introducta ante 1554; β circa Messanam. 4.

6. **M. botryoides* *Mill.*; floribus laxe racemosis; corollis globosis; foliis late-linearibus, (apicem versus latioribus), strictis, scapo subaequalibus. *Bertol. Amön.* p. 58. *M. corollis globosis, uniformibus: inferioribus remotioribus; foliis strictis, linearibus, basi angustatis, canaliculatis.* *Willd. Enum.* p. 578. *Mill. Dict.* n. 1. *Lam. et Decand. Fl. fr.* 3. p. 208. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 567. *Roth Enum. pl. germ.* I. 2. p. 62. *Gusson. Prodr. Fl. sic.* 1. p. 428. *Red. Lil.* 364. *HYACINTHUS botryoides*; cor. globosis, uniformibus; foliis canaliculato-cylindricis, strictis. *Linn. Spec.* p. 455. *Willd. Spec.* II. p. 170. *Lam. Enc. meth.* III. p. 193. *Roth Germ.* II. p. 391. *Savi Fl. pis.* 1. p. 353. *H. cor. ovatis, globosis, nutantibus; foliis linearibus, erectis, canaliculatis.* *Targ. Tozz. Obs. bot. Dec.* III. n. 25. *Tenor. Fl. neap.* 1. p. 187. *Hall. Helv.* n. 1246. *Curt. Bot. Mag.* t. 157. *Sturm Deutsch. Fl.* I. A. 7. *H. botryoides, vernus: minor, latifolius, caeruleus, inodorus* *Bauh. Hist.* 2. p. 572. *Lob. Ic.* t. 108. f. 1. *Clus. Hist.* 1. 1. p. 181. *Park. Parad.* 114. t. 113. f. 5. β flore albo. γ flore cinerascens. δ flore rubro. ϵ scapo ramoso.

„Differt floribus inodori et foliis erectis a *racemoso*, cui flores odori et folia patenti-decumbentia, carinata.“ *Linn. Spec.*
„Folia 3 lin. lata ob breves petiolos recta. Spica floribus 20-30. Corollae dentibus candidis, supremis exiguis. Odor delicatus.“ *Hall. Linn. Mant.* 366.“ Bulbus ovatus, fuscescens, 6-9 lin. Folia radicalia 2-4, plerumque scapo paulo breviora, raro eundem aequantia, linearia, canaliculata, basi angustata,

apice plerumque latiora et dein in acumen breve callosum obtusum attenuata, glaucescentia, striata, 3-9 poll., $1\frac{1}{2}$ -5 lin. lata. Scapus erectus, teres, quâ florifer angulosus, crassitie fili emporetici ad pennam corvi usque, 1 vel 2 ex eodem bulbo, inferne subinde purpureo-punctati, 5-10 poll.. Racemus cylindræus, multiflorus, laxiusculus, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ poll.. Pedunculi subhorizontales vel quidquam nutantes, filiformes, 1-2 lin., floribus concolores vel pallidiores. Bracteae 2 minimae, ovatae, reflexae. Corollae caeruleae, primum subhorizontales, demum nutantes, globosae, vel ovato-globosae, 1- $1\frac{1}{2}$ lin.; limbi dentibus subaequalibus, ovatis, acutiusculis, primum albidis, dein caeruleis; terminales minores magis oblongae, erectae, pallidiores. Stam. corollâ $\frac{1}{3}$ breviora, alterna vix breviora; filamenta subulata, corollae adnata; antherae rotundato-ovatae caeruleae. Germen rotundatum trigonum, viride. Stylus longitudine staminum. — „Linne (in Spec. Pl.) *Decandolle* et *Seguier* flores inodoros, *Haller* et *Lamarck* vero leviter odoros dicunt; sed reapse odori sunt, et odor tantum in locis septentrionalibus vel saeviente frigore evanescit.“ *Bertoloni*. In *Europae mediae et meridionalis collibus et pratis, etiam in Persia.* 4.

7. *M. parviflorum Desf.*; racemo abbreviato, laxo; corollis globoso-campanulatis, conformibus, perviis: denticulis erectis; foliis semiteretibus, canaliculatis, strictis, subtus striatis. *Bertol. in litt.* M. fol. subulato-filiformibus; racemo terminali, brevissimo; floribus distinctis. *Desf. Atl.* 1. p. 309. *Gussone. Prodr. Fl. sic.* 1. p. 427. *HYACINTHUS parviflorus Pers. Syn.* 1. p. 375.

Bulbus ovatus, tunicatus. Folia canaliculata, vix $\frac{1}{2}$ lin. lata, $4\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$ poll., glabra, (scapo breviora). Scapus fere filiformis, erectus, 5-6 poll. Pedicelli brevissimi, (erecti vel patentes). Racemus $4\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$ lin.. Cor. dilute caeruleae (amethystinae), globosae, minimae, (inter se remotae), apice sensim latiores, subhexagonae, sexdentatae, (denticulis erectis et ideo campanulatae.) Caps. triquetra. *Desf.* Floret autumnno. Species diversissima a *M. botryoidi*, quocum peiperam confunditur a *Sprengel*. *Bertolon. in litt.* In *Africa boreali et in Sicilia.* 4.

Obs. An huc forte *Musc. autumnale Gussone*, quod in *Ind. sem. N. Bocca-dif.* 1823 „*M. botryoidi* simile, sed florendi tempore, foliis omnino linearibus, nec apice dilatatis, corollis caeruleis“ differre dicitur? Specimen, quod nomine *H. parviflori* a clo *Jan* e Sicilia accepimus plurimis convenit cum descriptione supra data; at differt foliis flaccidis, ut in *M. racemoso*: corollis ovato-oblongis potius quam globosis, siccis atrofuscis: dentibus vix omnino erectis, sed quidquam incurvis. Anne ergo verum *M. parviflorum* vel potius varietas *M. racemosi*, a quo differt: bulbo magis fusco; scapo brevior (3 $\frac{1}{2}$ poll.); racemo brevior (2 $\frac{1}{2}$ poll.), minus denso; pedunculis minus coloratis; bracteolis paulo longioribus acutioribusque; corollis magis oblongis (2 $\frac{1}{2}$ lin.), in siccis atrofuscis, sterilibus vix ullis: ore minus contracto.

8. **M. racemosum Willd.*; floribus dense racemosis; corollis ovato-oblongis, deorsum imbricatis; foliis anguste linearibus, laxis, scapo longioribus. *Bertol. Amön. it.* p. 60. M. cor. ovat., uniformibus, confertis: summis sessilibus; fol. laxis, dependentibus, linearibus. *Willd. Enum.* p. 378. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 208. *Mert. et Koch D. Fl.* II. p. 567. *Roth*

Roth Enum. pl. germ. I. 2. p. 62. *Gusson. Prod. Fl. sic.* I. p. 427. *Redout. Lil.* t. 252. *HYACINTHUS racemosus*; cor. ovatis, summis sessilibus; fol. laxis. *Linn. Spec.* p. 455. *Willd. Spec.* II. p. 170. *H. flor. ovatis, 6-sulcis: supremis sessilibus abortivis; fol. linear., canaliculatis, flaccidis.* *Smith Engl. Fl.* 2. p. 149. *Comp.* p. 54. *Engl. Bot.* 1951. *Brotero Fl. lusit.* p. 537. *M. a Bieb. Fl. taur. Cauc.* I. p. 285. *Tenore Fl. neap.* I. p. 188. n. 210. *Savi in Mem. d. Mat. e Fis. etc.* T. VIII. p. 2. p. 482. *Jacq. Austr.* t. 187. *Curt. Bot. Mag.* 122. *H. juncifolius*; cor. ovatis, deorsum imbricatis: summis sterilibus; fol. angustis, canaliculato-cylindricis. *Lam. Enc. meth.* III. p. 194. *Bertol. Mem. Soc. med. Gen.* T. 1. p. 81. *H. botryoides Allion. pedemont.* I. p. 118. *Scop. Carn.* n. 424.? *Pall. ind. taur.* *H. non scriptus* *Habl. Taur.* p. 118. (uterque fide *Bieberst.*) *Hall. Helv.* n. 1245. *H. racem. caerul. minor juncifol.* *Bauh. Pin.* 43. *hist.* 2. p. 571. *Dod. Pempt.* 217. *Lobel. ic.* 107. f. 2. *Zannich. Ven.* t. 93. *Park. Parad.* p. 114. *Rudb. Elys.* II. 25. f. 7. *H. botryoides 1.* *Clus. Hist.* I. p. 181. *M. arvense juncif. caerul. minus.* *Tournef. Inst.* 548. (synonym. *perversis, monente Smith in Fl. graec.* 2. p. 238.) β flore albo *Hall.* γ . *caucasicum Besser H. Crem.*

„Folia carinata, lin. lata, ob debiles petiolos laxa, decumbentia. Spica floribus 40-50, summis sterilibus. Flores odori. *Haller.*“
Linn. Mant. p. 567. Bulbus subrotundo-ovatus, albidus vel pallide fuscus, prolifer. Folia radicalia plura, anguste linearia, superne minime dilatata, canaliculata et inde semiteretia, striata, glauca, flaccida, supra terram strata, 5-10 poll., lin. lata. Scapus teres, erectus, saepius fuscescens, 4-8 poll., nunc solitarius, nunc 2-4 ex eodem bulbo. Racemus oblongo-ovatus vel conicus, erectus, densissimus, multiflorus, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ poll. Pedunculi nutantes ut flos unus alteri incumbat, filiformes, floribus concolores, $\frac{1}{2}$ -2 lin. Bractee minimae, ovatae, albiae. Corollae atro-caeruleae odore satis forti, (denticulis revolutis hiantes *Bertol. in litt.*), ovatae, serius cylindratae, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin.; dentibus ovatis, primum albidis, serius caeruleis; terminales steriles erectae, subsessiles, minores et dilutiores. Stam. corollae $\frac{1}{3}$ breviora, alterna breviora; filamenta subulata; antherae ovatae, caeruleae, polline flavo. Germ. ovato-rotundatum, trigonum. Stylus longitudine staminum. Caps. lobis 5 rotundatis: loculis 2 spermis. Differt a *botryoide* praeter characteres datos: florendi tempore seriore; floribus odore fortiori, colore intensiore. — „Vereor ne *HYAC. racemosus* (cor. globosis confertis; fol. canaliculato-cylindricis, laxis) *Targ. Tozz. obs. bot. Dec.* III. n. 26. sit lusus *M. botryoidis* ob corollas globosas, quae in *racemoso* semper ovato-oblongae.“
Bertol. Per omnem Europam temperatiorem in collibus, pratis, vineis; in *Balearibus, in Creta et in Graecia.*

9. *M. commutatum Guss.*; racemo abbreviato; corollis

ovatis, distinctis, subconformibus: denticulis inflexo-conniventibus; foliis linearibus, canaliculatis, laxis. *Gusson. Prodr. Fl. sic. 1. p. 426.*

Folia linearia, 2-3 lin. lata, scapum subaequantia. Flores recurvato-patuli, nec tamen deorsum imbricati, fere inodori, caerulei. Corollae a denticulis conniventibus clausae. Hisce notis facillime distinguitur a *M. racemoso* affini. *Bertol. in litt. In Sicilia, 4.*

Obs. Huc nobis spectare videntur specimina a *D. Fleischer* in argillosis Smyrnae lecta, quae nomine *M. racemosi var.* ex herbario societatis itinerariae wirttembergensis a *clo Steudel* accepimus, et quae sec. *Fleischer* in herbario *Dris. Zimmermann*, smyrnensis, nomine *Hyac. bifolii* ab ipso *Gouan* imposito, prostant. In hisce speciminibus *M. racemoso* simillimis: bulbus ovatus, fuscus, magnitudine Avellanae. Folia radicalia 2-3, flaccida, minus tamen quam in *racemoso*, acuta, valde canaliculata et apice fornicato-teretia, scapo breviora, 2-2½ poll., explicata 2 lin. lata. Scapus erectus vel suberectus, crassitie fili emporetici, 1-3 poll., teres, apice caeruleus. Racemus magis laxis, quam in *racemoso*, multiflorus, 7-8 lin., in speciminibus nostris semper arcuato-recurvus. Pedunculi graciles, patentes, et patienti-recurvi, teretes, caerulei, lin., basi bractearum vestigiis minutissimis. Corollae ovatae et ovato-oblongae, patentes vel defloratae subcernuae, nec tamen imbricatae, intense caeruleae, 1½ lin.; dentibus brevibus, ovatis, acutiusculis, minus conniventibus quam in *botryoidi* et *racemoso*; summae, ut videtur steriles, subclavatae. Reliqua ut in *M. racemoso*.

Quid: *Muscari filifolium Wahlénb. in Berggren Resor uti Europa och Oesterlaenderne; suaveolens Fischer?*

1407. DRIMIA.

a. foliis scapum praecedentibus.

1. *DR. lanceolata Schrad.*; foliis scapo paulo brevioribus, lanceolatis, utrinque acuminatis, enervibus, immaculatis; racemo paucifloro; pedicellis patienti-recurvis, floribus sesquilingioribus. *Schrad. pl. rar. hort. Gott. fasc. 1. et in Comment. d. Blumenbachia.* LACHENALIA *reflexa Andr. Repos. t. 299. Trattin. Tabul. t. 169.*

Bulbus tunicatus, globoso-ovatus, nucis juglandis fere magnitudine, extus sordide purpurascenti-fuscus. Folia 3½-4 poll., 6-8 lin. lata, apicem versus angustiora, laete viridia. Scapus subsolitarius, folia longiora paulo superans, erectus, flexuosus. Racemus 1½ poll. Flores 6-8, distantes, 4 lin. longi. Pedicelli 5-6 lin., patentes, sub anthesi patienti-recurvi. Cor. laciniatae extus ut pedicelli rubro-punctati. Stamina corollam subaequantia. Reliqua ut in *DR. lanceaefolia. Schrader.* Flores tristes, flavo-virentes, rubro punctati. *Tratt. In Prom. b. spei. 4.*

2. *DR. lanceaefolia Gawl.*; foliis scapum subaequantibus, lanceolatis, acuminatis, enervibus, supra maculatis; racemo elongato, multifloro; pedicellis patienti-recurvis; floribus plus duplo longioribus. *Schrader ll. cc.* LACHENALIA *lanceaefolia Jacq. Coll. Suppl. p. 69. Ic. rar. II. t. 402. Willd. Spec. II. p. 178. Redout. Lil. t. 59. Trattin. Tabul. t. 167.* L. *lanceaefolia a major*; fol. lanceolato-acuminatis, glaucis, nigro-maculosis; racemo cylindraneo-pyramidato, numerosiore, densiore. *Bot. Mag. 1580. β densiflora Schrad.*

LACHENALIA *lanceaefolia* Gawl. in *Botan. Mag.* t. 643. L. *maculata* Tratt. *Tabul.* t. 168. γ *longipedunculata* Schrad. SCILLA *maculata*; racemo pyramidali, multifloro; pedunculis longissimis patentibus, junioribus coloratis; petalis staminum longitudine, post anthesin reflexis; fol. lanceolatis, superne saturatius maculatis. *Schrank pl. rar. h. monac.* t. 100.

Tota glabra. Bulbus ovatus, etiam globoso-ovatus, $1\frac{1}{2}$ poll. diamet., tunica fuscâ. Folia fere $\frac{1}{2}$ ped., poll. et ultra lata, longe acuminata, laete viridia, supra maculis saturatioribus. Scapi plures, inter folia solitarii, primo erecti flexuosi, dein curvati, serius flaccidi totique decumbentes. Racemus 3-4 poll., latus. Flores subconferti, $2\frac{1}{2}$ lin. longi. Pedicelli 5-6 lin., ante anthesin patentibus, post anthesin patienti-recurvis, fructu maturescente erecti. Bracteae exiguae. Cor. lacinae aequales, oblongae, obtusae, sordide ex albo virides, margine dilutiores, uti pedicelli rubro-punctatae, sub anthesi infra medium reflexae, serius erectae. Stamina laciniarum basi inserta iisque vix breviora; filamenta filiformia, rubro-purpurea; antherae ellipticae biloculares. Germen subpedicellatum, late conicum, obtusissimum, 6-sulcatum. Stylus subulatus, purpureus, longitudine staminum, post anthesin paulo longior. Stigma obtusum, obsolete trifidum. Caps. corollamarcidâ tecta, membranacea, reticulato-rugosa, cinerea, subglobosa; loculis dorso fere ad basin dehiscentibus, valvae post dehiscentiam ut antea axi centrali inter se connexis. Sem. in quovis loculo pauca, angulo centrali loculamentorum affixa. In β flores copiosiores et confertiores: in γ folia minora; racemus brevior; pedicelli poll.; utraque procul dubio inconveniente cultura orta. *Schrader.* Folia plana, apice tantum subcanaliculata, carnosula, supra maculis magnis sordide atrovirentibus, inferiora in orbem prostrata, interiora juniora erecta. Scapi inferne obsolete maculati. Pedicelli primum purpurei, dein virides. Petala apice calloso fornicatula, exteriora inferne connata cum exterioribus. Filamenta longitudine corollae. Antherae virescentes. Caps. oblonga, obtusissima, 6-sulcata vel sine sulcis teres. Sem. teretia, 2 in quovis loculo, quorum 1 plerumque ad maturitatem pervenit et totam capsulam velut 1-locularem replet. Reliqua ut supra. *Jacq.* Apud *Gawler*: folia glauca, nigro-maculata; filamenta stylo corollaque breviora. In γ folia 3 poll., patentia, poll. lata; scapi foliis plus duplo longiores; pedunculi rubenti-violacei, serius virides; flores vix 3 lin.; antherae atropurpureae, polline flavo. *Sprengel* S. V. II. p. 75. Dr. *lanceaefoliam*, p. 77. iterum LACHENALIAM *lanceaefoliam* exhibet! In *Prom. b. spei.* 4.

Obs. Cls. *Trattinich* in *Tabul.* t. 168. p. 132. L. *lanceaefoliam* *Bot. Mag.* 643. nomine L. *maculatae* a l. *lanceaefolia* *Jacq.* (quae in *Bot. Mag.* l. c. laudatur) distinguit, et eandem foliis rotundo-maculatis, glaucescentibus; inflorescentiâ fertiliore; floribus triplo majoribus; petalis non simul reflexis; germine pedicellato, differre monet. In iconis haec perperam L. *lanceaefolia* *Andr.* dicitur.

3. Dr. *Gawleri*, *Schrad.*; foliis scapo duplo brevioribus, oblongo-ovalibus, nervosis, immaculatis; racemo multifloro; pedicellis patienti-recurvis, floribus triplo longioribus. *Schrad.* II. cc. Dr. *lanceaefolia* β minor; fol. ovato-lanceo-

latis, immaculatis; racemo diffuso, rariore, modo subquadri-floro, depauperato. *Gawl. Bot. Mag. t. 1380. (excl. LACHENALIA reflexa Andr. Repos.) HYACINTHUS revolutus H. Kew. 1. p. 458. ed. 2. II. p. 275. (excl. syn. Linn. fid. Gawl.)*

Species a *DR. lanceolata* et *lanceaefolia* diversissima. Bulbus duplo minor, magis globosus, tunicâ fusciscente. Folia 2 poll. vel paulo longiora, 6-8 lin. lata, acuta, basi angustata veluti in petiolum canaliculatum $\frac{1}{2}$ poll., supra nervosa. Scapus plerumque solitarius, inter folia prodiens, valde flexuosus, rarius curvatus, basin versus rubro-punctatus. Racemus 2-3 poll.. Flores mediae magnitudinis *lanceolatam* inter et *lanceaefoliam*. Pedicelli fere poll.. Reliqua ut in *DR. lanceaefolia*. Datur varietas foliis longius petiolatis. *LACH. reflexa Andr.* a *Gawler* huc relata longe diversa foliis, directione scapi et racemo paucifloro. *Schrad.* Folia 6-8, laete viridia. Scapus 5-6 poll.. Bracteae virides, obsoletae. Pedicelli rubescentes. Cor. 3 lin., viridis, purpurascenti-striata. Filamenta virentia, basi rubella. *Gawl. in ic. In Prom. b. spei. 4.*

4. *DR. ovalifolia Schrad.*; foliis scapo multo brevioribus, ovalibus, nervosis, immaculatis; racemo paucifloro; pedicellis patentibus-recurvis, floribus triplo longioribus. *Schrader II. cc. DR. lanceaefolia Loddig. Bot. Cab. 278. Link Enum. 1. p. 330.*

DR. Gawleri proxima sed minor et gracilior. Bulbus magnitudine nucis Avellanae, tunicâ fusciscente. Folia circiter poll., 4-5 lin. lata, apiculata, in petiolum brevem subcanaliculatum attenuata. Scapus solitarius, 4-5 poll., gracilis, flexuosus, curvatus, serius procumbens, punctis rubris vix conspicuis. Racemus 1 $\frac{1}{2}$ poll.. Pedicelli 5-10, 6-8 lin., purpurascetes, sub anthesi patentibus-recurvi, serius erecti. Flores vix 2 lin., sordide purpurascetes. Filamenta longitudine corollae, alba, basi purpurea. Stylus stamina aequans, stigmatibus obtuso. Capsulae structura et reliqua omnia ut in praecedentibus. *Schrader.* Folia 18 lin., 6 lin. lata, cuneiformia, subapiculata. Bracteae minutae. *Link. In Prom. b. spei. 4.*

5. *DR. media Jacq.*; foliis lineari-subulatis, semiterebibus, antice subcanaliculatis, glabris; (racemo multifloro; pedicellis patentissimis, corollâ longioribus.) *Jacq. Coll. Suppl. 40. Ic. rar. II. t. 375. Willd. Spec. II. p. 166. Link Enum. 1. p. 330. HYACINTHUS medius Poir. Enc. Suppl. III. p. 120.*

Bulbus ex ovato subrotundus, squamis crassis licet tunicatus foris aequabilis, purpureo fusco cinereo varius, 2 poll. diametro, succo aqueo urente. Folia plurima, acuta, erectiuscula, superne patula, fere pedalia, sub lente minute punctatula. Scapus post folia axillaris, nec lateralis, foliis paulo altior, teres, crassitie peninae columbinae, erectus, (1-2 ped.). Racemus cylindricus, tandem $\frac{1}{2}$ ped.. Pedunculi numerosi, fere 40, vix $\frac{1}{2}$ poll., patentissimi, suffulti bracteolâ lanceolatâ, acutâ, scariosâ, patente. Flores inodori. Corollae lacinae albae, apice parumper concavae. Antherae sordide flavo-fuscae. Germen virens. Capsula oblonga, obtusissima, fusco-cinerascens, glabra, erecta. Semina nigricantia. *Jacq.* Corolla alba, extus cum pedicello purpurascens.

cens. *Link.* In *Prom. b. spei*, ad *Duyvelsberg*, *Bergius.* 4.

b. *foliis post scapum prodeuntibus.*

6. *DR. ciliaris Jacq.*; foliis sublinearibus, subcarinatis, ciliatis, scapo triplo brevioribus; pedicellis patentissimis. *Jacq. Coll. Suppl.* 41. *Ic. rar.* II. t. 377. *Willd. Spec.* II. p. 165. *Gawl. Bot. Mag.* 1444. *HYACINTHUS ciliaris Poir. Enc. Suppl.* III. p. 120.

Bulbus subrotundus, 2 poll. diametro, squamis crassis, rubro-fuscis, succo acri. Folia plura, acutula, integerrima, antice planiuscula, subtus dorso medio protuberante, glabra, nitida, erectiuscula, $\frac{1}{3}$ ped., $\frac{1}{4}$ poll. lata. Scapus lateralis, ante folia, teres, glaber, pennâ columbinâ gracilior, $1\frac{1}{2}$ ped., sordide virescens. Pedicelli 20 et ultra, $\frac{1}{2}$ poll., patentissimi, uniflori, bracteolis minutis. Flores inodori, structurâ, magnitudine, ceteris simillimi *DRIMIAE elatae*, nisi quod corolla magis virescat. Caps. obverse ovata, trialata, obtusissima, fusco-cinerascens, glabra, erecta. Semina saepius 2, oblonga, nigricantia, longitudine loculamenti, erecta. *Jacq.* Bulbus subovatus, squamis acutis. Folia 4-5, 6-8 poll., 4 lin. lata, albicanter pruinata, ciliis brevibus. Scapus erectus, foliis bis terve altior, obsolete maculatus. Racemus laxus, multiflorus; pedicelli flore breviores, bracteolâ subulatâ longiores. Cor. ad $\frac{1}{3}$ tubulosa, $\frac{1}{2}$ poll., extus virens, punctis minutis purpurascens dense adspersa, intus pallida, lacinae ligulato-lineares, superne concavae, carinatae: interiores subangustiores, ultra medium crispatae. Filamenta fasciculata, corollâ $\frac{1}{4}$ breviora. Germen ovato-pyramidatum, obtuse triquetrum, guttulâ e poro medio. Stylus germine triplo longior, filamentis $\frac{1}{4}$ brevior. Stigma glanduloso-puberulum. *Gawl.* Cor. tenuis, albo-purpurascens. *Link.* In *Promont. b. spei.* 4.

7. *DR. elata Jacq.*; foliis lineari-lanceolatis, oblique flexis, glabris, glaucescentibus, scapo duplo brevioribus; floribus nutantibus. *Jacq. Coll. Suppl.* 38. *Ic. rar.* II. t. 373. *Fragm.* p. 5. t. 2. f. 2. *Willd. Spec.* II. p. 165. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 281. *Bot. Mag.* 822. *Red. Lil.* 430. *HYACINTHUS elatus Poir. Enc. Suppl.* III. p. 120. *Breyn. Cent.* 91. t. 40.

Tota glabra. Bulbus subrotundus, magnitudine pugni, squamosus, ex rubro fuscescens, squamis ovatis, concavis, truncatis, carnosus, crassis, cutem inflammantibus. Folia post anthesin, acuta, integerrima, basi canaliculata, subtus nervo medio carinata, erectiuscula, longiora vix pedalia. Scapus lateralis, teres, calamum crassus, 2 ped., erectus, glaucescens, superne racemosus. Pedicelli numerosi, patentissimi, fructiferi omnino erecti, 1-flori, $\frac{1}{2}$ poll., bracteolâ lanceolatâ, acutâ, brevior, purpurascens. Cor. foris viridula, intus albida, fasciâ mediâ virente, punctis minimis pellucida, tubo brevi, laciniis oblongis, acutulis, longis, revolutis-reflexis. Filamenta purpurea, subulata, longitudine fere corollae. Antherae fuscae polline viridi. Germen ovatum sessile. Stylus staminibus paulo longior. Stigma capitatum, trilobum. Caps. obovato-triquetra, membranacea, cinerea, gla-

brâ. Sem. 2 - 5 in quovis loculo, oblonga, obtusa, nitida, atra. *Jacq.*. Bulbus maximus, flavo-viridis, costatus, superne fuscus. Racemus oblongus. Bracteae fuscae, pedicellis vix breviores, $\frac{1}{3}$ poll. Flores $\frac{2}{3}$ poll., sordide albi, basi virentes rubentesve, post anthesin fuscescentes: laciniis oblongo-linearibus, patentibus, demum reflexis. *Gawl.*. Bracteae pedicellis duplo breviores. Racemus florum sterilium bractearumque fasciculo terminatus. Cor. lacinae tubo duplo longiores, obtusae. *Redouté.*
In arenosis Prom. b. spei. 4.

8. DR. *purpurascens Jacq. fil.*; foliis lineari-oblongis, glabris, carinatis, undulatis, crenatis, scapo duplo brevioribus; pedunculis patentibus. *Jacq. Ecl. p. 48. t. 30.* DR. *undulata Hortul.*

Bulbus $1\frac{1}{2}$ poll. diam., tunicatus, fusco-virens. Folia peractâ florescentiâ prodeuntia, 9 - 10, lineari-oblonga, $\frac{1}{2}$ ped., 2 lin. lata, acuta, glaucescentia, nitida, margine subtilissime crenulata, subscariosa, apicem versus integerrima, aequalia. Flores circiter 50, racemosi, inodori, in scapo e centro bulbi plus quam pedali, erecto, tereti, purpureo-glaucis, glabro. Pedunculi purpurascens, glabri, longitudine florum, singuli suffulti bractea dimidio brevior, lineari-lanceolata, inferne constricta et gibbosa, purpurascens, glabra. Cor. lacinae lineari-oblongae, canaliculatae, revolutae, diaphanae, glabrae, apice rotundatae, nervo medio purpureo, ad lentem venis purpureis reticulatae. Stam. longitudine fere corollae, recta, subulata, purpurascens. Antherae erectae, oblongae, sulcatae, flavae. Germen oblongum, sulcatum, viride. Stylus subulatus, corollâ longior, purpurascens. Stigma capitatum, villosum. *Jacq.*. *Habitat?* 4.

9. DR. *undulata Jacq.*; foliis lineari-lanceolatis, glabris, undulatis, scapo longioribus; floribus patentibus. *Jacq. Coll. Suppl. 41. Ic. rar. t. 376.* *Willd. Spec. II. p. 166.* (excl. syn. *Linn. et Thunb.*)

Tota glabra. Bulbus subrotundus, juglande major, tunicatus, subcris, foris magis minusve ferrugineus, squamis imbricatis, truncatis. Folia plura, acuta, integerrima, undulata, glauca, erecta, striatula, firmula, 4 - 5 poll., post anthesin. Scapus erectus, teres, 3 poll., crassitie pennae columbinae, basi vaginâ unâ alterâve scariosâ albidâve unciali, erectiusculâ, supra medium dense racemosus. Pedicelli horizontales, vix $\frac{1}{2}$ poll., bracteolâ parvâ albidâque. Flores inodori. Petala sordide pallida, fasciâ mediâ utrinque viridi orisque leviter purpurascens, oblonga, obtusula, apice involuto-fornicata, planiuscula, basi erecta, ceterum patentissima, basi breviter connata. Filamenta albida, subulata, petalis breviora, singulis supra basin innata. Antherae ovatae. Germen subrotundum, triquetrum. Stylus superne incurvus, longitudine staminum. Stigma capitatum, subtrifidum. *Jacq.*. *In Promont. b. spei.* 4.

Obs. *Gawler* in *Bot. Mag.* excludit *Dracimum revolutum* *H. Kew. ed. 2.* utpote ad *Dr. lanceaefoliam* β spectantem. At *Hort. Kew.* laudat *Dracimum revolutum* *Linn. Suppl. et Thunb.*, quem *Gawler* ad *Dracimum undulatum* ducit, ubi nobis aequè excludendus videtur.

10. DR. *pusilla Jacq.*; foliis lanceolato-linearibus, glabris, basi canaliculatis, scapum subaequantibus; floribus erectis. *Jacq. Coll. Suppl. 42. Ic. rar. II. t. 374.* *Willd. Spec.*

II. p. 165. *Ait. H. Kew. ed. 2. II. p. 281. Link Enum. 1. p. 531. HYACINTHUS pusillus Poir. Enc. Suppl. III. p. 120.*

Tota glabra. Bulbus subrotundus, pollicem et ultra crassus, squamosus, e rubro fuscescens, squamis carnosis, crassis, succo vesicatorio. Folia post scapum pauca, acutula, integerrima, nitida, basi in petiolum canaliculatum quasi attenuata, erecta, laete virentia, nervo medio subtus protuberante, longiora 4 poll. Scapus lateralis, gracilis, erectus, atrovirens, 2-3 poll., superne racemosus. Pedicelli 1-flori, patuli, breves. Bractea una alterave in scapo infra racemum et ad pedicellos lanceolata, acuta, parva. Cor. viridula, tubo brevi, laciniis lineari-cuneiformibus, obtusulis, superne parum concavis, basi in tubum erectis, reflexo-patentissimis, longis. Filamenta alba, corollâ paulo breviora hujusque laciniis basi inserta. Antherae castaneae, oblongae. Germen viride, ovatum, triquetrum, superum. Stylus inferne trisuleus, erectus, longitudine staminum. Stigma obtusum, obsolete trifidum. *Jacq. In Prom. b. spei, in saxosis ad caudam leonis. 2.*

Quid: DRIMIA humilis Bergius in *Ecklon topogr. Verzeich. p. 1* monte leonis.

viridiflora L. in *Ecklon l. c. o* districtu Uitenhagen? AN UROPEYALUM viride?

1408. L A C H E N A L I A.

a. floribus campanulatis.

1. *L. hyacinthoides Jacq.*; foliis plurimis, subulato-linearibus, canaliculatis, immaculatis (maculatisque, scapo longioribus); racemo oblongo; (corollis campanulato-patentibus, breviter pedicellatis; petalis obtusis, interioribus subemarginatis). *Jacq. Coll. Suppl. 58. Ic. rar. II. t. 382. Willd. Spec. II. p. 173. Trattin. Tabul. t. 163. HYACINTHUS orchioides Jacq. H. Vind. II. t. 178. L. orchioides a Willd. Spec. II. p. 172., quatenus laudatur: H. orch. aphyllus serpentarius major. Breyner. prodr. 24. t. XI. f. 3. β foliis maculatis. L. contaminata; fol. lineari-subulatis, canaliculatis; floribus pedunculatis; petalis 3 superioribus longioribus. *Ait. H. Kew. ed. 1. I. p. 460. ed. 2. II. p. 285. (excl. syn. L. orthopetalae Jacq., monente Gawler, uti in) Willd. Spec. II. p. 174. Bot. Mag. 1401. Thunb. Fl. cap. ed. Schult. p. 326. et hoc test.: PHOENIX orchioides Thunb. nov. gen. I. p. 96.**

Bulbus subrotundus, Avellanae magnitudine. Folia radicalia plura, subulata, canaliculata, acutula, flaccida, 6-12 unc. Scapus $\frac{1}{2}$ ped., teres, erectiusculus, ex sanguineo maculatus. Racemus erectus, pollice crassior, vix biuncialis. Flores plurimi, suaveolentes, albidi. Reliqua ut in *L. angustifolia*, a qua praesertim spicâ breviori crassioreque foliisque canaliculatis diversa. *Jacq. Minus differre ab angustifolia, quam hujus β, s. albidam: Trattin. Trattinn. In L. contaminata Ait.: Folia glabra, supra maculis obscure rubentibus adspersa, scapo longiora. Scapus erectus, semiteres, vix spithamaeus maculis sordide rubris. Racemus multiflorus. Pedunculi erecti, filiformes, albi, $1\frac{1}{2}$ lin. Bractea*

ad basin pedunculi singuli, e lata basi ovata, acuminata, concava, patentissima, albida, pedunculo brevior. Petala exteriora basi in tubum extus gibbum connata, oblonga, obtusa, alba, superne rubentia, infra apicem gibbo retuso, supremum (scapo proximum) trilineare, duo inferiora breviora. Petala interiora oblonga, minus obtusa, prope apicem carinata, carinâ rubra, duo superiora longitudine supremi exterioris, infimum longitudine breviorum exteriorum. *Ait.* Bulbus subdepressus, fusco mixtus. Folia 3-4 lin. lata, carnosa. Scapus cinnamomeo et viridi marmoratus. Pedicelli lineam longi. Cor. 3 lin., virescenti-alba, extus maculâ rubro-fuscâ ad apicem laminae cujusvis. Filamenta stylusque alba. Antherae cinnamomeae. Odor HELIOTROPII peruviani. *Gawl.*, qui, in nota ad 1372, *L. angustifoliam* *Bot. Mag.* 735 forte meram varietatem *L. contaminatae* esse. In *Prom. b. spei.* 4.

Obs. Ipsissimus *Jacquin* in *Collect.* III. p. 243. HYACINTHUM suum orchioidem *Hort. Vind.* („quem ex icone transmissa“, monente *Jacq. H. Vind.*, „Linnaeus asseruit esse suum *Hyac. orchioidem*“) synonymon *L. pallidae* *Ait.*, in *Coll. Suppl.* p. 58. vero *L. suae hyacinthoidis* dicit. Divum *Jacquin* olim *L. orchioidem* et *Hyacinthoidem* et forte alias adhuc species sub suo *Hyac. orchioidi* confundisse, patet e sequenti adnotatione, quam in *Hort. Vind.* l. c. adjecit: „Variat nimis haec planta, quod facile patebit, si lubet tres Breynianas utramque Buxbaumianam a *Linnaeo* tanquam synonyma adducta meamque comparare. Prioribus folia 3 tribuuntur; mea tamen semper polyphylla.“ Div. *Willdenow* *L. hyacinthoidem* distinxit a *L. contaminata*, ad quam duxit *L. orthopetalam* *Jacq.*, et quam etiam e definitione data sub sua *L. contaminata* intellexisse videtur. *Aiton* in *ed. 2. Hort. Hew. et Link* in *Enum.* I. p. 332. *Willdenowium* secuti sunt. *Gawler* vero rectius, ut nobis videtur, *L. contaminatam* *Ait.* cum *L. hyacinthoide* *Jacq.* conjunxit, et *L. orthopetalam* a *contaminata* distinxit. *Sprengel* in *S. Veg.* II. p. 77. ad *L. contaminatam* (flor. pedunculatis subcylindricis erectis; petalis interioribus obtusis; fol. lineari-subulatis, canaliculatis) duxit *Проввннм orchioides* *Thunb.*; et p. 78. ad *L. hyacinthoidem* (flor. brevissime pedunculatis, petalis interioribus emarginatis; foliis lineari-subulatis, canaliculatis, laxis, scapo longioribus), *L. orthopetalam* et *orchioidem* *Jacq.*!

2. *L. angustifolia* *Jacq.*; foliis pluribus, subulatis, semiteretibus, facie planiusculis, immaculatis, (scapo tereti, dense maculato longioribus); racemo digitiformi; corollis campanulatis, (brevissime pedunculatis; petalis patulis obtusis.) *Jacq. Coll. Suppl.* 47. *lc. rar.* II. t. 381. *Willd. Spec.* II. p. 173. *Hort. Hew.* ed. 2. II. p. 285. *Bot. Mag.* 755. *Trattin. Tabul.* 161. β minor; petalis acutioribus. *L. albida* *Tratt. Tabul.* 162. *L.* cor. camp., brev. pedunc.; petalis interioribus longioribus, ovatis, acutiusculis; stam. corollâ brevioribus; bracteis subulatis, pedunculo longioribus; fol. lineari-subul., canalic., laxis, scapo longioribus. *Dieter. Lex. Nacht.* 4. p. 286. *L. angustifolia* *Red. Lil.* t. 162.

Tota glabra. Bulbus subrotundus, (albus, tunicatus), Avellanâ minor. Folia radicalia plura, saepe ad 10, vix canaliculata, acutula, (carnosa *Gawl.*), lacte virentia, 7-11 unc., flaccida et terrae incumbentia. Scapus teres, (tereti-compressus *G.*), erectus, saepe etiam flexuosus, foliis paulo (vel duplo) brevior, (4-6 poll.), ex viridi pallens, maculis sordide rubris. Racemus cylindricus, compactus, digitum crassus, 2-3 unc., erectus. Flores numerosi, (12-20 *Gawl.*) parvi, suaveolentes. Pedicelli erecti, breves, (1-2 lin. *G.*), albidi. Bractee sessiles, ex latâ basi acuminatae, concavae, patentissimae, albidae, (pedicellis duplo breviores *G.*),

summae steriles. Cor. campanulato-patentissima, (4 lin. diam. G.). Petala nivea superne utrinque maculâ viridi vel fuscâ, oblonga, obtusa, plana; exteriora $\frac{1}{3}$ breviora, basi inter se et cum interioribus connata, infra apicem callosula, summo hic fornicato. Filamenta patula, petalis interioribus paulo breviora, alba. Antherae oblongae, didymae, erectae, miniatae, cum polline flavo. Stylus subulatus, erectus, albus, longitudine staminum. Stigma capitatum. Caps. ovata, obtusa, triquetra, cinerea. Semen unum alterumve, ovatum, acutum, nitidum, atrum. *Jacq.* Apud *Gawler*: Cor. lacinae exteriores ovatae, acutiusculae, latiores ac breviores, superne utrinque maculâ longitudinali fuscescente; interiores obovato-oblongae. Antherae rubro-fuscae. Germen viride, sulcis 3 flavescentibus. In β , monente *Trattinick* (cui species propria) statura minor; folia breviora, minus laxa; scapus brevior, rigidior; bracteae multo longiores; flores majores; cor. lacinae acutiusculae. *In Prom. b. spei.* 4.

3. *L. orthopetala Jacq.*; foliis plurimis, lineari-subulatis, canaliculatis, maculatis, (scapo longioribus); floribus cuneiformibus, rectis; (petalis erectis, obtusiusculis: exterioribus parum brevioribus). *Jacq. Coll.* 3. p. 240. *Ic. rar.* II. t. 383. *Tratt. Tabul.* t. 164. *L. ustulata Herb. Banks.* (fid. *Gawl.* in *Obs. ad L. hyacinthoidem et lucidam* n. 1372.)

Bulbus subrotundus, albidus, carnosus-tunicatus, crassitie pollicis. Folia saepius 4, ped., flaccida, basi 4 lin. lata, supra medium veluti subulata, carnosula, acuta, glabra, subtus maculis fuscis obsoletis. Scapus $\frac{1}{2}$ ped., teres, pallide ex rubro fuscescens, erectus, calamus fere crassus. Spica multiflora, erecta. Pedicelli breves, pallidi. Flores inodori, circiter 30, summi abortantes. Bracteae cyathiformes, scapo adnatae. Corolla subinfundibuliformi-tubulosa, obsolete triangularis; petala alba, extus infra apicem lineolâ viridi, perpendiculari, linearia, obtusiuscula, 3 exteriora paulo breviora et ipsâ basi cum interioribus connata. Filamenta alba, subulata, erecta, longitudine corollae. Antherae oblongae, sulcatae, purpureae. Germen oblongum, viride. Stylus subulatus, longitudine fere staminum. Stigma simplex. *Jacq.* Differt a *L. contaminata* corollâ cyathiformi fere triplo longiore. *Gawl. Bot. Mag.* ad 1372. *In Prom. b. spei.* 4.

4. *L. liliiflora Jacq.*; foliis geminis, (inaequalibus), oblongo-lanceolatis, facie dense pustulatis; scapo erecto, tereti; corollis patentireflexis; petalis sublinearibus: (interioribus emarginatis). *Jacq. Coll. Suppl.* p. 66. *Ic. rar.* II. t. 387. *Willd. Spec.* II. p. 176. *Trattin. Tabul.* t. 137.

Tota glabra. Bulbus subrotundus, avellanâ paulo major, extus fuscescens. Folia basi canaliculatâ mutuo amplexantia, reclinata, obtusula, integerrima, saturate virentia, immaculata, facie totâ pustulis convexo-planis, 4-5 unc., altero fere unc. lato, altero multo angustiore. Scapus pennâ columbinâ paulo crassior, foliis paulo altior, (flores inter angulosus), immaculatus, flexuosus, pallide virens. Racemus multiflorus, erectus. Pedunculi 2-3 lin., erecti, pallidi. Bracteae e basi lata acuminatae, concavae, erectiusculae, cum virore pallentes, parvae. Flores inodori, erectiusculi, *Lilium parvum* referentes. Corolla uniformiter alba, cal-

lis subvirentibus, basi leviter connata, inferne infundibuliformis, dein patentissima. Petala exteriora late linearia, plana, obtusa, dorso infra apicem callo oblongo, obsoleto; interiora anguste cuneiformia, emarginata, longiora latioraque. Filamenta subulata, basi corollae inserta, erecto-patula, longitudine corollae, alba. Antherae oblongae, didymae, erectae, ochroleucae. Geramen oblongum, triquetrum, viride. Stylus subulatus, erectus, longitudine staminum. Stigma obtusum. *Jacq. In Prom. b. spei. 4.*

5. *L. patula Jacq.*; foliis geminis, lineari-lanceolatis, canaliculatis, pulposo-carnosis, ad medietatem erectis, dein reflexis, (scapo maculato brevioribus; pedicellis erectiusculis; petalis interioribus cuneiformibus, obtusis: limbo patentissimo). *Jacq. Coll. IV. p. 149. Ic. rar. II. t. 384. Willd. Spec. II. p. 175. Hort. Kew. ed. 2 II. p. 286. Trattin. tabul. t. 156.*

Tota glabra. Bulbus subrotundus, tunicatus, fuscus, magnitudine pisi. Folia acuta, integerrima, inferne mutuo-amplexantia, scapo breviora, atrovirentia, immaculata. Scapus spithameus, teres, calamo triplo angustior, erectiusculus, viridis, maculis ferrugineis obsoletius variegatus, superne racemosus et multiflorus. Pedicelli proprii graciles, albi, erectiusculi, $\frac{1}{3}$ unc.. Bractee minutae, rotundatae, concavae, obtusissimae, virentes cum fascia superne transversa ferruginea; bractea infimi floris acuminata et major. Petala alba, utrinque infra apicem lincolâ longitudinali, exteriora viridi tinctâ, interiora roseâ; exteriora lanceolata, acutula, parum concava, erectiuscula cum apicibus callosis et patulis; interiora cuneiformia, obtusa, plana, unguibus erecta, ceterum patentissima, saepe reflexa, interioribus longiora. Filamenta subulata, declinata cum apicibus adscendentibus, longitudine petalorum exteriorum. Antherae oblongae, obtusae, erectae, flavae. Geramen oblongum, triquetrum, flavum. Stylus filiformis, erectus, longitudine staminum. Stigma obtusulum. *Jacq. In Prom. b. spei. 4.*

6. *L. rosea Andr.*; foliis geminis, lineari-lanceolatis, obtusiusculis, scapoque gracili immaculatis; floribus breviter pedicellatis, patulis; petalis intactis: interioribus parum longioribus, subemarginatis, suberectis. *Andr. Repos. Trattin. Tabul. n. 157.*

Primo intuitu varietas *L. patulae* esse videtur, sed differt florum colore undique roseo; foliis laxis; floribus brevius pedicellatis; petalis subaequalibus. *Trattin. Similis etiam L. bifoliae. Gawl. In Prom. b. spei. 4.*

7. *L. bifolia Gawl.*; foliis attenuatis, cartilagineo-marginatis, nervoso-striatis: exteriori deorsum cucullato vaginante scapumque superante, interiori concavo multo minore; floribus remotis, bilabiatis. *Gawl. Bot. Mag. 1611.*

Media *L. unifoliam* inter et *pallidam*; ab illa numero foliorum, pedicellis brevioribus, corollâ minus ventricosâ; ab hac, praeter characteres datos, pedicellis longioribus, corollâ magis patulâ distincta. Affinis quoque *L. rosea Andr.* Folium majus 9 poll. acutum, laete viride, poll. latum. Scapus viridis, 4-5 poll. Racemus multiflorus. Pedicelli flore duplo breviores, quidquam

longiores, quam bracteae ovato-acuminatae, albae. Cor. nutans, vix 6 lin., lacte rosea, basi alba et tubuloso-constricta: lacinae interiores rotundato-obtusae, bilabiato-patulae; exteriores $\frac{1}{4}$ breviores. Stamina declinato-assurgentia, vix exserta. Antherae flavae. *Gawl.* *Habitat?* 4.

8. *L. glaucina Jacq.*; corollis sessilibus; petalis interioribus longioribus, patulis, obtusis; stylo staminibus longiore; foliis geminis, lineari-lanceolatis, glabris; scapo tereti immaculato. *Jacq. Coll. Suppl.* 59. *Ic. rar.* t. 591. *Willd. Spec.* II. p. 171. *Trattin. Tabular.* t. 155. *Ait. H. Kew.* ed. 2. II. p. 284.

Tota glabra. Bulbus subrotundus, depressulus, tunicâ fuscâ, Avelana saepe minor. Folia opposita, acutula, immaculata, crassula, basi vaginante concava, patentia, 4-5 lin., alterum $\frac{3}{4}$ unclatum et planum, alterum duplo angustius et superne concavum. Scapus una cum racemo $\frac{1}{2}$ ped., crassitie calami, flexuosus, erectus, nitidus, punctis rubris obsoletis. Flores plures, patuli, odore gratissimo, subsessiles. Bracteae acuminatae, concavae, pallidae, parvae, summae approximatae et steriles. Petala albida cum suffuso caeruleo vel glauco, rarius in quibusdam ejusdem racemi floribus purpurascencia; exteriora ad apices callosos flavo-purpurea, oblonga, obtusa, concava, basi inter se et cum interioribus connata, summo fornicato; interiora (saepius incarnata) cuneiformia, rotundata, plana, non callosa, superne patentia, exterioribus $\frac{1}{3}$ longiora. Filamenta alba, subulata, quidquam declinata, petalis breviora. Antherae oblongae, erectae, flavae. Germen oblongum, triquetrum. Stylus filiformis, situ staminum quibus paulo longior. Stigma subcapitatum, trifidum. Caps. oblonga, trisulcata, obtusa cum mucrone, glabra, fuscescens: valvulis breviter mucronatis. Semina atra, nitida, pyriformia. *Jacq.* *In Prom. b. spei.* 4.

9. * *L. orchioides Ait.*; corollis sessilibus; petalis interioribus longioribus, patulis, obtusis; stylo longitudine staminum; foliis oblongo-lanceolatis, margine cartilagineo-crenatis, (scapo brevioribus). *Willd. Spec.* II. p. 172. (excl. α .) *Ait. Kew.* 1. p. 460. ed. 2. II. p. 284. *Thunb. prodr.* 64. *Flor. cap.* ed. *Schult.* p. 527. *Gawl. Bot. Mag.* 854. (excl. syn. *Jacq.*) HYACINTHUS *orchioides Linn. Spec.* p. 455. (?) PHORMIUM *hyacinthoides Linn. Suppl.* 204. MUSCARI *orchioides Mill. Dict.* n. 5. β . foliis maculatis; floribus albido-sulphureis, suaveolentibus. *Gawl. Bot. Mag.* 1269. quo teste: *L. orchioides Jacq. Coll.* III. p. 241. *Ic. rar.* II. t. 590. *Trattin. tabular.* 154. *L. orchioides* δ . *Thunb. Fl. cap.* l. c. (ut videtur). PHORMIUM *orchioides* δ . *Thunb. nov. gen.* p. 97. Hyac. *orchioides africanus major bifolius maculatus*, flore sulphureo obsoleto majore. *Breyn. prodr.* II. p. 72. *Ic. rar.* 25. t. XI. f. 2. γ . cor. viridi-purpurascente, sed obsoletius. *Gawl.* 854 *Ic.*, nota ad 1269. δ . *L. orchioides* β petalis caeruleis, apice saturatoribus.

Willd. l. c. Breyn. l. c. t. 11. f. 1. Orch. angustif. maculata. Buxb. Cent. III. p. 10. t. 16.

Thunberg l. c. de planta spontanea nil monet, praeter: „β „(quod forte orchioides)“ corollis flavis, scapo foliis longiore.“ — „δ „(forte β)“ cor. albis, apice virentibus; scapo spithamaeo, albo, superne purpureo-punctato; foliis supra purpureo-maculatis.“
H. orchioides ipsius div. Linnaei dubius, et vix hujus loci, cum diagnosis: „cor. 6-partitis; petalis 3 exterioribus brevioribus“ non sufficiat, et citet Breyn l. c. t. 11. f. 1. 2. 3. Buxb. Cent. III. t. 16. et 20. et adjiciat in descriptione: „folia 2, pustulata, ovato-oblonga; racemus floribus copiosissimis, violaceis; corollae vix ad basin 6-partitae; petala exteriora ovata, breviora; interiora obovata, longiora.“ Descriptio cultae β apud *Jacquin: bulbis subrotundis, albidis. Folia plerumque 2, 1/2-1 ped., 1/2-3 unc. lata, altero semper multo angustiori, acutula, carnosula, superne patula, planiuscula, inferne vaginanti-canaliculata, margine cartilagineo-aspera, sordide virentia, intus lineolata maculisque fuscescentibus. Scapus teres, erectus, calamo duplo gracilior vel crassitie digiti minimi, pallide virens, maculis fuscis, firmulus, plerumque foliis longior. Bractee lanceolatae, acuminatae, basi concavae, patentissimae, albae. Flores sessiles, modo suaveolentes, modo inodori, erectiusculi; supremis in apice abortantibus. Petala 3 exteriora oblonga, erecta, truncata, apice fornicata et callosa, cum interioribus fere connata, alba, apicibus viridibus; 3 interiora cuneiformia, exterioribus 1/3 longiora et supra haec patula, pallide flavescentia. Filamenta filiformia erecta, petalorum basi adnata, eorumdemque longitudine. Antherae oblongae, flavescentes. Germen ovatum trigonum. Stylus subulatus, erectus. Stigma obtusum. Apud *Gawler: rad. parvula; folia et scapus plus minus rubro variegata s. maculata, praesertim inferne. In β folia basi extus rubra, dilute viridia, supra maculis majoribus et minoribus irregulariter sparsis, atropurpureis, 4-6-poll., 2-3 poll. lata. Scapus ad altitudinem 2 poll. nudus, pallide flavus, sanguineo maculatus, 1/2 ped. vel ultra. Bractee solitariae, minutae, flavescentes. Cor. pollicaris, basi ventricosa, virenti-flavescens, laciniis exterioribus brevioribus, fusco-marginatis. In γ folia 5 poll., poll. fere lata, striata. Scapus cum racemo 6 1/2 poll., crassitie fere pennae. Racemus 2 poll. Bractee lineari-subulatae, rufescentes, flore paulo breviores. Flores approximati, 9 lin.; lacinae exteriores virides, 1/3 breviores, interiores rubro-violaceae margine pallidiores, vix patulae, obtusissimae. In *Prom. b. spei; in arenosis ad pedes Duvvelsberg, am Löwenschwanze, Tiegerberg prope Riedvalley; vix in Oriente. 4.***

10. *L. mediana Jacq.; foliis geminis, oblongo-linearibus, margine laevibus scapoque tereti immaculatis; floribus breviter pedunculatis, patentissimis; corollis subcylindricis. Jacq. Coll. 5. p. 242. Ic. rar. t. 592. Trattin. Tabul. t. 159.*

Bulbus subrotundus, quidquam depressus, magnitudine Avellanae. Folia ped. et ultra, acuta, inferne canaliculata et vaginantia, superne plana, lineari-lanceolata, longitudine fere aequalia, alterum unc. fere latum, alterum multo angustius; utrinque saturate virentia, lucida, ad lentem lineolata. Scapus nitidus, pallide

virens, calamo gracilior, erectiusculus, debilis, hinc plerumque arcuatus. Racemus erectus, tandem 3-unc.. Flores circiter 20, remotiusculi, inodori. Bractee sessiles, concavae, acuminatae, albidae. Pedicelli 1-flori, teretes, erectiusculi, bractearum ad minus longitudine. Cor. tubulosa: petala exteriora oblonga, obtusa, erecta cum apice patentissimo, apice callosa, summum fornicatum; interiora cuneiformia, obtusa, superne revoluto-patentia, exterioribus paulo longiora, et cum his basi connata; omnia albida, exteriora supra medium tota virentia, interiora ibidem lineolâ tantum mediâ viridi. Filamenta subulata, basibus petalorum adnata eorundemque longitudine, alba. Antherae oblongae, subvirescentes polline flavo. Germen viride. Stylus subulatus, longitudine staminum, albus. Media L. *orchioide* inter et *pallidam* H. Kew.; a L. *orchioide* differt floribus pedicellatis foliisque ad oras non asperis; a L. *pallida* foliis latioribus et planis. Jacq.. Willdenow, Redouté, Aiton et Sprengel junxerunt hanc speciem cum L. *pallida*, quâ major. In Prom. b. spei. 4.

11. L. *pallida* Ait.; corollis campanulatis; petalis 3 interioribus longioribus; floribus brevissime pedunculatis, horizontalibus; foliis lineari-oblongis, scapo longioribus. Ait. H. Kew. ed. 1. l. p. 460. ed. 2. II. p. 285. Willd. Spec. p. 175. (excl. syn. L. *medianae* Jacq.) Thunb. Prodr. p. 64. Fl. Cap. ed. Schult. p. 527. Redout. Lil. t. 22. Trattin. Tabular. t. 160. PHORMIUM *orchioides* γ Thunb. nov. pl. gen. p. 97. α flore pallido-subcaerulescente Bot. Reg. 514. β flore pallido sublutescente. Bot. Reg. 287. (excl. syn. Jacq.)

Petala exteriora basi in tubum extus gibbum caerulescentem connata, oblonga, obtusa, alba, infra apicem gibbo viridi notata; interiora obovata, apice patentia, alba, carinâ versus apicem pallide viridi. Ait. l. c. Scapus palmaris. Corollae apice purpureae, basi caerulescentes. Thunb.. Medianâ triplo minor, petalis exterioribus viridibus, apice fuscis, interioribus pallidis. Tratt.. In β culta: folia bina, 9-unc. vel ped., erecto-recurva, glabra, lucida, $\frac{1}{2}$ unc. lata vel latiora, inferne convoluto-vaginata, (immaculata). Scapus glaucescens. Racemus multiflorus, laxiusculus; pedicelli corollâ pluries breviores; bractee late ovato-acuminatae, breves. Cor. vix $\frac{1}{3}$ unc. longior, oblonga, cylindraco-campanulata, suburceolata; lacinae 3 exteriores $\frac{1}{3}$ circiter breviores, obtusissimae, infra apicem carunculâ externâ viridi, subcarinatae: summa sublongior, magis carinata; 3 interiores spathulato-obovatae, pallidiores, tenuiores, carinâ supra obsolete virente, una subangustior emarginata. Stam. conniventia, corollae subaequalia; pollen luteum. Germ. viride, oblongum, subconicum, rotundate hexagonum, sulcis 3 alternis profundioribus. Ker. In Prom. b. spei; in arenosis planities ad Tiegerberg. Ecklon. 4.

12. L. *lucida* Gawl.; foliis geminis, supra lucidis, scapo brevioribus, (obtusis): altero fere duplo longiore, elliptico-oblongo; racemo cylindraco, confertiusculo; corollâ curte tubuloso-campanulatâ, recurvato-patulâ: laciniis subaequalibus; staminibus subexsertis. Gawl. Bot. Mag. 1372. et

hoc teste cum? *L. fragrans* Andr. Repos. 302. et ergo: *L. latifolia* Tratt. Tabul. t. 142. Dietr. Lexic. Nachtr. IV. p. 288.

Bulbus ovato-globosus, albidus. Folia 3-4 poll.: latius pollicem et ultra, angustius vix 5 lin. latum; utraque obtusa, saturate viridia, divaricata. Scapus 4-5 poll., glaucus, crassitie $1\frac{1}{2}$ lin. Pedicelli flore quadruplo breviores, longitudine bractee ovato-acuminatae. Corolla 4 lin., albida, laciniis supra, apicem versus, striâ oblongâ, fulvo-rubrâ. Differt a *L. pallida* laciniis corollae subaequalibus; a *L. contaminata* numero et formâ foliorum. *Gawl.* In Prom. b. spei. 4.

Obs. Cls. *Gawler* cum? huc ducit *L. fragrantem* Andr., quae clo *Trattinick* species propria, *L. latifolia*, est. Haec sane potius cum *L. lucida*, quam cum *fragrante* convenit, licet ab utraque differre videatur, cum: folia magnitudine aequalia, ovata, obtusa, scapusque immaculata; flores ventricosi, subaequales, toti rosei, basi tantum flavo-virentes; stamina divaricata; antherae didymae. Vix eruendum, an huc vel ad *fragrantem* spectet *L. fragrans* *H. Kew.*, ubi *Andr.* laudatur.

13. *L. fragrans* Jacq.; foliis geminis, (inaequalibus), lineari-lanceolatis, planis, maculatis, glabris, scapo erecto (duplo brevioribus); corollis pedunculatis, subcampanulatis, (horizontalibus; petalis interioribus subemarginatis; staminibus exsertis.) *Jacq. Hort. Schönbr.* I. p. 43. t. 82. *Willd. Spec.* II. p. 176. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 286. (excl. syn. *Andr.*) *Trattin. Tabul.* 141. *L. unicolor* γ ; fol. variegatis; corollâ albâ. *Gawl. Bot. Mag.* 1375.

Bulbus subrotundus, depressulus, sordide albens, Avellanae magnitudine. Folia acuta, patula, basi canaliculata, ceterum planâ, ex viridi purpureoque varia; majus 4 unc.. Scapus teres, $\frac{1}{2}$ ped., crassitie fere calami. Racemus biuncialis, virens purpurâ paucâ. Pedicelli uniflori, breves, erectiusculi. Bracteolae sessiles, ovatae, acutae, concavae, pedicellis appressae, summae steriles. Flores parvi, horizontales, albi, suaveolentes, (odore *ORCHIDIS odoratissimae*). Petala 3 exteriora subovata, obtusula, concava, callo sanguineo; interiora cuneiformia, leviter emarginata, plana, apice patula, longiora. Filamenta subulata, quidquam declinata, corollam superantia. Antherae oblongae, incumbentes, flavae. Germen subrotundum, triquetrum. Stylus staminibus brevior. Stigma simplex. *Jacq.* In Prom. b. spei. 4.

Obs. *Hortus Kewensis* ed. 2. l. c. diagnosi *L. fragrantis* a *Willd.* in *Spec.* l. c. datâ utitur, quae tamen plantae *Jacquini* unice inuititur, et laudat *Andrews* 302, nec *Jacquini*. Haec vero *L. fragrans* *Andr.* a *Gawler* cum? ducitur ad *L. lucidam*, quam confer.

14. *L. purpureo-caerulea* Jacq.; foliis geminis, oblongo-linearibus, pustulatis, scapo erecto, tereti (superne angulato sublongioribus); corollis campanulatis: limbo patentissimo; staminibus assurgentibus, divergentibus, corollâ paulo longioribus.) *Jacq. Coll. Suppl.* 63. *Ic. rar.* II. t. 388. *Trattin. Tabul.* t. 139. *L. purpureo-caerulea* α *Willd. Spec.* II. p. 177. *Gawl. Bot. Mag.* 745. β foliis laevibus *Gawl.* l. c. γ foliis tribus, abbreviatis. *L. purpureo-caerulea* *Andr. Repos.* t.

251. *L. botryoides* Trattin. Tabul. t. 140. Dietr. Gart. Lex. Nachtr. 4. p. 287.

Tota glabra. Bulbus subrotundus, depressus, avellanae magnitudine, albus. Folia integerrima, acuta, nitida, immaculata, superne facie pustulata, viridia, erecta vel semireclinata, inferne canaliculata, ceterum plana, $\frac{1}{2}$ ped., $\frac{3}{4}$ unc. lata. Scapus crassitie calami, flexuosus, firmulus, immaculatus. Racemus cylindricus, longus. Pedicelli breves, erecti, pallidi. Bractee subrotundae, acutae, late sessiles, concavae, pallidae, summae steriles. Flores numerosi, odore forti *Oxyacanthae*. Cor. inferne caerulea, superne purpurea, callis sordide ex purpureo virentibus. Petala exteriora oblonga, obtusa, quidquam concava, patulo-erecta, basi in tubum brevem connata, infra apicem subtus callo oblongo gibbosa; interiora cuneiformia, rotundata, plana, callo nullo, inferne erecta, ceterum reflexo-patentissima, paulo longiora exterioribus, quorum basi inseruntur. Filamenta purpurascencia, subulata, superne leviter arcuata, petalis longiora. Antherae oblongae, erectae, luteae. Germen viride, triquetrum. Stylus purpurascens, triquetus, erectus, longitudine staminum. Stigma obtusum. Jacq. Folia sublanceolata, supra, excepta parte inferiore, verrucis minutis pustulaeformibus dense adpersa. Racemus densus, apicem versus conico-attenuatus. Pedicelli corollam breviores, bracteam minutam, ovato-subulatam longiores. Cor. adscendens, curtato-cylindrica, reflexo-campanulata, subinaequalis. Stigma obsoletum. Odor Convallariae. Gawl. γ differt bulbo majore; foliis ternis, abbreviatis, patulis, subtus purpurascens, minoribus, non pustulatis; scapo abbreviato; floribus magis ventricosis, caeruleis, apice tantum purpurascens. Trattin. l. c., cui species propria videtur, uti etiam nobis. In Prom. b. spei. 4.

15. *L. nervosa* Gawl.; foliis subgeminis, oblongo-ovatis, immerse nervosis, scapo duplo brevioribus, margine tenuissime cartilagineo-denticulatis, humo adpressis; laciniis corollae interioribus recurvis; stamine infimo remotius deflexo, omnibus corollam duplo longioribus. Gawl. Bot. Mag. t. 1497.

Valde affinis *purpureo-caeruleae*, a qua, praeter characteres datos, corollam non adeo expansam differt. Folia (intense viridia) acutiuscula et obtusa, plana, interdum subtus pustulata, (4-5 poll., 2-3 poll. lata. Scapus virescenti-carneus, $\frac{1}{2}$ ped. et ultra, crassitie calami.). Bractee (minutae, virides), longitudine pedicelli carnei, 2 lin. longi. Racemus multiflorus, laxiusculus, pedicellis divaricatis, flore parum brevioribus. Cor. horizontali-subnutans, curtato-cylindrico-campanulata, $\frac{1}{3}$ poll., fusco-purpurascens, apicem versus virescens: lacinae exteriores ovatae, concavae, basi subgibbosae, extus callo parvo, prominulo sub apice: intimae quidquam longiores, obtusae. Stamina divergentia, longitudine pistilli. Filamenta stylusque rubra; antherae flavae. Germen ovato-trigonum, sulcis 3, profundioribus; stylus striato-setaceus stigmate inconspicuo. Fragrantissima. Gawl. In Promont. b. spei. 4.

16. *L. unicolor* Jacq.; foliis geminis, lineari-lanceolatis, facie rariter pustulatis, scapo erecto, tereti (duplo brevioribus); corollis subcylindricis; petalis interioribus apice patulis;

genitalibus declinatis, (exsertis). *Jacq. Coll. Suppl.* p. 61. *Ic. rar.* II. t. 589. *Tratt. Tabul.* t. 138. *L. unicolor* α fol. a supino pustulis paucis vagis. *Gawl. Bot. Mag.* p. 1575. *L. purpureo-caerulea* β *Willd. Spec.* II. p. 177. (excl. α). β ? foliis immaculatis. *Gawl. Bot. Mag.* 1575. ic.

Bulbus subrotundus, albidus, Avellanâ duplo minor. Folia opposita, acutiuscula, crassula, immaculata, facie striata et superne pustulata, dorso nitida, ad oras sub lente minutissime cartilagineo-erosula, basi canaliculata, ceterum plana, patentissima. Scapus crassitie calami, immaculatus, nitidus, erectus, foliis duplo fere longior. Flores racemosi, plurimi, subodori, patentissimi vel subnutantes in pedicellis erectiusculis. Bractee sessiles, concavae, acutae, parvae, viridescentes; summae steriles et comosae. Petala exteriora oblonga, obtusa, concava, infra apicem callosa et fornicata, ipsâ basi planiuscula; interiora cuneiformia, rotundata, paulo longiora; omnia, filamenta, stylus pedunculique uniformiter saturate purpurascunt. Filamenta subulata, leviter declinata, petalis longiora. Antherae erectae, flavae. Germen oblongum, triquetrum, viride. Stylus figurâ, situ longitudineque staminum. Stigma obsolete trifidum. *Jacq.* Differt a *L. purpureo-caerulea* laciniis corollae magis inaequalibus et filamentis longioribus. In β (quae nobis vix hujus esse loci videtur) folia 2 radicalia, saturate viridia, obtusa, aequalia, 3-4 poll., 6 lin. lata. Scapus pallide flavescenti-viridis, 3-4 poll.. Bractee lanceolatae, acutae, dilute virides, pedicellis apice rubicundis et 3 lin. longis duplo breviores. Cor. 4 lin., albido-rosea: laciniis liturâ sub apice virescente. Filamenta alba, antheris flavis. *Gawl. Clo Sprengel* synonymon *L. fragrantis.* *In Prom. b. spei; prope Stellenbosch.* 4.

17. *L. racemosa* *Gawl.*; foliis trinis, lineari-lanceolatis, inferne vaginantibus, supra pustulatis, scapo brevioribus; floribus longe pedicellatis. *Gawl. Bot. Mag.* t. 1517.

„Differt a *pustulata* valde affini“ (*Sprengel S. V. II. p. 77.* synonymam *purpureo-caeruleae* dicit)“ praeter characteres datos: foliis 3, nec 2, latius lanceolatis; corollâ albâ graveolente, nec inodorâ opacâ virescenti-albâ; pedicellis longitudine floris vel ultra, nec 4plo brevioribus; laciniis exterioribus internis $\frac{1}{3}$, nec $\frac{1}{4}$, brevioribus; laciniâ interiorum infimâ angustatâ; stylo brevioribus. Folia (ex ic.) supra laete viridia, pustulis frequentissimis, dilutioribus, subtus glauca, acuminatâ, $\frac{1}{2}$ ped., $1\frac{1}{2}$ poll. lata. Scapus crassitie calami, glaucus. Bractee ovato-lanceolatae, acutae, albae, lineam longae. Racemus laxis, erectus. Pedicelli erecti, filiformi-complanati, bracteis pluries longiores, (4-5 lin.), glauci. Cor. alba, nutans, curte cylindrico-campanulata $\frac{1}{3}$ poll.: lacinae exteriores (extus striâ virente), parabolicae, dorso proxime infra apicem callo notatae: interiores patulae, spathulato-ligulatae, planae, summae recurvo-divaricatae, apice rotundatae, saepius denticulatae; infima convoluto-concava, magis protensa. Stamina alba fundo corollae inserta, declinata, longitudine laciniarum interiorum. Antherae sagittato-ovatae, flavae. Germen subulato-trilobum, ellipticum. Stylus longitudine laciniarum exteriorum, stigmatibus cuspidato, simplicissimo. *Gawl.* *In Promont. b. spei.* 4.

18. *L. pustulata* Jacq.; foliis geminis, lanceolato-linearibus, facie pustulatis; scapo triquetro, reclinato; floribus subcampanulatis, subsessilibus. *Jacq. Coll.* III. p. 244. IV. p. 220. t. 2. f. 1. *Ic. rar.* II. t. 386. *Willd. Spec.* II. p. 176. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 286. *Bot. Mag.* 817. *Tratt. Tabular.* t. 135. *L. reclinata*; corollis campanulatis, brevissime pedunculatis; petalis interioribus longioribus, obtusis; stylo staminibus longiore; stigmate obtuso, ciliato; fol. geminis lineari-lanceolatis, apice pustulatis, reflexis; scapo triqu. recl. *Dietr. Nachtr.* IV. p. 292. β . *L. pustulata* Andr. *Repos.* *L. pustulata*; coroll. campanul. brevissime pedunculatis; petal. interior. longior. obtus.; stylo subulato, staminibus brevioribus; stigmate acuto, simplici; scapo erecto, tereti; fol. geminis lineari-lanceolatis, laxis, pustulatis, scapo duplo longioribus. *Dietr. l. c.* p. 291. *L. pustulata densiflora.* *Tratt. tabular.* t. 136.

Bulbus subrotundus, depressulus, tunicâ fuscâ. Folia glabra, immaculata, acuta, integerrima, fere ped., flaccida, hinc reclinata, basi canaliculata et amplexicaulia, superne plana, apicem versus revoluta, supra a medio ad apicem pustulis elevatis, rotundatis, sparsis. Scapus longitudine foliorum, debilis, prostratus; extremitate florigerâ tantum erectâ, nitidus, trisulcatus, latere uno angustissimo, hinc veluti compressus. Spica $1\frac{1}{2}$ unc., ab inferioribus sensim florens, densa, multiflora. Bracteae concavae, e basi lata in acumen terminatae, pallidae, glabrae, parvae, terminales steriles, lanceolato-lineares, acuminatae, roseae, longiores. Flores inodori, patuli. Petala erecta, albida: exteriora superne subtus virentia, oblonga, ad apicem incrassata, nec fornicata, basi cum interioribus connata; interiora utrinque superne fasciâ angustâ, flavo-virente, oblonga, superne latescentia et patula, exterioribus $\frac{1}{4}$ longiora. Filamenta subulata, erecta, longitudine fere corollae. Antherae subrotundae, compressulae, flavae. Germen ovatum, triquetrum. Stylus filiformis, petalis longior. Stigma capitatum, villosum. *Jacq.* Folia dilute viridia, obscurius striata. Racemus confertus. Flores $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ poll., pedicellis 1-2 lin. quadruplo longiores, cyathiformi-tubulosi, viridi-albidi, apice obscuriores, inamoeni, subhorizontaliter patentibus: laciniis interioribus $\frac{1}{4}$ longioribus. Genitalia dilute flavicantia. *Gawl.* In β flores duplo majores, fragrantibus, stigmate simplici; habitus validior; pustulae totam faciem foliorum occupantes; scapus teres, crassus. *Trattinn. l. c.* *In Prom. b. spei.* 4.

19. *L. purpurea* Jacq.; foliis geminis, lineari-lanceolatis, immaculatis, ad oras subtilissime cartilagineo-crenulatis; floribus pedunculatis, patentissimis; corollis subcylindricis; (staminibus petala interiora erecta obtusa fere duplo superantibus). *Jacq. Coll. Suppl.* p. 65. *Ic. rar.* II. t. 393. *Willd. Spec.* II. p. 177. *Trattinn. Tabular.* t. 143.

Tota glabra et immaculata. Bulbus subrotundus, magnitudine Avel-lanae, albus, tunicâ fuscâ. Folia acuta, nitida, crassula, reclinata, ad summum $\frac{1}{2}$ ped., unc. lata. Scapus teres, foliis longior, erectiusculus, pennae columbinae crassitie, viridis. Flores

numerosi, inodori, horizontales. Racemus 3-unc. et ultra, erectus; bracteis sterilibus terminatus. Bracteae ovato-acuminatae, sessiles, concavae, patentissimae, albae. Pedunculi erectiusculi, bracteis paulo longiores. Cor. tubulosa. Petala exteriora alba cum apicibus virentibus, oblonga, obtusa, concava, erecta, apice depresso calloso et fornicato; interiora paulo longiora ex violaceo-purpurea cum fascia infra apicem longitudinali saturatiore, cuneiformia, erecta, acutula, parumper conniventia, basi in fundum rotundatulum, nec planum, connexa. Filamenta caerulea, subulata, declinata, petalis fere duplo longiora. Antherae ex badio sordide pallentes, oblongae. Germen ovale, obtusum, triquetrum. Stylus filiformis, longitudine staminum, purpurascens. *Jacq.* In *Prom. b. spei*; in arenosis ad radices *Duyvelsberg*. *Ecklon.* 4.

20. *L. violacea Jacq.*; foliis geminis, oblongis, maculatis, scapo tereti, adscendente (brevioribus); racemo erecto pedunculis patentissimis longitudine florum; floribus basi planis propendulis; (staminibus exsertis). *Jacq. Coll.* IV. p. 147. *ic. rar.* II. t. 394. *Willd. Spec.* II. p. 177. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 287. *Trattin. Tabul.* t. 166.

Bulbus subrotundus, tunicatus, albus, Avellanâ major. Folia opposita, acutula, crassa, integerrima, basi vaginantia, lineata, dorso tota quanta maculata: maculis in vagina pallente ferrugineis, caeterum saturatius virentibus; facie immaculata, cum vagina fere ped., altero duplo angustiore. Scapus $1\frac{1}{2}$ ped., crassitie calami, maculis oblongis fusciscentibus. Racemus $\frac{1}{2}$ ped. et ultra, apice bracteis sterilibus terminatus. Pedicelli numerosi, 1-flori, graciles, $\frac{1}{2}$ unc., albi. Bracteae parvae, acutae, patulae, ortu concavae. Flores parvi, cernui, triquetri cum basi planiuscula, odore Rutae. Petala erecta, obtusa, omnia callo ad apicem destituta; 3 exteriora oblonga, concava, virentia; 3 interiora cuneiformia, summo apice parum reflexo, exterioribus paulo longiora, violacea. Filamenta subulata, erecta, e corollae basi eademque paulo longiora, violacea. Antherae ovatae, obtusae, erectae. Germen subrotundum, triquetrum. Stylus filiformis, violaceus, longitudine staminum. Stigma acutum. *Jacq.* In *Promont. b. spei*, *Schwarzberg prope Steenbocks rivier.* 4.

21. *L. isopetala Jacq.*; foliis geminis, (lanceolatis, deflexis), scapo suberecto (apice angulato brevioribus); floribus erectis; petalis longitudine subaequalibus, (oblongis, obtusis.) *Jacq. Coll. Suppl.* 68. *ic. rar.* II. t. 401. *Willd. Spec.* II. p. 179. *Trattin. Tabular.* t. 165.

Bulbus subrotundus, extus fuscescens, avellanâ major. Folia basi canaliculata et mutuo amplexantia, inferne erecta, dein reclinata, viridia, immaculata, crassula, striatula, obtusula, integerrima, 10 circiter unc., vix unc. lata. Scapus teres, crassitie pennae columbinae, flexuosus, cum racemo circiter ped.. Racemus erectus, multiflorus, longus. Pedunculi 2 lin., parumper distantes, erectiusculi. Bracteae ovatae, acutae, late sessiles, concavae, erectiusculae, viridescentes; summae paucae steriles, saepe vix ulla. Flores inodori, erectiusculi, coloris sordidi. Cor. tubulosa, obsolete et obtuse triangularis, tota erecta. Petala sordide pallentia cum apice fusco-sanguineo; exteriora oblonga, concava, in-

fra apicem subtus callo depresso gibbosa; interiora subcuneiformia, (sub) emarginata, callo destituta, plana, vix longiora. Filamenta subulata alba, longitudine corollae. Antherae oblongae, erectae, ochroleucae. Germen ovatum, triquetrum, viride. Stylus filiformis, erectus, longitudine staminum. Stigma obtusum. *Jacq.* In *Prom. b. spei.* 4.

22. *L. hirta* Thunb.; corollis campanulatis, pedunculatis; foliis (solitariis) linearibus, hirtis. *Thunb. Prodr.* 64. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 527. *Willd. Spec.* p. 178. PHORUM *hirtum* Thunb. *Diss. nov. pl. gen.* V. p. 96.

Scapus simplex, flexuoso-erectus, glaber, purpureo-maculatus, spithamaeus. Folium unicum, basi latâ vaginans, hirsutum. Flores racemosi, cernui, ovati, albo-caerulescentes. *Thunb.* In *Prom. b. spei.* 4.

b. floribus cylindricis:

23. *L. unifolia* Jacq.; folio unico, canaliculato, (lineari-lanceolato); racemo laxo; (pedunculis erectiusculis flores subaequantibus; petalis interioribus cuneiformibus, obtusis, inaequalibus.) *Jacq. H. Schönbr.* 1. p. 45. t. 83. *Willd. Spec.* II. p. 178. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 287. *Bot. Mag.* 766. *Trattin. Tabul.* t. 158.

Bulbus subrotundus, depressulus, albidus, magnitudine Avellanae. Folium basi ad 2 unc. scapum arcte amplectens, vaginam mentiens, maculis sanguineis (vel vaginâ fere totâ violaceâ), hinc planiusculum et $\frac{1}{2}$ unc. latum (ut in spontaneis) dein ad apicem usque canaliculatum, crassum, ped.. Scapus teres, erectiusculus, crassitie pennae columbinae; inferne et ad flores maculis sanguineis, ped.. Racemus 3 unc.. Pedicelli erectiusculi, caerulescentes, $\frac{1}{2}$ unc.; bracteolâ lanceolatâ, acuminatâ, amplexante, erectâ, (in spontaneis bracteolae inferiores late ovatae obtusiusculae, superiores ovatae, acuminatae). Flores inodori, pedicellis paulo longiores. Petala exteriora oblonga, (basi dilatata), obtusa, concava, erecta, pallida, basi caerulescentia, infra apicem callosa et fusco-viridia (5 lin.); interiora longiora, (6 lin.), erecta, apice quidquam patulo, cuneiformia, obtusissima, concava, alba, basi cum exterioribus connata. Filamenta subulata, alba, corollâ paulo breviora. Antherae flavae. Germen obovato-triquetrum, sexsulcatum, obtusum. Stylus filiformis, albus, stamina aequans. *Jacq.* Folium basi vaginâ amplâ, sesquipollicari, laete rubrâ, undis transversis obscurioribus, superne lanceolato-lineari, attenuatum, acuminatum, apice caudato-reflexum, laete viride, rubro-marginatum, supra vaginam $1\frac{1}{2}$ poll. latum. Scapus 5-6 poll., albidus, purpurâ variegatus. Bractee pedicellis dilute cyaneis $\frac{1}{2}$ poll. multo breviores. Cor. $\frac{1}{3}$ poll., urceolato-cylindrica, bilabiato-irregularis; lacinae extus basi dilute cyaneae, superne albidae, rubro-tinctae, intus virentes: extimae breviores, attenuatae, intimae sursum dilatatae, unâ convolutâ minore. Stigma simplex. *Gawl.* Caps. in spontanea brevissime pedicellata intra petala emarcida, obovata, obtuse trigona, 3 lin., subretusa, mucronulo brevi vel stylo persistente coronata; loculis 2-6-spermis. Semina rotundato-ovata cum mucrone parvo, ni-

tida, atra, magnitudine capituli aciculae. *In Promont. b. spei.* 4.

24. *L. tricolor Thunb.*; foliis oblongo-lanceolatis, recurvato-recumbentibus, maculatis; corollis trigono-cylindricis, elongatis, nutantibus, pedicello 3-4-plo longioribus; petalis interioribus exteriores $\frac{1}{3}$ superantibus, cyathiformi-patulis. *Gawl. Bot. Mag.* 1020. (excl. β .) quo teste hujus tantum loci: *Thunb. Prodr.* 64. *Fl. cap.* ed. *Schult.* p. 327. ergo etiam: *PHORMIUM alooides Linn. Suppl.* p. 205. *Thunb. nov. gen.* p. 95. (excl. α et γ .) *L. tricolor Curt. Bot. Mag.* 82. *Red. t. 2.* (excl. β .) *Trattin. Tabul.* 148. *L. tricolor α H. Kew.* ed. 2. II. p. 288. *L. tricolor β cor. flavis, basi rubentibus, apice viridibus. H. Kew.* ed. 1. p. 461. *Willd. Spec.* II. p. 179. (excl. *L. luteola Jacq.*) *L. tricolor alooides Pers. Syn.* 1. p. 377.

Bulbus globosus, carnosus, fibrosus, albus. Folia radicalia bina vaginantia, lanceolato-ensiformia, concava, subundulata, integra, glabra, patentia, supra purpureo-maculata. Scapus teres, carnosus, glaber, erectus, purpureo-maculatus. Flores racemosi, cernui. Rhachis angulata. Bractea sub pedunculo lata, acuta, membranacea, brevissima. Pedunculus teres, erecto-patens, glaber, $\frac{1}{2}$ unguicularis. Cor. lacinae 3 interiores lato-lineares, obtusissimae, emarginatae, concavae, poll., aequales, invicem minime cohaerentes; 3 exteriores basi invicem et cum interioribus parum connatae, ovatae, concavae; superior retusa. Filamenta basi laciniarum inserta, alba longitudine corollae. *Thunb. In campis depressis arenosis Prom. b. spei, alibi.* 4.

25. *L. luteola Jacq.*; foliis geminis, elongato-lanceolatis, (inaequalibus), plerumque immaculatis; scapo erecto; corollis propendulis, cylindricis, cum limbo petalorum interiorum patentissimis. *Jacq. Coll.* IV. p. 148. *Jacq. ic.* II. t. 595. *L. corollis pedunculatis, pendulis; petalis interioribus longioribus, emarginatis, patentissimis; bracteis acutis; foliis oblongo-lanceolatis. Willd. En. H. Berol.* p. 380. *Red. Lil.* 297. *Trattin. Tabul.* t. 149. *L. tricolor β Willd. Spec.* p. 178. (excl. syn. *Ait.* et *Curt.*) *L. quadricolor γ lutea Sims Bot. Mag.* 1704. *L. lutea Sims Bot. Mag.* 1907. *L. flava Andr. Repos.* 456. (fid. *Smith* in *Rees Cycl.* sub *L. tric. β flava*.) *β pallida Trattin. Tabul.* 150. *L. tricolor β luteola H. Kew.* ed. 2. II. p. 288. *Bot. Mag.* 1020. *L. tricolor B Red. Lil.* 2. *PHORMIUM alooides α Thunb. nov. gen.* p. 95.

Bulbus subrotundus, albidus, fere unciae diametro. Folia opposita, acuta, integerrima, glabra, patula, carnosula, superne reflexa; alterum ensiforme, plus quam unc. latum; alterum sublineare, triplo angustius: omnia immaculata, rarissime maculis fuscis, „(8-11 poll., 8-15 lin. lata. *Red.*)“. Scapus teres, crassitie caulami, fuscescens, immaculatus, superne longe racemosus. Bractee sessiles, acutae, concavae, patulae, parvae. Pedunculi 4-flori, erectiusculi, 4-lin. Flores „(15)“ cernui, adhuc clausi coccinei, „(5 fere lin.)“ increscentes lutei cum virore ali-

quo, petalis exterioribus saepe purpurâ obsoletâ suffusis. Petala exteriora oblonga, obtusa, concava, erecta, interioribus $\frac{1}{3}$ fere breviora; interiora spathulata, obtusissima, concava, erecta, „(apice plus minus violacea)“, omnia sine callo ad apicem. Filamenta subulata, erecta, corollae longitudine. Antherae oblongae, fusco-purpureae. Germen „(viride, trisulcum)“ oblongum, trigonum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma „(fuscum)“ subtrifidum, obtusum. *Jacq.*. Descriptio a *Gawler* data haud paucis abludit: Folia basi vaginantia, late lanceolata, saturate viridia, 5-6 poll., ultra pollicem lata, longitudine scapi viridis, et, uti hic, maculis sparsis, irregularibus, majusculis, atrosanguineis. Pedunculi horizontaliter patentes, fere $\frac{1}{2}$ poll., virides, basi bractea triangulari, vix lin.. Flores penduli, pollicares, toti lutei, ante expansionem apice virides. *Gawl.*. Differt a *L. tricolore*: foliis immaculatis, angustioribus, inaequalibus; scapo immaculato; floribus fere dimidio minoribus, patentissimis ac cernuis, eorumque colore: *Trattin.* l. c.; iisdem characteribus et stylo semper staminibus longiore, apud *Redouté*. In β folia dilutiora, 4-6 poll., 1-1 $\frac{1}{2}$ poll. lata; scapus duplo longior, glauco-cyaneus; racemus secundus, multiflorus; flores pallide flavescentes, expansi apice tantum viriduli. Jungere *luteolam* cum *tricolore* videtur. *Tratt.* l. c.. In *Prom. b. spei*; *Wagenmachersvalley*. *Ecklon.* 4.

Obs. *Sims* ad γ suum, tab. 1704 monet, se *luteolam* *Jacq.* tantum quoad figuram sine foliis laudare, quam foliis maculatis gaudere supponit. Varietates suas hic adductas 3 omnes potius forte ad *tricolorem* spectare, sed nomen *quadricoloris* interea hic esse retinendum, eò magis, cum dubium sit, an *L. tricolor* *B. M.* t. 83. c. varietate 1030 distincta sit species a varietatibus *quadricoloris* hic adductis.

26. *L. quadricolor* *Jacq.*; foliis geminis, lineari-lanceolatis, laxis, maculatis, scapo erecto (paulo brevioribus); corollis propendulis, (remotiusculis), cylindricis; limbo petalorum interiorum (multo longiorum) patulo. *Jacq. Coll. Suppl.* 62. *lc. rar.* 396. *Andr. Repos.* 148. *Tratt. Tabul.* t. 153. *L. quadricolor* β *Bot. Mag.* 1097. et ad 1704. *L. pendula* β fol. angustioribus, superne maculatis: pet. exter. coccineis apice viridibus, interioribus flavescentibus apice atro-sanguineis. *Willd. Spec.* II. p. 181. *H. Kew.* ed. 2. II. p. 288. *L. tricolor* γ *quadricolor* *Smith* in *Rees Cycl.* β . foliis immaculatis. *L. quadricolor* *Sims* *Bot. Mag.* 588. *Link Enum.* 1. p. 332. *L. quadricolor* α *Bot. Mag.* ad 1704. *L. tricolor* *Jacq. nov. act. helv.* 1. 38. t. 2. f. 3. *lc. rar.* 1. t. 61. *L. tricolor* α *Hort. Kew.* ed. 1. p. 461. *Willd. Spec.* II. p. 179. *L. tricolor* A *Red. Lil.* 2. (quatenus synonyma.)

Differt a *L. pendula*, praeter characteres datos, floribus longius pedunculatis, magis distantibus; petalis exterioribus multo brevioribus, interioribus (non emarginatis); scapo molliore; fol. longioribus, angustioribus, magis canaliculatis: altero longiore basi erecto, apice reclinato. *Gawl.*. Bulbus ovatus, fuscescens, avellanâ paulo major. Folia opposita, acutula, integerrima, utrinque virentia, facie maculis fusciscentibus, inferne canaliculata et erecta, supra medium reclinata; alterum longius, 8 circiter unc., unc. fere latum. Scapus teres, crassitie calami, nitidus, ex viridi-pallens, immaculatus, erectiusculus, foliis paulo altior.

Flores circiter 6, distantes, breviter pedicellati, inodori, speciosi fere $1\frac{1}{3}$ unc.. Bracteae acutae, concavae, minutae, summae magis elongatae et steriles. Cor. tubulosa, obsoletius triquetra, basi obtusa. Petala exteriora oblonga, concava, rubra, supra medium flavescentia, apice viridia, obtusa, erecta, summo apice calloso et fornicato; interiora cuneiformia, parum concava, apice rotundata, liberrima inter se et ab exterioribus, quibus $\frac{1}{3}$ fere longiora, erecta cum apicibus patulis, pallide virentia, (v. flava) inferne rubella, superne atropurpurea. Filamenta alba, subulata, petalis breviora. Antherae oblongae, erectae. Germen subrotundum, triquetrum. Stylus figurâ et longitudine staminum. Stigma subtrifidum, obtusum. *Jacq.*. Scapus maculis paucis, majusculis, sanguineis. Bracteae pedicellis subaequales, lineares, acuminatae. Cor. pollicaris. Stylus staminibus longior, in icone apud *Gawler*, cui hybrida forte e *L. tricolore* et *quadricolori* immaculata. β affiniore *tricolori* quam *pendulae*. Cor. flava; petala exteriora medio et basi coccinea, apice viridia, interiora flava, apice kermesina et purpurea. *Sims.* In *Prom. b. spei.* 4.

27. *L. pendula* *Ait.*; foliis binis, ovato-lanceolatis, erectis; corollis cylindraceutis, cernuis, breviter pedunculatis; petalis exterioribus parum brevioribus; spicâ compactiore. *Sims Bot. Mag.* 590. *Ait. H. Kew.* ed. 1. p. 461. ed. 2. II. p. 288. (excl. β). *Thunb. Prodr.* 64. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 528. *Willd. Spec.* II. p. 180. (excl. β). *Andr. Repos.* 41. t. 62. *Lodd. Bot. Cab.* 267. PHORMIUM *alooides* β *Thunb. nov. gen.* p. 96. PHORM. *bulbiferum* *Cyrill. Neap. fasc.* I. t. 12. *Buxb. Cent.* III. t. 19. (fid. *Tratt.*). α *L.* fol. oblongis, geminis scapoque erecto immaculatis; corollis impunctatis, pendulis. *Jacq. Coll.* 5. p. 259. *ic. rar.* t. 400. *Red. Lil.* t. 52. *Tratt. Tabul.* t. 151. *Kerner h. semperv.* t. 214. β *L. pendula* β *tricolor* *Trattin.* t. 152.

Corollae luteae, laciniis exterioribus apice virentibus; interioribus apice purpureis; scapo spithamaeo foliisque supra maculatis. *Thunb. l. c.* „Folia oblongo-lanceolata, succulenta, laevia, spithamaea. Scapus erectus, teres, crassitie pennae anserinae, foliis paulo longior, supra medium maculis nonnullis rubescentibus. Racemus pauciflorus, floribus distantibus. Pedunculi filiformes, rubentes, $\frac{1}{2}$ unc.. Bractea ad basin singuli pedunculi ovata, acuta, brevissima. Petala exteriora basi in tubum trigibum connata, rubra, apicibus virentibus: infimi apex incrassatus, intus fornicatus, supra depressus; interiora obtusissima, inferne flavicantia, lineâ dorsali rubente, superne e purpureo rubicunda, margine et medio virentia. *Hort. Kew.* In α : bulbus subrotundus, depressulus, albidus, unc. fere in diametro. Folia 8 unc., $1\frac{1}{2}$ unc. lata, acuta, carnosula, nitida, (uti scapus, rore glaucescenti *Red.*), erectiuscula, planiuscula, inferne concava, basi convoluta, vaginâ membranaceâ albidâ, truncatâ inclusa. Scapus crassitie calami, fere ped., nitidus, viridis, ad flores rubescens, (pallide maculatus *Gawl.*). Racemus e floribus circiter 12 inodori, apice bracteis sterilibus coronatus. Bracteae pallidae, membranaceae, concavo-adnatae, hinc ovatae et patulae. Pedunculi subrubentes, vix $\frac{1}{2}$ unc.. Flores $1\frac{1}{3}$ unc., triangulares. Petala 3 exteriora lineari-oblonga, obtusa, concava, tertii supe-

rioris apice calloso, fornicato et depresso, utrinque rubra cum apice virente (fusco *Red.*); 3 interiora elongato-cuneiformia, exterioribus paulo longiora iisdemque basi connata, obtusissima, subemarginata, leviter carinata, extus flavescencia carinâ rubra, superne saturate rubro-violacea cum carina apiceque viridi, intus ejusdem fere coloris. Filamenta subulata longitudine corollae, pallida. Antherae hastatae, violaceae, polline flavo-virente. Germen ovale, triquetrum, viride. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma capitatum, subtrilobum. *Jacq.*. In β , quae transitum ad *L. quadricolorem* sistit, folia aeque immaculata, latiora quam in *quadricolori*. Cor. miniata, apice virens; petala interiora, ut in *pendula*, violacea. *Tratt.*. In *Prom. b. spei*, in arenosis prope *Ried valley, Saldanha Bay: Ecklon; vix in Oriente.* 4.

Obs. Hujus nobis loci videtur neglecta ab omnibus *L. linguiformis*; fol. radicalibus binis erectis, linguiformibus; scapo racemoso; floribus pendulis. *Lam. Enc. III. p. 372.* quo teste: *ALTERNIS bifolia Burm. Pl. Reg. et Buchoz Hist. gen. II. t. 1.*; ad quam vero varietatem spectet, augurari non audemus ex descriptione nimis brevi: „*Similis tricolori*; sed folia latiora, minus acuta, plana. Racemus simplex, multiflorus. Flores cylindrici, pedicellati, subirregulares, aurantiaci, petalis interioribus apice purpureo-fuscis. In Africa.“ *Div. Vitman in Sum. Pl. II. p. 319.* *ALTERNIS bifoliae Buchoz* β est: *Burb. Cent. III. t. 19.*, ubi foliolum unicum, flores pauciores.

28. *L. rubida Jacq.*; foliis geminis, elongate sublanceolatis, acutis, facie maculatis, superne planis; scapo erecto, ad medium usque maculato; floribus incurvulis, punctatis, pendulis. *Jacq. Coll. Suppl. p. 60. Ic. rar. II. t. 398. Willd. Spec. II. p. 179. (excl. β).* *Hort. Kew. ed. 2. II. p. 288. Link. Enum. 1. p. 322. Trattin. Tabul. t. 145. L. rubida a Gawl. Bot. Mag. 995. icon.*

Bulbus oblongus, extus fuscescens, crasse et spongiose tunicatus. Folia opposita, basi canaliculato-conniventia, crassula, integerima, supra maculis ferrugineis, subrotundis, sparsis, dorso pallidiora et immaculata, solâ infimâ parte sanguineo-punctata, $\frac{1}{2}$ ped., erectiuscula, altero unc. lato, altero duplo angustiore. Scapus foliis altior, teres, pennâ columbinâ crassior, viridis, ad medium usque maculis sanguineis, superne racemosus et triquetus. Pedunculi circiter 8, breves, patuli, ex cavitate e bracteola subrotunda acuta patentissima pallidaque formata. Bractee summae steriles. Flores unciales, inodori. Cor. tubulosa, inferne obtuse triangularis. Petala exteriora oblonga, obtusa, canaliculato-concava: superius basi gibbosum et apice callose fornicatum, rosea et ad apicem virentia; interiora elongate cuneiformia, rotundata, concava, erecta cum apice patulo, rosea cum oris albidis et lineolâ infra apicem viridi, longiora, infimum duobus aliis paulo brevius. Filamenta subulata, albida, basibus petalorum innata, longitudine corollae. Antherae oblongae, incumbentes. Germen ovatum, obtusum, triquetrum, 6-sulcatum, pallide flavens. Stylus albus, superne purpurascens, filiformis, erectus, petalis longior. Stigma triquetrum. *Jacq.*. Folia non maculata, tenuissime crenulata. Cor. purpurascens. *Link. In Prom. b. spei.* 4.

29. *L. tigrina Jacq.*; foliis subgeminis, basi ad medietatem usque mutuo amplexantibus et convolutis, dein lanceolatis et patulis, acutis, maculatis; scapo erecto, undique ma-

culato; floribus cylindricis, punctatis, pendulis. *Jacq. Coll. Suppl. 67. Ic. rar. II. t. 399. Trattin. Tabular. t. 146. L. rubida* β *Willd. Spec. II. p. 180. Gawl. Bot. Mag. 995.*

Tota glabra. Bulbus oblongus, tunicatus, uncialis. Folia 2, rarissime 3, 5-9 unc., erecta, superne patentia, maculis ferrugineis. Scapus inferne teres, caeterum angulatus, crassitie calami, longitudine foliorum, pallide virens maculis purpureis. Racemus multiflorus. Bracteae subrotundae, acutae, concavae, pallidae, parvae, summae dense aggregatae, steriles. Pedunculi breves, nutantes, albi. Flores inodori, unciales. Petala inferne rubra, ceterum pallida cum linea media dorsali rubra punctisque rubris densissimis; exteriora linearia, obtusa, quidquam concava, erecta, in decursu omnia ad dorsum corollae flexa, petalis interioribus breviora, intermedio ad apicem fornicato; interiora cuneiformia, erecta, supra exteriora patula, obtusa, inter se et cum exterioribus ad basin levissime connata. Filamenta subulata, basi petalorum inserta, longitudine corollae. Antherae erectae. Germen ovatum, triquetrum, obtusum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma capitatum. *Jacq. In Prom. b. spei; in arenosis planitiei capensis. 4.*

30. *L. punctata Jacq.*; foliis geminis, lineari-lanceolatis, canaliculatis, utrinque maculatis, erectis; scapo erecto, maculato, paucifloro; floribus cylindricis, incurvulis, punctatis, pendulis. *Jacq. Coll. II. p. 323. Ic. rar. II. t. 397. Willd. Spec. II. p. 180. Trattin. tabular. t. 147. L. rubida* γ . *Gawl. Bot. Mag. 993.*, quo teste: *Orch. hyacinthoides*, foliis caule et floribus maculatis. *Buxb. Cent. III. p. 12. t. 20.* (olim perperam a *Linnaeo* in *Spec. p. 455. HYACINTHO orchiodi* et in *Mant. ALETRIDI (VELTHEIMIAE) capensi* pro synonymo adscriptus; et, fide hujus synonymi:) *L. linguiformis* β . *Lam. Enc. III. p. 372.*

Bulbus subrotundus, crasse tunicatus, albus. Folia acutiuscula, $\frac{1}{2}$ ped., utrinque maculis badio-fuscis, dorso fusco-sanguinea, facie glauco-virentia, basi albida punctis maculisque rubris. Scapus 10 unc., teres, nitidus, calamo duplo gracilior, nudus, ex rubro pallidoque maculatus. Pedunculi uniflori, albidi, patuli, bracteis minutis albidis, fere 3, summis una cum florum gemmis abortantibus. Flores plus quam unciales. Corolla albida, externa tota utrinque punctis rubris densissimis, interior sic punctata dumtaxat superne et inferne in linea media dorsali; limbus brevis patens. Petala 5 exteriora inverse cuneiformia, erecta, obtusa, infimâ basi cum interioribus connata; 3 interiora longe cuneiformia, obtusa, interiorem tubum formantia, exterioribus paulo longiora, apice patula, infimo duobus reliquis paulo breviori. Filamenta subulata, erecta, longitudine fere corollae. Antherae oblongae, incumbentes, rubellae, effetae nigricantes. Germen ovatum, triquetrum. Stylus filiformis, erectus, longitudine staminum. Stigma obtusum. Caps. ovata, obtusa, triquetra. *Jacq. In Prom. b. spei; ad Tigervalley. 4.*

31. *L. pusilla Jacq.*; foliis plusculis, infra terram anguste et longe canaliculatis, dein oblongis, planis; racemo in

sinu foliorum; (staminibus longe exsertis.) *Jacq. Coll. Suppl.* p. 71. *lc. rar.* II. t. 385. *Willd. Spec.* II. p. 175. (*excl. syn. L. reflexae Thunb.*) *Trattin. Tabul.* 144.

Tota glabra. Bulbus subrotundus, Avellanâ minor, tunicâ fuscâ. Folia saepius 4, 2-3 unc., vix $\frac{1}{2}$ unc. lata, infra terram mutuo amplexantia, supra terram anguste oblonga, acutula, crassula, viridia vel sordide sanguinea, facie maculis fuscis, patula. Scapus teres, niveus, cum maculis obsolete roseis, vix crassitie pennae columbinae, subterraneus, supra terram in sinu foliorum contracte racemosus et multiflorus, ut flores videantur umbellati. Pedicelli breves, erecti, nivei. Bractee ovato-acuminatae, concavae, erectae, niveae. Flores erecti, unciales. Corollae basis connata aut unâ aut duplici maculâ caeruleâ. Petala nivea cum fascia dorsali virente, linearia, obtusa, subcanaliculata, erecta; exteriora ad apicem callose fornicata, basi inter se et cum interioribus connata, breviora. Filamenta subulata, petalis $\frac{1}{3}$ longiora. Antherae oblongae flavae. Germen obverse ovatum, trilobatum. Stylus filiformis, erectus, longitudine staminum. Stigma obtusum, subtrifidum. *Jacq.* *In Prom. b. spei.* 4.

32. *L. reflexa Thunb.*; corollis ventricosis, subsessilibus, erectis; foliis ensiformibus, reflexis, scapo longioribus. *Thunb. Fl. cap. ed. Schult.* p. 327. *PHORMIUM orchioides a Thunb. Nov. gen.* p. 96.

Bulbus globosus, carnosus, magnitudine Avellanae, albus, fibrillosus. Folia raro 1, saepe 2 radicalia, vaginantia, lato-lanceolata, convoluto-concava, acuminata, subundulata, integerrima, revoluta, glabra, digitalia vel ultra, altero breviora, poll. lata. Scapus simplex foliis vaginatus, teres, glaber. Flores racemosi, ovati, patuli. Rhachis flexuosa, angulata. Bractea ad basin floris ovata, acuta, membranacea, brevissima, alba. Cor. oblonga, subinflata, unguicularis, subclausa, incurva; lacinae concavae, obtusae: 3 exteriores breviores, quarum dorsalis apice incrassata, subfornicata, obtusa; 3 interiores longiores, quarum infima paulo brevior. Filamenta filiformi-subulata, tubo corollae inserta et ad medium longitudinaliter adnata. Antherae parvae, supra flavae, subtus fuscae. *a* corollis flavis, ovato-oblongis; scapo subincluso, brevissimo, fere nullo supra terram. *Thunb. Willdenow L. reflexam Thunb. cum? ad L. pusillam duxit. In Prom. b. spei ad pedem Leuwestaart, Duyvelsberg, in Swartland.* 4.

Obs. Specimen possidemus nomine *L. pallidae* a clo *Agardh* communicatum, in quod tota descriptio *L. reflexae* quadrat, praeter bractee, quas in nostra $\frac{1}{2}$ lin., nec brevissimae.

Quid LACHENALIA tenella Schneevogt?

1409. U R O P E T A L U M.

1. *U. serotinum Gawl.*; corollis campanulatis, pedunculatis, secundis; petalis exterioribus longioribus, patulis, (reflexis), interioribus connatis; foliis linearibus, canaliculatis. *Willd. Spec.* II. p. 175. (sub LACHENALIA serotina, uti:) *H. Kew. ed. 2. II. p. 286.* HYACINTHUS serotinus *Linn. Spec.* 453. *Lam. Enc.* III. p. 190. *Mill. Dict.* n. 2. *Cavan. ic.* 18. t. 30. *Gaertn. sem.* 38. t. 12. *Desfont. Atl.* 1. p.

307. *Hort. Kew.* 1. p. 457. *Syn. stirp. Arragon.* 44. *Loisel. Fl. Gall.* 206. *Lam. et Dec. Fl. fr.* III. p. 207. *Red. Lil. t.* 202. *HYAC. lividus Pers. Syn.* 1. p. 376. *DIPCADI serotina Usteri Annal. St.* 2. p. 13. *ALBUCA minor Gled. Act. Berol.* 1769. p. 61. *SCILLA serotina a Gawl. Bot. Mag.* 859. *H. obsoleti coloris hispanicus. Clus. hist.* 177. *Bauh. hist.* 2. p. 587. β . Cor. e lateritio flavescens, laciniis extimis divaricatoribus. *Gawl. l. c.* 1185. et in nota ad 1552. *HYACINTHUS serotinus Broter. Fl. lusit.* p. 536? *HYACINTHUS fulvus Cav. Annal.* III. p. 47. *SCILLA serotina; nudiflora; bracteis patentibus; scapo subsquamoso. Schousb. Maroc.* 1. p. 165? (quo teste *SCILLA anthericoides Desf. et Poir. cum?*)

Bulbus ovatus, albus, magnitudine Juglandis minoris. Folia radicalia 4-5, attenuata, intus nervoso-striata, erecta, longitudine fere scapi laxi, quidquam glaucescentia. Scapus 4-16 poll. Racemus erectus, oblongus, remotiusculus, multiflorus, subnutans. Flores 6-20. Bracteae solitariae, subsagittato-ovatae, aristatae, membranaceae, fuscescentes, pedicellis recurvis, corollâ brevioribus breviores nunc, nunc longiores. Cor. cylindrico-campulata, ad $\frac{3}{4}$ longitudinis suae partita; lacinae lineari-oblongae, subaequales: exteriores acutae, sordide fuscae, striâ mediâ purpurascens; interiores paulo breviores in cylindrum conniventes, magis obtusae, sordide fuscae, intus albidae, rubro tinctae. Germen longitudine styli e tribus filis connati. Stigmata obsoleta. Stamina lineari-subulata, a basi ad fissuram corollae concreta, hac $\frac{1}{4}$ breviora, stylo longiora, albida, antheris pallide flavis. In β folia scapusque (ex ic.) glauca, basi flavescens-viridia, $\frac{1}{3}$ poll. lata. Bracteae roseo-albidae, pedicello fuscescente vix longiores, $\frac{1}{2}$ poll. Corollae lacinae $\frac{2}{3}$ poll. longae, 2-3 lin. latae, obtusae, sordide virescenti-fuscae, disco purpurascens. In spontaneo β *Cavanilles*: bulbus magnitudine ovi columbini, basi radicibus numerosis, albis, 3-4 poll. Folia 4-5, scapum subaequantia, 1-6 lin. lata, apice angustata, basi vaginante dilatata, lineis longitudinalibus. Scapus teres, glaber, 2-ped., crassitie pennae anserinae. Spica 6 poll. Pedicelli erecti, longitudine florum. Bractea pedicellis longior, concava, acuminata. Cor. lateritia; lacinae 3 exteriores revolutae, ad basin fere usque liberae; 3 interiores profunde partitae, basi tubum formantes, superne divergentes, 5-6 lin. Filamenta corollâ breviora, corollae laciniis basi inserta. Antherae oblongae, flavae. Caps. ovata, 3 lin. *a* in *Gallia merid., Hispania, Lusitania, Teneriffa, Barbaria*; β . circa *Mogador, Brouss.*; in *Marocco: Schousb.?*; in *Lusitania?* 4.

Obs. An hujus loci: *H. serotinus Forsk. Fl. Ag. arab.* p. 209., in quo corollae lacinae exteriores distinctae, rubrofuscae; semina multa in quovis loculo?

2. *U. hyacinthoides Spreng.*; racemo nutante; bracteis pedunculo longioribus; foliis duobus lineari-subulatis, canaliculatis, scapo longioribus; laciniis corollae subunguiculatis. — *Spreng. Cur. post.* p. 135. *POLEMANNIA hyacinthoides Bergius; de Schlechtendal, Linnaea* 1826. p. 250.

Bulbus magnitudine Avellanac maximae, pyriformis, solidus. Folia basi erecta. Scapus palmaris, (7 poll.) teretiusculus, colore flo-

rum. Racemus 6-10-florus. Bracteae ovato-lanceolatae, acuminatae (pallide fuscescentes, 4-5 lin.). Pedunculi ante anthesin minimi, dein longitudine tubi corollae, (3 lin.). Flores rubicundi, glauci: laciniis interioribus luteo-virescentibus. Corolla (6-7 lin.) infra medium usque 6-fida; tubus basi parum amplior; lacinae planae, superne reflexae, lanceolato-lineares; 3 exteriores longiores, extus basi gibbae, intus foveolâ nectariferâ, obtusae; 3 interiores parum breviores, tubum longiorem formantes; apice reflexae, acutiusculae; omnes subunguiculatae, ungue lineari; laminâ dilatatâ oblongâ. Stamina longitudine unguum interiorum; filamenta plana, membranacea, apice angustiora, tubo accreta et superne cum corollae laciniis interioribus cohaerentia, apice tantum libera: 3 ad laciniam corollae primam, 2 ad secundam, 1 ad tertiam. Antherae lineares, inferne bifidae, medio dorso insidentes. Pistillum filamentis brevius. Germen oblongum, triquetrum. Stylus longitudine germinis, obtuse triqueter, vix inclinatus. Stigma lobis 3 oblongis, erectis. Caps. immatura oblonga, triquetra, truncata, lucida; matura magnitudine Cerasi, latior quam longa, loculis polyspermis. Semina unâ serie in quovis loculo horizontaliter incumbentia, plana, disciformia, superne parum convexa, alata, aterrimum, nitida, toto margine truncata. HYACINTHO *serotino* L. tam affinis, ut vix ullum discrimen; jungere tamen cum eo non audemus non inspectis vivis utriusque speciminibus. Genus quamvis LACHENALIAE proximum, plurimis tamen notis discrepans, nec cum alio genere consociandum. Nomen in honorem Pharmacop. *Polemann* in urbe Cap. a divo *Bergius* datum. *De Schlechtend* qui characterem generis non addidit. *In Prom. b. spei.* 4.

3. *U. glaucum Burch.*; foliis lato-lanceolatis, erectis, scapo multo brevioribus; pedunculis longissimis. *Burch. Mss. in Bot. Reg. t. 156.* LACHENALIA *speciosa Dietr. Lex. IX. p. 558?*

Bulbus ovato-globosus. Folia circiter 7, 1½ ad 12 poll. usque, scapo duplo triploque breviora, basi convoluta, amplexantia, erecta, lineari-lanceolata, uti tota planta glauca, plana, exteriora latiora, utroque margine subreflexa, interiora angustiora, cuspidata. Scapus erectus, parum flexuosus, 2-3-ped., crassitie fere pennae scriptoriae majoris. Racemus multiflorus, floribus irregulariter sparsis, pedunculis patentibus, rigidis, 1-floris, flore duplo triploque longioribus, basi bractea lineari-lanceolatâ, sphacelatâ, patentireflexâ. Cor. e viridi-fulvescens, extus rore glauco canescens, fere pollicaris, tubuloso-campanulata, laciniis oblongis, obtusis, intus glabris, ultra medium solutis, 3 exterioribus reflexis, intus caudiculâ crassâ, subulato-compressâ; interioribus erecto-patulis, ecaudatis. Filamenta brevissima, planiuscula. Antherae oblongae, luteae, mucronatae, sagittatae. Germen 3-suleum. Stigmata 3 replicata, inclusa. *Bot. Reg. Sprengel in N. Entd. I. p. 529.* *U. glaucum Burch.* non satis a LACHENALIA distinctum monct, in *S. Veg. p. 78.* vero admittit. *In Prom. b. spei prope Klaarwater. Burchell.* 4.

4. *U. longifolium Lindl.*; foliis lineari-ligulatis, acuminatis, debilibus; racemo laxo, paucifloro; floribus cernuis; petalis obtusis. *Bot. Reg. t. 974.* et in *Trans. Hortic. Soc. T. VII. P. I.*

Bulbus ovatus, pallidus, scariosus, magnitudine ovi passeris. Folia humifusa; primordialia filiformia, fistulosa; adulta lata, ligulata, planiuscula, carnosae, longe acuminata, $2\frac{1}{2}$ ped., luteo-viridia. Scapus erectus, teres, glaber, semidiaphanus, longitudine foliorum. Racemus laxus, 4-5-florus. Flores nutantes, fusco-virides: bracteae ovatae, baciae, sphacelatae, acumine subulato, floribus breviores. Perianthium duplex, (virens, $\frac{3}{4}$ poll. et ultra) laciniis apice reflexis, linearibus, obtusis, in tubum conniventibus (margine livide purpurascens): exterius alte tripartitum; interius fere ad apicem cohaerens, apicibus tantum solutis. Stamina versus basin laciniarum inserta, laciniis paulo breviora, filamentis subulatis, laciniarum faciei internae adhaerentibus. Antherae pallide virides, lineares. Germen oblongum, triquetrum, 3-loculare, loculis polyspermis, ovulis distichis. Stylus levissime pubescens, facie utriusque anguli sulcatâ. Stigma trilobum, in angulos styli decurrens. *Lindl.* In Africa orientali, in ins. *Mafmale*, circa *Mozambique*. 4.

5. *U. viride* *Gawl.*; corollis campanulato-cylindricis, pedunculatis; petalis exterioribus longissimis, filiformibus, recurvatis; foliis linearibus, canaliculatis, scapo longioribus. *Willd. Spec. pl.* II. 174. (sub *LACHENALIA viridi*, uti:) *H. kew. ed. 1. p. 462. ed. 2. II. p. 281. Thunb. prodr. p. 64.* *HYACINTHUS viridis* *Linn. Spec. p. 454. Lam. Enc. III. p. 191. Murr. Comment. gott. 1781. p. 44. t. 5. Jacq. ic. I. t. 66. Misc. II. p. 331. Houtt. Pfl. Syst. 2. p. 418. t. 84. f. 1. Redouté Lil. V. t. 203. ZUCCAGNIA viridis* *Thunb. nov. gen. pl. IX. Fl. cap. ed. Schult. p. 328. Willd. Enum. H. berol. p. 379. PHORMIUM viride* *Thunb. nov. gen. p. 5. DIPCADI viride* *Mönch Meth. Suppl. p. 267. DIPC. filamentosum* *Medic. in Ust. Ann. 2 St. p. 13.*

In spontanea apud *Thunberg* l. c : „rad. bulbosa, fibrillosa. Folia erecta, glabra, scapo paulo breviora, integra, setaceo-acuminata, $\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapus inferne teres, superne compressus, erectus, apice cernuus, glaber, simplex, spithamaeus. Flores racemosi, cernui, subsecundi, 4 pluresve in racemo cernuo. Pedunculi reflexi, $\frac{1}{2}$ lin., capillares. Bractea sub pedunculo solitaria, lanceolata, cuspidata, longitudine pedunculi. Corollae unguicularis lacinae exteriores duplo longiores, setaceo-caudatae, saepe reflexae. Caps. ovata, trilocularis.“ In culta: Bulbus oblongus, pyriformis, viridis, basi fibris aliquot crassis. Scapus ad basin racemi usque ped., viridis, apice reclinatus, glaucus, crassitie culmi triticei. Folia 3, stricta, succulenta, lineata, apice reclinata, vaginâ brevi marcescente amplexantia, scapo aequalia vel breviora. Racemus spithamaeus, 6-10-florus (et ultra), secundus. Flores remoti, summi abortientes. Pedunculi floribus quidquam breviores, (1-2 lin.) teretes, sub anthesi cernui, serius in latus oppositum versi et erecti. Bracteae setaceae, patentes, marcescentes, (pedunculis longiores, 3-6 lin.). Cor. saturate viridis, extrinsecus glauca, inodora; lacinae 3 exteriores in tubum cylindricum coalitae, ceterum lineares, primum patentes, dein reflexae, acumine subulato-carnoso, quidquam incurvato, florem totum superante (cum acumine 10 lin.); interiores ovatae, con-

cavae, patentes, apice brevi, obtuso. Stam. inclusa, basi laciniarum inserta; filam. compressa, pallida. Anth. oblongae, flavae, filamenta aequantes. Germen oblongum trigonum, trisulcum, viride. Stylus subteres. Stigma obtusum. *Murr.* In *Prom. b. spei.* 4.

Quid UROFETALUM crispum Burchell Mss. in Bot. Reg. ad t. 156.?

1410. PHORMIUM.

1. *Ph. tenax* Thunb. *Diss. nov. gen.* p. 94. *Forst. gen. n.* 24. *Prodr.* 155. *Cook it.* II. 96. c. icone. *Joh. Miller ic.* 2. *Linn. Suppl.* p. 204. *Willd. Spec.* II. p. 171. *Annal. d. Mus.* T. II. p. 228. 474. T. XIX. p. 401. t. 20. *Poir. Enc. Suppl.* IV. p. 398. *Thieb. d. Bern.* in *Mem. d. l. Soc. Linn. Par.* IV. p. 57. t. 7. *Rédout. Lil.* 448. 449. *Dict. Sc. natur.* 21 Cah. *Fortg. Gart. Mag.* II. t. 2. *CHLAMYDIA tenacissima* Gaertn. *fr.* 1. p. 31. t. 18. *LACHENALIA ramosa* Lam. *Enc.* III. p. 573.

Radix carnosae, tuberosae. Cespites magni, flabelliformes. Folia radicalia, numerosa, disticha, coriacea, firma, tenacia, lineari-lanceolata, acuta, carinata, basi canaliculata, equitantia, ad medium usque erecta, dein arcuato-reflexa, glabra, tenuissime striata, laete viridia, in flavum vergentia, subtus pallida, nervo medio prominente sanguineo, margine rubro, marcescentia flavescentia, 2-5 ped., 2-3½ poll. lata; ad basin cujusvis folii membrana lacera. Scapus 2-7 ped., basi 3 poll. in circuitu, teres vel quidquam compressus, superne paniculatus, nitidus, intense viridis; ramis alternis circiter 15, 12-15-floris; squamis alternis, appressis, fuscis, carinatis, margine cartilagineis, infimis apice foliaceis. Bractee ad ramos deciduae, lanceolatae, acutae, fusciscentes. Pedicelli 1-2-3, apice crassiores. Flores suberecti, intense flavi, basi virentes. Tubus melle repletus. Lacinae erectae, staminibus breviores: exteriores pallidiores, striis viridibus, ovato-lanceolatae, concavae, dorso carinatae, apice sphacelatae, breviores; interiores ovato-oblongae, obtusae, subpatentes. Stam. subincurva, alterna breviora, apice rubra. Antherae erectae, sagittatae, polline primum rubro, dein flavo. Styl. trigonus, longitudine staminum longiorum. Caps. oblonga, acuta, 3 gona, saepius torta, 3 poll., primum flavescenti-virens, serius intense fusca; valvulis coriaceis, extus fuscis. Sem. nigra, nitida, plana, margine membranacea, magnitudine seminis FRITILLARIAE imperialis, 5-7 lin. longa, 2-3 lin. lata. Variat floribus minoribus et majoribus, numerosioribus, flavis vel rubris; foliis longius petiolatis. „Incolae Nov. Zeelandiae ex hac planta lini speciem fabricant ex qua mulieres storeas pro variis vestimentis plectunt, in quem usum plures species Liliaceorum adhiberi possunt.“ *Linn. Suppl.* In *Nova Zeelandia et Norfolk-Island.* 4.

Obs. Hanc plantam omnium primus in Contiente Europae coluit divus vates Hymnorum ad Floram et Cererem, Carol. L. B. von der L. ßhe, Vindobonae in horto suo, ex quo in H. caes. Imperatricis. De cultura et usu hujus plantae vide, praeter *Böhmer techn. Gesch. d. Pfl.* 1. p. 548., *Edwards in Nouvelles Ann. d. Voy.* T. 29. p. 74. (ubi varietates 7), *Henry fils in Journ. d. Pharm.* 1816. Sept. p. 495., *Salisbury in Repert. of Arts.* 1825. March p. 233., *Gillet de Laumont in Bullet. d. l. Soc. d'Encouragem.* No. 214. p. 33., quos omnes in *Dingler Polytechn. Journal.* 1823-1827. invenies.

1411. EUCOMIS.

1. *Eu. punctata* Ait.; scapo cylindrico, (maculato); foliis oblongo-lanceolatis, canaliculatis, patentibus; comae foliis brevibus; racemis longissimis. *Ait. H. Kew.* ed. 1. p. 433. ed. 2. II. p. 246. *Willd. Spec.* II. p. 93. *Thunb. Fl. cap. ed. Schult.* p. 316. *Diss. nov. gen.* p. 122. *L'Herit. Sert. angl.* 18. *Bot. Mag.* 913. *Red. Lil.* t. 208. *Tratt. Thes.* t. 54. *E. punctata* α *Bot. Mag.* 1559. ASPHODELUS *comosus* Houtt. *Linn. Pfl. Syst.* II. p. 381. t. 83. ORNITHOGALUM *punctatum* Thunb. *Prodr.* 62. BASILAEA *punctata* Lam. *Ill.* t. 289. f. 2. *Jaume St. Hil. fam. nat.* 1. p. 129. *Poir. Enc.* II. p. 590. *Zuccagn. Röm. Coll.* p. 137. FRITILLARIA *punctata* *Syst. Veg. ed. Gmel.* 1. p. 545. β . fol. dorso purpureo striatis. *Gawl. Bot. Mag.* 1539. *Willd. Enum.* 364. *Eu. striata* Don *H. Cant.* 6. 86.

In spontanea apud Thunberg l. c.: „Fol. plurima, acuta, integra, erecto-patentia, margine purpurea et parum undata, subtus ultra medium purpureo-maculata. Scapus purpureo-maculatus, erectus, $1\frac{1}{2}$ ped.. Racemus subcylindricus. Coma racemo brevior, e foliis plurimis, lanceolatis, apice margineque purpurascens. Petala ovata, patentia, concava, albida, dorso apiceque virescentia. Filamenta basi dilatata, invicem et cum petalis connata. Stylus simplex, staminibus paulo longior. Germen sulcatum, purpurascens, striis albis. Odor gravis, subingratus.“ In culta α . Bulbus subovatus, basi fibris albidis. Folia 5-6 divaricato-patentia, (vix) pedalia et ultra; racemus 6-8 poll.; pedicelli virides, corollâ paulo longiores; bracteae violaceae, concavae, $\frac{1}{2}$ poll., longitudine pedicellorum. Cor. rotata, ad tubum usque fissa, viridis, extus dorso purpurascens; lacinae interiores magis albidae. Filamenta corollâ breviora, divergentia, subincurva, primum albida, serius viridia, uti antherae. Germen viride, apice radiis 6, latis, purpureis. Stylus curvatus. In β caulis interdum fere 3-ped., laete viridis, infra flores interrupte purpureo-striatus. Folia 6-9 acuminata, undulata, $\frac{1}{2}$ -1-ped., 1- $1\frac{1}{2}$ poll. lata, supra laete viridia. Bracteae ovatae, obtusiusculae, pedicellis duplo breviores, laete virides, apicem versus dense purpurâ striatae. Pedicelli pollicares, virides, hinc purpurascens. Cor. ex albo virens, laciniis obtusis, ultra $\frac{1}{3}$ poll., 2-3 lin. latis. Filamenta concoloria; laciniis paulo breviora, antheris flavis. Germen purpureum. Comae foliola radicalibus similia, sed multo minora, pollicaria, 6 lin. lata, purpurâ marginata. *Gawl. In Pro-mont. b. spei.* 4.

2. *Eu. undulata* Ait.; scapo cylindrico; foliis ovato-oblongis, undulatis, patentibus: comae foliis longitudine fere racemi (spicati). *Ait. H. Kew.* ed. 1. p. 433. ed. 2. II. p. 246. *Willd. Spec.* II. p. 93. *Thunb. Fl. cap. ed. Schult.* p. 317. *Diss. nov. gen.* p. 122. *Bot. Mag.* 1083. *Tratt. Tabular.* t. 719. *Thesaur.* t. 53. *Eucomis regia* *L'Herit. sert. angl.* 17. (excl. *Dill.* et *Linn.* fid. *Gawl.*) *Rédout. Lil.*

t. 175. (excl. syn. *Dill. Linn. Mill. et Hort. Kew. monente Gawl. fide H. Kew. ed. 2. l. c.*) *Euc. regia* β *Mart. Mill. Dict.* *ORNITHOGALUM undulatum Thunb. Fl. cap. prodr. 62.* *FRITILLARIA longifolia Hill. H. Kew. 354. t. 15. Vitm. Summ. plant. II. p. 299.* *FRITILL. autumnalis Mill. Dict. 8. n. 10.* *BASILAEA coronata Lam. Enc. 1. 382.*

„Folia sessilia, acuta, scapo longiora, spithamaea et ultra. Scapus glaber, spithamaeus. Flores comosi, racemosi, plurimi virescentes. Pedunculi flore paulo breviores, cernui. Coma polyphylla: foliis lanceolatis, acutis, tenuissime undulatis, longitudine racemi. Cor. virescens, marginibus albidis.“ *Thunb. Cultae in Bot. Mag.* „bulbus ovatus, imbricato-tunicatus; tunicis crassis, carnosis, rhizomate cylindrico, crassissimo, basi truncato-complanato. Folia divaricato-potentia, radiata, obsolete nervoso-lineata, recurvatim reclinata, cartilagineo-crenulata, carinata, angustiora et longiora, quam in *regia*, magis acuminata, basi non adeo attenuata, pedalia, 1-1½ poll. lata. Scapus centralis, cylindricus, non attenuatus. Folia comae radicalibus similia, sed multoties minora. Bractee floribus breviores. Cor. subnutans, flavido-virens, rotato-patens, basi turbinato-contracta: lacinae aequales, ovali-oblongae. Filamenta inferne membranulâ tenui connata, incurvo-potentia. Stylus longitudine staminum, uncinato-incurvus. Capsula subrotundo-trigona, angulis sulcatis. Semina multa, 9 in singulo loculo.“ *In Prom. b. spei. 4.*

3. *Euc. regia Ait. Kew.*; scapo cylindrico; foliis linguiformibus, obtusis, humo appressis. *Ait. Kew. ed. 1. p. 433. 2. p. 245. Willd. Spec. II. p. 93.* (excl. in utroque synonymo *Dillen.*)

In Prom. b. spei. 4.

Obs. *Euc. regiam H. Kew.* esse distinctam ab *E. nana*, (ad quam spectat *Dillen* in *H. Kew.*) magisque *undulatae* affinem monet *Gawler* ex *Herb. Banks* ad *E. nanam*, cui forte mera varietas foliis latioribus, obtusioribus, planioribus.

4. **Euc. nana Ait.*; scapo clavato; (floribus sessilibus); foliis lato-lanceolatis, acutis, (diffusis.) *Ait. Kew. ed. 1. p. 432. ed. 2. II. p. 245. Jacq. Coll. 4. p. 213. H. Schönbr. I. t. 92. Willd. Spec. II. p. 92.* (excl. syn. *FRITILLARIAE nanae Burm. et Linn.*, monente *Gawler*). *Thunb. Fl. cap. ed. Schult. p. 316.* (excl. syn. *Linn.*) *L'Herit. Sert. Angl. 17. Bot. Mag. 1495. Tratt. Tabul. 795.* *FRITILLARIA regia Burm. Cap. 9. Linn. Spec. p. 435. Mill. ed. 8. n. 9.* *ORNITHOGALUM nanum Thunb. prodr. 62.* *BASILAEA nana Poir. Enc. Suppl. 1. p. 590.* *Zuccagni in Röm. Coll. 136.* *ASPHODELUS comosus Hortul. Corona regalis. Dill. Elth. 109. t. 92. f. 108. t. 95. f. 109.*

Bulbus tunicatus magnitudine *Rapae* majoris. Folia radicalia circiter 5, obovato-oblonga, diffusa, acuta, inferne attenuata, nervosa, glabra, palm. lata, spithamaea et ultra. Scapus erectus, inferne attenuatus, albus, medio valde incrassatus, viridis, glaber, palmaris, apice comoso-foliosus. Coma polyphylla; foliola

lanceolato-oblonga, nervosa, glabra, concaviuscula, patula, integra, $1\frac{1}{2}$ poll.. Flores sub coma verticillati, sessiles, plurimi. Bractea sub singulo flore ovata, basi lata, acuta, concava, flore paulo brevior. Cor. viridis; petala oblonga, obtusa, concava, erecta, semiunguicularia. Filamenta subulata, inferne dilatata et petalorum basi invicemque connata, incurva, albida, longitudine fere petalorum. Antherae ovatae, erectae, flavae. Stylus subulatus, inflexus, viridis, lin. longus, persistens. Stigma acutum. Caps. 3-angularis, profunde 3-sulcata, retusa, inflata, angulis obtusis, glabra, corollâ major, viridis. Semina in fundo loculamenti singuli 1-3, ovato-globosa, glabra, immatura alba, matura nigra, magnitudine Milii. Nectarium nullum, nisi foveae inter basin staminum et petala, ubi connata sunt. *Thunb.* In culta: bulbus ovatus, extus fuscus, magnitudine pugni, fibris albis crassis. Folia radicalia 7-10, obtusula, crassula, margine cartilagineo-denticulata, utrinque sub lente minutissime punctata, basi adscendentia et parumper canaliculata, dein in orbem expansa, 6-8 unc., 2 unc. lata, nervo medio subtus prominente. Scapus in extimo folio axillaris, infra folia poll. fere crassus, $\frac{1}{2}$ ped., nitidus. Flores foetiduli, sessiles, densi. Bracteae inferiores ovatae et florum longitudine, superiores lanceolatae, longiores, margine cartilagineo-denticulatae, virides, patentibus; summae comosae, longiores. Cor. campanulata, foliolis aequalibus, planis, superne patentiusculis. Stylus longitudine staminum. *Jacq.* In *Prom. b. spei*, in rupibus *Roggeveld*, in *Hantum et alibi*. 4.

5. *Eu. purpureo-caulis Andr.*; scapo clavato; foliis multifariis, expansis, orbiculato-spathulatis. *Andrew's Repos.* 369. *Hort. Kew. ed. 2. II. p. 245.* *Trattinn. Thes. t. 55.*

Folia lata, crassiuscula, plura, radicalia; scapus crassus, livido-purpureus. Flores majusculi, pauci, virides. Coma parva, tenuis; foliolis roseo-marginatis. *Tratt.* In *Prom. b. spei*. 4. *Masson.* 4.

6. *Eu. bifolia Jacq.*; scapo clavato; foliis geminis lanceolato-ovatis, acutis, humo appressis; (bracteis acuminatis; floribus erectis.) *Jacq. Collect. IV. p. 215. Ic. rar. t. 449. Trattinn. Thes. t. 56. Willd. Spec. II. p. 92. Bot. Mag. 840, quo teste: FRITILLARIA nana Burm. Cap. 9. Linn. Mant. 223. (a Willdenow ad E. nanam ducta). MELANTHIUM massoniaefolium Bot. Repos. t. 368. (germinis fig. mala.) BASILAEA bifolia Poir. Enc. Suppl. 1. p. 591.*

Bulbus subrotundus, depressus, tunicis crassis, carnosus, extus fuscus, 2-fere unc. in diametro. Folia opposita, basi vaginantia et mutuo amplexantia, hinc concava, dein plana, glabra, carnosula, obscure longitudinaliter lineata, ad lentem utrinque punctulata, facie profunde, dorso pallide virentia, 7 unc., 3 unc. lata. Scapus centralis, erectus, $\frac{1}{2}$ ped., e basi gracili in digiti crassitiem clavatus, hinc spicatus. Pedunculi e bractearum alis solitarii, 1-flori, breves, crassi, pallidi. Bracteae ovatae, sessiles, basi concavae, patulae, virides, unc.. Cor. cum virore pallens. Petala oblonga, acutula, parum concava, patentissima, alterna paulo angustiora. Filamenta albida, subulata, basi latiore

tiore connata, erecta, versus stylum arcuata, longitudine corollae; antherae flavescentes. Stylus subulatus, erectus, staminibus brevior. Stigma simplex. Germen virens. *Jacq.*. Folia 4-6 poll., 3 poll. lata. Racemus subspicatus, multiflorus, bracteato-foliosus, subcomosus. Cor. turbinata, incurva, staminibus brevior. Stylus apice uncinatus. Germen turbinatum, alato-triquetrum, apice rubellum. *Gawl.* *Illo. de Schlechtendal* sui generis videtur. *In Prom. b. spei.* 4.

1412. M I L L A.

1. *M. biflora Cavan. ic. t. II. p. 76. t. 196. Pers.*
Syn. I. p. 355. MILLEA biflora Willd. Spec. II. p. 62.

Radix tuberosa, rufa; basi tuberibus oblongis fasciculatis fibrillosis. Folia radicalia, ped. et ultra, subulata, interne quidquam canaliculata, scapis saepius longiora, glabra. Scapi vix ped., teretes, duriusculi, semper fere furcati et biflori; ad bifurcationem bracteolis 5 brevibus, acutis, marcescentibus. Pedunculi magnâ parte corollae tubo vestiti, 5-poll., sensim crassiores. Cor. candida, infundibuliformis; tubus oblongus, rectus, sensim amplior; faux pervia, limbus patentissimus; lacinae ovatae, inferne lineâ viridi; alternae angustiores appendiculo brevi uncinato; corolla post fecundationem marcescit, erectis laciniis sibimet appressis. Filamenta vix ulla; antherae oblongae, erecto-conniventes, subsessiles, laciniis oppositae. Germen trigonum, tubo inclusum, viride. Stylus filiformis, exsertus, sensim incrassatus; stigmata globulosa, pilis crassis brevibus, numerosis, albicantibus. Caps. oblongo-triangularis, acuta. Sem. ovato-acuta, nigra, inaequaliter pressa. *Cav.* *In Mexico.* 4.

1413. P O L I A N T H E S.

1. **P. tuberosa*; foliis linearibus; scapo spicato; laciniis limbi ovatis. *Linn. Spec. p. 455. Willd. Sp. pl. II. p. 164. Lam. Enc. meth. VIII. p. 129. Lour. Fl. Coch. 1. p. 244. Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. 66. Salisb. in Trans. Hort. Soc. 1. p. 41. t. 2. Redout. Lil. 147. Bot. Reg. 63. Bot. Mag. 1817. Kniph. Cent. 2. 76. Knorr Del. 1. t. T. 12. Rudb. Elys. 2. p. 59. f. 4. Swert. Floril. t. 14. f. 1. Park. Theatr. t. 23. par. t. 113. f. 1. 2. Moris. Hist. 2. p. 376. s. 4. t. 12. f. ult. Amica nocturna Rumph Amb. V. p. 285. t. 98. β Rudb. Elys. 2. p. 59. f. 2. Clus. hist. 1. p. 176. Gerard. Emac. 115. f. 16. Swert. Floril. t. 14. f. 2. Moris. Hist. 2. p. 376. s. 4. t. 12. f. 22.*

? flore pleno. — δ foliis variegatis.

Rad. tuberculum oblongum v. subglobosum, fuscescens, subtus fibris carnosus. Scapus erectus, simplex, 2-5-ped., vix crassitie digiti, squamosus: squamis foliaceis. Folia radicalia numerosa, anguste lineari-lanceolata, inferiora subensiformia acutissima, leviter striata, pallide viridia, punctis basi purpureis, 10-18 poll., $\frac{1}{2}$ -1 poll. lata: superiora breviora, alterna, in squamas abeuntia. In spontanea in Amboina folia ulnam longa, in Cochinchina jam vix pedalia. Flores subsessiles, in spica longa

laxa, bractea brevi suffulti, alterni, saepius gemini, 2-2½ poll., albi, fragrantissimi, tubo striato, subincurvo, laciniis recurvo-horizontalibus subaequalibus obtusis fere duplo longiore. Stamina limbo breviora. Antherae lineares, virescentes, filamentis longiores. Stylus longitudine fere tubi, triqueter, albus, stigmatibus parum divergentibus. *Simon de Tovar* Seville anno 1594. Culturam vide in *Allg. Gart. Mag.* 1807. p. 93. e *Salisbury* in *Trans. Hort. Soc.* I. p. 41.; in *Fortges. Gart. Mag.* v. VII. p. 217. et in *Emerton's Treatise on the Culture and management of the Auricula, Polianthes, Carnation with figures.* New edit. 1822. In *India orientali, Java, Zeylona; in Ind. occid., Mexico, ex Hern. Mex.* 277.: *Salisbury.* In *Peruvia tantum culta.* 4.

2. *P. gracilis Link;* foliis linearibus; scapo racemoso; laciniis limbi linearibus. *Link Enum.* 1. p. 330. *Link et Otto Abbild. auserl. Gew.* t. 24.

Folia radicalia linearia, carinata, integerrima, glaberrima, longissima, laxa. Scapus 3 ped. et ultra, basi foliosus, superne vaginis brevibus, simplex, teres, glaber. Flores spicati, sessiles, subinde bini. Bractee ovatae, acutiusculae. Cor. infundibuliformis, alba, tubo incurvo 1 poll. 10 lin.; limbo 6 lin.; laciniis 2 lin. latis, acutis. Stam. corollae adnata; antherae in fauce. Germ. oblongum. Stylus tubo paulo brevior. Stigma tripartitum. *P. tuberosae* valde affinis, sed differt corollâ longiore, tenuiore, toto habitu graciliore nec non odore debiliore. An spontaneae propior ac praecedens, per longum tempus in hortis culta? *Link.* In *Brasilia. Sello.* 4.

Obs. POLIANTHES pygmaea Jacq. est MASSONIA ensifolia.

1414. A L E T R I S.

1. **A. farinosa;* floribus pedicellatis, oblongo-tubulosis; corollis fructiferis laeviusculis, farinosis; foliis lato-lanceolatis, mucronatis. *Mich. Fl. bor. am.* 1. p. 189. (sub *A. alba*, uti *Pursh Fl. Sept. Am.* 1. p. 225.) *A. acaulis;* fol. lanceolatis, membranaceis; floribus alternis. *Linn. Spec.* p. 456. *Amön. ac.* 3. p. 11. *Willd. Spec.* 2. p. 183. *Lam. Enc. meth.* 1 p. 78. *Mill. Dict.* ed. 8. n. 1. *H. Kew,* ed. 2. II. p. 290. (excl. syn. *WURMBEAE bullatae Willd.*) *Elliott Sketch* 1. p. 318. *Torrey Fl. N. M. U. St.* p. 344. *Bigel. Am. B.* t. 50. *Gron. Virg.* 38. *Pluk. Amalth.* 119. t. 437. f. 2.

Flores albi in spica longa. *Pursh.* Folia radicalia, laevia, membranacea. Scapus nudus, sat longus, spicâ terminatus. Flores parvi, alterni, farinosi. *Lam. Rad. praemorsa.* Folia omnia fere radicalia, stellatim vel erecto-patentia, lanceolata, utrinque attenuata, apice acuta, mucronata, obsolete 3-5 nervia, glabra, flavescenti-viridia, basi striatâ margine membranaceâ pallidiora, 3-6-poll., 4-6 lin. lata. Scapus strictus, teres, striatus, tenuissime scabriusculus, flavescenti-viridis, 1½-2 ped.; foliolis raris sparsis, appressis, lineari-lanceolatis, acuminatis, 5-6 lin., superioribus remotioribus parvis. Racemus spiciformis, erectus, ante anthesin apice inflexus, 4-6 poll. Pedunculi angulosi, ½

lin., lepidoti, floriferi patentés, primum erecti; basi bracteis solitariis vel geminis, lineari-subulatis, dimidium corollae aequantibus, 2 lin.; alterà minori. Cor. ovato-urceolata, apice subcampanulata, alba, sicca flavescens, 3 lin., 1½ lin. in diametro, extus rugoso-lepidota; laciniis ovato-lanceolatis, acutis, erecto-patentibus: alternis paulo angustioribus. Stam. corollà breviora; filamenta basi laciniarum inserta, erecta, subulata; antherae longitudine fere filamentorum, oblongae, acutae, flavae. Germen oblongum. Stylus germine longior, stamina aequans, superne attenuatus. Stigmata 3 obtusa. Semina numerosa, minuta, oblonga, utrinque acuta, flava, longitudinaliter striata. *Torr. et ad spec. spontanea. In America septentrionali a Nova Anglia ad Carolinam. 4.*

Obs. Clm. *Leconte* plures cum *A. farinosa* confusas species distinxisse monet *Nuttall nov. gen. I. p. 218.*

2. *A. aurea Walt.*; floribus subsessilibus, breviter tubulatis, subcampanulatis; corollis fructiferis rugosis, scaberrimis; foliis lanceolato-ensiformibus, acutis. *Mich. Fl. Am. bor. 1. p. 190. Pursh Fl. Am. sept. I. p. 225. Torrey Fl. N. M. U. St. p. 345. Walt. Fl. carol. 121. Poir. Enc. meth. Suppl. 1. p. 289. WURMBEA bullata*; racemo multifloro; corollis ovatis, rugosis; laciniis limbi rectis brevissimis. *Willd. H. Berol. t. 8. Mag. II. p. 25. (fid. Pursh et Torr.) Pluk. Alm. 135. t. 174. f. 5. Moris. Hist. 3. p. 606. V. 15. t. 2. f. 1. (uterque fid. Mich. et Willd.)*

Rad. magna, praemorsa. Scapus 2-3-ped.. Spica magis pauciflora, quam in *alba*. Pedicelli brevissimi, bracteis flore dimidio brevioribus. Capsula uti in *alba*. Vix a *farinosa* distincta. *Torrey l. c.* Flores farinosi, laciniis aureo terminatis. Styli subflorescentia conglutinati, fructu maturo divisi. *Pursh.* Folia radicalia, lanceolata, acutissima. Caulis erectus, foliolis parvis alternis squamaeformibus. Flores alterni, fere sessiles, spicati. Cor. aurea, ante aperturam bullata, quidquam pubescens, persistens. *Poir.* In culta apud *Willden.*: rad. subcarnosa, fibrosa. Folia numerosa striata, glabra, patentia. Scapus simplicissimus, 1½ ped., teres, glaber, foliis lineari-subulatis, alternis, remotis, sensim minoribus. Racemus 2-3 poll.. Pedunculi 1-flori; bractea subulata bifida vel potius appendiculata. Cor. ovata, transversim rugosa: dentibus oblongis, acutis, rectis. Filam. subulata, brevissima, fauci corollae inserta, decurrentia. Antherae oblongae. Germen ovatum, 6-partibile. Styli 3 subulati, bipartibiles. Stigmata simplicia. *In arenosis sylvaticis a Nova Caesarea ad Carolinam meridionalem. 4.*

Obs. Descriptio *A. farinosae* in *Bot. Mag. 1418*, (eius icon a *Pursh* et *Torrey* ad *A. farinosam* laudatur), potius ad *A. auream* pertinere videtur — Et *Mich. et Willd.* laudant *Moris. et Pluk.* a *Linu. et Willd.* (in *Sp. Pl. 2. p. 273.*) ad *HELON. bullatam* citatos, quos jam *Lam.* in *Enc. meth. 3. p. 100.* vix ad *HELON. bullatam* spectare dixit. *Pursh* sub *A. aurea Mich.* laudat *WURMBEA bullatam Willd.* et synonymon *Pluk.* iterum ad *HELON. bullatam s. latifoliam Mich.* refert. *Dryander et Aiton et Link Enum. 1. p. 333. WURMB. bullatam Willd.* ad *A. farinosam* citant: his ad sentit *Gawl.* in *Bot. Mag.*, qui tamen *Pluk. et Moris.* excludit tanquam ad *A. auream* spectantes. Figura a *Moris.* data, quamvis plantam *Willdenowianam* male repraesentet, nobis tamen hac potius, quam ad *HELON. bullatam* pertinere videtur.

3. *A. japonica Lamb.*; erecta; foliis ensiformibus, fal-

catis, glabris; floribus spicatis. *Lamb. Linn. Soc. Trans. X. p. 407.* *A. farinosa Thunb. Linn. Trans. II. p. 354.* *Hypoxis spicata Thunb. Jap. p. 156.* *Lam. Enc. meth. 3. p. 183.*

Radix fibrosa, fibris capillaribus fasciculatis. Folia radicalia, plurima, subfalcata, integra, trinervia, scapo breviora, spithamaea. Scapus filiformis, subangulatus, flexuosus, erectus, villosus, ped. Flores e medio scapo ad summitatem spicati, alterni, remoti, plurimi. Capsula rhachisque valde hirsutae. *Thunb.. In Nipon, inter Miaco et Quana. 4.*

1415. V E L T H E I M I A.

1. * *V. viridifolia Jacq.*; foliis lanceolatis, plicato-undulatis, obtusis; corollae limbi dentibus rotundatis, rectis. *Willd. Spec. II. p. 181.* *Ait. h. Kew. ed. 2. II. p. 289.* *Jacq. H. Schönbr. 1. p. 41. t. 78.* *Fortges. Allg. Gart. Mag. V. p. 97.* *V. capensis Red. Lil. t. 193.* *Thunb. prodr. p. 60.* *Fl. cap. ed. Schult. p. 309.* *Poir. in Enc. meth. VIII. p. 449.* *Gleditsch Act. berol. 1769. p. 66.* *V. undulata Mönch Meth. p. 631.* ALETRIS *capensis*; acaulis, fol. lanceolatis, undulatis; spicâ ovatâ; floribus nutantibus. *Linn. Spec. 456.* *Mant. p. 367. (excl. Buxb.) Act. Holm. 1770. p. 229. t. 5.* *Mill. Dict. 8. n. 2.* *Lam. Enc. 1. p. 78.* *Bot. Mag. 501.* *Pluk. Alm. 187. t. 195. f. 6? (fid. Lam.)*

„Folia radicalia, obovato-oblonga, inferne attenuata, glabra. Scapus teres, erectus, pedalis, apice subinde nutans. Racemus spithamaeus. Pedunculi capillares, $\frac{1}{2}$ lin. Flores nutantes s. reflexi. Cor. cylindrica, obtusae, flavae (?), poll. Bractea lanceolato-subulatae, sanguineae.“ *Thunb..* „Bulbus tunicatus, violaceus. Folia radicalia 6, lato-lanceolata, undulata, violaceo-maculata. Scapus foliis altior, violaceo-maculatus. Spica s. racemus terminalis, imbricatus floribus numerosissimis, brevissime pedunculatis, cernuis; bracteis propriis setaceis. Cor. subcylindrica punctis carneis, limbo brevissimo, obtuso. Stamina filamentis longitudinaliter limbum usque adnata. Germen in fundo clauso corollae. Stylus incurvatus. Stigma obtusum. Caps. subinflata, ovato-triquetra, acute carinata, angulis compressis, magna. *Linn. Mant..* Bulbus crassitie pugni, subrotundo-ovatus, tunicatus, flavo pallens vel violaceo-fuscescens, basi tubere rotundato protuberante, fibris crassis albis obsito. Folia plura, (6-8), obtusa cum mucrone parvo, basi crassa et canaliculata, amplexantia, saturate viridia, (rarius quidquam maculata), patula, 9 unc. (- $1\frac{1}{2}$ ped.), 2-3 unc. fere lata. Scapus centralis, firmus, solidus, ex fusco viridique maculatus, (maculis purpureis violaceisque), 1- $1\frac{1}{2}$ ped., crassitie digiti. Spica densa, ovata, 1-3 poll. erecta. Pedicelli uniflori, ($1\frac{1}{2}$ -5 lin.) virides, teretes. Bractea solitariae, e basi lata sessili angustatae, lineares, conniventes, rubellae, (punctatae,) fere unc., alia brevior ad latus. Flores foetiduli, $1\frac{1}{2}$ -2 unc., (2-3 lin. diam.) ante expansionem erecti, serius penduli, summi steriles, ex carneo rubelli (rubelli albide vel flavescenti-punctati, dentibus virentibus). Cor. tubus longissimus, incurvulus; limbus brevis: laciniis subrotundis obtusis, aequalibus, patulis. Filamenta ad medium tubo accreta, dein decli-

nata, corollâ paulo longiora, (rubella). Antherae oblongae, flavo-virentes, (polline luteo). Germen ovato-oblongum triquetrum. Stylus subulatus, declinatus, stamina aequans (demum superans). Stigmâ simplex. Caps. oblonga, in alas 3 planas semipellucidas excurrentes, pallida. Sem. pauca, obovata, obtusa, valvularum axi affixa, nigra. *Jacq.* In *Prom. b. spei, Uitenhagen* etc. 4.

Obs. *Orchis hyacinthoides*, fol. caule floribusque maculatis, *Burb. Cent III.* p. 12. t. 20., forte et 19. (a *Linneé Mant.* huc ducta), minime hujus loci, sed ad *LACHENALIAS* spectat. De germinatione vide *Mirb. Annal. Mus. XIII.* p. 76. t. 3. f. 29.

2. *V. glauca Jacq.*; foliis lanceolatis, glaucis, margine subcrispatis: apice mucronato; limbo patenti. *Willd. Sp. Pl.* 2. p. 182. *Ait. H. Kew.* ed. 2. II. p. 289. *Jacq. H. Schönbr.* 1. p. 40. t. 77. *Bot. Mag.* 1091. *Red. Lil.* 440. *Gart. Mag.* 1811. p. 126. t. 14. *ALETIS glauca H. Kew.* ed. 1. I. p. 463. *Mart. Mill. Dict.*

Differt a *V. viridifolia* foliis glaucis, vix undulatis. Limbus corollae patens, laciniis longioribus quam in *viridifolia*, obtusis quidem, sed non rotundis, ut in illa. Flores minores, angustiores. *Ait.* Bulbus oblongo-ovatus, pyramidalis (fuscus, 3 poll. et ultra) superne imbricatus, rhizomate inferne prominente fere crassitie bulbi, fibris carnosis albis simplicibus. Folia circiter 7, lorata, lanceolato-oblonga (acuta obtusaque), subundata, lineis remotiusculis depresso-nervosis, glauca, erecto-divergentia, basin versus convoluto-vaginantia, costâ mediâ subcarinatâ; interiora longiora, (8 circiter pollic.). Scapus teres, longitudine foliorum v. paulo longior, viridis, inferne dense rubro-punctatus. Racemus spicatus, multiflorus, densus, reflexo-imbricatus, oblongus, (3-4 poll.) plerumque comâ bractearum sterilium. Bracteae membranaceae, convoluto-concavae, subulatae, pedicellis brevissimis filiformibus rubris longiores, (altera duplo longior, altera eum aequans) flore breviores. Corollae cernuae, albidae, (carneae) punctis rubris, 1-1½ poll., subclavato-tubulosae, medio subgibboso-ampliatae et quidquam curvatae; limbi lacinae breves ovatae, obtusae, paululum attenuatae, interiorum apices inflexi, exteriorum latiorum et breviorum recurvo-patentes. Filamenta filiformi-subulata, tubo ad medium usque adnata, inclusa, altera paulo breviora. Antherae minutae, sagittato-ovatae, basi limbi aequales, (flavo-virentes, polline flavo.) Germen viride, oblongo-ovale, hexagono-sulcatum. Stylus germine duplo longior, filamentis paulo longior, triquetro-subulatus, sursum tortus, uncinato-flexus. Stigma mera cuspis. *Gawl.* Capsula alis 3 magnis, membranaceis, loculis dispermis. *Red.* In *Prom. b. spei*; in arenosis saxosis *Saldanhabay.* 4.

1416. TRITOMANTHE.

1. **T. Uvaria Link*; foliis margine carinâque spinuloso-serratis; spicâ ovali, cylindricâ; corollâ clavato-cylindricâ. *Link. Enum.* 1. p. 335. *TRITOMA Uvaria Gawl. Bot. Mag.* 758. *Ait. H. Kew.* ed. 2. II. p. 290. *TR.* foliis scapo brevioribus, rigidis etc. *Red. Lil.* 291. *ALOË Uvaria*; floribus sessilibus, reflexis, imbricatis, prismaticis. *Linn. Spec.* p. 450.

Mill. Dict. ed. 8. n. 25. Kniph. Cent. IX. n. 5. Knorr. Delic. 1. A. 13. ALOË longifolia Lam. Enc. meth. 1. p. 90. ALETRIS Uvaria Linn. Mant. p. 508. S. V. 277. Ait. H. Kew. 1. p. 464. VELTHEIMIA Uvaria; scapo longiore foliis ensiformibus, carinatis. Willd. Spec. II. p. 182. Poir. in Lam. Enc. VIII. p. 449. Thunb. Fl. cap. ed. Schult. p. 509. Jacq. Fragm. 7. t. 4. f. 9. VELTHEIMIA speciosa; scapo foliis longiore; foliis ensiformibus, carinatis, margine carinâque serrulatis. Roth nov. pl. spec. p. 490. KNIPHOFIA aloides Mönch Meth. p. 631. Seb. thes. 1. p. 29. t. 19. f. 5.? Weinm. Phyt. ic. 45. a.

„Folia radicalia valde attenuata, supra canaliculata, striata, glabra. Scapus teres, erectus, 1-2 ped. et ultra. Spica floribus reflexis; bracteae lanceolatae, membranaceae, albidae. Corollae cylindricae, aurantiacae, obtusae, poll.“ *Thunb.* Radices fasciculatae, plurimae, longae, pallidae, (luteae), crassitie calami et ultra. Folia radicalia plurima, ensiformia, acute carinata, acuminata, ad oras scabra, caeterum glabra, 4 ped. et ultra, (basi 1¹/₂ poll. lata) debilia. Scapus centralis, glaber, firmus, 3 ped. (et ultra), crassitie digiti. Racemus spiciformis densissimus, erectus, ped.. Flores breviter pedicellati, numerosissimi, imbricati; adhucdum clausi rubri et patentissimi, expansi flavi, penduli, foetidi. Spathae vagae et ad pedunculos. Cor. unc., succo melleo plena, tubulosa, basi subglobosa, supra hanc incurva, limbum versus ampliata; limbi lacinae semiovatae, rotundatae, concavae, brevissimae, erectae. Filamenta subulata, erecta, corollae ventri accumbentia, eadem multo longiora, flava. Antherae oblongae, subincumbentes, flavescentes. Germen ovato-pyramidale, triquetrum, flavescens. Stylus filiformis, staminibus paulo longior, inferne virens, superne flavens. Stigma trifidum. Caps. ovato-acuta, triquetra, minime alata, glabra, fusca. Sem. solitaria, nigra, nitida. Pedunculi in fructu erecti. *Jacq.* Folia perennantia, erecta, viridia. Scapus 24-40 poll., (fusco-purpureus, *Gawl.*). Pedicelli crassi, arcuati, 2 lin., basi bractea lanceolata, eosdem superante, (fusca). Cor. basi crocea (vel sordide viridiflava) apice coccinea, (lin. 6 longitudinalibus). Stam. inaequalia. Germen viride ovatum. Stylus staminibus brevior. *Red. In Prom. b. spei; in Duyvelsberg etc. 4.*

Obs. Cls. *Roth*, cui ex differentia diagnosi subscripta *Ta. media* videtur *Uvaria*, recte monet *Commel. Hort. II. p. 29. t. 15.* neque ad hanc neque ad *mediam* spectare. Dubitavit jam olim *Redouté*.

2. *T. media Link*; foliis glaucis, margine carinâque laevibus; (spicâ oblongâ, pyramidatâ); corollâ clavato-cylindricâ: (crenis patulis.) *Link Enum. 1. p. 355. Tritoma media Ait. H. Kew. ed. 2. p. 290. Bot. Mag. 744. Redout. Lil. 161. ALETRIS sarmentosa; acaulis; fol. ensiformibus, laxis; floribus spicatis, suave rubentibus; radicibus sarmentosis. Bot. Repos. 54. VELTHEIMIA repens Ejusd. Recens. 18. 65. VELTH. sarmentosa; scapo longiore foliis lineari-lanceolatis, canaliculatis, flaccidis; radice repente. Willd. H. Berol. p. 380. V. media Donn H. Cantab.*

Differt a *T. Uvaria*: foliis minoribus, glaucis, angulis carinâque non aculeato-serratis; a *pumila* foliis majoribus, non adeo linearibus, corollâ non cyathiformi-campanulatâ, longiore. *T. pumila* multo major, *T. Uvaria* minor. *Gawl.* Rad. fasciculata e fibris teretibus, simplicibus, flavescentibus, divergentibus, repentibus. Folia plura, angusta, flaccida, quidquam pendula, carinata, acuta, glabra, scapo $\frac{1}{3}$ longiora, 22 poll., basi $4\frac{1}{2}$ -9 lin. lata. Scapus erectus, firmus, teres, 15 poll., glaucescens, (foliis altior, $1\frac{1}{2}$ -3-ped., subviolaceus). Racemus simplex, densus, primum conicus, dein cylindricus. Pedicelli breves, teretes, primum erecti, sub florescentia horizontales (pendulive), serius iterum erecti. Bracteae membranaceae, lanceolatae, acutissimae, pedunculos superantes, floribus dimidio breviores, (violaceae). Flores pallide flavi in aurantiacum vergentes, (hyeme pallide flavi, vere lacte rubri). Perigonium tubulosum, 9 lin.; dentes obtusi, rotundati, subaequales. Stamina fundo floris inserta, perigonio non adhaerentia, eodem longiora; filamenta flavescentia, subulata, exserta; antherae ovaes, flavo-aurantiacae. Germen flavescens, subtrigonum. Stylus flavescens, (viridis), filiformis, erectus, perigonio brevior. Stigma simplex. Caps. ovalis, acuta, obtuse triangularis. Semina triangularia vel irregulariter angulosa, angulo interno valvularum adhaerentia. *Red.* In *Prom. b. spei*, 4.

3. *T. pumila Link*; foliis (distichis) margine carinâque scabris; (spicâ oblongâ, confertâ); corollis inferne cylindricis, superne subglobosis. *Link Enum.* 1. p. 33. *TRITOMA pumila Ait. H. Kew. ed. 2. p. 290. Bot. Mag. 764. Loddig. Bot. Cab. 444. ALETRIS pumila Ait. H. Kew. 1. p. 464. VELTHEIMIA pumila*; scapo breviora foliis linearibus, acute carinatis. *Willd. Sp. Pl. 2. p. 182. Mart. Mill. Dict. V. abyssinica Redout. Lil. t. 184. Vel. d. Mus. d'hist. nat. 3. 55.*

Differt a praecedentibus: foliis distichis vel oppositis corollisque brevibus campanulato-cyathiformibus; a *media* foliis non glaucis; ab *Uvaria* staturâ minore. Folia margine carinâque minutissime serrulato-scabrida, $\frac{1}{2}$ poll. et ultra lata. Scapus nigro cinereoque variegatus. Bracteae glaucescentes. Cor. $\frac{1}{2}$ poll., miniato flava. Filamenta corollâ duplo longiora, sanguinea, antheris flavis, basi puncto atro notatis. *Gawl.* In *Prom. b. spei*; in *Abyssinia*: *Bruce sec. Redouté.* 4.

1417. A L O E. *)

A. *Parviflorae* (APICRAE *Willd.* HAWORTHIAE *Haw.*)

a. *Corollis bilabiatis.* APICRAE.

a. *Acaules vel subacaules.*

a. *Foliis integerrimis, (vel subintegris):*

1. * *A. retusa*; foliis quinquefariis, apice retuso-deltoidi-

*) Sequimur hic expositionem specierum hujus generis omnium, quae nobis saltem hucusque innotuerunt, perfectissimam et naturae maxime consentaneam, Serenis-

deis, pallide viridibus, apice perviridibus, supra lineatis. *Haw. Synops.* p. 95. n. 15. (sub *HAWORTHIA retusa*). *A. acaulis*; fol. 5-fariis, deltoideis. *Thunb. Diss.* n. 15. *Prodr.* p.

simi Principis *Salm-Djok*; systema *Haworthianum* interea hic in nota exhibebimus.

Cls. Haworth Synops. p. 75. Aloës species, primum cum *Duval* per tria genera divisas, sequente systemate exposuit:

ALOE:

- a. caule senecto dichotomo fruticoso vel suffruticoso:
 1. *A. plicatilis.* 2. *A. dichotoma.* 3. *A. purpurascens.* 4. *A. soccotorina.*
 b. caule fruticoso, nec dichotomo:
 5. *A. spicata.* 6. *A. africana.* 7. *A. arborescens.* 8. *A. ferox.* 9. *A. supralaevis.* 10. *A. flavispina.* 11. *A. mitraeformis.* 12. *A. nobilis.*
 13. *A. distans.* 14. *A. albispina.*
 c. caule senecto suffruticoso nec dichotomo, propaginibus plerumque radicalibus:
 15. *A. barbadensis.* 16. *A. glauca.* 17. *A. lineata.* 18. *A. depressa.*
 19. *A. brevifolia.* 20. *A. variegata.*
 d. MACULATAE: caule senecto suffruticoso nec dichotomo, propaginibus radicalibus; foliis multifariis laevibus plus minus maculatis:
 21. *A. striata.* 22. *A. serrulata.* 23. *A. obscura.* 24. *A. latifolia.* 25. *A. saponaria.*
 e. ACAULES: foliis multifariis ciliato-spinosis, propaginibus caespitosis:
 26. *A. virens.* 27. *A. suberecta.* 28. *A. acuminata.* 29. *A. tuberculata.*
 30. *A. humilis.* 31. *A. incurva.*

GASTERIA.

- a. Propaginibus radicalibus nullis, corollis brevioribus ventricosioribus, foliis undique laevigatis, saepius variegatis:
 1. *G. obliqua.* 2. *G. pulchra.* 3. *G. nigricans.*
 b. ACAULES: propaginibus radicalibus caespitosis; corollis longioribus minus ventricosis; foliis linguiformibus plus minus maculatis vel tuberculatis (primâ exceptâ):
 4. *G. glabra.* 5. *G. carinata.* 6. *G. latifolia.* 7. *G. angulata.* 8. *G. angustifolia.* 9. *G. longifolia.* 10. *G. brevifolia.* 11. *G. intermedia.*
 12. *G. verrucosa.*

HAWORTHIA.

- a. CAULESCENTES: corollis bilabiatis, laciniis recurvis; foliis rigidissimis.
 1. *H. viscosa.* 2. *H. aspera.* 3. *H. tortuosa.* 4. *H. expansa.*
 b. ACAULES: corollis bilabiatis, laciniis recurvis; foliis rigidis multifariis, undique tuberculatis vel margine solum cartilagineo albo, margaritaceis; scapis superne effusopaniculatis:
 5. *H. albicans.* 6. *H. maxima.* 7. *H. major.* 8. *H. minor.* 9. *H. minima.* 10. *H. attenuata.* 11. *H. radula.*
 c. ACAULES: corollis bilabiatis, laciniis recurvis, foliis multifariis mollioribus (ultimis quatuor ciliatis); scapis gracilibus; ramis strictioribus:
 12. *H. cymbiformis.* 13. *H. reticulata.* 14. *H. recurva.* 15. *H. retusa.*
 16. *H. mirabilis.* 17. *H. pumila.* 18. *H. translucens.* 19. *H. arachnoides.*
 d. CAULESCENTES: erectae; foliis rigidissimis, integris, acuminato-cuspidatis; corollis cylindricis suberectis, limbo subregulari. An genus proprium?
 20. *H. spiralis.* 21. *H. spirella.* 22. *H. pentagona.* 23. *H. imbricata.*
 24. *H. foliolosa.*

In *Suppl. pl. succul.* p. 50. vero *Haworthias* sequente ordine disposuit:

- a. DELICATAE: acaules; foliis ambienter multifariis, mollioribus, laevioribus, saepe plus minus ciliatis vel aristatis et superne ad lucem pellucidis reticulatisque; scapo simplici:
H. mucronata, cuspidata, limpida, aristata, setata, cymbiformis, reticulata, translucens, et arachnoides cum varietate insigni.
 b. RETUSAE: acaules; saepe ciliatae, foliis 5 multifariis, vix mollibus, vix rigidiusculis, superne plus minus gibboso-retusis et ad solem plus minus pellucidis reticulatisve; scapo simplici:
H. turgida, lacte-virens, retusa, mirabilis, atrovirens.
 c. MARGARITIFERAE: acaules; foliis ambienter multifariis, rigidis, tuberculis sub-

61. *Fl. cap. ed. Schult. p. 312. Linn. Spec. 459. Willd. Spec. II. p. 191. Mill. Dict. n. 19. Ait. H. Kew. ed. 2. II. p. 300. Salm Dyck. Cat. rais. p. 1. Haw. Linn.*

respicientibus, margaritaceis, (at, in recurvis, virentibus) margineve solum cartilagineo-albo, scabrove; scapis effuso-paniculatis:

H. *semimargaritifera, semiglabrata, margaritifera, minor, erecta, brevis, granata, fasciata, scabra, papillosa, attenuata, radula, albicans, recurva.*

d. CAULESCENTES: plus minus caulescentes, rarius pedales; foliis rigidis 3-5-fariis, dense imbricatis, saepeque spiraliter tortis, saturate viridibus plerumque:

H. *pseudo-tortuosa, concinna, cordifolia, asperiuscula, curta, tortella.*

Ad APICRAS demum, quas ab HAWORTHIIIS removet, amandat: ALOËN *bullulata, pentagonam, pseudorigidam, asperam, bicarinatam, cum spirali, spirella, imbricata et foliosa.*

In REVISIONE demum sequente serie disposuit ALOËS species:

1. PACHIDENDRON:

a. ANGUSTIFOLIA: foliis ensiformibus, patulo recurvantibus; floribus flavis:

Huc: 1. P. *africanum*, 2. P. *Principis*, 3. P. *angustifolium*.

b. LATIFOLIA: foliis sublanceolatis; floribus brevibus vix incurvatis.

Huc: 4. P. *ferox*, 5. P. *pseudoferox*, 6. P. *supralaeve*. (Si haec sectio forte genus novum constituet, AGRIODENDRI nomen proponit.)

1. ALOË:

In *Philos. Mag. et Journ. 1825. Octob. p. 280.* harum 2 sectiones novas posuit, quarum:

1. ARBORESCENTES; caule fruticoso simplici, nec dichotomo; foliis angustioribus; propaginibus, si ullis, basilaribus; huc duxit A. *gracilem*.

2. MACRIFOLIAE; frutescentes, graciles; foliis distantibus, vaginantibus, lorato-acuminatis, macris, angustis, effuso-recurvulis, marginalibus dentibus semper minutissimis numerosissimis; floribus (ut audivi) luteis coccineisve lateralibus. Caules senecti (secus D. *Bowie*) in locis natalibus elongati longe decumbunt, Ruborum fruticosorum modo, assurgentibus apicibus. Fortasse proprium genus, floribus mihi ignotis. Huc: A. *macra, rufocincta, ciliaris, striatula, tenuior.*

In *Revis. p. 203.* nova denuo illi nata sectio:

PROLIFERAEE; radicibus valde soboliferis, floribus anguste thyrso-spicatis, ante aperturam acutioribus quam in aliis, apicibus minus rectis.

Huc: A. *brevifolia, prolifera, depressa, Serra.*

3. RHIPIDODENDRON *plicatile*.

4. GASTERIA (in *Philos. Magaz. et Ann. of Philosophy. November. 1827. p. 348.*).

β. *Breviflorae*: propagines nullae.

a. *caulescentes*: caudice senecto saepe sesquipedali; foliis spiraliter multifariis, inaequilateraliter carinato-trigonis, obliquis, nitentibus, laevibus, albo nigro-que perlépide marmoratis fasciatisve; scapo elato, ramoso: 1. *pulchra*; 2. *maculata*; 3. *pieta*.

b. *acaules*: caule vix ullo; bifariae:

α. *albidiores*: foliis (sequentibus) magis albo marmoratis: 4. *formosa*, 5. *fasciata*, 6. *retata, (reticulata)*.

β. *viridiores*: foliis distichis viridioribus obtusis: maculis longe obscurioribus: 7. *nigricans*, 8. *crassifolia*, 9. *brevifolia*.

β. *Longiflorae*:

a. *bifariae*:

α. *laeviores*: foliis magis laevibus:

α. *retusifoliae*: foliis retusis, propaginibus nullis: 10. *obtusifolia*.

b. *acutiores*: foliis acutioribus:

1. *graciliflorae*: floribus omnium cognitarum gracilioribus: propaginibus paucissimis: 11. *mollis*.

2. *crassiflorae*: floribus medio valde incrassatis, sive magis ventricosos: 12. *subnigricans*, 13. *disticha*, 14. *conspurcata*, 15. *angulata*, 16. *sulcata*, 17. *excavata*, 18. *angustifolia*, 19. *laevis*.

β. *verrucosae*: foliis distichis; paginis plus minus exasperatim verrucosis: 20. *subverrucosa*, 21. *verrucosa*, 22. *intermedia*.

b. *multifariae*: foliis per aetatem et recte spiraliter multifariis acutis cuspidatis inaequaliter trigonis acuteque carinatis:

α. *asperae*: foliis plus minus tuberculatim exasperatis: 23. *repens*, 24. *parva*, 25. *decipiens*, 26. *carinata*, 27. *strigata*, 28. *laetepunctata*, 29. *subcarinata*.

β. *glabriorae*: foliis semper glabratis, aetate multifariis et inaequilateri-carinatim trigonis:

1. *breviorifoliae*: foliis floribusque brevioribus (quam in sequenti).

Soc. Tr. 7. 9. Med. Bot. Beob. 1785. p. 56. Bot. Mag. t. 455. Decand. Pl. gr. t. 45. Knorr Del. I. t. A. 10. APICRA *retusa* Willd. Mag. Ges. Naturf. Fr. 5. p. 271. n. 13. CATEVALA *retusa* Medic. Theod. p. 68. Commel. Hort. 2. t. 6. Till. Pis. 6. t. 5. Weinm. Phyt. 73.

„Flores simillimi *A. margaritiferae*.“ Linn. (albidi, inconspicui). Folia radicalia, aggregata, valde carnosa, supra basi concava, apice triquetro plano convexiuscula, subtus convexo-trigona, apice setâ terminata, glabra, integra, venis pallidis, pollicaria. Flores nunquam vidit Thunb.- Folia supra lineis 9 albidis, in rosulam 5-gonam disposita. Scapus simplex, teres, 8-12-poll., a basi ad apicem squamosus. Squamae (lato-lanceolatae, albidae, subscariosae Dec.) bracteaque filo sat longo terminatae. Flores albido-virescentes, erecti, subsessiles: Lam. (fere bilabiati, labio inferiore reflexo, 5 lin. longi. Petala exteriora planiuscula, interiora obsolete carinata. Stam. inclusa; filamenta tubo breviora, virescentia, 3 petalis externis opposita breviora. Antherae rotundatae flavae. Germen virescens. Stylus brevis, obsolete trigonus. Stigma subtrifidum. Dec.). Flores sessiles, spicati, distantes, virescentes, nullo modo affines illis *A. margariti-*

bus) cavo-inflexis: 30. *undata*, 31. *glabra*, 32. *nitida*, 33. *trigona*, 34. *obtusa*.

2. *longifoliae*: foliis adultis longioribus, uti etiam floribus fere semper longissimis: 35. *acinacifolia*, 36. *nitens*, 37. *venusta*, 38. *pluripunctata*, 39. *ensifolia*, 40. *candicans*, 41. *linita*, 42. *bicolor*.

5. HAWORTHIA:

a. *Trifariae*: fol. trifariis minimis, asperis, atro-viridibus; scapis caulibusve fere capillaribus, rigidis, simplicibus, infra flores sine bracteolis:

H. viscosa, indurata, cordifolia, concinna, asperiuscula.

b. *Rigidae*: fol. spiraliter 3-multifariis, parvis, induratis, asperiusculis, atroviridibus; scapis caulibusque filiformibus.

H. rigida, pseudorigida, tortuosa, pseudo-tortuosa, expansa.

c. *Luridae*: fol. multifariis mediocribus, luride viridibus luridisve; superne erecto-patulis, saepe recurvis induratisque, margine infraque tuberculato-asperis, scabris vel rugosis, tuberculis laridis confluentibus; scapo simplici, filiformi:

H. hybrida, scabra, sordida, recurva, venosa.

d. *Albicantes*: acaules; fol. ambienter multifariis, rigidis, laevibus, saepius albicantibus, apice carinatis; marginibus carinaeque cartilagineis; scapo ramoso:

H. albicans, laevis, ramifera, virescens.

e. *Margaritiferae*: fol. rigidis, ambienter multifariis, plus minus tuberculato-margaritaceis; scapo ramoso, infra flores nudo. Sectio difficilis: *H. margaritifera* gaudet papillis niveis convexis; *papillosa* habet papillas truncatas, apice subconcasas in utraque pagina; *semimargaritifera* etiam gerit truncatas papillas, saepe ad lucem viridi-albo mutabiliter variables, et praecipue subtus impositas:

H. Reinwardti, fasciata, attenuata, Hadula, erecta, papillosa et ceterae *margaritiferae* (praeter *luridas*.)

f. *Retusae*: saepe ciliatae; foliis mediocribus, 5-multifariis, vix mollibus, vix rigidiusculis, superne plus minus gibboso-retusis et ad solem plus minus pellacidis reticulatisve; scapo simplici:

H. mutica, retusa, mirabilis, turgida, laetevirens.

g. *Arachnoideae*: fol. ambienter multifariis, mollibus, laevibus, saepissime plus minus marginibus carinisque denticulato-ciliatis:

H. setosa, pallida, atrovirens, chloracantha, arachnoides, translucens.

h. *Reticulatae*: fol. ambienter rosaceo-multifariis, mollibus, laevibus, laete viridibus, integris obsoleteve denticulatis, saepe mucronato-aristatis; superne ad lucem pellucidis reticulatisque; scapo simplici:

H. reticulata, concava (cymbiformis), mucronata, limpida, aristata, cuspidata, denticulata.

6. APICRA:

a. *Erectae*; fol. erectis, valde pungentibus induratis.

b. *Patulae*; fol. patulis, pungentibus, abbreviatis, induratissimis; speciebus adscriptis nullis.

ferae, quidquid monuisset *Linnaeus* et *Willd. Spec. C. de Spin in litt. ad Balbis.* *In Prom. b. spei.* 4.

2. *A. mutica*; foliis 5-fariis, apice retuso-deltaideis, obtusiusculis, muticis, supra sublineatis. *Haw. Rev. i. e. Saxifragearum Enumeratio et Revisiones pl. succ. p. 55.* (sub *HAWORTHIA mutica*).

Retusae simillima, ut ovum ovo; at forte pallidior, durior, turgidior; foliis obtusioribus apice sine mucrone, minus regulariter retusis, lineis magis anastomosantibus. *Haw. l. c.* *In Prom. b. spei.* 4.

3. *A. turgida*; foliis oblongo-acutis, integris, superne apicem versus fereim convexulis s. gibboso retusulis; ad lucem valde pellucidis lineolisque varie saturatoribus. *Haworth Suppl. pl. succ. p. 52.* (sub *HAWORTHIA turgida*.)

Retusae certe proxima; at triplo minor et longe delicatior, minus retusa, valdeque distincta. Folia supra superne valde pellucida, viridi reticulata, cuspide minutâ carinulâque ad apicem etiam pellucetibus, infra saturate viridia, lineolis solum paucis oblongis sparsis apicem versus pellucetibus. *Haw. Clo Sprengel synonymon retusae in S. V. II. p. 68.* *In Prom. b. spei.* 4.

4. *A. laete virens*; foliis lineari-lanceolatis, laete viridibus, superne subcarinulatis subciliatisque, ad lucem pellucide lineolatis et obsolete reticulatis. *Haworth Suppl. pl. succ. p. 53.* (sub *HAWORTHIA laetevirenti*.) *Link Enum. 1. p. 335.*

A. turgidae affinis; at longe alia et minor. Folia saepe superne concava, carinâ ad apicem minute ciliato-serrulatâ, serrulis pellucetibus. *Haw.* Folia subtus rubentia, aculeis minutis. *Link. In Prom. b. spei.* 4.

5. *A. multifaria*; foliis multifariis minutissime serrulatis, apicem versus retuso-deltaideis, pellucetibus, striis viridibus tribus. *HAWORTHIA multifaria Haw. Philosoph. Mag. et Journ. 1824. Octob. p. 300.* β foliis magis ad apicem lineolatis, mucrone breviori. *Haw. l. c.*

H. retusae simillima, at minor; foliis laete-viridibus duplo numerosioribus, multi-nec 5-fariis triploque minoribus, apicem versus ad lucem pellucide lucidis, lineis 3 viridibus longitudinalibus (saepaque sesquialterâ) plus minusve completis, et setulâ albâ duplo longiore quam in *H. retusa* finientibus. Var. β *H. retusae* magis approximât discrepantibus foliis in directione, numero et magnitudine. *Haw. In Prom. b. sp. D. Bowie.* 4.

6. *A. asperula*; foliis retuso-deltaideis, denticulatis, parte retusâ asperis pluriusque lineolatis. *HAWORTHIA asperula Haworth Philos. Mag. et Journ. 1824. Octob. p. 300.*

H. retusae similis; at foliis sordide viridibus, in parte retusâ granulatim exasperatis, granulis sparsis lineolisque pallescentibus sub 10, nec sub 5, ut in *H. retusa*. Foliorum margines carinaque apice minutissime ciliatae denticulataeve, ciliis viridibus. *Haw. Prom. b. sp. D. Bowie.* 4.

7. *A. tessellata*; foliis retuso-subdeltaideis, pallide vi-

ridibus, superne nigro-viridi-tessellatis, extus nigro-viridibus, asperis. *HAWORTHIA tessellata* Haw. *Philosoph. Mag. et Journ.* 1824. *Octob.* p. 500.

H. retusae valde affinis; sed foliis multifariis. Folia vix semi-cylindrica, sed magis compressa, recurvula, apice carinata, carinâ marginibusque denticulatis, denticulis albis subrespicientibus; supra glabra, pallide viridia, tessellis in parte retusa saepius rhombeis parallelopipedisve, longe saturatioribus; subtus aspera, praecipue apicem versus. *Haw.* *In Promont. b. spei.* *D. Bowie.* 4.

8. *A. albicans* Haw.; foliis multifariis, laevigatis, mucronatis, albicantibus: marginibus carinâque cartilagineis. *Haworth Linn. Soc. Trans.* 7. p. 8. *H. Kew.* ed. 2. II. p. 299. *Salm Dyck Cat. rais.* p. 1. *Bot. Mag.* t. 1452. *A. marginata* Lam. *Enc.* 1. p. 89. (fid. *Bot. Mag.*) *HAWORTHIA albicans* Haw. *Syn.* p. 91. (excl. syn. *Commel. Hort. Amst.* t. 7.) *H. simplex*, scapo ramoso; fol. ovato-acuminatis, albidis, laevibus, margine carinâque valde cartilagineis. *Haw. Revis.* p. 52. *APICRA albicans*; acaulis; fol. reflexo-patentibus, ovatis, triquetris, carinatis, acutis, glabris, margine carinâque cartilagineis; scapo ramoso. *Willd. Mag.* l. c. p. 271. n. 12. *A. afr. humilis* folio triangulari rigido albicante. *Comm. prael.* t. 30. *pl. rar.* t. 43. (in *Bot. Mag.* non *Comm.* t. 30. t. 43., sed *ejusd.* *A. afr. humilis* folio in summitate triangulari et rigidissimo, marginibus albicantibus. *Commel. prael.* 81. t. 35. *ic. rar.* 48. t. 48. cum *Lamarck* et *Willdenow* laudatur.)

Folia numerosa, rosaceo-aggregata, patentia, ovato-acuminata, 2-3-poll., 1½ poll. lata, rigidissima, crustâ cartilagineâ tenui glabrâ diaphanâ per totam superficiem aequaliter obducta, subdiaphana, supra depressiuscula, infra convexa, carinato-cuspidata, marginis atque carinae cartilagine crassiore, vitreo-pellucente, quandoque imperfecte dentata, (viridia, albo-marginata *Lam.*). Scapus circiter 1½ ped., subpurpurascens, ramis 3-4, crassitie pennae anatis. (Pedunculus communis paniculato-ramosus *Lam.*) Racemi multiflori, floribus remotis. Pedicelli floribus quater breviores. Cor. subventricoso-cylindrica, vix ¾ poll., ad ⅔ connata, subbilabiata, laciniis obtusis, externis duplo angustioribus, superioribus magis explicatis, inferiore mediâ reliquis magis convolutâ, albo viridi purpurâ varia. Fructificationis organa corollâ duplo breviora. *Gawl.* Folia apice obliqua. *Link.* Confer sequentem. *In Prom. b. spei.* 4.

9. *A. laevigata*; simplex; scapo (*Commelyni* fide) simplici; foliis ovato-longe acuminatis, cuspidatis, albidis, laevibus, tenuiter albo marginatis. *HAWORTHIA laevis* Haw. *Rev.* p. 52. *Commel. Hort. amst.* 2. t. 7. (a *Haworth* prius, a *Willdenow* vero jam cum nota: mala, ad albicantem ducta). *In Prom. b. spei.* 4.

10. *A. ramifera*; caudice inferne supra terram ramuloso;

foliis ovato-acuminatis, albidis; tuberculis paucis, sparsis, albicantibus. *HAWORTHIA ramifera* Haw. *Rev.* p. 52.

Hae tres *laevigatae* sorores sunt simillimae, uti ovum ovo. Sed facillime distinguuntur: prima „(*albicans*)“ caudice simplici et margine cartilagineo crasso; secunda „(*laevigata*)“ cartilagine fere nullâ, caudice simplici et foliis longius in acumen productis; tertia haec caudice ramoso, nec non saepe foliis parce tuberculatis; tuberculis lucidis. *In Prom. b. spei.* 4.

11. *A. virescens*; simplex, subimmarginata; foliis ovato-acuminatis, virescentibus; tuberculis paucissimis albis, sparsis, lucidis. *HAWORTHIA virescens* Haw. *Rev.* p. 52. β . *minor*; duplo minor, glauco-viridis. (Fortasse propria species. *Haw.*)

Vicina quidquam *APICRAE spirali* Nob. *Haw.* *Habitat?* 4.

12. *A. cymbifolia* Schrad.; foliis multifariis, cymbiformibus, obtusis, mucronatis, glaucis, supra valde concavis; apicibus carinatis, obsolete reticulatis; propaginibus numerosis. *Haw. Linn. Soc. Trans.* 7. p. 8. (sub *ALOË cymbiformi*.) *H. Kew. ed. 2. II. p. 299.* *A. cymbifolia*; acaulis; fol. lato-ovatis, concavis, mucronatis, dorso apicem versus carinatis; floribus racemosis, erectis, cylindricis, bilabiatis. *Schrad. N. Journ.* II. B. I. St. p. 17. t. 2. *Desvaux Journ. d. Bot.* I. p. 246. *Willd. Enum.* p. 386. *Salm Dyck Cat. rais.* p. 1. *Jacq. Fragm.* p. 72. t. 112. f. 1. *A. cymbiformis* *Bot. Mag.* 802. *HAWORTHIA cymbiformis* Haw. *Syn.* p. 83. *HAWORTHIA concava*; fol. excavato-cymbiformibus, obtusis, glaucis, valde concavis, superne carinatis, obsolete reticulatis; propaginibus cespitosis. *Haw. Revis.* p. 58. *APICRA cymbifolia*; fol. ovatis, concavis, mucronatis, glaucescentibus, supra lineatis; corollis infundibuliformibus. *Willd. Mag.* I. c. p. 271.

n. 14. β foliis magis erectis *Haw. Revis.* p. 58.

Aetate subcaulescit. *S. Dyck.* Habitus Familiae *SEMPERVIVORUM acaulium*. Folia acuminata, similia puerorum cymbis chartaceis. *Haw.* Flores fere iidem, ac in *A. retusa*: *Balb. in litt.* Folia glabra, vix 2 poll., glauco-viridia. Scapus pedalis, squamis scariosis, albis, purpurascens. Pedicelli virides, bracteis, corollas fere attingentibus, breviores. Racemus multiflorus, floribus distantibus, albicantibus. Cor. $\frac{3}{4}$ poll., ad basin usque divisa in lacinias angustas, subattenuatas, obtusas, basi striâque mediâ laciniarum purpurascens, subbilabiata; labio superiore ascendente, inferiore reflexo. Stamina tubo breviora. Stylus vix ul-
lus, stigmate sessili, subtrigono capitato. B. M. *In Prom. b. spei.* 4.

13. *A. hebes*; foliis ovatis, concavis, luridis, obtusis cum mucronulo, apicem versus pellucetibus; lineis saturatioribus. *HAWORTHIA obtusa* Haw. in *Philos. Mag. et Journ.* 1825. *Octob.* p. 282.

H. concavae Nob. proxima; at subduplo minor, colore adhuc lurido et minus virente glaucove, quam in illa; foliis apice cras-

sioribus, obtusioribus, magis pellucetibus magisque striatis. Flores ut in affinibus. *Haw. In Prom. b. sp. D. Bowie. 4.*

14. *A. planifolia*; foliis ovato-acuminatis, supra planis, pallide viridibus: senioribus reflexis. *HAWORTHIA planifolia Haw. in Philos. Mag. et Journ. 1825. Octob. p. 282.*

H. concavae simillima habitu et magnitudine; foliis forte minoribus aristulâ longiore, paucioribus (sive adhuc nullis) propaginibus, unâ singulari exceptâ in summo scapi floriferi, quae in nostro exemplo per annum ultrave persistit. Distinguitur optime foliorum paginâ planâ. *Haw. In Prom. b. sp. D. Bowie. 4.*

15. *A. altilinea*; foliis incurvis, ovato-lanceolatis, aristatis, minute denticulatis: superne utrinque lineâ elevatâ. *Haw. Philosoph. Mag. et Journ. 1824. Octob. p. 301. (sub HAWORTHIA altilinea.)*

Folia pallide viridia, superne carinâ minutissime denticulatâ, finiente in setulam aristamve membranaceam fere $\frac{1}{2}$ uncialem; supra plana et apicem versus lineâ costali elevatâ fere in medio. Ad lucem folia superne pellucetia, lineis maculisve viridibus irregulariter subtessellata, ut in affinibus. Major quam *H. mucronata*; arista longior quam in *H. concava*: sed optime distinguitur elevatâ utrinque lineâ. *Haw. In Prom. b. sp. D. Bowie. 4.*

16. *A. mucronata*; foliis lanceolatis, membranaceo-cuspidatis, superne convexis, apice pellucidis, lineolatis reticulatisque. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 50. (sub HAWORTHIA mucronata uti in) Rev. p. 58.*

Affinis *cymbifoliae*, at duplo minor; foliis supra convexulis, nec concavis, subinde minutissime denticulatis. *Haw. l. c. In Prom. b. spei. 4.*

17. *A. limpida*; foliis integris, oblongo-subulatis, aristato-mucronatis, superne omnino ad lucem transparentibus; lineolis saturatoribus. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 51. (sub HAWORTHIA limpida uti in) Rev. p. 58.*

Statura omnino *mucronatae* et *cuspidatae*: discrepat foliis gracilioribus, pallide viridibus, superne longe magis pellucidis sive aquoso-delicatissimis et fere limpidis. *Haw. Clo. Sprengel synonymon A. translucetis in S. V. 2. p. 68. In Prom. b. spei. 4.*

18. *A. aristata*; foliis atro-viridibus, integris, ovatis, longe subulato-attenuatis filoque semiunciali terminatis, sublineatis. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 51. (sub HAWORTHIA aristata, uti in) Rev. p. 58.*

Statura *mucronatae*, *cuspidatae*, *limpidae*; sed foliis longissime saturatoribus, magis subulatim subtriquetro-attenuatis, aristâ terminatis, inde subtus superne carinulatis, ad lucem solum obsolete pellucido-reticulatis. Simulat quoque *SEMPERVIVUM cuspidatum*; at duplo major, aristâ quadruplo longiore graciliore. *Haw. Clo Sprengel synonymon A. arachnoidis in S. V. 2. p. 68. In Prom. b. spei. 4.*

19. *A. cuspidata*; foliis viridibus, obovato-oblongis loratisve, acuminatis, aristâ terminatis, parce ciliato-serrulatis, apice pellucetibus reticulatisve. *Haw. Rev.* p. 58. (sub *HAWORTHIA cuspidata*, ut in) *Suppl. succ.* p. 50.

Simillima *reticulatae*; differt: ciliis marginalibus validioribus; foliis supra non convexulis, sed obovato ovatoque oblongis; cuspidate carnosâ. *Haw. Suppl. l. c.* Folia superne carinâ denticulis aliquot. *Haw. Rev.* p. 58. Clo *Spreng.* synonymon *A. translucetis* in *S. V.* 2. p. 68. *In Prom. b. spei.* 4.

20. *A. denticulata*; foliis pallide viridibus, ad lucem subreticulatis, carinulâ marginibusque minutissime albo-denticulatis, aristatis. *Haw. Rev.* 58. (sub *HAWORTHIA denticulata*). *Cuspidatâ* pallidior, magis reticulata, aristâ brevior. *Haw. In Prom. b. spei.* 4.

b. *Foliis margine dentatis vel ciliatis.*

21. *A. reticulata* *Haw.*; foliis multifariis, aequilateritriquetris, obtusiusculis, glaucescentibus, reticulatis, supra subconcavis. *Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 9. *Hort. Kew.* 2. ed. II. p. 299. *S. Dyck Cat. rais.* p. 2. p. 36. *AL. arachnoides* γ *reticulata*; fol. crassioribus, obtusioribus, pallidioribus, glabris, margine tantummodo carinâque rotundatâ obsolete denticulatis. *Bot. Mag. ic.* 1314. et 1361. syn. *AL. pumilio* *Jacq. Hort. Schönbr. t.* 421. *AL. herbacea* *Decand. pl. grass.* (utraque fide *S. Dyck*). *HAWORTHIA reticulata* *Haw. Syn.* p. 94. *Rev.* p. 57. *APICRA reticulata* *Willd. Mag. l. c.*

Ætate subcaulescens, fol. junioribus subconcavis, senioribus convexiusculis. In *AL. pumilionis* figura folia non reticulata; sed in specimine vivo in *H. Schönbr.* *S. Dyck l. c.* Non esse varietatem *AL. pumilae* *Mill.*, ut in *Bot. Mag. l. c.* dicitur, *Haw. l. c.* *AL. pumilio* *Jacq.* in *Bot. Mag.* ducitur ad *translucentem*. „Parva, SEMPERVIVO similis. *Haw.*“ Folia dense cespitosa, 1½ poll., ¾ poll. lata, pallide viridia, fusco reticulato-maculata, venis translucentibus intermixtis, crassiora, obtusiuscula. Scapus pedalis, (simplex) albidus, hinc inde rubescens. Bractee albae, lanceolatae, acuminatae, pedicellis brevibus albidis duplo longiores, 4 fere lin.. Corollae remotiusculae, vix pollicares, albae, extus roseo suffusae, laciniis reclinatis, obtusis, intus striâ virente. *Gawl. Sprengel* in *S. V.* 2. p. 68. *A. herbaceam* *Dec.* synonymon *A. arachnoidis* dicit. At *A. herbacea* *Decand.*, (acaulis, fol. cespitosis, oblongis, acutis, apice triquetris, angulis, inprimis carinali, tenuiter denticulatis), media inter *A. arachnoidem*, (a qua differt: foliis non spinulas molles longasque gerentibus, sed tenuiter denticulatis) et *A. atrovirentem*, (a qua differt eodem caractere, et foliis pallidis angulisque carinatis, dentibus magis conspicuis, quam in angulis superioribus) et *A. cymbaefoliam*, quae foliis concavis, obtusis, edentulis abunde diversa. *Decand. Cat. h. monsp.* p. 76. *In Prom. b. spei.* 4.

Obs. Div. Willdenow in *Mag.* p. 271. n. 15. *APICRAM pumilionem* (fol. erectiusculis, lanceolatis, triquetris, acutis, glaucescentibus, glabris, apice margine

carinâque cartilagineo-denticulatis) distinxit ab *APICRA reticulata* (subcaulescente; fol. oblongo-triquetris, patulis, obtusiusculis, tenuissime reticulatis, glabris, junioribus supra planis, senioribus convexiusculis, apice carinâ obsolete subdenticulatâ). *A. pumilio*; (fol. trigonis, apice subulatis, cartilagineo-dentatis; floribus subspicatis, breviter pedunculatis, patulis, supra medium expansis, *Jacq.* l. c.) describitur sequentibus: „Rhizoma crassitie digiti minimi, fibris crassis. Folia rosam densam formantia, subtus carinato-convera, supra planiuscula, carinâ interdum obtusâ, in hac et in oris cartilagineo-denticulata, ceterum glabra, pulposa, insipida, glauco-virentia, $1\frac{1}{2}$ unc. Scapus $\frac{1}{2}$ ped. teres, erectus, crassitie pennae columbinae, fuscescens; spathis vagis, lanceolatis, cuspidatis, numerosis. Pedicelli uniflori, breves, erecti, bracteati. Flores plurimi, inodori. Petala basi connata, lineari-lanceolata, albida cum fascia media rubella, ad medium usque tubum curvatum mentientia, dein reflexo-patentia, bilabiata, exteriora latiora, omnia $\frac{1}{2}$ unc. Filamenta subulata, erecta, inaequalia, petalis duplo breviora. Antherae flavae incumbentes. Germen ovatum, 6-sulcum. Stylus crassus, erectus, brevissimus. Stigma capitatum, trifidum. Ab *A. Bradleyana* p. 12. f. 30. differt praesertim spathis scapi numerosis“ *Jacq.*

22. *A. atrovirens* *Dec.*; foliis atroviridibus, supra valde turgidis; setulis marginalibus exiguis; tuberculis undique numerosis. *Haw. Revis.* p. 57. (sub *HAWORTHIA atrovirente*.) *A.* fol. cespitosis, patulis, atrovirentibus, apice trifariis; angulis spinis herbaceis brevibusque munitis: lateribus subtuberculosis. *Decand. Pl. gr.* t. 51. *S. Dyck Cat. rais.* p. 5. et 37. *A.* acaulis; fol. patulis, (lanceolatis), ovatis, trigonis, tuberculatis, margine carinâque dentatis: dentibus subulatis, brevissimis; corollis pedicellatis infundibuliformibus; bracteis pedicello brevioribus. *Willd. En.* p. 386. *A. pumila* *Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 10. *A. pumila* ε *Linn. Spec.* 460. (quo teste: *Boerh. Lugd. Bat.* 2. p. 151. c. tab. *Bradl. Succ.* 3. p. 12. t. 30.) *A. Bradleyana* *Jacq. H. Schönbr.* ad tab. 421. *A. arachnoides* β *pumila* *Thunb. Prodr.* 61. *Willd. Spec.* II. p. 188. *Hort. Kew.* ed. 1. et 2. II. p. 301. *A. arachnoidea* β *Bot. M.* 1514. *A. arachnoidea* β *pumila*; cespitose stolonifera, minor; foliis atrovirentibus, herbaceo spinulose dentatis, dorso papillulosis. *Bot. Mag.* 1561. ic. *A. arachnoidea* β *Lam. Enc.* 1. p. 89. *A. herbacea* *Mill. Dict.* ed. 8. n. 18. *APICRA atrovirens* *Willd. Mag.* l. c. p. 168. n. 3. *HAWORTHIA pumila* *Haw. Syn. succ.* p. 95. *CATEVALA atroviridis* *Medic. Theod.* p. 69.

Aetate subcaulescens, foliis pellucidis. *S. Dyck.* Stolonifera, (sobolem producens valde convexam, compactam, circularem) *Haw.* Folia dense cespitosa, pollicaria, $\frac{1}{2}$ poll. lata, (oblongo-lanceolata), acuminata, margine dense spinuloso-dentato, albido-virescente. Scapus pedalis, (teres, erectus), violaceo-ruber, passim squamis concoloribus, viridi-marginatis, lanceolato-acuminatis, 3 lin. longis, (simplex, glaberrimus. Pedicelli breves, distantes, erecti). Bractee virides, disco rubescentes, corollâ triplo breviores. Flores (sub) sessiles, remoti, pauci, vix pollicares, albido-virentes (s. cinerascetes). Cor. cylindrica, subbilabiata; laciniis apice patulo-revolutis, oblongis, obtusis, 3 externis striâ longitudinali flavescenti-rubrà. Filamenta flavicantia, petalis dimidio breviora. Antherae luteae, ovato-rotundae, erectae. Germen subcylindricum, sulcatum, intense viride. Stylus brevissimus; stigmatate capitato. Caps. obtuse trigona. *Gawl. et Decand.* *In Prom. b. spei.* 4. 25.

23. *A. chloracantha*; foliis erecto-recurvis, lorato-sulcatis, acuminatis, atro-virentibus, margine carinaeque denticulatis; denticulis parvis, viridibus, numerosis, quandoque geminatis. *Haw. Rev.* p. 57. (sub *HAWORTHIA chloracantha*).

Atrövirenti affinis: at foliis multo longioribus longeque planioribus, superne carinatis, cuspidè setosâ parvâ terminatis, inferne ad lucem lineatis. *Haw. In Prom. b. spei.* 4.

24. *A. stenophylla*; foliis lorato-attenuatis, arcuatim patienti-recurvis, perviridibus, apice subcarinatis; carinâ orisque creberrime denticulatim exasperatis. *HAWORTHIA angustifolia* *Haw. in Philos. Mag. et Journ.* 1825. *Octob.* p. 285.

H. chloracanthae proxima, at minor; foliis multo angustioribus, patentioribus et longioribus, s. 3-4-uncialibus, subtus convexis, supra planioribus, saepius lineâ elevatâ longitudinali centrali; marginalibus denticulis minutissimis, et inarmato oculo vix conspicuis. *Haw. In Prom. b. sp. D. Bowie.* 4.

25. *A. pallida*; foliis subglaucescentibus, margine carinaeque membranaceo-setulatis asperisve. *Haw. Revis.* p. 56. (sub *HAWORTHIA pallida*).

Setosâ duplo minor longeque minus setosa; *atrovirenti* propinquior. at longe pallidior magisque spinulosa; foliis planioribus, nullo modo turgidis farcisque, sed ad lucem aliquantulum pellucenter guttatis subtuberculatisque. *Haw. In Prom. b. spei.* 4.

26. *A. setosa*; foliis lorato-sublanceolatis, acuminatis setâque longâ terminatis, superne subcarinatis, margine carinaeque ciliatim membranaceo-setosis. *Haworth* in *Suppl. pl. succ.* p. 52. (sub *HAWORTHIA setata*) *Rev.* p. 36. α ; foliis planis, viridibus; setis niveis, tenuissimis, numerosis. *Haw. Rev. l. c.* β ; *nigricans*; fol. planis, luride atro-virentibus, setis niveis tenuissimis, numerosis. *Haw. l. c.* γ ; *media*; fol. turgidis, pallide viridibus, utroque convexulis ciliisque niveis duplo majoribus duploque paucioribus. *Haw. l. c.* δ ; *major*; foliis pallide viridibus, utrinque convexiusculis ciliisque niveis triplo, quam in α et β , majoribus, duploque paucioribus. *Haw. l. c.* *H. arachnoides* β minor *Haw. Suppl.* (se teste).

Translucenti proxima; sed 2-5 plove minor; foliis apicem versus non pellucidis, sed absolute saturatoribus, ad lucem obsolete reticulatis, apice subulâ carnosâ atro-viridi, aristâ membranaceâ finientibus. Setae marginales paucae, 1-2 lin., adscendentes vel demum expansae, niveae, deorsum sensim evanescentes, foliorum basi basinve versus nullae. *Haw. Suppl.* γ et δ forte propria species. Folia in omnibus varietatibus opaca, minora, angustiora, turgidiora, saturatiora, setis longioribus elegantioribus quam in *arachnoidea*. Praeterea setae carinales in 2-3 ordinibus saepe dispositae. *Haw. Rev. l. c.* *Clo Sprengel* synonymon *A. arachnoidis* in *S. V.* 2. p. 68. *In Prom. b. spei.* 4.

27. *A. translucens* *H. New.*; valde sobolifera; foliis

multifariis, suberectis, lanceolato-teretiusculis, eleganter ciliatis: apice maculis oblongis, valde pellucidis. *Haw. Syn.* p. 96. (sub *HAWORTHIA pellucente*). *H. Kew.* ed. 2. II. p. 300. *S. Dyck Cat. rais.* p. 2. et 37. *HAWORTHIA translucens Haw. Suppl. pl. succ.* p. 52. *AL. pellucens Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 10. *A. arachnoides* δ *translucens*; fol. pallidissimis, transparentibus, margine et carinâ setaceo-denticulatis, cuspidate terminali membranaceâ nec echinatâ; caule saepe foliolis sphaecelatis prae aliis numerosius stipato. *Bot. Mag.* 1361. et t. 1417. (in hoc et in *Haw. Syn.* l. c. excl. syn. *A. pumilionis Jacq.* fid. *S. Dyck.*) *APICRA translucens*; acaulis cespitosa; fol. patentibus, lanceolatis, teretiusculis, ciliatis, apice maculis oblongis valde pellucidis notatis. *Willd. Mag.* l. c. p. 168.

„Affinis *arachnoidi*, a qua potissimum staturâ differt; media quasi hanc inter et *atrovirentem*“ *S. D.* „Elegans. Soboles minores, tenuius ciliatae, margine non cartilagineo. Folia 1-2 poll., 6-8 lin. lata, pallide viridia, dilutius reticulato-maculata, acuminata, carinâ et margine albo valde setaceo-ciliato-denticulata. Scapus simplex, flavescenti-viridis, hinc ruber, pedalis. Bractee albae disco roseo, pedicellis viridibus duplo longiores, 4 lin.. Flores satis approximati, vix pollicares, albidi, rubro-tincti: laciniis patentibus, obtusis, intus alternis striâ longitudinali viridi et rubellâ.“ *Gawl.* Aculei setiformes, longissimi. *Link.* In *Prom. b. spei.* 4.

28. * *A. arachnoides Mill.*; foliis expansis, lanceolatis supra planiusculis, marginibus cartilagineis, crasse ciliatis. *Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 10. *Mill. Dict.* ed. 8. n. 17. *S. Dyck* p. 3. et 37. *Thunb. Diss.* n. 7. *Prodr.* p. 61. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 311. *A. acaulis*; fol. adscendentibus, ovatis, apice trigonis, margine carinâque dentatis; dentibus cartilagineo-setosis; corollis subsessilibus, infundibuliformibus; bracteis pedicello longioribus. *Willd. En.* p. 385. *A. fol. cespitosis, coarctatis, glaucescentibus, apice pellucido-corneis, trifariis; angulis spinis inermibus longisque munitis, lateralibus laevibus.* *Decand. pl. gr.* t. 50. *Bot. Mag.* 756. ic. *A. arachnoides* α *communis Willd. Spec.* II. p. 188. *Hort. Kew.* ed. I. 467. ed. 2. II. p. 301. *A. arachnoides* α *communis*; fol. margine subtusque membranaceo-echinatis. *Bot. Mag.* ad 1314 et 1361 et 1417. *A. pumila* δ *arachnoidea Linn. Spec.* 460. *Commel. prael.* 78. t. 27. *Weinm. Phyt.* 73. *Knorr Del.* 1. A. 11. *Bradl. Succ.* 3. p. 12. t. 30. *HAWORTHIA arachnoides Haw. Syn.* p. 96. *APICRA arachnoides Willd. Magaz.* l. c. p. 168. n. 2. *CATEVALA arachnoidea Medic. Theod.* p. 68. β *pellucens*; foliis apice pellucidis, fere inermibus. *S. Dyck Cat. rais.* p. 3. *H. Amstel. Misit Ssso S. Dyck ill. van Marum.*

Thunberg describit spontaneam: „Folia radicalia, plurima, aggregata, oblonga, margine dorsoque apicem versus ciliis albis, lanceolatis, cartilagineis, inermibus, pallida, venis viridibus, poll. et ultra.“ In culta: Folia brevia, basi carnosula, apice cornea et pellucida, utrinque convexula, superne marginibus et carinâ spinis mollibus, membranaceis, albis, nec arachnoideis. Scapus griseo-violaceus, simplex, elatus, squamis lanceolatis, scariosis. Pedicelli brevissimi, bracteis breviores. Flores distantes, erecti. Cor. pollicaris, ventricoso-cylindrica, bilabiata, dilutissime violacea, vel sordide albicans, viridi-striata; petala exteriora oblonga, revoluta, interiora basi angustata, obtusa. Filamenta inaequalia, corollam fere aequantia, alba. Antherae luteae. Stylus brevissimus, albus. Stigma trigonum, subcapitatum. Germen viride, obsolete trigonum. *Decand. et Bot. Mag.* In *Prom. b. spei.* 4.

Obs. Al. humilem africanam arachnoidem *Comm. prael.* 7. t. 27. citatam optimamque dictam in *Bot. Mag.* t. 75., ad Al. translucentem potius spectare. *Haworth Syn. l. c.*

29. *A. venosa* Lam.; acaulis; foliis reflexo-patentibus. ovato-oblongis. acutis, glabris, apice obtuse triquetris, margine denticulatis, supra lineatis; scapo simplici. *Willd. Mag.* l. c. p. 271. n. 11. (sub *APICRA tricolore*). *Lam. Enc.* 1. n. 16. *S. Dyck* p. 5. et 38. Al. *tricolor*; fol. sublinguiformibus, acutis, reflexis, supra lineatis, apice obsolete crenulatis, corollâ albâ et viridi variegatâ. *Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 25. (qui in *Synopsi* hanc speciem neglexit; nunc illi) *HAWORTHIA venosa* *Revis.* p. 44. et 51. Al. africana etc. *Comm. prael.* p. 80. t. 29. *Weinm. Phyt.* t. 71. a (fid. *Bot. Mag.* 1353. ubi excludenda *A. venosa*).

Folia oblonga, acuta, crassa, marginibus aspera vel denticulata, supra venis rectis longitudinalibus. Scapus simplex, 2 ped.. Spica laxa. Flores albo rubroque variegati, deflorati cernui. Cor. limbo labiato. *Lam.* Ser. *S. Dyck* non vidit creditque interrisse illam in hortis, nec confundendam monet cum *recurva*, uti in *Bot. Mag.* In *Prom. b. spei.* 4.

30. *A. mirabilis* Haw.; foliis ciliato-spinosis, quinque-fariis, retuso-deltoides, cuspidatis, marginibus carinâque ciliato-spinosis, supra glabriusculis, subtus subtuberculatis, obsolete reticulatis. *Haw. Linn. Soc. tr.* 7. p. 9. *H. Kew. ed.* 2. II. p. 300. *S. Dyck* p. 5. *Bot. Mag.* t. 1354. *HAWORTHIA mirabilis* *Haw. Syn.* p. 95. *APICRA mirabilis*; acaulis: fol. 5-far., triquetris, apice horizontaliter depresso-truncatis, margine carinâque ciliato-spinosis, supra glabris, subtus subtuberculatis, obsolete reticulatis. *Willd. Mag.* 5. p. 269. n. 4. „Facie *retusae*; sed folia margine carinâque ciliato-spinosa, subtus tuberculata, rubescentia.“ *S. Dyck l. c.* Caudex nullus. Folia radicalia, compacte ambientia, pulvinato-incrassata, tenera, semirhombeo-oblongata, introrsum ventricosa, declive truncata. laevia, flavescenti-viridia, lineis saturationibus verticaliter inscripta, dorso subcarinato convexa, papillose scabrata, acumine continuo, subtus rubro-violacea, glauco maculato-punctata, 1½-2-poll., poll. lata. Caulis simplex, gracilis, flexilis, rubescens.

$\frac{1}{2}$ ped.. Racemus remote pauciflorus. Bracteae viridulae, pedicellos concolores aequantes, $\frac{1}{3}$ poll.. Cor. tubulosa, angulis rotundatis, albida, rubro-striata, basi virens, poll., ad $\frac{1}{3}$ usque recurvo-bilabiata; laciniis utriusque labii ab invicem discedentibus, striâ rubrâ longitudinali. Stamina tubum aequantia. *Gawl.*
In Prom. b. spei. 4.

c. *Foliis margaritaceo-tuberculatis.*

31. *A. recurva* *Haw.*; foliis subulatis, crassis, erecto-recurvis, supra concavis, subtus subtuberculatis, marginibus obscure margaritaceo-tuberculatis. *Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 10. *H. Kew. ed. 2. II. p. 10.* *S. Dyck Cat. rais.* p. 4. *Bot. Mag. t. 1355.* (excl. syn. *tricoloris* et *venosae*).
HAWORTHIA recurva *Haw. Syn.* p. 94. H. fol. recurvis, semiteretibus, ovatis, longe attenuatis subulatisve: supra laevibus, margine tuberculatim subelevato, serrulato, subtus scabris e tuberculis parvis crebris, viridibus. *Haw. Revis.* p. 51.
APICRA recurva *Willd. Mag. l. c. p. 270. n. 8.*

„Raro propagines prodit.“ *Haw.* Ss. *S. Dyck* non vidit. Huc nunculo *Haworth* spectare videtur *A. anomala* *Haw. Linn. Trans.* p. 25., qui in *Rev. l. c.* „folia plerumque spiraliter bi-multifaria, e viridi sordide purpurascencia lividave“ notat. „Folia pauca, radicalia, multifaria, recurve divaricata, pulvinato-crassa, oblongo-attenuata, plano-convexa, saturate viridia, rore cana, supra glabrata lineisque paucis saturatoribus, subtus dense papillosa, margine cartilagineo-serrulata, 2-3 poll., poll. lata. Caulis tenuis, flexilis, $\frac{1}{2}$ ped. vel ultra, rubescens. Racemus laxus. Bracteae roseo-albidae, lineares, pedicellos rubros apice virides $\frac{1}{3}$ poll. aequantes. Corollae ab imo gibberulae attenuato-tubulosae, erectae, fere poll., albidae, viridi-striatae; rictu revolutim dispanso, laciniis intus candidis, striâ mediâ rubrâ. Stamina tubum aequantia.“ *Gawl.*, qui folia aëri exposita livescere. *In Prom. b. spei.* 4.

Obs. *A. anomala* *Haw.*; subcaulescens: foliis trifariis, imbricato-patentibus, ovatis, triquetris, margine carinâque incrassatis, maculatis. *Willd. Mag. l. c. p. 273. n. 24.* (sub *APICRA anomala*); *A. foliis trifariis albo et viridi variegatis, laciniis corollae rubris.* *Haw. Trans. Linn. Soc. VII. p. 25;* *S. Dyck Cat. rais. p. 8;* *Till. H. pis. t. 7.* (excl. synonym.); quam *Haworth* in *synopsi* serius omisit, Ss. *S. Dyck* non vidit, nunc ipsi auctori *Haworth* in *Rev. p. 44.* videtur *A. recurva* *Bot. Mag. t. 1353.* (excl. syn. *venosae* s. *tricoloris*).

32. *A. scabra*; rigida; foliis semicylindricis, induratissimis, superne acutis s. incrassatis, triquetris, extus tuberculato-scaberrimis, intus scabris, basin versus laevibus. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 58.* (sub *HAWORTHIA scabra*) *Ejusd. Rev. p. 51.*

„Species distinctissima; fasciatâ duplo minor et ultra, et vix affinis; lurida, non rectim margaritifera, at scaberrima, tuberculis virescentibus sordidis.“ *Haw.*, qui monet: „hanc et *recurvam* fortasse novam sistere sectionem; nempe magis *luridae* quam ceterae, scabrioresque, absque fere margaritis vel omnino.“ *In Prom. b. spei.* 4.

33. *A. sordida*; foliis erecto-patulis, apice subrecurva-

tis, luride viridibus, superne carinatis, subtus carinâque margine scabriusculis. *Haw. Rev. p. 51.* (sub *HAWORTHIA sordida*).

Parvam imperfectamque plantam solum vidi, foliis oblongo-acuminatis subulatisve, at supra concavis, mucrone parvo terminali. *Haw.*, qui post *scabram* posuit. *In Prom. b. spei. 24.*

34. *A. Radula S. Dyck*; foliis erecto-recurvis, subulato-attenuatis, undique asperis, tuberculis minutissimis, crebris, sparsis, cretaceo-margaritaceis. *Haw. Syn. p. 93.* (sub *HAWORTHIA Radula*). *S. Dyck Cat. rais. p. 4.* *α. major*; fol. superne papillis minutissimis viridibus, subtus margaritaceis asperis. *S. Dyck l. c. et laevior ejusd. in litt. ad Haworth.* *β. media*; fol. utrinque tuberculis margaritaceis minutissimis scabris. *S. Dyck l. c.* *A. Radula Jacq. H. Schönbr. t. 422.* *A.* fol. patentibus, oblongo-lanceolatis, apice subtrigonis, utrinque tenuissime papillosis; scapo ramoso; corollis pedicellatis, infundibuliformibus. *Willd. En. p. 586.* *APICRA Radula Willd. Mag. l. c. p. 270. n. 10.* *HAWORTHIA Radula β pluriperlata*, baccis minutissimis numerosis. *Haw. Rev. p. 54.* *γ. minor*; fol. brevioribus, tuberculis margaritaceis majoribus et rarioribus asperis. *S. Dyck l. c. et asperior ejusd. in litt. ad Haworth.* *δ. margaritacea S. Dyck in litt. ad Haw.*; olim „*semimargaritifera minima*“ (nobis tantum *semimargaritifera minor* nota). *HAW. Radula δ magniperlata Haw. Revis. p. 54.*

β apud *Jacq.*: „*acaulis*. Folia radicalia numerosa, in orbem sita, carnosâ, ensiformia, supra plana, subtus convexula, rigida, apice subulato, crassa, utrinque et ad oras tuberculis carnosâ virentibus cum apice cartilagineo albo et inde radulae instar aspera, amara, 3-4 unc., basi $\frac{1}{2}$ unc. lata, recurvata. Scapus centralis, ramosus, erectiusculus, debilis, teres, glaber, $1\frac{1}{2}$ ped., vix crassitie pennae columbinae, inferne nudus, superne spathis parvis, lanceolatis, acutis. Pedicelli brevissimi; floribus erectis. Petala linearia, superne cuneiformia, obtusa, alba cum fascia longitudinali virente, ad medium usque tubum fingentia, dein bilabiato-reflexa. Stam. anteriora breviora, tubum non superantia. Germen oblongum, obtusum. Stylus crassus, brevis. Stigma capitatum.“ Bracteae longitudine pedunculi. *C. de Spin in litt. ad Balb.* *γ* e horto privato S. M. Francisci II. Vindobonae media quasi *Radulam* inter et *margaritiferam S. Dyck p. 38.* *In Prom. b. spei. 24.*

35. *A. attenuata Haw.*; foliis erecto-recurvis, subulato-attenuatis: subtus tuberculis cretaceo-margaritaceis majoribus, supra minutissimis; capsulis oblongis, triquetris. *Haw. Linn. Soc. tr. 7. p. 11.* *S. Dyck Cat. rais. p. 4.* *ALOË Radula Ker Bot. Mag. t. 1345.* (excl. syn. *Jacq.*) *HAWORTHIA attenuata Haw. Syn. p. 92.* *APICRA attenuata*; *acaul.*; fol. patulis, lanceolatis, acuminatis, supra planiusculis minutissime, subtus grosse papillosis. *Willd. Mag. l. c. p. 270. n. 9.*

(et hoc teste: *A. afr. margaritif. minor etc. Boerh. ind. 130. n. 7.*)

„Folia supra laete viridia, rugosa, minutissime margaritaceo-tuberculata; subtus saturate viridia et tuberculis margaritaceis majoribus confluentibus (transverse *Spin*) seriatim ornata; flores albo-rosei.“ *S. Dyck*. Multum affinis *Radulae*. *C. d. Spin.* Caudex nullus, annosior cespitose stolonifer. Folia radicalia, multifarie fasciculato-compacta, divaricatim divergentia, incurvula recurvulaque, lanceolato-subulata, sensim attenuata, elongato-cuspidata, plano-convexa, coriaceo-crassa, saturate viridia, subtus tuberculis eretaceo-albicantibus, muticis, majoribus laxius, supra minutioribus creberrimis radulae instar asperata, (adultiora supra laevia *Link*), $1\frac{1}{2}$ -3 poll., basi $\frac{1}{2}$ poll. lata. Caulis gracilis, crassitie fili emporii, flexilis, laxe racemosus, rufescens, pedalis. Pedicelli corollâ triplo v. quadruplo breviores, rubri. Bracteae viridulae, oblongo-lanceolatae, acutae, pedicellos aequantes vel paulo breviores. Corolla 6 striata, tubulosa, basi turgidula, ad medium usque 6-fida, revoluta-bilabiata, fere poll., basi ventricosâ viridi, tubo albido-rubescente, labio infimo quidquam depresso, laciniis divergentibus, lineari-oblongis, obtusiusculis, inarum duabus lateralibus convoluto-angustatis, omnibus albis, intus basi flavescens striâque mediâ longitudinali laete rubrâ. Stamina tubum aequantia, alternantia. Stylus germen aequans. Stigmatâ 3 minuta. Differt ab *A. margaritifera* foliis gracilioribus, valde attenuatis, interne planis, exasperatis, flavescens-viridibus; corollâ non sessili, graciliore, ad medium usque divisâ; laciniis magis divergentibus et spiraliter revolutis; caule flexili tenuiore; floribus paucioribus remotioribusque. *Gawl.* *In Prom. b. spei. 4.*

36. *A. clariperla*; foliis* subulato-acutis, undique praeclari-perlatis, perlis subtus majoribus. *Haworth* in *Phil. Mag. et Ann. of Philos. n. 15. Mart. 1828. p. 186.* (sub *HAWORTHIA clariperla*).

Media *A. attenuatam* inter et *fasciatam*; priori valde similis, sed minor, perlis longe pulchrioribus, undique magis extantibus, clarioribus, et subtus saepe fasciatim serialibus; foliis longe brevioribus sive minus attenuatis. Forte *A. fasciatae* magis affinis, praecipue magnitudine; sed differt foliis undique, (nec infra solum) perlatis. Flores ut in affinibus. *Haw.* *In Prom. b. spei. 4.*

37. *A. fasciata* *S. Dyck*; acaulis; foliis erectis, lanceolatis, acuminatis, supra planis, subtus grosse papillosis convexis; papillis fascias transversales formantibus. *Willd. Mag. l. c. V. p. 270. n. 7.* (sub *APICRA fasciata*.) *S. Dyck Cat. rais. p. 5.* (excl. β se teste in *Ols.*) *HAWORTHIA fasciata* *Haw. Revis. p. 54.* (excl. β). *HAW. fasciata* β *Haw. Suppl. pl. succ. p. 57.* (excl. synonym. se teste in *Rev. p. 54.*)

Ab *A. attenuata* imprimis differt foliis supra laevibus. Flores non vidi. *S. Pr. Salm-Dyck*. Proxima *A. granatae*; sed folia multo angustiora, supra omnino glabra, subtus verrucoso-fasciata. *Willd. l. c.* *In Prom. b. spei. 4.*

38. *A. subulata* *Salm-Dyck*; acaulis; foliis laete vi-

ridibus, erecto-patulis, strictis, a basi ad apicem attenuatis et in cuspidem triquetram longissime productis, supra convexusculis laevibus, subtus tuberculis margaritaceis parvulis transversim subfasciatis. *Salm Dyck Obs. bot.* 1822. p. 1., quo teste: *A. fasciata* β *major*; foliis multo latioribus et longioribus, supra glabris, subtus papillois; papillis minoribus et minus regulariter in fascias transversales confluentibus. *Salm-Dyck Cat. rais.* p. 5. *HAWORTHIA fasciata* β *Haw. Rev.* p. 54.

Folia fere 5 poll., basi poll. lata. Pedunculus 2 ped., ramosus: rami basi bibracteati. Flores spurce albidi; pedicelli bracteis duplo longiores. Differt ab *A. fasciata*: foliis laete viridibus, duplo triplove longioribus latioribusque; supra glabris nec nitidis; tuberculis paucioribus solitariis nec confluentibus et pedunculo ramoso. A varietatibus *A. Radulae*, quibus staturâ et inflorescentiâ proxima, differt foliis magis erectis, supra laevibus, subtus fasciatim tuberculatis. S. Pr. *Salm-Dyck.* In *Prom. b. spei.* 4.

39. *A. Reinwardti Salm-Dyck*; subcaulescens; foliis multifariis, erectis, coarctatis, acutis, rigidis, supra laevibus, nitidis, subtus striatis: tuberculis margaritaceis minutissimis distinctis longitudinaliter et transversim in lineas dispositis. *Salm-Dyck obs. bot. in Hort. Dyck.* 1821. p. 37. *HAWORTHIA Reinwardti Haw. rev.* p. 53. et, se teste: *HAWORTHIA fasciata Haw. Suppl. succ.* 57. (excl. syn. *A. fasciata Hortulan.*)

Rad. fibrosa. Caulis 3-4 poll., foliis obtectus. Folia $1\frac{1}{2}$ poll., basi 6 lin. lata, attenuata, in cuspidem excurrentia, coarctato-incurva et fere cauli adpressa, supra planiuscula, lacte viridia, subtus convexa, apice carinulata, atro-viridia, longitudinaliter nervoso-striata, striis 10-12, tuberculis instructis (unde tubercula per lineas longitudinales); tubercula margaritacea, alba, minutissima, distincta nec confluentia, transversim etiam in lineas disposita. Pedunculus simplex, pedalis, filiformis, teres, fuscus, bracteis sterilibus 2-3 instructus. Flores spicati in apice pedunculi, breve pedicellati. Pedicelli bractea latiusculâ paulo breviores. Cor. calycina bilabiata, laciniis 5 superioribus et inferioribus subrevolutis, facie et colore *A. Radulae*. Genitalia ad normam. Caps.? Differt ab *A. fasciata*: caule 4 poll., fol. coarctatis, subtus nervoso-striatis et tuberculis minutissimis distinctis, nec in fascias transversales confluentibus. *Haworth* dicit folia ovata, erecto-patula; tubercula cretaceo-margaritacea. S. Pr. *Salm-Dyck.* In *Promont. b. spei.* *D. Reinwardt.* 4.

40. *A. coarctata*; erecta; foliis incurvato-imbricantibus, sordide viridibus: intus glabris, externe maculis parvis sparsis albicantibus. *HAWORTHIA coarctata. Haw. Philosoph. Mag. et Journ.* 1824. *Octob.* p. 301.

Facies quasi inter *H. Reinwardti* et *APICRAM bullulatam*, foliis ovato-acuminatis, uncialibus, extus valde turgidis, apice carinatis, affinium more. *Haw.* In *Prom. b. sp.* *D. Bowie.* 4.

41. * *A. margaritifera* *H. Kew.*; acaulis, dichotoma; foliis 4-pollicaribus, longe ovato-acuminatis, erecto-patulis; tuberculis margaritaceis, magnis. subtus parum majoribus; florum pedicellis adultis bracteas fere aequantibus; capsulis transverse rugosis, trifarie quadratis. *Haw. Suppl. succ. p. 55.* (sub *HAWORTHIA margaritifera*). *A. acaulis*; fol. trigonis, cuspidatis, papillosis; floribus racemosis, cernuis, cylindricis. *Hort. Kew. ed. I. p. 468. 2. ed. II. p. 501. Willd. Spec. II. p. 188. Mill. Dict. ed. 8. n. 14. Salm-Dyck Cat. p. 5. Bot. Mag. 1360. A. pumila Thunb. diss. n. 8. Prodr. 61. Fl. cap. ed. Schult. p. 311. APICRA margaritifera*; acaulis; fol. erectiusculis, ovatis, acuminatis, mucronatis, apice obtuse triquetris, supra planiusculis, utrinque grosse papillosis; scapo ramoso; bracteis pedicello florum longioribus. *Willd. Mag. 5. p. 269. n. 5. (quoad β). β major. A. marg. β major*; fol. 4-pollicaribus: papillis magnis. *Willd. Mag. l. c. Dec. Pl. gr. t. 57. A. Haw. Linn. Trans. 7. p. 11. Hort. Kew. (utriusque edit.). Willd. Spec., Salm Dyck, Bot. Mag. II. cc. HAWORTHIA major Duv. h. alenc. p. 7. Haw. Syn. 92. A. pumila margaritifera a Linn. Spec. 460., quo teste: Commel. Hort. II. p. 19. t. 10. (a *Haworth* melius ad maximam i. e. semimargaritiferam a ducta). *Bradl. Succ. 3. p. 1. t. 21. (a Haworth cum?; in Hort. Kew. ad calcem varietatum).**

In β flores virides; bracteae pedicello breviores. *S. Dyck.* Caulis ramosus; racemus erectus, laxis; bracteae ovato-acutae, subundulatae; pedicelli corollâ multo breviores; cor. tubulosa, basi subventricosa, 6 striata, ad quartam partem circiter bilabiata: laciniis superioribus magis erectis, imbricato-convergentibus, mediâ latiore, inferiorum lateralibus convoluto-angustatis, recurvatis; stamina tubo inclusa; stylus crassus, brevis, stigmatibus subtrilobo. *Gawl. B. Mag. l. c. In Prom. b. spei. t.*

Obs. Antiquissimam hanc speciem plurimis varietatibus gaudere, et subdividi posse in sectiones duas, quarum altera foliis utrinque, altera subtus tantum papillosis: *S. Dyck p. 39. Thunberg* quoque, sub eadem diagnosi *pumilae*, quâ *Hort. Kew. de margaritifera* utitur, in *Fl. cap. l. c.* nequidem et β γ *margaritiferae* ultra describit, et tantum in genere de specie addit: „Folia radicalia plurima aggregata, caulem vix formantia, valde carnosâ, oblonga, setâ pellucidâ acuminata, undique albo-papillosa, erecto-patentia, digitalia. Scapus angulatus, flexuoso-erectus, simplex vel ramosus. Flores bracteam minutâ sub singulo pedicello.“

42. *A. minor*; foliis subquadriuncialibus, suberecto-patulis, longe oblongo-acuminatis; tuberculis margaritaceis submediocribus, subserialibus, subtus parum majoribus; florum pedicellis bracteas aequantibus; capsulis trifarie oblongis. *Haw. Suppl. succ. p. 56.* (sub *HAWORTHIA minore* uti in *Synops. p. 92. Duv. Hort. Alenc. p. 7. ALOË margaritifera β minor Ait. Kew. 1. p. 468. ed. II. p. 501. Willd. Spec. II. p. 188. Haw. Trans. Linn. Soc. 7. p. 11. Bot. Mag. t. 815. S. Dyck Cat. rais. p. 5. Gaertn. sem. 67. t. 17. Blair's*

Bot. Ess. t. 1. (fig. dextr. inf. ob caps.) *A. margaritifera*; acaulis; foliis patulis, ovatis, obtuse subtrigonis, utrinque grosse papillois, scapo ramoso, corollis subsessilibus, infundibuliformibus. *Willd. Enum. p. 386.* *A. pumila margaritifera* β *Linn. Spec. p. 460.* *A. margaritifera B. media Dec. pl. gr. 57.* *APICRA margaritifera* γ *minor*; fol. subtripollicaribus, papillis minoribus. *Willd. Mag. l. c. Dill. Elth. 19. t. 16. f. 17. Commel. Hort. 2. p. 21. t. 11.* (uterque fide *Linn.*)

„An *A. dichotoma*? An externe sobolifera?“ *Haw. Dillenius* bracteas pedicello aequales, *Ser. Princ. S. Dyck* vero longiores, floresque albo-roseos dicit. — „Folia 1-5 poll. Scapus ramosus, purpurascens, 2-3 ped., ramis erectis, sparsis. Flores in racemo laxo sessiles, pallide purpurascenti-virides, striâ longitudinali viridi, semipollicares vel parum ultra, bractea rubicundâ duplo brevior: lacinae corollae concretae, superne reflexo-patentes: 3 exteriores planae, interiores apice subcanaliculatae. Stamina aequalia. Stylus brevis. Stigma simplex.“ *Gawl. l. c. In Promont. b. spei. h.*

Obs. Mirum, in *Bot. Mag. 1330* synonyma *Commelyni* in β et in α *Willd. Spec.* et excludi simul, et laudari. *A. margaritifera Dec. pl. grass.* a *S. P. Salm-Dyck* laudatur ad *A. margaritifera* γ ; a *Bot. Mag.* ad β ; a *Hort. Kew.* ad α ! *Haworth* eandem ad *A. erectam* trahit.

43. *A. erecta*; foliis erectis, strictis; senectis incurvo-erectis, tripollicaribus, longe ovatis, saepe abrupte acuminatis attenuatisve; tuberculis margaritaceis mediocribus; florum pedunculis bracteas superantibus, laciniisque corollae acutis. *Haworth Suppl. pl. succ. p. 56.* (sub *HAWORTHIA erecta*, uti in *Rev. p. 55.*, ubi nunc „*H. externe sobolifera*; foliis stricto-patulis, subquadri-pollicaribus, longe ovato-acuminatis, tuberculis margaritaceis majoribus.“) *A. margaritifera*; acaulis; fol. subtrigonis, acuminatis, tuberculis cartilagineis undique adpersis. *Decand. pl. gr. t. 57.* (fide *Haw.*; a *S. P. Salm Dyck* ducitur ad *A. margaritifera* γ s. *A. granatam*.) *A. margaritifera* β *Willd. Enum. p. 386.* (quatenus laudat *Decand. t. 57.* Sed hanc serius ad *granatam* laudavit).

„*Margaritiferae* nostrae simillima, et fere ejusdem magnitudinis, foliis parum angustioribus; sed discrepat sobole copiosa parvâ externâ basin versus, ut in *A. granata*, a qua longe differt staturâ et margaritis.“ *Haw. Clo Sprengel* synonymon *A. papillosae* *S. Dyck* in *S. V. 2. p. 69.* *In Prom. b. spei. 4.*

44. *A. brevis*; externe sobolifera; foliis subbiuncialibus, patulis, ovato-acutis; tuberculis maximis margaritaccis; bracteis latissimis pedicellos superantibus. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 57.* (sub *HAWORTHIA brevis*.) *A. margaritifera* γ *minima* *Bot. Mag. 1360.* (bona; nec aliorum. *Haw.*)

„Differt a *minore* et *erecta*: foliis brevioribus magis patulis tuberculisque pulchrioribus. Capsulae abbreviatim trifarie quadratae.“ *Haw.* Folia atroviridia, tuberculis majusculis glaucescenti-albis, $\frac{3}{4}$ poll. latis. Caulis e lilacino glaucescenti-albidus. Brac-

teae albae, striâ longitudinali basique roseae, $\frac{1}{3}$ poll.; pedicelli virides, brevissimi. Cor. $\frac{3}{4}$ poll., viridi-alba, striâ mediâ viridi-fuscâ. *Gawl.* In *Prom. b. spei.* 4.

45. *A. granata*; externe sobolifera; foliis subbiuncialibus, subpatulis, ovato-acuminatis; tuberculis parvis, numerosissimis; bracteis pedicellos suboblitteratos longe superantibus. *Haw. Suppl. succul.* p. 57. (sub *HAWORTHIA granata*).

APICHA granata; acaul.; fol. patulis, ovatis, acutis, mucronatis, apice obtuse triquetris, supra planiusculis, utrinque grosse papilloso; scapo ramoso; bracteis pedicello brevioribus.

Willd. Mag. 5. p. 269. n. 6. *ALOË margaritifera* γ *minima*; fol. brevissimis, papillis minimis; bracteis pedicello brevioribus; floribus albis. *Salm Dyck Cat.* p. 5. *Haw. Trans.*

VII. p. 11. *Hort. Kew.* utr. edit., *Willd. Spec.* II. cc.

A. marg. *C. minima* *Dec. pl. gr. t.* 57. *HAWORTHIA minima*

Haw. Syn. p. 92. *A. pumila margaritifera* γ *Linn. Spec.*

p. 460. *Dillen. Elth.* t. 16. f. 18. β . *polyphylla*; fol.

duplo numerosioribus, margaritis crebrioribus. *Haw. Rev.*

p. 203.

Caps. trifarie quadrata transversim rugosior, quam in prioribus.

Haw. Suppl. l. c. qui e seminibus cultam persistere, et neque hanc, neque *semiglabrata* sobolem ullam lateralem proferre.

APICHA granata *Willd.* (ad quam in *Mag.* laudat *A. margaritifera* *Dec. pl. gr. t.* 57., prius a se in *Enum.* ad *A. margaritifera* β ductam) clo *Sprengel S. V.* p. 69. synonymon *A. margaritiferae.* In *Prom. b. spei.* 4.

46. *A. semiglabrata*; acaulis, dichotoma; foliis atro-viridibus, erecto-expansis, tripollicaribus, ovatis, longe acuminatis, mucronatis: supra late irregulariter areis glabris, subtus margaritaceo saepius tuberculatis; pedicellis antiquis florum bracteas aequantibus. *Haw. Suppl. pl. succ.* p. 55. (sub *HAWORTHIA semiglabrata*.)

Olim varietatem *margaritiferae* credidi; sed videtur alia margaritis varie evanescentibus foliisque undique minus papilloso, saturatioribus, deorsum saepius glabris. Capsulae trifarie quadratae. *Haw. l. c.* qui a *D. Hitchin.* Clo *Sprengel S. V.* 2. p. 69. synonymon est *A. hybridae* *S. Dyck.* In *Prom. b. spei.* 4.

47. *A. semimargaritifera* *S. Dyck*; foliis erectiusculis: senioribus horizontalibus, ovatis, mucronatis, supra convexiusculis glabris, subtus margaritaceo-grosse papilloso, apice carinatis, triquetris. *S. Dyck Cat. rais.* p. 6. *HAWORTHIA*

semimargaritifera; acaulis, (dichotoma?); foliis 3-4-pollicaribus, erecto-horizontalibus, ovato-acuminatis, cuspidatis, superne carinato-triquetris, supra convexulis, saepissime glabris, subtus margaritaceo-maxime papilloso, marginibus carinâque grosse margaritaceo tuberculatim crenatis. *Haw. Suppl. pl. succ.* p. 54. α . *maxima*; subcaulescens; foliis tripollicari-

bus; papillis maximis, subserialibus, margine carinâque frequentioribus. *S. Dyck* l. c. *A. margaritifera, maxima* *Haw. Linn. Soc. Tr. 7. p. 11. Suppl. l. c. HAWORTHIA maxima* *Haw. Syn. p. 91. n. 6. Duval H. alenc. p. 7. A. africana* *Commel. H. amst. 2. p. 19. t. 10. (fide Haw.)* β . *major*; acaulis; foliis tripollicaribus; tuberculis paucis majoribus. *S. Dyck* l. c. γ . *minor*; acaulis; foliis subtripollicaribus; tuberculis numerosis parvis. *S. Dyck* l. c. (spectare ad *Radulam Balb. in. litt.*) δ . *multiperlata*; foliis rigidis, quadriuncialibus, ovatis, longe acuminatis attenuatisve, superne arcte carinatis, undique margaritis maximis longe extantibus, valde numerosis, subserialibus, marginibus margaritato grosse alteque crenatis. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 54.*

„Foliis perfecte glabris magis patentibus magisque obtusis a *margaritifera* differt.“ „In β folia supra plerumque glabrata; at subinde perlac adsunt. δ differt a ceteris varietatibus paginâ superiore non glabrâ, sed tuberculatâ, praecipue apicem versus: in omnibus varietatibus foliorum margines carinaeque insigniter margaritaceo-crenatae. Capsulae? Flores?“ *Haw. In Prom. b. spei. 4.*

Obs. Jam *Willdenow* sub *APICRA margaritifera maxima* (quae *A. papillosa*) monuit auctores plurimos a *Haworth* ad *margaritifera maximam* (quae *semimargaritifera* α) laudatos ad *A. africanam* folio in summitate triangulari margaritifero, flore subviridi *Commel. Hort. 2. p. 19. t. 10.* pertinere, quae illi species ab omnibus diversa et hucusque praetervisa; nam folia facie glabra sine verrucis.

48. *A. papillosa* *S. Dyck*; caule pedali et ultra; foliis dodrantalibus, attenuatis, erectis, papillis maximis, albis, saepe centro depressis, undique subseriatim ornatis; pedunculo ramoso; bracteis pedicello brevioribus; floribus virescentibus. *S. Dyck Cat. rais. p. 7. Link Enum. 1. p. 356.* *APICRA margaritifera maxima* fol. dodrantalibus, papillis magnis. *Willd. l. c. p. 269. n. 5. HAWORTHIA papillosa* *Haw. Suppl. pl. succ. p. 58.* β *semipapillosa*; fol. supra laevibus, sordide viridibus. *Haw. Revis. p. 55.*

„Omnium hujus sectionis maxima.“ *S. P. Salm Dyck. An hujus sectionis? Haw. In Promont. b. spei. 4.*

49. *A. hybrida* *S. Dyck*; foliis spiraliter multifariis, ovato-lanceolatis: junioribus patulis, supra convexiusculis, rugosis, subtus tuberculatis: tuberculis parvis, viridibus. *S. Dyck Cat. rais. p. 7. HAWORTHIA hybrida* *Haw. Revis. p. 51.* „Ex horto *S. M. Francisci* I. privato, hybrida quasi ex *margaritifera* et *tortuosa* vel *pseudo-rigida*.“ *S. Dyck l. c. In Prom. b. spei. 6.*

β . *Caulescentes.*

50. *A. aspera* *Haw.*; foliis trifariis, orbiculato-ovatis, acuminatis, viridibus, supra concaviusculis, subtus valde tuberculatis; (caule stricto.) *Haw. Linn. Soc. Trans. 7. p. 6. S. Dyck Cat. rais. p. 7. H. Kew. ed. 2. II. p. 299. Ha.*

WORTHIA aspera Haw. *Syn.* p. 90. *APICRA aspera*; caulescens, stricta; fol. trifariis, patulis, orbiculato-ovatis, carinatis, acutis, supra concavis, subtus dense papillosis. *Willd. Mag. l. c.* p. 274. n. 27. Ap. fol. adultis trifarie spiraliter subirregularibus, orbiculato-ovatis, subacuminatis, pallide viridibus: supra concavis laevibus, subtus tuberculis viridibus validis numerosis sparsis; perigonio cylindrico laevi. *Haw. Suppl. pl. succ.* p. 63. α . *minor*; foliis pallide viridibus duris. *Haw. Suppl.* β . fere duplo major. *Haw. Suppl.*

„Folia spiraliter trifaria: juniora supra subconcava, seniora convexiuscula; tubercula viridia.“ *S. Dyck*; qui in *litt.* ad *elm Haworth*: „pedunculum simplicem, perigonium ut supra, limbum regularem patulum, stylum staminaque inclusa.“ Varietates α et β forte species esse distinctas ob tuberculorum nervorumque differentiam. *Haw. Rev.* p. 202. In *Prom. b. spei.* h.

51. *A. bicarinata*; foliis submultifariis, cordatis, induratis, saturate viridibus, bicarinatis: supra laevibus, subtus tuberculis elevatis sparsis atro-viridibus; marginibus carinisque crebre tuberculato-asperrimis. *APICRA bicarinata* Haw. *Suppl. pl. succ.* p. 63.

Simillima *asperae*; at folia fere triplo majora, colore saturatiore, carinulis duabus marginibusque induratissime irregulariter tuberculato-asperrimis. *Haw. l. c.* In *Prom. b. spei.* h.

52. **A. viscosa*; foliis trifariis, ovatis, acutis, perviridibus, minime tuberculatis; caulibus strictis, simplicibus. *Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 6. *Thunb. Diss.* n. 13. *Prodr.* 61. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 312. *Linn. Spec.* p. 460. *Willd. Spec.* II. p. 191. *Mill. Dict.* n. 11. *H. Kew. ed.* 2. II. p. 299. *S. Dyck Cat.* p. 8. (excl. β .) *Decand. Pl. gr.* t. 16. *Bot. Mag.* t. 814. *A. caulescens*; fol. imbricatis, trifariis, ovatis, trigonis, inermibus; racemo simplici; corollis infundibuliformibus; laciniis limbi reflexo-patentibus. *Willd. Enum. H. Berol.* p. 384. *HAWORTHIA viscosa* Haw. *Syn.* p. 90. *APICRA viscosa*; caulescens, stricta; fol. trifariis, erecto-patentibus, ovatis, trigono-carinatis, acutis, supra concavis, glabris. *Willd. Mag. l. c.* p. 274. n. 25. *AL. triangularis* Lam. *Enc.* I. n. 18. *Med. bot. Beob.* 1785. p. 61. *Commel. Prael.* 82. t. 31. *Dill. Elth.* 15. t. 13. f. 13. *Till. Pis.* 17. — α *major*; fol. saepe remotioribus quam in β *Haw. Rev.* p. 49. β *minor*; fol. confertioribus, minus crassis: junioribus magis erectis magisque acuminatis *Haw. l. c.* γ *parvifolia*, fere duplo angustior; fol. duplo minoribus densiusque imbricatis. *Haw. l. c.*

Thunberg describit spontaneam „subcaulescentem; caulem totum foliis tectum, palmarem. Folia trifariam exstantia, acuta, supra canaliculato-concava, subtus versus apicem compresso-carinata, integra, patentia, pollicaria.“ In culta caudex 4-8

poll.; folia inferiora imbricato-erecta, superiora patentia et fere horizontalia. Scapus purpurascens, vel griseus, debilis, ped., superne squamosus. Flores graciles, distantes, sparsi, 8 lin., suberecti; tubo albo, viscoso, rubro-striato; laciniis concretis, bilabiatis, 5 reflexis, summâ erectâ, albido-virentibus, striâ longitudinali rubicundâ. Pedicelli breves, erecti, dein cernui; bracteis fuscis pedicello brevioribus. Stamina inaequalia, inclusa, longiora stylo filiformi. Antherae subrotundae, rubescentes, polline albo. Stigma simplex, obtusum. Germen virens. Caps. subcylindrica, sexsulca. *Dec. et Gawl.* Caulis basi prolifer, pedunculo simplici filiformi. *S. Dyck.* Folia saepe disticha. *Balb. in litt.* Flores spicati, distantes, in nostro climate nunquam viscosi. Bractee longitudine tertiae partis pedunculi. *C. de Spin in litt. ad Balb.* *In Promont. b. spei. h.*

53. *A. concinna*; foliis concinne trifariis, densissime imbricatis, biuncialibus, patulis, cuspidate obtusâ superne recurvatis, pallescente viridibus. *Haworth Suppl. pl. succ. p. 59.* (sub *HAWORTHIA concinna*.) *A. viscosa* β *major*; lateribus duplo latioribus; foliis magis confertis, et densissime imbricatis. *S. Dyck Cat rais. p. 8. n. 20.*

„Duplo fere *viscosâ* major, foliis pallidioribus, magis recurvatis, nec exacte horizontaliter expansis, 1½ poll., atrovirentibus, cuspidate acutâ ut in *A. viscosa*. *A. curtae* forte magis affinis; sed foliis non spiraliter tortis. *Haw.* Clo *Sprengel* synonymon *A. viscosae* in *S. V. 2. p. 70.* *In Prom. b. spei.? h.*

54. *A. cordifolia*; foliis rigidissimis, cordato-amplexicaulibus, crassissimis, atroviridibus, superne carinatis, asperiusculis, distincte marginatis: marginibus asperis. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 60.* (sub *HAWORTHIA cordifolia*).

Viscosae simillima; at foliis uncialibus cordatis, supra fere planis, tantillum concavis et 3-4 lin. crassis, obtusioribus et cum mucrone obtuso brevissimo rigidissimo. Foliorum asperitas e tuberculis minutis crebris viridibus sub lente solum conspicuis. *Haw.* *In Prom. b. spei. h.*

55. *A. asperiuscula*; foliis rigidissimis, orbiculato-cordatis, subacutis, angulatim a centro arcte inflexis, atro-viridibus, marginulatis, superne asperiusculis, margine aspero. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 60.* (sub *HAWORTHIA asperiuscula*).

„*Cordifoliae* simillima, at triplo minor; foliis minus crassis et magis angulatim inflexo-canaliculatis et aliquantillum acutioribus. Vix varietas minor *A. viscosae*; folia nempe longe crassiora, minor, rotundiora, et minus angulatim inflexa quam in illa.“ *Haw.* *In Prom. b. spei. h.*

56. *A. parva*; foliis cordato-acutis, subretusis, recurvulis, ciliis minutissimis respicientibus albis, apice subtesselatis. *HAWORTHIA parva Haw. Philos. Mag. et Journ. 1824: Octob. p. 301.*

Folia involuto-concava, extus nigro-viridia, tuberculata, aspera, intus pallidiora, glabra: in retusa parte supra lineolis elevatis subinterruptis tessellatis saturatoribus. *H. asperiusculae* for-

tasse proxima (at nunc omnino acaulis) potiusve pone priorem, sed longe minor. *Haw.* An hujus sectionis? *In Prom. b. sp. D. Bowie.* †.

57. *A. indurata*; ramulosa; foliis trifariis, patulis, compresso-cavis, cordato-acuminatis, asperis, atro-viridibus, induratissimis: senectis recurvo-expansis, unisulcatis, crassioribus. *HAWORTHIA indurata Haw. Revis. p. 49.*

Affinis *viscosae*; at foliis magis patulis, minus macris. Affinior forte *pseudo-tortuosae Salm*, quam non satis vidi. *Haw. In Prom. b. spei.* †.

58. *A. subtortuosa*; caulescens, tortuosa; foliis trifariis, spiralibus, imbricatis, patulis, ovatis, trigono-carinatis, acutis, apice subreflexis, supra concavis, glabris. *Willd. Mag. l. c. p. 274. n. 26.* (sub *APICRA tortuosa*.) *A. pseudo-tortuosa S. Dyck Cat. rais. p. 8. p. 41. Link Enum. 1. p. 336. HAWORTHIA pseudo-tortuosa Haw. Suppl. pl. succ. p. 59.*

„Flores *AL-viscosae*. Haec, et *viscosa* β , frequentes in hortis belgicis, a *viscosa* differunt, altera: caule minus elevato, foliis duplo longioribus adeoque imbricatis, ut vix margo superioris folii inferioris marginem excedat; altera: foliis spiralibus; unde commutata cum *tortuosa Haw.* a divo *Willdenow*.“ *S. Dyck l. c. Viscosae* simillima; at duplo major. *Haw. Suppl.* Forte non distincta species. *Haw. revis. p. 50.* Clo *Sprengel* synonymon *A. tortuosae Haw.* in *S. V. 2. p. 70.* *In Prom. b. spei.* †.

59. *A. torquata*; foliis trifariis, subpatulo-recurvulis, sordide viridibus, asperiusculis; caule torquato. *Haw. in Philos. Mag. et Ann. of Philos. 1827. Febr. p. 123.* (sub *HAWORTHIA torquata*).

„Nomine *A. pseudo-tortuosae* var. a Ser. Princ. *Salm-Dyck* accipi. Sed magis approximatur *H. pseudo-rigidam Salm-Dyck*; folia quam in ea rectiora, laeviora, pallidiora. Simulat etiam *tortuosam*; sed folia minus recta, pallidiora, subtus tuberculis longe minoribus, sub lente tantum visibilibus, longe numerosioribus.“ *Haw. In Prom. b. spei.* †.

60. *A. subrigida*; caulescens; foliis spiraliter trifariis, cuspidatis, patentibus, apice recurvatis, undique tuberculis minutis rugosis; pedunculo simplici ramosove; floribus laxe spicatis; bracteis pedicello florum paulo brevioribus. *S. Dyck Cat. rais. p. 9. et 41.* (sub *A. pseudorigida*). *HAWORTHIA pseudorigida. Haw. Suppl. succ. p. 62.* *APICRA rigida*; caulescens; foliis imbricato-patulis, subreflexis, ovatis, apice triquetris, papilloso-scabris, supra concavis, apice crenulatis. *Willd. Magaz. V. p. 272. n. 19.* (excl. syn. praeter *Willd. En.* (ubi laudat *A. spiralem* β *Spec. II. p. 191.* quae iterum excludenda, ad *pentagonam* se teste in *Mag.* spectans) et forte *Jacq. Fragm. t. 108*).

„Pedunculus filiformis; lacinae corollae undulatae. Olim in *H. Dyck rugosa* dicta. Foliis manifeste trifariis a *rigida Dec.* di-

stincta." *S. Dyck*. „Vix APICRA, ob habitum fere *tortuosae*." *Haw. Revis.* p. 202. *Clo Link En.* 1. p. 336. etiam omnino eadem cum *A. tortuosa S. Dyck*. *In Prom. b. spei.* h.

Obs. Willdenow l. c. ad *A. rigidam* suam laudat *Decand. pl. gr. t. 63.* et *Jacq. Fragm. t. 108.* cum *A. expansa Haw.*. Planta *Jacquini*, ab aliis non laudata, cum diagnosi data a *S. Princ.* melius quadrare videtur, quam cum *A. rigida Dec.* „Caulis“ in *Jacquiana* „successivo pedalis. Folia densissima, ovato-lanceolata, rigidissima, mucronata, pungentia, virentia, intus basi glabra nitidaque, ceterum intus extusque et ad oras punctis exasperata, dorso convexa, erecto-patula, 1½ unc., spiraliter disposita. Scapus 1-2 • foliorum summorum centro, simplex vel ramosus, primum erectus, dein reclinatus, vix crassitie pennae columbinae, saepe 2 poll. Pedicelli breves; bracteolâ sublineari. Flores erectiusculi; tubus cylindricus, sulcatus, sordide viridulus. Limbi bilabiati lacinae 6, albidae, patenti-reflexae, tubo duplo breviores, alternae breviores. Filamenta tubo breviora, alterna graciliora longioraque.“

61. *A. rigida Dec.*; foliis inermibus, cespitosis aut subspiralibus, patulis, rigidis, lanceolatis, acutis. *Dec. pl. grass. t. 62.* *H. Kew. ed. 2. II. p. 298.* (quâtenus hac diagnosi utitur: excl. syn. *Bot. Mag. t. 1337.*) *A. rigida β major Salm Dyck Cat. rais. p. 9.* *A. cylindracea β rigida Lam. Enc. l. p. 89.* (fid. *Decand.*, qui coli in *H. paris.* nomine *A. rigidae*). APICRA *expansa*; caulescens; fol. multifariis, ovatis, acuminatis, imbricato-patulis, tenuissime scabris, supra concavis, margine cartilagineis, integerrimis. *Willd. Mag. l. c. p. 372. n. 18.* (fide *S. Dyck*, qui Berolini vidit). HAWORTHIA *rigida Haw. Rev. p. 49.* HAWORTHIA *expansa β paulo major.* (fide *Salm Dyck*).

Rad. suffruticosa, ramosa, crassiuscula, rubescens. Caulis o, saepe palmaris, foliis omnino obtectus, simplex, erectus, suffrutescens. Folia sessilia, subamplexicaulia, lanceolata, acuta, pungentia, patula, superne plana, inferne valde convexa, atro-viridia, tuberculis concoloribus minimis subrugosa, dura, rigida, circa caulem spiralia in senioribus, cespitosa in junioribus. Pedunculus floralis e foliis cylindricus, gracilis, debilis, griseus, bracteis quibusdam lanceolatis. Flores longe racemosi, distantes, in quincunce, pedicello brevi, basi bracteati. Cor. tubulosa, bilabiata, hexapetala; petalis coalitis, oblongis, apice patulo-revolutis, virentibus, limbo albicantibus. Filamenta recta, corollae tubo aequalia, receptaculo inserta, albida, inaequalia: antheris erectis, polline albido. Germen cylindricum, sexsulcum, virens. Stylus albidus, erectus, cylindricus, crassiusculus: stigmatibus albo, trigono, subcapitato. Caps. trilocularis, trivalvis, cylindrica. Semina numerosa, biserialia. Distincta videtur a *spirali* foliis non genuine spiralibus, semper patulis; floribus non transverse rugosis. *Dec.* „Affinis certe *H. expansae*; at alia foliis duplo majoribus, longioribus. *Haw. Rev. l. c.*“ *A. cylindracea (imbricata)* quidquam minor; differt etiam ab hac foliis horizontaliter patulis. *Lam.* *In Promont. b. spei.* h.

62. *A. tortuosa Haw.*; foliis spiraliter trifariis, patulis, nigricantibus, externe minime tuberculatis; caule valde tortuoso. *Haw. Trans. Linn. Soc. 7. p. 7.* *H. Kew. ed. 2. II. p. 298. n. 27.* *Jard. de St. Sebastien. De Spin p. 23.* *S. Dyck Cat. rais. p. 8.* ALOE *rigida Bot. Mag. t. 1337.*

(excl. syn. *A. expansae* Haw., et toto coelo diversae rigidae Decand. monente Haworth, quae tamen laudatur ad rigidam in H. Kew.) HAWORTHIA tortuosa Haw. Syn. p. 90. β . major; foliis longioribus. S. Dyck l. c.

„Folia supra glabra, pedunculus plerumque simplex, „(in adultioribus ramosus, *De Spin*);“ bractee longitudine pedicelli.“ S. Dyck l. c. Flores magis, quam in *viscosa*, approximati. *De Spin. in litt. ad Balb.* Caudex subnullus vel palmaris, imbricato-foliosus. Folia multifaria, oblongo-acuminata, carinato-cuspidata, coriaceo-crassa, atrovirentia, pustulatum corrugata, recurvato-divaricata, supra convoluto-concava, infra convexa, 2-3 poll., poll. lata. Caulis simplex, nudus, ped., tenuis, virescens. Racemus sparsus, rariusculus. Pedicelli corollâ triplo breviores, patentes, glaucescentes, $\frac{1}{3}$ poll. Bractee albido-virentes, lineari-lanceolatae, pedicellis fere duplo breviores. Cor. bilabiato-tubulosa, basi ventricoso-gibba, 6-striata, externe vires striis albis obsolete, poll., ad $\frac{1}{3}$ 6-fida; laciniis 3 superioribus convergentibus, recurvato-erectis, planioribus, obtusatis; inferioribus divergentibus, revoluto-deflexis, canaliculatis, albis, fasciâ mediâ viridi, apice rubrâ. Stamina subdeclinata, alterne breviora, tubum aequantia. Stylus staminibus subduplo brevior. Stigma obtusulum, obsolete puberulum. Gawl. In *Prom. b. spei.* h.

Obs. HAWORTHIA *tortella*: foliis confertis, spiraliter trifariis, sesquiuncialibus, nigricantibus, externe minime tuberculatis; caule praetortuoso basi valdeque ramoso. Haw. *Suppl. pl. succ.* p. 61. (quae simillima *tortuosae*; at omni parte minor: foliis longe numerosioribus, brevioribus, cauleque superne minus ramoso: forte mera seminalis varietas minor, asperior, foliosior. Haw. In *Prom. b. spei.*) et

HAWORTHIA *curta*; foliis spiraliter trifariis, subuncialibus, patulis, subaequilateraliter triangularibus, nigro-viridibus, supra concavis et granulatim valde exasperatis; caule brevissimo. Haw. *Suppl. pl. succ.* p. 61. (quae *tortuosae* humilior; foliis longe brevioribus forteque saturatoribus. Haw. In *Prom. b. spei.*) nunc ipsi auctori in *Rev.* p. 50. nil nisi varietates culturâ natae videntur. Sprengel in *S. V.* 2. p. 69. vero *A. curtam* specie ab *A. tortuosa* distinguit.

63. *A. expansa* Haw.; subacaulis; foliis multifariis, viridibus, immaculatis: junioribus patulis; senioribus horizontalibus, rugosiusculis. Haw. *Trans. Linn. Soc.* 7. p. 8. *A. rigida* Salm Dyck *Cat. rais.* p. 9. HAWORTHIA *expansa* Haw. Syn. p. 91. (excl. syn. *Decand.*) APICRA *patula* Willd. *Mag.* p. 272. n. 17. (fide Salm Dyck (qui Berolini vidit)).

„Pedunculus ramosus; bractee pedicello longiores.“ S. Dyck l. c. Clo Sprengel *S. V.* 2. p. 70. synonymon *A. rigidae* Dec. In *Prom. b. spei.* h.

Obs. Willdenow l. c. ad APICRAM *patulam*; subcaulescentem; fol. multifariis, oblongo-lanceolatis, patentibus, apice triquetris, cuspidatis, utrinque glabris, tenuissime punctatis, citat *Al. pertusam* Haw. et *Al. afr.* glabro folio, minutissimis cavitatibus donato *Comm.*, utramque tamen cum? Proxima illi est *A. expansae* suae (*rigidae* Dec.); sed foliis longioribus, glabris, magis recurvis diversa. Dubitat de synonymo *Commel.*, cum folia vix cavitatibus ornata

b. Corollis cylindraceutis, limbo regulari.

64. *A. foliolosa* Haw.; foliolis multifariis brevissimis, confertissimis, orbiculato-ovatis, laevigatis, horizontalibus, laete viridibus; caule stricto. HAWORTHIA *foliolosa* Haw. Syn.

Syn. p. 99. *ALOE foliolosa* Haw. Linn. Soc. tr. 7. p. 7.
 Hort. Kew. 2. ed. II. p. 298. S. Dyck Cat. rais. p. 9.
 Bot. Mag. t. 1552. *APICRA foliolosa*; caulescens, stricta;
 fol. multifariis, patentibus, orbiculato-ovatis, carinatis, acutis,
 margine carinâque incrassatis, apice recurvis, glabris. Willd.
 Mag. l. c. p. 274. n. 28.

Affinis *A. spirali*. Caudex totus imbricato-foliatus. Folia pluri-
 faria, squamiformia, omnium minima tenerrimaque, ovato-acu-
 minata, transversim latiora, parum crassa, rigida, glabra, ju-
 niora perobsolete denticulata, superne patula, caudicem ab apice
 ad basin squarrose loriantia, obscure viridia, $\frac{1}{2}$ poll., basi di-
 latatâ poll. fere lata. Caulis simplex, filiformis, flexilis, sordide
 violaceus. Racemus laxus. Flores e minoribus, erecti, regula-
 res. Bractee albo-virides, longitudine pedicellorum, cauli con-
 colorum, corollâ duplo breviorum. Corolla recta, cylindræa
 angulis rotundatis, $\frac{1}{2}$ poll., extus sordide virens rubro mixta,
 ore brevissimo, patulo, laciniis intus candidis striâ mediâ viridi.
 Stamina inclusa. Antherae flavae. Gawl. In Prom. b.
 spei. h.

65. *A. nigra*; foliis multifariis, horizontalibus, confer-
 tissimis, cordato-acutis, verrucoso-rugosis, atro-viridibus.

APICRA nigra Haw. Philos. Mag. et Journ. 1824. Octob. p. 302.

A. foliolosae proxima. Folia involuto-concava, undique scaberrima,
 margine tuberculato. Suffrutex erectus, nunc trientalis solum et
 induratissimus. Inter *APICRAM foliolosam* et *asperam* locanda.
 In Prom. b. spei. D. Bowie. h.

66. *A. imbricata* Haw.; erecta, teres; corollis rugosis;
 foliis multifariis, erectiusculis, laevigatis, immaculatis. Haw.
 Linn. Soc. tr. 7. p. 7. S. Dyck Cat. rais. p. 10. *A. spiralis*
 Thunb. diss. n. 14. prodr. 61. Fl. cap. ed. Schult. p. 312.
A. subcaulescens; fol. inermibus, ovato-acutis, imbricatis,
 octofariis, adpressis; floribus cylindricis, transverse rugosis.
 Decand. pl. grass. t. 56. Jacq. Fragm. p. 72. f. 110. *A.*
 fol. spiraliter imbricatis, ovatis, acuminatis, laevibus; corollis
 transversim rugosis, subsessilibus; caule stricto. Hort. Kew.
 ed. 2. II. p. 298. Bot. Mag. t. 1455. *A. caulescens*; fol.
 imbr., octofariis, ovatis, apice trigonis, inermibus, glabris;
 floribus spicatis; corollis tubulosis: limbo 6-dentato, obtuso,
 erecto. Willd. Enum. p. 584. *A. spiralis a imbricata* Hort.
 Kew. ed. 1. p. 471. Willd. Spec. II. p. 191. Mill. dict.
 ed. 1. n. 19. ed. 8. germ. n. 12. *A. cylindræa a* Lam. Enc.
 I. p. 89. Mill. ed. 7. n. 12. *HAWORTHIA imbricata* Haw.
 Syn. p. 98. n. 25. *APICRA imbricata*; caulescens, stricta; fol.
 multifariis, erectis, imbricatis, ovatis, acutis, apice trique-
 tris, glabris; corollis transversim rugosis. Willd. Mag. n.

20. Dill. Elth. t. 15. f. 14. Commel. prael. t. 32.

„Pedunculus simplex; corolla brevissime pedicellata, cylindrico-
 hexagona, angulis papillose denticulatis.“ S. Dyck l. c. „Cor-
 hirta;“ Haworth l. c. qui, quid *A. spiralis* Linn., non liquere

satis. *Thunberg* describit spontaneam: „caulis totus tectus foliis, debilis, cernuus, spithamaeus. Folia sex-vel octofariam exstantia, acuta, subtus valde convexa, carinâ longitudinali, supra convexiuscula, integra, laevia, erecto-patentia, pollicaria.“ In culta caudex „(basi stolonifer)“ pollicaris pedalisve, simplex; folia $1\frac{1}{2}$ poll., basi pollicem lata „(lanceolata, acuminata, mucronata, pungentia, totum caulem amplexantia, rigida, dense imbricata, *Jacq.*)“, sparsa, subinde quasi spiralia, carinato-cuspidata, subpulvinata, atroviridia, minutissime puncticulata, carinâ margineque denticulato-scabra, caudicem subconniventer loricantia. Scapus strictus, „(debilis, flexus)“ simplex et ramosus, (fuscescenti-glaucus). Racemus multiflorus, laxius spicatus, erectus, patulus, „(subsecundus)“. Pedicelli flore „(erecto)“ his terve breviores. Bracteae „(breves)“ convoluto-acuminatae, flavescentes, ovato-lanceolatae, pedicellis glaucis paullo longiores, 2-3 lin.. Cor. $\frac{3}{4}$ poll., viridi-albida, cylindrico-trigona, sexstriata, „(striis virentibus aut fuscescentibus)“ infra os constricta, extus rugis callosis dense scabra, laciniis apice replicato-patulis: exterioribus ad $\frac{3}{4}$ concretis, „(apice flavescentibus)“ interiores aequales includentibus. Stamina corollâ parum breviora, alterna quidquam longiora, (flavescentia). Germen columnare, viride, 6-striatum, stylum filiformem triquetrum subaequans, stigmate depresso puberulo. *Gawl.* Descriptio a *Decandolle* data quadrat quidem, non vero icon, in qua folia glauca, nec atroviridia; corollae fere lilacinae, petalis 3 interioribus apice luteis. *In Prom. b. spei. h.*

Obs. Ad quam harum varietatum spectet „*A. spiralis*; floribus sessilibus, ovatis, crenatis: segmentis interioribus conniventibus“ *Linn. Spec. pl.* 459. omnino dubium. Citat quidem in *Spec. Dillen.* t. 13. f. 14., ubi *imbricata*; at in *Mantissa* 368 adjicit: „folia ovato-subulata, mucronato-spinosa, apice triearinata, sexfariam (non 5-fariam) imbricata.“ An haec *pentagona*? Licet *Willdenow* in *Enum.* p. 384. ad *A. spiralem* icon *Decand. Pl. gr.* t. 56. citasset, *Link* tamen in *Enum.* p. 336. *A. spiralem* *Willd. Enum.* ad *A. pentagonam*, *A. spiralem* *Decand.* vero ad *A. imbricatam* trahit.

67. *A. quinquangularis*; foliis subquinquefariis, pallide viridibus, glabris, subtus obsolete maculatis; perigonii angulis spongiose torulosis. *APICHA pentagona* β *torulosa* *Haw. Rev.* p. 201. et, hoc teste: *ALOÏ pentagona* *Salm-Dyck Cat.* p. 10.

Pedunculus plerumque simplex; corolla cylindrico-hexagona, angulis sublaevibus. *S. Dyck.* *In Prom. b. spei. h.*

68. *A. spirella* *Haw.*; foliis praespiralibus, quinquefariis, patentibus, lanceolato-acuminatis, glabris, pallide viridibus, apicem versus subbicarinulatis, subtus superne carinulisque obsolete maculatis, marginibus asperiusculis. *Haw.* (sub *HAWORTHIA spirella* in *Syn.* p. 97. n. 21.) *S. Dyck Cat. rais.* p. 10. et 42. *Link Enum.* 1. p. 336.

„Simillima *spirali*, at triplo minor; foliis angustioribus, apice bicarinulatis, carinulis ordine macularum notatis.“ *Haw. l. c.* „Pedunculus ramosus, corolla hexagono-cylindrica, angulis laevibus. Folia longiora magisque patentia, quam in *imbricata*; hanc inter et *pentagonam* media, a qua differt foliis dilutius viridibus, brevioribus, maximeque spiralibus, ita, ut anguli quinque vix appareant.“ *S. Dyck l. c.* Clo *Sprengel* synonymon *A. spiralis* in *G. V. 2.* p. 70. *In Prom. b. spei. h.*

69. *A. spiralis* Haw.; foliis praespiralibus, quinquefariis, patentibus, ovato-acuminatis, glabris, viridibus, apicem versus carinâ semilaterali; subtus superne obsolete sparsim maculatis marginibus asperiusculis. *Haw. Syn. p. 97.* (sub *HAWORTHIA spirali*). *A. spiralis* Haw. *Trans. Linn. Soc. 7. p. 6.* *A. pentagona* β *spiralis* *Salm-Dyck Cat. p. 10.* *APICRA spiralis*; caulescens, tortuosa; fol. 5-fariis, patentibus, spiralibus, glabris, subtus obsolete maculatis. *Willd. Mag. n. 21.* (et hoc teste *A. spiralis* *Linn. Spec. p. 459.*)

Folia adeo spiralia, ut multifaria videantur, attamen omnino quinquefaria: *Haw. Syn. l. c.* „In β pedunculus simplex, flores interrupte spicati“: S. Pr. *Salm-Dyck*, qui se possidere specimen nomine *A. spiralis* a *Haworth* missum, a *pentagona* non nisi foliis magis spiralibus diversum. *In Promont. b. spei. h.*

70. *A. pentagona* Haw.; foliis quinquefariis, glabris, viridibus, subtus obsolete maculatis (corollis non rugosis). *Haw. Linn. Soc. Trans. 7. p. 7.* *A. foliis quinquefariam imbricatis, ovatis, acuminatis, laeviusculis; corollis pedunculatis, non rugosis; caule stricto.* *Hort. Kew. ed. 2. II. p. 298.* *Bot. Mag. t. 1558. Jacq. Fragm. p. 72. t. 111.* *A. spiralis* β *pentagona* *Hort. Kew ed. 1. p. 471.* *Willd. Spec. II. p. 191.* *HAWORTHIA pentagona* *Haw. Syn. p. 97. n. 22.* *APICRA pentagona*; caulescens; fol. 5-fariis, imbricato-patulis, ovatis, apice trigonis, glabris, junioribus concaviusculis, subtus obsolete maculatis. *Willd. Mag. p. 273. n. 23.* *Haw. Suppl. pl. succ. p. 62.* α . fol. adultis semper, quocunque casu, absolute 5-fariis. *Haw. Suppl.* β . torta; foliis saepissime valde spiraliter 5-fariis. *Haw. Suppl.*

„Nunquam spiralis, semper pentagona, foliis imbricatis. Specimen tamen ejusdem, ut videtur, speciei vidi *spirellâ* majus, foliis subspiralibus.“ *Haw. Syn. l. c.* (cui non omnino se consentire posse S. P. *Salm-Dyck* in *Obs. ad suam A. pentagonam*: idque ipse in suo β nunc fatetur *Haworth*).“ β copiose viget in *H. Kew.*; at non α . Folia in β diversa figurâ, colore, constantiâ. Forte propria species. Ambae varietates discrepant satis a *spirali* nostra, quae duplo major, vel plus, et a *spirella* nostra, quae duplo minor, et distincta.“ *Haw. Suppl. l. c.* — Folia $1\frac{1}{2}$ poll., basi poll. lata, deorsum quinquefariam, superne quidquam spiraliter imbricata, ovato-acuminata, pulvinata, brevia, rigida, carinato-cuspidata, atrovirentia, superiora subtus tuberculis sparsis, parvis, albo-flavicantibus, margine carinâque denticulata; inferiora patentia, superiora convergentia, suprema minora pallidiora convoluta-concava. Scapus crassitie filii emporetici, ramosus, glaucescens, $1\frac{1}{2}$ ped.. Racemi multiflori, sparsi, laxi; pedicelli $\frac{1}{3}$ poll.. corollâ triplo quadruplo breviores, longitudine fere bractearum glaucarum, apice rubescentium, et iisdem etiam triplo breviorum. Corolla cylindrico-tubulosa, glabra, sordide e virescenti flavescens, laevis; laciniis parabolicis regulariter patulis, tubo quadruplo brevioribus; interioribus subangustioribus magis

erectis. Stamina subdeclinata longitudine tubi, alterna breviora. Antherae luteae. Stigma simplex. Clo Sprengel synonymon *A. spiralis* in *S. V.* 2. p. 70. In *Prom. b. spei.* h.

Obs. *Jacquini* planta haud ita paucis ab illa in *Bot. Mag.* abluere videtur: Caulis $\frac{1}{2}$ ped. et ultra, erectus, basi prolifer, totus serie quintuplici foliorum imbricatorum patulorum tectus. Folia e basi lata lanceolata, acuminata, pungentia, rigida, crassa, carnosa, integerrima, amplexicaulia, glabra, facie plana, dorso concava, 1 $\frac{1}{2}$ unc. longa. Scapus unus alterve, terminalis, ramosus, teres, crassitie pennae columbinae, plerumque declinatus, 1 $\frac{1}{2}$ ped. Pedunculi: -flori, breves, bracteola lanceolata. Flores secundi, erectiusculi. Cor. tubus cylindricus, sexsulcatus, albus, angulis virentibus; limbus brevis: laciniis obovatis, flavescentibus, patentibus, alternis paulo minoribus.

71. *A. bullulata* Jacq.; caulescens; foliis quinquefariis, imbricato-patulis, ovatis, trigonis, acutis: supra glabris, subtus grosse papillosis. *Willd. Mag.* l. c. n. 25. (sub *APICRA*, ut etiam *Haw. Suppl. pl. succ.* p. 62.) *Jacq. Fragm. bot.* p. 72. t. 109. *S. Dyck Cat. rais.* p. 11. *Hern. h. semperv.* t. 471.

„Subcaulescens, caule pedali stricto. Folia spiraliter quinquefaria, praesertim in planta juniore, ita ut inferne habitus *A. pentagonae*, superne *A. spiralis*, acuminata, mucronata, viridia, 2 poll., superne plana, inferne convexa, facie plana, subtus bullulis elevatis, ovalibus vel subrotundis, planis, nitidis, pluribusque depressis. Corolla vix bilabiata, tubo viridi; limbi patentissimi laciniis obverse ovatis, rotundatis, sulphureis, cum fascia media virente: 5 brevioribus.“ *Jacq. l. c.* Affinis *ALOE spirali* *Haw.*; at minor, et diversa foliorum margine carinaeque crebre tuberculato-asperis induratissimisque. *Haw.* In *Prom. b. spei.* h.

B. *Curviflorae* *Salm-Dyck et Haw.* olim, *GASTERIAE* *Duv. et Haw.*, *ALOEAE* *Willd.*)

a. *Breviflorae.*

α. *Caulescentes.*

72. *A. pulchra* *Haw.*; foliis spiraliter distichis angustis, subcanaliculatis, uno latere truncatis, apice attenuatis, acutis, glabris, nitidis, integerrimis, atroviridibus, maculis confluentibus albis subfasciatis, margine integerrimis. *Salm Dyck obs. in Horto Dyck.* p. 43. *Cat. rais.* p. 12. *Haworth Trans. Linn. Soc.* VII. 16. *A.* subcaulescens; fol. subdistichis, linearibus, inaequilateri-trigonis, glabris, integerrimis, maculis distinctis, apice attenuatis, acutis, mucronatis. *Willd. Mag.* V. p. 279. n. 12. *Bemerk.* 19. *Jacq. H. Schönbr.* IV. p. 10. t. 419. *Fragm. bot.* p. 73. t. 112. f. 2. 5. *A. maculata α pulchra*; fol. acutis. *Hort. Kew.* 1. p. 469. 2. ed. II. p. 297. *Willd. Spec.* II. p. 189. *A. maculata α*; fol. subacinaciformibus, elongatis. *Bot. Mag.* 1314 in nota. *A. maculata* *Bot. Mag.* 755. *A. obliqua*; fol. junioribus distichis, tandem sparsis, inaequaliter trigonis, acutis, patentibus, pictis; corollis (basi) ventricosis, cernuis. *Dec. pl. gr.* t. 91. (fid. *H. Kew.* et *Salm-Dyck*; *Haworth ad obliquam*). *GASTERIA*

pulchra; caule senecto sesquipedali, subdichotomo; fol. spiraliter multifariis, pictis, ensiformibus, acutis. *Haw. Syn.* p. 85. G. fol. acute ensiformibus; pedunculo floribus subangustis sublongiore. *Haw. Phil. Mag.* 1827. p. 549.

Caulis, pedunculus et flores sicut in *A. obliqua*. Folia 1 1/2 ped., anguste acinaciformia, supra canaliculata, et marginibus saepe scabriusculis. Differt a simillima *obliqua* foliis duplo triplove longioribus, angustioribus et acutioribus; a reliquis omnibus cum *obliqua* caule pedali, quandoque subramoso. S. P. *Salm-Dyck*. Tota glabra. Caulis proprie nullus, sed foliorum inferiorum bases per plures annos persistentes. Folia plura, acinaciformia, altero margine lato plano, altero acuto et quidquam cartilagineo crenato, integerrima, mucronata, nitida, atrovirentia, undique maculis albidis, crassa, firma, patentia, basi mutuo amplexantia, margine membranacea, longiora 2 ped., unc. lata. Scapus ex axillis foliorum superiorum, 3-ped., simplex vel ramosus, erectus, superne debilis, longe racemosus. Pedicelli 1/2 unc., 1-flori, graciles, nutantes; bracteolâ albida acutâ. Flores curvati, tubus ventricosus, ovatus, roseus; limbus fauce angustatus, pallidus, striis virentibus; lacinae expansae, late ovatae, obtusae, alternantes, aequales. Stamina petalis breviora. Caps. oblonga, obtusa, obtuse trigona, erectiuscula in pedicello patente, unc. *Jacq.*. Radices durae. Caulis palmaris et saepe minor, frutescens. Folia approximata, amplexicaulia, basi membranâ aucta, acumine corneo, angulis laevibus, lateribus 2 tertio laterali latioribus. Scapus erectus, e griseo rubescens, inferne compressus, ramis basi bractea lanceolatâ, acutissimâ, linearis, viridi, 1/4 poll. longitudine pedicellorum rubrorum. Flores in ramis laxo racemosi. Cor. basi ventricosa, rubra, medio curva, apice tubulosa, virescens, 3/4 poll. Petala basi coalita, oblonga, 3 externis brevioribus. Filamenta alba tubo inclusa. Antherae luteae. Germen cylindricum, viride, sessile. Stylus albus. Stigma subcapitatum. Caps. oblongo-cylindrica, 6-sulca. Semina in quovis loculo biserialia, plana, membranâ cineta, nigra. *Dec.*. Cor. coccineam pingit et describit *Bot. Mag.* superne viridi-albam, laciniis exterioribus usque ad curvaturam connatis, interioribus tenuioribus. Pedicellos corollâ cum omnibus auctoribus longiores sistit, contra *Haworth*. *In Prom. b. spei.* 4.

Obs. *Willdenow* in *Spec. pl.* II. p. 189. sub: *A. maculata*: (caulis; fol. linguaeformibus, glabris, pictis; floribus racemosis, cernuis, curvatis) *Thunb.* *Diss.* n. 10. *Prodr.* 61. (*Flor. cap. ed. Schult.* p. 311.) *obliquam* sub β , *pulchram* sub α conjunxit. At non liquet ex descriptione data a *Thunberg* in *Fl. cap.* l. c. varietates hasce re verâ spectare ad *maculatam*. *Decandolle* *pl. gr.* t. 91. duxit ad *obliquam*. Describit nempe *Thunberg* l. c. *maculatam* suam: „Folia radicalia, trigona, paginâ interiore concavo-plana, exteriorâ convexâ, dorso plano, unguem lato, sensim attenuata, erecta, spithamea, poll. lata; flores pendulos, pedunculis reflexis.“ Cor. illi subcylindrica, basi crassior, medio recurvata, apice angulis viridibus, subincarnata, unguicularis. Lacinae 3 exteriores ad curvaturam usque divisae, crassiores, interiores tenuiores, invicem liberae, sed cum exterioribus interne longitudinaliter connatae. Antherae ovatae, flavae. Stigma obtusum, plumosum. Varietas α maculis albis oblongis confluentibus; β maculis albis minutis.

75. *A. obliqua* *Haw.*; caulescens; foliis spiraliter distichis, angustis, oblique flexis, uno latere truncatis, apice obtusis cum mucrone, glabris, nitidis, integerrimis, atroviridibus, maculis confluentibus albis, fasciatis, margine integerrimis. *Salm-Dyck Obs. bot. in H. bot. dyck.* p. 42. *Cat. rais.*

p. 11. *Haw. Trans. Linn. Soc. VII. p. 14.* A. fol. brevioribus, linguiformi-oblongatis. *Bot. Mag. 1322. in nota.* A. *maculata* β *obliqua*; fol. obtusis cum acumine. *Hort. Kew. ed. 1. p. 469. ed. 2. II. p. 297.* *Willd. Spec. II. p. 189.* A. *maculata*; acaulis; foliis distichis, patentibus, linguiformibus, lanceolatis, inaequaliter trigonis, maculatis; cor. cylindraceis curvatis, pendulis. *Willd. Enum. p. 387.* A. caulescens; fol. subdistichis, linearibus, inaequaliter trigonis, glabris, integerrimis; maculis confluentibus, apice obtusis, mucronatis. *Willd. Mag. p. 279. n. 11. Bemerk. 19.* A. *Lingua*, α *Bot. Mag. t. 979. (excl. syn. Kunorr et Commel., forte et Weinm. Phyt. ic. 57. Sabb. Hort. t. 81.)* GASTERIA *obliqua*; caule senecto sesquipedali, subdichotomo; foliis spiraliter multifariis, pictis, anguste linguiformibus, obtusissimis cum mucrone. *Haw. Syn. p. 85.* GASTERIA *maculata*; fol. anguste linguiformibus, oblique subundatis, obtusis (cum mucrone): floribus grossis pedunculo longioribus. *Haw. Phil. Mag. 1827. p. 349.* β . G. *maculata* β *fallax*; candidior. *Haw. Phil. Mag. l. c.*

Caulis pedalis. Folia 6 poll., basi poll. lata, superne planiuscula. a medio ad apicem oblique flexa, patula, marginibus quandoque levissime scabra. Pedunculus floralis 3. ped., simplex vel ramosus, bracteis quibusdam sterilibus, margine pellucidis. Flores numerosi, dense racemosi. Pedicelli bracteâ multo longiores, et quandoque apice ad insertionem florum bracteâ alterâ. Cor. ventricoso-retusa, basi rosea, tubo brevi laete viridi, caeterum fere alba. Stylus staminaque longitudine corollae. *Salm. Dyck.* Folia breviora, quam in *pulchra*, laticra, undato-obliquiora obtusioraque; flores multo crassiores. *Haw.* In β folia ad oculum quasi tuberculato-exasperata, tactu vero laevissima. *Haw. Phil. M. l. c.* In *Prom. b. spei.* 4.

Gasteria picta 74. A. *Bowieana*; foliis ensiformibus, planis, obtusis cum mucrone; pedunculis flore grosso brevioribus. *Haw. Philos. Magaz. l. c. (sub GASTERIA picta).*

„Caudex adhuc brevis. Folia duplo longiora, quam in *obliqua*, cui simillima, planiora, minus carinata, maculis albis minus clavis; seapo simplici (vix semper) longissimo.“ *Haw. l. c.* In *Prom. b. spei*, unde nuper misit D. Bowie. 4.

β . *acaules.*

75. A. *formosa*; foliis linguiformibus, laevibus, integris, obtusis cum acumine, albo nigroque fasciatis. GASTERIA *formosa* *Haw. in Phil. Mag. l. c. p. 350.* A. *marmorata* *H. Hitchins.*

In *Prom. b. spei?* 4.

Gasteria nigrescens 76. A. *vittata*; foliis distichis, brevibus, crassis, biconvexis, obtusis, integerrimis, albo perlepidide fasciatis. GASTERIA *fasciata* *Haw. Phil. Mag. l. c. p. 350. (et, hoc teste, fide fasciata fide Baker J. Linn Soc xviii 1857*

specim.) *A. nigricans* γ . *fasciata*; fol. angustioribus, maculis albidioribus, magis, praecipue subtus, fasciatim pictis, apice obtusissimis, integerrimis. *S. Dyck obs. bot. p. 64.* *GASTERIA nigricans* γ *fasciata*. *Haw. revis. p. 47.* β . *laxa*; foliis laxe imbricatis. *Haw. Ph. Mag. l. c.*

Pulchra species; foliis (in α) arcte imbricatis, brevioribus et obtusioribus quam in praecedentibus. Flores fere omnium brevissimi et crassiores ut in *nigricante*, sed pallidiores: apud nos spica simplici, 2-ped. — β singularis. *Haw. Ph. M. l. c.* In *Prom. b. spei. β . in Horto D. Hitchins. 4.*

77. *A. dictyodes*; foliis subensiformibus, albo maculatis, ^{Gasteria} sobolium perlepide albo reticulatis. *GASTERIA relata* ^{Wetata} *Haw. Phil. Mag. l. c. p. 350.* _{fide Baker}

Parvas plantas solummodo vidi, cum unico folio adultiore, turgido et lateraliter obtuse subcarinato, saturate viridi, albo submaculato, acuminato. *Haw. l. c.* In *Prom. b. spei. 4.* _{f. Linn Soc. xviii}

78. *A. nigricans* *Haw.*; subacaulis; foliis distichis, erectis, late linguiformibus, crassissimis, utrinque convexis, apice obtusiusculis cum mucrone, atro-viridibus, albido subserialiter maculatis, glaberrimis, nitidis, ad margines basi obtusis, maculatis, apice cultratis, cartilagineis, integerrimis. *Salm Dyck obs. bot. p. 63. (excl. β et γ).* α *A. nigricans* α *latifolia*; fol. latioribus, longioribus, apice obtusis, margine integerrimis. *Salm D. l. c. et hoc teste: A. nigricans Cat. rais. p. 16.* *Haw. Trans. Linn. Soc. 7. p. 16.* *A. ac. fol. dist. patentibus linguif. atrovir. albo maculatis, glabris, apice obtusissimis, mucronatis, margine acutis, verrucis cartilagineis, integerrimis; scapo ramoso.* *Willd Mag. V. p. 277. n. 5.* *Bem. p. 17.*

A. Lingua β crassifolia; fol. lateralibus, brevioribus. *Ait. Kew. 1. p. 469. ed. 2. II. p. 297.* *Willd. Spec. II. p. 190.* *A. Lingua β Bot. Mag. 858. ic. (fide Haw.; ergo:)* *A. Lingua ϵ fol. latior. brevior. glabris, corollâ obsoiore. Bot. Mag. 1522.* *A. obliqua Jacq. H. Schönbr. IV. p. 9. (excl. syn. fide Salm-D.)* *GASTERIA nigricans*; fol. linguiformibus, brevibus, obtusis, nigro-viridibus, obsolete maculato-punctatis, marginibus cartilagineis. *Haw. Phil. Mag. p. 350. Synops. p. 86. (excl., se teste in Phil. Mag., Bot. Mag. 1522. ad excavatam spectante).* β . *marmorata* *Haw. Phil. M. l. c.* *A. nigricans δ . marmorata*; fol. angustioribus, brevioribus, maculis obsolete marmoris ad instar confluentibus, apice obtusiusculis vel oblique acutis, integerrimis. *Salm-Dyck obs. l. c.*

Caulis brevis, quandoque in senectissimis fere pedalis, foliis densissime obtectus, exacte vel oblique distichis. Folia 5-7 poll., basi in α poll. 2 lata, in β 1½ poll., apice varie obtusa, vel obtusiuscula mucrone satis producto, utrinque maculis majoribus subfasciatim confluentibus, primo albidis, dein pallide viridibus, obsolete ornata, imâ basi ad marginem late membranacea, postea

usque ad medium rotundato-obtusa et maculis sive tuberculis oblitteratis albis, per lineam dispositis margine notata; ultra medium vero cultrata, tuberculis quibusdam distinctis, laevissimis, mox in cartilagine pellucida et integerrima confluentibus marginata. Scapus 2 ped. et ultra, ramosus, bracteis quibusdam sterilibus. Flores numerosi, dense racemosi. Pedicelli longitudine bractearum vel paulo longiores. Cor. obclavata, basi valde ventricosa, rubicunda, tubo amplo, brevi, viridi, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. Differt ab *A. obtusifolia* fol. nitidis, crassioribus, apice minus obtusis ad margines superne solum cartilagineis, integerrimis. Propagines fere nullae. *Salm-Dyck*. Scapus paniculatus; flores crassissimi et fere brevissimi, confertissimi. *Haw. Phil. Mag.* l. c. cui β forte propria species videtur. In *obliqua Jacq.*, „folia a divo auctore virentia cum maculis cinereis, $\frac{1}{2}$ ped., basi totum caulem amplexantia dicuntur. Scapus compressissimus, $1\frac{1}{2}$ unc. latus, erectus, superne ramis plerumque 2, ad flores teretiusculus, 3-ped.. Racemi longissimi, floribus pendulis. Bracteolae lanceolatae, acutae, membranaceae. Pedicelli rubri. Cor. tubus ovatus, ruber, inflatus, incurvus in faucem cylindricam, ex viridi albidoque striatam: lacinae semi-ovatae, patulae, aequales. Filamenta subulata, alba, receptaculo inserta. Germen oblongum. Stylus staminibus brevior. Caps. oblonga, obtusa, triangularis, uncialis, erecta in pedicello patentissimo. Semina plura, oblonga, plana, nigra.“ In *Bot. Mag.* l. c. folia apicem versus rubella, scapus corallinus. Pedicelli 4 lin.. Cor. $\frac{3}{4}$ poll., laciniis apice roseis. Hanc esse veram *A. Linguam Itator.* ex *Comes de Spin* monuit. In *Prom. b. spei.* 4.

79. *A. crassifolia*; foliis anguste linguiformibus, brevissimis, deorsum subcylindratis, obsolete marmorato-punctatis. *GASTERIA crassifolia Haw. Phil. Mag.* l. c. p. 351. quo teste: *ALOË nigricans* β *crassifolia*; fol. angustioribus, crassioribus, usque ad medium fere cylindratis, apice minus obtusis et margine levissime crenulatis. *Salm-Dyck obs. bot.* p. 64. *Cat. rais.* p. 17. *Haw. Rev.* p. 47. (sub *GASTERIA*). A prioribus longe differt: foliis brevioribus, saturatoribus; ab omnibus distinguitur foliis crassissimis. Flores non vidi. *Haw.* l. c.. Folia basi $1\frac{1}{2}$ poll. lata. *Salm-D.* In *Promont. b. spei.* 4.

80. *A. brevifolia*; foliis parabolico-linguiformibus, brevissimis: punctis pallidis; floribus parum abbreviatis. *GASTERIA brevifolia. Haw. Phil. Mag.* l. c. p. 351. G. fol. exacte distichis, parab. ling. brevibus obtusis: marginibus superne laevibus. *Haw. Syn.* p. 89. α . *laete virens*; foliis pallide viridibus, scapo solitario. *Haw. Ph. Mag.* l. c. β *perviridis*; foliis saturate viridibus, saepius scapis duobus. *Haw.* l. c. Facies *nigricantis*; at pallide virens, corollis longioribus. Folia duplo breviora quam in *longifolia*: at simillima, exceptis apicibus glabris. *Haw.* l. c.. In *Prom. b. spei.* 4.

b. Longiflorae.

81. *A. obtusifolia Salm Dyck*; acaulis; foliis distichis,

suberectis, late linguaeformibus, brevibus, supra planis, subtus convexis, apice retuso-obtusis cum mucrone parvulo, perviridibus, albido subserialiter maculatis glabris, margine culltratis, verrucis cartilagineis obsolete crenulatis. *Salm Dyck obs. bot.* p. 62. et, se teste: *A. Lingua, γ brevifolia*; fol. brevissimis, retusissimis, basi lateraliter compressis. *Cat. rais.* p. 17. *GASTERIA obtusifolia*; fol. brevibus brevissimisque, late lorato-linguiformibus, punctis parvis, perviridibus. *Haw. Phil. Mag.* p. 351.

Caulis o. Folia 3-6 poll., poll. 2 lata (in junioribus paulo longiora, quam lata, basi crassissima et lateraliter compressa) suberecta, exacte disticha, crassa, supra plano-concaviuscula, subtus convexa, a basi ad apicem aequilata, retuso-obtusissima, glabra nec nitida, utrinque maculis numerosis parvulis subfasciatim confluentibus, primo albidis, dein pallide viridibus, margine culltrata, laeviuscula, tuberculis basi et apice in cartilagine confluentibus subcrenulata. Flores? Ab *A. Lingua* et praecedentibus omnibus differt foliis multo brevioribus; propius accedit ad *nigricantem*; proxima *GASTERIAE brevifoliae Haw.*, a qua vix diversa; interea cl. *Haworth* ex planta juvenula, quam communicavi, judicavit non esse *G. brevifoliam*. Propagines fere nullae. *Salm-Dyck. Haworth l. c.* nomen *retusifoliae* proponit. *Habitat? In Prom. b. spei? 4.*

82. *A. mollis*; foliis linguiformibus, acutis, brevibus, *Gasteria mollis*, crassis, mollibus, sordide viridibus, submaculatis, apicem *mollis*, cuspidatum versus serrulatis. *GASTERIA mollis Haw. Phil. Mag. l. c.* p. 351. *G.* foliis exacte distichis, brevibus, linguiformibus, obtusis, cuspidatis, farcis, molliusculis, laevibus, sordide viridibus, submaculatis, margine saepe asperiusculo. *Haw. revis. p. 46. p. 203. Suppl. succ. p. 47.* *187*

Folia triuncialia, unc. lata, $\frac{1}{2}$ unc. crassa, obtusa, sordide albo magnipunctata, apicem versus minute serrulata, cum mucrone conspicuo terminali. *Haw. Rev. p. 203. In Promont. b. spei. 4.*

83. *A. subnigricans Spreng.*; subcaulis; foliis distichis, patulis, linguiformibus, supra planiusculis, versus apicem subattenuatis, obtusiusculis, cum mucrone perviridibus, albo parce obsolete tuberculato-punctatis, nitidis, basi ad margines glabris, medio tuberculatis, apice cartilagineis. *ALOË pseudo-nigricans Salm Dyck obs. bot. p. 65. Cat. rais. 17. Link En. p. 357. A. subnigricans Spreng. S. V. 2. p. 71. GASTERIA subnigricans*; foliis linguiformibus, acutiusculis, parce subtuberculato-punctatis. *Haw. Phil. Mag. p. 352. β. glabrior*; fol. latioribus, obtusioribus, glabrioribus, saturatoribus clariusque maculatis: mihi adhuc brevioribus. *Haw. l. c.*

Caulis brevis vel quandoque in senectissimis subpedalis, foliis distichis obiectus. Folia 8-10 pollicaria, basi $1\frac{1}{2}$ poll. lata, juniora suberecta, seniora patentia, supra basi concaviuscula, medio leviter depressa, apice convexiuscula, subattenuata, obtusius-

cula et quandoque acuta cum mucrone, saturate viridia, tuberculis obsolete, minutis, albis, praecipue subtus subfasciatim dispositis, inferne oblitteratis, superne prominentibus utrinque scabriuscula; imâ basi margine membranacea, postea tuberculata, tuberculis primo oblitteratis, deinde scabris et apicem versus in cartilagine pellucida dentato-crenulata confluentibus. Scapus 3-ped., simplex vel ramosus, bracteis quibusdam sterilibus. Flores dense racemosi, numerosi. Pedicelli bractea breviores. Cor. obclavata, valde ventricosa, ad insertionem pedicelli viridis, post rubicunda, tubo amplo brevi viridi, ore subpatulo. Stylus staminaque longitudine corollae. Differt ab *A. nigricante* fol. perviridibus, longioribus, angustioribus, apicem versus plus minusve attenuatis et scabriusculis, margine tuberculato-dentatis. Ad sunt in horto plantae juvenulae in *Cat. rais.* sub nomine „*A. nigricantis* γ *denticulatae*, marginibus denticulatis“ adductae, quae huc pertinere videntur, et hucusque omnino glabrae remanent. An varietas laevior hujusce speciei? An species distincta? Propagines fere nullae. *Salm-D.* — Forte hae plantulae varietas β a *Haworth* supra adducta. *In Prom. b. spei.* 4.

Gasteria

disticha 84. * *A. disticha*; acaulis; foliis distichis, recurvo-pa-

tentibus, late-linguiformibus, convexiusculis, margine cula-
tis, apice obtusis cum mucrone, atro-viridibus, albo pulcre
maculatis, glabris, ad margines verrucis cartilagineis, serrato-
dentatis. *Salm-Dyck obs. bot.* p. 60. (sub *A. Lingua*, uti in)

186 *Cat. rais.* p. 17. (excl. γ .) α *A. Lingua* α *angustifolia*; fol. an-

gustioribus, apice obtusiusculis. *Salm Dyck obs. bot.* p. 61.

A. Lingua Willd. Bem. 17. et *Mag. V.* p. 277. (excl. syn. *la-*

tifoliae Haw.) *A. disticha*; floribus pedunculatis, pendulis,

ovato-cylindricis, curvis. α *Linnae. Spec.* 459. (fide *Haworth*

in *Phil. Mag.* p. 352., qui huc laudat, citatum ab ipso Lin-

naeo, *Commel. hort.* 2. p. 15. t. 8.) **GASTERIA denticulata**

Haw. Suppl. succ. p. 50. *Revis.* p. 204 (excl. γ). **GASTERIA**

disticha; foliis linguiformibus, perviridibus, glabris, obtusis,

sparse punctato-maculatis, lateribus acutis, superne tubercu-

lato-denticulatis. *Haw. Phil. Mag.* p. 352. *G. disticha* α

minor Haw. ibid. eod. β *A. Lingua* β *latifolia*; fol. latio-

ribus, brevioribus, crassioribus, apice obtusissimis. *Salm-*

Dyck obs. bot. p. 61. *Cat. rais.* 17. **GASTERIA disticha** β *ma-*

major. Haw. Phil. Mag. l. c.

Caulis nullus vel aetate brevissimus. Folia 10 poll., in α basi 1 $\frac{1}{2}$

poll. lata, in β 2 poll.; erecto-patentia, subrecurvata, exacte di-

sticha, utrinque convexiuscula, supra medio longitudinaliter et

leviter depressa, glabra, undique maculis albis, validis, subtus

numerosioribus et paulo minoribus, confluentibus vel distinctis

eleganter pictis, ad margines tuberculis cartilagineis basi fere

nullis et imo apice confluentibus, aspere serratis. Scapus 4 ped.

et ultra, simplex, bracteis quibusdam sterilibus. Flores race-

mosi, numerosissimi. Pedicelli bractea parum longiores. Cor.

obclavata, basi inflato-ventricosa, rubicunda, tubo brevi, viridi,

ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. Differt ab *A. conspur-*

cata, cui valde similis, foliis atroviridibus, nunquam margine

truncatis, maculis majoribus rarioribusque eleganter pictis vel marmoratis et floribus magis ventricosus. Propagines infrequentes, praesertim in var. β . *Salm-Dyck*. Margines magis, quam in reliquis, denticulatae. *Haw. Suppl.* In *Promont. b. spei.* 4.

Obs. Aloe *Lingua* in Horto Com. de *Spin* folia habet crassissime disticha, intus virentia, obsolete albo maculata, apice brevi mucronata, margine integra, saepe obiter crenulata. Pedunculus ramosus. Perigonium ventricosum. Alia dein extat ibidem: foliis distichis, angustioribus, patentibus, albo maculatis, margine cartilagineis. Demum ad has accedunt duae aliae, quarum una foliis est latis, et *conspurcatae* proxima: huic folia margine integra, non truncata, obscure viridia, maculis numerosis aut verrucis parum extantibus, albis, inordinate sparsis nec serialibus, apice mucronata et margine cartilagineo dentata; altera folia habet utroque margine plus minus truncata, pallide virentia maculisque albis conspersa, apice mucronata, margine cartilagineo-serrulata. *Balb. l. c.* An revera A. *Linguae* varietas: A. *Lingua* & *Campana* ined. in *Bertol. Virid. bon. veget.* 1824. p. 3. in qua folia carnosae, alia anguste linguiformia, alia latiora, obtusa cum mucronulo, margine cartilagineo-crenulata, tota crebre adspersa maculis parvis, albidis, et quam Ser. *Salm-Dyck* in litt. ad *Campana* novam, in Catalogo suo non descriptam dicit.

85. A. *conspurcata* *Salm Dyck*; acaulis; foliis distichis recurvo-patientibus, late-linguiformibus, convexiusculis, basi quandoque sulcatis, utroque margine saepe truncatis, apice obtusis cum mucrone, perviridibus, maculis numerosissimis albis conspurcatis, glabris, ad angulos verrucis cartilagineis serrato-dentatis. *Salm Dyck obs. bot. in H. Dyck* p. 59., quo teste: A. *conspurcata* β *truncata* *Cat.* p. 18. 51. *GASTENIA conspurcata*; fol. lat. lingu. pervir. numerosissime pallide punctatis; lateribus subtuberculato-denticulatis, truncatis *Haw. Phil. Mag.* p. 353.

Caulis o. Folia pedalia, basi 2 poll. lata, erecto-patientia, subrecurva, linguiformia, exacte disticha, utrinque convexiuscula, supra longitudinaliter medio depressa, et senecta basi leviter sulcata, saepe quadrilateralia, lateribus 2 marginalibus, 2-3 lin. latis, saturate viridia, glabra, undique, sed praecipue paginam inferiore, maculata, maculis albis, minutis, numerosissimis irregulariter sparsis, ad angulos tuberculis cartilagineis parvulis, basi et apice confluentibus, aspereserrulata. Scapus 4-ped., simplex, bracteis quibusdam sterilibus. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli longitudine bractearum. Cor. obclavata, basi rubicunda, tubo longiusculo, viridi, ore subpatulo. Stylus staminaque longitudine tubi. Ab A. *angustifolia* differt fol. longioribus et latioribus, saepe quadri-lateralibus, marginibus asperioribus quamvis minus cartilagineis. Propagines infrequentes. *Salm-Dyck*. „Ab omnibus facilis distinctu maculis foliorum numerosissimis, obscurioribus.“ *Haw.* In *Prom. b. spei.* 4.

86. A. *angulata* *Willd.*; acaulis; foliis distichis, patientibus, late linguiformibus, planiusculis, supra sulcatis, utroque margine truncatis, apice obtusiusculis cum mucrone, laete viridibus, albo fasciatim maculatis, basi glabris, apicem versus tuberculatis, ad angulos verrucis cartilagineis, denticulatis. *Salm Dyck obs. bot. in Hort. Dyck.* p. 56. *Cat. rais. a. β . γ .* p. 17. A. a. f. d. p. linguif., basin versus convexiusculis, laete viridibus, albo maculatis, glabris, apice obtusis,

mucronatis, margine truncatis, verrucis cartilagineis, denticulatis, α . β . γ . *Willd. Mag.* 5. p. 256. n. 2. (excl., monente *Salm-Dyck*, synonymis) *Bemerk.* p. 16. *A. Lingua β latifolia Willd. En.* p. 387. (excl. syn. *linguiformis Dec. B.*, monente *Salm*). *A. Lingua longifolia Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 13. *A. lingua β fol. majoribus, guttulis albicantibus conspersis, vel iisdem oblitteratis Bot. Mag.* 1322. f. 5. (male monente *Haworth*). *A. linguiformis Mill. dict.* 8. n. 13. (fide *Haw.* var. magis punctata). *GASTERIA angulata; foliis late linguiformibus, longis, pallide viridibus, albo fasciatim maculatis, lateribus truncatis. Haw. Phil. Mag.* p. 354. *GASTERIA longifolia; fol. distich., linguif., long. obtusis, pall. vir., marginibus tuberculato-scabris. Haw. Syn.* p. 89. *α . vulgaris; fol. basin versus obsolete truncatis, superne acutis. Willd. l. c.* (qui huc *A. Linguam β . longifol. Haw.*). *β . unilateralis; fol. margine altero latere truncatis, altero acutis. Willd. l. c.* *γ . truncata; fol. utrinque margine truncatis. Willd. l. c.* *δ . β var α D. Hitchin, adhuc minor. Haw. Phil. Mag. l. c.*

Caulis nullus. Folia pedalia et ultra, basi poll. 2 lata, patentia, et saepe varie in-vel recurva, exacte disticha, in junioribus margine cultrata, in adultioribus quandoque uno alterove margine truncata, in adultis quadrilateralia, lateribus 2 marginalibus 3-4 lin. latis, supra longitudinaliter sulcata et medio depressa, apice obtusiuscula cum mucrone, lacte viridia, utrinque maculata, maculis albis in fascias dispositis, apicem versus verrucoso-prominentibus (basi ergo glabra, et apice tuberculata) ad angulos tuberculis cartilagineis validis, basi apiceque confluentibus, dentata. Scapus tripedalis, bracteis quibusdam sterilibus. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli bracteâ longiores. Cor. obclavata, basi parum ventricosa, rubicunda, tubo longo viridi, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. Differt ab *A. sulcata* foliis minus truncatis, leviter sulcatis, margine minus cartilagineis, maculisque rarioribus majoribus regulariter in fascias dispositis. Varietates α , β , γ , a *Willdenow* tanquam distinctae et constantes notatae, solummodo sunt plantae juniores, adultiores, senectae. Propagines numerosissimae. *Salm-Dyck*. Folia praelonga, punctis parvis albis. Scapus simplex. Flores spicati, remoti. *C. de Spin in litt. ad Balb.* *In Prom. b. spei.* 4.

87. *A. sulcata Salm-Dyck; foliis distichis, patulis, late linguaeformibus, utroque latere valde truncatis, supra sulcis longitudinalibus, apice retusis cum mucrone, lacte viridibus, obscure albo-maculatis, subglabris, ad angulos cartilagineis, superioribus saepe inflexis, tuberculato-serratis. Salm Dyck obs. bot. p. 54. quo teste: A. obscura γ truncata; fol. etc. versus apicem maculis leviter prominentibus, margine incurvatis, undulatis. Salm. D. Cat. rais. p. 15. A. linguiformis Dec. pl. grass. B. t. 68. prima; A. linguiformis Lam. Enc. meth. I. n. 23.?* *A. Lingua angulata Haw. Trans.*

Linn. Soc. 7. p. 23. *A. Lingua* δ fol. subattenuatis, subcarinatis, verrucosis, *Bot. Mag.* 1522. (ob synonym. Haworthian. laudatum; clo. *Haworth* vero *A. Lingua* β *Bot. Mag.* 1522. f. 5.) *GASTERIA sulcata*; fol. latè linguiformibus, subretusis, angulato-truncatis, laete viridibus, pallide maculatis, sulcis longitudinalibus. *Haw. Phil. Mag.* l. c. p. 354. *GASTERIA angulata* *Haw. Syn.* p. 88.

Caulis nullus vel aetate brevissimus. Folia pedalia, basi 2-3 poll. lata, patentia, exacte disticha, in junioribus margine cultrata, apice obtusa cum mucronulo; in adultis quadrilateralia, lateribus duobus marginalibus 4-5 lin. latis, apice obtuso retusis; in senectissimis quandoque uno latere solum truncata et apice acuta, supra sulcis validis canaliculato-exaratis, pallide viridia, obsolete maculata, maculis albidis, numerosis, parvulis, irregulariter sparsis, versus apicem prominentibus, (ergo basi glabra, apice subrugosa) ad angulos pellucide cartilaginea, serrata, aspera, angulis superioribus elevatis, saepe inflexis et undulatis. Scapus 2-3 ped., simplex, bracteis quibusdam sterilibus. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli bractea longiores. Cor. obclavata, rubicunda, medio alba, apice tubulosa, laete virens, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. Ab *A. excavata* differt staturâ majore; fol. crassioribus, latioribus, quadrilateralibus, sulcatis, ad angulos margine cartilagineo cinctis. Propagines valde frequentes. Nomen *angulatae* *Haw.*, quamvis optimum, mutandum erat ob antiquiorem *angulatam* *Willd.* *Salm-Dyck*. Folia minus, quam in affinibus, laevia, magisque retusa, marginibus minus asperis. *Haw. Syn.* l. c. *In Prom. b. spei.* 4.

Obs. *A. acuminata* *Lam.* in *Bot. Mag.* huc ducta ad *verrucosam* potius spectare videtur, quâcum jungitur etiam a clo *Poiret Enc. Suppl.* 1. p. 246. sub *A. carinata ensiformi* *Dec.* cum *A. disticha* β . *Linn.*. Etiam *A. afr.* fl. rubro, fol. triangulari et verrucis ab utroque parte albicantibus *Commel. hort.* 2. p. 17. t. 9. a *Bot. Mag.* et *Haw.* cum? huc ducta a *Willdenow* ad *A. carinatum* laudatur.

88. *A. excavata* *Willd.*; acaulis; foliis subspiraliter bifariis, patulis, planiusculis, linguaeformibus, uno latere truncatis, supra depresso-excavatis, junioribus apice obtusis cum mucrone, senioribus acutis laete viridibus, obscure albo conspurcatis, glabris, angulis cartilagineo-serratis. *Salm Dyck obs. bot. in H. Dyck.* p. 55. *Cat. rais.* p. 15. quo teste: *A. excavata*; acaulis; fol. distichis, patulis, spiraliter dispositis, linguiformibus, apice acutis, laete viridibus, obsolete maculatis, glabris: junioribus superne medio excavatis, margine verrucis cartilagineis, denticulatis, altero latere acutis, altero truncatis. *Willd. Mag.* V. p. 276. n. 5. *Bemerli.* 15.; *A. obscura*; acaulis, fol. distichis, patentibus, linguiformibus, utrinque planis, laete viridibus, obsolete maculatis, glabris, apice obtusis, mucronatis, margine acutis, cartilagineis, denticulatis. *Willd. Mag.* V. p. 275. n. 1. (excl. synonym. *A. Linguae, angustifol.* *Haw.*); *Bemerli.* 16.; *A. obscura* α et β *unilateralis*; fol. uno margine truncatis. *Salm-Dyck Cat. rais.* p. 15.; *A. Lingua, a, angustifolia*; fol. angustis utrinque viridibus.

Willd, En. H. berol. p. 387. (excl. syn. linguiformis Dec.); A. africana fol. plan., lateribus conjugatis, carinatis, fl. rubr. Mill. ic. t. 19. (opt.); GASTERIA excavata; fol. linguiformibus, acutis, obscure albido-conspureatis, basi excavatis, lateribus truncatis. Haw. Phil. Mag. l. c. p. 254; GASTERIA latifolia; fol. distich. linguæf. acutis, maculatis, marginibus tuberculato-serrulatis. Haw. Syn. p. 87. (ergo A. Lingua latifolia Haw. Linn. Trans. 7. p. 13); GASTERIA latifolia β. multifaria; fol. oblique multifariis, curvis, linguiformibus. acutis, cultratis, marginibus tuberculato-serrulatis. Haw. Syn. succ. p. 87. (ergo A. Lingua β multifaria Haw. Linn. Soc. 7. p. 12.) A. disticha δ Linn. Spec. 459. A. Lingua Bot. Mag. 1322. f. 4. (fide Haw. in Phil. Mag. l. c. utraque). β. GASTERIA excavata β. fol. oblique spiraliter multifariis. Haw. Phil. Mag. l. c. p. 355.

Caulis o. Folia $\frac{1}{2}$ ped., basi poll. 2 lata, supra plana, medio depressa, subtus convexiuscula, quandoque obsolete sulcata, planiuscula, et latere truncato parum carnososa; unde vix triquetra et nullo modo carinata, pallide viridia, obsolete maculata, maculis fere concoloribus vel albidis, numerosis, parvulis, irregulariter sparsis, glaberrimis, ad angulos verrucis in cartilagine confluentibus serrulata. Scapus $1\frac{1}{2}$ ped., simplex, bracteis sterilibus quibusdam instructus. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli bractea multo longiores. Cor. obclavata, basi rubicunda, medio alba, apice tubulosa, laete virens, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. Differt ab *A. subcarinata* foliis tenuioribus, latioribus, glaberrimis, nunquam carinatis. Propagines valde frequentes et plantae juniores longo tempore distichae ac margine cultratae permanent: inde error *Willdenowii*: *AL. excavatae* et *obscurae*, quae eadem planta: haec junior, illa senior. In hac specie et in *A. angulata* nomina a clo *Willdenow* (ab ao 1811 recepta) tanquam antiquiora servanda. *Salm-Dyck. Link* in *Enum. p. 387. A. excavatam* „fol. subacuminatis cum mucrone, excavatis ob impressionem a superioribus“ adhuc distinguit ab *A. obscura*, in qua tamen recte mucronem mollem notat. *A. β multifariam Haworth Phil. Mag.* „modo crescendi, propaginum foliis longo tempore distichis vix meram varietatem“ dicit. In *Prom. b. spei. 4.*

89. *A. angustifolia Haw.*; acaulis; foliis distichis, patienti-incurvis, linguiformibus, utrinque convexis et medio longitudinaliter depressis, apice obtusis cum mucrone, atroviridibus, maculis numerosissimis albo conspurcatis, subglabris, ad margines cartilagineis, tuberculato-dentatis. *Salm-Dyck obs. bot. p. 57. (excl. β) et, se teste: A. conspurcata, α, unilateralis; folio uno latere truncatis. Cat. rais. p. 18. A. Lingua angustifolia Haw. Trans. Linn. Soc. 7. p. 13. A. linguiformis β Lam. Dict. Enc. 23. (cum? Salm-Dyck). A. linguiformis, C, verrucosa Dec. pl. gr. t. 68. ic. altera (mala, monente S. Princ., qui cum?; sine dubio, sed excl. syn. Mill. et Boerh., monente Haworth; Willdenow ad A.*

Linguam β . *latifoliam* *H. berol.* s. *angulatam* duxit; in *Bot. Mag.* n. 1322. ducitur ad *A. Linguam* γ cum *Mart. Cent. Dec.* l. 11.) *GASTERIA angustifolia*; sobolifera; foliis incurvulis, linguiformibus, unisulcatis, biconvexis, obtusis, atroviridibus, maculis parvis, obscuris, subglabris, numerosissimis. *Haw. Phil. Mag.* p. 355. *Haw. Syn.* p. 88., et, hoc teste: *A. Lingua* β *Bot. Mag.* 1322. f. 2.

Caulis o. Folia 9-10 poll., basi $1\frac{1}{2}$ poll. lata, patienti-incurva, linguiformia, exacte disticha, crassiuscula, utrinque convexa et medio longitudinaliter canaliculato-depressa, margine convexo-cultrata, rarissime uno alterove latere subtruncata, apice obtusa cum parvo mucrone, saturate viridia, undique, et praecipue subtus maculis albis, parvis, numerosissimis, irregulariter sparsis, distinctis ac parum prominentibus, ad margines tuberculis confluentibus pellucide cartilaginea, cartilagine tuberculato-dentatâ. Scapus 3-ped., simplex, bracteis quibusdam sterilibus. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli bractea longiores. Cor. obclavata, basi rubicunda, tubo longiusculo viridis, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. Differt ab *A. angulata* fol. crassioribus, brevioribus, paulo angustioribus, incurvo-patientibus, saturate viridibus, albo irregulariter conspurcatis, et nunquam quadrilateralibus. Nomen, quamvis improprium, a *Haworth* inditum servari debet. Folia angustiora, quam in *sulcata* et *angulata*, sed multo latiora, quam in pluribus aliis. Propagines numerosae. *Salm-Dyck.* A semine non variare. *Haw.* In *Prom. b. spei.* 4.

Obs. Sereniss. Princeps *Salm-Dyck Commel. H. amst.* t. 8. et *Till. H. pis.* t. 9., utramque cum? huc ducit, malasque esse icones notat. *Commelyni* t. 8. in *Bot. Mag.* t. 979. ad *A. Linguam* α , i. e. *obliquam*, serius vero ad *A. angulatam* ducebatur in n. 1322.; monente *Haworth* spectat ad *A. disticham*.

90. *A. laevis* *S. Dyck*; simplex; foliis incurvulis, linguiformibus, turgidis, obtusis, sordide virentibus; maculis parvis, obscuris, marmoreo-dilutis, laevissimis. *Haw. Phil. Mag.* l. c. p. 355. (sub *GASTERIA laevi*), quo teste: *A. foliis linguiformibus, patulis, basi latiusculis, incurvis, apice angustioribus, recurvis, obtusiusculis, uno latere truncatis, glaberrimis, sordide virentibus, obsoletissime albo maculatis, angulis sublaevibus.* *S. Dyck Cat. rais.* p. 16; *A. angustifolia, β laevis*; maculis confluentibus obscuris, foliis laevissimis. *Salm. D. obs.* p. 58. *GASTERIA angustifolia β laevis* *Haw. Rev.* p. 47. (An huc *A. linguiformis β fol. laevibus.* *Lam. Enc.* l. p. 190?)

Flores se non vidisse. Maculae foliorum parum dilutiores, basi fere albae. Inamoena foliorum superficie, directione, formâ; multiplicatu difficilis. *S. Dyck Cat. l. c.* Folia paulumper attenuata, maculis obscuris, marmoreo dilutis, laevissima; superne cartilagine fere integra, inferne serrulata. Propagines rarissimae. *Id.* in *Obs. A. laevem H. berol.* non differre ab *A. Lingua*: *Link En.* p. 337. In *Prom. b. spei.* 4.

91. — *A. subverrucosa* *Salm-Dyck*; acaulis; foliis distichis, patulis, linguiformibus, supra planiusculis, apice obtu-

* *Gasteria subverrucosa*

vide Bot. Mag. A. Linguam Dec. xviii 1822.

sis cum mucrone, perviridibus, albo serialiter tuberculato-maculatis, scabris, ad margines dentato-serratis, asperis. *Salm D. obs. bot.* p. 67. *GASTERIA subverrucosa*; subsimplex; foliis linguiformibus, supra planiusculis, obtusis, perviridibus, albo serialiter tuberculato-marginatis. *Haw. in Phil. Mag.* p. 355. *α. A. subverrucosa α. grandipunctata*; foliis tuberculis latis, confluentibus, fasciatim pictis. *Salm D. obs. l. c.* et, se teste: *A. subverrucosa Cat. rais.* p. 19. *GASTERIA subverrucosa α grandipunctata Haw. l. c.* *β. A. subverrucosa β parvipunctata*; fol. longioribus latioribusque maculis minutis apice parerioribus ac distinctis, et basi, praecipue subtus, creberrimis, subconfluentibus. An species propria? *Salm D. obs. l. c.* *GASTERIA subverrucosa β. parvipunctata Haw. l. c.*

Caulis nullus. Folia 7-8 poll. in *α*, 8-10 poll. in *β*, basi 1½ poll. lata; juniora erecta, seniores patentissima, medio leviter depressa, subtus convexa, opaca, utrinque, praecipue subtus, serialiter tuberculata: tuberculis inferne laevioribus, superne asperis, in *α* latis, maculiformibus, fasciatim confluentibus, viridi-albidis; in *β* multo minoribus, sed numerosioribus, subtus basin versus creberrimis, subconfluentibus, ceterum distinctis, margine tuberculis numerosis, imo apice in cartilagine crenata confluentibus, a basi asperrime dentato-serratis, praecipue in *α*. Scapus 5-ped., simplex, bracteis quibusdam sterilibus. Flores racemosi, numerosi. Pedicelli bractea longiores. Cor. obclavata, basi ventricosa, rubicunda, tubo longiusculo, viridi, ore patulo. Stylus staminaque inclusi. Differt a *subnigricante* foliis obtusioribus nec nitidis, multo magis tuberculato-punctatis, margine a basi ad apicem asperrime serratis. Propagines fere nullae. *Salm-D.* An *GAST. distichae* affinior? quaerit *Haworth l. c.*, qui tamen juniora tantum specimina vidit. *In Prom. b. spei.* 4.

92. *A. verrucosa Ait.*; acaulis; foliis distichis, patentibus, angustissime linguiformibus, attenuatis, supra canaliculatis, apice acutis, in mucronem exeuntibus, atroviridibus, undique creberrime margaritaceo-tuberculatis, scaberrimis, margine truncatis, imo apice integerrime cartilagineis. *Salm-Dyck obs. bot.* p. 71. *Cat. rais.* p. 19. *A. a.*, fol. ensiformibus, acutis, papillosis, floribus racemosis, reflexis, clavatis. *Ait. hew.* 1. p. 468. 2. II. p. 296. (excl. syn. *Commel.* t. 9.) *Willd. Spec.* II. p. 189. *Enum.* p. 586. *A. a.* fol. dist., lineari-ensiformibus acutis, margine truncatis, utrinque densissime albo papillosis. *Willd. Mag.* p. 278. n. 7. *Bem.* p. 18. *Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 12. *Mill. dict.* n. 20. *Bot. Mag.* t. 837. *A. carinata β ensiformis. Dec. pl. grass.* n. 65. *A. Serra β verrucosa Pers. Syn.* p. 379? *GASTERIA verrucosa*; sobolifera, asperrima; fol. flexuosis, ensiformibus, inflexo-concavis, atro-viridibus, creberrime margaritaceo-tuberculatis. *Haw. Phil. Mag.* p. 356. *Synops.* p. 89. *β. latifolia*; fol. robustioribus, latioribus et brevioribus. *Salm D.* 1.

l. c. et, hoc teste: *A. carinata* Dec. *pl. gr.* (excl. syn.); *A. acuminata* Lam. *Enc.* 21. *GASTERIA verrucosa* β *latifolia* Haw. *rev. p.* 47. *Phil. Mag. l. c.* γ . *striata*; fol. longitudinaliter luteo-striatis. *Salm D. ll. cc.*

Caulis o aut brevissimus. Folia 10-11 poll., basi pollicem lata, in β 8-9 poll. et 1¹/₂ poll. lata; juniora erecta, seniora horizontalia, flexuosa, in-vel recurva, tuberculis sparsis, parvis, cretaceo-albis, margine truncato-aspere dentata. Scapus 2-3-ped., simplex, bracteis sterilibus, basi foliiformibus. Flores racemosi, numerosi. Pedicelli bracteam duplo longiores. Cor. obclavata, basi ventricosa, rubicunda, tubo brevi viridi, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. Differt ab omnibus tuberculis margaritaceis. Propagines numerosissimae. *Salm-D.* In *Bot. Mag.* scapus ruber, corolla pollicaris et ultra, apicem versus flavescens, obscure viridi fasciata. In *Prom. b. spei.* 4.

Obs. Si, monentibus omnibus auctoritatibus, excludenda t. g. Commelyni, tunc etiam excludenda *A. disticha* β *Linn. Spec.* 459., utpote huic synonymo in-nixa. Hanc vero *A. disticham* β *Linn.* synonymon jubet esse *distichae* *Thunberg*, qui in *Diss. n. g. Prodr.* 61. et *Fl. cap. ed. Schultes* p. 311. eadem utitur diagnosi, quam supra a *Willdenow* et ab omnibus laudatus *H. Kewensis*. *Aloeam disticham* describit *Thunb. l. c.* sequentibus: „folia vix ullum caulem formantia, sed imbricata, disticha, linguiformia, supra concava, subtus convexa, marginibus planata, undique albo-papillosa, erecto-patentia, spithamaea.“ Hanc, cum *Mill. dict. ed. 7.* et *Boerh. ind. alt. 2. t. 131. Till. pis. t. 8. verrucosae* synonymon esse postulat *Gawler* in *Bot. Mag.*, qui *acuminatam* *Lam.* duxit olim ad *sulcatam*.

93. *A. intermedia* Haw.; acaulis; foliis distichis, patentibus, anguste linguiformibus, attenuatis, supra concavis, apice obtusiusculis cum mucrone, laete viridibus, nitidis, crebre albo-tuberculatis, margine subtruncatis, scabris, apice integerrime cartilagineis. *Salm-Dyck obs. bot. p.* 69.; et hoc teste: *A. intermedia* α , et β *unilateralis*; foliis uno latere truncatis; et γ *truncata*; foliis utrinque margine truncatis. *Cat. rais. p.* 19. (excl. syn. *Dec. Commel. et Till.*) *Haw. Linn. Trans. 7. 12.* *Willd. Bemerk. 17.* *A. Lingua* α fol. minoribus, tuberculis margaritaceis, dense et confluentur pustulatis. *Bot. Mag. t.* 1522. f. 1. (cum synonymis pessimis, monente *Haworth*). *GASTERIA intermedia*; foliis anguste linguiformibus, attenuato-obtusiusculis, laete viridibus, albo creberrime tuberculatis, scabris, apice cartilagineo-asperimis. *Haw. Phil. Mag. p.* 356. β . *asperrima*; acaulis; foliis distichis, patentibus, linguiformibus, supra planiusculis, apice obtusis cum mucrone parvo, perviridibus, tuberculis validis, cartilagineis, nitidis, albidis vel viridibus, undique, sed praecipue ad margines creberrime et asperrime tectis. An propria species? *Salm-Dyck obs. l. c.* *GAST. intermedia* β . *asperrima* *Haw. l. c.* γ . *laevior*: tuberculis paucioribus. *GAST. i. \gamma. laevior. Haw. l. c.* δ . *longior*: foliis longioribus, acutioribus. *GAST. i. \delta. longior. Haw. l. c.*

Caulis o. Folia in α 7-8 poll., basi pollicem lata, juniora erecta, seniora patentissima, subtus convexa, apice varie obtusa vel acutiuscula cum mucrone lato et producto, laetissime viridia, utrin-

que tuberculato-scabra, tuberculis sparsis, parvulis, albis distinctis, margine quandoque obtuse cultrata, quandoque uno latere vel binis truncata, tuberculata, dentata, apice integerrime cartilaginea; in β paulo breviora et latiora, saturate viridia, tuberculis pellucidis, primum albidis, dein viridibus, ad margines validioribus. Scapus 2-3-ped., plerumque simplex, bracteis sterilibus. Flores racemosi, satis numerosi. Pedicelli longitudine bractearum. Cor. obclavata, basi ventricosâ rubicunda, tubo longiusculo viridi, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. Ab *A. subverrucosa* differt foliis angustioribus, attenuatis, subcanaliculatis, laete viridibus, undique tuberculis albis, numerosissimis. Propagines numerosissimae. β varietas insignis et forte propria species, differt colore perviridi, quo propior *verrucosae*; sed folia obtusa, latiuscula nec canaliculata, tubercula nullo modo margaritacea majorem cum *A. intermedia* affinitatem praebent. Propagines satis frequentes. *Salm-Dyck*. In *Bot. Mag.* folia margine apicis et carinâ subtus rubella. Scapus corallinus. Flores penduli, pollicares, apice albidae, striis viridibus. In *Promont. b. spei.* 2.

Obs. Enumeratis nunc omnibus pristinae *A. Linguae* varietatibus interest scire, quid sit: *A. Lingua*; subcaulis; fol. linguiformibus, denticulatis, glabris, distichis; floribus racemosis, erectis, cylindricis. *Thunb. Diss. n. 11. prodr. 61. Fl. cap. ed. Schult. p. 312?* Sub hac, eadem diagnosi utentes, *Hortus Kew. ed. 1. p. 469.* et *Willdenow Spec. II. p. 191.* comprehendebant *ALOËM angulatam (longifol. Haw.)* et *A. nigricantem Haw.* Quae vero ex his sub *A. Lingua Thunb.* lateat, non facile patet ex descriptione Thunbergiana, in qua: „folia radicalia vix caulem formantia, imbricata, disticha, laevia, apice rotundata, margine tenuissime denticulata, patenti-erecta, spithamea. Cor. ad medium 6-partita, subdigitalis; lacinae 3 exteriores crassiores, sanguineae, a basi ad medium cohaerentes, vix separandae sine laceratione; 3 interiores liberae, albidae, margine tenui, dorsali carinâ crassiore, sub apice virescentes. Stylus trigonus, staminibus longior. Stigma simplex, parum incrassatum. Caps. ovata, obtusa, glabra, 6-partita, dissepimento duplicato;“ eò minus, cum *A. linguiformem Linn. Suppl. p. 206.* ad suam laudasset, „quae monente *Linnaeo fil.* „arbor orgyalis“ et forte ad *plicatam* amandanda. An huc forte *A. racemosa Lam. Enc. 1. p. 91.* et suadente *Gawler A. verrucula Med. Theod. 73. n. 14.?*

Gasteria 94. *A. repens*; praesobolifera: foliis verrucosis, brevibus, inaequali-trigono-ensiformibus, inflexo-cavis, laete viridibus, denticulatis. *Haw. Phil. Mag. l. c. p. 356.* (sub

GASTERIA repente.) *GASTERIA repens*; foliis ensato-linguiformibus, albo-verruculosis; radice repente soboliferâ. *Haw. Rev. p. 48.*

Hybrida quasi *intermediam* inter et *carinatham*, at longe minor, verrucis innumeris albicantibus, praecipue sparsis, rarius subseriatis. Flores non vidi. Floruit in *H. Kew.* *Haw. Ph. M. l. c.*
184 *Habitat?*

95. *A. pusilla*; sobolifera; foliis brevissimis, maxime inaequali-trigonis, ensiformibus, tuberculato-asperiusculis.

GASTERIA parva Haw. Phil. Mag. l. c. p. 356.

Omniùm adhuc cognitarum minima. *Haw.* *Habitat?* *H. D. Hitchins.*

Gasteria 96. *A. decipiens*; simplex; foliis erecto-expansis, ovato-acuminatis, inflexo-concavis, superne carinatis, nigro-viridibus, granulis confluentibus nigris, antiquis demum laevioribus. *GASTERIA decipiens Haw. Phil. Mag. 1827. Novemb.*

p. 557. *HAWORTHIA nigricans*; aspera; fol. nigro-viridibus, erecto-expansis, pauculis, ovato-acuminatis, granulis crebris, confluentibus, tuberculiformibus, nigris. *Philos. Mag. et Journ.* 1824. *Octob. p.* 301.

Folia basin versus inflexo-concava, apice carinata ut in plurimis, ipsâ basi intus laevia. *Haw.* In *Prom. b. spei.* 4.

97. * *A. carinata Mill.*; acaulis, foliis spiraliter multifariis, inaequilateri-trigonis, supra excavatis, subtus carinatis, attenuatis, acutis, viridibus, apice complanatis, albo-tuberculatis, tuberculis ad angulos scaberrimis. *Salm-Dyck obs. bot.* p. 50. *Cat. rais.* p. 14. *Ait. Kew.* 1. p. 469. 2. II. p. 297. *Willd. Spec.* II. p. 189. (excl. syn. *Linn. et Martyn*). *Willd. Mag. l. c.* p. 278. n. 8. *Bemerk.* 18. *Lam. Enc.* 1. n. 22. *Mill. dict. ed.* I. n. 21. ed. 8. (fide *H. Kew.*) *Bot. Mag.* 1351. (figurâ dextrâ, monente *Haworth*, exceptâ, et ad *glabram* spectante). *A. carinata* α *acinaciformis*; fol. acinacif., profunde carinatis. *Dec. pl. gr. t.* 63? *A. disticha* β *Linn. Spec.* 459. (fid. *Haw. Phil. Mag. l. c. p.* 557. et, tunc fide hujus synonymi): *A. disticha triangularis H. par.* fid. *Lam. Enc. meth.* I. p. 90. *A. tristicha Medic. Theod.* 75. n. 15? *A. africana Dill. Elth. t.* 18. (optime!) **GASTERIA** *carinata*; sobolifera; foliis rectis, inaequaliter trigonis, tuberculis sparsis, scaberrimis, albicantibus. *Haw. Phil. Mag. l. c. p.* 557. *Syn. p.* 87. β . pulchrior; fol. pallidioribus. *Haw. Rev. p.* 205. γ . *A. carinata* β fol. subdistichis. *Bot. Mag. l. c.*

Caulis nullus. Folia 7-8 poll., basi 3 poll. lata: juniora erecta, seniores patula, incurvula, numerosa, lateribus convexiusculis, apice linguiformi, utrinque subserialiter tuberculata, tuberculis cartilagineis ad angulos majoribus, et versus apicem angulo carinali et uno laterali (altero oblitterato) in cartilagine integerrima confluentibus. Scapus pedalis simplex, bracteis quibusdam sterilibus. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli bracteis longiores. Corcalycina obclavata, ventricosa, basi rubicunda, medio alba et apice tubulosa, viridis, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. Differt ab *A. glabra* fol. tenuioribus, apice complanatim cultratis, verrucis multo asperioribus. Propagines numerosae. *Salm-Dyck.* In *Bot. Mag.* folia assurgenter divaricata dicuntur, a lata basi subacinaciformia, acuminata, crassa, rigida, tuberculis pallidis, parum elevatis, nunc in meras maculas subsidentibus, vagis parcius crebriusve inaequaliter conspersa, atro-viridia, subinde fuscescentia. In icone scapus sub floribus crassitie calami scriptorii, corallinus. Bracteae lineares, albae, deflexae, pedicellis semipollicaribus corallinis deflexis duplo breviores. Corpendula, basi ventricosa, coccinea, superne incurva, virescens, sulfureo-striata, vix 1 $\frac{1}{2}$ poll. Antherae flavae. In *Prom. b. spei.* 4.

Obs. Anne planta *Decandolli* potius ad β . cum folia glauca pallidaque? *S. Princ. Salm-Dyck A. africanam Commel. H. Amst.* II. t. 9. laudat quidem, sed malam esse iconem notat: ab aliis excluditur. *A. angulata, excavata et verrucosa* passim nomine *carinatae* in hortis occurrunt.

98. *A. strigata*; sobolifera; foliis rectis, inaequaliter trigonis, tuberculis magnis albis, subconfluentibus, saepe strigatis. *GASTERIA strigata* Haw. in *Phil. Mag.* l. c. 557.

Carinatae simillima, at major, foliis undique magis fasciatim, quam strigatim sparsimve maculatis s. verrucosis: verrucis paucioribus, albidioribus, magis distantibus et majoribus: nec non in pagina superiore laevioribus s. minus exstantibus quam in inferiore. Foliolorum strigae apicem versus praecipue. Haw. l. c. In Africa australiore. D. Bowie. 4.

99. *A. laetepunctata*; foliis rectis, inaequaliter trigonis, tuberculis magnis, numerosis, praealbis, pulcherrime sparsis.

GASTERIA laetipunctata Haw. in *Phil. Mag.* l. c. p. 557. β .

GASTERIA denticulata γ . Haw. *Rev. Succ.* 204.

Carinatae simillima, at forte minor, foliis adhuc angustioribus, tuberculis majoribus s. clarioribus concinnioribus magisque albis, vix per fascias et potius sparsis: Haw. l. c. qui nunc monet β huc potius quam ad *disticham* spectare, ubi tamen languentem hanc in *H. Kewensi* plantam potius ad *nitidam* vergere notat. Folia in β acuta, aspera, perbelle magnipunctata, margine apicem versus scabra, altero latere crassiora magisque aspera et tuberculata. In Africa australiore. 4. Bowie.

100. *A. subcarinata* Salm-Dyck; acaulis; foliis spiritaliter multifariis, patentibus, anguste linguiformibus, uno latere valde truncatis, supra planiusculis, subtus convexis, apice oblique flexis, obtusis cum mucrone, laete viridibus, albo subtuberculatis, angulis cartilagineo serratis. Salm-Dyck obs. bot. in H. Dyck. p. 51. quo teste: *A. subcarinata* et *pseudo-angulata* Ejusd. *Cat. rais.* p. 14. et 16. *GASTERIA subcarinata*; sobolifera; fol. inaequalissime trigonis, rectis: punctis albicantibus sparsis, asperis, supra planiusculis. Haw. *Phil. Mag.* l. c. p. 558. *Suppl. succ.* p. 49. β . *striata*; fol. eleganter albo striatis. Salm-Dyck obs. l. c. et, se teste: *A. pseudo-angulata* β . *Cat.* p. 26. *A. angulata*, δ , *striata* Willd. *Mag. V.* p. 276. n. 2. *Bemerk.* 16. *GASTERIA subcarinata* β , foliis viridi saturatoribus, asperioribus, subinde albo eleganter striatis. Haw. *Phil. Mag.* l. c. *Rev.* p. 47.

Caulis nullus. Folia $\frac{1}{2}$ ped., basi pollicem vel $1\frac{1}{2}$ poll. lata, patentissima, oblique flexa, numerosa, supra subinde subconcaeva, quandoque longitudinaliter sulcata, uno latere truncata, altero cultrata, laete viridia, utrinque subverrucosa punctis numerosissimis, parvulis, albis, irregulariter sparsis, apicem versus asperis et ad angulos in cartilagine dense serrata confluentibus. Scapus 2 ped. et ultra, simplex, bracteis quibusdam. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli bractea longiores. Cor. obclavata, basi leviter ventricosa, rubicunda, apice longe tubulosa, viridis, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. *A. carinata*, *glabra* etc. differt: foliis angustis, linguiformibus, subcarinatis. Propagines valde frequentes, et plantae juniores longo tempore distichae et cultratae: inde error in *Cat. rais.* *A. pseudo-angulata* (fol. linguiform., laete viridibus, parce albo-tuberculatis: junioribus obtusis, margine cultratis; in adultis oblique acutis uno margine

truncatis; angulis cartilagineo-serratis, *Cat. rais.* p. 16) est planta junior *A. subcarinatae*. *Salm-Dyck obs.* l. c. Cor. magis elongata, quam in *pulchra*. *Balb. in litt. Sprengel in S. V. A pseudo-angulatam* synonymon dixit *angulatae*. *In Prom. b. spei.* 4.

101. *A. undata*; nitescens: foliis inaequalissime trigonis, rectis, undato-obliquis, atroviridibus, glabris, albido sparsim multiguttatis: marginibus tuberculato-asperis. *GASTERIA undata Haw. Phil. Mag.* p. 358. *Gasteria undata* *fide Baker*

Flores non vidi, at nova species. Folia multifaria et inaequaliter carinatim trigona. *G. subcarinatae* affinis, at distincta, foliis magis nitentibus. Forsan hybrida species. *Hab.?* *In H. D. Hitchins.* 4. *Eastern*
subcarinata
fide Baker
of Rim
Soe xvii
192

102. *A. glabra Salm-Dyck*; foliis spiraliter multifariis, recurvo-patentibus, subaequilateri-trigonis, supra excavatis, subtus alte carinatis, acutis, subglabris, perviridibus, apice triquetris; maculis subprominentibus albis, angulis tuberculatis. *Salm obs. bot.* p. 48. *GASTERIA glabra*; simplex, sublaevis; foliis patenti-recurvulis, perviridibus, praecarinatis, albo valde sparse punctatis, marginibus tuberculatis. *Haw. Phil. Mag.* l. c. *α. major*; fol. longioribus. *A. carinata β. subglabra Haw. Linn. Trans.* 7. p. 14. *A. carinata S. Dyck Cat.* 13. *A. carinata Bot. Mag.* 1351. (fig. sinistr. folii, solum cum verbis: nunc in meras maculas subsidentibus). *GASTERIA glabra Haw. Syn.* p. 87. *β. minor*; fol. brevioribus, (laete viridibus). *S. Dyck obs.* l. c. *A. glabra β. brevifolia S. Dyck Cat.* l. c. *GAST. glabra β. minor Haw. Rev.* p. 47. *Phil. Mag.* l. c. *Eastern glabra*

Caulis nullus. Folia pedalia et ultra, in var. *α* 6-7 poll., in *β* basi 3-4 poll. lata, patentissima, subrecurva, numerosa, multifaria, crassa, supra excavata, subtus alte carinata, lateribus fere convexis, utrinque punctis numerosis albis parvulis irregulariter sparsis, versus foliorum apices subverrucosis, ad margines carinae cartilaginea, basi et apice integerrima, medio verrucis distinctis scabra, ad apicem aequilateri triquetra, carinam saepe dilatata. Scapus $1\frac{1}{2}$ ped., simplex, bracteis quibusdam sterilibus. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli bractea longiores. Cor. obclavata, ventricosa, basi rubicunda, apice tubulosa, viridis, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. Differt ab *A. nitida* fol. recurvatis, multo robustioribus, verrucoso-maculatis, margine scabris. Propagines rarissimae. *Salm-Dyck. In Prom. b. spei.* 4.

103. *A. nitida Salm Dyck*; acaulis; foliis spiraliter multifariis, fere aequilateri-trigonis, supra excavatis, subtus alte carinatis, acutis, glaberrimis, nitidissimis, viridibus; maculis albis sparsis vel subfasciatis, angulis integerrimis. *Salm Dyck obs. in H. Dyck.* p. 47. *Cat. rais.* p. 12. (excl. *γ*). *A. fol. etc.*; scapo simplici; bracteis assurgentibus. *Bot. Mag.* 2304. *GASTERIA nitida*; simplex: fol. subaequilateri-trigonis,

rectis, cavis, laevissime lucidis, albo maculatis. *Haw. Phil. Mag. l. c. p. 559.* *a. major Salm C. rais. p. 12.* *a. parvipunctata*; maculis parvulis, sparsis. *Id. obs. p. 47.* *GAST. nitida a parvipunctata*; fol. saturate viridibus, s. viridissimis, mac. p. sp. distantibus: floribus miniatis. *Haw. l. c.* (cui adhuc subvarietas floribus pallidioribus). *β. minor Salm Cat. p. 13.* *β. grandipunctata*; maculis majoribus serialibus. *Id. obs. p. 47.* *G. nitida β grandipunctata*; fol. perviridibus sed pallidioribus quam in *a*, maculis duplo majoribus, serialibus. *Haw. l. c.*

Caulis nullus. Folia fere pedalia, basi 4 poll. lata, juniora erecta, seniora patula, numerosa, supra excavata, subtus alte carinata, latere truncato - concaviuscula, ad angulos laevissima, apice acuminata, undique absolute polita, nitidissima, viridia, maculis in *a* irregularibus, in *β* praecipue subtus in fascias dispositis. Scapus 5-4-ped., simplex, bracteis quibusdam sterilibus et solitariis. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli bractea longiores. Cor. obelavata, basi parum ventricosa, miniata, a medio ad apicem tubulosa, flavo-virens, ore patula. Stylus staminaque inclusi. Propagines nullae; plantae juniores distichae, rugosae. Ab *A. trigona* differt fol. numerosioribus, lucidissime politis, basi latioribus, apice acutis, margine glaberrimis magisque carinatis excavatis ac multifarie divergentibus. *S. Dyck. In Bot. Mag. folia saporis dulcescentis dicuntur, inaequaliter trigona, subtus inaequaliter convexa, facie minore plana, angulis cartilagineis, acumine subpungenti. Scapus basi compressus, superne teres. Flores curvati, basi incrassati, superne attenuati, odore Hyacinthi. In β, flores, ni fallor, ait Haworth, longe pallidiores. An propria species? In Prom. b. spei, unde semina a D. Swetlingreben, 4.*

104. *A. trigona Salm D.*; foliis spiraliter multifariis, inaequilatere trigonis, supra concavis, subtus oblique carinatis, attenuatis, apice obtusiusculis cum mucrone, glabris, nitidis, laete viridibus, maculis permultis albis, fasciatim dispositis, angulis tuberculatis. *Salm Dyck obs. in H. bot. Dyck. p. 45. (excl. β.)* *G. sobolifera*, foliis inaequali-trigonis, attenuatis, oblique carinatis, laete viridibus; maculis permultis albis, fasciatis; marginibus tuberculatis. *Haw. l. c.* (sub *GASTERIA trigona*). *Phil. Mag. l. c. t. 559.* *A. trigona a elongata*; fol. longioribus et angustioribus. *Salm D. Al. Curvisl. 45.* *A. acinacifolia γ. angustifolia*; fol. patulis, multifariis, angustis, superne canaliculatis, subtus inaequilateri-carinatis, marginibus tuberculato-denticulatis. *S. Dyck Cat. rais. p. 12.* *A. acinacifolia δ. laete virens*; fol. laete viridibus et paulo latioribus. *S. Dyck l. c.* *β minor.*

Caulis nullus. Folia pedalia, basi 3 poll. lata, juniora erecta, seniora patentia, supra concava, subtus carinata lateribus convexiusculis, ad angulos tuberculata, basi et apice integra, laete viridia, maculis numerosis, albis, parvulis, rotundatis, solitariis vel confluentibus, transversim in fascias dispositis. Scapus 2 ped.,

simplex, bracteis quibusdam sterilibus, solitariis. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli bractea paulo breviores. Cor. calycina obclavata, basi parum ventricosa, laete rubicunda, a medio ad apicem tubulosa, laete virens, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. *Salm-Dyck*, qui in plantis junioribus propagines numerosas, laeves, nec ut in *acinacifolia* β tuberculatas, notat, et folia per plures annos disticha, cultrata. β . in *H. D. Hitchins. In Prom. b. sp. 4.*

105. *A. obtusa*; simplex; foliis inaequilateri-trigonis, ^{Gasteria}oblique carinatis, excavatis, viridibus; maculis multis albis ^{obtusis}fasciatis; marginibus tuberculatis apiceque subobtusatis. *Haw. fide Beck Phil. Mag. l. c. p. 559.* (sub *GASTERIA obtusa*) quo teste: *A. f. Linn trigona* β *obtusa*; fol. brevioribus, latioribus, margine et apice ^{soe.}obtusioribus magisque excavatis et carinatis. *Salm-Dyck xviii 19 obs. bot. p. 46.* (excl. syn. *nitentis Haw.* cum? licet allati). *A. nitida* γ . *brevifolia*; fol. obtusis, magis excavatis. *Cat. p. 15.* (excl. syn. *Suppl. pl. succ. 48.*)

Folia (supra valde excavata et) in junioribus rugosa, 6-9 poll., basi 5 poll. lata. Propagines nullae. „Forte „(jam olim in *obs. monuit S. Princeps*)“ propria species, cui locus *A. nitidam* inter et *glabram* assignandus. Ab *acinacifolia* inflorescentiâ, foliorum formâ et staturâ minore valde differt. Ab *A. nitida*, cui magis affinis, propter folia angustiora, minus carinata, apice obtusiora et margine tuberculata satis diversa.“ *Salm-Dyck. Habitat in Prom. b. spei? 4.*

106. *A. acinacifolia Jacq.*; acaulis; foliis spiraliter distichis, uno latere truncatis, longissimis, acinaciformibus, supra concaviusculis, apice attenuatis, acutis, glaberrimis, nitidis, laete viridibus, maculis distinctis, subfasciatim dispositis, angulis interrupte cartilagineis, denticulatis. *Salm-Dyck obs. in Hort. Dyck. p. 44.* *A. foliis erecto-patulis, latiusculis, spiraliter distichis, inaequilateri-triquetris, acinaciformibus, superne concaviusculis, subtus convexis, apice acutis, atroviridibus, albido seriatim maculatis, glaberrimis, nitidis, margine interrupte cartilagineis, basi integerrimis, apice denticulatis. S. Dyck Cat. rais. p. 12. et 45. (excl. γ . δ .) Al. Curv. p. 44.* *A. acaulis; foliis distichis, acinaciformibus, angulis cartilagineo-aculeatis; floribus racemosis, pendulis, cylindricis. Jacq. Ecl. p. 49. t. 51. Bot. Mag. 2569. GASTERIA acinacifolia Haw. Suppl. p. 49. Rev. p. 48. G. foliis inaequaliter triquetris, acinaciformibus, longissimis, nitidis, laete viridibus; maculis pallidis fascialibus; marginibus interrupte cartilagineis. Haw. Phil. Mag. l. c. p. 559. a. major; fol. plus quam 2 ped., floribus 1½ poll., propaginibus nullis. Haw. Ph. Mag. l. c. β . minor; propaginibus frequentibus. Salm l. c. Haw. l. c.*

Caulis nullus, vel aetate brevissimus. Folia 2 ped. et ultra, basi poll. 3 lata; juniora erecta, seniora patentia, acinaciformia, su.

perne et latere truncato-concaviuscula, ad angulos basin versus tuberculis cartilagineis confluentibus integra, apicem versus denticulata, lacte viridia, maculis numerosis albidis, solitariis vel confluentibus subfasciatim ornata. Scapus 5 ped., simplex, bracteis quibusdam, ternis oppositisve solitariisque instructus. Flores numerosi, racemosi. Pedicelli bractea longiores. Cor. clavata, $1\frac{1}{2}$ poll., basi attenuata rosea, tubo longo amplo virescenti, ore subpatulo. Stylus staminaque inclusi. In juvenulis folia exacte disticha, undique tuberculis numerosissimis scabra, utroque margine cultrata. Differt a *pulchra* fol. omnibus radicalibus duplo triplove longioribus et latioribus, lacte viridibus, minus variegatis; corollis $1\frac{1}{2}$ poll. „Folia adulta laevia, junidra tuberculis parvis exasperata.“ *Salm. D. l. c.* „Rad. fibris carnosis, crassis. Caulis 0. Folia 5-6, patentia, $1\frac{1}{2}$ ped. et ultra, 2 poll. lata, glabra, saturate viridia, maculis albis variegata, mucronata, marginibus 3 cartilagineis, aculeato-scabris, subdiaphanis. Flores 20 et ultra in racemo simplici, $1\frac{1}{2}$ ped. Scapus obliquus, 5-ped., inferne anceps, superne fere teres, glaucescens, bracteis paucis ternis oppositis et solitariis, ovato-lanceolatis, cuspidatis, scariosis. Pedicelli laxi, penduli, singuli bractea unica, sessili, minima, scariosa, lineari-lanceolata. Cor. campanulata, incurvata, subcarnosa, ($1\frac{1}{2}$ poll.); tubo roseo, limbo profunde 6-fido, virescente, subringente, laciniis apice reflexis. Stamina corollae breviora, declinata, 3 longiora. Germen oblongum, subtrigonum. Stylus declinatus, primo longitudine staminum, post anthesin vero corollae paulo longior. Stigma cernuum, villosum. *Jacq. Sprengel S. V. 2. p. 70.* synonymon dicit *excavatae!* *In Prom. b. spei. 4.*

107. *A. nitens*; foliis subacinaciformibus, lacte viridibus, crassissimis, longissimis, maculis pallidis, sparsis conjunctisve submarmoratis. *Haw. Phil. Mag. l. c. p. 360.* (sub *GASTERIA nitente*) quo teste: *a.* fol. erectioribus ut supra, subinde $1\frac{1}{2}$ ped.; floribus $1\frac{1}{2}$ poll. *Haw. l. c.* *GASTERIA nitens*; fol. spiraliter bi-multifariis, nitidis, lateraliter alte carinatis, obsolete maculatis, marginibus carinaeque cartilagineo-albicantibus, tactu rugosiusculis. *Haw. Suppl. succ. p. 49.* *GASTERIA acinacifolia* *β. nitens*; foliis adultis oblique bi-multifariis, inaequilateraliter triquetris, ensato-linguiformibus, longissimis, subnitentibus, viridibus, albo confluentibus maculatis; marginibus tuberculato-cartilagineis, asperiusculis. *Haw. rev. p. 48.* *β.* foliis brevioribus, magis patentibus, magis maculatis, floribus minus elongatis. *Haw. Ph. M. l. c.* *GAST. acinacifolia* *γ. patula* *Haw. Rev. p. 205.*

„Ab *acinacifolia* distinguitur punctis maculisque sparsis nec fasciulis. Flores fere ut in *candicante*, apice magis aperti, pedunculis longis, debiliter flaccide dependentibus ob ponderosa perigonina. Non est *obtusa* varietas *G. trigonae*, ut videtur *S. P. Salm. D.*, quae multoties minor, et longe alia.“ *Haw. Ph. M. l. c.* *In Suppl. succ.* „foliis saepe dodrantalibus, linguiformibus, superne attenuatis, obtusiusculis, vix mucronatis, basi 2-5 poll. latis, infra apicem $\frac{1}{2}$ poll., crassis, duris, laevissime nitentibus, lacte viridibus, maculis variis confluentibus, aliisque rotundis

punctiformibus obsolete albicantibus, undique marmoratis“ descripsit, et adjecit: „flores non vidi: sine dubio abbreviati.“ At in *Revisione* dubitandum esse natura docuit de rebus non visis: „Flores 1½ poll., longiores omnium mihi notarum, forteque minus incurvi. Folia 1½ ped., alte viridia, obtuse carinatum inaequilateraliter triquetra.“ — *Sprengel* in S. V. synonymam *glabrae* dicit. In *Prom. b. spei?* 4.

108. *A. venusta*; foliis ensiformibus, longis, nitentibus; maculis numerosis, asperiusculis, albis; marginibus valde cartilagineis, obtuse interruptis. *GASTERIA venusta* *Haw.* in *Phil. Mag. Nov. 1827. p. 361.*

Folia adhuc juvenilia pedalia, bifaria, sine carinis, sed vix semper; etiam undique asperiuscula, uti in juvenilibus *acinacifoliae*, a qua differt foliis minoribus, macrioribus adhuc, maculis magis claris distinctisque, albis, pulchrioribus. *Haw.* In *H. Kew.* 4.

109. *A. pluripunctata*; foliis ensiformibus, acuminatis, viridibus, albo creberrime tuberculatim exasperatis. *GASTERIA pluripunctata* *Haw. Phil. Magaz. Novemb. 1827. p. 360. β.* foliis adhuc magis maculatis.

Specimina nuper allata, foliis adhuc asperiusculis, sed distincta species. *Haw.* In *Prom. b. spei.* Apud *D. Hitchins.* 4.

110. *A. ensifolia*; foliis longissimis inaequaliter carinato-trigonis s. ensiformibus, confluentem multiguttatis. *Haw. Phil. Mag. Novemb. 1827. p. 360.* (sub *GASTERIA ensifolia*). *GASTERIA ensifolia* fol. cultratis, cuspidatis etc. *Haw. in Philos. Mag. et Journ. 1825. Octob. p. 282.*

Acaulis, foliis nunc exacte distichis, bipedalibus, supra planis, obscurioribus, subtus parum convexis, at macrioribus quam in plurimis *GASTERIIS*, guttis numerosissimis albis saepe confluentibus marmoratis, potiusve fere tectis, praecipue subtus, ibique pulchrioribus albidioribus. *G. candicanti* affinis; at foliis duplo fere angustioribus minus confluentem maculatis, et adhuc omnino sine carina distincta. Nondum floruit. *Haw. 1826.* „*G. acinacifoliae* forte nimis affinis.“ *Haw. Nov. 1827.* In *Africa australiore.* 4.

111. *A. candicans*; foliis longis, inaequali-carinato-trigonis, subacinaciformibus, glabriusculis, maculis albis, maxime confluentibus. *Haw. Phil. Mag. Novemb. 1827.* (sub *GASTERIA candicante*). *GASTERIA candicans*; foliis exacte distichis, ensato-linguiformibus, macris, glabris, subtus verrucoso-asperiusculis: verrucis cartilagineis, albis, subconfluentibus. *Haw. Revis. p. 46. 205.*

Acaulis; foliis pedalibus, subtus candicantibus, ob verrucas numerosissimas confluentes. Foliorum margines albo-cartilaginei, viridi parum interrupti: subinde folium altero latere truncato-carinatum. Cor. 1½ unc., totae rubrae. Formosa bonaque species. Ab *A. nitida* *Salm* et *acinacifolia* *Jacq.* discrepat absentia angulorum; a caeteris contiguis longa corolla: nisi in *subnigricante* „tubus amplus, brevis, viridis“ huic proxima. *Haw. l.c.* Folia multifaria saepe albo quasi saccharata. Flores pallidiores,

magis penduli, longiores minusque curvati, quam in aliis sectionibus, fere 2 poll., grossi, apice rectiusculi s. minus patuli, pallido albove marginati. Bracteae pedunculos aequantes. *Haw. Ph. M. l. c.* In *Prom. b. spei.* 4.

112. *A. linita*; foliis linguiformibus, subobtusis, mucronatis, sordide albo fuscoque marmoratis: marginibus late cartilagineis. *GASTERIA linita Haw. in Phil. Mag. Nov. 1827. p. 361.*

Folia adhuc disticha, vix pedalia, atro-viridia, maculata et marmorata, subtus saepe quasi pigmento albo linita, marginibus interrupte asperis, apice laevioribus. Aetate forte carinata multifariaque evadunt. *Candicanti* affinis, at valde distincta. In *Prom. b. spei.* 4.

Gasteria bicolor 113. *A. bicolor*; foliis anguste linguiformibus, obtusis, biconvexis, laevissimis, pallidis, imis subtus maculato-marmoratis. *GASTERIA bicolor Haw. in Phil. Mag. et Ann. Baker of Phil. 1826. April. p. 275. Novemb. 1827. p. 361.*

fide Baker "Folia inter erectiora, nunc pedalia, disticha, carinata, sed forte non in aetate; omnium pallidissime virescentia, mucronata, supra immunia; marginibus superne cartilagineo-asperiusculis et intra ipsam marginem margine alio lineari concinno atro-viridi. Subtus infima folia crebre ac subsordide et saturate varie marmorata. Flores non vidi." *Haw.* In *Prom. b. spei.* 4.

C. *Grandiflorae.* (ALOE Willd. et Haw.)

a. *Acaules, vel caule senecto brevissimo.*

114. **A. humilis Lam.*; foliis subulatis, supra turgidis, inermi-spinosis, infra tuberculatis, apicibus rectiusculis: bracteis internodio longioribus; stylo staminibus brevioribus. *Haw. Syn. p. 85. Linn. Soc. Trans. 7. p. 15. S. Dyck Cat. rais. p. 20.* *A. fol. oblongo-lanceolatis, spinoso-dentatis, subverrucosis; corollis nutantibus, cylindricis; petalis aequalibus. Willd. Enum. p. 585. Magaz. l. c. p. 287. n. 9. (excl. Bot. Mag.) Lam. Enc. meth. 1. p. 88. n. 12.* *A. acaulis; foliis undique inermi spinosis, adscendentibus, subulato-trigonis. Dec. grass. t. 39. Hort. Kew. ed. 2. II. p. 294. (excl. syn. Bot. Mag. 757. 828. monenté Haworth in Syn.) Thanb. Diss. n. 6. prodr. 61. Fl. cap. p. 511. Willd. Spec. II. p. 187. Mill. Dict. 1. n. 16. ed. 8. n. 10. (fide Dec., qui huc iterum instar β , cum Willdenow in Spec., *A. elongatam Murr.*, quam prius ad *A. vulgarem barbadensem* laudavit.) *A. perfoliata* ξ *humilis H. Kew. ed. 1. p. 467.* *A. perfoliata* \circ *humilis. Linn. Spec. p. 458, quo teste: Commel. prael. 77. t. 26. rar. t. 46. (quae humilis α Willd. Spec. l. c.) CATEVALA humilis Medic. Theod. p. 69. β major; foliis aliquot latioribus. S. Dyck l. c. γ . incurva; S. Dyck l. c. *A. incurva*; foliis subulatis, teretiusculis, undique valde tuber-**

culatis, apicibus incurvatis; bracteis intermedio brevioribus; stylo staminibus longiore. *Haw. Syn.* p. 85. *A. humilis, incurva Haw. Linn. Soc.* 7. p. 15. *A. humilis Jacq. Schönbr.* t. 420. *A. humilis β incurva*; floribus non nihil splendidioribus, majoribus atque crebrioribus; fol. angustioribus, magis glaucinis, subadscenderent incurvatis. *Bot. Mag.* 828.

„Folia plus minus tuberculata, in α apice rectiuscula vel incurva, in β incurvata; flores cylindrici, laevissime ventricosi, laciniis 5 exterioribus concavis et angustioribus; bractea internodio duplo triplove longiores. Maxima cum *echinata* et *tuberculata* affinitas, ut nec longitudine pistillorum bractearumve, nec formā corollae tuto distingui possint.“ *S. Dyck Cat. rais.* p. 53. In spontanea apud *Thunberg*: „Folia radicalia, plurima aggregata, margine et paginā undique aculeata, incurva, digitalia vel paulo ultra. Scapus flexuoso-erectus, squamis tectus, 2-ped. Flores ante anthesin erecti, sub florescentia nutantes, dein iterum erecti. Cor. sanguinea, ore aequali, virescente. Apud *Decandolle*: radices numerosae, fasciculatae, cylindricae, crassiusculae, caule nullo brevive, foliis obsito. Folia in cespitem congesta, adscendentia, apice saepe superne subrecurva, amplexicaulia, subulata, subtrigona, superne plana, inferne convexa, glauca, interdum apice rubentia, undique obsita spinis herbaceis, mollibus, albidis verrucisve obtusis. Pedunculus floralis cylindricus, rubens, polline griseo, bracteis jam a basi sparsis, ovato-acuminatis, longis, marcescentibus, striatis, infimis aliquando folio conformibus. Flores spicati, triplici lineā spirali circa axin deducti, pedicellati, primo erecti, sub anthesi lucem versus penduli, maturescentes iterum erecti. Cor. cylindrica, amoene rubicunda, apice virescens: petalis 3 externis oblongis, concavis, apice paulo revolutis; 3 internis oblongis, planiusculis, tenellis, albidis, apice paulo revolutis. Filamenta alba, planiuscula, inaequalia, corolla paululum breviora. Antherae ovatae, crassae, erectae, externe medio insertae, polline croceo. Germen cylindricum, virescens, sulcis 6. Stylus filiformis, longitudine staminum, albo-virescens, stigmate albo. Caps. cylindrica, obtuse trigona, sulcis 6, loculis dissepimento subbipartitis. Semina rotundata.“ In β scapus simplex; bractea intervallis suis multo longiores. γ differt a β: foliis multo angustioribus et subulatis; bracteis brevioribus magisque distantibus. *C. de Spin in litt. ad Balbis.* In γ s. *A. humili*, apud *Jacquin*: Folia radicalia plurima in rosa densa, extima patentissima, intima erecta, crassa, pulposa, glauca, foris striata, facie lineata, utrinque margineque spinis carnosissimis, antice plana, dorso convexula, basi fere 1/2 unc. lata, sensim in extremitatem subulatam terminata, 4 unc., amaricantia. Scapus teres, 2 ped., calamo crassior, glaber, fuscescens, erectus; spathis lanceolato-cuspidatis, acutis, striatis, semiamplexicaulibus, erectis, margine membranaceis, semipellucidis, virescentibus, unciā longioribus. Flores racemosi, unc. longiores, (fere 1 1/2 poll.) ante et post explicationem erecti, sub explicatione horizontales vel magis penduli. Pedicelli teretes, semper erecti, glabri, fere 1 1/2 unc., spathā suffulti. Cor. miniata, superne pallida cum fascia media longitudinali viridi, apice patula, obtusa, fere hexapetala; petalis basi connatis; exterioribus linearibus et angustioribus: interioribus spathulatis, omnibus conca-

vis. Filamenta subulata, declinata, albida, alterna paulo longiora corollam aequantia. Antherae ovatae, suberectae, aurantiacae. Germen oblongum, teres, sexsulcum. Stylus longitudine staminum. Stigma simplex, obtusum. Caps. oblonga, obtusè trigona, obtusa, erecta, cinerea, unc.. Semina plura, nigra. In *Prom. b. spei.* 4.

115. *A. echinata Willd.*; acaulis; foliis oblongo-lanceolatis, spinoso-dentatis, subtus albo-verrucosis; corollis cernuis, cylindraceo-ventricosis; petalis inaequalibus. *Willd. Enum. H. berol. p. 385. Magaz. p. 278. n. 10. (excl. synonym. Curt. Mag. 828.) S. Dyck Cat. rais. p. 21. Haw. revis. p. 42. Link Enum. p. 338.*

„Foliorum formâ *tuberculatae* propior quam *humili*; ab utraque floribus brevioribus magisque inflatis distincta.“ *S. Dyck l. c. p. 53.* Petala in hac specie aequalia. *Balb. in litt.* „*A. tuberculatae Nob.* similis; at forte duplo major. Unam plantam solum vidi.“ *Haw. l. c.. In Prom. b. spei.* 4.

Obs. Huc *Willdenow* traxit: *A. humilem Jacq., A. humilem* β *Bot. Mag. 928., et Haw. Linn. Trans. cum Commel. Prael. p. 77. t. 26, rar. p. 46. t. 46.*

116. *A. tuberculata Haw.*; foliis acuminatis, supra concaviusculis, undique numerosissime tuberculatis. *Haw. Syn. p. 84. Linn. Soc. tr. 7. p. 16. S. Dyck Cat. rais. p. 21. Link Enum. p. 338. β . major S. Dyck l. c. Van Marum.*

„Folia oblongo-lanceolata, attenuata, in acumen producta, flexuosa, viridi-glaucis, supra planiuscula, undique tuberculis numerosissimis, subseriatim echinato-spinosis, apice varie in-vel-recurvatis; bractee late albo-marginatae, longitudine internodii; stylus staminaque inclusi. Folia magis, quam in *echinata*, spinosa, irregulariter flexa; propaginibus facilis multiplicatu. β fors *echinata Willd.*“ *S. Dyck l. c.. Affinis A. humili*; sed tubercula magis plana, copiosiora, et seriatim disposita. *C. de Spin in litt. ad Balb.. In Prom. b. spei.* 4.

Obs. An huc *tuberculata*; fol. lineari-lingulatis, acutis, acute cartilagineo-mucronatis, inferne canaliculatis, cartilagineo-tuberculosis. *Iagascoa gen. et spec. p. 13., in qua corollae incurvae, et quam A. tuberculatae Willd (?) affinem, sed diversam dicit.*

117. *A. longiaristata*; foliis lorato-acuminatis, gracilibus, numerosissimis, aristâ longâ finientibus. *A. aristata Haw. in Philos. Mag. et Journ. 1825. Octob. p. 280.*

Species praesingularis, atque formosa magnitudine fere *A. tuberculatae Nob.*, et pone eam fortasse locanda; at foliis gracilioribus, numerosioribus, subincurvis, expansis, utrinque convexulis, crebre ac valide albo-serratis, aristâque semunciali (citius) emarcidâ: supra glabris, laevibus, serie unicâ longitudinali, centrali apicem versus tuberculorum spinularumve, subtus albo subfasciatim tuberculatis spinulosisque, spinulis herbaceis innocuis affinium. Flores spicati, formosi, pallide corallini, fere ut in affinibus. *Haw. In Prom. b. sp. D. Bowie.* 4.

118. *A. suberecta Haw.*; foliis septuncialibus, acuminatis, glaucis: supra planis, laevibus, subtus apicem versus tuberculatis; laciniis corollae acuminatis, incurvis, apice sub-

crenulatis. *Haw. Syn. p. 84.* *A. suberecta* *H. Kew. ed. 2. II. p. 295.* *A. suberecta* β *Haw. Trans. Linn. Soc. 7. p. 16.* *A. perfoliata* μ *suberecta. Hort. Kew. ed. 1. I. p. 467.* *A. acuminata* β *major. S. Dyck Cat. rais. p. 21.* β . *semiguttata*; fol. ovatis, longe acuminatis, supra glabris, subtus tuberculatis: carinâ apice marginibusque crebre spinosis. *Haw. rev. p. 41.*

β . Staturâ et magnitudine *A. suberectae*: differt praecipue tuberculis valde numerosis, albis, in foliorum pagina inferiore. *A. acuminatam* quoque simulat; at duplo et ultra major; foliis forte magis patulis, spinis marginalibus carinaeque albis multo crebrioribus. Sobolem rarius profert. Forte propria species. *Haw. rev., In Promont. b. spei. 4.*

119. *A. acuminata* *Haw.*; foliis subquadriuncialibus, acuminatis, glaucescentibus: supra planis, laevibus, parce spinosis, subtus valde tuberculatis; laciniis corollae obtusis. *Haw. Syn. p. 84.* *S. Dyck Cat. rais. p. 21.* *Link Enum. p. 358.* *A. suberecta* α *Haw. Trans. Linn. Soc. 7. p. 16.* *A. humilis* *Bot. Mag. 757.* (nec aliorum, exclus. synonym. fere omnibus, monente *Haworth.*)

„*Suberectâ* duplo triplove minor, propaginibus radicalibus frequentibus, laciniis corollae magis expansis.“ *Haw. Syn. l. c.* „Folia lineata, ovato-lanceolata, supra fere laevia, subtus subseriatim echinata, margine et carinâ remote et subinermi spinosa. Intermedia *tuberculatam* inter et *virentem*, cujus foliorum longitudo, quae in β , in qua folia supra spinis quibusdam instructa, bracteae internodio duplo longiores, stamina inclusa, stylus exertus. *S. Dyck Cat. rais. p. 21. 54.* Flos cernuus, magis laxus. Bracteae pedicello breviores. Spica magis laxa. *Balb. in litt.* Caudex o. Folia scapum cespitose cingentia, assurgentia, superne saepius subincurva, late subulata, plano-convexa, interdum fere trigona, spinis albis, subcartilagineis, molliusculis, inermibus: marginalibus dentiformibus, regularibus, numerosis, caeteris saepius abortivis et pustulas minutas albidas referentibus. Scapus centralis, erectus, $\frac{1}{2}$ - 2 ped., viridis, a basi bracteis convolutis, acuminatis, membranaceis, albis, superne fertilibus, violaceo-striatis. Racemus spicatus, longiusculus, nec valde densus. Pedicelli longitudine bracteae et corollae, erecti. Cor. pendula, cylindrica, ante expansionem coccinea, postea flava, apice aurantiaco viridi-striata, 2-poll., ad basin usque partita: lacinae 3 exteriores angustiores, magis succulentae; interiores fere membranaceae; omnes ore patulo reflexae. Filamenta subinaequalia, fere longitudine corollae, flava; antheris coccineis. Stigma simplex. *Gawl.* Folia majora, spinae firmiores quam in *A. humili* *Link. In Prom. b. spei. 4.*

120. *A. subtuberculata* *Haw.*; foliis glauco-caerulescentibus, laevibus, subtus superne maculato-tuberculatis, maculis infimis non elevatis. *Haw. in Philosoph. Mag. et Journ. 1825. Octob. p. 280.*

A. acuminatae *Haw.* proxima; sed adhuc duplo minor, foliis magis caerulescenti-glaucis albisve, spinis marginalibus numerosiori-

bus, potiusve confertioribus, brevioribus, niveis. Foliorum tubercula pauca, apicem versus solum posita, horum infima laevia et immersa, nec elevata, maculas veras laeves formantia. Flores non examinavi. *Haw.* In *Prom. b. sp. D. Bowie.*

121. *A. virens* *Haw.*; foliis subacutis, oblongo-lanceolatis, viridibus, parce maculatis, marginibus remote spinosis: spinis viridibus; floribus thyrsis spicatis. *Haw. Syn. p. 83. Linn. Soc. trans. 7. p. 17. S. Dyck Cat. rais. p. 22.* *A. subcaulescens*; fol. oblongo-lanceolatis, patentibus, laete viridibus, glabris, utrinque albo-maculatis, margine remote spinosis: spinis uncinatis. *Willd. Mag. etc. p. 279. n. 15. Bot. Mag. 1355.*

„In Caldario caulescens, quod non in Frigidario.“ *Haw. Syn. l. c.*
 „Folia longe et anguste lanceolata, supra fere planiuscula, subtus valde maculata, margine solum subinermi-spinosa. Pedunculus basi anceps, angulis subspinosis, bracteis quibusdam instructus; stamina longitudine perigonii; stylus paululum longior. *S. Dyck. l. c.* Scapus basi nudus. Affinis *A. humili* β . *majori*; sed folia majora, laetius viridia, tuberculis subtus nullis. *C. de Spin.* (qui sub nomine *A. acuminatae* tulit) in *litt. ad Balb.* „Caudex subnullus, interdum $\frac{1}{2}$ ped., sarmentosus. Folia pedalia circiter, pallide viridia (mali ad instar) recurvato-divaricata, lingulato-attenuata, plano-convexa, subtus prominule guttata, molliter rectaque spinosa. Racemus rarus. Pedicelli adscendentes, corollâ duplo breviores, bractea duplo longiores. Cor. pendula, clavato-tubulosa, tubo tereti-trigono, ventricose dilatato, laciniis ad medium fere usque coalitis, $1\frac{1}{2}$ -2 poll., flavescenti-coccinea, apicem versus viridula. Antherae coccineae, subexsertae. *Gawl. In Prom. b. spei. t.*

b. *Caule senecto suffruticoso:*

foliis immaculatis:

122. **A. prolifera* *Haw.*; subacaulis; foliis lanceolatis, acutis, glaucis, marginibus carinaeque apice spinosis, vix cartilagineis, subtus subtuberculatis. *Haw. Linn. Trans. 7. p. 16. S. Dyck Cat. rais. p. 23. A. brevifolia* *Haw. Syn. p. 80. Revis. p. 202.* *A. fol. cespitosis*, brevissimis, glaucis, apice trigonis, angulis spinosis; spinis albis, apice numerosissimis. *Decand. Pl. gr. t. 91. Gart. Mag. 1809. p. 89. t. 18. Bot. Reg. t. 996. H. Kew. ed. 2. II. p. 294.* *A. caulescens*; caule abbreviato; fol. ovatis, patulis, spinoso-serratis: serraturis superioribus approximatis, apice triquetris, subtus in costa media subspinosis; racemo simplici; pedunculis corollâ cylindricâ nutante brevioribus. *Willd. Enum. p. 584. Idem Berl. Mag. n. 27. A. brevioribus etc. Mill. Dict. n. 8. A. perfoliata* γ *Lam. Enc. meth. n. 11. (fid. Decand.) Commel. Prael. 22. (fid. Haw. in Revis. p. 202.)* β *major.* Simillima, sed major; fol. duplo latioribus et longioribus; spinis marginalibus remotiusculis. *S. Dyck l. c. Commel. Prael. t. 22. (fid. S. Dyck).* Ergo *A. perfoliata* δ . *Linn.*

Spec. Willd. Spec. II. p. 185. A. prolifera; subacaulis; fol. ovato-lanceolatis, acutis, glaucis: marginibus carinâque apice remotiuscule spinosis, vix cartilagineis, subtus subtuberculatis. Haw. Rev. p. 203. Suppl. pl. succ. p. 44.

„Caulis tantum in senecta et in Caldario.“ *Haw. l. c.* In icone in *Bot. Reg.* dentes foliorum virentes, reflexi, 2 lin.. Bracteae rhachi adpressae, virentes, pedunculo longiores, lanceolatae, apice purpurascens. Cor. cernuae, 1½ poll., sulfureae, aurantiaco variegatae, lacinae exteriores lanceolatae, interiores ovatae, pallide viridi-flavescentes, nervo medio atrovirente. *Sprengel* hanc cum *distante* conjunxit! β fol. duplo majoribus, spinis marginalibus remotiusculis. *Haw. Rev. p. 203.* Folia breviter acutata, supra planiuscula, aculeis incurvis. *Link.* Radices cylindricae, ramosae. Folia subradicalia, quasi cespitosa, approximata, crassa, dura, obtusiuscula, apice trigona, marginibus spinis perpendicularibus, duris, apice numerosioribus; carinâ spinis subirregularibus. Pedunculus teres, basi subcompressus, rubens, simplex; bracteis latis, marcescentibus, acutis. Racemus elongatus. Pedicelli in duplici spirali, erecti, bractea occulti. Flores primum erecti, sub anthesi penduli, dein iterum erecti. Cor. flammeo-rubra, apice virescens; petala oblonga, obtusiuscula, apice subpatula, 3 interna intensius colorata. Filamenta filiformia, subcomplanata, petalis aequalia, lutea, declinata. Antherae fusco-rubrae, ovaes; polline lateritio. Germen cylindraceum, viride. Stylus luteus, longitudine situque staminum. Differt ab *A. Serra*: foliis patulis, magis planis apice magis spinosis, caule brevissimo; ab *A. rhodacantha* spinis albis; foliis patulis, apice trigonis. *Dec.* In *Prom. b. spei.* t.

Obs. *Cls. Haworth* ad α duxit: *A. foliis brevioribus, amplexicaulis, utraque spinosis; floribus spicatis, Mill. dict. ed. 8. (excl. synonym. Commelyni, quod ad depressam rectius pertinere affirmavit olim, nunc vero concedit. Hocce vero synonymon Commelyni 22. rar. t. 45. laudat Decandolle (adducens simul perfoliatam γ Lam. Dict. n. 11.) quam S. Princeps ad brevifoliam duxit, non ad β). „Nomen proliferae retinendum, quod minime in β quadrat, jam alii speciei dicatum, et huic speciei, maxime proliferae, aptissimum.“ C. de Spin in litt. ad Balb. „Brevifolia, prolifera, depressa, nec non Serra sectionem novam efficiunt: PROLIFERAM radicibus valde soboliferis, floribus anguste thyrsospicatis, ante aperturam acutioribus, quam in aliis, apicibus minus rectis.“ *Haw. Rev. p. 203.**

125. *A. Serra Dec.*; caulescens; foliis cespitosis, patulis, margine spinosis: spinis inferioribus approximatis, coalitis, superioribus remotis, medio subspinosis; scapo dense bracteato. *Decand. pl. grass. t. 80. S. Dyck Cat. rais. p. 23. n. 56. Haw. Suppl. p. 44., quo teste: Jacq. Fragm. (sphalm. Eclog.) p. 47. t. 61.*

Rad. sobole elongatâ repente, ut in *A. saponaria Haw.* Apud *Decandolle*: Rad. numerosae, carnosae-frutescentes, cylindricae, parum fibrosae, intus luteae. Caulis lignosus, palmaris vel cubitalis cylindricus, simplex. Folia numerosa, lanceolata, crassa, subtus convexa, apice quandoque triquetra, angulis spinosa; margine corneo, albo, spinoso; spinis inferioribus approximato-coalitis, superioribus distantibus. Scapus teres; squamis membranaceis, latis, remotis, interdum geminatis. Flores longe racemosi, ordine spirali, pedicellati, primum erecti, sub anthesi cernui, serius surrecti. Cor. cylindracea, rubicunda, apice viridescens; petala oblonga, 3 externa crassiora magisque colorata.

Filamenta corollâ paulo longiora, flavescentia. Antherae rubrofuscae. Germen viride, cylindraceum, sexsulcum. Stylus longitudine corollae, flavus. Stigma obtusum, simplex. Caps. cylindracea. Sem. numerosa, in quoque loculo biserialia. Foliorum maculae sunt spinae abortivae et interdum subtus in spinas mutantur; cum folio nascuntur et folio crescente remotiores evadunt. Planta apud *Jacquin* fere alia videtur; haec: Successive caulescens; caulis in culta unc. Folia plurima, imbricatim in orbem expansa et patentissima, interiora erecta, lanceolata, acuminata, crassa, sapore amaro, glauca, rigida, adulta $\frac{1}{2}$ ped.; margine aculeis validis, ex lata basi acuminatis, cartilagineis, albis, patentissimis, summis saepe versus folii faciem erectis; dorso inermia vel apice aculeis paucis. Scapus axillaris, 3 ped., erectiusculus, superne longe racemosus, fere crassitie digiti minimi, compressulus praesertim inferne; dense vestitus spathis ovatis, acutis, amplexicaulibus, membranaceis, latis. Pedunculi 1-flori, erecti, unc.. Flores nutantes, $1\frac{1}{2}$ unc., crassitie calami, obtuse triangulares. Petala sublinearia, acuta, convexa, erecta, apicibus virentia, 3 exteriora rubella, interiora pallida. Filam. subulata, declinata, corollâ paulo longiora, viridi-pallentia. Antherae oblongae, rubrae. Stylus staminibus paulo longior. Caps. oblonga, obtusa, erecta. Sem. oblonga, angulata, nigra. *Jacq. In Prom. b. spei.* 4.

Obs. *Decandolle* l. c. laudat *Aloë* *perfoliatam* *et* *Linnaei Spec.* p. 457. et *Lam. Enc.* 1. p. 88. sine dubio; cum? vero *A. africanam* *Mill. Dict.* n. 4. (quae *Pachidendron* *Haw.*) *Commel. prael.* p. 68. t. 17. sine flore et t. 44., quae omnino *A. perfoliata* *et*. Mirum ergo div. *Willdenow* in *Enum. H. berol.* p. 383. sub *A. Serra Dec.* laudare *A. perfoliatam et Linnaei* et *Spec. pl.*, ibique simul excludere *Commel.* t. 17., cui *et Linnaei* innitur. *A. Serram Willd.* eandem esse cum *depressa* monuit *S. P.*

124. * *A. depressa* *Haw.*; foliis oblongo-ovatis, acutis, glaucis: subtus tuberculatis; marginibus carinâque apice cartilagineis, albo dentatis. *Haw. Linn. Soc. Tr.* 10. *Syn.* p. 80. (excl. *A. Serra Dec.*). *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 294. *S. Dyck Cat. rais.* p. 23. *Bot. Mag.* 1332. (excl. syn. *Mill. et Decand.*) *A. Serra* caulescens; fol. ovato-oblongis, patentibus, margine carinâque subtus spinoso-serratis: serraturis inferioribus approximatis, utrinque apicem versus muricato-maculatis. *Willd. Mag. l. c.* p. 282. n. 26. (excl. syn. *Dec.* et *A. serrulata* *Haw.*) *A. caulescens*; fol. ovatis, patulis, spinoso-serratis: serraturis inferioribus approximatis, costâ mediâ utrinque subspinosâ; racemo simplici; pedunculis corollâ cylindricâ pendulâ brevioribus. *Willd. Enum.* p. 385. (excl. syn. *Decand.*) *fid. Link Enum.* p. 538. *A. perfoliata v. depressa* *H. Kew.* ed. 1. *A. perfoliata* ζ *Linnaei Spec.* 458. *Willd. Spec.* II. p. 185. *Commel. Prael.* t. 21. *Mill. Dict.* ed. 1. n. 14. (fide *H. Kew.*) ed. 8. n. 8. (absque caractere specifico, qui ad *A. glaucam* pertinet, monente *Haworth*).

„Folia lanceolata, spinis quibusdam abortivis tuberculata, margine carinâque spinosa; spinae apicem versus frequentiores. Media quasi *proliferam* inter et *Serram*; ab illa differt: foliis latioribus, fortioribus, patentissimis vel reflexis; scapo altiore; staturâ duplo fere

fere majore; propaginibus rarioribus: huic vicinior; sed neque spinæ distantes ad apicem, nec basi confluentes. *S. Dyck* l. c. p. 54. Caudex brevis, crassus, vel totus foliatus vel deorsum denudatus. Folia divaricatim patentia, ovato-acuminata, brevia, flavo-virentia, rore glauco obnubilata, rigido-crassa, succulenta, dentibus acutis, albido-cartilagineis remotius margine, et subtus finem versus armata, aliorumque rudimentis vagis, macularum facie in utraque pagina parcissime conspersa, 5 poll., basi 2 poll. lata. Caulis simplex. Racemus spicatum elongatus, parcus, erectus. Flores recti, penduli. Pedicelli corallini, bracteas vix superantes, corollâ duplo vel ultra breviores. Bracteae ovato-lanceolatae, acuminatae, poll., basi $\frac{1}{2}$ poll. latae, coccineae, basi flavescentes, margine albae. Cor. cylindrica, pendula, 3-poll., saturate coccinea, striis flavis mixta, apicem versus flavescens, striis saturate viridibus. Filamenta flava, antheris coccineis. *Gawl.* In *Prom. b. spei.* h.

Obs. *Cls. Haworth* (cum *Bot. Mag.* ad 1452. fol. vers.) *A. Serram Dec.* sine dubio huc ducens, observationes monet ad *A. glaucam* spectare; attamen *A. Serram* propriam esse speciem statuit *S. Dyck Cat. rais.* p. 23. n. 56. — *Millerum* ad 8. et 16. speciem eadem synonyma adduxisse, et characteres in descriptione permutasse: *Bot. Mag.* l. c., ubi *A. Brevioribus* etc. *Mill. Dict.* 8. n. 8. adducebatur.

125. *A. lineata* *Haw.*; foliis viridibus, lineatis; spinis rubris. *Haw. Linn. Soc. trans.* 8. p. 18. *Syn.* p. 79. *A. fol. erecto-expansis, oblongo-ensiformibus, viridibus; spinis rubris.* *Haw. revis.* p. 40. *Hort. Kew. ed. 2. II.* p. 295. *S. Dyck Cat. rais.* p. 24. n. 57. *A. perfoliata* η *lineata* *H. Kew. ed. 1.* α . *viridis*; foliis saturate viridibus, lineatis, spinis marginalibus validis, subrecurvis, rubris. *Haw. revis.* p. 40. β . *glaucescens*; fol. glaucescentibus, lineis conspicuis, parallelis, viridibus pallidisve; spinis validis marginalibus numerosis, respicientibus, igneis, basi viridibus. *Haw. rev. l. c.*

Folia latissima, vix spinosa. *Link.* In *Prom. b. spei.* h.

Obs. De hujus diagnoseos brevitatem obscura recte conquestus est *Sss. Pr Salm-Dyck* l. c. p. 55. Spinæ illi videntur longiores fuisse, quam in *glaucâ*, et folia lacte viridia.

126. *A. dorsalis* *Haw.*; foliis ensiformi-triquetris, maculatis, margine carinâque alte spinosis. *Haw. Revis.* p. 45. *Trans. Linn. Soc. VII.* p. 28. quo teste: *A. vera costâ spinosâ. Munting aloid.* 20. cum ic. 23.

„Non tantum distincta species, *barbadensi* aut *lineatae* affinis; sed forte cum *barbadensi* et affinibus genus distinctum floribus flavis: GENUINAE ALOAE. An *lineatae* var.?" *Haw.?* In *Prom. b. spei.* h.

Obs. *Munting* sequentibus describit plantam suam: „*A. verae vulgaris* valde similis, sed folia crassiora, neque in mucronem adeo acutum, sed paulo latiorrem desinentia, supra plana, subtus obtuso-triquetra, margine carinâque spinulis ejusdem coloris, magnitudine atque crassitudine eadem superantibus, nec non variis latioribus simul et angustioribus albidis maculis undique conspicuas quibusdam etiamnum lineis interne ex albido lutescentibus ac raro dispositis repleta, ruptu facilia. Thyrsus rotundus, 3 ped., basi digiti crassitie, rectus, solidus, obscure luteus, quasi hepaticus, superne divisus in ramos 3 aequales, $\frac{1}{2}$ ped., nec non *vulgaris* in modum deorsum tendentes, paulo rotundiores. At vero colore omnino dissimiles; hi enim albescentem non ingraturum, illi verò ex obscuro lutescentem: alii vero variegatum colorem, luteum scilicet strii diversis gratiose albicantibus distinctum omnium oculis venuste subjicientes. Quapropter miror *Diosc. Ruell. Lonic. Trag. Dodon.* et *A. verae* florem

adscripsisse album; *Matth.* non tantum album, verum et purpurascens; *Geen.* vero, *Tabern.*, *Camer.* etc. omnino luteum. Credibile hasce species illis in locis album, in his vero luteum, in aliis ad purpureum vergentem florem, climatis coelique mutatione varium, producere, ut in hac nostra planta, aliisque observavimus, quae in natali Aethiopiae solo florem omnino album, qui in Frisia in luteum convertitur. Nec dubito quin elegans haec *Aloës verae* species flores aliquando in medium adductura sit plane luteos, si nobis diutius superstitem deflorescentemque videre contigit. Praeter hoc alium portentosum in hac naturae lusum deprehendimus; ejus folia maculis multo copiosioribus, nec non latioribus, atque spinulis in dorso margineque majoribus exornata conspiciantur.

127. **A. glauca* Mill.; foliis oblongo-ensiformibus, valde glaucis; spinis marginalibus rubris. *Haw. Trans. Linn. Soc.* VIII. p. 18. *Syn. p.* 79. *A. foliis valde glaucis, spinis rubris. Ait. Kew. ed. 2. II. p.* 295. (ex icon. *B. M.* et *Dec.* potissimum ad β et γ). *S. Dyck Cat. rais. p.* 24. *Mill. Dict. ed. 8. (excl. obs.) A. perfoliata* ζ *Willd. Spec. II. p.* 186. α . *major*; foliis dealbatis; spinis junioribus, pallidioribus, adscendentibus. *Haw. Syn. l. c.* *A. glauca* α *elatior* *Salm D. l. c.* *A. glauca*; caulescens; fol. ovato-linearibus, patentibus, glaucis, glabris, immaculatis, planis, supra striatis, margine spinosis: spinis rubris, rectis, juniorum foliorum viridibus, reflexis. *Willd. Mag. l. c. p.* 280. n. 18. β . *minor*; fol. minoribus, magis patulis, caerulescenti-glaucis, mollioribus: subtus apicem versus subtuberculatis, spinis junioribus virescentibus, respicientibus. *Haw. Syn. l. c.* quo teste: *A. rhodacantha* *Bot. Mag. t.* 1278. („sed vix *Decandolle*, quae tertia varietas“); *A. rhodacantha* *Haw. Trans. Linn. Soc. 7. p.* 27. (fide *Haw. Rev. p.* 45. (*Fortges. Gart. Mag. IV. t. 1.*) et, teste hic laudato *B. M.*: *A. perfoliata* ζ *glauca* *Hort. Kew. ed. 1. p.* 466.; *A. perfoliata* \times *Linn. Spec. p.* 458.; (ergo *A. perfoliata* ν *Willd. Spec. II. p.* 186.); *Thunb. diss. V. n.* 3.; *Weinm. V. t.* 71. *Commel. prael. t.* 24. *Hort 2. t.* 12. γ . *humilior*; *A. glauca* β . *humilior* *Salm D. l. c.*, quatenus laudat: *A. rhodacantham*; fol. patulis, amplexicaulibus, margine spinis rubris, inferne rarioribus; pedunculo a basi bracteato. *Dec. grass. t.* 44. (*Bot. Mag. vero non nisi cum?* adducit). *A. rhodacantha*, caulescens; fol. oblongo-lanceolatis, patulis, glaucis, glabris, immaculatis, planis, supra obsolete striatis, margine spinosis; spinis rubris, rectis, juniorum foliorum viridibus, adscendentibus. *Willd. Mag. p.* 280. n. 19. δ . *spinosior*; foliis magis patulis, forte minus glaucis, inferne tuberculis paucis apicem versus; spinis marginalibus longioribus, latioribus, igneo-rubris; caule pedali lignoso. *A. glauca* γ . *spinosior.* *Haw. Rev. p.* 40. *A. muricata* *Schult. Obs. p.* 70.

In α folia lineata, oblongo-lanceolata, margine spinis parvis et apice subtus spinis 3-4 instructa, caulis $\frac{1}{2}$ ped.: in γ folia breviora, latiora, margine spinis majoribus magisque distantibus, apice subtus tuberculato-spinosis, caulis fere nullus. In β in

Bot. Mag.., caudex brevis, junior totus foliosus, vetustior infra denudatus; flores recti, cylindrici, e majoribus; folia amplexicaulia, conferte ambientia, lanceolato-acuminata, brevia, patula, mollia, glauca, spinis densioribus, rectis, fulvis, margine et nunc parce acuminibus vagis ad summum dorsum munitis; caule simplici, toto fere ab imo bracteis sphacelato-membranaceis latius lanceolatis stipato; racemo spicatum producto, rariusculo; pedicellis erecto-divergentibus, flori subaequalibus; corolla pendulo-cernua (miniata, apice flavescenti-viridis, $\frac{1}{2}$ poll.); laciniis ad basin usque liberis, apice breviter revolutis; filamentis has aequantibus; stigmatibus acutiusculo. In γ , *rhodacantha* Dec., caulis lignosus, cylindricus, simplex, brevis. Folia amplexicaulia, patula, conferta, lanceolata, crassa, mollia, viridi-glauca, immaculata, margine spinosa; spinis rubris perpendicularibus, basi rarioribus; ad cacumen spinis nonnullis in superficie. Pedunculus floralis axillaris, erectus, subcompressus, simplex, fere ad basin bracteatus; bracteis latis membranaceis rubentibus, inferis sterilibus. Flores spicati, duplici lineâ spirali circa axin, 5 in quaque spirali, primo erecti, dein reclinati, tandem erecti. Cor. rubicunda, apice virescens, cylindrica; petala 3 externa crassiora, rubicunda, erecta; 3 interiora latiora, minus colorata, apice paulo revoluta. Filamenta alba, planiuscula, petalis subaequalia. Antherae ovatae, polline lateritio. Stylus flavicans, filiformis, petalis aequalis. Stigma acutiusculum. Caps. cylindrica, sexsulca. S. P. a *Salm* notat *A. rhodacantham* Dec. sibi omnino videri *glaucae* β *Haw.*, cum spinae in icone Decandolliana nimis rubrae; se possidere specimen Decandollianum a *glaucae* β *Haw.* non distinguendum; directionem spinarum in characteribus Aloës non valere. Cum S. P. *A. rhodacantham* B. M. cum? et *Haworth rhodacantham* Red. cum? adduxisset, utramque interea instar varietatis distinximus. *A. perfoliata* β *Lam. Enc. I. p. 188.* huc ducta a *Decandolle* forte ad *depressam* spectare videtur cum *Lamarck* laudet *Commel. t. 21.* Differt a *mitriformi* potissimum (praeter char. datos) caudice non arborescente; scapo bracteis tecto; corollis apice viridibus. In *Promont. b. spei. h.*

128. *A. paniculata* Jacq.; acaulis; foliis patentibus, oblongo-lanceolatis, planis, nervoso-striatis, cartilagineo-marginatis, subdenticulatis; paniculâ divaricatâ; corollis cylindrico-clavatis, cernuis. *Willd. Enum. p. 386.* *A. subcaulescens*; fol. ovato-oblongis, planis, glaucis, glabris, immaculatis, striatis, cartilagineo-marginatis, obsolete denticulatis. *Willd. Mag. l. c. p. 281. n. 20.* *Salm Dyck Cat. rais. p. 24.* *Jacq. Fragm. p. 48. t. 68.* *A. striata*; foliis glaucis, longitudinaliter substriatis, obsolete maculatis, marginibus albo-cartilagineis, integriusculis. *Haw. Syn. p. 81, Trans. Linn. Soc. 7. p. 18. Suppl. p. 44.* *H. Kew. ed. 2. II. p. 295.*

Octennis necdum caulescens; tota glaberrima. Folia lanceolata, acuta, radicalia integerrima, quaedam inferne ad marginem incomplete cartilagineo-dentata, glauca, ped., 3 unc. lata, $\frac{1}{2}$ unc. crassa, rigida, amara. Scapus 2-ped., crassitie digiti, hinc convexus, inde planus, glaucus, paniculato-ramosus. Spathae ad ramos ramulosque latae, amplexicaules, geminae, oppositae, ad

pedicellos lanceolatae, acutae. Pedicelli 1-flori, teretes, $\frac{1}{2}$ unc., erecti, flavo-rubelli. Flores unc., cylindrici, erecti, rubelli cum apice virescente, pendulini. Cor. apice sexfida; laciniis oblongis, obtusis, erectis. Filamenta subulata, erecta, petalorum longitudine, receptaculo inserta, pallide flavescentia. Antherae oblongae, erectae, aurantiacae. Germen oblongum, sexsulcatum, obtusum, nitidum. Stylus filiformis, petalo longior. Stigma obtusum. Caps. oblonga, obtusa, glabra, digitum minimum fere crassa, unciâ paulo brevior, obtuse hexagona. Sem. oblonga, acuta, angulata, nigra. *Jacq.*. Caulis pedalis et ultra: foliis oblongo-lanceolatis, immaculatis: junioribus patulis, senioribus dependentibus, apice incrassatis, incurvatis. *S. Dyck* l. c.. Huc fortasse etiam *A. albocincta*, quam confer. Folia omnium crassissima, senecta subtus plerumque sulcis 2, 3 vel 5 transversis a foliorum pondere enatis. *Willd.* *In Prom. b. spei.* h.

Obs. An huc *A. africana* caulescens perfoliata glauca et non spinosa *Commel prael.* 74. t. 23., quae *A. perfoliata* t *Linn. Spec.* 458., *Willd. Spec.* II. p. 86?

129. *A. purpurascens* *Haw.*; caule senecto suffruticoso, percrasso, dichotomo; foliis ensiformibus, glaucis: apicibus recurvis, serraturis marginalibus albis. *Haw. Linn. Soc. tr.* 8. p. 20. *Syn.* p. 75. *Hort. Kew.* 2. II. p. 292. *A. perfoliata* ε *purpurascens* *Hort. Kew. ed.* 1. p. 466. *A. sinuata* *Willd. Spec.* II. p. 187. (excl. syn. fide *Salm-D.*; *Willdenow* vero ipse ad *soccotorinam*, uti *Decand. et Bot. Mag.*) *A. vera* *Lam. Enc. meth.* I. p. 86. n. 4. *A. rubescens*; fol. amplexic., patulis, margine spinosis; pedunculo compresso, ramoso; ramis subbracteatis. *Decand. pl. grass.* t. 15. *S. Dyck Cat. rais.* p. 25. n. 60. *A. ramosa* *Haw. Linn. Trans.* 7. p. 44. (ut nunc videtur auctori ipsi in *Rev.* p. 44.) *A. soccotorina* β . *major* *Bot. Mag.* 1474. *A. officinalis* *Forsk. p.* 73. n. 30. β . *A. vacillans* *Forsk. aegypt.* 74. n. 34. (fide *Lam.*)

„Folia griseo-purpurascencia obsolete albo-maculata.“ *S. Dyck.*
Caulis 6-ped., crassitie brachii. Folia interdum extus albo maculata, raro ultra pedalia, basi 2 poll. lata, in planta tenera flavida, interiora convergentia, sub dio violaceo-purpurascencia, dum in *soccotorina* obscure viridia, rore griseo obducta. Scapus raro ultra 2 ped.. Cor. $1\frac{1}{4}$ poll., lateritia, apice viridis. *Gawl.* Valde affinis *A. vulgari* (*barbadensi*). Folia angusta, 1-2 ped., tota rubescencia, superne canaliculata, emaculata. Caulis plerumque ramosus. Spicae graciles, flores penduli. *Lam.* Radices numerosissimae, cylindricae, lignosae, crassiusculae. Caulis lignosus, crassus, brevis, foliosus. Folia conferta magna, lanceolata, patula, superne plano-concava, griseo-purpurascencia, margine rubentia, dentibus perpendicularibus, inferne numerosioribus. Pedunculus floralis lateralis, adscendens, rubescens, compressus, ramosus: ramis cylindricis, basi nudis vel subbracteatis. Flores laxè spicati, remoti, obliqui; pedicelli breves, incarnati, subbracteati. Cor. profunde rubra, cylindrica; petala basi longe coalita, recta, conniventia, oblonga, obtusa, crassiuscula, aequalia. Filamenta albicantia, planiuscula, alterna lon-

giora; antheraë crassae, ovales, rubro-lateritiae. Stylus cylindricus, albicans, filamentis aequalis; stigma obtusiusculum. Germen 6-sulcum, obscure virens. Caps. obtusissime trigona, 6-sulca. *Decand.* In β folia planiuscula, obscure viridia, margine rubra, dentato-spinosa. Flores subsessiles, cernui, filamento breviores, flavo-rubentes. Caulis saepe crassitie brachii, ulnam altus, sed valde debilis ut brevissimâ vi decumbat, hinc et saepe radices gerit laterales. Succus recens flavus, siccus sanguineus. *Forsk.* In *Prom. b. spei.* \dagger .

Obs. „Dubia quae, cum de foliorum colore sileat cl. *Haworth*, nascuntur, solvit laudatus ab illo *Hort. Kew.* Vidi in *H. paris.*, ubi non amplius, sed *Viennae*. In *Britannia* non satis nota, cum inde fere semper *A. vulgaris elongata* hujus purpurascens loco mittatur.“ *S. Dyck* l. c. p. 56. Cls. *Lamarck* *A. officinalem Forsk.* ad *barbadensem* ducit; sed hujus nobis potius esse loci videtur ex descriptione apud *Forsk.* Scapus teres, 2 cubit., glaber, cinereus, interdum bifidus; corymbus terminalis, ped.; bractea membranacea, lanceolata, deflexa sub flore singulo; flores rubri, pedicello parvo, cernui, racemosi, tereti-triquetri: oris laciniis apice reflexis: 3 interioribus infra apicem conniventibus et paullo longioribus reliquis; folia extrorsum attenuata, supra cava, infra convexa: margine aculeis oppositis, erectis, compressis, brevibus, conferta, basi plana, vaginantia, colore viridi, nebulis albidis, subtus rufescente; pulpâ viridi, viscido-carnosâ, foetidâ. In *A. vera Linn.* fol. plana.

130. **A. barbadensis Mill.*; caule suffruticoso; propaginibus radicalibus; foliis ensiformibus, sinuato-serratis; corollis luteis. *Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 19. *Syn.* p. 79. (excl. syn. *A. verae Munt.*, monente *Haw.* in *revis.* p. 45.; ergo etiam apud auctores sequentes). *Mill. Dict. ed.* 8. n. 2. *A. perfoliata* γ . *barbadensis Hort. Kew. ed.* 1. p. 466. *A. vulgaris*; foliis patulis, adscendentibus, margine spinosis; pedunculo ramoso; ramis bractea duplici amplexis: *A*; *barbadensis*; fol. mollibus, maculatis aut immaculatis, margine spinisque obsolete rubris. *Dec. pl. grass.* p. 27. (descr. monente *S. P. Salm*). *A. vulgaris Lam. Enc.* I. p. 86. (excl. syn. *Forsk.*) *Desf. Fl. atl.* 1. p. 310. *H. Kew. ed.* 2. II. p. 292. *A. caulescens*; fol. lanceolatis, erecto-patentibus, apice subrecurvis, glaucis, glabris, immaculatis, margine sinuato-serratis: serraturis spinosis. *Willd. Mag.* l. c. p. 280. n. 17. *S. Dyck Cat. rais.* p. 25. *A. perfoliata* λ *vera*. *Willd. Spec.* II. p. 186. *A. perfoliata*, π , *vera*; fol. spinosis, confertis, dentatis, vaginantibus, planis, maculatis. *Linn. Spec.* p. 458., quo teste: *H. Cliff.* 150; *H. ups.* 86; *Mat. med.* 160; *Royen lugd.* 22; *Brown jam.* 197; *A. vulgaris Bauh.* 386; *Kadanaku Rheed. Malab.* 11. p. 7. t. 3. *A. perfoliata vulgaris Aubl. gujan.* 1. p. 304. (fide *Decand.* quo teste etiam: *H. eystet. aest. ord.* 4. Fol. 2. f. 1.; *Moris. hist.* 1. p. 414. S. IV. t. 22. f. 1.; *Lob. ic.* 374. Caraguata *Marcg. Bras.* 37. ic. β . *A. elongata*; floribus spicatis, tubuloso-triquetris, subringentibus, oblique dependentibus; foliis aggregatis, dentato-spinosis. *Murr. Comm. Gott.* IX. p. 191. t. 2. *Ejusd. Opusc.* II. p. 481. (fide *Dec.*, qui tamen etiam ad *humilem*). *A. humilis* β . *Willd. Spec.* II. p. 187. *A. vulgaris Willd.*

Enum. et Mag. A. n. 9. *Trew* in *Comm. Norimb.* 1744. p. 324. t. 5. f. 18 — 21. *A. vulgaris Blackw.* ed. *Trew* t. 229. (uterque fide *Murray* cum *Regn. Bot.* vol. 3.) γ . *chinensis*; *A. barbadensis* β ; caule suffruticoso; radice subrepente; fol. anguste ensiformibus, sinuato-serratis: maculis numerosis, oblongis, albicantibus, infimis distantibus. *Haw. Suppl.* p. 45.

Inflorescentia et flores omnino *A. perfoliatae* ejusque genuina varietas, quamvis corolla fere minus divisa mihi apparuit. *Linn.* Propaginum folia saepe valde maculata, at senecta caulis principis immaculata vel maculis. Apud *Rheede*, a *Linné* laudato, in spontanea: Rad. fibris albo-flavescentibus, carnis, saporis aquei, linguam nonnihil vellicantis. Caulis unicus, brevis, teres, surrectus, intus carnosus aqueus. Folia bina decussato ordine, caulem amplectentia, cubitalia et longiora, sensim in cuspidem attenuata, valde crassa, supra plana, subtus convexa, glabra, oris spinis viridibus, rigidiusculis; pulpâ aqueâ, clarâ, viscidâ, saporis aquei subdulcis. Scapi radicales teretes. Flores fistulosi, humidi, plures congregati, oblongi; lacinae 6 cuspidatae, exteriores quidquam inflexae, collo flavae, croceae, striis aurantiis. Stam. viridi-albicantia. Antherae oblongae, surrectae, rufae. Stylus albicans. In cultâ apud *Redouté*: radix lignosa, fibris numerosis, crassis, cylindraccis, descendentes. Caulis lignosus, simplex, cylindricus, brevis. Folia numerosa, amplexicaulia, inferne patula, superne adscendentia, magna, lanceolata, glauco-viridantia, supra planiuscula, subtus convexa, consistentiâ in A molli, in B (quae *abyssinica*) duriusculâ margine corneo, pallido in A., rubicundo in B., spinoso; spinis duris, rubicundis, distantibus, margine perpendicularibus: in utraque varietate folium aliquando maculatum. Scapus axillaris, glauco-rubescens, subcompressus, adscendens, ramosus; ramis 3-5 subcylindraccis, basi hibracteatibus; bractea inferâ lanceolata semiamplexicauli, superâ breviora latâ, apice emarginatâ, semiamplexicauli. Florum spica cylindrico-ovata; pedicelli irregulariter circa axin trispirales, cylindrici, basi bractea brevi. Flores primo erecti, dein patuli, tandem penduli. Cor. cylindrica, fundo nectarifera, lutea; petala basi coalita, apice subaperta; 3 exteriora oblonga, subconcava, obtusa; interiora paulo longiora et latiora, apice paululum aurantiaca. Filamenta linearia, planiuscula, lutea, recta, fecundationis horâ corollâ parum longiora, dein breviora, subaequalia. Antherae ovales, erectae, aurantiacae; polline luteo. Germen cylindraccum, sexsulcum, viridans. Stylus simplex, cylindricus, pallescens, petalis aequalis. Stigma simplex, luteum. Caps. cylindraccæ subtrigona, sexsulca, primo carnosæ, loculis dissepimento imperfecto divisis. Semina biserialia, 7-8 in quaque serie, oblonga, parallelogrammica vel Trapae instar angulata. β , quam *Willd.* prius *humilis* β in *Spec.*, dein synonymon *vulgaris* in *Enum. et Mag.* dixit: „foliis angustioribus, caule magis elevato magisque gracili“ *So. Pr.* *Salm* planta adhucdum dubia. Describitur ab ipso *Murray* sequentibus: „Radix fibrosa, subacida. Truncus fere spitham., 1½ poll. crassus, teres, obliquus, foliorum reliquiis annulatus. Folia aggregata, amplexicaulia, non vaginaria, 2 ped., oblonga, e basi lata sensim attenuata, carnosæ pulpâ molliori, basi crassissima et plana; dein concava, tum cana-

liculata, apice oblique flexo compresso denticulato-spinoso, margine sinuato-dentata, dentibus in spinam compressam apice fuscam terminata, glauca, immaculata; superiora patentissima et recta, media horizontalia, inferiora dependentia. Surculi foliiferi e radice plures maculis albidis, paucis, oblongis. Pedunculus e centro foliorum oblique emergens, strictus, subangulatus, purpureo-virescens, $1\frac{1}{2}$ ped., basi subcompressus, ibidemque altero margine cristâ subcartilagineâ, infra nudus, supra bracteatus, simplex vel divaricatus in ramos 2 spiciferos, sulcatus. Bractee latae, acuminatae, amplexicaules, albido-flavae, lineatae, persistentes, marcidæ. Spica ped., cylindrico-pyramidalis, congerie bractearum terminata; floribus numerosissimis approximatis pendentibus, ante expansionem horizontalibus. Pedicellus 1-florus, teres, lin., basi latior, patens. Cor. pollice longior, extus pallide lutea lineis viridibus, intus albida, tubuloso-triquetra, ex basi brevissima angusta ventricoso-teres, ad $\frac{2}{3}$ divisa in lacinias lanceolatas, erectas, alternis latioribus et paulo longioribus apice nonnihil reflexo, ita dispositas ut 3 sursum, 2 ad latera, 1 deorsum collocentur; singulae lineis 3 viridibus medio pictae. Cor. dissecta intus polypetala apparet; scatet nectare. Genitalia longe exserta, basi inflexa. Stam. alterna longiora; filamenta basi corollae inserta, subulata, deorsum albido-lutea, compressa; antherae oblongae, aurantiae, incumbentes. Pistill. staminibus subaequale. Germen obovatum, obsolete triquetrum, 6, sulcum. Stylus cylindricus, apicem versus magis flavus. Stigma apex obtusus.“ In γ radix quasi repens. Soboles numerosae e terra erumpentes celeriterque caulescentes, foliis infimis magis distantibus magisque maculatis et angustioribus, quam in *A. barbadensi* americana. Forte propria species. *Haw.* In Indiis (orientali *Rheede*; in America culta?): „at π in Italiae, Siciliae, Melitae tectis, muris.“ h.

Obs. Botanicos veteres hanc commutasse nomine *A. verae* cum *A. purpurascente*; *P. Salm-D.* Flores in thyrso, bractee pedicello longiores; spinas albicantes, remotas notat *cls. Balbis in litt.* *A. perfoliatam* γ *barbadensem* *H. Kew.* div. *Willdenow* olim cum *Dillen.* f. 19. t. 20. ad *A. sinuatam* mandavit; serius se ipsum emendavit in *Enum.*, sub *soccotorina*. *A. maculata vera* *Forsk.* aeg. 73 n. 29, quam *cls. Lamarck* ad *abyssinicum* duxit, et in qua „flores flavi, folia vix pedalia, non variegata, scapus $1\frac{1}{2}$ ped.“ hujus potius loci nobis videtur. Utrum *A. perfoliata* floribus corymbosis, cernuis, subcylindricis, *Linn. Spec.* 1. apud *Loureiro Fl. coch.* p. 252. hujus loci, cum *Katanaku Rheede* conjungat cum *A. soccotorina* *Garc. Arom.* 1. c. 2? quae subcaulis, cui folia $1\frac{1}{2}$ ped., subulata, carnosa, extus convexa, intus subplana, glauca, glabra, amplexicaulia, imbricata, margine utraque spinoso-dentata. Scapus teres, subnudus, foliis longior. Flos luteo-ruber; corymbo subcylindrico, terminali, cernuo. Cor. campanulata, oblonga; limbo brevi, patente. Stamina erecta, receptaculo insidentia, corollae subaequalia. Caps. supera, 3-locularis, polysperma. In arenariis regni *Champavae*.

131. *A. abyssinica* *Lam.*; subcaulescens; foliis longe lanceolatis, erecto patulis, duriusculis, laete viridibus, superne concaviusculis, margine sinuato-dentatis, rubris; floribus viridi luteis. *S. Dyck Cat. rais.* p. 25. *Lam. Enc. meth.* I. p. 86. n. 5. *A. vulgaris* B *abyssinica*; fol. duriusculis, maculatis aut immaculatis; spinis rubris. *Decand. pl. grass.* t. 27. (icon, nec descriptio ut videtur *S. P.* a *Salm.*) *Poir. Enc. meth. Suppl.* 1. p. 295.

Maxime affinis *barbadensi*. *S. Dyck* p. 57.; sed certe distincta. A; *vulgaris* *Lam.* (*barbadensi*) et *A. vera* (*purpurascente*) major. Fo-

lia $2\frac{1}{2}$ ped., basi 4 poll. lata, crassa, tenera, dilute viridia, subtus convexa vel semiteretia, supra canaliculata. Pedunculus communis 5 ped. et ultra, teres, simplex, superne bracteis parvis, squamosis. Spica elongata, laxiuscula. Flores flavo-virentes. Cor. profunde 6-fida; lacinae approximatae, tubum formantes. Stamina corollâ paulo longiora. *Lam.*, qui huc ducit *A. maculatam veram Forsk.* In *Abyssinia*. \dagger .

Obs. Hujus nobis loci videtur *A. perfoliata* à vera *Smelovski* in *Mem. de l'Acad. d. Petersb.* 1811. p. 403. t. 9. „Rad. fibris filiformibus, crassitie pennae anserinae, albo-flavescentibus, vix amariusculis. Caulis solitarius prope radicem et medio sui cauliculos protrudens, superne foliosus, 2-3-ped. et ultra, flexuose erectus, teres, squamis a foliorum adultiorum lapsu obvallatus. Folia conferta, erecta, ensiformia, trifariam saepe alternantia, amplexicaulia, vaginantia, immaculata, glauca, crassa, carnosa, inferiora facie planiuscula, dorso convexa, superiora canaliculata, pedalia, marginibus spinis e luteo virescentibus regulariter distantibus hamiformibus. Parenchyma foliorum prasinum. Pedunculus terminalis ascendens, teres, spathaceus. Spathae monophyllae squamiformes, lanceolato-acuminatae, albo-fuscae, persistentes, inferiores sparsae, superiores confertae. Flores racemosi approximati, reflexi, fundo flavi, striis longitudinalibus virentibus. Cor. subcylindrica 6-fida, tubo gibbo, limbo patulo parvo, fundo nectarifero. Filamenta subulata, corollâ longiora, receptaculo inserta. Antherae oblongae incumbentes. Germen ovatum. Stylus simplex, longitudine staminum. Stigma obtusum, subtrifidum.

β . *foliis maculatis.*

132. * *A. variegata*; subcaulis; foliis trifariis, pictis; fasciis albis, canaliculatis; angulis cartilagineis, obsolete serrulatis. *Haw. Syn.* p. 81. *Trans. Linn. Soc.* VII. p. 14. *Linn. Spec.* p. 459. *Mant.* p. 367. *Mill. Dict. ed. 8.* n. 9. *Thunb. Diss. n. 12. prodr.* p. 61. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 312. *Willd. Spec.* 2. II. p. 190. (excl. syn. *Till.*) *Hort. Kew. ed. 2.* II. p. 296. *A. subcaulescens*; fol. imbricato-patulis, subtrifariis, oblongis, trigonis, maculatis: angulis cartilagineis, crenatis; racemo simplici; corollis cylindricis, pendulis. *Willd. Enum.* p. 384. *Magaz. l. c.* p. 279. n. 13. *S. Dyck Cat.* p. 26. *Decand. pl. grass. t. 21.* (excl. syn. *Till.*) *Bot. Mag. t. 513.* *Blair's Bot. Ess.* c. tab. *A. punctata Haw. Trans. Linn. Soc.* 7. p. 26. (se teste in *revis.* p. 44.) *Commel. prael. t. 28. rar. t. 27.* *Petiv. Gaz.* 88. f. 1. (fid. *Haw.*) α . stylo staminibusque corollâ brevioribus; fasciis viridibus foliorum angustioribus. *Haw. Trans.* l. c. β . stylo staminibusque corollâ longioribus; fasciis viridibus latioribus. *Haw. variegata* β . *viridior S. Dyck* l. c.

„Corolla incarnata, ore 6-fido; laciniis 3 interioribus alternis, patulis. Stamina declinata. Stigma simplex.“ *Linn. Mant. Thunberg* describit spontaneam nimis breviter: „foliis radicalibus, imbricatis, oblique trifariis, oblongis, supra valde canaliculatis, subtus earinatis, marginibus albo-cartilagineis et papilloso-denticulatis, undique fasciis albis variegatis, erecto-patentibus, palmaribus.“ In culta apud *Decandolle*: „caulis basi ramosus v. simplex. Scapus erectus, simplex, cylindricus ($1\frac{1}{2}$ ped.), interne viridis, rore glaucescente squamisque nonnullis parvis. Flores remoti, primum erecti, serius penduli, pedicello brevi rubescente bractea fere breviori. Cor. cylindrica, extus rubicunda, intus alba (15-16 lin., rubra viridi alboque

striata, *Curt.*): lacinae striâ longitudinali, viridi, apice patulae et quidquam revolutae. Filamenta alba, planiuscula, arcuata, corollam subaequantia. Antherae oblongae, inferne bifidae, flavae, trisulcae, effetae subrotundae. Germen cylindricum, profunde sexsulcum, viridans. Stylus filiformis, subconicus, alboroseus, staminum longitudine situque. Stigma simplex, obtusum. Caps. cylindracea, 6-sulca.“ *In Prom. b. spei.* 4.

133. *A. serrulata* *Haw.*; foliis maculatis, marginibus carinatis, apice serrulatis. *Haw. Linn. Soc. Tr.* 7. p. 18. *Syn.* p. 82. *Hort. Kew. ed.* 2. II. p. 295. *S. Dyck Cat. rais.* p. 26. *Bot. Mag. t.* 1415. *A. perfoliata* λ *serrulata* *Hort. Kew. ed.* I. p. 466.

„Subcaulescens, plurium pedum; foliis ovato-lanceolatis, apice subtriquetris, maculis albis, subserialibus, pictis; pedunculo crasso; floribus numerosis, eleganter racemosis. Elegantissima tum floret, ac si *tenuifolia* picta esset, ut *variegata*.“ *S. Dyck* l. c.. Non esse, ut in *Bot. Mag.* dicitur, *variegatae* varietatem, *obscurae* magis affinem, cum *variegata* sine affinibus: *Haworth* *Syn.* I. c.. Caudex brevis. Folia multifaria, imbricatim divergentia, numerosa, lanceolato-acuminata, maculis albis, oblongis, margine cartilaginea, serrulato-denticulata, apice carinato-triquetra. Caulis subramosus. Racemus longus, floribus remotiusculis. Cor. subclavato-cylindracea, compressiuscula, subcurvata, cernua; $1\frac{1}{2}$ poll., pallide miniato-carnea, apicem versus striâ virente, ore brevi regulari patula, laciniis ad $\frac{3}{4}$ concretis, inde conniventibus, obtusulis. Germen columellare, rotundato-trigonum, stylo triplo brevius. Stylus filamentis gracilior, puncto stigmatoso obsolete pubescente. Differt ab *A. variegata*: staturâ multo majore; foliis multifariis nec trifariam decussatis, griseo-viridibus, obscurioribus; maculis majusculis distinctis oblongis albis, nec undulato-variegatis; pedicellis corollâ duplo, nec 3-4 plo brevioribus. *Gawl.* *In Prom. b. spei.* 5.

Obs. *Willd.* in *Mag.* I. c. p. 283. *A. serrulata* *Haw.* ad suam *A. Serram* duxit.

134. *A. pallescens* *Haw.*; depressa; foliis lorato-lanceolatis, pallide viridibus, lineis et maculis obsoletis, pallidis perviridibusque: spinis marginalibus numerosis, parvis, albis. l. c. *A. Haw. Revis.* p. 41.

A. Saponariae s. *serrulatae* similis, at forte longe minor, magis depressa, pallidior: maculis obsoletioribus. Flores ignoti. In horto amic. *D. Hitchin.* An varietas *A. serrulatae*? vix. *Haw. l. c.*

135. *A. micracantha* *Haw.*; foliis anguste ensiformibus, inferne albo-maculatis: maculis saepe tuberculiformibus, oblongis, sparsis, numerosis; spinis marginalibus rectis, albis, minutissimis. *Haw. Suppl. pl. succ.* p. 105. *A. fol. lineari-loratis, canaliculatis, margine spinulosis; racemo umbellato, laxo; pedunculis corollâ longioribus. Bot. Mag.* 2272. *A. acaulis; fol. canaliculatis, linearibus, maculatis, spinis marginalibus minutis debilibus. Link et Otto Abbild. auserl. Gew. Hft.* 7. p. 87. t. 40.

Vidi solum parvam plantam spontaneam nuper (in *H. Kew.*) receptam, cujus folia vix $1\frac{1}{2}$ ped. (in adultis forsi $1\frac{1}{2}$ ped.), anguste lorato - ensiformia, nunc solum 4 - 5 lin. lata, recta, alte concavo-canaliculata, glaucescentia, obsolete striatula, extus viridia, non valde carnososa, molliora. *Haw. l. c.*. Folia lineari-lanceolata, vix $1\frac{1}{2}$ ped., basi $\frac{1}{2}$ poll. lata, apice sensim attenuata, profunde canaliculata, pallide viridia, maculis distinctis, parum carnososa, mollia. Scapus fere ped., inferne semicylindricus, superne teres; bracteis distinctis, ovatis, acuminatis, striatis, scariosis, semiamplexicaulibus. Flores primum erecti, dein nutantes. Pedunculi albi, erecti, corollâ longiores. Cor. cylindrica, $1\frac{1}{3}$ poll.; petalis roseis apice quidquam recurvo-viridibus; 3 exterioribus paulo brevioribus. Filamenta inaequalia; antherae ovatae, aurantiacae. Stylus longitudine corollae. Stigma capitatum. *Bot. Mag.*. Caulis brevissimus, ita ut planta acaulis dicatur; solum nullae. Folia radicalia ped., vix poll. lata, acuta, maculis hinc inde pallidis, margine spinis 2 - 3 lin. longis debilibus approximatis pallidis. Scapus ped., squamis albis. Flores in apice scapi subumbellati, exteriores cernui in pedunculis poll. longis. Cor. tubulosa, 1 poll. 2 lin. longa, rubra, dentibus subreflexis apice virescentibus. *Link et Otto. In Prom. b. spei. h.*

136. *A. tenuifolia* Lam.; subcaulescens; foliis lanceolatis, tenuibus, patulis, laete viridibus, glabris: supra lineatis et obsolete maculatis, margine tenuissime denticulatis. *Willd. Mag. etc. p. 279. n. 14. Lam. Enc. meth. 1. p. 87. n. 10. S. Dyck Cat. rais. p. 26. Link Enum. p. 339.*

„Caulis 2 ped. et ultra, debilis, ut per se stare erectus nequeat; folia adulta margine grandidentata, subtus striata vel quasi nervosa, maculis longitudinaliter serialibus.“ *S. Dyck l. c. et p. 57. (Tota rubet, et affinis umbellatae Dyck; sed folia valde tenuia et canaliculata. C. de Spin in litt. ad Balb.). Valde affinis A. maculosae (Saponariae); sed folia tenuia, fere membranacea, canaliculata, longe acuminata, pallide viridia, plerumque rubescentia, utrinque maculis albis obsolete: dentibus marginalibus cartilagineis albis, parvis, vix spinosis. Lam. A. virenti affinis. Willd. In Africa. h.*

137. *A. albo-cincta* Haw.; glauca, laevigata, macra; foliis acuminato-oblongis, margine alte cartilagineo, albissimo, integerrimo, subtus immaculatis, supra longitudinaliter crebre striatis: striolis virentibus maculisque a medio ad apicem sparsis, caerulescentibus sordide, saepe confluentibus. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 43.*

Species formosa et distincta, *tenuifoliae* sine dubio simillima; sed vix eadem. Fere omnium folia minus crassa, glauca, supra striata, maculata, delicatula. *A. striatae* quoque similis; at minor: caudex debilior, longior; folia latius et magis margaritaceo-marginata, laeviora, caerulescenti maculata, maculis laevibus obscuris. Flores? *Haw. Suppl. l. c.* „Fortasse est mera junior *A. striatae nobis, paniculatae Jacq.*“ *Haw. rev. p. 40. Habitat? Aiton communicavit. h.*

138. *A. arabica* Lam.; caule suffruticoso; foliis longe lanceolatis, in acumen productis, rigidis, glabris: junioribus

patulis, senioribus reflexis et cauli adpressis, apice recurvatis, supra planiusculis, subtus convexis, utrinque maculis numerosis, parvis, albis, subfasciatim conspurcatis: spinis marginalibus rigidis, fusco-rubris, subuncinatis: inferioribus recurvis, superioribus incurvis. *S. Dyck Cat. rais. p. 27. Lam. Enc. meth. l. p. 91. n. 29. A. variegata Forsk., Aeg. 74. n. 31.*

Omnibus convenire cum descriptione data a clo *Lam.*, „(i. e. a *Forsk.*)“ specimen, quod in *H. Schönbr.* vidit: *Ss. Pr. S. Dyck.* „Folia lineari-lanceolata, margine retrorsum dentato-spinosa, maculis albis, sparsis, basi vaginantia; interdum conferta, digitum longa; interdum angustiora, pedalia, remota, minus maculata. Caulis basi nudus.“ *Forsk. In Arabia. h.*

139. *A. grandidentata Salm-Dyck*; subcaulescens; foliis longe lanceolatis, attenuatis, recurvo-deflexis, laete viridibus utrinque maculis angustis albis subfasciatis, margine sinuato-dentatis, apice rufescentibus. *Salm-Dyck obs. bot. 1822.*

A congeneribus omnibus differt foliis longioribus, deflexis, apice recurvis et maculis albidioribus numerosioribus; ab *A. latifolia* et *umbellata* colore laete viridi; ab *A. picta* maculis longioribus fasciatim dispositis. *S. Pr. Salm-Dyck. In Prom. b. spei. h.*

140. **A. Saponaria Haw.*; foliis oblongo-lanceolatis, sordide-viridibus, subglaucescentibus: maculis majusculis oblongis, albidis, fasciatim transversis; spinis rufescentibus; floribus thyrsis capitatis. *Haw. Syn. p. 83. A. Saponaria, α minor Haw. Linn. Trans. 7. p. 17. A. Saponaria α minor; fol. angustioribus, lateribus rectoribus, sub dio hepatico-fuscescentibus; caule simplici vel corymboso-ramoso. Bot. Mag. 1346. t. 1460. ic. A. perfoliata γ saponaria. Hort. Kew. ed. 1. p. 467. A. picta β minor Willd. Spec. II. p. 186. (quatenus synonymon H. Kew., excl. Dill. et Linn., monente Gawl.) A. picta β. A. perfoliata γ saponaria prior. edit. H. Kew. ed. 2. II. p. 293. (excl. syn. Dec. et Bot. Mag., ad obscuram, seu H. Kew. l. c. α spectantibus.) A. disticha Mill. Dict. ed. 8. n. 11. (fid. Haw.) A. umbellata Decand. pl. gr. t. 98. (excl. syn. ad pictam relatis monente Gawl. l. c.) *Salm-Dyck Cat. rais. p. 27. A. maculata α Lam. Enc. I. p. 87. A. perfoliata γ Linn. Spec. 458. A. africana caulescens; fol. spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus. Commel. Hort. 2. t. 5. (fide Bot. Mag. l. c.) A. perfoliata λ Linn. Spec. 458. A. maculata spinosa major. Dill. Elth. t. 14. f. 15. (fide Bot. Mag. aliis utraque potius ad latifoliam spectare videtur). A. caulescens, fol. caulem amplectentibus, floribus aurantiacis. Bratl. Dec. 17. t. 14. f. 5. (fide Bot. Mag.) β. picta; foliis longitudinaliter luteo**

striatis. *S. Dyck l. c.* *A. umbellata striata* *H. S. Sebast.*
A. africana Hortor. Lombard. *A. saponaria* β . *luteo-striata*.
Haw. Revis. p. 41.

Folia caudicem ambientia, patentia, minora quam in *latifolia*, marginibus magis rectis; maculis oblongis triplo majoribus quam in *obscura*, albo-virentibus, per fascias transversas irregulares dispositis ita, ut diametri maculae longiores axi folii parallelae sint. Spinae recurvae, approximatae, flavicantes. Scapus sordide glaucescens. Bractee flavescenti-virides, lanceolatae, hinc inde purpurascens, pollicares. Flores capitato-racemosi, nondum expansi subumbellati, pedunculis erectis, 1½ poll., rubris. Cor. pendula, subclavato-cylindrica, supra basin attenuata, subcurvata, basi subglobosa, fere 1½ poll., laete coccinea, laciniis apice sulphureo marginatis. Antherae miniatae, subexsertae. *Gawl.*
In Prom. b. spei. h.

Obs. 1. *Decandolle* sub sua *umbellata* duas adducit varietates in *Bot. Mag.* prorsus neglectas: A *A. umbellatam majorem*, ad quam ducit *A. perfoliatam* β et λ *Linn.* et haec nobis videtur sequens *latifolia*. B. *A. umbellatam minorem*, ad quam ducit *A. perfoliatam* μ *Linn.* et *A. perfoliatam saponariam* *H. Kew.*; quae ergo sola hujus loci nobis saltem videtur. *Cls. Link* in *Enum. p. 339.* ad *A. umbellatam Decand.* et *Salm* citat *A. pictam Willd. Enum. p. 382.*; plantam in *Herb. Willd.* vero non hujus esse loci notat. Folia in planta *horti berol.* striis albis longitudinalibus; ergo β propior.

Obs. 2. Huc nobis forte spectare videtur: *A. trichotoma*; fol. ensiformibus, patentibus, margine spinosis, utrinque pictis; maculis fasciato-interruptis, albicantibus; scapo trichotomo; racemis conicis; floribus subcylindricis, pendulis. *Colla Hort. ripul. p. 8. t. 13.*, quam nomine *A. africanae* coluit, et cui *A. umbellatam* β *pictam Hort. Dyck* instar synonymi adscripsit. Planta ill. *Colla* proxime accedit ad *A. maculatam DC.*; sed maculae fasciato-interruptae, non rotundatae; scapus non simplex, sed semper fere trichotomus; racemi non superne truncati, nec umbellati, sed conici; corolla non rubro-lateritia apice viridescens, sed pallide aurantiaca. Haec et *A. umbellata* an *A. pictae* varietates? quaerit *Colla*.

141. *A. latifolia Haw.*; foliis ovato-lanceolatis, pallide viridibus; maculis oblongis, obsoletis, albicantibus, sparsis subfasciatisque; spinis rufescentibus; floribus thyrsis capitatis. *Haw. Syn. p. 82.* *S. Dyck Cat. rais. p. 28.* *Link Enum. p. 339.* *A. Saponaria* β . *latifolia Haw. Linn. Soc. tr. 7. p. 18.* *Bot. Mag. t. 1346.* *A. Saponaria* β *major*; fol. latioribus; caule corymboso, ramoso. *Bot. Mag. 1460.* *A. umbellata A. major Decand. pl. gr. t. 98.* (Confer *Obs. ad Saponariam.*)

„Folia quam in praecedentibus multo majora, maculis fere ut in *obscura* dispositis; sed multo majoribus. Multiplicatu aequae facilis, ac *Saponaria*; cum *obscurae* vix propagines subnascentur.“ *S. Dyck l. c. p. 59.* Caudex raro ultra 2-ped. *Gawl.* Differt ab *A. Saponaria*, ex icone, staturâ omnium partium majore; caule purpurascens; bracteis ovato-lanceolatis; spinis foliorum pallidis apice fusciscentibus, patentibus, floribus thyrsideo-racemosis, fere bipollicaribus; pedunculis patentibus; petalis apice latius sulphureis. *In Promont. b. spei. h.*

Obs. Non ante annum 1795 in Britannia innotuisse, et adhucdum raram esse, omniumque hujus generis thyrsis gaudere maximo. *Haworth Syn. p. 90.*

142. *A. obscura Mill.*; foliis elliptico-lanceolatis, laete viridibus, glaucescentibus; maculis brevibus s. subrotundis, parvis, albicantibus, sparsis; spinis ruberrimis; floribus thyrsis-

spicatis. *Haw. Syn.* p. 82. *Mill. dict. ed.* 8. n. 6. *A. Saponaria* β . *obscura* *Haw.* in *Linn. Trans.* 7. p. 17. (excl., momente *Haw.*, syn. *Bradl.*) *A. perfoliata*; fol. latioribus, amplexicaulibus, maculatis, margine spinosis; floribus spicatis: α . *obscura* *Ait. Hort. Kew. ed.* 1. p. 467. *A. picta*; caulescens; fol. ensiformibus, dentatis, pictis, patentibus (diagnosi ex *Willd. Spec.* II. p. 186 petitâ). *H. Kew. ed.* 2. II. p. 293. (excl. syn. *A. umbellatae* *Dec.*) *A. picta* α *major* *Willd. Spec.* II. p. 186. (fide *Haw.* et *Bot. Mag.*, qui tamen non corrigunt synonyma corrigenda). *A. picta* *Thunb. diss. n.* 4. *prodr.* p. 61. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 310. (diagnosi, uti in *Willd. Spec.* ex illo repetitâ) *Decand. pl. grass. t.* 97. *Bot. Mag. t.* 1323. *Gart. Mag.* 1809. p. 89. t. 17. *A. caulescens*; fol. oblongo-lanceolatis, patentibus, maculis subserialibus, oblongis, spinoso-serratis; racemo simplici; florib. cylindricis, pendulis. *Willd. En. H. berol.* p. 383. *Mag. etc.* p. 280. n. 16. (excl. syn. *Al. Saponariae* *Haw.*) *S. Dyck Cat. rais.* p. 27. *A. maculata* β *Lam. Enc.* p. 87. (fid. *Dec.*) *A. perfoliata* μ . *Linn. p.* 458., quo teste: *A. africana maculata spinosa minor.* *Dill. Elth. t.* 15. f. 16. (uterque a *Willdenow Spec.* perperam sub *ALOË picta* β . *minore* cum *A. perfoliata saponaria* *H. Kew.* conjunctus fide *Bot. Mag.*) β . *glaucior*; foliis glaucioribus, maculis rotundis, sparsis, obscuris, saturatoribus. *Haw. Saxif. Enum. Succul. Revis.* p. 40. γ . *magnidens*; foliis saturatoribus, maculis obsoletis; marginibus dentibus majoribus s. distantioribus. *Haw. Revis.* l. c.

Caudex lignosus, nunc brevis nudus, nunc fere totus foliosus. Folia conferta, patentissima, crassa, dura, subtus convexa, dilute viridia, maculis vagis, oblongis, glauco-flavescentibus: spinis marginalibus validis, rectis, fulvis. Scapus viridi-flavescentis, sub floribus crassitie pennae aquilae. Racemus densius spicatus, oblongo-conicus. Bractee albido-rubellae, fere pollicares, lanceolatae, acuminatae; pedicelli 2-3 poll., erecti, virides, sursum fusco-purpurascens; corolla cernua, 2-poll., saturate coccinea, apicem versus et intus virescens, tubulosa, tereti-trigona. Stamina subinclusa, antheris fulvis, cum stylo exsertis. *Bot. Mag.* In *Prom. b. spei.* \dagger .

Obs. Hanc et *Saponariam* bene depictas esse a *Decandolle*, sed in descriptione foliorum *pictae* suae et *maculatae* commutasse *saponariam* cum *obscura*: *Princ. S. Dyck* l. c. p. 58. Utrum *maculata* β *Lam.* re vere huc spectet, uti videtur clo *Decandolle*; cum „folia angustiora, profunde, fere atro-viridia, et supra praecipue maculis majoribus albidis magisque distinctis; spicam magis elongatam, laxiorem minusque elegantem“ ferat, vel adsordide virentem *saponariam*, addubitandum, cum citasset *Lamarck* etiam *Dill.* t. 14. f. 15., qui potius ad *saponariam* spectare nobis videtur. Conservatur in *H. paris.* nomine *A. pictae* *Juss.* E *Thunberg* in *Fl. cap.* nil edocemur: jungit enim in synonymis ϑ , λ , μ , ν , et tantum addit: „caulis flexuoso-erectus, spithamaeus vel paulo ultra; folia plana, saepius fasciata maculis interruptis, pedalia.“

γ . caule fruticoso.

143. **A. soccolorina* *Lam.*; caule senecto, suffruticoso,

crasso dichotomo; foliis ensiformibus, virescentibus, apice subincurvatis: serraturis marginalibus parvis, albis, numerosis. *Haw. Syn.* p. 75. (excl. *perfoliata* λ . *vera* Willd.) *Linn. Soc. Trans* 7. p. 19. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p. 292. *Lam. Enc.* 1. p. 85. A. caule fruticoso; foliis oblongis, ensiformibus, submaculatis; margine corneo, albo, spinoso: spinis rectis. *Dec. pl. grass.* t. 85. (excl. syn. *Munting* ad *dorsalem* spectante monente *Haworth.*) A. caulescens; fol. lanceolatis, adscendenti-erectis, spinoso-dentatis, subglaucescentibus, submaculatis; spinis albis, confertissimis; racemò simplici; floribus cylindricis pendulis. *Willd. Enum.* p. 383. *Mag. l. c.* p. 281. n. 21. *Regn. Bot.* III. *Woodward* III. t. 202. *Bot. Mag.* 472. *Black.* t. 333. A. *soccotorina* α *minor* *Bot. Mag.* t. 1474. (excl. *Munt.*) A. *perfoliata* δ . *soccotorina* *Ait. Kew. ed.* 1. p. 466. A. *perfoliata* ξ *Linn. Spec.* 458. quo teste: *Pluk. Alm.* 19. t. 240. f. 4. *Commel. Hort.* 1. p. 91. t. 48. A. *sinuata*; caulescens; foliis ensiformibus, sinuato-serratis, reflexis; floribus racemosis, erectis, cylindricis. *Thunb. Diss.* n. 5. *prodr.* 61. *Fl. cap. ed. Schult.* p. 311. *Willd. Spec.* 11. p. 187. (excl. syn. *barbad.* et *Dill.*, se ipso teste in *Enum.*) A. *vera*; fol. longiss. angustiss.: marginibus spinosis; floribus spicatis. *Mill. Dict.* 8. n. 15. (fid. *Haw.*, nec *vera* *Lam.* et *Hort. Paris* monente *Dec.*, quo teste:) *Petiv. Gaz.* n. 465. t. 87. f. 9.

Radix lignosa, crassa, ramosa. Caulis lignosus, cylindricus, simplex aut ramosus, cubitalis et ultra, inferne nudus, foliorum vestigiis subexasperatus. Folia ad apicem ramorum numerosa, congesta; sparsa, amplexicaulia, adscendentia, oblonga, lanceolata, acuta, superne glauca, inferne maculis albis quibusdam notata, planiuscula; margine corneo, albo, spinoso, spinis acutis, duris, brevibus, rectis, numerosis. Pedunculus floralis e foliis, erectus, cylindricus, subglaucus, bracteis sterilibus, membranaceis, ordine quincunci dispositis, ovato-oblongis, mucronatis, rubentibus vestitus. Flores in racemum cylindricum dispositi, pedicellati, primo erecti, postea penduli, tandem rursus erecti, basi bracteati; bracteae pedicellis subaequales. Corolla basi coccinea, medio pallida, apice viridescens, cylindræa, hexapetala; petalis distinctis, oblongis, obtusis, tribus interioribus, tribus externis. Stamina sex. Filamenta flava, subulata, tria ad petala interiora corollâ longiora, tria alia corollae aequalia. Antherae oblongae, fuscae. Pollen luteum. Germen viride, cylindricum, sexsulcatum. Stylus flavus, filiformis, staminibus brevior. Stigma acutum. Capsula cylindræa, obtuse trigona, trilocularis, trivalvis. Semina numerosa, saepius abortiva. *Dec. pl. gr.* Caulis in planta 50 annorum crassitie brachii, a basi ad 4-6 ped. altitudine nudus. Folia ($1\frac{1}{2}$ ped., basi vix $1\frac{1}{2}$ poll. lata, *Lam.*) subtus convexiuscula, supra quidquam concava. Scapus 2 ped., simplex, purascens (basi olivaceus, apicem versus violaceus, subteres *Lam.*). Pedicelli fere longitudine floris, bractea sphacelatâ,

convoluto-acuminatâ, saepe longiores. Cor. (saepius crocea, vel rubro flavoque varia, striis viridibus) tereti-trigona: laciniâe intimae fere duplo latiores, apice rotundatae, exteriores dorso carinatae, ore brevi, patulo. Germe oblongo-trigonum, stylo quadruplo brevius. *Gawl.* In *Soccotora*; *culta in Barbados.* †.

144. *A. macra* *Haw.*; caudice folioso; foliis lorato-ensiformibus, concavo-canaliculatis, patulo-recurvantibus, spinuloso-serrulatis, viridibus. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 45. 105. Rev. p. 42.*

Caudex $\frac{1}{2}$ ped.; foliis laevibus, immaculatis: infimis alternis distantibus, supremis collecto-capitatis, $1\frac{1}{2}$ ped., omnium hujus generis tenuioribus s. minus succulentis, valde, at breviter, serrulatis, denticulis praecexiguis, pallide roseis, fere ut in *ruso-cincta*, spinulisque marginalibus in utraque exiguis albis vel saepius pallide roseis. Folia in *macra* effuso-recurvata, $1\frac{1}{2}$ ped., alte concavo-canaliculata, saturate viridia; in *ruso cincta* incurvo-erecta, breviora, duplo latiora latiusque roseo marginata, spinis marginalibus parum paucioribus forteque paulo majoribus. Flores ex axillis foliorum lateralium, non terminalium in *macra*. A *ruso-cincta* differt foliis duplo angustioribus, magis recurvis. Paululum simulat DRACAENAM *marginatam* *H. Kew.* s. PHYLLOMA. *Haw.* Flores spicati, more ALOARUM, at in foliorum axillis superiorum. Scapus pedalis, adscendens sive patulus, florum spicâ subbrevis, pauciflorâ. Corollae pendulae, breves, cylindraceae, rectae, subsemiunciales, luteo-rubrae: ore laciniisve patulis, ut in variis. Genitalia inclusa. Capsulam abbreviatam non perfectam vidi: *Haw. rev. l. c.*, cui nunc forte genus novum ob capsulam baccatam in *Phil. Mag. et Journ. 1824. Octob. p. 299.* Clo *Link* in *Enum. p. 359.* ad genus LOMATOPHYLLUM spectare videtur. In *Mauritiis.* †.

145. *A. rufocincta* *Haw.*; foliis lorato-lanceolatis, acuminatis, viridibus, concavo-canaliculatis, margine roseo: denticulis numerosis albis, cartilagineis. *Haw. Suppl. pl. succul. p. 45. Revis. p. 41.*

„Proxima *macrae*: at differt foliis latioribus, erectioribus. Affinis etiam *soccotorinae*, quoque *rufescenti* *Dec. pl. grass. 15.*: at foliis laete viridibus, dentibus diversis. *Macra*, folia minus carnosa quam in plurimis, laevia, immaculata, margine tenuiter laete roseo, albo, denticulato. Plantae juvenes fere acaules, foliis erecto-patulis, $1\frac{1}{2}$ ped., 2-5 poll. ad basin. *Haw. Suppl. l. c.* „Nunc gerit folia bipedalia, fere ut in FOURCROEA: sed credo hujus generis, ob foliorum involutionem“ *Haw. rev.* In *Ind. orientali.* †.

146. *A. ciliaris* *Haw.*; foliis oblongo-lanceolatis, brevibus: denticulis infimis sensim majoribus, ciliiformibus. *Haw. in Philos. Mag. et Journ. 1825. Octob. p. 281.*

Caudex nunc 3-5-pedalis in *horto Kew.*, gracilis, erectus. Folia remota, flaccida, viridia, laevia et forte omnium minus carnosa sive tenuissima. *Haw.* In *Prom. b. spei.* *D. Bowie.* †.

147. *A. striatula* *Haw.*; foliis lorato-acuminatis, angustis; vaginis pallidis, viridi concinne striatulis: spinulis mar-

ginalibus uniformibus. *Haw. in Philos. Mag. et Journ. 1825. Octob. p. 281.*

-Fruticulus in *hort. Kew.* nunc 3-pedalis, *A. ciliari* vix gracilior, foliis involuto-concavis, duplo angustioribus, glaucescentibus duploque longioribus, marginalibus denticulis minoribus, parum remotioribus. Paulum simulat *A. macram*; at omnino tenuior, foliorum denticulis longe numerosioribus minoribusque. Non-dum floruit. *Haw.. In Prom. b. spei. D. Bowie. †.*

148. *A. tenuior* *Haw.*; foliis lorato-acuminatis, vaginis viridibus; spinulis marginalibus minutissimis, numerosissimis, uniformibus; caudice gracillimo. *Haw. in Philos. Mag. et Journ. 1825. Octob. p. 281.*

Folia supra subinvoluto-concava, viridia; vaginis viridibus obsolete striatulis, cum saturatiore viridi. *A. striatulae* simillima; at caule duplo graciliore: foliis angustioribus, denticulis marginalibus numerosioribus minoribus. Folia etiam aliquot simulant *A. micracantham*; at longe distantiora, angustiora, minora immaculataque. Flores (ut audiivi) lutei, 6-7-andri: staminibus exsertis. *Haw.. Prom. b. spei. D. Bowie. †.*

149. *A. Bowiea*; foliis lorato-linearibus, involuto-canaliculatis, acuminatis, apice recurvulis, glaucescenti-viridibus, sublaevibus: denticulis marginalibus cartilagineo-albis, numerosis; floribus laxè spicatis, patulis. *BOWIEA africana* *Haw. Philosoph. Mag. et Journ. 1824. Octob. p. 299. 1827. Febr. p. 123.*

Folia vix subsemiped., multifaria, erectiuscula, superne parum recurvula, involuta, latissime canaliculata, viridia glaucescentiave, laevia, substriatula, subtus convexa, regione costali rigidiuscula, e parvis incipientibus pallidis verruculis s. maculis lente magis conspicuis; marginibus (foliorum) denticulis distinctis, rectis, vix $\frac{1}{2}$ lin., subirregulariter positis et saepe per lentem subtriangularibus. Scapus subpedalis, gracilis, erectus, bracteatus: bracteis imis unc. longis, subfoliiformibus, basi utrinque dilatatis membranaceis, sine floribus; superioribus sensim minoribus cum floribus. Flores laxè spicati, distincti, patentes (nec penduli ut in *ALOË*); pedunculis perigonio 5-plo brevioribus, teretibus, basi bracteatis. Corolla sordide luteo-viridis, tincturâ rufescente, semuncialis, laciniis oblongis, obsolete bilabiatis, apice subrevolutis. Filamenta nivea, exserta, antheris obtusis emarginatis, basi cordatis, polline flavo. Stylus albo-lutescens, stigmate inconspicuo. — Folia, scapus et bractee, ut in genere *HAWORTHIA*; sed perigonium, ut in *ALOË macra*. *Haw.. In Prom. b. sp. D. Bowie. †.*

150. *A. myriacantha*; foliis lorato-linearibus, arcuato-recurvis, acuminatis, submucronatis, concavo-canaliculatis, glaucescentibus, subtus tuberculato-spinulescentibus, supra laevibus: maculis albis oblongis; denticulis marginalibus albis, numerosissimis; floribus umbellatis. *BOWIEA myriacantha* *Haw. in Philos. Mag. et Ann. of Philos. 1827. Febr. p. 122.*

Caudex senectus incrassato-subconicus, in nostro specimine spontaneo 2-unc.; in locis natalibus forte semisubterraneus. Folia mul-

multifarie effusa, vix numerosa, sub $\frac{1}{2}$ ped., 4-5 lin. lata, arcuatim patenti-recurva, crassiuscula, attenuatim acuminata, sordide viridia s. glaucescentia; subtus convexa rariusve obsolete carinulata, asperrima, spinulis minutis respicientibus; supra laevia; ordine saepe geminato macularum oblongarum albarum (in medio folii) longitudinaliter dispositarum, rarius tuberculatim subelevatarum; marginibus foliorum minute albo-cartilagineis, denticulis minutissimis, albis, rectis vel subrespicientibus. Scapus vix pedalis, erecto-adscendens, subflexuosus, gracilis, teres, laevis, inferne nudus, superne bracteis late adpressis, acuminatis, plus minus membranaceis et aristatis, superioribus magis magisque imbricatim approximatis, supremis supra flores in capitulum densum conicum sterile membranaceum terminatis. Flores 6-8 in umbella spuria e bractearum alis; pedunculis $\frac{1}{2}$ unc., erectis, teretibus, lutescenti-viridibus. Corolla pedunculo longior, parum ringens; lacinae 3 exteriores acuminatae, crassiores: suprema incurva, longior, erecta, inferne sordide rosea, superne virescens nervis viridibus; inferiores conniventes nec patentem; 3 interiores breviores, teneriores, incurvae, sordide lutescentes carinula viridi. Filamenta inaequalia, inclusa (an semper?), corollae basi inserta, lutescentia; 3 longiora flexuose declinato-adscendentia, cum stylo ab ipsa basi flexili. Stylus niveus, staminibus longior, longitudine laciniarum interiorum. Stigma exiguum, trilobum, luteum. Germen oblongum, obtuse 6-costatum. *Haw.* In *Prom. b. sp. D. Bowie.* 4.

151. **A. spicata*; caulescens; foliis planis, ensiformibus, dentatis; floribus spicatis, campanulatis, horizontalibus. *Thunb. Diss. n. 2. Prodr. 61. Fl. cap. ed. Schult. p. 309. Linn. Suppl. 205. Willd. Spec. II. p. 185.? Haw. Syn. p. 76. Salm-Dyck Cat. rais. p. 28.* *A. foliis lorato-ensiformibus, deorsum albo perbelle guttatis: spinis marginalibus mediocribus, igneis. Haw. Revis. p. 59.*

„Simillima *A. perfoliatae*; at spicâ et figurâ florum valde diversa. Ex hujus succo optima Gummiresina Aloës paratur; ex reliquis speciebus vilior.“ *Linn. fil. l. c. Thunberg* describit spontaneam: „caulis teres, apice foliosus, 3-4 ped., crassitie brachii. Folia subverticillata, basi lata, sensim attenuata, canaliculata, remote dentata, 2-ped., patentia. Flores densissime approximati in spicam pedalem sensim florentem. Bractea sub singulo flore solitaria, ovata, acuta, lata, membranacea, alba, striis 3 viridibus, corollâ paulo brevior. Cor. lacinae 3 interiores invicem non connatae, latiores, ovatae, obtusae, albae, carinâ lineâ triplici viridi, unguiculares; 3 exteriores basi cum interioribus connatae, angustiores, minus concavae, ceterum similes. Filam. linearia, sensim parum attenuata, basi alba, superne flavescencia, inaequalia, erecta, corollâ $1\frac{1}{2}$ longiora. Antherae ovatae, fulvae. Stylus flexuosus, erectus, longitudine fere staminum. Stigma simplex obtusiusculum. Caps. ovata, obtusa, subtrigona, inflexa, hinc carinata, lateribus planis 4-striatis, inde convexa, sulco medio glabra. Dissepimentum duplicatum.“ „Folia maculis sive punctis nonnullis albis sparsis.“ *Haw.* Sss. *S. Dyck* nunquam vidit. In *Synopsi* olim *Haworth* de synonymo *Willdenowii* non dubitavit; nunc vero non nisi cum? idem adducit. In *Prom. b. spei.* 5.

152. *A. hexapetala* S. Dyck; caule fruticoso; foliis anguste lanceolatis, acuminatis, carnosis, glabris, glauco-viridibus immaculatis: junioribus patulis, senioribus horizontalibus vel reflexis, apice rectis vel subrecurvis; spinis marginalibus numerosis, minutis, albicantibus; pedunculo simplici, crasso, bracteis quibusdam lato-ovatis instructo; floribus spicatis, cernuis, sexpartitis: laciniis a basi ad apicem liberis. S. Dyck *Cat. rais.* p. 28. LOMATOPHYLLUM *Jacquini* Spreng. S. V. 2. p. 74.

„Affinis videtur *spicatae*; sed flores non horizontales, nec macula ulla in foliis alba.“ S. Dyck l. c. p. 59. In H. Schönbrunensi. †.

153. *A. caesia* S. Dyck; caule fruticoso; foliis longe lanceolatis, erecto-patulis, apice subrecurvis, glaucis, glabris, immaculatis: supra planis, margine et apice subtus spinosis; spinis rubris. S. Dyck *Cat. rais.* p. 29. Link *Enum.* p. 539. *a. patula*; caule bipedali; foliis confertis patulis. S. Dyck l. c. *β. elatior*; caule debili, decempedali; foliis angustioribus, distantioribus, patentibus. S. Dyck l. c. *A. caule fruticoso*; foliis longe lanceolatis, erecto-patulis, apice subrecurvis, glaucis, glabris, immaculatis: supra planis, margine et apice subtus spinosis; spinis rubris. *Haw. Suppl.* p. 46. *γ. disticha*; foliis distichis. *Van Marum* (Sss. Pr. non vidit.). An *Aloë africana* *Commel. rar. t.* 44. *Prael. t.* 17.?

„Folia longa, angusta, glauca, spinis parvis, unde habitus fere glaucae; sed duplo triplove major. Folia in *a* satis approximata incomam elegantem. Videtur in hortis occurrere nomine *glaucæ majoris*. In *β* folia subinde horizontalia, caule laevi, debili. Media *glaucam* inter et *arborescentem* sive *africanam*. S. Dyck l. c. p. 60. *β* „speciem insignem“ dicit *cls. Haworth* l. c., sed nomen nullum indicat. *γ* forte ex aetate: juniorem disticham esset monuit *exc. C. de Spin* in litt. ad D. Balbis. In horto Dyck., Confluent., Bruxell. †.

154. *A. gracilis* *Haw.*; foliis subdistantibus, effuse incurvo-recurvulis, anguste longeque lorato-acuminatis, glaucis, mollibus: marginalibus denticulis remotiusculis, minutis. *Haw. in Philos. Mag. et Journ.* 1825. *Octob.* p. 280.

Nunc bipedalis gracilisque, *A. macram* aliquantum simulans, viget in horto Kewensi. Caudex gracilis. Folia caulem vaginantia, ut in *A. frutescente*; sed affinia illis *caesiae*, at longiora, graciliora et molliora tactu; etiam minus crassa quam in multis: dentibus marginalibus subroseis longe minoribus. Nondum floruit. *Haw. In Prom. b. spei.* D. Bowie. †.

155. * *A. dichotoma*; caule dichotomo, laevissimo, fruticoso; foliis ensiformibus, serrulatis, glaucis, apicibus erectis. *Haw. Syn.* p. 74. *Trans. Linn. Soc.* 8. p. 21. *H. Kew. ed.* 2. II. p. 296. *A. c. d.*; *f. e.* serratis; floribus paniculatis; staminibus corollâ ovatâ longioribus. *Willd. Spec.* II. p. 184.

Linn. Suppl. p. 206. Thunb. diss. n. 1. Prodr. 61. Fl. cap. ed. Schult. p. 309. Patterson's Journ. p. 56. (ed. germ. p. 55.) t. 3. 4. 5. Salm-Dyck Cat. p. 30. RHIPIDODENDRUM dichotomum; fol. lanceolato-ensiformibus, acutiusculis, dentatis, patentibus; spicâ paniculatâ; staminibus corollâ longioribus. Willd. Mag. etc. 5. p. 166.

„Videtur olim confusa cum *plicatili*: nondum in hortis Continentis.“

Salm-Dyck l. c. Thunberg describit spontaneam: „truncus teres, erectus, strictissimus, superne dichotome ramosus, 2 org., crassitie femoris, inanis. Rami erecti, pedales et ultra, apice foliosi. Folia perfoliata, denticulata, subtus convexa, supra plana, patienti-erecta, glabra, carnosâ, pedalia, summis sensim minoribus.“ — *Caulis omnium glaberrimus. Haw. In Prom. b. spei. h.*

Obs. Persoon in Synopsi I. p. 378. sphalmate adducit ad hanc speciem A. ramosam Linn. fl., quae non existit. Aliam adhuc speciem generis RHIPIDODENDRI in Prom. b. spei observasse olim, Lichtenstein; Willdenow in Mag. l. c.

156. **A. plicatilis Mill.*; foliis exacte distichis, linguiformibus, obtusis, subintegris: paginis laevissimis, mollissimis; caule fruticoso, valde dichotomo, basi strumoso. *Haw. Syn. p. 74. Trans. Linn. Soc. 7. p. 15. S. Dyck Cat. rais. p. 30. Mill. Dict. 8. n. 7. A. subacaulis; foliis linguiformibus, laevibus, distichis. Ait. Hew. ed. 1. p. 470. 2. ed. II. p. 296. Willd. Spec. II. p. 190. Bot. Mag. t. 457. Decand. pl. grass. t. 75. A. caulescens, dichotoma; foliis distichis (inermibus) lineari-linguiformibus, obtusis, laevibus; floribus laxè racemosis, nutantibus, cylindricis. Willd. En. p. 381. Reichenbach Mag. t. 83. A. disticha & plicatilis Linn. Spec. p. 459. A. tripetala Medic. Bot. Beob. 1783. p. 55. KUMARA disticha Medic. Theod. p. 74. t. 4. RHIPIDODENDRUM distichum; fol. linearibus, subintegerrimis, apice obsolete serratis, obtusis, distichis; racemo simplici; staminibus longitudine corollae. Willd. Mag. nat. Fr. Berl. 5. p. 165. n. 1. RHIPIDODENDRON plicatile Haw. revis. p. 45. Commel. Hort. 11. p. 5. t. 3. β . major; caule robustiore, foliis duplo triplove longioribus latioribusque; serraturis marginalibus asperioribus. S. Dyck l. c. A. plicatilis Jacq. H. Schönbr. t. 433.? RHIPIDOD. plicatile β . majus. Haw. rev. p. 45.*

Dichotoma et caulis fors omnium crassissimus, cinereus, 6-7 ped., superne capitulis foliorum 2-4. Folia patula, 15 circiter poll., 2 poll. lata, basi carnosula, glauca, apice cartilagineo-serrata, compressa, plicatilia, obtusa, bifaria. Scapus ex axillis foliorum supremorum, erectus, teretiusculus, basi compressus. Racemi breves, laxi. Flores pauci, 9-12, rubri, apice viridi-flavicantes, ante expansionem erecti, dein cernui. Pedicelli flore breviores, bracteâ subulato-acuminatâ. Petala 3 exteriora ultra medium coalita, oblonga, obtusa, recta; interiora ad basin usque libera, concava, oblonga, apice subrevoluta, pallidiora, nervo longitu-

dinali saturatiore. Stamina deorsum inflexa. Filamenta flava, corollam aequantia, 3 laciniis extimis opposita latiora. Antherae ovatae, flavae, crassae. Germen ovato-cylindricum, viride. Stylus luteus deorsum inflexus. Stigma simplex acutum. Caps. cylindracea. Semina in quovis loculo biserialia. *Dec.*. In β apud *Jacq.*: caulis teres, fusco-cinereus, firmus, crassitie carpi, 2-3 ped., minime amarus, sed acer. Folia pulposa, crassa, elongate linguiformia, obtusa cum mucrone innocuo, margine cartilagineo-denticulata, ceterum glabra, glauca, ped., $1\frac{1}{2}$ unc. lata. Scapus subterminalis, teres, crassitie calami, foliis longior, glaber, glaucus, superne spathis paucis vagis ovatis, acutis, inferne nudus. Racemus erectus, brevis. Pedicelli vix $\frac{1}{2}$ unc., erectiusculi, rubri. Flores penduli, cylindrici, $\frac{1}{2}$ unc., rubri, inodori; cor. exterior 1-petala, tubulosa, erecta: laciniis 3 oblongis obtusis concavis; interior 3-petala, apice patula, ceterum similis. Filamenta quidquam compressa, longitudine corollae, erecta; antherae oblongae, sulfureae. Germen oblongum, obsolete 6-gonum. Stylus longitudine staminum. Stigma acutum. — β hocce tardius crescit, indeque humilior. Flores magis ventricosi. In *Africa*. \dagger .

157. *A. frutescens* *S. Dyck*; caulescens; caule humili; foliis lineari-lanceolatis, recurvato-patentibus, remotis, glaucescentibus, spinoso-dentatis: dentibus viridibus. *S. Dyck Cat. rais.* p. 30. *Haw. Suppl. pl. succ.* p. 46.

„Simillima *arborescenti*; sed caule frutescente, humiliore, debiliore, vix 2-3 ped.; foliis distantibus, multo angustioribus, brevioribus; propaginibus caulinis et radicalibus numerosissimis. Maxime prolifera, ut brevi vasculum expleat. Vulgaris in hortis Germaniae, ubi *arborescens* raro occurrit.“ *S. Dyck* l. c. et p. 61. Per 30 annos non floruit, cum *arborescens* saepius floreat. *C. de Spin in litt.* ad *Balb.*. Clo *Link* in *Enum.* p. 539. varietas est *A. arborescentis*. In *Prom. b. spei.* \dagger .

158. **A. arborescens* *Mill.*; caule fruticoso; foliis aggregatis, ensiformibus, glaucescentibus, apicibus reflexis, dentibus marginalibus virescentibus. *Haw. Linn. Trans.* 7. p. 20. (excl. syn. *perfoliatae* β *Linn.* ut in:) *Synops.* p. 176. *Mill. Dict.* n. 3. *Bot. Repos.* t. 468. *Decand. pl. grass.* t. 38. *Hort. Kew. ed.* 2. II. p. 292. *A. caulescens*; fol. lineari-lanceolatis, recurvato-patentibus, spinoso-dentatis, amplexicaulibus, subglaucescentibus; dentibus viridibus: inferioribus confertioribus; racemo simplici; floribus cylindricis, pendulis. *Willd. Enum.* p. 582. *Mag. l. c.* p. 281. n. 22. *Salm-Dyck Cat. rais.* p. 51. *Bot. Mag.* t. 1306. *A. perfoliata* α *arborescens*. *Hort. Kew. ed.* 1. p. 466. *Mill. ed. Mart.*. *A. perfoliata* η *Linn. Spec.* p. 458. (ubi sphalmate η omissum, uti in) *Willd. Sp.* II. p. 185. *A. fruticosa* *Lam. Enc.* 1. p. 87. *A. arborea* *Medic. Bot. Beob.* p. 305. *CATEVALA arborescens* *Medic. Theod.* p. 67. *Commel. Hort.* 2. p. 27. t. 14. prael. 69. t. 18. *Pluk. Phyt.* 129. f. 3. (mala). *Petiv. Gazoph.* t. 86. f. 3.

Caudex interdum 10-12 poll., erectus vel parum flexuosus. simplex vel ramosus, teres. Folia basi 2 poll. lata, in comam terminalem ambienter aggregata, fere a basi attenuata acuminata, convoluta-concava, recurvato-reflexa, succulenta, glabra, glaucescentia, margine serrato-spinosa, juniora dentibus viridibus. Scapus simplex, teres, bracteis vagis, rufescentibus, striatis, membranaceis, apice glaucescentibus, obtusis, pollicaribus, $\frac{1}{2}$ poll. latis. Racemus pyramidalis-oblongus, densior. Pedicelli pollicares, coccinei, erecto-patentes, serie sub 5 plici. Corollae coccineae, $1\frac{1}{2}$ poll.; tubus tereti-trigonus; lacinae breves, patulae, apice virentes, interiores apice flavae striâ viridi. Stamina subinclusa, flava, alterna breviora, robustiora. Antherae coccineae polline luteo. Stylus subexsertus, flavus, ascendens, stigmati simplici. Caps. obtuse trigona. Semina subovata. *In Prom. b. spei.* h.

159. *A. pluridens* Haw.; foliis capitatis, ensiformibus, recurvantibus, viridibus: dentibus marginalibus validis, numerosis, incurvis. *Haw. in Philosoph. Mag. et Journ. 1824. Octob. p. 299.*

A. arborescenti proxima; at foliorum denticulis duplo numerosioribus; species bona atque speciosa, trunco jam firmo crasso pedali. *Haw. In Promont. b. spei. D. Bowie.* h.

160. *A. africana* Mill.; foliis late ensiformibus, erecto-subrecurvatis, laevibus, duris: adultis supra medium recurvis; spinis marginalibus dorsalibusque apice igneis; (spica terminali longissimâ; floribus pendulis, imbricatis). *Haw. Revis. (sub PACHIDENDRO africano) p. 36. Mill. dict. ed. 8. n. 4. ed. 1. n. 36.* *A. caule fruticoso, simplici; fol. ensiformibus, glaucis: inferioribus distantibus, apicibus reflexis; dentibus marginalibus igneis. Haw. Syn. p. 76. Trans. Linn. Soc. 8. p. 21. Hort. Kew. ed. 2. II. p. 196. A. perfoliata β . africana H. Kew. ed. 1. p. 466. Willd. Spec. 2. p. 185. Commel. prael. t. 18? hort. t. 14? α . latifolia; foliis capitatis arcte collectis, erecto-patulis, superne parum recurvis: caule firmo, erecto, forte 8-ped. Haw. Suppl. p. 47 et 106. PACHIDENDRON α latum. Haw. Rev. l. c. β . angustior; foliis fere duplo angustioribus, quam α , magisque recurvatis, caule forte 7-ped. Haw. Suppl. p. 47. Bot. Mag. t. 2517. *A. pseudo-africana; fol. tuberculis subspinosis, numerosis, sparsis utrinque. S. Dyck Cat. rais. p. 31. (fid. Haw. revis.) Link Enum. p. 559.**

Flores tubulosi, lutei, in spica ampla eximia. Pedunculi erecti, graciles. Cor. $1\frac{1}{2}$ poll., incurvata. Genitalia incurva, corollâ 4-5 lin. longiora. Filamenta intra tubum aurantio-rubra. Antherae magnae. Stylus lutescens, antheras superans. In β spica eximia, longa, α floret a Febr. ad Majum; β a Nov. ad Febr. *Haw. revis. l. c.* Folia rigidiora spinaeque copiosiores β feroci appropinquant. *P. Salm-Dyck. In β in Bot. Mag. caulis erectus, cicatrisatus; folia descripta, supra concava, subtus apice subinde aculeolata. Spica florum flavorum, apice virentium,*

8 poll. Cor. 1½ poll., apice subincurva. Filamenta lutea exserta; antherae fulvae. In *Prom. b. spei.* h.

Obs. Synonymon *Commelyni* dubium, utrum huic, vel *arborescenti* subscribendum. *Princ. Salm-Dyck Cat.* p. 62. *Haw. rev.* p. 38.

161. *A. Salm-Dyckiana*; foliis ensiformibus, subconca-
vis, perviridibus, erecto-recurvis, adultis expansè in semi-
circulum revolventibus; spinis marginalibus dorsalibusque apice
rubris. *Haw. revis.* p. 37. (sub *PACHIDENDRO Principis*). *A.*
africana Salm-Dyck Cat. rais. p. 62.

„Differt ab *arborescente*: caule robustiore; foliis latioribus, inten-
sius viridibus, supra subconcavis, subtus apice spinosis, spinisque
rubris. Angulus carinae semper spinosus, quod non in *arbores-*
cente. Foliorum directio et dispositio eadem, quae in *arborescente*,
quacum fere ubique commutata.“ *Princ. Salm-Dyck.* „Ab
A. africana foliorum directione discrepat: in hac folia adulta ex-
pansa, ultra medium tantum recurva, fere in arcum; ima, ut in
omnibus, plus minus reflexa: in *P. principis (Salm-Dyckiana)*
folia adulta a basi revoluta, spinulis subtus subseriatim longitudi-
naliter sparsis, distantibus, numerosioribus fortè, quam in *afri-*
cana.“ *Haw. rev.* l. c. In *Prom. b. spei.* h.

162. *A. angusta*; foliis revoluta-recurvis, anguste ensi-
formibus, glaucis, undique parce tuberculato-spinosis: spinis
marginalibus, igneis. *Haw. Rev.* p. 38. (sub *PACHIDENDRO*
angustifolio). *A. angustifolia Haw. Suppl.* p. 47.

Caulis fruticosus, simplex, fortè 4 ped.. Folia infima magis distan-
tia, quam in *africana*, minus in caput collecta. *Haw. Suppl. ex*
unico specimine non florente. In *Prom. b. spei.* h.

163. **A. ferox Lam.*; caule fruticoso, simplici; foliis
ovato-ensiformibus, rigidiusculis, glaucis, deflexis: paginis,
praecipue inferiore, regulariter spinosissimis. *Haw. Syn.* p.
77. (excl. β). *Linn. Trans.* 7. 21. *Hort. Kew.* ed. 2. II. p.
293. *S. Dyck Cat. rais.* p. 51. *Lam. Enc. meth.* 1. p. 87.
A. caule arborescente; fol. perfoliatis undequaque spinosis;
staminibus corollâ duplo longioribus. *Decand. Pl. gr.* t. 32.
(fid. *S. Dyck*). *Bot. Mag.* 1975. *Mill. Dict.* 8. n. 22.
Munt. Aloid. p. 16. f. 17. *Phyt.* p. 20. f. 85. *A. perfoliata*
9 ferox Hort. Kew. ed. 1. p. 467. *A. perfoliata γ Linn.*
Spec. p. 457. *Willd. Spec.* II. p. 185. *Mill. Dict.* ed. 7.
n. 24. (fid. *H. Kew.*) *A. muricata et horrida Haw. Trans.*
Linn. Soc. 7. p. 26. (ut ipsi auctori nunc videtur in *Revis.* p.
44.) *PACHIDENDRON ferox Haw. Revis.* p. 38. *Till. pis.* t.
11. ? *Commel. Prael.* 70. t. 19. (sine dubio *Linn. Willd.*
Lam., cum? *Bot. Mag.*)

Arborescens, saepius 20-ped.. Folia ad apicem caulis palmae in-
star conferta, dependentia, superiora erecta, ovato-lanceolata,
ped., 5-4 poll. lata, acuminata, obscure glauca, carnosa, undi-
que spinosa, sed ad margines et in linea longitudinali media su-
pra subtusque spinis acutioribus, longioribus, validioribus, magis
curvatis. Pedunculi terminales, adscendentes, ramis 2-5 divari-
catis, atro-virides, teretes; bracteis patentibus, ovatis, acutis,

pallide fuscis, digitum crassi, $\frac{1}{2}$ ped., in spicam confertam $\frac{1}{2}$ ped. racemosam terminati. Pedicelli corallini, teretes, 1-2 lin., longitudine bractee corallinae oblongae obtusae. Flores penduli, subcylindrici, flavescenti-virides, ochroleuco-striati, 4-5 lin.. Filamenta corollae duplo longiora, divergentia, filiformia, cum antheris styloque corallina. *Gawl.* Apud *Redouté*: Rad. lignosa; fibris crassiusculis, cylindricis, griseis. Caulis arborescens, simplex, inferne foliorum reliquiis exasperatus, superne foliosus. Folia irregulariter spiralia, amplexicaulia, conferta, patula, lanceolata, marginibus spinosa, obscure viridia, supra concava, subtus convexa, utrinque spinis duris, conicis, apice subincurvis, fusco-rubris, sparsis vel lineam longitudinali ordinatis, inferne numerosioribus. Scapus crassus, subcompressus, irregulariter sulcatus; ramis 2-5, patulis, cylindricis; bracteis latis. Spicae longae, cylindricae, densae; flores circa axin trispirales, penduli, pedicellati; pedicellis brevibus, teretibus, basi bractea lata lanceolata brevi marcescente. Cor. cylindrica; petala erecta, basi subconnata, 3 exteriora oblonga, obtusa, concava, albo-rubentia, apice viridia; interna ovato-oblonga, obtusissima, apice parum extus revoluta, alba, lineam longitudinali viridi, apice atro-violaceo. Stam. exserta; filamenta inferne alba, parte exserta flava: 3 coram petalis internis longiora, planiuscula; antherae lineares, primo aurantiacae, erectae, serius fuscae, versatiles. Germen cylindraceum, viride, sexsulcum. Stylus rectus, albus, apice flavus, stamina longiora aequans. Stigma simplex, obtusum. Caps. cylindracea, sexsulca. Sem. biserialia. *In Prom. b. spei. h.*

Obs. „Descriptionem datam a clo *Haworth* non omnibus partibus convenire cum icone *Decandolle* a clo *Haworth* non laudata, „(laudavit serius in *Rev. l. c.*)“ melius cum speciminibus duobus *ferocis H. Paris.* licet diversis inter se, altero utrinque spinoso, altero supra laevi; specimen, ad quod icon cli *Decandolle* parata, interiisse: si non ex eadem stirpe, fors distinctas esse species, cum junius specimen semper floreat, reliqua nunquam floruisent, meliusque quadrent cum descriptione *Haworthiana*, quam icon *Decandolle*, in qua folia erecta: *P. S. S. Dyck.*

164. **A. subferox Spreng.*; caule fruticoso simplici; foliis lanceolatis, primo patulis, dein reflexis, rigidis, subinermibus, atro-viridibus, rore glauco: supra glabris, margine et pagina inferiore spinis rigidis, atro-rubentibus. *S. Dyck Cat. rais. p. 31.* (sub *A. Pseudo-feroce*). *A. subferox Spreng. S. V. 2. p. 73.* *A. ferox β*; foliis mitioribus, superne fere inermibus. *Haw. Syn. p. 77.* *PACHIDENDRON pseudo-ferox*; fol. ovato-ensiformibus, glaucis, deflexis: subtus tuberculato-spinosis, supra subinermibus. *Haw. rev. p. 38. Commel. prael. t. 20.* (fid. *Haw. rev.*) ergo: *A. perfoliata ε. Linn. Spec. p. 458. Willd. Spec. II. p. 186.* (quam *Willdenow* laudavit ad *A. Commelyni*).

„Differt a *supralaevis*: foliis reflexis, nec incurvo-adscendentibus.“
Haw. l. c. Linn. in Mant. p. 367. ad perfoliatam ε ait: „caulis exserit radices filiformes, descendentes, radicanter.“ *In Promont. b. spei. h.*

165. *A. supralaevis Haw.*; caule fruticoso, simplici; foliis oblongo-ensiformibus, rigidis, glaucescentibus, incurvis: supra laevibus, subtus irregulariter (tuberculato-) spinosis.

sis. *Haw. Linn. Trans.* 8. p. 22. *Syn.* p. 77. (excl. syn. *Willd.* monente ipso *Haworth* in *Revis.* p. 39.) *Hort. Kew. ed.* 2. II. p. 293. *S. Dyck Cat. rais.* p. 32. PACHIDENDRON *supralaeve* *Haw. Revis.* p. 39. *Mill. Dict. ed.* 1. n. 13. (fid. *H. Kew.*)

Ssso Pr. *Salm-Dyck*; qui hanc speciem nunquam vidit, huc fors rectius spectare *A. ferox* *Decand.* videtur, l. c. p. 64. *Willdenow* eandem citat ad *A. Commelyni* cum sua *A. perfoliata* ϵ et *Commel. prael.* p. 7. t. 20. In *Prom. b. spei.* ζ .

166. *A. flavispina* *Haw.*; caule fruticoso; propaginibus radicalibus; foliis oblongo-acuminatis, glaucis: junioribus patulis, senioribus horizontalibus; lateribus dorsoque spinis interruptis latissimis, fulvicantibus. *Haw. Syn.* p. 77. *Linn. Soc. trans.* 8. p. 22. *S. Dyck Cat. rais.* p. 32.

Ad seriem *mitraeformium* spectat, quae adhuc dubiis multis premittitur. Similis quodammodo, monente *Haworth*, *A. mitraeformis* *H. Eltham.* *S. Dyck* l. c. p. 64. In *Prom. b. spei.* ζ .

167. *A. albispina* *Haw.*; caule fruticoso; foliis ovato-acuminatis, virescentibus, marginibus carinâque valde spinosis; spinis longis, albissimis: senioribus apice flavicantibus, mortuis atris. *Haw. Syn.* p. 78. *Linn. soc. tr.* 8. p. 22. *S. Dyck Cat. rais.* p. 32.

Folia oblongo-lanceolata: adulta rugosiuscula, subpubescentia juniora vel subviscosa. Vix 2 ped.. Caulis stolonifer. Spinae 4-5 lin. *S. Dyck* l. c. et p. 65. In *Prom. b. spei.* ζ .

168. **A. Commelyni* *Willd.*; caulescens; foliis ovato-oblongis, attenuatis, patulis, glaucescentibus, supra laevibus, margine carinâque apicem versus subtus spinoso-dentatis: spinis albicantibus. *Willd. Mag. Ges. nat. Freund.* V. p. 282. n. 25. (excl. syn. *supralaevis* *Haw.* et *Commel.* t. 20.) *Salm Dyck Cat. rais.* p. 32. *Haw. Suppl. pl. succ.* p. 48. *A.* fol. erectis, ovatis, acuminatis; spinis marginalibus paucioribus, albis. *Haw. Revis.* p. 42. *A. mitriformis*; fol. crassis, margine spinosis, inferne spinulosis, adpressis, impunctatis; racemis umbellatis. *Dec. pl. grass.* 99. (fide *Salm-Dyck.* excl. syn. ad β . spectt.) *A. mitriformis* β . *humilior* *Haw. Linn. Trans.* 7. 25. *A. mitriformis* α *Lam. Enc.* 1. n. 8. β . *A. mitriformis*; foliis ovatis, erectis, acuminatis; spinis marginalibus paucioribus, flavicantibus. *Haw. Rev.* p. 43. et, se teste: *A. mitriformis*; caule fruticoso; propaginibus radicalibus; foliis imbricatis, erectis, ovatis, acutis; spinis marginalibus rarioribus. *Haw. Syn.* p. 77. (excl. syn. *Dec.*) quo teste: *Bot. Mag.* t. 1270; (excl. pl. syn. ad α spectant.) *Mill. Dict.* n. 1; *A. mitraeformis* α *Hort. Kew. ed.* 2. II. p. 294. *A. mitraeformis* α *elatior* *Haw. Linn. Trans.* 7. 25. *A. perfoliata* ν *Linn. Spec.* p. 458. *A. perfoliata* o *mitraeformis* *H. Kew.* p. 467. *A. perfoliata* α *Willd. Spec.* II. p. 186.

A. picta *v* *Thunb. Diss. 6. n. 4. Dillen. H. Elth. 21. t. 17. f. 19.* *γ. A. Commelyni β minor*; fol. angustioribus et brevioribus. *S. Dyck l. c.*

In *α* radices subfasciculatae. Caulis lignosus, 6-ped., erectus, plerumque simplex, inferne nudus, cortice griseo, vestigiis foliorum exasperato, annulato. Folia ad apicem caulis conferta, semiamplexicaulia, erecta, lanceolata, acuta, dura, superne concava, inferne convexa, margine spinis duris, brevibus, albis, rectis, infra in linea longitudinali spinulosa. Scapus axillaris, nudus, cylindricus, exsertus, e griseo purpurascens. Flores in racemo primum conico, dein subumbellato, pedicellati: pedicello cylindrico, basi bracteato. Corolla cylindrica, coccinea, hexapetala; petalis oblongis, obtusiusculis: tribus externis coloratis; 3 internis margine pallidis. Stamina 6. Filamenta lutea, planiuscula, corollâ breviora, inter se inaequalia, receptaculo inserta. Antherae oblongae, medio insertae, erectae, rubro-lateritiae, pollen albidum emittentes. Germen obtuse trigonum, viride, sexsulcatum. Stylus filiformis, luteus. Stigma obtusum. Capsula trilobularis, trivalvis, obtuse trigona. Semina numerosa, in quoque loculo biserialia, saepius abortiva. *Dec.* In *β* apud *Gawl.* caudex ut in *α*. Folia fragilia, glaberrima, ovato-acuminata, sursum convergentia, supra depressa, glauca, immaculata, nunc acumina pauca, brevia, dorso vage exserentia, spinis (in icone fusciscentibus) remotis, regularibus. Scapus florifer ramosus, 1-3 ped., rubro-violaceus, crassitie pennae oloris, squamis lanceolatis, fusco-flavicantibus, acuminatis, $\frac{1}{2}$ poll.. Bracteae lanceolatae, pedicellis dimidio breviores, flavescenti-fuscae. Flores in racemo denso, sensim oblongo. Pedunculi adscendentes 2-3 poll., saturate coccinei, uti corolla $2\frac{1}{2}$ -3 poll., quae intus flavicans, recta, cernua. Stamina alterna breviora. Antherae coccineae. Reliqua ut in *α*. Jam olim de *mitriformi* *Haw.* dubitavere *S. P. Salm-D.* et *Com. de Spin*; nunc ipsi auctori varietas *Commelyni*. In *Prom. b. spei. h.*

169. *A. spinulosa* *Salm-Dyck*; caulescens; foliis ovato-oblongis, glaucescentibus, erecto-patulis, apice subrecurvis, supra laevibus, infra irregulariter spinulosis; spinis marginalibus et carinalibus, longioribus, albis. *Salm-Dyck obs. bot. in H. Dyck. 1822. 4.*

Ab *A. supralaevis* *Haw.* longissime discedit, et sectionis *mitraeformium* est. Ab *A. Commelyni*, cui proxima, valde differt foliis obtusioribus apice recurvis, subtus undique spinosis, spinis marginalibus numerosioribus. *S. Dyck. In Promont. b. spei. h.*

170. *A. nobilis* *Haw.*; caule fruticoso, folioso, simplici, absque propaginibus; foliis imbricatis, erectis, late ovato-acutis, infimis subdistantibus; spinis marginalibus numerosis, (albis). *Haw. Syn. p. 78. Haw. Revisio. p. 43. A. mitriformis spinosior*; fol. paulo minoribus magisque distantibus; spinis numerosioribus, flavicantibus. *Haw. Linn. Soc. trans. 8. 23. A. mitraeformis γ. spinosior Willd. Mag. p. 282. n. 24. A. Commelyni* simillima; foliis numerosis sesquimajoribus, infimis magis distantibus, spinis marginalibus frequentioribus. *Haw.*

Syn. Distinguitur facile dentibus longioribus et duplo numerosioribus, quam in affinibus. *Haw. Syn.* Confer *Obs.* ad *A. Commelyni*. Clo *Sprengel* synonymon *A. mitraeformis Willden.* in *S. V.* 2. p. 74. In *Prom. b. spei.* h.

171. *A. xanthacantha Willd.*; caulescens; foliis ovato-acuminatis, glaucis, patentibus, margine dorsoque spinosis: spinis latissimis, flavicantibus. *Willd. Mag.* l. c. p. 282. n. 25. (excl. syn. *A. flavispinae Haw.*) *S. Dyck Cat. rais.* p. 33. *Haw. Suppl. pl. succ.* p. 48. *AL. mitraeformis H. Eltham. t.* 17? *AL. mitraeformis patula Hortor.*

„Non esse *flavispinam Haw.*; cum in *xanthacantha* spinae non omnino flavae, sed albae, aetate tantum flavescentes, nec latae. Flores spicati, nec ut in affinibus, umbellati. *S. Dyck* l. c. p. 69. Quod et *Haworth* agnovit in *Suppl.* l. c. simillimam esse *flavispinae*. Varietatem esse *A. mitraeformis C. de Spin* in litt. ad *Balb.*. (*A. africana mitraeformis spinosa Dillen H. elth.* 21. t. 17. f. 19. laudatur sine dubio in *H. Kew.* ad *mitraeformem a.*) In *Prom. b. spei.* h.

172. *A. mitraeformis Willd.*; caulescens; foliis ovatis, acutis, imbricato-erectis, subglaucis, margine carinaeque subtus spinosis. *Willd. Mag.* l. c. n. 24. (excl. β . et γ . *Haw.*) quo teste: *Ejusd. Enum. H. Berol.* p. 383. *S. Dyck Cat. rais.* p. 33. *A. fol. patulis*, late ovatis, acutis, praecrassis: spinis marginalibus paucioribus flaveolis. *Haw. rev.* p. 43. β *elator*, paulo major. *S. Dyck* l. c.

„ β fors ne varietas quidem. Folia superficie inferiore fere nuda. Spinae marginales flavae. Altitudo fere *xanthacanthae*. An *mitraeformis Haw.*?” quaerit *S. Dyck* l. c. p. 70., quae, testante nunc ipso *Haworth*, alia. „A prioribus differt foliis magis patulis.“ In *Prom. b. spei.* h.

173. *A. distans Haw.*; caule fruticoso; propaginibus radicalibus; foliis distantibus, erecto-patulis, ovato-acutis. *Haw. Syn.* p. 78. *A. fol. erecto-patulis*, remotioribus, ovatis, acutis; spinis marginalibus paucis, majoribus. *Haw. Rev.* p. 43. *A. brevifolia S. Dyck* p. 33. et hoc teste: α . *A. brevifolia*; foliis remotis erecto-patulis. *S. Dyck. A. mitraef. humilior Willd.* *ALOE mitraeformis β brevifolia*; fol. ovatis, brevibus, distantibus, subtus tuberculatis. *Bot. Mag. t.* 1362. *A. mitraeformis β . angustior Lam. Enc.* 1. p. 87. *Link Enum.* p. 339. *A. brevifolia Haw. Linn. Soc. tr.* 8. 23. (cui huc: *A. perfoliata π brevifolia H. Kew. ed.* 1. p. 467. *A. mitraeformis β . ed.* 2. II. p. 294. (excl. syn. *Plant. grass. c. icone*, quae *A. Commelyni* praesentat.)) β . *A. reflexa*; foliis remotis oblongo-acutis reflexis. *S. Dyck* l. c. *Van Marum.* γ . *A. depressa*; foliis confertis, patentibus: caule humiliore. *S. Dyck* l. c. *Van Marum.* *A. distans γ . depressa*; spinis pallidioribus; fol. (ut *S. Dyck*). *Haw. Rev.* p. 43.

„Varietatum pristinarum *mitraeformis* minima, maculis numerosissimi-

mis albis in superficie interna facilis distinctu. Sub α subvarietas adhuc minor. In β folia angustiora, dependentia. In γ folia latiora, sed adeo approximata, ut se invicem contingant. Omnibus spinæ albae, ætate demum flavicantes. S. Dyck l. c. p. 71. Varietatem esse mitriformis etiam C. de Spin in litt. ad Balbis: sed e qua forte justius species. Flores subumbellati, e flavicante rubri, perigonii limbo reflexo. Omnium altissimam esse, et folia brevissima. Balb.. Caudex annosior nudus; folia lacte viridia, subtus tuberculis albidis, oblongis, sparsis, succulenta, fragilia, 3-4 poll., 2 poll. lata, concaviuscula, subtus subcarinato-convexa, sursum incurvula, formâ fere depresso-naviculari, dentibus cartilagineis, brevibus, distantibus, fusco-flavescentibus, majoribus et crebrioribus, quam in A. Commelyni. Scapus simplex vel corymboso-ramosus, virescens, hinc purpurascens. Racemus multiflorus, transversim cylindricus vel subumbellatus; pedicellis divaricatis longitudine fere corollae; bracteis ovato-lanceolatis, convolutis, pallide albido-rubris, acuminatis, 4 lin.. Cor. cernua, 2 poll., sordide coccinea, apicem versus et intus virescens, laciniis apice revolutis, tubo tereti-trigono. Antherae coccineae stylusque viridis exsertæ. Gawl. In Prom. b. spei. 4.

174. A. inermis Forsk.; foliis inermibus, margine subcartilagineis. Forsk. Aeg. 74. n. 33.

Folia carnosâ, 1½ poll. lata, curva, subtus convexa, viridia, supra concava, ferruginescentia, albido-maculata, prorsus inermia: lineae 2 longitudinales elevatae in pagina superiori foliorum; margine hyalino, crasso, cartilagineo. Forsk.. Ad urbem Taes Arabiae. h.

175. A. pendens Forsk.; (sine diagnosi). Forsk. Aeg. 74. n. 32. Vitm. Sum. Pl. II. p. 535. Gmel. Syst. 1. p. 562. A. dependens Steud.

Folia subdisticha, digito angustiora, ½ spith. vel pedalia, vaginantia, remota. Flores racemosi flavi. Crescendo saepe dependet e rupibus; pedunculis tamen surgentibus. Forsk.. In Arabia. h.

Obs. A. pertusa Haw. Linn. Trans. VII. p. 25. nunc, monente se ipso in Rev. p. 15. 201., est species CRASSULAE, a Haworth nunc PUNGOBREA pertusa dicta in Phil. Mag Mart. 1828. (sphalmate TUNGOBREA in Rev. Succ.).

A. caroliniana Hill H. Kew. p. 333. t. 13. caule tripedali, fol. linearibus, floribus viridi-albicantibus etc. non est ALOË.

1418. Y U C C A.

* Serrulatae; foliorum marginibus serrulis minutis creberrime exasperatis; mucrone terminali pungente, valido; caudice erecto, 1-12 ped., simplicl.

1. Y. conspicua Haw.; foliis paucis, laxè capitatis, longo-lanceolatis, marginibus serrulato-asperis. Haw. Suppl. pl. succ. p. 32.

Caulis caudexve crassus, firmus, erectus, 3-ped.. Folia viridia, omnium pauciora, forteque minus arete imbricata capitatave, omniumque hujus sectionis latiora, plus pollicem lata, 1½ ped., serrulis marginalibus albis, nisi sub lente inconspicuis, attactu leviore manifestioribus. Flores? Haw.. Nomine Y. Draconis Lutetiis accepit Anderson. Habitat? h.

2. **Y. aloifolia*; foliis arcte capitatis, praerigidis, rectis, loratim lineari-lanceolatis, crassis, pallide viridibus, margine serrulato-aspero. *Haw. Suppl. succ.* p. 32. *Y.* foliis crenulatis, strictis. *Linn. Spec.* p. 457. *Willd. Spec.* II. p. 184. *Desfont. arbr.* 1. 18. *Mill. Dict. n.* 2. *Cav. Descr.* p. 449. *Mich. Fl. bor. Amer.* 1. 196. *Pursh Sept. Amer.* 1. 228. *Dec. pl. grass.* t. 20. *Red. Lil.* t. 401. 402. *Bot. Mag.* t. 1700. *Y. serrulata* *Haw. Syn. succ.* p. 69. *Dill. Elth.* 435. t. 523. f. 416. *Pluk. Alm.* 19. t. 256. f. 4. *Commel. prael.* 64. t. 14. β . pendula. *Desf.*

Flores albos dicit *Pursh*; at in nulla hic depictarum tales. Apud *Redouté*: „Caudex lignosus, teres, inferne nudus, cortice atrofusco, rugoso, superne squamis imbricatis vel foliorum vestigiis tectus, 9-12-(18) ped., plerumque simplex, rarius divisus. Folia lineari-lanceolata, utrinque attenuata, aculeo terminata, rigida, margine cartilagineo denticulata, leviter canaliculata, superiora erecta, media patentia, inferiora pendula (2-3-ped., $1\frac{1}{2}$ poll. lata). Scapus e foliorum centro, ramosus, 22 poll.-2 ped., crassitie pollicis, glaber, inferne foliolis aliquot brevibus ceterum reliquis similibus. Panicula pyramidalis, magna; pedunculi communes angulosi, horizontaliter patentem, inferiores 8 circiter poll. 7-8 flori, superiores breviores. Pedicelli graciles 9-13 lin., arcuati, apice penduli. Bractee lanceolatae, acutae, foliaceae; inferiores rigidae, virides, superiores violaceae molles. Cor. tulipâ minores; lacinae aequales, ovatae, concavae, crassiusculae, quidquam divergentes, apice compressae, primum albae cum macula violacea ad basin, serius ad nervum medium violaceae. Stam. corollâ duplo breviora; filamenta alba, crassa, oblonga, compressa, tenuiter pubescentia, erecta; antherae parvae, transversales. Germen trigono-prismaticum, angulis obtusis, longitudinaliter sulcatis, longitudine staminum. Stylus 0. Stigma prismaticum, crassum, album, trigonum.“ Apud *Gawler* omnium altissima dicitur, 18 ped.. Folia angustiora, rigidiora, quam in *gloriosa*, numerosissima, terminalia, supra basin angustata, interiora erectius conniventia. Panicula subconferta, 2-3 ped., divaricata, ramulis laxis. Pedicelli in icone basi et apice purpurascetes. Bractee corollâ duplo breviores. Flores ex ochroleuco flavicantes, apice basique purpurascetes, $1\frac{1}{2}$ poll. Peractâ anthesi, quae in hac specie rarior, perit apice et e radice caudice novo assurgit. In *Jamaica*, *Vera Cruz*; *Linn.* In *Carolina*, *Florida*; *Pursh.* \dagger .

Obs. In *Decandolle pl. grass.* in descriptione folia ovato-lanceolata, dicuntur perperam, nec depinguntur talia; pedunculi dicuntur 5-6-flori; si rami hinc pedunculi, floribus pluribus, si pedicelli, tantum unico gaudent. Petala dicuntur alba, depinguntur ochroleuca. Stigmata 3 adesse. Capsula cylindrica, obtuse trigona, sulcis 3 basi dilatatis, loculis dissepimento bipartitis: semina biserialia.

3. *Y. serrulata* *Haw.*; decempedalis, simplex; foliis arcte capitatis, praerigidis, rectis, loratim lanceolato-lineariibus, viridibus, margine asperrimo. *Haw. Suppl. pl. succul.* p. 32. *Y. aloifolia* *Haw. Syn. succ.* p. 70. (se teste).

Foliis certe longe angustioribus, quam in figura antiqua *Dilleni*, quae sine dubio vera *Y. aloifolia*. *Haw.* Cum *aloifolia*. \dagger .

4. **Y. Draconis*; octopedalis, simplex; foliis laxè capi-

tatis, loratim lanceolato-linearibus, rufo-virescentibus, saepe laxe reflexis, margine aspero. *Haw. Suppl. pl. succul. p. 33. Ejusd. Syn. 2. 184.* Y. foliis crenatis, nutantibus. *Linn. Spec. 457. Willd. Spec. 2. p. 184. Mill. dict. 3. Lam. Enc. VIII. p. 825. Gaertn. Fruct. II. p. 54. t. 85. Y. Harruckeriana Crantz Dissert. d. arb. Drac. p. 29. Dill. Elth. 437. t. 324. f. 417. Commel. prael. t. 16. (?)*

Soboles subterraneae grosse tuberosae, subinde circa caudicem pullulantes. Folia terminalia, imbricatim densissime conferta in capitulum magis oblongum, quam in prioribus, exceptâ conspicuâ. Matura folia debilia varie deflectuntur. *Haw.* Saepissime 3-4 ped. Spica paniculata, erecta, floribus numerosis, albis, pedunculis inclinatis. Antherae magnae. Stigma trilobum, lobis bipartitis. Caps. subcarnosa, crassa, subhexagona. Semina numerosa, nigra, utrinque plana, subrotunda. *Poir.* In icone *Dillen*: corollae lacinae magis lanceolatae, planae, patentes et quidquam reflexae, quam in *gloriosa* et *aloifolia*. Folia longiora, angustiora, tenuiora quam in *aloifolia*, a medio vel a basi fere reflexa vel pendula, magis nitida, intensius viridia, minus concava, spinis terminalibus longioribus gracilioribus, 2 ped., poll. lata, margine serraturis tenuioribus sec. *Dillen*, fortioribus sec. *Linn.* In *Commel.* t. 16. dentes magni, spinosi, remoti: ergo vix hujus loci. *Smith Rees Cycl.* In *Carolina australiore.* †

5. *Y. crenulata* *Haw.*; foliis mediis parum recurvis, suboblique flexis, glaucescentibus, loratim lineari-lanceolatis, margine carinâque obtusâ asperis, subtus glaucis. *Haw. Suppl. pl. succul. p. 33.*

Plantae solum juvenes subpedales coram. *Habitat?* — apud *D. Loddiges.* †

6. *Y. arcuata* *Haw.*; foliis loratim lanceolato-linearibus, arcuatim fere in semicirculum recurvis, flaccidis, saturate viridibus, laevibus, 7-8 lin. latis, margine asperiusculo. *Haw. Suppl. pl. succul. p. 33.*

Plantae solum juvenes subpedales coram. *Habitat?* *H. Chelseanus.* †

7. *Y. tenuifolia* *Haw.*; foliis inferne arcte arcuatim recurvis, fere in semicirculum, loratis, lineari-acuminatis, angustissimis, rigidis, arcte concavo-canaliculatis, margine serrulatis. *H. Suppl. pl. succul. p. 34.*

Folia in nostris (forte junioribus) 4-5 lin. lata. *Haw.* *Habitat?* *E. Malta tulit D. Loddiges.* †

** *Spinosa e: foliorum marginibus spinosis.*

8. *Y. spinosa* *Humb. et Bonpl.*; arborescens; foliis linearibus margine spinis simplicibus adscendentibus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. red. Kunth. I. p. 289.*

Arbor 5 orgyar., habitu *Y. gloriosae*. Folia apice angulata, plana, coriacea, striata, margine spinoso-denticulata: spinis flavis, virescentia, glabra, nitida, 1½ ped., 4 lin. lata. Flores panicu-

lati. Calyx purpureo-aurantiacus?; laciniis oblongis acutiusculis, tribus interioribus paulo latioribus. Stamina calyce duplo breviora. Filamenta basi incrassata. Ovarium triquetrum. *Kunth. In locis temperatis Nov. Hisp. prope Actopan versus montem Mamawchota. h.*

9. *Y. acaulis Humb. et Bonpl.; subacaulis; foliis lanceolato-ensiformibus, margine spinis bifidis; laciniis reflexis. Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. red. Kunth. T. 1. p. 289. CODONOCRINUM * agavoides Reliq. Willd. Ms. (fide de Schlechtend. fil.).*

HABITUS AGAVES, NON YUCCAE. Ab AGAVE florum structurâ valde differt, nec cum *A. cubensi*, (floribus pendulis, staminibus calyce brevioribus, sed ovario infero), confundenda. Panicula adjecto pedunculo 4-5 orgyalis, ramosa, ramis alternis. Flores pedicellati, terni, penduli. Calyx pallide luteus; laciniis oblongis, obtusiusculis, 9 lin., tribus interioribus paulo latioribus. Stamina calyce duplo breviora. Filamenta subulata, basi dilatata. Ovarium superum triquetrum. Stylus triquetrum, staminibus paulo longior. Stigma trifidum. *Kunth. Copiose in locis calidis et temperatis prope Caracas et Cumana. h.*

*** *Filiferae: acaules; foliis margine omni laevi plus minus sphacelatis deorsum filamentiferis; filis varie tortilibus, plus minus validis, 1-3 uncialibus.*

10. *Y. concava Haw.; foliis subsesquipedalibus, erecto-incurvis, arcte concavis, oblongo-lanceolatis, obtusis, obsolete mucronatis, nervoso-striatis, undique asperiusculis, sordide glaucescentibus; filis marginalibus validis, albis. Haw. Suppl. pl. succul. p. 34.*

Folia seniora 4 poll. lata. *Habitat? Apud D. Vere. h.*

11. **Y. filamentosa; foliis erecto-recurvatis, lanceolato-oblongis, mucronulatis, concavo-latissime canaliculatis, filis marginalibus validissimis, 2-3 poll., tortis, fulvis. Haw. Suppl. pl. succ. p. 34. Y. fol. serrato-filiferis. Linn. Spec. 457. Willd. Spec. II. p. 184. Mill. Dict. n. 4. Lam. Enc. VIII. p. 826. Mich. Fl. bor. Am. 1. p. 196. Ait. h. Kew. ed. 2. II. p. 291. Bot. Mag. 900. Red. Lil. 277. 278. Gart. Mag. 1811. p. 218. t. 22. Trew Ehret. t. 37. Moris. Hist. 2. p. 419. sect. 4. t. 23. f. 2. β fol. elegantissime flavo albidove ad margines variegatis striolatisve.*

Ab *Y. concava* differt: foliis minus rigidis, longe minus concavis, angustioribus. *Haw.* Rad. perpendicularis, fibris fuscis longissimis, crassitie calami scriptorii. Folia omnia radicalia, 20 poll. circiter, lineari-lanceolata, rigida, patentia, quidquam canaliculata, glabra, (glaucescentia), scabriuscula, spinoso-acuta; margine filis capillaribus, albis, remotis. Scapus 6-9 ped., erectus, teres, crassitie pollicis, basi foliolis aliquot brevibus (fusces-

*) Genus CODONOCRINUM apud Willdenow Reliqu. Ms. „Cor. 6-petala, campanulata. Stam. basi dilatata. Stylus staminibus longior.“

centibus) linguiformibus, subobliquis, acumine parvo. Panicula pyramidalis $\frac{2}{3}$ scapi longa; racemi numerosi, in pedunculis 8-11 poll. subhorizontalibus, basi bracteis ovato-lanceolatis, 15-20 flori. Pedicelli brevissimi. Flores penduli, albidi, formâ magnitudineque Tulipae. Cor. ad basin usque fissa; lacinae patentes; exteriores lanceolatae, acutae, apice compressae callosaeque, albidae, dorso medioque pallide flavescenti-virides; interiores similes, sed ovatae, concavae, acutiusculae. Filamenta aequalia, crassa, compressa, pube albidâ, inferne stylo approximata, superne ab eodem paulo distantia, corollâ duplo breviora. Antherae ovato-oblongae, flavae, parvae, subhorizontales. Germen prismaticum, faciebus 6, sulcatis, superne paulo dilatatum. Stylus crassissimus, trigonus, sulcis 3, stamina paulo superans. Stigmata 3, oblonga, recurva, intus canaliculata. *Redout.* In *Carolina et Virginia ad littora et in interioribus.* h.

12. *Y. flaccida Haw.*; foliis omnibus valde flaccidis, tenuibus, infra medium debiliter recurvo-dependentibus, loratim longo-lanceolatis, planis, apice concavis, mucronulatis, undique asperiusculis; filis marginalibus validissimis, fulvicanibus. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 34.*

Differt a praecedentibus (*concava et filamentosa*) foliis omnino flaccidis, debilibus, planioribus, mollioribus, tactu solo facillima distinctu. *Haw. Sprengel S. V. II. p. 41, cum? licet, junxit cum concava.* Habitat — apud *D. Vere.* h.

13. *Y. recurva Salisb.*; foliis recurvo-deflexis, margine rare filamentosis; petalis interioribus parum latioribus. *Salisb. parad. lond. 31. c. ic. pulcher. Haw. Syn. p. 69. Suppl. pl. succ. p. 35. Y. recurvifolia Pursh. Fl. sept. Amer. I. p. 228. Nutt. gen. 1. p. 218. Trans. Hort. Soc.: Salisbury. I. p. 334.*

Caudex in hortis 1-3-ped. Folia lineari-lanceolata, integerrima, praerigida, viridia, margine demum rare filamentifera, superne laevia, apice spinosa. *Salisb. l. c. Y. gloriosae* „(quâcum commutata)“ valde affinis, at forte affinior *Y. rufocinctae. Haw.* Flores viridi-flavi, subpurpurascens: *Pursh*; odoris fortis, citri quasi mixti. Stigma ut in *Y. gloriosa. Salisb.* In *Georgiae oris arenosis.* h.

14. *Y. puberula Haw.*; pubescens, filamentosa, acaulis; foliis lorato-lanceolatis, patentibus, glaucis; fibris marginalibus pauculis, fulvis; ramulis florigeris dense puberulis. *Haw. Phil. Mag. et Ann. of Phil. N. 15. Mart. 1828. p. 186.*

Folia inflexo-concavula, deorsum ad costam magis magisque incrassata. Scapus affinium, 4-ped., ramosus, corymbosus, inferne magis bracteolatus; floribus laevibus ovato-globulosis, pendulis, lacteis. Petala lanceolata, interiora longiora, fere duplo, etiam latiora. *Haw. l. c.* Forte in *America septentrionali.* h.

15. *Y. glaucescens Haw.*; foliis loratim lineari-lanceolatis, unciâ angustioribus, glaucis; filamentis marginalibus subrarioribus, tenuioribus, albis. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 35. Revis. p. 34. Y. angustifolia Hort. Angl.*

A praecedentibus differt primo intuitu: foliis quadruplo angustioribus vel ultra. Plantae senectae parum caulescentes, soboles subterraneae, strumoso-tuberosae. *Haw.*. Panicula magna. Flores magni, tulipiformes, albi, petalis exterioribus extus costâ late subochraceâ. Stigmata dimidiâ longitudine staminum confluentia. *Haw. Sprengel*, cum? tamen, hanc cum sequente *angustifolia* junxit. *In America septentrion.* †.

16. *Y. angustifolia Pursh.*; foliis erectis, rigidis, angustissime ensiformibus, bipedalibus, semiunciam latis, glaucis, late sphacelatim albo-marginatis; filamentis marginalibus rarioribus, tenuissimis, albis, superne sive apicem versus nullis. *Haw. Suppl. pl. succul. p. 35. Revis. p. 34.* *Y. fol. angustissimis, rigidis, margine raro filiferis; capsulis magnis, obovatis, cylindricis. Pursh amer. sept. I. p. 227. Nutt. gen. 1. p. 218. Link Enum. 1. p. 333. Bot. Mag. 2236.*

Acaulis, scapo simplici. Folia multo magis recurva „(erecta petit *Haworth*)“ mucronata, filaque ad marginem longiora; lacinae corollae acutiores, et tota humilior *strictâ*. *Bot. Mag.*. Panicula ampla, densa, cum planta subacauli fere orgyalis: ramo principe longo, producto. Flores conferte approximati, vix aperti, viridi-pallescentes: petalis exterioribus sordide rufescentibus, longe angustioribus, elliptico-lanceolatis: interioribus ovato-orbicularibus cochleariformibus. Stigmata robustissima, viridia, confluentia. *Haw.*. Flores albi, magni. *Nutt.*. Folia 6 lin. lata. *Link. Ad littora Missouri.* †.

Obs. Y. filamentosae nimis affinis et hujus fors mera varietas. *Schrader in litt.*

17. *Y. stricta Sims*; acaulis; foliis lanceolato-linearibus, strictissimis, apice elongatis; scapo basi ramoso; ramis simplicibus; corollis orbiculato-campanulatis. *Sims. Bot. Mag. n. 2222.*

Folia longa, margine rare filamentosa. Scapus 4-5-pedalis. Corollae magis, quam in reliquis, globosae. Affinis *angustifoliae*, sed multo major. *Sims.* Flores virentes, pallide purpurâ suffusi. *In Carolina. Lyon.* †.

**** *Integerrimae*: foliis margine integerrimo, laevi; caudice saepe 1-10 pedali, valido, recto:

18. *Y. superba Haw.*; foliis loratim lanceolatis, amplis, 2-3 uncias latis, subplicatis, parum mucronatis; floribus confertissimis, oblongo-campanulatis, inapertis apice assurgenter rostratim curvatis; caudice 10-pedali. *Haw. Suppl. pl. succul. p. 36. Y. gloriosa. Bot. Repos. t. 473.* (fide *Haworth*, qui male se ipsum hanc iconem laudasse in *Synops. p. 69.* fatetur. Monente vero *Bot. Mag. 1260. Y. gloriosa B. Repos. aloifolia* est.)

Folia triplo latiora, quam in *aloifolia*, mucronibus debilioribus, minus pungentibus. Magis affinis *gloriosae*, a qua formâ corollae et caule arborescente diversa. *Haw.*. Cum *gloriosa* conjunxit *Sprengel & V. II. p. 41.* et *Reichenbach* in *Moess. Handb. p. 572.* *Habitat?*

19. **Y. gloriosa*; foliis erectis, bipedalibus, loratim lanceo-

ceolatis, rigidis, crassis, 3 uncias latis, subplicatis, caerulescenti-viridibus, margine pallido, subtus superne asperiusculis; corollis ovato-campanulatis; caudice florifero subtripedali. *Haw. Suppl. pl. succul. p. 37.* Y. fol. integerrimis. *Linn. Spec. 456.* *Willd. Spec. 2. p. 183.* *Mill. Dict. n. 1.* *Lam. Enc. VIII. p. 824.* *Batsch b. B. p. 49.* *Desfont. Arb. et Arbriss. 1. p. 18.* *Walt. Fl. carol. p. 124.* *Mich. Fl. bor. Amer. 1. p. 196.* *Pursh Fl. sept. Amer. p. 228.* *Réd. Lil. t. 326. 327.* *Lenz in Gart. Mag. 1810. p. 3. t. 1.* *Bot. Mag. 1260.* *Kniph. Cent. I. 100.* *Barr. rar. 70. t. 1194.* *Park. Parad. t. 455. f. 1.* *De Bry Florileg. renov. t. 142.*

Caudex lignosus $1\frac{1}{2}$ -3 ped., $1\frac{1}{2}$ poll. et ultra in diametro, basi semper simplex, apice subinde ramosus; superne squamis rigidis albidis e foliorum basibus persistentibus. Folia numerosa, lineari-lanceolata, basi quidquam angustata, acuta, rigida, apice (valide) spinosa, 11-15 poll. (et ultra), 15-18 lin. lata, (subtus pallidiora). Scapus e foliorum centro, 3 ped., teres, quidquam flexuosus, ramosus, inferne viridis, superne rufescens, bracteis vel foliolis lanceolatis acutis cito marcescentibus. Panicula pyramidalis; rami rufescentes, horizontaliter patentés, 5-8-flori; pedicelli arcuati, basi bracteis magnis lanceolatis. Cor. pendula, (flavescenti) albida, formâ Tulipae, campanulata, ad basin usque divisa; lacinae ovatae, concavae, acutae, exteriores dorso rubescentes, interiores albidae. Filamenta alba, crassa, superne paulo compressa, albida, pilosa, ultra medium circa germen stylumque erecta, apice paulo divergentia. Antherae subrotundae, flavae, minimae. Germen viride, oblongum, prismaticum, obtuse trigonum, sulcis 3 parum profundis. Stigmata 3 oblonga, albida, canaliculata, basi connata et stylum brevem, crassum, formantia. *Red.* Folia longe acuminata, margine integerrima. Cor. lacinae interiores duplo ferè latiores. Differt *aloifolia* (quacum commutata) truncis 6-10 ped., in *gloriosa* $1\frac{1}{2}$ -2 ped.; foliis in illa cartilagineo-crenulatis, in hac integerrimis; in illa panicula magis contracta, flores in racemulis magis conferti, corolla major, longior, laciniis magis acuminatis, extus purpurascens; in hac basi et apice tantum rubellis; in illa racemuli magis laxi, penduli. Inflorescentia in hac fere 3 ped., caudex saepe ad basin usque foliosus, subinde ad pedes 2 supra radicem nudus. Flores inodori. *Gawl.* In Canada, Peru: *Linn.*; Carolina, Virginia. *h.*

20. *Y. rufocincta Haw.*; subcaulis; foliis erecto-effusis, sesquipedalibus, lanceolato-linearibus, subflaccidis, 2 uncias latis, subglauciscenti-viridibus, undique laevibus, margine rubro, tenui, integerrimo. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 37. Revis. p. 34.*

In plantis in viridariis folia subinde, solumque subinde, debiliter varie subrecurvata. Panicula magna, densa, pallescens; flores ut in affinibus. *Haw.* Habitat? In H. Chelseano. *h.*

21. *Y. obliqua Haw.*; foliis loratim lanceolato-linearibus, oblique flexis, glaucis; caudice 3-4-pedali, subramoso;

sobole subterraneâ strumoso-tuberosâ. *Haw. Suppl. pl. succ. p. 37. Syn. succ. p. 69.*

β . caudice simplici; foliis latioribus, minus vel non oblique flexis. Forte propria species. *Habitat?* — β in *H. Kensington* apud *D. Malcolm*. \dagger .

22. *Y. glauca* *Nois.*; acaulis; foliis lanceolatis, flaccidis, glaucis, integerrimis; laciniis corollae ovatis, patentissimis. *Bot. Mag. 2662. Noisette Jard. fruit.?*

Folia minus rigida quam in aliis. Scapus 4. 5 ped., ramis lateralibus circiter 20: singulis 10-16-floris; spicâ terminali sub 30-florâ. Flores solitarii geminive, rarius terni. Corolla minus globosa quam in plerisque ceteris; lacinae valde patentes. *Bot. Mag.* In *Carolina. Lions.* \dagger .

Quid *Y. horrida* *Humb. et Bonpl.* apud *Steudel*?

1419. A G A V E.

a. *Foliis glaucis.*

u. acaules.

1. **A. americana*; foliis dentato-spinosis; scapo ramoso; tubo corollae medio angustato; staminibus corollâ longioribus, stylo brevioribus. *Willd. Spec. II. p. 192. Linn. Spec. p. 461. Amoen. acad. 3. p. 22. Mill. Dict. n. 1. Haworth Syn. p. 70. Ruiz et Pav. Fl. peruv. 3. p. 66. Humb. Mex. 11. p. 418. Humb. et Bonpl. nov. gen. 1. p. 258. Desfont. Fl. atl. 1. p. 310. Broter. Fl. lusit. p. 550. Lam. et Dec. Fl. fr. III. p. 255. Tenore Fl. neap. 1. p. 188. n. 211. Mauri rom. plant. Cent. 13. p. 18. Andrew's Repos. 438. Trattinn. Tabular. t. 245. A. ramosa Mönch meth. p. 642. Hall. helv. n. 1249. Bauh. pin. 286. H. Eyst. Ant. IV. p. 3. f. 1. β . *A. americana muricata*; fol. margine luteo vel albo. *Risl. H. Carlsr. p. 3. Haw. l. c. A. variegata Hortul.* Conf. *Schulze über die grosse americanische Aloë. 8. Hamb. 1782. Vogel über d. grosse american. Agave. 8. Nürnberg. 1800. Hübner Beschr. u. Abbild. d. amer. Agave. Augsb. 1815. Hawkins Trans. Horticult. Soc. IV. p. 389. Mém. Mus. T. XV.**

In planta peruviana apud *Ruiz et Pav.*: „proles plurimae. Radix caudice crassissimo, foliorum basibus squamato, fibrosissima: fibris fasciculatis, flexuosis, longissimis, crassitie calami scriptorii, epidermide exteriori fusca, interiori subviolaceâ; parenchymate albo; sapore viscido, haud ingrato. Scapus erectus, teres, 4-6-org., crassus, squamis alternis sublanceolatis, semiamplexicaulibus; inferioribus longioribus approximatis, superioribus remotioribus sensim minoribus, scapo appressis. Folia radicalia, sibi invicem incumbentia, lanceolata, canaliculata, laevia, margine dentato-spinosa, glauca, extus colore viridi-glaucio variegato insculpta, mucronata, rigida, crassa, 6-ped. et ultra, succosa; exteriora reflexa, intermedia patentia; interiora in conum acutissimum rectum obvoluta. Spina foliorum terminalis poll. et ultra, recta, subulata,

castanea; spinae marginales incurvae, ejusdem coloris, 3 lin. Panicula maxima, nutans, composita. Pedunculi recurvato-inflexi, decompositi, multiflori. Flores pedicellati, bracteis sublan- ceolatis. Cor. luteo-viridis, tubuloso-infundibuliformis; tubus obsolete hexagonus. Limbi lacinae oblongae, obtusae, conca- vae, erectae, repandae. Filam. subulata, leviter compressa, corollâ multo longiora, apice curvata, basi incrassata. Antherae lineares, utrinque sulcatae, versatiles, poll., lin. latae, luteae. Germen turbinatum, hexagonum; angulis alternis prominentiori- bus, parum curvatum. Stylus filiformis, obtuse angulatus, pri- mum longitudine corollae, postea staminibus longior. Stigma capitatum, trigonum, per angulos trifidum, incisuris pubescenti- bus. Caps. turbinata, obtuse trigona, trisulca. Sem. suborbi- culata, plana, fusca.“ — „Scapus in Lusitania basi crassitie cru- ris perit plerumque altero post anthesin anno una cum foliis, plantâ sobole laterali propagatâ. In Algarbiis nunc ad sepes aliam *Agaves* speciem colere inceperunt: foliis saturate viridibus, minus crassis; florentem nondum vidi: an *A. vivipara* L.? An *mexicana* Lam.?“ *Brotero l. c.* In tota *America me- ridionali a planitie ad alt. 1600 hexap.*; in ins. *Mauritii*; nunc indigenatum nata in littoribus italicis praecipue ad *Clavarum* in *Liguria*: *Bertol.* in litt.; in *Gall. merid.*; circa *Bol- zanum*: de *Giovanelli*. *Cortusum* ferunt hanc plantam pri- mum in Europa coluisse. 4.

2. *A. mexicana* Lam.?; foliis erecto-patulis, lanceola- tis, glaucescentibus; spinulis marginalibus parvis, subdistan- tibus, pallidis, superne atropurpurascens. *Haw. Suppl. succ. p. 41.* *Lam. Enc. 1. p. 52?* (excl. β) quo teste: *Mor- ris. Hist. p. 417.*, et *Maguei v. Metl Mexic.*. *A. Man- gnai Desf. tabl. de l'Ecole ed. 2. p. 53?* *A. bulbifera Bonpl.?*

Haworth nullam hujus speciei adumbrationem adjecit, nec lauda- vit *mexicanam* Lam., in qua ex descriptione in *Enc. l. c.*: „folia magna, ut in *A. americana* disposita iisque similia, sed minus crassa, 3-4-ped., 5 poll. lata; spinae minores, minus validae; scapus 15-ped., superne paniculatus; flores numerosi, flaves- centi-vel albide virides, odore nauseoso. Flores ad basin fere usque fissi in lacinias ovaes, planas, stellatas, petaliformes. Pa- nicula laxior, magis effusa, quam in *americana*, et, secundum *Jacquin*, prolifera.“ An ergo *A. mexicana* Lam. eadem, ac illa *Haw.*? *Metl et Maguey* etiam *americana* apud *Ruiz et Pav.* et *Humb.* et *Bonpl.* dicitur. In *Mexico*. h.

3. *A. Milleri* Haw.; foliis dentato-spinosis; scapo sim- plicissimo. *Haw. Syn. succ. p. 71.* *A. virginica* Mill. *Dict. ed. 8. n. 2.* nec alior.

A. americanae valde affinis, sed folia apice angustiora, pallidiora. Scapus brevior. Flores in apice scapi congesti, formâ coloreque *A. americanae*. Proles pauciores. *Mill.* Conf. *A. spicatum*. *Habitat?* In *Virginia?* 4.

4. *A. flaccida* Haw.; foliis anguste lanceolatis, flaccido- recurvis; spinis marginalibus minutis. *Haw. Syn. Succ. p. 72.* *Habitat?* 4.

5. *A. brachystachys* Cav.; foliis radicalibus imbricatis, ensiformi-canaliculatis, integerrimis, glabris; caule erecto; spicâ brevi, densâ, terminali. *Cavan. Descr. p. 455. H. Reg. Matr cum ic. edend. A. spicata*; fol. rigidis, tenuibus, canaliculatis, angustis, acutis, integerrimis; scapo simplicissimo; floris laciniis revolutis, tubo cylindræo brevioribus; staminibus longe exsertis. *Decand. Cat. H. Monsp. 1815. p. 76. Hort. monsp. ined. t. 98. Réd. Lil. t. 485.*

Folia radicalia plus minusve arcuatim reflexa, 2-ped., basi 2 poll. lata; caulina alterna, sensim minora et in squamas marcescentes transeuntia. Scapus 6-ped., teres, glaber, basi crassitie digiti. Spica $\frac{1}{2}$ ped.. Flores sessiles, subimbricati. Corolla $1\frac{1}{2}$ poll.; tubus brevis, quidquam curvatus, fauce compressâ; laciniæ extus glaucescenti-virides, intus flavæ, mox post expansionem arcuatim reflexæ, post fecundationem iterum erectæ. Filamenta subulata, corollâ duplo longiora, purpureo-maculata. Antheræ lineares, sulcis 4. Stylus subulatus, sulcis 3 longitudinalibus, staminibus brevior, sub fecundatione incurvus, dein erectus, elongatus staminaque superans. Stigma capitatum, triangulare. Germen adhaerens, oblongum, fere teres. Capsula ovata, basi angustata, corollâ coronata, poll.. Semina in loculis biserialia, nigra, compressa. *Cav.* Scapus fere cubitalis, teres. Racemus spiciformis, brevis. Flores subsessiles, erecti, congesti. Perigonium virescens, apice sordide flavescens. Filamenta purpurascens. Antheræ lineares, atropurpureæ. *Decand.*, qui apud *Redouté l. c.* ait differre *spicatam* suam (i. e. *brachystachyn*) a *yuccaefolia* foliis integerrimis nec serrato-dentatis; scapo breviori; bracteis sterilibus paucis; spicâ densiore magis ovatâ; antheris purpureo-fuscis nec flavis. Radices, apud *Redouté*, fasciculatæ, duræ, teretes. Folia erecta, tenuia, rigida, acuta, pedalia et ultra, 8-9 lin. lata, intense glaucescenti-viridia. Scapus centralis, erectus, solitarius, simplicissimus, 3 ped., basi foliolis aliquot semiamplexicaulibus. Spica 15-20-flora, rhachi ad pedicellos tuberculosâ. Bracteæ acutæ membranaceæ. Corollæ tubus cylindricus, 6-sulcus, 8-9 lin., limbo parum longior: laciniæ lineares, obtusæ, revolutæ. Filamenta basi tubo adnata, 12-15 lin.. Antheræ 7-8 lin., intense purpureo-fuscae, polline flavo. Germen ovato-oblongum, adhaerens, ovulis biserialiter angulo interno affixis. Stylus longitudine staminum. Stigma obsolete trilobum. *In Mexico. 4.*

6. *A. spicata* Cav.; foliis lanceolatis, canaliculatis, margine membranoso-denticulato; spicâ longissimâ. *Cavan. Descr. p. 454. Hort. reg. madr. ic. ined. Annal. d. Cienc. nat. T. III. No. 15. p. 256.*

Folia divergentia, lanceolata, acuta, marginibus membranaceis tenuiter dentata, $2\frac{1}{2}$ ped., basi (ubi latissima) 3 poll. fere lata, 4 lin. crassa. Scapus 15 ped., $1\frac{1}{2}$ poll. in diametro; foliis alternis, appressis, radicalibus brevioribus, sensim minoribus; superioribus in squamas acutas transeuntibus, caducis; scapus, uti tota planta, pallide viridis, teres, glaber, rore cinerascens. Bracteæ lanceolato-subulatae, basi tuberculo. Spica 6-ped.. Pedicelli perpendiculares, fere poll., subcylindrici vel subcompressi, scapo appressi, 2-3 flori. Flores basi bracteis 2 ovatis,

acutis, 2 lin., marcescentibus. Corolla pedicello quidquam major, extus virescens, intus virescenti-flava; tubus brevis, ad germen quidquam angustatus, nectare claro repletus; limbus profunde 6-partitus; laciniis linearibus, obtusis, apice fasciculo pilorum alborum, illico post expansionem revolutis, spiraliter contortis, marcescentibus, dein iterum erectis filamenta amplectentibus. Filamenta fauci tubi inserta, laciniis opposita iisque duplo longiora, subulata, recto-divergentia, purpureo-punctata. Antherae lineares, flavescenti-virides, loculis 2 longitudinaliter dehiscentibus. Stylus triqueter, incurvus, staminibus brevior, post fecundationem erectus, elongatus. Stigma triquetrum. Germen viride, oblongum, quidquam curvatum, obtuse angulosum, longitudine pedicelli. Capsula, ut videtur, qualis in *A. americana*. *Cav.* In *Havana*? 4.

7. *A. yuccaefolia* *Réd.*; foliis linearibus; floribus spicatis; corollis revolutis. *Rédout. Lil. t. 328. 329.* *A. foliolorato-attenuatis, erecto-recurvatis, glaucis, supra canaliculato-concavis: serrulis marginalibus minutissimis, albis, densis. Haw. Suppl. succ. p. 41. Willd. Enum. Suppl. p. 19. Link Enum. 1. p. 334.*

Rhizoma fuscum brevissimum, sub terra divisum in fibras longas teretes, ramosas, crassitie digiti minimi. Folia numerosa, linearia, angusta, basi carnosula, glauca, rigidula, margine cartilaginea, tenuiter et irregulariter denticulata, 22-30 poll., basi 1-1½ poll. lata, apicem versus sensim in acumen angustata. Scapus e foliorum centro erectus, gracilis, altissimus, 11½ ped., viridis, glaber, basi foliolis aliquot radicalibus similibus, sed multo minoribus, membranaceis, lineari-lanceolatis, sparsis; basi vix 9 lin. in diametro. Racemus densus, 7½-11 poll., circiter 50 florus; rhachi profunde sulcata. Flores primum glauci, dein flavescenti-virides, sessiles, solitarii geminique, basi bracteis minimis lanceolatis, acutis, membranaceis, albidis, medio fuscis. Cor. basi tubulosa, apice subinfundibuliformis, ad medium usque divisa; lacinae ovato-oblongae, flavescenti-virides, dorso sulcis 3 profundis longitudinalibus, apice acutiusculo reflexae. Stamina basi laciniarum inserta; filamenta rubro-fusca, erecta, filiformia, aequalia, 20 lin.. Antherae magnae lineares, flavescenti-virides. Germen ovato-oblongum, laeve, glaucum, ½ poll.. Stylus filiformis, erectus, primum staminibus brevior, serius longior. Stigma trigono-capitatum. Flores foetidi. *Red.* *Haworth*, qui „parvam tantum plantam se vidisse“ affirmat, „folia omnium angustiora“ dicit. *Link l. c.* hanc nomine *A. brachystachyae* et *spicatae* e *H. matrit.* accepisse asserit; et sane *spicatae* proxima; differt tamen ex descriptione foliis angustioribus; floribus sessilibus; laciniis ovato-oblongis. *Clo Ker* in *Recens. Liliac. Journ. of sc. II. p. 183.* *A. virginica* in specimine elegantiore videtur. *Habitat?* 4.

8. * *A. virginica*; acaulis herbacea; foliis cartilagineo-serratis; scapo simplicissimo. *Willd. Spec. II. p. 155. Linn. Spec. p. 461. Jacq. Coll. II. p. 261. Ic. rar. II. t. 378. Mich. Fl. Am. bor. 1. p. 187. Haw. Syn. p. 74. Pursh Sept. Am. p. 226. Elliott Sk. I. p. 402. Torrey Fl. N. M. U. St. p. 346. Lam. Enc. ill. t. 255. f. 2. Bot. Mag. 1157.*

Rhizoma fusiforme, praemorsum, unciae in diametro, carnosum, extus fuscescens, intus album, fibris fusiformibus crassitie calami. Folia radicalia plurima, crassa, coriacea, 3-8 unc., avenia, 1-2 unc. lata, minutissime cartilagineo-dentato-spinosa, cartilagineo-mucronata, pallide virentia, subinde maculis rotundatis, atrosanguineis. Scapus centralis 4-5 (6) ped., erectus, viridis, rore glauco, teres; foliis vel spathis acuminatis, inferioribus amplexantibus et concavis, superioribus sessilibus, ad flores brevissimis. Racemus simplex, e floribus circiter 40, 1 $\frac{1}{2}$ ped., terminalis. Flores subsessiles, parum incurvi, virides, (flavi Ell.), sexunciales, suaveolentes. Cor. tubus teres, 6-sulcatus; lacinae longe lanceolatae, obtusulae, concavae, erectiusculae, alternae profundius sectae. Filamenta ex superiori parte tubi, subulata, erecta, corollam $\frac{1}{3}$ longiora, viridia punctis ferrugineis. Antherae lineares, fusciscentes, effetae albae, magnae. Germen oblongum, obsolete trigonum. Stylus filiformis, crassus, obsolete trisulcatus, staminibus paulo brevior, viridis, ferrugineo-punctatus. Stigma albidum, trifidum, capitatum, patens. *Jacq.*. Folia divergentia, lanceolata, rigida, dilute viridia, margine alba. Spica pedunculo subflexuoso. Flores distantes, sparsi, erecti; bracteis scariosis, convoluto-acuminatis. Cor. cyathiformi-tubulosa, obtuse 6-gona, angulis alternis latioribus; limbus erectus, divergens, tubo paulo brevior, flavus; lacinae oblongae, attenuatae, subsphacelatae. *Gawl.*. Caps. globosa, obsolete trisulcata, 3-locul., 3-valv.. Sem. numerosa, compressa, biserialia. *Elliott.*. Conf. *spicatam et yuccaefoliam.* In Virginia et Carolina ad ripas fluviorum in saxosis. γ .

β . caulescentes.

9. *A. lurida* H. Kew.; subcaulescens; foliis glaucis, dentato-spinosis; caule paniculato; racemulis laxe fasciculatis; corollam horizontali, limbo turbinato patulo; laciniis ovato-lanceolatis; germine cylindrico, corollae tubum aequante, prope basin constrictiore; staminibus styloque dimidio et ultra corollam superantibus; stigmatibus capitato-trilobo, antheras superante. *Gawl. in Bot. Mag.* t. 1522. quo teste: *H. Kew. ed.* 1. 472. *ed.* 2. II. 502. *Willd. Spec.* II. 193. (excl. in utroque, monente *Gawl. syn. Jacqu.*) (*Poir. Enc. Suppl.* 1. p. 241. ex syn. *H. Kew.*) *Mart. Mill. Dict.* n. 4. *A. Vera Cruz. Mill. ed.* 8. n. 7. (*A. Vera Crucis*, foliis oblongis, marginibus spinosissimis nigricantibus. *Haw. Succ.* p. 72.) *A. Amer. e V. Cruz fol. latior. glaucis. Hort. Beaum.* p. 4. *A. americ. sobolifera. Herm. lugdb.* 16. t. 17? (*a Willdenow*, ut nobis videtur rectius ad *viriparum* laudata). β . fol. angustioribus. *H. Kew.*, *Willd.*, *Bot. Mag.* (excl. syn. *Milleri*, monente *Haw. Succ.* p. 74.)

In icone ad specimen in *H. Kew.* florens (descriptionem nullam dedit *Gawler*) pedunculus horizontalis, in pedicellos 5 corymbose divisus, pollicares, crassitie pennae anatis. Bractee ovato-lanceolatae, acuminatae, viridi-flavescentes, ad pedunculum pedicellosque, iisdem breviores. Corolla, cum partibus fructificationis, pallide viridis. Tubus fere 2 poll., 5 lin. circiter diame-

tro. Limbus $1\frac{3}{4}$ poll., infundibuliformis, laciniis oblongo-lanceolatis, alternis parum latioribus, obtusiusculis. Antherae virides. — „Scapus florens biorgyialis.“ *Gawl.* In *Vera Cruz*. 4.

Obs. 1. *Gawler* observat: „in diagnosi plantae hujus data in 2. ed. *Hort. Kew.* To: „stylo filamentis brevioribus“ priori additum fuisse ex eo, quod *Jacquin* idem de sua planta dixisset, quam *Vera Cruz Aloë* in hortis nominari monet, et inde forte *luridae H. Kew.* subscripsit. Attamen nec icon, nec descriptio a divo *Jacquin* data cum *lurida H. Kew.* convenit; *americanae* propiorem plantam sistens.

Obs. 2. Cum *A. lurida Jacq.*, monente *Gawler* diversa sit a *lurida H. Kew.*, et forte ad unam alteramve specierum subsequentium praecedentiumve, hucusque, ob raram nobiscum earundem florescentiam, nondum satis bene descriptarum, spectet, subjungimus descriptionem a divo *Jacquin* datam: si a reliquis diversa, *Jacquini* dicenda foret. „Truncus pedalis, a foliorum reliquiis inaequalis. Folia „(eheu!)“ notissima. Spadix e centro foliorum, erectus, 12-ped., teres, crassitie brachii, glaber, e glauco virens; spathis vagis emarcidis ovato-acutis distantibus, superne paniculatus; ramis inferioribus 2 ped., superioribus sensim brevioribus, omnino numerosis, patentissimis, subancipiti-depressis. Flores numerosi, fasciculati, omnes erecti, nauseose foetidissimi. Cor. virens, ad $\frac{1}{3}$ sexfida, coriacea; tubo 6-sulcato; limbi laciniis anguste oblongis, canaliculatis, obtusis, apice fornicatis, erectis. Filamenta subulata, erecta, tubo inserta, corollâ duplo longiora, patula, flavescenti-viridia. Antherae lineares, longae, versatiles. Germen oblongum, obsolete trigonum, corollâ brevius. Stylus filiformis, crassus, erectus, subtrigonus, corollâ paulo longior. Stigma subcapitatum, obtusum, subtrigonum. Caps. obverse ovata, obtusa, 3-sulcata, tubo corollae persistente staminibusque coronata, nigra, glabra. Sem. numerosa, plana, atra. Hujus loci videtur: *A. lurida Targ. Tozz. obs. bot.*, quae: „subcaulescens; fol. denticulato-spinosis; scapo paniculato, prolifero; genitalibus corollâ longioribus; capsulâ obovatâ, tubo corollae coronatâ;“ et cujus „floris odor sub fecundatione nauseosus Brassicae similis corruptae, inaperti nullus.“? *Bertoloni* in *Virid. Bon. Veget.* 1824. p. 3. corollam pallidam, nectare diaphano tenaci repletam, stylum passim staminibus brevioribus, sed in nonnullis floribus stamina aequantem et paniculam capsuliferam longe post nuptias etiam viviparam adnotat. An ergo hujus loci?

10. *A. angustifolia Haw.*; caulescens; foliis anguste lanceolatis, dentato-serratis. *Haw. Syn. succ.* p. 72. *Revis.* p. 35. *Link Enum.* 1. p. 334. In *Insula Helenae*. h .

b. foliis virescentibus vel viridibus.

11. *A. Keratto Mill.*; foliis erectis, laete virentibus, marginibus fuscis, minime serratis. *Mill. Dict.* ed. 8. n. 6. *Haw. Syn. succ.* p. 75. (non *A. americana* β *H. Kew.* ed. 2. II. p. 301.)

Folia $2\frac{1}{2}$ -3 ped., 3 poll. lata, intense viridia, aculeo nigro terminata, margine fusciscenti rubro serrulata, erectiora quam in reliquis. Nondum floruit. *Miller*, qui eam nomine *Keratto* ex *St. Christoph Americae*. h .

12. * *A. vivipara*; acaulis; foliis dentatis; scapo ramoso, tubo corollae medio angustato; staminibus corollam aequantibus. *Willd. Spec.* II. p. 193. *Lam. Enc.* I. p. 53. *Haw. Syn.* p. 75. *Linn. Spec.* p. 461. *Mant.* p. 368. *Mill. Dict.* n. 5. *Bertol. Virid. Bonon. veget.* 1824. p. 3. et hoc teste: *A. Theometel Zuccagni* in *Röm. Collect.* p. 158. *Commel. prael.* 65. t. 15. *Rumph Amb.* V. p. 273. t. 94; et qui conferre jubet *Herm. Lugd.* 16. t. 57. 17. (in *Linn. Mant.* laudatum).

„*Hermanni* synonymon pertinet ad aliam, forte non determinatam speciem; *Rumphii* dubium videtur.“ *Willd.* Folia 3-4 ped., quidquam molliuscula, spinis brevibus, supra concaviuscula, apice saepe recurva. Scapus 10-12 ped., superne ramosus, in paniculam elongatam effusus. Flores parvi, virentes, antheris vix exsertis. Bulbifera bulbisque deciduis prolifera. *Lam.* Scapus in olla vix humanae altitudinis. Flores lutei gemmis viviparis intermixti. *Bertol.* In *A. Theometel*, ad quam *A. americana* fol. parum dentatis *Theometel* s. *Manguei* divinum. *Morris. Hist.* p. 418. *A. americana* minor *Munt. Phytogr. cur.* p. 20. f. 93. *Raj. Hist.* t. 2. p. 4198. a *Zuccagni* laudatur, et quae haud ita bene cum descriptione a *Lamarck* data congruit: Caudex vix 3-poll., teres, erectus, simplex; planta ante florescentiam perfecte acaulis. Folia radicalia, sub florescentia in apice caudicis in orbem disposita, exteriora lato-lanceolata, crassissima, margine inflexa et undique spinosa, mucrone valido, extrinsecus quidquam canaliculata, intus plana vel concava, pallide viridia, nec viridi-glaucoscentia, 1½ ped., 4 poll. lata; spinis brevibus, distantibus, fuscis, triangularibus, apice retrorsum uncinato; interiora suberecta, integerrima, margine cartilagineo nonnihil spinuloso, apice rubicundo. Scapus basi teres, sub ramis angulosus, erectus, lacte viridis, nitidus, spathis squamiformibus, 5 ped. et ultra, basi 7 poll. in circumferentia, supra medium in paniculam contractam divisus. Squamae alternae, ensiformes, amplectentes, apice aculeato, mox emarcidae; ex earum sinu primum prodeunt bulbillorum acervi sessiles, floribus abortivis quandoque mixti, qui sensim pedunculati fiunt. Rami alterni, breves, rigidi, ancipites, obliqui, ramulosi, scapo concolores; ramuli brevissimi, 2 brachiati, 5 ex apice ramuli. Flores 3-5 ex quovis ramuli apice, pluribus abortivis mixti, brevissime pedunculati, sublutei, inodori, 3 poll., 13 lin. lati. Pedunculi teretes, erecti, vix 3 lin.. Bracteae triangulares, carinatae, ferrugineae, 1 sub quovis pedunculo. Cor. lacinae oblongae, apice calloso-pubescentes, aequales; 5 interiores basi angustiores, dorso carinatae; exteriores fere planae, basi utrinque gibbosae. Filamenta corollae duplo longiora, compressa, subulata, adscendentia. Antherae oblongae, tetragonae. Germen oblongum, obsolete triquetrum, glabrum, pallide virescens, corollae longius. Stylus obtuse trigonus, erectus, staminibus brevior. Stigma obsolete trigonum, plerumque cochleariforme, pubescens, albidum. Caps. oblonga, glabra, obsolete triquetra. Semina fere triangularia, compressa, atra, lucida. *Zucc.* In *Mexico.* 2.

Obs. Planta *Rumphii* sane dubia, et, si descriptio *Rumphii* fidelis, novi generis. „Formae *Anassae* frutex, sed omnibus partibus major. Folia in inferiore fruticis stipite in orbem fere sine ordine disposita, 4 circiter ped. altitudine ac stipitem formantia cruris crassitie, cito attenuatum ad crassitiam brachii viridis. Folia 5-6 ped., palmam lata, superius plana et concava, inferius ex plano convexa, firma, ut puer uni insistere possit; spinis acutis, curvis, duris, distantibus digiti, latitudine, sursum incurvatis, apice spinam duram, subulatam, nigram. Substantia e fibris crassis, succo viscoso, parum amaricante, ingrato parumque mordente. E centro caulis altitudine 3-4 virorum, media parte ad 2 circiter orgyas foliis parvis, apice simili duro terminatis, squamiformibus, appressis, duris, sed non lignosis, intus viscosus. Rami laterales 15-16, 3 ped. circiter, lenti, firmi, superne tetragoni, lateribus 2 latioribus magisque glabris: ramuli plures minores, firmi, apice corymbis subumbellatis, inque iis duplex florum forma. Quorum prima sunt viridia, et tenuiter serrata foliola, pollicis unguem circiter longa, interne parum concava et conniventia, unde et optime florem repraesentant, qui tamen non est; ex ipsorum enim media parte altera iterum similia exerescunt foliola, quae sensim post priorum lapsum genuinum exhibent florem. Altera itaque formarum constituit florem, qui plerumque ad latera umbellarum istarum conspici-

tur, et in inferiore parte 2 crassa gerit foliola. Flos hic raro sese extendit constatque ex 6 oblongis et concavis petalis, quae plerumque cinguntur et quasi clauduntur ab extremo maximo, quod retrorsum flectitur, coloris ex viridi flavescentis. In floris centro pistillum, quod tamen foliolum magis refert cum 6 crassis firmisque staminibus antheras gerentibus et in orbem positis uti in Liliis albis; sed inodori sunt hi flores; an vero hi latius sese extendant, nescio, cum pluvioso tempore observaverim. An fructus subsequantur? Propagatur enim duplici modo: ad quandam enim distantiam a matricis stipe multae fegerminabant plantulae, ex quibus distincte adparebat esse propagatas ex dictis istis spuris floribus s. fasciculis istis foliosis, qui cum tubo incurvo in terram prolapsi novas formabant plantulas: an vero hae perfecte evadant, nescio. Undique enim circa matricem alii majores propullulant surculi. *Prope fluvium d'Alph in horto deserto.*

15. *A. polyacantha Haw.*; foliis lorato-lanceolatis, acuminatis, concavo-convexiusculis, perviridibus; spinis marginalibus brevibus, subtriangularibus, numerosissimis, sursum subincurvantibus, atropurpurascensibus. *Haw. Revis. p. 55.*

Staturâ et habitu *A. viviparae*: at foliis $1\frac{1}{2}$ pedibus, longe saturatioribus; spinis validis ad lucem atropurpurascensibus, subalternatim saepe dimidiatis. *Haw. Habitat?*

14. *A. geminiflora Brande*; foliis margine filamentosis; spicae floribus per paria approximatis. *Brande Journ. of Science N. 5. t. 1. Dict. sc. natur. 52 Cah. LITTAEA geminiflora Tagliabue in Biblioteca italiana 1. p. 100. DRACAENA Boscii H. Cels. YUCCA Boscii Desfont. Cat. H. Paris. BONAPARTEA juncea Willd. Enum. Suppl. p. 18? B. flagelliformis C. Henckel d. Donner sm. Bot. Zeit. 1820. Junce. fol. apice spinosis et basi vaginantibus. Cat. Hort. bonon. 1797. β . foliis filamentosis. DRACAENA filamentosa Scagnatta.*

Rad. radiculis paucis flexuosis, colore obscuro. Caudex erectus, teres, laevis, cicatricibus squamosus. Folia obscure viridia, in apice caudicis in orbem congesta, ancipitia, basi tantum incrassata, farcta, substriata, glabra, diffusa, flaccida, mucrone osseo terminata, marginibus per aetatem filamentosis. Scapus centralis, simplex, erectus, teres, laevis, substriatus, inferne squamosus; squamis lanceolato-dentatis, superne multiflorus. Flores in spiralem crebram interruptam dispositi, sessiles, geminati, ochroleuco-viridi-violacei, basi bractea lineari-lanceolata subciliata florem subaequante; basi cujusdam floris duabus aliis bracteolis ovato-acutis, ciliatis, scariosis. Cor. tubuloso-campanulata, 6-angularis; limbo revoluta; laciniis lanceolatis. Filamenta purpurascens, erecta, basi laciniarum limbi inserta, limbo duplo longiora. Antherae lutescentes, magnae, oblongae, sulcatae. Germ. ovatum, 6-gonum. Styl. erectus, simplex, teres, superne crassior, corollâ paulo longior. Stigma inconspicuum. Caps. 3-gona. Sem. semiorbicularia, plana, nigra, nitida. *Brande. In Peruvia?*

Obs. „Puto cum exc. de Spin nostram ad AGAVES pertinere, nec novum genus constituere! insuper BUONAPARTEA juncea R. et P. s. TILLANDSIA juncea Poir. (ACANTHOSPORA Spreng.), quam Steudel cum illa confundit, prorsus est distincta, uti apparet ex descriptione et icone Ruiziana: „Colla H. ripulens. p. 6. Character generis LITAEAE in Bibl. it. l. c. „Cal. simplex, superus, 6-angularis, monophyllus, limbo 6-fido, revoluta. Filamenta exserta, perianthii laciniarum basi affixa. Styl. simplex. Caps. matura trigona, trilocularis:“ qui abunde distinctus a caractere BUONAPARTEAE R. et P. Planta a Ruiz et Pav. depicta ne similis quidem *A. geminiflorae*.

1420. F O U R C R O Y A.

1. *F. gigantea Vent.*; caulescens; foliis integerrimis. *Vent. in Uster. Ann.* 19. p. 54. *Dec. Pl. gr.* 126. *Ait. H. Kew. ed. 2. II. p.* 302. *Bot. Mag.* 2250. *Trattinn. Tabul.* 659. *F. foetida Haw. Syn. p.* 73. AGAVE *foetida Linn. Spec.* 461. *Amoen. 3. p.* 22. *Willd. Spec. II. p.* 194. *Lam. Enc. I. p.* 55. *Mill. Dict. ed. 8. n.* 5. *Aublet hist. p.* 505. *Jacq. Coll. II. p.* 512. *ic. rar. II. t.* 579. *A. americana Commel. Hort. II. p.* 35. *t.* 18. *Pluk. Alm. t.* 258. f. 2. $\beta?$ foliis subinde basi vel toto margine spinoso dentatis. *Willemet Hb. Maurit. in Ust.*

Radix crassitie brachii et ultra, fibris crassis (cinereo-albidis). Caudex erectus, teres, 1-1 $\frac{1}{2}$ ped. Folia plurima, in orbem disposita, erecta, subensiformia, mucronata, ad oras inermia, rigida, crassa, parumper canaliculata, nitida, laete viridia, (saepius punctata), intus fibrosa alba, longiora 6-7 ped., $\frac{1}{2}$ ped. lata, trita foetentia: (aculeis in β rufescentibus) scapus (20-) 32 ped., crassitie brachii, erectus, teres, nitidus, (basi punctatus); spathis lanceolatis, mucronatis, pungentibus, integerrimis, sessilibus: infimis pedalibus, (basi crosis) superioribus successive brevioribus; supra medium in paniculam amplam effusus. Rami alterni, circiter 40, patentissimi, medii longiores, 5-ped., digitum crassi. Ramuli numerosi, alterni, simplices, crassitie calami, 4-12 unciar. Bracteae ad pedunculos lineares, parvae, ferrugineae. Pedunculi 1-flori, sparsi, brevissimi, solitarii vel 2-5. Flores penduli, omnino ut in *A. cubensi*, sed paulo majores, vere hexapetali, (ultra 1000. Cor. foetens, petalis in disco virentibus, in limbo albis, interioribus latioribus. *Vent.*;) his cum germinibus delapsis bulbilli succedunt ovati, acuminati, sessiles. *Jacq.* Petala oblongo-lanceolata, aequalia, quidquam carnosae. Germen trigonum, striatum, pollicare, quidquam curvatum. Filamenta utrinque angustata, medio dilatata, petalis dimidio breviora. Antherae oblongae, versatiles, polline flavo. Stylus trigonus, corollam brevior, stamina superans (eorundem longitudine *Vent.*), cavus. Stigma capitatum, pubescens (fimbriatum *Vent.*). Nectaria 3 oblonga, patentia, styli basi inserta. *Bot. Mag. In America meridionali.* β .

2. *F. tuberosa H. Kew.*; caulescens; foliis dentato-spinosis. *Hort. Kew. ed. 2. p.* 305. (excl. β). *Haw. Syn. p.* 75. AGAVE *tuberosa Willd. Spec. II. p.* 194. (excl. β). *Lam. Enc. 1. p.* 55. *Mill. Dict. ed. 8. n.* 4. *F. spinosa Targ. Tozz. obs. bot. n.* 16. *A. angustifolia H. Paris. fide Lam.* *A. quae bulbos pro floribus protulit. Rodati ind. H. Bon. et obs. de Agaves speciebus, p.* 27. *t.* 1. *A. americana tuberosa minor spinosa. Commel. Hort. II. p.* 37. f. 19. *Pluk. Alm. 19. t.* 258. f. 1. (laudante Miller).

Folia formam coloreque *A. giganteae*, sed margine spinoso-dentata. Radix in tuber incrassata; proles nullae: *Miller*, qui junxisse *Linnaeum* hanc cum *gigantea* monet. Folia longa, angusta, flexilia, parum crassa. *Lam.* Flores magnitudine *giganteae*,

duplo fere majores, quam in *cubensi*. *Towns. Ait.* In
America calidiore. †.

3. *F. cubensis* *Haw.*; corollis hexapetalis; foliis ciliato-spinosis. *Jacq. Amer.* 100. t. 175. f. 28. *pict.* t. 260. f. 25. (sub *AGAVE cubensi* uti) *Willd. Spec.* II. p. 195. *Haw. Syn. succ.* p. 73. *F. agavephylla*; foliis caudicis crassis, lineari-lanceolatis: externis dentato-spinosis, dentibus sursum uncinatis; internis subintegerrimis: omnibus spinâ longâ terminatis; scapo squamigero ad medium pyramidate-paniculato; floribus saepe binis ad bracteas axillaribus, pendulis, abortivis, caducis; bractearum axillis deinde bulbiferis. *Brotero* in *Linn. Transact. March.* 1825. *F. tuberosa* β *Ait. H. Kew. ed.* II. p. 305. *AGAVE mexicana* β *Lam. Enc.* 1. p. 52. *Poir. Suppl.* I. p. 241. *A. odorata* *Pers. Syn.* I. p. 580. *Nema-guett Marcgr. Brasil.* 2. 16. (fid. *Jacq.*)

Elegantissima. Folia ensiformia, acuminata, ciliato-spinosa, crassa, erecta, pallide virentia, 5-4 ped.. Scapus erectus, 15 ped., pulcherrimus, paniculatus. Flores numerosissimi, penduli, extus sordide albentes, intus sordide virentes, odore gratiore *Tagetis*. Petala ovalia, obtusa, planiuscula, patula, 3 exteriora paulo angustiora. Filamenta patula, petalis duplo breviora, inferiore mediâ parte obovatâ compressa omniumque crassissima, superne subulato-acuminata. Antherae oblongae, maximae. Germen oblongum, obsolete triquetrum, leviter incurvum, longitudine fere corollae. Stylus triqueter, trisulcatus, erectus, baseos omnium crassissimae angulis applanatis marginatisque, superne subulatus, longitudine staminum. Stigma obtusum, obsolete trifidum. Caps. oblonga trisulea. Sem. plurima, angulata. Vivipara, soboles novae mentiuntur bulbos ex squamis subrotundis integerrimis sibi mutuo incumbentibus et plantulas producunt ubique paniculae ramulis inhaerentes. *Jacq.* Frequens in *Cuba*, ubi *Manguai* audit; in *Maranhã*, *Pernambuco* et aliis *Brasiliae* regionibus. †.

4. *F. rigida* *Haw.*; foliis lineari-lanceolatis, superne integerrimis, basi ipsâ serrato-spinosis. *Haw. succ.* p. 74. *AGAVE rigida*; foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, rigidis, aculeo terminatis. *Mill. dict. ed.* 8. (nec *lurida* β. *H. Kew. ed.* 2.) *C. d. Spin. Cat. Jard. St. Seb.* 1812. p. 25. c. icone. *Link Enum.* 1. p. 334.

Subcaulescens. Folia 15 circiter poll., 18 lin. lata, rigidissima, aculeo nigro, solido. Scapus e centro foliorum 9 ped., apice ramosus, floribus numerosis viridi-flavis. Stylus staminibus longior. Capsulae subtrigonae, triloculares, polyspermae. Floribus non fructificantibus gemmae succedunt parvae, deciduae, radicanteſ lacteque excreſcentes in plantas matri similes. *De Spin.* Folia raro ultra 2 ped., poll. lata, grisea. Nunquam prolifera. *Mill.* In *America calidiore*, *Vera Cruz* †.

Obs. Hujus forte loci nobis esse videtur neglecta ab omnibus: *AGAVE aspera*; cor. hexapetalis, foliis subintegerrimis. *Jacq. Enum.* p. 307, in qua scapus ramosus; flores numerosi, structurâ, magnitudine coloreque *A. hexapetalae*; habitus *Ag. foetidae*, sed multo minor; folia primo anno flaccidiuscula, at tempore rigida, angusto-lanceolata, acuminata, integerrima vel denticulo uno

alterove, utrinque nitida, dorso ad tactum asperiuscula; floribus bulbili in scapi ramis succedunt.

5. *F. madagascariensis* Haw.; foliis patulo - expansis, lorato - lanceolatis, subinvolutis - canaliculatis, parum nitentibus, virescentibus; spinis marginalibus minutis, albis. *Haw. Suppl. pl. succul. p. 42.* AGAVE *madagascariensis* Spreng. *S. Veg. II. p. 79.*

Planta exigua, primi anni. *In insula Madagascar. 4.*

6. *F. cantala* Haw.; foliis patule expansis, sublanceolato - loratis, planiusculis, parum nitentibus, glaucescentibus; spinis marginalibus minutis, numerosis, albis. *Haw. Suppl. pl. succul. p. 42.* AGAVE *cantala* R. H. *bengalens. 1814. p. 25.*

Planta exigua primi anni. Folia magis glauca, molliora, quam in *madagascariensi.* Haw.. *Prope Canton.*

7. *F. australis* Haw.; foliis integerrimis, longe lanceolatis, patentibus, viridibus. *Haw. Syn. succ. p. 74.* AGAVE *australis* Steudel *Nomencl. p. 18.*

Sprengel hanc speciem neglexit. *In Nova Hollandia?*

1421. DORYANTHE S.

1. *D. excelsa* Correa *Linn. Trans. VI. p. 211. t. 25. 24. Brown prodr. p. 298. II. Kew. ed. 2. II. p. 505. Link Enum. 1. p. 254. Bot. Mag. t. 1685.*

Rad. fasciculata. Folia radicalia circiter 100, 4 ped., 2 poll. lata, ensiformia, glabra, integerrima, margine angustissimo cartilagineo, erecta, inferiora recurva, (acuminata, dilute viridia, caulina multoties minora). Caulis s. scapus e centro foliorum, strictus, 12-18 ped., teres, pallide viridis, vix pollicis; foliis lineari-lanceolatis, acutis, basi vaginantibus, apice patentibus, 2-3 poll., basi 4-5 lin. latis. Capitulum subrotundum e spicis suboppositis, confertis, paucifloris. Flores alterni, punicei, breviter pedunculati, bracteis semivaginantibus pedunculisque coloratis. Bractee sub capitulo magnae, ovato-acuminatae, virides, hosque inter aliae lanceolatae, puniceae, flores in fasciculos 2-4-flores colligentes; duae angustiores, longitudine germinis et pedunculi ad flores singulos. Corollae tubus 2-5 poll.; lacinae linguiformes, obtusae, cuspede inflexa, revolutae, 4-poll., 9 lin. latae. Filamenta subulata, crassiuscula, punicea. Antherae longitudine $\frac{1}{3}$ filamentorum, flavae, polline viridi. Germen rectum, obsolete triquetrum. Stylus antheris longior, puniceus, trisuleus, stigmate 5-lobis. Elegantissimam iconem parare jussit ill. *Lambert. Gawl. et Corr.. In Nova Hollandia. 4.*

1422. ALSTRÖMERIA. *)

a. *caule erecto v. suberecto.*

1. * *A. peregrina*; caule erecto - assurgente; foliis lineari-

*) In plurimis ALSTRÖMERIAE speciebus folia basi ita torta, ut pagina propria superior (quae saepius pube variâ obsita) inferior fiat.

lanceolatis, contortis; floribus 2-6nis; petalis exterioribus obcordatis, acuminatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv.* III. p. 58. t. 288. (quib. test:) *A. pelegina* (sic!) *Linn. Spec.* II. p. 461.; *Jacq. H. Vind.* I. p. 20. t. 50. et III. t. 73. 74.; *Orteg. Delect. Fl. Hisp. descr.* 2. ic. 2.; Hemerocallis etc. *Feuill.* II. p. 711. t. 5.; Vulgo *peregrina* nec *Pelegrina*. (*A. Pelegrina*; coroll. patentibus; petalis 3 exterioribus cuneiformibus, tridentatis, reliquis mucronatis; fol. lineari-lanceolatis, sessilibus. *Willd. Spec.* II. p. 461. *Linn. Amoen.* VI. p. 247. c. ic.. *Lam. Enc.* V. p. 149. *Jacq. Coll.* IV. p. 220. t. II. f. 6. *Cavan. Descr.* p. 455. *Curt. Mag.* t. 159. *Réd. Lil.* t. 46. *Hern. H. sempervir.* t. 195. *Allg. G. Mag.* 1805. p. 89. t. 7. *Gaertn. fruct.* 1. p. 41. t. 15. f. 4.)

„Folia resupinata. Flores pulcherrime variegati.“ *Linn.* Glabra, glauca. Radix fasciculata, longissima, tuberoso-pendula, oblongo-cylindrica, inferne fibrillosa, alba, tenera, subhyalina. Caulis plures, simplicissimi, 2 ped. et ultra, teretes, sub florescentia inferne defoliati. Folia sparsa, conferta, sessilia, reflexa, striata, crassiuscula, lucida. Pedunculi terminales, 2-3, saepe 4-6 subumbellati, teretes, 1-flori, foliis terminalibus longiores, nitidi. Cor. 2-poll., formosissima. Petala purpureo-rosea; exteriora alba in centro intense rubra apice viridia; interiora duplo angustiora, obovata, acuminata, integerrima, punctis et maculis versicoloribus variegata. Stamina declinata, corollâ breviora; filamenta subulata; antherae erectae, ovaes, obscure purpureae. Stylus staminibus brevior. Stigmata 3 divergentia. Caps. subglobosa, obtuse acuminata, trigona, obsolete trisulca, trivalvis, pallescens. Semina globosa, lutescentia. *Ruiz et Pav.* In culta caules 1½ ped.. Folia 1½ poll., 2-5 lin. lata, semiamplexicaulia, obtusa, nervo prominente, glabra, 5-6 sub flore, instar involucri. Pedunculi erecti. Petala interiora punctis luteis, rubris viridibusque, marginibus in 2 involutis et subvelutinis; exteriora medio kermesina, margine incarnata, maculis viridibus, rubris et albis, apice tridentata: dentibus 2 lateralibus majoribus obtusis, roseis; medio acuto, calloso, viridi. Filamenta carnea, antheris flavis. Caps. glabra, striis 6 longitudinalibus elevatis in pedunculo persistentibus, dum valvulae dehiscendo decidunt. Semina 8-12 fusca in quovis loculo. *Cav. et Jacq.*, qui semina plantae in *H. Vind.* depictae tulisse ab ipso *Linnaeo*, plantam vero parum discrepare ab icone a *Feuillée* data. *In collibus, praeruptis, maritimis arenosis et glareosis Peruviae et Chili.* 2.

2. *A. Hookeriana*; caule erecto, gracili; foliis linearibus, glaucis, subtortis; umbellâ (paniculâ) subsexflorâ; perianthii foliolis recurvato-campanulatis, subserratis: tribus exterioribus obovato-spathulatis, tribus interioribus lineari-spathulatis. *Hook. Exot. Flor.* t. 181. (sub *A. rosea*).

Caulis simplex, glaucus, uti tota planta, glaber. Folia parva, remota. Panicula dichotoma, floribus subsenis, erectis. Pedicelli longi, graciles, basi bractea foliacea. Petala basi in tubum conniventia, apice patentia, subaequalia: exteriora latiora, obovata, basin versus attenuata, supra serrulata, intus obsolete lineata,

extus vero purpurâ intensius striata; interiora lineari-spathulata; infimum more exteriorum maculatum et striatum, lateralia 2 lineâ supra medium flavâ, rubro punctatâ; omnia apiculata, apice viridi. Filamenta purpurea. Antherae 3 simul pollen explodentes, purpureae, effetae viridi-fuscescentes. Germen turbinatum, profunde sulcatum. Stylus purpureus, staminibus brevior, demum longior, stigmatibus 3 recurvis. *Peregrinae* proxime affinis. *Hooker. In Chili. 4.*

Obs. Mutandum nomen erat ob antiquissimam *A. roseam R. et Pav.*

3. *A. pulchra Sims.*; foliis lineari-lanceolatis; pedunculis subumbellatis, involucratis, trifloris; pedicellis tortuosis; petalis exterioribus obovatis, mucronatis. *Bot. Mag. t. 2421. A. flos Martini Bot. Reg. 751. Lindl. in Trans. Hort. Soc. VI. p. 82. A. fol. lineari-lanceolatis; pedunculis subtrifloris, flexuosis; laciniis corollae obovatis, apiculatis, serratis. Spreng. S. V. II. p. 80. A. tricolor; caule erecto, gracili; fol. lineari-lanceolatis, tortis, glabris; umbellâ pauciflorâ (?); perianthii laciniis 4 exterioribus obovato-spathulatis, subconformibus, brevioribus; 2 interioribus paulo longioribus, lineari-spathulatis: omnibus serratis. Hook. Exot. Fl. t. 65. A. fol. linearibus; pedunculis geminis; laciniis corollae subconformibus, acutiusculis, serratis. Spreng. l. c. p. 80.*

Caulis simplex, glaber, pedalis. Folia pauca, remota, vix 2 poll., margine omnino non ciliata. Involucrum sub umbella triphyllum, foliolis caulinis similibus, sed minoribus. Flores respectu plantae magni „(in icone *Bot. Mag.* 2 poll.). Petala 4 exteriora apice maculâ intense purpureâ sub callo (virenti) albo; interiora 2 erecta, subcarinata, alba, fasciâ latâ purpureâ lacerâ apicem versus, et sub hac flava, apice purpurea, lineis pluribus flavis punctisque parvis subtus picta. Stamina ut in *pulchella*, at pollen viride; sic etiam stylus, at hic staminibus brevior. *Hooker. A. Pelegrinae* proxima, et nulli a *Ruiz et Pavon* descriptae conveniens, nisi forte eorundem *Ligtu. Bot. Mag. l. c.* Umbella multiradiata: radii male triflori dicuntur, uniflori enim, sed saepius 3-4-fidi, et singula subdivisio tantum uniflora; ad singulam divisionem foliolum unum. Stylus staminibus longior. Pollen lividum. *Grah. in Edinb. Phil. Journ. 1825. Jul. p. 174. In Chili. 4.*

4. **A. pulchella*; corollis reflexo-patentibus, omnibus acutis; foliis sessilibus; pedicellis involucre brevioribus. *Linn. Suppl. 206. Willd. Spec. II. p. 195.*

Planta habitu et structurâ simillima *A. Pelegrinae*, nisi folia angustiora et caulis hujus terminatus involucre irregulari, e foliis majoribus exacte petiolatis, resupinatis. Pedunculi nudi, simplicissimi, uniflori. Flores 4-6, subcernui, magnitudine *A. Pelegrinae* irregulares. Petala a basi patentia, recurvata, alterna minora albida, apice rubra, basi striata sive rubro punctata. Stamina declinata, lutea, aequalia. Pistillum rubrum adscendens. Stigma trifidum. *Linn. fil. ad iconem plantae a L. B. Alströmer* communicatam, uti in reliquis ALSTRÖMERIIS (a *Linnaeo* filio descriptis). Conf. sequentem *Ligtu. In America meridionali. 4*

5. *A. *Ligtu*; caule erecto; foliis lanceolato-linearibus; floribus umbellatis; petalis subconformibus. *Ruiz et Pav. Fl. peruv.* III. p. 59. (sub A. *Ligta*). A. caule adscendente. *Linn. Spec.* 462. (quibus testt:) Hemeroc. floribus purpurascens, striatis, vulgo *Ligtu*. *Feuill. peruv.* 2. p. 710. t. 4. A. *Feuillaeana Meyer* in *Reliq. Haenk.* II. p. 122. β ? A. *pulchella*; caule erecto; fol. sessilibus, lanceolatis; pedunculis involucri longioribus; petalis recurvo-patentibus, acuminatis, subaequalibus: 2 erectis maculatis angustioribus. *Bot. Mag.* 2553. (quatenus *Feuill.* et *Ruiz et Pav.* laudat; excl. *pulchella Linn.*) *Hook. exot. Fl.* t. 64. *Bot. Reg.* t. 1008. A. *Simsii Spreng.* S. V. II. p. 80.

„Glabra, fere glauca. Rad. fasciculata, filiformis, ex singulo filo tuber oblongo-cylindricum, palmare, hyalinum, tenerrimum, sapore subdulci. Caules plures, pedales, simplicissimi, inferne sensim attenuati, in florescentia inferne defoliati. Folia sparsa, sessilia, spiraliter contorta, striata. Pedunculi terminales, umbellati, 6-10, aliquando plures, 1-rarius 2-florî, teretes, erecti. Involucrum polyphyllum; foliolis lanceolatis. Cor. perpulera, $1\frac{1}{2}$ poll.; petala roseo-carnea, cuneiformi-lanceolata, acuminata, 5 interiora angustiora, quorum 2 superiora pluribus punctis variegata. Caps. hexagona, pallescens, nucis Avellanae magnitudine. Semina globosa, lutea.“ *Ruiz et Pav.* In β culta apud *Hooker* caulis erectus, vix scandens, gracilis, debilis, 2-3 ped., simplex, teres, glabriusculus, subglaucus. Folia sparsa, distantia, in ramis sterilibus inferioraque in fertilibus late obovato-spathulata, submembranacea, petiolum versus torta, striata, glaucescentia, margine ciliata; superiora in fertilibus lanceolata, plus minus convoluta torta. Umbella subsexradiata, radiis bifloris. Flores magni, elegantes. Pedicelli circiter pollicares, glabri, subglauci, bractea foliaceâ, latâ, tortâ, unde involucrum sub umbella. Petala 4 exteriora subaequalia, obovato-spathulata, basi erecta, apice patentia, ibique margine serrata, apiculq calloso, lacte coccinea; duo interiora duplo fere longiora, erecta, linearia, splendide flavo-coccinea apice, ibique integerrima, punctis coccineis intensioribus punctato-striata. Filamenta receptaculo inserta, primum erecta, pallide purpurea, demum declinata, apicibus incurvis. Antherae oblongae, purpurascens, polline flavicante. Germen subtrigonum, lineis 6 prominentibus. Stylus subulatus, filiformis, staminibus longior, basi triangulari albus superne purpurascens, stigmatibus 5 linearibus. In arenosis urbis Conceptionis Chili, copiose in agris. D. Petri arcis; in Brasilia. 2.

Obs Posuimus huc instar β cum? A. *pulchellam Sims*, (quae tamen forte species propria), quia monuit specimina A. *Ligtu* K. et P. in *Herb. Lambert.* asservata suae multo magis esse similia, quam illa A. *Ligtu* in *Curtis*, et paucis quoque tantum abluere a descriptione data in *Fl. peruv.*; vix dubitare suam esse eandem cum illa divi *Feuillée* a *Ruiz et Pavon* laudata, longe vero differre ab illa *Ligtu* in *Curtis* 127., et minime quadrare cum *pulchella Linn. fil.*, quae nullibi in *Fl. peruv.* describitur, quae forte delenda, utpote ex icone tantum.

6. A. *Curtisiana Meyer*; caule erecto; foliis subulatis; umbellâ simplici, pauciflorâ; (pedunculis involucrum superantibus); perianthii subbilabiati petalis omnibus acutis, antico posticis triplo brevioribus. *Meyer* in *Reliqu. Haenk.* II. p. 122.

(excl. *albiflorá*; quo teste:) *A. Ligtú*; fol. spathulato-oblongis; pedunculis umbellae involuero longioribus; corollâ bilabiata. *Linn. Fil. Suppl.* 207.; *Curtis Bot. Mag.* 125.; *Rédout. Lil. t.* 40. (excl. syn. *Feuill.*). *Willd. Spec. II.* p. 195. (quatenus *Linn. fil.* laudat et *Feuillé icon.* carpit). *A. Gart. Mag.* 1809. p. 85. t. 9. β . foliis variegatis. *Loddig. Bot. Cab.* 17.

„Caules steriles foliis subulatis appressis vestiti, terminati foliis spathulatis, oblongis, resupinatis, in rosam fere positis. Caulis floriferus vestitus foliis subulatis, appressis, terminatus involuero breviori. Pedunculi pauciores, simplicissimi, nudi. Petala 3 superiora majora, alba, basi punctata, apice rubro maculata. Petala 3 inferiora breviora, imprimis infimum, fere subulata, rubra. Filamenta petalis inferioribus longiora, deflexa, scabra. Antherae didymae, luteae. Pistillum rubrum. Spectabilis floribus magnis.“ *Linn.* Rad. e tuberibus oblongis, cylindricis, obtusis, apice attenuatis, fasciculatis. Caules plures simplices, herbacei, 5-9 poll., erecti, glabri, angulosi: steriles ubique foliis parvis, subulatis erectiusculis tecti, rosulâ foliorum patentium oblongorum, fere spathulorum terminati; floriferi foliis parvis, sparsis, subulatis, apice involuero e foliis 5-6 linearibus pedunculis multo brevioribus. Pedunculi 2-3, simplices, nudi, angulosi, apice in germen turbinatum, hexagonum, sexsulcatum incrassati. Petala inaequalia; 3 superiora magna, ungue elongato, limbo elliptico: medio maximo, fere omnino lacte roseo; lateralibus angustioribus acutioribusque albis apice roseo; 3 inferiora omnino rosea; medio minimo acutiore, lateralibus majoribus. Filamenta rubra, filiformia, debilia, petala superiora versus inclinata; antherae subglobosae, flavae. Stylus erectus, subtrigonus, ruber; stigmatibus 3 simplicibus, filiformibus, quidquam divergentibus. *Redouté*. Convenit cum icone et descriptione a *Redouté* data figura *Curtisiana*; at petala non rosea, sed miniata; folia non subulata, sed linearia sub floribus; in apice vero ramorum sterilium folia conferta, obovato-lanceolata, obtusa, in petiolum attenuata. Hujus etiam esse loci videtur: *A. Ligtú Cóm. a Hoffmannsegg* 2. u. 5. *Nachtr.* p. 50. An *A. Ligtú Linn. fil.* omnino hujus loci, cum color corollae discrepet? *In Chili; in Brasilia.* 4.

7. *A. albiflora Presl.*; caule erecto, glabro; foliis linearibus, sessilibus, planis; umbellâ 5-6-florâ; involuero foliaceo pedicellos subbilidos superante; petalis tribus superioribus obovatis, denticulatis: exterioribus duobus oblongo-lanceolatis, antico impari lanceolato, denticulato. *Presl Reliqu. Haenk. Fasc. II.* p. 121.

Caulis pedalis, teres, substriatus, simplicissimus, foliosus. Folia 2 poll., vix 2 lin. lata, rarissime lineari-lanceolata, acuta, glabra. Umbella terminalis plerumque 4-radiata. Foliola involucri numero pedicellorum, foliis conformia, pedicellos paullo superantia. Pedicelli simplices, nudi, pollicares, aut bifidi bracteati pollice longiores. Bracteae involuero conformes. Flores erecti, magnitudine *Pelegrinae*, albi, patentes, petalis 3 superioribus apiculatis, dorso lineis coloratis, basi longe unguiculatis; exterioribus 2 longe unguiculatis, acuminatis, medio maculis linearibus

ribus purpureis; extimo brevissime unguiculato, acutiusculo, reliquis duabus lineis brevior. Stamina subaequalia, corollâ breviora, antheris erectis, oblongis, cordatis. Stylus filiformis stigmate trifido. Germen turbinatum, 6-costatum. Caps. ovato-subglobose, hexagona, dissepimentis connatis. Semina sphaeroidea, funiculis incrassatis. Non esse *A. Curtisianam*, uti videtur clo *Meyer l. c. Presl.* In *Cordilleras de Chili.* *Haenke.*

8. *A. caryophyllea Jacq.*; erecta; fol. spathulaeformibus, sessilibus, appressis, trinerviis; caule florifero subaphyllo; caulibus sterilibus superne praeterea aliis foliis longe lanceolatis, petiolatis et sparsis; corollis bilabiatis. *Jacq. Hort. Schönbr. IV. p. 33. t. 465.*

Tota glabra. Radix e tuberibus fasciculatis, teretibus, crassitie fere digiti minimi, obtusis, unc., carnosis, sordide pallentibus, apice fibris ramosis. Caules plures, erectiusculi, teretes, virentes et purpurascens, foliolis appressis sparsis spathulaeformibus vestiti; alii steriles, graciles, 3-9 poll., apice foliis alternis plurimis et frondosis; alii pauci floriferi, crassitie pennae columbinae, aphylli, longiores. Folia petiolata, anguste lanceolata, utrinque acuta, patula, 1-3 poll. Involucri foliola plura lanceolato-linearibus, patentissima et erecta, pedunculis longiora et quidem saepius duplo. Pedunculi circiter 5, erecti, teretes, superne sexsulcati, unc. Petala acuta, patula, inaequalia, ex ungue canaliculato-lanceolata; 3 deorsum flexa tota rubra, breviora, intermedio minimo; 3 assurgens alba cum summa parte rubra, intermedio longissimo. Filamenta subulata, glabra, declinata, inaequalia. Antherae oblongae, erectae, rubrae. Germ. obovatum, viride, sexsulcatum. Stylus staminibus brevior, rubellus; stigmate in 3 lacinias lineares patentissimo. Odor floris ut in *Caryophyllo: Jacq.*, cui huic spectare videtur *A. Ligtu Botan.*, nec *Feuill. et Linn.* Proxima etiam videtur *A. Curtisiana* et forte non satis diversa. *Habitat? 4.*

9. *A. spathulata Presl.*; caule erecto; foliis spathulatis, mucronulatis, cartilagineo-marginatis, glabris; umbellâ 2-3 florâ; involuero foliaceo pedicellos unifloros aequante; petalis subconformibus apiculatis. *Presl. Reliqu. Haenk. Fasc. II. p. 122.*

Caulis $\frac{1}{2}$ ped., basi nudus, apice crebre foliosus, uti tota planta glaberrimus. Folia 16 lin., 6 lin. lata, sessilia, apice rotundata, basin versus longe attenuata. Involucri foliola 5 foliis conformia. Pedicelli erecti, uniflori, involuero paulo breviores. Cor. erecto-patens, poll.; petala oblongo-lanceolata, integerrima, exteriora paulo latiora. Filamenta corollâ breviora, stylo longiora, antheris subrotundis. Stigma trifidum. *Presl. In Peruvia? Haenke. 4.*

10. *A. plantaginea Mart.*; caule stricto, glabro; foliis anguste lanceolatis, glabris: in caulibus sterilibus ovato-lanceolatis, in rosulam expansis; umbellâ 5-9-radiatâ; involuero polyphylo, pedunculos paulo superante; petalis subconformibus, integris, infundibuliformi-erectis: exterioribus obovato-

spathulatis, obtusis: interioribus obovato-oblongis, apiculatis.
De Mart. Fl. brasil. ined.

Caulis ped. et ultra, teretiusculus, remote foliosus, superne nudus. Folia in caulibus floriferis erecta, basi torta, sessilia, acutiuscula, nervoso-striata, 20-30 lin., 2-5 lin. lata; in caulium sterilium apicibus numerosa, patentia, obtusiuscula, basi attenuata, glaberrima, firmiora, nervosa, 2-4 poll., 6-12 lin. lata. Invol. foliola 8-12, lanceolata, suberecta, longiora semper pedunculos erectos, 12-18 lin., simplices, subnudos, rarius bracteolatos, superantia, 8-21 lin., 1-3 lin. lata. Cor. inclinata, vix ringens, 13-17 lin.; petala concolora ut videtur; exteriora ungue longo basi ciliolato, 12-16 lin., 3½ lin. lata: summum paulo majus; interiora paulo angustiora; infimum paulo minus et acutius. Stam. corollâ paulo breviora, inaequalia. Stylus staminibus longior et brevior. *In alpestribus provinciae Minas Geraës Brasiliae.* 4.

11. *A. revoluta Ruiz et Pav.*; caule erecto; foliis lanceolatis; (pedunculis umbellatis, bifloris;) petalis reflexis: interioribus minoribus. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 59.*

Radix longissima, filiformis, fasciculata, tuberoso-pendula: tubera solitaria, oblonga, tenera, alba. Caules plures, simplicissimi. Folia sparsa, nitida. Flores umbellati, involucrati. Involucrum polyphyllum: foliolis lanceolatis, totidem ac umbellae radii. Pedunculi biflori. Petala purpurea, revoluta; interiora minora, quorum 2 superiora a medio ad basin lutea, punctis purpureis maculata. Stylus triqueter, staminibus brevior. *Ruiz et Pav. In collibus Chili prope Huilquilemu.* 4.

12. *A. versicolor Ruiz et Pav.*; caule erecto; foliis lanceolato-linearibus; umbellâ 2-3-florâ; petalis internis angustioribus, infimo breviora latiore. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 59.*

Glabra. Radix fasciculata, tuberoso-pendula; tubera oblonga, alba, hyalina, tenerrima. Caules plures, simplicissimi, ½ ped., subteretes. Folia sparsa, sessilia. Petala lutea maculis purpureis: 3 exteriora aequalia, interiora angustiora, quorum 2 suprema angustiora, alterum paulo brevius latius. Stigma trifidum. *Ruiz et Pav. In collibus aridis prope Huilquilemu et in campis Laxa Chili.* 4.

13. *A. haemantha Ruiz et Pav.*; caule erecto; foliis lineari-lanceolatis, ciliatis; umbellâ sub-6-radiatâ; pedunculis bifloris; petalis exterioribus serratis: (supremo breviora). *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 60.* β petalis albido-purpureis et luteo variegatis. *Ruiz et Pav.*

Radix filiformis, longissima, tuberoso-pendula; tubera oblonga, hyalina, tenera, alba. Caules plures, simplicissimi, ped. Folia sparsa, revoluta, margine minutim ciliata. Umbella 5-6-radiata. Petala sanguinea; 5 basi tubulosa, infimum interius planum, exteriora 3 apice serrata, quorum superius brevius; interiora 2 superiora reliquis longiora et angustiora, lineis luteis variegata; alterum inferius longitudine duorum exteriorum lateralium. Variat fol. lanceolatis; petalis exterioribus acuminatis albido-purpureis, maculâ obscure-purpureâ notatis: interioribus obsolete ser-

ratis, obtusis, albo, luteo et purpureo variegatis. *Ruiz et Pav.*
In collibus et ruderatis provinciae Rere Chili. 4.

14. *A. lineatiflora Ruiz et Pav.*; caule erecto; foliis lanceolatis, (nitidis); umbellâ 4-7-radiatâ; pedunculis bifloris, unifoliis; petalis (obovato-cuneiformibus; acuminatis), serratis, lineatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv.* III. p. 60. t. 289.

Glabra. Radix filiformis, fasciculata, tuberoso-pendula; tubera oblongo-cylindrica, tenera, hyalina. Caules plures, simplices, nitidi, subpurpurascens, teretes, cavi, 2-3-ped.. Folia sparsa, sessilia, latiuscula, 7-nervia, striata, integerrima, utrinque nitida, basi contorta, superiora approximata. Involueri folia 4-7. Pedunculi divergentes, furcati, foliolo ad basin pedicelli brevioris lanceolato. Petala purpurea, obovato-cuneiformia, acuminata, acumine viridi, 2 interiora superiora angustiora, luteo et purpureo variegata, basi tubulosa, reliqua plana. Stamina declinata. Antherae erectae, assurgentes, virides. Stylus declinatus, ruber. Stigmata 3, reflexa. Caps. ovalis, truncata; acuminata, hexagona, purpurascens. *Ruiz et Pav.* *In collibus Peruviae ad Pongo provinc. Camana.* 4.

15. *A. psittacina Lehm.*; glaberrima; caule erecto; foliis oblongo-lanceolatis, nervosis; pedunculis umbellatis, 1-floris; corollae laciniis exterioribus lanceolatis, reliquis oblongis, superne maculatis. *Lehmann Cat. h. Hamb.* 1826.

Habitat?

16. *A. brasiliensis Sello*; caule stricto; foliis lanceolatis, acutis, nervosis, glaberrimis; pedunculis umbellatis, unifloris: laciniis corollae lanceolatis, acutis, integerrimis, striatis. *Sprengel S. V.* II. p. 81.

A. monticolae Mart. proxima esse videtur, an eadem? *In Brasilia. Sello.* 4.

17. *A. monticola Mart.*; caule stricto, glabro; foliis lineari-lanceolatis, acutis, remotis, glabris; umbellâ 6-radiatâ: pedunculis simplicibus vel basi ramulo; petalis 3 exterioribus spathulatis cum acumine, obsolete crenulatis; 3 interioribus lanceolatis, acutis: 2 superioribus paulo longioribus. *De Mart. Fl. brasil. ined.*

Caulis teretiusculus, 2-ped., crassitie pennae cygnae, remote foliosus, superne nudus. Folia sessilia et subdecurrentia, subtus glaucescentia, 2½-3 poll., 3-4 lin. lata. Involuerum foliolis 5-6, inaequalibus, 1½-2 poll., 2-3 lin. latis. Pedunculi erecti, glabri, 15-18 lin., imâ basi plerumque ramulo 1-floro brevior, ad cujus basin bractea 8 lin.. Cor. horizontalis, 20-24 lin., 10-12 lin. diam.; petala exteriora in unguem longum angustata, minata?, 16-18 lin., superne 4½-5 lin. lata: summum paulo longius; interiora ungue ciliolato, lineolis purpureis, 3 lin. lata: 2 superiora 19-20 lin.. Stam. corollâ paulo breviora. Germ. glabrum, 2½-3 lin.. Styl. staminibus paulo brevior. *In Serra das Lages Provinciae Bahiensis.* 4.

18. *A. longistaminea Mart.*; caule erecto, glabro; foliis lineari-lanceolatis, acutis, tortis, brevibus; umbellâ 5-ra-

diatâ, non involucreatâ; petalis exterioribus oblique ovatis: interioribus minoribus oblongo-lanceolatis, acuminatis, infimo minore; staminibus paulo exsertis. *De Martius Fl. Brasil. ined.*

Caulis teretiusculus, 20 poll., superne nudus. Folia infima squamiformia 4-5 lin., media remota, erecto-patentia, sessilia, glaberrima, glaucescentia, 6-9 lin., 1½-2 lin. lata. Pedunculi glabri, 6 lin., nudi vel ramulo incompleto. Cor. horizontales, 10-12 poll., 8 lin. diam.; petala exter. latiora, acumine brevi, integerrima, intus infra medium puberula, rosea? nervis intensioribus, apice viridi. 10-11 lin., 4-4½ lin. lata; interiora 2 superiora infra medium unguiculata, 9-10 lin., 2-3 lin. lata, ut videtur exterioribus concolora: infimo anguste lanceolato, 8 lin. Stam. recta, subaequalia, corollam 1-2 lin. superantia. Germ. glabrum, lin. Styl. staminibus brevior, corollam vix superans. Stigm. trifidum. *In campis herbidis ad Villa da Pedra Branca Prov. Bahiensis. 4.*

19. *A. foliosa Mart.*; caule erecto, glabro, basi scabriusculo; foliis lineari-lanceolatis, acutiusculis, subtus pulverulento-pubescentibus; umbellâ 5-6-radiatâ; pedunculis 1-2-floris; corollis infundibuliformibus, erectis; petalis exterioribus spathulatis, crenulatis: interioribus lanceolatis, acutis. *De Mart. Fl. brasil. ined.* *β angustifolia*; umbellâ 1-6-florâ. *γ humilior*; fol. in medio caulis valde approximatis.

Caulis 1-3 ped., teretiusculus, inferne maculatus, medio dense foliosus, superne viridis ad 1-2 poll. nudus. Folia ima squamiformia, in medio caule densa, erecto-patentia, sessilia, margine subrevoluta, basi semel torta, subtus pube densâ glaucescente, 3-nervia, 16-40 lin., 2-5 lin. lata. Invol. foliola 6-8, inaequalia, foliis similia, 10-30 lin., 1-4 lin. lata. Pedunculi angulosi, glabri, 12-30 lin., simplices, nudi, vel medio ramulo iterum 1-floro et ibidem bractea pollicari. Cor. subhorizontales, 15-21 lin., diam. poll.; pet. exteriora obtusa v. emarginata cum acumine calloso, basi integerrima, coccinea, apice alba, 15-20 lin., apice 6-7 lin. lata: summum paulo majus; interiora subaequalia, integerrima, 15-18 lin., 2-3 lin. lata, miniata, apice miniato-coccinea lineis purpureis. Stam. corollâ paulo breviora, superne coccinea. Germen glabrum, 2-3 lin., 6-angulum. Stylus stamina subaequans. In *β* caulis 10-14 poll., folia remotiora, 8-21 lin., 1-2 lin. lata; umbella 4-6-flora involucre 6-8 phyllo, rarius 4-flora involucre 2-phyllo. In *γ* caulis 8-11 poll., magis scabridus, densissime foliosus; umbella 2-4-flora; petala exteriora magis emarginata. *α in campis prope Ytu: β et γ in altis saxosis Provinciae Minas Geraës Brasiliae. 4.*

20. *A. glaucescens Humb. et Bonpl.*; caule erecto, apice nutante, glabro; foliis lanceolatis, convolutis, subtus glaucescentibus; floribus umbellatis; laciniis calycinis oblongis, obtusis, glabris. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 282.*

Caulis 1-3 ped., simplex, teres, dense foliosus, pauciflorus. Folia sparsa, sessilia, acuminata, rigida, striata, supra glabra, nitida, subtus pubescentia, 1½-2 poll., cauli arcte adpressa,

summa latiora, planiuscula, patentia. Flores 4-6; pedicellis $\frac{1}{2}$ poll., glabris, basi bracteatis. Bractea lanceolata, membranacea, nervosa, pedicello brevior. Cal. campanulatus, glaber; lacinae 3 exteriores oblongae, obtusae, nervosae, incarnatae, interne pallidiores, subaequales; 3 interiores exterioribus tenuiores, vix tamen longiores, oblongae, unguiculatae, flavae, ferrugineo maculatae. Stamina calyce breviora. Filamenta subulata, glabra, demum declinata. Antherae oblongae, polline caeruleo. Germen trigonum, 6-sulcatum, glabrum. Stylus staminibus brevior. Stigma 3-fidum. *Kunth.* In *devexis Pichinchae orientalis*, inter planitiem *Palmascuchu* et fontem *Cantunae*. 4.

21. *A. linifolia* *Humb. et Bonpl.*; caule adscendente, hirtello; foliis lanceolatis, margine revolutis, glabris; floribus umbellatis; laciniis calycinis exterioribus oblongis, acutiusculis, externe pubescentibus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth* III. p. 282. *A. sol. lanceolatis, sessilibus, obtusis, nervosis, glabris; caule pubescente, folioso; floribus ternis, terminalibus. Reliqu. Willd. Ms. (sive de Schlechtend. fil.)*

Caulis subpedalis, simplex, teres, violaceus, dense foliosus, apice 3-5-florus, inferne nudus, squamis nonnullis, glaber (in definitione „hirtellus.“) Folia sparsa, breviter petiolata, obtusiuscula, subcoriacea, 5-nervia, 8-9 lin.. Petioli crassiusculi, hirtelli. Pedicelli pollicares, teretes, pubescentes, supra medium bracteam foliis simillima. Calycis lacinae 3 exteriores nervosae, rubrae, externe pubescentes, $\frac{1}{2}$ poll., subaequales; 3 interiores exterioribus tenuiores, vix tamen longiores, unguiculatae, ovatae, acutiusculae, nervosae, flavae, rubro-maculatae, glabrae; inferior reliquis patentior. Stamina calyce duplo breviora. Filamenta subulata, glabra, apice curvata. Antherae ovatae, polline violaceo. Germen subrotundum, pubescens. Stylus puberulus, stamina superans. Stigma 3-partitum, laciniis reflexis. *Kunth.* In *frigidis Parami de Almaguer inter Marmato fluv. et metam Puntaurcu*. 4.

22. *A. distichophylla*; caule adscendente; foliis distichis, oblongo-lanceolatis; umbellâ 3-8-florâ; petalis aequalibus: interioribus planis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 60. t. 287. f. a. (sub A. distichifolia).*

Glabra. Caulis solitarius, simplicissimus, 2-ped., filiformis. Folia alternatim disticha, apice contorto, subtus striata, nervosa, 2-poll., inferiora minora. Petioli breves, contorti. Involucrum bracteis subulatis, inaequalibus, parvis. Pedunculi teretes, fere poll., 1-flori, divergentes. Cor. punicea, $\frac{1}{2}$ poll.. Petala cuneiformia, acumine minimo; 3 exteriora basi canaliculata; interiora latiuscula. Antherae violaceae. Caps. ovata, obtuse trigona, punicea, obscure trisulca, non dehiscens. Semina subrotunda, fulvescentia, pulpâ paucâ. *Ruiz et Pav.* In *nemoribus Andium Peruviae, in montibus altis frigidis Munna*. 4.

23. *A. secundifolia* *Ruiz et Pav.*; caule dependente; foliis secundis, lanceolatis, acutissimis, subtus albis; umbellâ

sub-5-florâ; floribus hirsutis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 60. t. 290. f. a.*

Caulis solitarius, simplicissimus, 2-ped., filiformis, teres, pendulus, glaber. Folia alterna, 1½ palmaria, poll. lata, utrinque longitudinaliter lineata, nervosa, margine retroflexa, supra glabra, subtus obsolete tomentosa alba. Umbella terminalis, 4-6-radiata. Involucri foliola parva, subulata, erecto-patentia. Pedunculi 1-flori, 1½ poll., teretes, filiformes. Cor. ½ poll., petalâ exteriora oblongo-obovata, interioribus parum latiora, punicea, extus lanuginosa; 3 interiora basi canaliculata, lutea, punctis nigris maculata, apice viridia, cuneiformia. Germen lanuginosum. Stigmata lanuginosa. Caps. oblonga, hexagona; angulis alternis productioribus, non dehiscens, obtusa, lutea, rugosa, scabra, parvae nucis juglandis magnitudine. Semina in pulpa nidulantia, subrotundo obovata, rubra. *Ruiz et Pav. In nemoribus Andium Peruviae, in montibus altis frigidis Munna. 4.*

b. caule scandente v. volubili. *)

24. *A. *Salsilla*; foliis petiolatis, lanceolatis, acuminatis; umbellâ ramosâ; pedunculis involucre longioribus, bracteatis, laxis. *Linn. Suppl. p. 196. Spec. p. 462. Willd. Spec. II. p. 196. A. caule volubili; foliis lanceolatis; umbellâ 5-10-radiatâ; pedunculis dichotomis, 3-floris. Ruiz et Pav. Fl. peruv. 5. p. 61. A. caule foliisque glabris, lanceolatis, membranaceis; umbellâ pauciflorâ; pedicellis elongatis subbifloris; laciniis calycinis aequalibus. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth 3. p. 284.? Bot. Mag. 1613. Fortg. Gart. Mag. 5. t. 27. Banks ic. t. 2. Feuill. peruv. 2. p. 715. t. 6. (fid. Linn.) Coylxochil *Hernand. hist. pl. 267. (fid. Gawl.) An A. edulis Tussac Fl. d. Antilles 1. p. 109. t. 14. Bot. Rep. t. 649. Kern. h. semperv. t. 370. VANDERSIA edulis Salisb. Trans. H. Soc 1. p. 352. (quaerit Kunth et Gawler.) BOMBAREA Salsilla Mirb.**

„Folia nervosa, resupinata. Petioli nulli. „(et tamen folia petiolata dicuntur)“ Involucrum polyphyllum, subulatum, reflexum. Pedunculi pauciores, elongati, apice subbiflori. Folium florale ad ramificationes pedunculorum. Petala erecto-patentia, obtusiuscula: exteriora rubicunda, interiora virentia. *Linn.* „Radix longissima, filiformis, fibrillosa, tuberoso-pendula; tubera subrotunda, ciccris magnitudine, tenera, hyalina. Caulis simplicissimus, striatus. Folia alterna, striata, basi spiraliter contorta. Umbella terminalis, radiis 5-10 vel pluribus. Involucrum foliolis totidem lanceolatis. Pedunculi ad basin pedicellorum bracteis lanceolatâ. Petala obovato-cuneiformia, purpurea, 3 interiora parum angustiora, ad basin maculâ intense violaceâ.“ *Ruiz et Pav.* Caulis volubilis, foliosus. Folia sparsa, angustato-acuminata, nervosa, plana, utrinque glabra, 5 fere poll.,

*) ALSTRÖMERIAS hasce nomine BOMBAREA genere proprio comprehendit *Mirbel Con. Poiret Enc. Suppl. II. p. 677.*

9 lin. lata. Petioli membranacei, spiraliter torti, glabri. Umbella terminalis, radiis elongatis, subbifloris, glabris, bracteatibus. Flores vix pollicares. Cal. glaber; lacinae 3 exteriores oblongae, basi cuneatae, obtusae, infra apicem tuberculatae, nervosae, rubicundae? superne rubro-maculatae; interiores longitudine exteriorum, obovato-cuneatae, unguiculatae, subemarginatae, flavae, rubro-maculatae. Stamina calycem aequantia. Filamenta subulata, glabra, demum declinata. Antherae subglobosae, erectae. Germen glabrum. Stylus trifidus, stamina subaequans, laciniis reflexis, interne puberulis. *Kunth. Gawler* in culta (ut videtur *eduli*) describit rhizoma flagelliforme, crassitie calami, tuberibus ad extremitates fibrarum magnitudine pisi cerasive, planiusculis v. exacte globosis, albis. Caules 3-4-pedales, crassitie culmi triticei. Folia numerosa, 3-poll., ultra $\frac{1}{2}$ poll. lata, alterna, distantia, patentissima, anguste ovato-lanceolata, dorso supinato subpruinosa. Umbella erecta, radiis 3-15, dichotomo-bifloris s. paniculato-plurifloris, pedicellis supra flexis. Germen turbinato-triquetrum. Corolla nutans, rosea, pollicaris; segmentis interioribus viridibus, maculis saturate puniceis, subcyathoideo-campanulata: laciniis exterioribus obovato-oblongis, acumine brevi; interioribus sublongioribus spathulatis: laminâ orbiculatâ, unguis canaliculo pruinoso. Filamenta laxius fasciculata, villo vix notabili. Stylus triqueter, subulatus. Capsula subglobosa, 6 costata, umbone (e styli vestigio) mucronata. *In Lima Linn. fil.; in alsis opacis Novaegrenadae prope Guaduas et Villeta; in planitie bogotensi, Humb. et Bonpl.; in S. Domingo (ubi Topinambours blancs). Tussac. 4.*

Obs. Andrews A. edulem radicibus globulosis, tuberculosi, edulibus ab A. *Salsilla* differre dicit. In planta sua caulis volubilis; folia alterna, elliptica, lanceolata, glabra, acuminata; flores terminales, subumbellati; pedunculi longi, saepius biflori, inclinati; petala 3 exteriora obtusa, pallide rosea, 3 interiora viridia, punctata, obtusissima; stamina corollâ breviora. An plures hic confusae species? Conf. *Obs. ad tortam.*

25. *A. torta Humb. et Bonpl.*; caule volubili foliisque glabris, sessilibus, lineari-lanceolatis, margine revolutis, rigidis; umbellâ multiflorâ; pedicellis unifloris, glabris; laciniis calycinis exterioribus paulo longioribus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 285.* A. caule volubili; umbellâ terminali multiflorâ; fol. linearibus, rigidis, glabris, striatis. *Reliqu. Willd. Ms. (fide de Schlechtend. fil.)*

Caulis teres, foliosus. Folia sparsa, acuminata, striata, margine revoluta, $1\frac{1}{2}$ poll., patentia. Flores numerosi, umbellati. Pedicelli $\frac{1}{2}$ poll. Cal. glaber; lacinae 3 exteriores oblongo-lanceolatae, obtusae, nervosae, rubrae, $\frac{1}{2}$ poll.; 3 interiores vix breviores; lanceolatae, unguiculatae, virides, nigro-maculatae, basin versus flavae. Stamina calycem subaequantia. Filamenta erecta, ut Germen Stylusque erectus longitudine staminum, glabra. Stigma 3-fidum. *Kunth. In frigidis Peruviae prope Caxamarca et Paramo de Yanaguanga. 4.*

Obs. Cls. Meyer in *Reliqu. Haenk. Fasc. II. p. 121.* sub A. *Salsilla*, „caule volubili, tereti; fol. angustis, resupinatis, membranaceis, apice cartilagineo-hamatis radiisque umbellae subramosae glabris; sepalis subaequalibus“ A. *Salsillam Linn., Her Bot. Mag. t. 1615., et Feuill. t. 6.* sine dubio, A. *tortam* H. et B. vero cum? instar synonymorum adfert; in adumbratione vero *tortam Salsillas* varietatem dicit, „et quidem eandem, quam legit Haenke.“ Planta ergo a *Haenke* lecta ad *tortam* potius, quam ad *Salsillam* spectare vide-

tur. „*A. Salsillam* foliorum formâ, umbellae divisionibus valde variare; folia modo latiora, tuncque plana apice minus recurvato, modo angustissima et tunc marginibus revolutis apice fere cirrhoso occurrere; umbellae radios modo bifidos modo simplices tuncque plures esse flores, quam 6“ et quae de petalis „ni forsân“ profert, concedimus; majorem tamen fidem habemus videntibus plantas vivas, hasque in species dirimentibus, quam scrutatoribus exsiccatarum, illas conferruminantibus.

26. * *A. multiflora*; foliis petiolatis, lanceolatis, acuminatis; umbellâ simplici; pedunculis bracteis brevioribus; petalis alternis truncatis. *Linn. Suppl. p. 207. Willd. Spec. II. p. 196. Banks ic. t. 1. BOMAREA multiflora Mirb.*

„Habitus et structura herbae *A. Salsillae*; at petioli margine rugosi, nec umbella pedunculata, ut in *A. Salsilla*. Involucrum multiflorum constat foliolis latioribus. Pedunculi involucro et florê breviores, simplicissimi, nudi. Flores magnitudine *A. Salsillae*. Petala 3 exteriora breviora, angustiora, integra; interiora truncata s. emarginata cum acumine. Colorem hujus ignoro, nam siccam misit cl. *Mutis*. A reliquis distinctissima est. Folia *Alströmeriarum* sunt resupinata, et corollae petalis alternis minoribus. *Linn. In America meridionali. Mutis. 4.*

27. *A. anceps Ruiz et Pav.*; caule volubili, ancipiti; foliis lanceolatis, acutis; umbellâ 17-florâ; petalis aequalibus; punctis atropurpureis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 61.*

Glabra. Caulis simplicissimus, gracilis. Folia alterna, breviter petiolata, integerrima, lineata, basi apiceque spiraliter contorta. Involucri polyphylli foliola lanceolata. Petala intense purpurea, intus obscure lutea, punctis atropurpureis maculata. *Ruiz et Pav. In nemoribus ad Huassahuassi Andium Peruviae. 4.*

28. *A. rosea Ruiz et Pav.*; caule volubili, tereti; foliis ovato-lanceolatis, (subtus pubescentibus, breviter petiolatis); umbellâ 18-radiatâ; petalis interioribus lineis nigris maculatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 91.*

Caulis glaber, nitidus, 5-ped. Folia alterna, breviter petiolata, acuta, integerrima, striata, subtus pubescentia, supra glabra. Petioli breves, spiraliter contorti. Involucri polyphylli foliola linearia, inaequalia, brevia. Pedunculi erecti, teretes, aequales, apice reflexi, ad medium bracteam subulatâ persistente. Petala rosca apicibus viridibus: 3 interiora basi tubulosa, apice lineis nigris maculata et viridiora. *Ruiz et Pav. In nemoribus Andium Peruviae ad Huassahuassi. 4.*

29. *A. crocea Ruiz et Pav.*; caule volubili, tereti; foliis lineari-lanceolatis, sessilibus, subtus pubescentibus; umbellâ multiflorâ; (pedunculis pubescentibus); petalis aequalibus, croceis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 61.*

Triogyalis. Caulis glaber. Folia sparsa, sessilia, acutissima, integerrima, supra glabra, albida, erecto patentia, nervosa, striata, basi contorta, 1½ palmaria, 4 lin. lata. Involucri polyphylli foliola oblongo-lanceolata, acuta, foliis caulinis latiora triploque breviora. Pedunculi arcuati, pubescentes, purpurei. Cor. 1½ poll. Petala crocea, aequalia, interiora basi tubulosa. Caps. albida, pubescens. *Ruiz et Pav. In nemori-*

bus ad Churupallana in Tarmae provinciae Andium Peruviae. 4.

30. *A. bracteata Ruiz et Pav.*; caule volubili (superne pubescenti); foliis lanceolato-linearibus (nervosis, subtus pubescentibus); umbellâ 5-radiatâ, sub-12-florâ; (pedunculis 2-3-floris; bracteis magnis, oblongo-lanceolatis); petalis interioribus spathulatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 61. t. 291. f. b. Pinipini Incol.*

Caulis teres, simplicissimus, superne pubescens. Folia sparsa, remota, integerrima, striata, nervosa, basi apiceque contorta, subtus lineata et pubescentia. Involucri foliola 5 lanceolata. Pedunculi longi, erecti, teretes, 2-3-flori, divergentes; bractea oblongo-lanceolatâ ad basin pedicellorum. Petala 3 exteriora purpurea, oblongo-lanceolata, apice viridia; 3 interiora viridia, basi lutea, margine prope apicem punctis violaceis. *Ruiz et Pav. In nemoribus ad Huassahuassi. 4.*

31. *A. coccinea Ruiz et Pav.*; caule assurgenti, villosi; foliis ovatis, acutis; umbellâ 2-4-florâ; petalis oblongo-cuneiformibus. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 62. t. 291. f. a.*

Radix filiformis, fibrillosa, tuberoso-pendula: tubera oblonga, alba, tenera, hyalina. Caulis fere 3-ped., simplicissimus, teres, inferne attenuatus, a medio ad basin squamis loco foliorum ovatis minimis, superne flexuosus. Folia alterna, breviter petiolata, integerrima, supra striata, glabra, subtus nervosa, villosa, inferiora sensim minora. Petioli spiraliter contorti. Involucrum nullum. Pedunculi teretes, villosi, 2-poll., 1-flori. Flores parvi, $\frac{1}{2}$ poll. Petala exteriora oblonga, coccinea, apice viridia; 3 interiora cuneiformia, luteo-virescentia, punctis purpureis maculata. Stamina corollâ breviora, 3 alterna longiora. Caps. pubescens, ovalis, non dehiscens. Semina plura in pulpa nidulantia. *Ruiz et Pav. Sprengel hanc speciem omisit. In nemoribus ad Huassahuassi Peruviae. 4.*

32. *A. pauciflora Humb. et Bonpl.*; caule volubili, foliisque glabris, ovato-oblongis aut ovato-lanceolatis, rigidiusculis; umbellâ pauciflorâ; pedicellis 2-3-floris, elongatis, glabris; laciniis calycinis exterioribus longioribus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 285.*

Caulis foliosus. Folia sparsa, acuminata, striato-nervosa, supra viridia, subtus pallidiora, 2 poll. et ultra, pollicem lata, saepius angustiora, patentia. Petioli membranacei, glabri, spiraliter torti, 3 lin. Umbella terminalis, 4-radiata, radiis 4-5 poll., 2-3-floris. Flores pedicellati, bracteati. Bractea lanceolata, subpollicaris. Cal. glaber; lacinae 3 exteriores oblongae, acutiusculae, nervosae, 10 lin., purpureae?, exsiccatae obscure fuscae; 3 interiores spathulatae, unguiculatae, obtusiusculae, aurantiacae? Stamina calyce paullo longiora. Filamenta subulata, glabra, ut Germen et Stylus staminibus brevior. *Kunth l. c. Juxta S. Fe de Bogota in devexis montis St. Quadalupae. 4.*

33. *A. setacea Ruiz et Pav.*; caule scandente; foliis lanceolatis (subtus pubescentibus); umbellâ simplici radiis nu-

merosis; pedunculis pubescentibus; bracteolis setaceis; corollâ parvâ; (petalis erecto-conniventibus). *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 62. t. 292. f. b.*

Caules simplicissimi, 3-4-ulares, nitidi, glabri, subteretes. Folia sparsa, integerrima, 1 $\frac{1}{2}$ poll., breviter petiolata, striata, supra glabra, subtus pubescentia, $\frac{1}{2}$ poll. lata. Petioli contorti. Umbella terminalis radiis 18-35, saepius paucioribus. Involucrum polyphyllum; foliolis parvis, lanceolatis, acutis. Pedunculi divergentes, teretes, pubescentes, 1-flori, 1-2 poll.; bracteolâ infra medium setaceâ. Flores vix $\frac{1}{2}$ poll. Petala erecto-conniventia, acumine minimo, glabra; exteriora oblonga, punicea; interiora spathulata lutea. Stamina corollâ breviora. Caps. subrotunda, trigona, cerasi magnitudine, truncata, apice 3-valvis. Semina subrotunda, rubra. *Ruiz et Pav. In nemoribus ad Pillao Andium Peruviae. 4.*

34. *A. tomentosa Ruiz et Pav.*; caule subvolubili, glabro; foliis lanceolatis, marginibus reflexis, subtus tomentosis; umbellâ multiflorâ; radiis bifloris. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 62. t. 292. f. a. Kerner h. semperv. t. 207.*

Affinis *A. ovatae*. Radix filiformis, longa, tuberoso-pendula; tubera oblonga, alba, tenera, hyalina. Caulis fere 4-ped., simplicissimus, angulatus, leviter striatus, nitidus, glaber. Folia sparsa, breviter petiolata, integerrima, supra enervia, subtus striato-nervosa tomentosa, incana, basi apiceque spiraliter contorta, 1-3 poll., poll. lata. Involucrum polyphyllum: foliolis lanceolatis. Pedunculi bracteolâ ad basin floris. Flores parvi. Petala exteriora oblonga, coccinea; 3 interiora spathulata, basi semitubulosa, lutescentia. Caps. subrotunda, trigona, obscure coccinea. Semina in pulpa dulci nidulantia. *Ruiz et Pav. In nemoribus ad Munna et Pillao Andium Peruviae. 4.*

35. *A. ovata Cav.*; caule volubili; foliis petiolatis, ellipticis, acuminatis, superne villosis (subtus lucidis); umbellâ ramosâ; pedunculis involucre longioribus, bifloris, bracteatis, laxis; corollâ campanulato- (tubulosâ). *Willd. Spec. II. p. 196. Cavan. Icon. pl. 1. p. 54. t. 76. BOMAREA ovata Mirb.*

Caulis contra motum solis volubilis, gracilis, duriusculus, 3 ped. Folia alterna, sessilia, lanceolata, acutissima, basi in petiolum contracta, ibique torta ut inferior pagina sursum spectet; superior lanuginosa, inferior quasi vernice obducta, limbo revoluta paginam versus lanuginosam; nervo medio vix prominente; lincis pluribus parallelis. Involucri foliola inaequalia, revoluta, numero radios aequantia; radii saepe 5, ad bracteolam bifidi, unde biflori; pedicellis 1 $\frac{1}{2}$ poll. Corollae petala in tubum approximata, ovato-oblonga; 3 exteriora coccinea, apice viridia; interiora viridia, versus summitatem planiuscula punctisque nigris variegata; limbo inferne utrinque in canalem involuto; omnia summo germi affixa, faucem patulam sistentia. Stam. alba, germi prope petalorum basin affixa, subulata; antherae ovatae, fuscae. Germen viride, sulcis 6, apice crenulis totidem. Stylus crassiusculus, subulatus. Stigmata 3, acuta. Caps. globosa, poll. in diametro, 6-sulcata, margine 6-crenato, superne circumscissa; valvulis concavis. *Cav. In Peruvia. 4.*

36. *A. hirtella* Humb. et Bonpl.; caule volubili, glabro, foliis oblongis, membranaceis, subtus in venis hirtis; umbellâ multiflorâ; pedicellis subunifloris, glabris; laciniis calycinis exterioribus paullo brevioribus. Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 284.

Caulis compressus. Folia sparsa, acuminata, striato-nervosa, plana, supra glabra, subtus pallidiora, 2-2½ poll., pollicem lata, patentia. Petioli spiraliter torti, 4 lin.. Umbella terminalis, 8-12-flora. Pedicelli saepissime 1-, rarius 2-3-flori, glabri, 2-poll., medio bracteati. Bractea oblonga, acuta, membranacea, concava, nervosa, glabriuscula, 4-lin.. Cal. glaber: lacinae 3 exteriores obovato-lanceolatae, acutae, nervosae, pollicares, rubrae; 3 interiores spathulatae, unguiculatae, apice rotundatae, virescentes, rubro-maculatae. Stamina calyce breviora, pubescentia, uti Germen. Stylus staminibus duplo brevior. Stigma 3-fidum. Kunth. Inter Mexico et Tanguillo in via Toluccensi. 4.

37. *A. denticulata* Ruiz et Pav.; caule scandente; foliis lanceolato-ovatis, acutissimis, marginibus repando-denticulatis, (subtus pubescentibus); floribus umbellato-corymbosis; (bracteis subulatis). Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 62. t. 293. f. b.

Radix filiformis, tuberoso-pendula; tubera oblonga, hyalina. Caulis simplicissimi, teretes, nitidi, fulvescentes, glabri. Folia alterna, remota, multinervia, striata, marginibus retroflexis, supra glabra, subtus per nervos dense pubescentia, 1-3-poll., plerumque poll. lata. Petioli 2 lin., repando-dentati, contorti. Flores numerosi, parvi. Pedunculi conferti, alternantes, 1-flori, totidem bracteis subulatis; squamulis furfuraceis. Cor. rubrolutescens. Petala longitudine aequalia, 3 exteriora oblongo-obovata, acumine minimo; interiora cuneiformia, basi semitubulosa, acuminata. Stamina corollâ breviora. Germen turbinatum. Stigmata 3 reflexa. Ruiz et Pav. In montibus altissimis, frigidis ad Patasaria Andium Peruviae. 4.

38. *A. fimbriata* Ruiz et Pav.; caule volubili; foliis lanceolatis, angustis; umbellâ multiflorâ; petalis interioribus fimbriatis. Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 63. t. 293. f. a.
A. c. v. glabro; fol. breviter petiolatis, anguste lanceolatis, acuminatis, subtus pubescentibus; u. m.; pedicellis unifloris, glabris; petalis interioribus denticulatis. Reliqu. Haenk. Fasc. II. p. 121.

Caulis simplicissimi, teretes, nitidi, glabri. Folia alterna, petiolata, acutissima, nervosa, striata, supra glabra, subtus leviter pubescentia, fere 3-poll., vix poll. lata. Petioli 3 lin., contorti. Umbella simplex; floribus 25-50 et ultra. Involucri foliola totidem lanceolata, retroflexa, intima sensim minora. Pedunculi poll., contorti, rubicundi, 1-flori. Cor. fere poll., lutea, colore croceo variegata. Petala interiora apice viridia, spathulata, margine fimbriata, basi semitubulosa; 3 exteriora cuneiformia. Caps. magnitudine Avellanae minoris, subovata, truncata, trigono-alata, trisulca, interne externeque transversim rugosa, apice per angulos ultra medium dehiscens, patentissima et tunc subtus tricornis aut tricalcarata; valvulis ovatis,

obtusis, acumine minimo, medio septiferis. Semina globosa, rubicunda, receptaculis per angulos internos decurrentibus inserta, vix grani piperis magnitudine. *Ruiz et Pav.* Pedicelli involucro longiores, erecti. *Rel. Haenk.* In nemoribus *Andium Peruviae ad Pozuzo.* 4.

39. *A. purpurea Ruiz et Pav.*; caule scandente, pubescente; foliis lanceolatis, angustis, subtus pubescentibus; floribus corymbosis subumbellatisque purpureis; (pedunculis 1-floris, lanuginosis, bracteatis). *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 63. t. 294. f. a.*

Caules simplicissimi, 3 org., superne sulcati, pubescentes, inferne ob pubescentiae delapsam glabri, teretes, nitidi. Folia sparsa, remota approximataque, acuta, nervosa, striata, integerrima, plana, palm. longa, poll. fere lata, supra glabra. Petioli contorti, 2-lin.. Flores terminales, 20-60. Pedunculi 1-flori, 1½ poll., lanuginosi, purpurei, bracteis lanceolato-linearibus; in nonnullis bracteolâ ad medium simili. Cor. purpurea, poll.. Petala exteriora cuneiformia, obtuse acuminata; interiora spathulata, basi semitubulosa. Stamina longitudine fere corollae. Antherae luteae, ovaes. Caps. subturbinata, truncata, trigono-alata, triquetra, trisulca, apice per angulos parum dehiscens, trivalvis, avellanæ nucis magnitudine. Semina subrotundo-triquetra aut polyedra, rubra, receptaculis per angulos internos decurrentibus inserta. *Ruiz et Pav.* In nemoribus versus *Pillao Andium Peruviae.* 4.

40. *A. macrocarpa Ruiz et Pav.*; caule scandente; foliis oblongo-lanceolatis, (subtus pubescentibus); umbellâ multiradiatâ; pedunculis bifloris, longissimis, (involucro multoties longioribus.) *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 63. t. 294. f. 2.*

Caules scandentes, 3-ulnares et ultra, simplicissimi, glabri, teretes. Folia sparsa, petiolata, acuta, integerrima, nervosa striata, palmaria, poll. lata, supra glabra, subtus pubescentia. Petioli contorti, 3 lin.. Umbella terminalis, 6-18-radiata. Involucrum polyphyllum; foliolis parvis, lanceolato-subulatis. Pedunculi 2-4-poll., 2-rarius 3-flori, ad basin pedicellorum bracteis lanceolato-subulatis. Cor. rubro-lutescens, poll.. Petala exteriora oblongo-cuneiformia, interiora spathulata, basi semitubulosa. Caps. globoso-turbinata, nucis juglandis magnitudine, lutea, trigona, trisulca. Semina subrotunda, in pulpa lutescente nidulantia. *Ruiz et Pav.* An diversa ab *A. ovata Cav.*? In nemoribus ad *Pillao Andium Peruviae.* 4.

41. *A. salsilloides Mart.*; caule scandente; foliis petiolatis, lanceolatis, acuminatis, utrinque glabris; umbellâ 6-25-radiatâ; pedunculis 2-3-floris; petalis exterioribus ovato-oblongis cum acuminulo: interioribus paulo longioribus, cuneatis, emarginatis, punctatis; filamentis inferne pubescentibus. *De Mart. Fl. brasil. ined.*

Caulis tenax, angulosus, glaberrimus, viridis. Folia alterna, patentia, saepius obliqua, nervosa, tenuia, laete viridia, subtus glaucescentia, 4-6½ poll., 7-12 lin. lata. Petioli supra plani, torti, glabri, 2-4 lin.. Invol. folia numerosa, inaequalia, exteriora lanceolata, subpetiolata, 2-3½ poll., 6-9 lin. lata; in-

tima linearia sessilia, 5-6 lin., $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. Umbella ampla. Pedunculi undique patentēs, teretiusculi, glabri, 2-5-poll., superne dichotomi et saepius subnutantes; bracteâ ovato-lanceolata 5-7 lin.; ramulus pedunculo brevior, iterum 2-florus, bracteâ $2\frac{1}{2}$ -4 lin.. Cor. subnutans, subcampanulata, 9-12 lin., 7-9 lin. diam.; petala exteriora aequalia, miniata?, immaculata, 9-11 lin., 4-5 $\frac{1}{2}$ lin. lata: interiora truncata cum acuminulo in emarginatura, 10-12 lin., 3 lin. lata, virescenti-flavida, maculis numerosis purpureis. Stam. erecta; filamenta inferne glanduloso-pubescentia, 3 longiora. Styl. staminibus brevior. *In sepibus prope Rio-Janeiro. 4.*

42. *A. grandifolia Humb. et Bonpl.*; caule volubili, glabro; foliis ovatis, membranaceis, subtus subpubescentibus; umbellâ pauciflorâ; pedicellis unifloris, pubescentibus; laciniis calycinis aequalibus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 285.*

Affinis cordifoliae. Caulis foliosus. Folia sparsa, petiolata, acuminata, plana, striato-nervosa, supra viridia, glabra, subtus pallidiora, 4 poll. et ultra, 2 poll. lata et ultra. Petioli $\frac{1}{2}$ poll., torti, pubescentes. Flores 5-6, umbellati. Pedicelli $1\frac{1}{2}$ poll. et paullo ultra. Cal. glaber: lacinae 3 exteriores oblongo-lanceolatae, obtusae, nervosae, rubrae, exsiccatae fuscae, 10 lin.; 3 interiores longitudine exteriorum, tenuiores, oblongo-spathulatae, obtusae, unguiculatae, nervosae, aurantiacae? rubro maculatae. Stamina calycem subaequantia. Filamenta subulata, glabra. Germen pubescens, uti stylus erectus, longitudine staminum. Stigma 3-fidum. *Kunth. In calidis provinciae Jaen de Bracamoros inter ripam fl. Amazonum et San Felipe. 4.*

43. *A. cordifolia Ruiz et Pav.*; caule scandente; foliis cordatis, acuminatis; umbellâ 6-radiatâ; pedunculis 2-3-floris, (puberulis; germine sublanuginoso.) *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 64. t. 290. f. b. Kern. h. semperv. t. 460.*

Caulēs simplicissimi, 2-3-ulnares, subteretes, glabri, nitidi. Folia alterna, remota, oblique acuminata, integerrima, nervosa, striata, supra glabra, nitida, subtus leviter pubescentia, 4-poll., 3 poll. fere lata. Petioli spiraliter contorti, 3 lin.. Umbella terminalis, plerumque 6-radiata. Involucrum foliolis totidem ovato-lanceolatis, acuminatis, interioribus sensim minoribus. Pedunculi $1\frac{1}{2}$ palmares, divergentes, leviter pubescentes; pedicelli bracteis totidem lanceolatis. Cor. poll., rubicundo-lutescens. Petala exteriora oblonga, interiora spathulata, basi semitubulosa. Germen turbinatum, leviter lanuginosum. *Ruiz et Pav. In nemoribus Andium Peruviae ad Pozuzo viam. 4.*

44. *A. latifolia Ruiz et Pav.*; caule volubili; foliis oblongo-ovatis, acuminatis, (nervosis, subtus pubescentibus); umbellâ multiradiatâ; pedunculis 1-3-floris, bracteatis; corollâ rubro-viridi; (petalis exterioribus cuneiformibus, obtusis: interioribus spathulatis, acuminatis). *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 64. t. 295. Kern. h. semperv. t. 248.*

Caulēs simplicissimi, teretes, glabri, nitidi, semipurpurei. Folia alterna, remota, petiolata, integerrima, nervosa, striata, supra

glabra, subtus pubescentia, $1\frac{1}{2}$ palmaria, palmam lata. Petioli spiraliter contorti, 3 lin., plani. Umbella terminalis, radiis 7-14. Involucrum foliolis totidem lanceolatis, magnis. Pedunculi divergentes, palmares, rubri. Pedicelli filiformes, bractea lanceolata rubra. Cor. poll. et ultra, rubro-viridis. Petala exteriora lineata, cuneiformia, concava, obtusa, subtus obscure rubra, supra dilutiora, apice virescentia; interiora 3 spathulata, viridia, punctis et lineis violaceis variegata, acuminata, basi semitubulosa. Filamenta subulata, compressiuscula, longitudine fere petalorum, parum declinata. Antherae glauco-caeruleae, ovoides. Caps. subrotunda, hexagona. *Ruiz et Pav.* In *Peruviae collibus vulgo Lomas dictis ad Atiquipa*. 4.

45. *A. hirsuta* Humb. et Bonpl.; caule volubili foliisque subtus hirsutis, oblongis, rigidiusculis; umbellâ multiflorâ; pedicellis unifloris hirsutis; laciniis calycinis exterioribus brevioribus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth III. p. 285.*

Affinis *A. tomentosae* et *latifoliae* R. et P.; num ab hac diversa? Caulis compressus, rubescens, hirsutus, foliosus. Folia sparsa, acuminata, striato-nervosa, supra viridia, glabra, subtus pallidiora, 4 poll. et ultra, $1\frac{1}{2}$ poll. lata, patentia. Petioli plani, margine crenulati, hirsuti, spiraliter torti, $\frac{1}{2}$ poll. Pedicelli $1\frac{1}{2}$ poll. Cal. glaber, incarnatus; lacinae 3 exteriores oblongae, obtusae, nervosae, 7 lin.; 3 interiores subpollicares, obovatae, unguiculatae, apice emarginatae, mucronatae. Stam. calycem aequantia. Filamenta pubescentia, uti germen et stylus triangularis longitudine staminum. Stigma laciniis 3 revolutis. Caps. baccata, ovata, truncata, trigona, sulcata, 3-locularis, loculis polyspermis. *Kunth.* In montosis sylvaticis *Novogranat. inter Fusagasuga et Icononzo*. 4.

46. *A. formosissima* Ruiz et Pav.; caule scandente; foliis lanceolatis, longis, (glaberrimis); umbellâ semiglobosâ; (pedunculis 1-floris); floribus numerosis, puniceo-luteis, punctatis. *Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. p. 64. t. 296.* *A. formosa* Pers. *Syn. 1. p. 381.* *Herner h. semperv. t. 265.*

Caulis simplicissimi, 2-org. et ultra, sulcati, nitidi, glabri. Folia sparsa, approximata remotioraque, acutissima, integerrima, striata, nervosa, utrinque glabra, 3-palmaria, poll. lata. Petioli $\frac{1}{2}$ poll., plani, spiraliter contorti, furfuracei. Umbella terminalis, maxima, semiglobosa, simplex, radiis 36-80. Involucrum foliolis totidem lanceolatis, intimis sensim minoribus. Pedunculi 2-poll., angulati, obsolete lanati, 1-flori. - Cor. $1\frac{1}{2}$ poll., pulcherrima. Petala exteriora oblongo-obovata, punicea, striata; interiora spathulata, acuminata, puniceo-lutea, punctata, basi semitubulosa. Filamenta lutea, planiusecula, subulata. Antherae caeruleae. Germen turbinatum. Caps. turbinata, trigona, trisulca. *Ruiz et Pav.* In nemoribus *Andium Peruviae ad Munna*. 4.

Obs. A. formosa Linn. *Suppl.*, cujus *Persoon* in nota ad ALSTRÖMERIAS meminit, non existit in *Linn. Suppl.*

47. *A. Caldasii* Humb. et Bonpl.; caule volubili, foliisque utrinque glabris, ovato-lanceolatis, rigidiusculis; umbellâ multiflorâ; pedicellis unifloris, pubescentibus; laciniis

calycinis exterioribus multo brevioribus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth* III. p. 283. Videtur *A. purpurea*; caule volubili; foliis petiolatis, oblongis, lanceolatis, glabris; umbellâ simplici, multiflorâ; pedunculis involucri subaequantibus; petalis exterioribus lanceolatis, interioribus obovatis. *Reliq. Willd. Ms. fide de Schlechtend. fil.*

Caulis glaber, foliosus. Folia sparsa, acuminata, striato-nervosa, plana; subtus pallidiora, 2-3 poll. et ultra, 9-10 lin. lata. Petioli membranacei, spiraliter torti, glabri. Flores numerosi, umbellati. Pedicelli 1½ poll. Calycis lacinae 3 exteriores oblongo-lanceolatae, obtusiusculae, sub apice tuberculatae, nervosae, glabriusculae, incarnatae, 9 lin.; 3 interiores exterioribus multo longiores, pollicares, obovato-cuneatae, unguiculatae, emarginatae, glabrae, aurantiacae, rubro maculatae. Stam. calycem subaequantia. Filamenta pubescentia, demum declinata. Pollen flavum. Germen, uti Stylus triqueter, pubescens. Valde affinis *floribundae*, et vix nisi foliorum formâ, floribus paulo minoribus et laciniis calycis exterioribus multo brevioribus diversa. *Kunth. In temperatis prope Alangasi, Pifo, et Chillo Quitens. 4.*

48. *A. floribunda* *Humb. et Bonpl.*; caule volubili folisque utrinque glabris, lanceolatis, submembranaceis; umbellâ multiflorâ; pedicellis unifloris, pubescentibus; laciniis calycinis exterioribus paulo brevioribus. *Humb. et Bonpl. nov. gen. red. Kunth* III. p. 283.

Caulis compressus, foliosus. Folia sparsa, breviter petiolata, acuminata, striata, plana, 2½ poll., 5 lin. lata, patentia aut reflexa. Petioli glabri, spiraliter torti. Flores numerosissimi, umbellati. Pedicelli pollicares, basi bracteati. Calycis lacinae 3 exteriores oblongo-lanceolatae, sub apice tuberculatae, nervosae, externe pubescentes, pollicares, rubrae?; 3 interiores tenuiores, obovato-cuneatae, apice emarginatae, basi unguiculatae, nervosae, glabrae, flavae?, rubro-punctatae. Stamina calycem subaequantia. Filamenta subulata, pubescentia, demum declinata. Antherae oblongo-ellipticae, erectae, biloculares. Germen pubescens, uti Stylus erectus. Stigma 3-fidum. *Kunth. Sprengel S. V. II. p. 82. eandem habet sub A. Caldasii, a qua nequidem instar varietatis distinxit. In temperatis Andium Quinduensium prope la Palmilla. Tetona pecosa Incol. 4.*

49. *A. Bredemeyerana*; floribus corymbosis, aggregatis; pedunculis bracteis longioribus; foliis ovato-oblongis, petiolatis, acuminatis, subtus cauleque volubili? tomentosis. *Reliqu. Willd. Ms.*

Non est *A. floribunda*, et forte non caule volubili. Caulis dense pubescens. Folia breviter petiolata, lanceolata, supra glabra, striata, subtus glaucescentia, pubescentia. Flores numerosi, terminales, umbellati. Pedunculi pollicares, pubescentes, basi bracteis reflexis, eorundem longitudine. Flores pollicares: lacinae 3 exteriores interioribus parum breviores. In honorem inventoris nominanda. *De Schlechtend. fil. Circa Caracas. Bredemeyer. 4.*

1423. IXIOLIRION.

1. *I. montanum* *Herb.*; spathâ multiflorâ; foliis lineari-subulatis; petalis alternis mucronatis; genitalibus erectis. *La Billard. plant. Syr. rar. Dec. II. p. 5. t. 1.* (sub AMARYLLIDE *montana*, uti *Willd. Spec. II. p. 56. Poir. Suppl. 1. p. 319. Red. Lil. t. 241. et Tratt. Tabular. t. 389.*) *Herbert App. p. 37. ALSTRÖMERIA montana Ker in Recens. Redout. in Journ. of Scienc. No. II. p. 183.*

Caulis subflexuosus, saepe ramosus, foliosus. Spatha terminalis multi-, axillaris uniflora: spathae phylla plerumque tot, quot flores. Flores paniculati, caerulei: laciniis aequalibus, profundis; 3 alternis mucronatis, reliquis obtusis. Filamenta recta, unguibus corollae inserta: 3 breviora. Antherae oblongae, sulcis 4. Germen inferum, turbinatum. Stylus staminibus longior. Stigmata 3 recurva. Capsula ovali-oblonga, seminibus pluribus ovali-oblongis, nigricantibus. *Labill.* Caulis 11-16 poll., gracilis, glaber, vix striatus, simplex vel apice subramosus. Folia radicalia, 5-6, caule breviora, vaginantia, basi vaginâ communi membranaceâ fuscescente inclusa; caulina pauca, multo breviora, basi amplexicaulia. Panicula vel umbella irregularis, terminalis; flores in ramis ultimis solitarii. Bractee ad basin pedicellorum 2 oppositae, lanceolatae, membranaceae, pedicellis multo breviores; ad basin rami ultimi umbellae bractee similes, numero radiorum umbellae, spatham vel involucrum simulantes. Cor. regularis, semipatens, ad germen usque divisa; lacinae lineari-lanceolatae, poll. circiter. Filamenta filiformia, 3 breviora cor. laciniis apiculatis inserta. Stylus filiformis, erectus. Caps. basi angustata. *Redouté* ad specim. siccum. *In altioribus Libani.* 4.

2. *I. tataricum* *Herb.*; caule submultifloro, folioso; corollis 6-partitis; laciniis 3 angustioribus acutis; staminibus corollâ brevioribus; foliis lineari-subulatis. *Marsch. a Bieb. Fl. Taur. Cauc. 1. p. 260. Suppl. p. 256.* (sub AMARYLLIDE *tatarica* uti sequentes:) A. spathâ subbiflorâ; cor. subcampanulatis, profunde 6-partitis: laciniâ supremâ angustissimâ, infimâ obovatâ acuminatâ; fol. linearibus, scapo longioribus. *Willd. Spec. II. p. 54. Pall. it. 3. app. 85. t. D. f. 1. Link Enum. 1. p. 134.*

Cor. fere hexapetala. Filamenta alterna breviora. *Pall. Pedunculus 1-florus, axillaris, e medio caule, praeterea flores 2-4 terminales, foliis 2 spathaeformibus suffulti. M. Bieb.* "Folium caulinum semper prostat; pedunculus vero axillaris saepe deest. Spatha 2-4-phylla, foliolis margine albo late membranaceis, acumine foliaceo mox brevi, mox elongato. Non video quomodo a nostra differat *A. montana* *Labill. Syr. Dec. 2. t. 1. Red. Lil. t. 241.*" *M. a Bieb. Suppl.* Bulbus ovatus, subuncialis. Folia radicalia longiora, caulina quasi bractee. Pedunculi axillares et terminales, 1-2-flori. *Herbert.* Cor. parva, caerulea. *Link. In Sibiria circa lacum Inderiensem, in Tauria.* 4.

Obs. „Capsula elongato-oblonga, nervis 12 prominentibus. Lacinae corollae medio trinerves. Caulescens, non scaposa. Specimen archetypum vidimus in *Herb.*

Herb. Lamb.. Potius cum *A. montana* congener, genus condiet novum. "*Herb. Revis.* p. 28. Species hasce duas auctoritate rev. *Herbert* retinuimus, quamvis unam eandemque sistere videantur, nam in specimina nostra sibirica descriptio *AMARYLLIDIS montanae* a *Redouté* data tam exacte quadrat, ut sequentia tantum addenda: caulis 11-12 poll., crassitie pennae gallinae ad penam anatinam usque, saepe tortus. Folia radicalia 3-5, anguste linearia, subulato-acuminata, basi vaginantia, acuta, 6-8 poll.; caulina 1-2, angustiora, 3-poll., glaucescenti-viridia. Umbella 2-5 flora; pedunculi stricti, teretiusculi, glabri, simplices, 1-flori, 6-24 lin.. Cor. pallide caerulea, 1-1½ poll. diam.; lacinae oblongae, 8-9 lin., medio dorsi nervis 3; exteriores 1½ lin. latae, mucrone brevi quidquam reflexo; interiores obtusae, 2 lin. latae. Filamenta longiora corollae ⅓, breviora eadem plus duplo breviora, glabra, subulato-filiformia. Antherae flavae, effetae revolutae, lin.. Germen oblongum, basi attenuatum, trigonum, sulcato-striatum, 2-3 lin.. Stylus corollae paulo tantum brevior. Stigmata patenti-reflexa. Occurrit etiam nomine *Scillae amoenae*!